

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

636.605
GE
v. 54

JUN 24 1949

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Begründet

von

Dr. Karl Ruß.

Herausgegeben und illustriert von Karl Neunzig.

Vierundfünfzigster Jahrgang.

Magdeburg 1925.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
(M. Kretschmann).

636.605
GE
v. 54

Inhalts-Übersicht.

(* bedeutet mit Abbildung.)

Größere Arbeiten.

Adlersparre, A.
Zu den Ausführungen des Herrn Krabbe über die Gattung Vidua. S. 25.
*Fütterungstechnik der Vogelhaltung. S. 173, 184. 195.
*Versuche die Gründe des Weißwerdens bei einem gefangenen Granatastrild zu analysieren und ein paar Worte über das Gefangenleben der Art. S. 492. 505. 516. 528. 540. 553.

Arens, P.
*Der Eisvogel. S. 359. 371. 384.
Der Kanarienstieglitz. S. 543.

Athen, Albert.
*Atlantische Vögel. S. 5. 14. 27. 38. 50. 64.

Bacmeister, W.
*Johann Friedrich Naumann. S. 57.
*Alfred Edmund Brehm. S. 369.
Skizzen aus Südtirol. S. 454. 465.
*Karl Theodor Liebe. S. 485.

Balser, C.
Orangenrote Kanarien. S. 459.

Berg, Bengt.
*Mein Freund, der Regenpfeifer. S. 564.

Beyer, Max.
*Meine Gebirgsloris. S. 130. 142.

Birk, J.
Individuelle Fütterung. S. 7. 17. 29. 40. 52.
Die Nachtigall. S. 117. 129. 141. 153. 165. 177.
*Die Tage von Leipzig. S. 279. 287.
*Steinrötel und Blaudrossel. S. 322. 347.
*Die Zwickauer Ausstellung. S. 372. 387.
Das Liebhaberjahr. S. 515. 526. 538. 551. 562. 574. 588.
Die Dresdener Vogelschau. S. 609.

Blohm, W.
*Mein Kuckuck Max. S. 294. 303. 316.

Braun, Fritz.
*Von meinen Vögeln. S. 147. 297. 477.
Von meinen Grauedelsängern und anderes. S. 357.
Umzug. S. 573.

Dähnick, Max.
Ornithologische Beobachtungen auf meiner Dänemark-Schweden-Reise. S. 521. 533.

Dams, A.
Bemerkenswerte Neuzüchtungen. S. 425.

Dreßler, Arthur.
Kleiber und Sumpfmeise. S. 262. 274.
*Die Eingewöhnung des großen Raubwürgers. S. 479. 493. 507.
Sind Mehlwürmer Desinfektionsträger? S. 614.

Drost, Dr. Rudolf.
Die Käfigung von Vögeln zum Zwecke der Vogelzugsforschung. S. 137.

Fehringer, Prof. Dr. O.
Meine gefiederten Sänger. S. 290.

Fink, Karl.
*Rotkehlchenlied. S. 1. 11. 23.
Der Bluthänfling. S. 195. 205. 216. 241. 251.
Etwas über die Ernährung zarter Weichfresser. S. 313. 325. 336. 351. 360. 374.
Die Darre (Kalkdurchfall) der Körnerfresser. S. 435. 446.

Freiwald, Albert.
Entgegnung zu dem Bericht des Herrn Ludwig Frank. S. 324.

Fuchs, Franz.
*Uhuzucht. S. 207.
Ornithologische Plauderei. S. 508.

Grafl, Norbert.
Ueber Brutwilligkeit bei Sittichen. S. 79.

Gribowski, Lothar.
*Etwas über die Dorngrasmücke. S. 530.

Günther, Adolf.
Aufzeichnungen aus dem Jahre 1922. S. 101.
Nach Tagebuchaufzeichnungen von 1921. S. 305.
Tagebuchnotizen von 1923—24. S. 475. 487.

Hagen, Werner.
*Der Kuckuck. S. 614.

Hampe, Helmut.
Ein eigenartiges Trio. S. 76.
*Über eine Rotkehlchenbrut in der Gefangenschaft. S. 504.
*Von meinen Staren. S. 599.

Hauchecorne, Dr. F.
*Aus dem Vogelhaus des Berliner Zoologischen Gartens. S. 276.

Hermann, Rudolf.
Ein Vogelheim. S. 405.

Holzky, Paul.
Anfangsgründe und Grundrisse zur Weiterentwicklung in der Ausbildung des Kanariengesanges. S. 566. 578. 603.

Hunger, Max.
*Wenn Vogelliebhaber eine Reise tun, da können sie was erzählen. S. 413. 426. 438. 450.

Jena, A.
Nächtliches Toben der Körnerfresser. S. 160.
Sind die hohen Preise im Handel mit einheimischen Vögeln gerechtfertigt? S. 266.
Notizen aus vergangenen Jahren. S. 544. 555. 565. 592. 601.

Kaforke, Emil.
Anpassung 86.
*Widerwärtigkeiten. S. 268.
Bevorzugen große, zahme männliche Papageien eine Pflegerin und weibliche einen Pfleger? S. 333.
Biene und Lori. — Ein Papageienliebhaber. S. 503.

Keibel, Leopold.
Vogelschau in München. S. 253.

Kempf, Franz.
25jährige Pflege einheimischer Waldvögel. S. 197.

Kepp, W.
Mein Zaunkönig. S. 382. 393.
Mein Haidijo. S. 490. 501.

Krabbe, A.
Meine Erfahrungen mit dem Zusammenhalten verschiedener Vogelarten in der Voliere. S. 454. 472.

Kretschmar, M.
*Unsere Lerchen. S. 231.

Krumbiegel, Ingo.
Kupferhaltige Vögel. S. 234.
*Bewaffnete Vögel. S. 362.

Krumm, Amtmann Max.
*Dompfaffenzucht. S. 94. 108. 120. 134. 146. 158. 169.

Kuntzendorff, John.
*Rotschwänze — Phoenicurus *(Forst.)* S. 87. 99. 114. 126. 138. 149. 162. 186. 199. 209. 222. 244. 255. 269. 281. 292.
*25 Jahre Schriftleitung. S. 189.
Der Rotwangensäbler — Pomatorhinus erythrogenys *(Vig.)*. S. 350.
*Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten. S. 423. 436. 449. 462. 485 495. 510. 520. 532. 546. 569. 580. 593. 604. 617.

Lichtenstaedt, S.
Mein Liebling — der Jako. S. 108. 122.
Die Sterblichkeit der jungen Graupapageien. S. 180.
Von grauen und anderen Papageien. S. 429.
Etwas über Krankheiten unserer Exoten. S. 598. 610.

Lucanus, Friedrich von.
Über die künstliche Aufzucht junger Papageien. S. 33. 45.

Luginger, Anton.
Einiges über die Gartengrasmücke. S. 110.

Luig, Dr.
Farbenwellensittiche. S. 470.

Mertes, Ado.
Singsittichzucht. Schöner Erfolg — kurze Freude! S. 217.

Merz, Erich.
Lerchen als Käfigvögel und ihre Gesangsbewertung S. 460.
*Die Orpheusgrasmücke als Käfigvogel. S. 577.

Möller, Pfarrer.
Erinnerungen eines Papageienliebhabers. S. 549. 561.
Mörs, F. E. O.
Vogelbilder aus Transvaal. S. 168.
*Dominikanerwitwen und Helenafasänchen. S. 168.
*Königswitwen und Granataftrild. S. 299.
Neunzig, Karl.
*Neueinführungen und Seltenheiten. S. 6.
Nordöstliche Silberschnäbelchen — Aidemosyne cantans orientalis *Hellm.*. S. 6.
*Haubenfink — Coryphospingus cristatus *(Gm.)*. S. 6.
*Olivendrossel — Turdus olivaceus *L.* S. 28.
*Grauer Lärmvogel — Chizaerhis concolor *(A. Sm.)*. S. 29.
*Donaldsons Turako — Turacus donaldsoni *Sharpe*. S. 60.
*Prachttangare — Calospiza pretiosa *(Cab.)*. S. 61.
*Sichelhopf — Rhinopomastus cyanomelas *(Vieill.)*. S. 62.
*Grauschwanzdrossel — Turdus amaurochalina *Cab.* S. 72.
*Südafrikan. Scharrdrossel — Geocichla litsipsirupa *(A. Sm.)*. S. 73.
*Einfarbdrossel — Turdus unicolor *Tick.* S. 74.
*Rostbäuchiger Flötenwürger — Laniarius rufiventris *Sw.*. S. 84.
*Schuppenglanzstar — Cinnyricinclus verreauxi leucogaster *(Gm.)*. S. 97.
*Spekes Webervogel — Ploceus spekei *(Heugl.)*. S. 98.
*Rüppells Weber — Ploceus intermedius *Rüpp.* S. 98.
*Gelbscheitelweber — Ploceus spilonotus *Vig.* S. 98.
*Schwarzstirnweber — Ploceus velatus *Vieill.* S. 98.
*Goldkopfweber — Ploceus auricapillus *Sw.* S. 98.
*Schwarzwangenbülbül — Otocompsa flaviventris *Tick.* S. 118.
*Braunohrbülbül — Hemixus flavala *Hodgs.* S. 119.
*Braunkopftimalie — Timalia pileata *Horsf.* S. 119.
*Meisentimalie — Yuhina nigrimentum *Hodgs.* S. 144.
*Braunscheiteltimalie — Stachyridopsis ruficeps *(Blyth)*. S. 144.
*Rostbäuchige Zwergtimalie — Dumetia hyperythra *(Frankl.)*. S. 145.
*Gestrichelter Rohrdroßling — Argya earli *(Blyth)*. S. 156.
*Zwergniltawaschnäpper — Niltava macgrigoriae *(Burt.)*. S. 158.
*Riesenprachtschnäpper — Niltava grandis *(Blyth)*. S. 183.
*Zwergtrauerschnäpper — Muscicapula maculata *(Tick.)*. S. 183.
*Braunkopfhabia — Buarremon brunneinucha *(Lafr.)*. S. 184.
*Orangebrüstiger Felsschnäpper — Petroeca phoenicea *J. Gd.* S. 203.
*Scharlachbrüstiger Felsschnäpper — Petroeca multicolor *Gm.* S. 203.
*Kleiner Mennigvogel — Pericrocotus peregrinus *(L.)*. S. 204.
*Senegaltaube — Turtur senegalensis *(L.)*. S. 215.
*Weinrote Turteltaube — Turtur vinaceus *(Gm.)*. S. 215.
*Borstenhäherling — Trochalopterum lineatum *(Vig.)*. S. 242.
*Rotwangensäbler — Pomatorhinus erythrogenys *(Vig.)*. S. 243.
*Blaurotschwanz — Phoenicurus frontalis *(Vig.)*. S. 264.
*Weißkehliger blauer Waldschmätzer — Tarsiger rufilatus *(Hodgs.)*. S. 264.
Indische Blaudrossel — Monticola solitarius pandoo *(Sykes)*. S. 265.
*Maskenwürger — Lanius vittatus *(Valence.)*. S. 265.
*Bergmerle — Oroscirtetes erythrogaster *(Vig.)*. S. 286.
*Braunrücken-Strauchschmätzer — Thamnobia cambaiensis *(Lath.)*. S. 286.
*Gelbbrüstiger Dickkopfwürger — Eopsaltria australis *White*. S. 286.
*Salvadoris Breitschwanzlori — Lorius salvadorii *Meyer*. S. 312.
*Borstenkopf — Dasyptilus pesqueti *(Less.)*. S. 312.
*Maskenorganist — Procnias tersa *(L.)*. S. 334.
*Schwalbenglanzstar — Pholia sharpei *(Jacks.)*. S. 334.
*Zweifarbrötel — Cossypha bicolor *(Sparrm.)*. S. 335.
*Goldschopfspecht — Celeus flavescens *(Gm.)*. S. 382.
Gelbnackenspecht — Chrysophlegma flavinucha *J. Gd.* S. 383.
*Halsbandarassari — Pteroglossus torquatus *(Gm.)*. S. 395.
*Zwergarassari — Selenidera gouldi *(Natt.)*. S. 396.
*Lauchgrüner Arassari — Aulacorhynchus prasinus *(Lcht.)*. S. 396.
*Arieltukan — Ramphastos ariel *Vig.* S. 396.
Baillons Arassari — Selenidera bailloni *(Vieill.)*. S. 407.
*Zitronenkopf — Poicephalus flavifrons citreocapillus *(Heugl.)*. S. 407.
*Fischers Unzertrennlicher — Agapornis fischeri *Rchw.* S. 407.
*Schwarzköpfiger Unzertrennlicher — Agapornis personata *Rchw.* S. 408.
Amazonen. S. 433.
*Emins Weber — Ploceus emini *(Hartl.)*. S. 434.
Kap-Steindrossel — Monticola rupestris *(Vieill.)*. S. 434.
Indischer Sonnenvogel — Leiothrix lutea calipypa *Hodgs.* S. 434.
Astleys Sonnenvogel — Leiothrix lutea astleyi *Delacour.* S. 434.
*Rotschwänzige Hügelmeise — Minla igneitincta *Hodgs.* S. 445.
*Jerdons Hügelmeise — Minla jerdoni *J. Verr.* S. 446.
*Kehlstreifen-Meisentimalie — Yuhina gularis *Hodgs.* S. 446.
*Elfenblauvogel — Irena puella *(Lath.)*. S. 446.
*Wüstenläuferlerche — Alaemon alaudipes alaudipes *(Desf.)*. S. 467.
*Buntbartvogel — Capito niger *(St. Müll.)*. S. 468.
*Rotschnabeltoko — Lophoceros erythrorhynchus *Tem.* S. 481.
Gelbschnabeltoko — Lophoceros flavirostris *(Rüpp.)*. S. 482.
Bindentoko — Lophoceros fasciatus *(Shaw)*. S. 482.
*Rostköpfige Schwanzmeise — Aegithalus erythrocephalus *Vig.* S. 490.
*Weißstirnbeutelmeise — Anthoscopus caroli *Sharpe*. S. 491.
*Kapbeutelmeise — Anthoscopus minutus *(Shaw)*. S. 491.
*Mohrenmeise — Parus niger *Vieill.* S. 491.
Flammenköpfchen — Cephalopyrus flammiceps *(Burton)*. S. 531.
Langschopftannenmeise — Parus melanolophus *Vig.* S. 531.
Westafrikan. Weißwangenlerche — Pyrrhulauda leucotis melanocephala *(Lcht.)*. S. 531.
Pelzelns Fink — Sycalis pelzelni *Scl.* S. 552.
*Martiniquegimpel — Pyrrhulagra noctis noctis *(L.)*. S. 552.
*Blaue Nachtigall — Larvivora cyane *Hodgs.* S. 553.
*Ein Besuch bei August Fockelmann zur Besichtigung eines südafrikanischen Tierimportes. S. 15.
*Indier bei Fockelmann. S. 48.
*Zur Vogelschau des „Vereins für Vogelschutz, -pflege und -liebhaberei zu Leipzig". S. 228.
Neunzig, Rudolf.
Ein weiterer Beitrag zur Fütterung der Prachtfinken. S. 36.
Die Fruchtbarkeit der Mischlinge. S. 90.
Beobachtungen an fremdländischen Vögeln. S. 178.
Referat über „Wieder ein Massensterben von Vögeln an der Ostsee". S. 278.
*Von meinen Prachtfinken. S. 418.
*Aus dem Vogelhause des Berliner Zoologischen Gartens. S. 457.
*Mexikaner bei Lenger. S. 576.
Pensler, Otto.
Finkensport. S. 411.
Pollmer, Albin.
Die Bedeutung der Vogelschau. S. 398.
Reich, Karl.
Die Rätsel des Vogelgesanges S. 69. 81.
Zu dem Artikel von Jos. Delvaux-Venlo (Holland) „Eine Streitfrage". S. 219. 229.
Nachtigallkanarien. S. 339.

Reimann, W.
*Zebrafinken. S. 557.
Reitzig, W.
Züchtung von Tarantinischen Unzertrennlichen. S. 338.
R. W.
*Mein Waldkauz. S. 590.
Sandner, Max.
*Vom Sperlingskauz. S. 417.
Allerhand aus Tirol. S. 597.
Schlosser, Enno.
Die geglückte Brut meiner Amaranten. S. 193.
Schmelzer, Walter.
*Finkenmischlinge und anderes. S. 329. 340.
*Kapuzenzeisig × Bluthänfling. S. 410.
Schmitt, Dr. A.
Ein Versuch von Brillenvogelzüchtung. S. 375.
Schneider, Max.
*Mein Mohrenkopf. S. 226.
Schramm, Dr. A.
Wieder eine Vogelstube. S. 93. 105.
Schreitmüller, Wilhelm.
*Einiges über den Kleiber. S. 74.
Melanismus bei Gimpeln, Stieglitzen, Bergfinken, Lerchen und anderes. S. 220.
Inmitten der Stadt Frankfurt a. M. brütende grünfüßige Teichhühner und andere Vögel. S. 303.
Nochmals melanotische Stieglitze. S. 363.
*Verschiedenes über den Kirschkernbeißer. S. 388. 400.
*Die weiße Bachstelze und Viehstelze. S. 482.
Einiges über den Baumläufer. S. 612.
Schulz, Bruno.
*Meine Drosseln. S. 225. 237. 249. 261. 273. 285.
*Meine Körnerfresser. S. 396. 408. 420. 431. 443. 456. 468.
Schuster, B.
*Von meinen Prachtfinken. S. 123.
Meine Prachtfinken und anderes. S. 208. 238.
Schütze, Eduard.
*Mein Vogelhaus. S. 132.
Schwarz, Paul.
Meine Medizin. S. 3. 13.
*Sumpfrohrsänger. S. 58. 70. 82.
*Gelbspötter. S. 190. 201. 213.
Spennemann, August.
*Moearah-Tjiassem. S. 315. 327.
Spille, E.
*Haltung und Züchtungsversuche mit fremdländischen Tauben. S. 113.
Über Zusammenhalten und Verträglichkeit der Vögel. S. 525.
Stauder, Oskar.
Nächtliches Toben unserer heimischen Weichfresser. S. 291.
Stehle, Dr.
Die Lehre von der Ernährung und ihre Anwendbarkeit bei der Fütterung unserer Stubenvögel. S. 365. 377.
Vogelschutz. S. 571. 594.
Steinbauer, E.
Dresdener Vogelausstellung. S. 63.
Stöß, J.
*Mein Seppel. S. 9. 31. 41.
*Meine Krähen. S. 402.
Volierenhaltung oder Einzelkäfigung. S. 518.
Soffel, Karl.
Die Nachtigall. S. 415.
Sunkel, Werner.
Vogelleben in Fritzlar. S. 497.
Thiele, Robert.
*Die Haubenlerche. S. 182.
Troschütz, A.
*Der „Kärrekied". S. 171.
Voigt, A.
Vogelschutz. S. 26.
Spitzschwanzamadinenzucht. S. 96.
Nochmals Vogelschutz. S. 192.
Kubafinkenzucht mit Hindernissen. S. 250.
Zur Pflege der Körnerfresser. S. 345.
Die Gartenvoliere. S. 441.
Wagner, Dr., Bad Salzbrunn.
Liebhaberei und exakte Forschung. S. 246. 256.
Wagner, H.
Lauchgrüne und gelbbäuchige Papageiamadinen. S. 537.
Walder, Dr.
*Mein Papageien-Fliegertrupp. S. 513.
Weber, A.
*Die Vogelschau in Hamburg. S. 34. 46.
Die verd..... Lauheit. S. 321.
Weigold, Dr. Hugo.
*Vogelliebhaber in China. S. 309.
Weitzel, Ludwig.
*Von meinem großen Gelbhaubenkakadu. S. 587.
Wolff-Schötmar, G.
*Photographische Vogelstudien. S. 300.
W. R., Berlin.
*Goldhähnchen, Baumläufer und Meisen. S. 154. 166.
*Von einigen seltener in der Gefangenschaft gehaltenen heimischen Vögeln. S. 353.

Kleine Mitteilungen.

Japanische Möwchen. S. 10, 92.
Isabellfarbener Hänfling. S. 19.
Braunkehliger Wiesenschmätzer am 13. 12. 24 erlegt. S. 32.
Naturfreunde! S. 75.
Betrachtungen gelegentlich der Münchener Vogelschau. S. 55.
Frühling oder Winter? S. 67.
Von Wellensittichen. S. 67.
Ursachen der Abnahme der Vogelwelt. S. 79.
Auslandsbericht. S. 92. 163. 295. 342. 451. 535. 618.
Einiges über meine Winterfutterplätze. S. 103.
Windgeschwulst beim Grünling. S. 115.
Aus der Gartenvoliere. S. 115.
Frühjahrsbeobachtungen (Biberach a. Riß). S. 115. 175.
Näheres über die Zucht von Fliegenmaden. S. 127.
*Freundschaft zwischen Mäusebussard und Ringeltaube. S. 140.
Radio und Brieftauben. S. 151.
Ein Vogelfriedhof. S. 151.
Die Vogelbewegungen nach Norden. S. 151.
Aufzucht von Mauerseglern. S. 151.
Mein Buchfinkalbino. S. 163.
Überwintert die Turteltaube im Senegalgebiet? S. 175.
Frühjahrsbeobachtungen (Pfarrkirchen). S. 175, 235.
Beförderung lebender Vögel durch Flugzeug. S. 200.
Import- und Gefangenschaftsschädigungen exotischer Tiere und Versuch ihrer Bekämpfung durch Venecin-Darreichung. S. 211.
Dompfaffmännchen. S. 212.
Einsammeln frischer Ameisenpuppen. S. 223.
Über die Unterscheidungsmerkmale der Geschlechter der Spitzschwanzamadinen und ihrer Verwandten. S. 223.
Der Massenmord im Süden. S. 235.
Zucht von Feldsperling-Männchen mit einem Haussperling-Albino-Weibchen. S. 247. 548.
Praktischer Vogelschutz im Regierungsbezirk Düsseldorf. S. 247.
*Meine Köhleramsel. S. 258.
*Enchyträen. S. 259.
Unterscheidung von Männchen und Weibchen bei den japanischen Möwchen. S. 259.
Ein Beitrag zur Bekämpfung der Mäuseplage in der Vogelstube. S. 270.
Mehlwürmerzucht. S. 271.
Kauenfang und Vogelschutz. S. 271.
*Beobachtungen in Davos. S. 283.
Drahtkörbchen als Brutstätten für Freibrüter und anderes. S. 283.
Vom Storch, der in den Schornstein fiel. S. 295.
Etwas vom Sprechen der Wellensittiche S. 307.
Abweichende Färbung bei Masken-, Spitzschwanz- und Gouldamadinen. S. 319.
Nur nicht schüchtern. S. 319.
Schwetzingen. S. 319.
Kobaltblaue Wellensittiche. S. 331.
Ein Gartenrotschwanzidyll. S. 331.
Der Kuckuck in der Konservenbüchse. S. 356
Von meinem Rotkehlchen. S. 367.
Ein Drama in der Vogelwelt. S. 367.
Vom Kuckuck. S. 367.
Zahmer Kolkrabe. S. 379.
*Zu der Arbeit: „Ein paar Worte über Alter und Alterserscheinungen einiger höherer Vögel". S. 379.

Davoser Vogelleben. S. 379.
*Kalifornische Schopfwachteln. S. 391.
Das Eichkätzchen als Schädling. S. 391.
Zum Nestschutze. S. 391.
Eröffnung der Vogelschutzausstellung in Ludwigshafen. S. 391.
Angriff eines Fisches auf einen Eisvogel. S. 403.
Stieglitze. S. 403.
Winterfütterung und Eichhörnchen. S. 404.
Wiedehopf und Schwarzspecht in der Großstadt. S. 415.
Milbenbekämpfung. S. 415.
Eigentümlicher Nistplatz einer Bachstelze. S. 427.
Vom Eichelhäher. S. 427.
*Abnorm gefärbte Rotbugamazone. S. 427.
Lebensrettung bei Schwalben. S. 439.
Lebertran. S. 439.
Steinadler in Baden geschossen. S. 439.
Ungestörtheit beim Nestbau. S. 439.
Kennt der Kuckuck sein Ei? S. 463.
Buchfink×Kanarien. S. 463.
*Braunstärling. S. 463.
Transport brasilianischer Vögel. S. 475.
*Grauedelsänger×Kanarienvogel. S. 475.
*Zebrafinkmännchen von ihm erbrütete Möwchenjunge fütternd. S. 475.
*Mohrenkopf. S. 476.
Weiße Wellensittiche. S. 487.
Milbenvertilgungsmittel „Milbol". S. 488.
Vogelversand betreffend. S. 499.
Mehlmilben in den Mehlwurmkisten. S. 499.
Mein Jako. S. 511.
Beobachtungen (Pfarrkirchen). S. 512.
Meine Heidelerche. S. 523.
Die 1. Ausstellung einheimischer Vögel in Dortmund. S. 523.
Buchfink×goldgelbes Kanarienmännchen. S. 548.
Aus dem Kreise Isenhagen (Lüneburger Heide). S. 548.
An den Trebbichauer Teichen. S. 548.
Transport australischer Vögel. S. 559.
*Neuguinea-Edelpapagei. S. 559.
*Taubenhalsamazone. S. 559.
*Zwergara. S. 559.
Widerstandsfähigkeit der Vögel gegenüber schweren Lufterschütterungen. S. 559.
Ein Gegenstück zu Dr. Walders Papageien-Flieger-Trupp. S. 559.
Vom Hunsrück. S. 583.
Erzhalunken. S. 606.
Bilderbücher. S. 607.
Beobachtung (Pfarrkirchen). S. 619.
Rückengeschwulst eines Stieglitz. S. 619.

Sprechsaal.

Frage betreffend:		Antwort:
1. Zinkfuttergefäße für Weichfresser	S. 10.	S. 32. 44.
2. Wärmeschutz bei Glasveranden	S. 20.	
3. Stieglitzkanarienzucht	S. 32.	S. 67.
4. Zeugungsfähigkeit der Bastarde	S. 44.	S. 164.
5. Wellensittichzüchtung	S. 56.	
6. Mischlingszüchtung	S. 67.	S. 103. 128.
7. Nächtliches Toben der Körnerfresser	S. 103.	S. 146. 164.
8. Mischlingszucht	S. 103.	S. 151.
9. Verträglichkeit von Sittichen	S. 103.	
10. Mischlingszucht	S. 140.	
11. Vogelfang in den U. S. v. A.	S. 151.	
12. Automatische Trinkgefäße	S. 175.	
13. Vogelmilbe	S. 187.	S. 212.
14a. Selbstrupfen einer Nachtigall	S. 319.	S. 368.
14b. Granatastrilde	S. 331.	S. 404.
15. Gesang der Bastarde	S. 356.	
16. Johimbetol	S. 380.	
17. Turteltauben	S. 391.	
18. Grauedelsänger	S. 404.	S. 439.
19. Grahammehl	S. 404.	S. 416.
20. Fadenwürmer	S. 416.	S. 440.
21. Nachfrage nach einem Buch	S. 439.	
22. Zinkstücke im Magen eines Wellensittichs	S. 452.	
23. Mehlwurmkiste	S. 523.	
24. Augenentzündung einer Amazone	S. 523.	
25. Grauedelsänger	S. 548.	
26. Fußkrankheit eines Graupapageien	S. 595.	

Farbenwellensittichzucht, eine Fußringfrage. S. 20. 67. 104. 115. 128. 151.
Fruchtbarkeit der Bastarde. S. 164.
Maskenamadinen. S. 164.
Geschlechtsunterschiede bei Spitzschwanzamadinen. S. 175, 284.
Unkenntnis der heimischen Fauna. S. 175.
Über den Versand lebender Vögel nach Österreich. S. 235.
Volksverdummung oder Aufklärung? S. 259. 320.
Aus dem Vogelhause des Zoologischen Gartens zu Berlin. S. 320.
Mehlwurmzucht. S. 331.
Rabenvögel. S. 428.
Buchfink×Kanarien. S. 499.
Gedankenlose Verhetzung. S. 559.
Nur die allergrößten Kälber wählen ihren Metzger selber. S. 619.

Bücher- und Schriftenschau.

Tierbestimmungsbuch von Prorektor Dr. P. Brohmer. Verlag Quelle u. Meyer. S. 68.
Die wissenschaftlichen Grundlagen der Vogelhaltung von Fritz Braun. Sammlung Borntraeger. S. 80.
Ornithologische Monatsschrift, herausgegeben vom Deutschen Verein zum Schutze der Vogelwelt. S. 80.
Werkzeuge der Tiere von Th. Zell. R. Voigtländers Verlag, Leipzig. S. 116.
Vögel der Heimat von Gustav Wolff. Verlag von Georg Schade, Salzuflen. S. 152.
Das V. Jahrbuch der A. Z. S. 175.
Die Vogeleier von Dr. Kurt Floericke. Franckhsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. S. 236.
Bandfische und große Seeschlange von Dr. V. Pietschmann. S. 271.
Der kleine Brockhaus. S. 295, 343.
Deutsche Übersetzungen russischer ornithologischer Werke. S. 307.
Meine Lieblinge die Falken von Dr. Fritz Engelmann. Verlag J. Neumann, Neudamm. S. 488.
Tiere im Zoo von Dr. Knottnerus-Meyer. Verlag von Dr. Werner Klinkhardt, Leipzig. S. 512.
Mein Freund der Regenpfeifer von Bengt Berg. Verlag Dietrich Reimer, Berlin. S. 535.
Der Naturforscher, herausgegeben von Prof. Dr. W. Schoenichen. Verlag von Hugo Bermühler, Berlin-Lichterfelde. S. 560.
Heinrot, Oskar und Frau Magdalene, Die Vögel Mitteleuropas, Verlag Hugo Bermühler, Berlin-Lichterfelde. S. 596.
Das Leben der Vögel von Friedrich von Lucanus. Verlag Aug. Scherl. S. 607.
Wenn die Schnepfen streichen von Baron A. v. Krüden. Verlag Richard Eckstein, Leipzig. S. 608.
Die Mumifizierung von Vögeln und kleinen Säugetieren von Ludwig Kirchrot, Klosterneuburg. S. 608.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig.

S. 10. 20. 44. 56. 68. 80. 104. 116. 128. 140. 152. 164. 176. 187. 200. 212. 224. 272. 284. 296. 308. 331. 343. 368. 380. 392. 404. 416. 428. 440. 452. 464. 500. 512. 524. 536. 548. 560. 572. 583. 595. 608. 620.

Vom Vogelmarkt.

S. 10. 20. 32. 44. 56. 68. 80. 92. 104. 116. 128. 140. 152. 176. 188. 200. 212. 224. 236. 247. 260. 272. 284. 296. 308. 320. 332. 344. 356. 368. 380. 392. 404. 416. 428. 440. 452. 463. 476. 488. 500. 512. 524. 536. 548. 560. 572. 583. 596. 608. 620.

Redaktionsbriefkasten.

S. 10. 20. 32. 44. 56. 68. 80. 92. 104. 128. 140. 152. 164. 176. 188. 200. 212. 224. 236. 248. 260. 272. 284. 296. 308. 320. 332. 344. 356. 368. 380. 392. 404. 416. 428. 440. 452. 464. 476. 488. 500. 512. 524. 536. 548. 560. 572. 584. 596. 608. 620.

Berichtigung.

S. 32, 140, 200, 356.

Verschiedenes.

Ausstellung des Vereins der Vogelliebhaber zu Lübeck. S. 43.
An die Leser. S. 248.
Paul Schindler †. S. 271.

Register.

Abtangare 486.
Acanthis cannabina nana *(Tsch.)* 51.
„ carduelis parva *Tsch.* 14. 51.
Accipiter nisus granti *Sharpe* 51.
Acridotheres cristatellus *(Gm.)* 310.
Adlerbussard 163.
Aegithalus erythrocephalus *Vig.* 490.
Agapornis fischeri *Rchw.* 343. 407.
„ personata *Rchw.* 343. 408.
Aidemosyne cantans orientalis *Hellm.* 6. 434.
Alaemon alaudipes alaudipes *(Desf.)* 467.
Alario alario *(L.)* 17.
Alariofink 17. 30*.
Albino-Buchfink 163.
„ Haussperling 247. 330.
„ Rotkehlchen 221.
„ Stieglitz × Kanarie 97.
Alectoris rufa hispanica *(Seoane)* 14. 51.
Alexandersittich, kleiner, s. Halsbandsittich.
Alpenbraunelle 355.
„ dohle 282*. 283.
„ krähe 282*. 283.
„ mauerläufer 597.
„ meise 454.
„ segler 379.
Amadina fasciata alexanderi *Neum.* 6.
„ eryhtrocephala *L.* 16. 42.
Amarant 123. 124*. 193. 208.
„ abessinischer 6. 434.
„ Jamesons 16.
Amazone 33.
Amazona albifrons *(Sparrm.)* 433.
„ „ panamensis *(Cab.)* 433.
„ xanthops *(Spix)* 433.
Amblyramphus holosericeus *(Scop.)* 350.
Ammerhabia, mexikan. 576.
Amsel 14. 23. 81. 115. 198. 225. 229*. 237. 241*. 249. 262. 273. 283. 303. 574. 588.
„ von den Azoren 28.
„ „ Madeira 51. 65.
Anas platyrhynchus platyrhynchus *L.* 14.
Angolagirlitz, gelbbürzeliger 16.
Aniuma 366*.
Anthoscopus caroli *Sharpe* 491.
„ minutus *(Shaw)* 491.
Antillengimpel 552.
„ tangare 463.
Anthus bertheloti maderensis nov. subsp. 51.
Apus murinus brehmorum *Hart.* 51.
„ unicolor unicolor *(Jard.)* 51.
Arara 33.
„ kakadu 86.
Arassari, Baillons 407.
„ lauchgrüner 396. 399*.
Ardeola speciosa *Horsf.* 328.
Argya *Less.* 156.
„ earli *(Blyth)* 49. 156.
„ malcolmi *(Sykes)* 49. 156.
Arieltukan 396. 400*. 458.
Asio otus 14.
Atlasfink 25. 541.
Augenbrauenhäherling 309. 311*.
Aulacorhynchus *J. Gd.* 396.
„ prasinus *(Lcht.)* 396.

Bachstelze, weiße 115. 413. 427. 482. 484*. 508. 619.
Bandfink 208. 560.
„ abessinischer 6. 419. 458.
Bartgeier 163.
„ vogel 468.
„ „ Levaillants 16.
Baumfalk 33. 163.
„ hopf 458.
„ läufer 36. 154. 156. 159*. 337. 612. 613.
„ pieper 425*. 466.
Bengalenpitta 49. 109*.
Beo 458.
Bergfink 160. 359. 455. 573. 620.
„ hänfling 149. 160. 358. 455. 620.
„ klarino 576.
„ laubvogel 454.
„ meise 445. 490. 527*. 536.
„ merle s. Rötelmerle.
„ rötel 49. 77.
„ sittich 342.
Bindentoko 459. 481.
Binsenastrild 608.
Birkenzeisig 160. 455.
Bläßhuhn 14. 39. 608.
Blattralle 362.
„ vogel 49.
Blauastrild 16. 26. 36. 125. 208. 377*. 379. 419. 584.
„ dunkler 6.
„ drossel 320. 325*. 347. 609.
Blaudrossel, indische 265.
„ flügelsonnenvogel 414*. 416.
„ „ tangare 582.
„ kappentangare 461*.
„ kehlchen 54. 67. 81. 229. 475. 526. 562. 574. 588.
„ krönchen 196*.
„ meise 166. 246*. 283.
„ nachtigall 311.
„ racke, abessinische 458.
„ rotschwanz 244. 262. 265*.
„ schnäpper, braunbrüstiger 49.
„ spötter 308.
„ stirnamazone 107.
„ „ sittich 33. 278. 452.
Bluthänfling 36. 148. 194. 204. 216. 241. 251. 283. 340. 367. 397. 408. 410. 420. 455. 545. 555. 566. 574. 620.
„ isabellfarbener 19.
„ von Madeira 51.
„ schnabelweber 16. 584.
Borstenhäherling 49. 156. 233*. 242.
„ kopf 312. 315*.
Brachypternus aurantius *(L.)* 383.
Brandseeschwalbe 51.
Braundrossel 272.
„ kopfamarant 16. 36. 379.
„ „ ammer 217*. 573.
„ „ habia 169*. 189. 576.
„ „ timalie 49. 119*.
„ ohrbülbül 49. 89*. 119.
„ rückengoldsperling 105. 341.
„ „ strauchschmätzer 50. 52. 286.
„ scheiteltimalie 49.
„ stärling 460*. 462.
„ wangensäbler s. Rotwangensäbler.
Breitschwanzlori 311.
„ Salvadoris 312. 313*.
Brillenamazone 423*. 433.
„ grasmücke 4. 51. 63*. 64.
„ lachdrossel s. Augenbrauenhäherling,
„ pfäffchen 209.
„ vogel 310. 375. 525.
„ „ japan. 375.
Bronzemännchen, weißbäuchiges 209.
„ flecktäubchen 113.
Brotogerys pyrrhopterus *(Lath.)* 513.
Buarremon brunneiceps *(Lafr.)* 184. 576.
„ virenticeps *Bp.* 576.
Buchanga afer *(Lcht.)* 16.
Buchfink 14. 115. 305. 330. 397. 411. 455. 456. 468. 475. 574. 588.
„ von den Azoren 27.
„ „ Madeira 50.
Büffelweber 16.
Bülbülamsel 49.
Bulweria bulwerii bulwerii *(Jard. u. Selby)* 51.
Buntastrild 16. 29*. 36.
„ bärtling 468.
„ bartvogel 468.
„ meise 490. 531*. 536.
„ specht, großer 352*.
Bussard 14.
„ von den Azoren 28.
„ „ Madeira 51.

Cabanisweber 619.
Calospiza *Gray* 61. 463.
„ brasiliensis *(L.)* 61.
„ cajana *(L.)* 61.
„ fastuosa *(Less.)* 51. 510.
„ flava *(Gm.)* 420.
„ paradisea *(Sw.)* 420.
„ pretiosa *(Cab.)* 61.
„ seledon *(Müll.)* 496.
„ tatao *(L.)* 61.
Capito *Vieill.* 468.
„ niger *(St. Müll.)* 468.
Caprimulgus affinis *Horsf.* 316.
Casarca cana *(Gm.)* 362.
Cassicus persicus *(L.)* 577.
Celeus flavescens *(Gm.)* 382.
Cephalopyrus flammiceps *(Burton)* 530.
Chaimarrhornis bicolor *Grant* 282.
„ fuliginosa affinis *Grant* 282.
„ „ fuliginosa *(Vig.)* 270. 292.
„ leucocephala *Vig.* 270. 271.
Charadrius alexandrinus *L.* 51.
Chauna 363. 365*.
Chizaerhis concolor *(A. Sm.)* 16. 28. 29.
Chloris chloris aurantiventris *(Cab.)* 14.
Chrysophlegma flavinucha *J. Gd.* 383.
Cinnyricinclus verreauxi *Finsch, Hartl.* 16. 86.
Cinnyris asiatica *(Lath.)* 535.
Coereba mexicana *Scl.* 576.
Colius striatus *Gm.* 376.
Coliuspasser ardens *(Bodd.)* 92.
Columba araucana *Less.* 163.
„ livia *Gm.* 14. 51.
„ palumbus azorica *Hart.* 14.
„ „ madeirensis *Tsch.* 51.
„ trocaz *Heineken* 51.
Copsychus musicus *(Raffl.)* 316.
Coracias abyssinicus *Bodd.* 163.
„ erythrogaster *Shelley* 452.
„ lorti *Shell* 163.
„ naevius *Dana* 163.
Corone macrorhyncha *Wagler* 328.
Coryphospingus cristatus *(Gm.)* 6.
Cossypha *Vig.* 335.
„ bicolor *(Sparrm.)* 335.
„ heuglini *Stark* 335.
„ humeralis *A. Sm.* 16.
Coturnix coturnix confisa *Hart.* 51.
„ „ conturbans *Hart.* 14.
Cyanerpes coeruleus *(L.)* 535.
Cyornis tickelliae *Blyth* 311.

Dajaldrossel 46. 49. 50. 311.
Damadrossel 49.
Damararotschwanz 199.
„ Lübberts 199.
Dasyptilus pesqueti *(Less.)* 312.
Diademrotschwanz 162.
Dickkopfwürger 286. 287*.
Domicella albinucha 312.
Dominikanerwitwe 26. 167*. 168. 276. 299. 456. 458.
Doppelgelbkopf 272. 561.
Dornastrild 608.
„ grasmücke 53. 255*. 290. 291. 426. 475. 529*. 530. 574.
Dreifarbennonne 173.
„ „ tangare 497. 510.
„ zehenspecht 597.
Drossel 41. 225. 237. 249. 261. 273. 285.
„ bunte 49.
„ Grays 260.
„ Wilsons 272.
„ Swainsons 576. 577*.
„ rohrsänger 171*. 361. 466.
Drosslinge 156.
Dumetia hyperythra *(Franklin)* 49.

Eichelhäher 316. 427. 606.
Einfarbdrossel 49. 73*. 74.
Eisvogel 55. 359*. 371. 384. 403. 414. 499.
Elfenastrild 16. 18*. 36. 419. 500.
„ blauvogel 445*. 446.
Elster 1.
„ drossel von Java 316.
„ rotschwanz 222.
Erddrossel, gefleckte s. Scharrdrossel.
Erithacus algeriensis *Kl.* 99.
„ aterrimus *Jerd.* 100.
„ auroreus auroreus *(Pall.)* 149. 150. 162.
„ „ filchneri *(Parrot)* 149. 162.
„ „ leucopterus *Blyth* 149. 162.
„ bonapartei *(v. Müll.)* 100.
„ caeruleocephalus *Vig.* 222.
„ diplootocus moussieri *(Olph.-Gall.)* 162. 580.
„ erythronotus alaschanicus *(Pi)* 222.
„ „ samamisicus *(Seeb.)* 199. 209.
„ familiaris *(Steph.)* 199.
„ „ falkensteini *(Cab.)* 199.
„ „ galtoni *(Strickl.)* 199.
„ „ hellmayri *(Rchw.)* 199.
„ „ lübberti *Rchw.* 199.
„ „ omoensis *(Neum.)* 199. 209.
„ „ sennaarensis *(Seeb.)* 199. 209.
„ frontalis *(Vig.)* 244.
„ grandis erythrogaster *(J. Gd.)* 245.
„ „ grandis *(J. Gd.)* 255.
„ hodgsoni *Moore* 162. 186.
„ mesomelas *(Hempr.-Ehrenbg.)* 99.
„ nigrigularis *(Moore)* 244.
„ ochruros *(Gm.)* 114.
„ „ semirufa *(Hempr.-Ehrenbg.)* 115.
„ pectoralis *(J. Gd.)* 49.
„ phoenicurus *(L.)* 88.
„ „ pleskei *Schal.* 138.

Erithacus phoenicuroides *(Moore)* 115. 126. 138.
„ rubeculus rubeculus *(L.)* 19.
„ rufiventris *(Vieill.)* 115. 127. 138.
„ schisticeps *(Hodgs.)* 222.
„ titys *(L.)* 100.
Erlenzeisig 1. 160. 188. 309. 359. 397. 444. 455. 456. 566.
Estrilda astrild *(L.)* 26.
Eulen 428.
„ papagei 83.
Euphema venusta *(Tem.)* 342.
Euphonia aurea *(Pall.)* 357.
„ chlorotica *L.* 357.
„ violacea *(L.)* 356.
Eupsaltria australis *White* 287.

Falco tinnunculus canariensis *Koenig* 51.
Falken 428.
Fasanenralle 362.
Feinsittich 342.
„ tangaren 463.
Feldlerche 81. 231*. 460. 466. 475. 572. 608.
„ sperling 209. 455. 478.
Felsenschwalbe 465.
„ taube 14. 39. 51. 65.
Felsschnäpper 202.
„ orangebrüstiger 203*.
„ scharlach „ 203. 205*.
Feuerflügelsittich 33. 513. 515*. 570*. 599.
„ schwanzamadine 533*. 636.
„ zeisig 340*. 410. 459.
Fichtenkreuzschnabel 455. 468. 469*.
Fink, Pelzelns 552.
Finkenrotschwanz 210.
„ blauköpfiger 222.
Fischadler 163. 465.
„ reiher 328. 498.
Fitislaubvogel 543*. 544*.
Flaggendrongo 49.
Flammenköpfchen 530.
Fleckenarassari 396.
Fliegenschnäpper 283.
Flötenwürger, rostbäuchiger 16. 83*. 84.
„ rot „ s. Rotbauchwürger.
Flußseeschwalbe 14.
Frauenlori 584.
Fringilla coelebs maderensis *Sharpe* 50.
„ „ moreletti *Puch.* 14.
Fuchsgans 362.

Gabelschwanzhuhn 316.
„ weihe 499.
Gallus varius *(Shaw)* 316.
Gänsegeier 163.
Gartengrasmücke 54. 56. 81. 110. 115. 251*. 290. 291. 414. 425. 512. 545. 550. 555. 565. 574. 602.
„ rotschwanz 87. 88*. 306. 331. 439.
„ „ abessinischer 100.
„ „ algerischer 99.
„ sänger 3. 9. 81. 190. 201. 213. 215*. 229. 290. 291. 352. 361. 374. 475. 527. 538. 545. 555. 565. 574. 589. 602.
„ trupial 577.
Gaukler 163.
Gebirgslori 130. 131*. 142. 584.
„ stelze 14. 35. 413. 438*. 466.
„ „ von Madeira 51.
Gelbbauchamazone 433.
„ „ organist 437*.
„ „ sittich 342.
„ bürzelkassike 577.
„ haubenkakadu, kleiner 333. 428. 584.
„ „ „ großer 429. 587*. 589*.
„ nackenamazone 561.
„ „ specht 383.
„ rückenwida 16. 92. 456.
„ scheitelweber 16. 98. 102*.
„ schnabeltoko 459. 481.
„ schopfspecht 347*. 381.
„ schulterwida 92.
„ stirnmohrenkopf 407.
Geocichla litsipsirupa *(A. Sm.)* 16. 73.
„ varia *(Pall.)* 49.
Geotrygon caniceps *(Gundl.)* 163.
Gimpel 81. 92. 94. 95*. 106. 115. 120. 134. 146. 148. 158. 160. 169. 212. 303. 342. 358. 404. 416. 431. 443. 455. 469. 492.
„ von den Azoren 14. 15.
Girlitz 147. 151. 303. 306. 454. 455.
„ schwefelgelber 16.
Gitterflügelelsterchen 185*.
Glanzstare 277. 458.
„ star, abessinischer 178.
„ witwe 25.
Gleitaar 163.
Goldammer 81. 148. 380. 466.
„ augentimalie 49. 524.
„ brüstchen 36. 208. 419.
„ „ südliches 16. 419.
„ hähnchen 3. 9. 14. 154. 155*. 337. 374.
„ „ von den Azoren 27.
„ „ „ Madeira 51.
„ kopfstar 458.
„ kopfweber 16. 98. 102*.
Goldmantellori 584.
„ pirol 452. 417*. 531.
„ regenpfeifer 307.
„ specht 381.
„ sperling 456.
„ stirnsittich 33. 44. 248.
„ trupial 577. 582*.
Götzenliest 328*.
Gouldamadine 37. 319. 379. 420. 598. 608.
Granatastrild 16. 26. 36. 299. 377*. 378*. 379. 404. 419. 492. 505. 516. 528. 540. 553.
Grasmücken 23. 53. 290. 336. 351. 574.
Grauastrild 36. 123.
„ bauchdrongo 49. 88*.
„ edelsänger 148. 357. 404. 439. 548.
„ kardinal 525. 584.
„ köpfchen 455*. 550. 584.
„ kopfsperling 26.
„ meise, indische 49. 51*. 329. 490.
„ nackengirlitz 16. 19*.
„ papagei 33. 108. 122. 180. 333. 429. 476. 511. 561. 595. 612.
„ schnäpper 576.
„ schwanzdrossel 64*. 72.
Grünarassari 396. 458.
„ bugamazone 550.
Grundrötel gefleckter 517.
Grünling 14. 115. 283. 330. 358. 455. 508.
„ von den Azoren 39.
„ specht 466.
„ zügelpapagei 458.
Guianabartvogel 443*.
Guttera cristata eduardi *(Hartl.)* 17.

Habicht 5.
Halcyon sanctus *Vig. Horsf.* 328.
Haliaetus intermedius 327.
Halsbandarassari 395*. 458.
„ „ sittich 248. 269. 549.
Haubenfink 6. 7*.
„ lerche 182. 183*. 231. 462. 608.
„ mainastar 310.
„ meise 166. 336. 354.
„ perlhuhn 17.
Hausrotschwanz 100*.
„ kaukasischer 114.
„ „ „ syrischer 115.
„ sperling 77.
„ „ italienischer 454. 456.
Heckenbraunelle 355.
Heidelerche 81. 231. 232*. 233. 414. 460. 498. 523. 589. 608.
Helenafasänchen 16. 36. 168. 299. 620.
Heringsmöwe 14.
„ von den Azoren 28.
Honigfresser, geschwätziger 618*.
Hügelmeise 445.
„ Jerdons 433*. 446.
„ rotschwänzige 435*. 445.
Hyazinthara 333.
Hydrophasianus 362.
Hypochera amauropteryx *Sharpe* 25.
„ ultramarina *(Gm.)* 25.

Jägerliest 180.
Interus mesomelas *(Wagl.)* 189.
Indigofink 340. 342. 356. 500.
Inkakakadu 270*. 333.
Irena puella *(Lath.)* 446.
Isabellatangare 520*.
„ würger 311.

Kaffernbartvogel 458.
Kakadu 33. 429.
Kalanderlerche 575*.
Kambodjastar 277.
Kammturako 342.
Kanarienvogel 69. 219. 229. 309. 324. 340. 566. 578. 603.
„ (Farbenvögel) 254.
„ (Nachtigallschläger) 339.
„ orangerote 424. 459.
„ wilder 14. 38. 46. 51.
Kangdarabülbül s. Weißwangenbülbül.
Kapbeutelmeise 491. 493*.
Kappenammer 413*. 416.
Kaprötel 16.
„ steindrossel 434.
„ täubchen 113. 204. 464.
Kapuzenzeisig s. Feuerzeisig.
Kardinal, roter 56. 163. 348. 524. 606*. 608.
Karmingimpel 147.
„ mexikan. 126*. 149. 248. 500.
Katharinasittich 471. 610.
Kea 81.
Keilschwanzdrongling 156.
„ sittich 33.
Kiefernkreuzschnabel 1.
Kirschkernbeißer 309. 388*. 400.
Klarinettenvogel 188. 576. 580*.
Kleiber 35. 74. 75*. 76*. 262. 274. 512.
Kleinelsterchen 123.
„ specht 353*. 354.
Köhleramsel 257*. 258.
Kohlmeise 1. 166. 305. 357.
Kolkrabe 375*. 376*. 379.
Königsgeier 163.
„ glanzstar 452. 459*. 474.
„ sittich 33.
„ wida 16. 25. 168. 299*. 456. 541.
Kreuzschnabel 468.
Kronenmeise, indische 49. 90*.
Krontangare 617.
Krummschnabelspötter 576. 581*.
Kubafink, kleiner 97. 250.
„ tangare 462*. 532.
Kuckuck 23. 293*. 294*. 303. 306. 316. 356. 367. 463. 466. 475. 616*. 617*.
Kurzschnabeltukan 396.

Lagonosticta senegala carlo *Zedl.* 6. 439.
Lamprocolius chalcurus *(Nordm.)* 457.
„ purpureus *Müll.* 457.
Langschopftannenmeise 531.
Laniarius atrococcineus *(Burch.)* 84.
„ rufiventris *(Sw.)* 16. 84.
„ sublacteus *(Cass.)* 84.
Lanius vittatus *(Valence)* 265.
Lappenkiebitz 362.
Lärmvogel, grauer 13*. 16. 28. 29.
Larus argentatus cachinnans *Pall.* 14. 51.
„ fuscus atlantis 14.
Larvivora cyane *Hodgs.* 553.
Lathorawürger 49.
Laubsänger 54. 361. 374. 589.
Leklancherifink s. Orangeblaufink.
Lerchen 231. 460. 588.
Lioptila capistrata *(Vig.)* 451.
Liothrix lutea astleji *Delacour* 434.
„ calipyga *Hodgs.* 434.
Lobivanellus 362.
Lophoceros fasciatus *(Shaw)* 481.
„ flavirostris *(Rüpp.)* 482.
„ erythrorhynchus *Tem.* 481.
Lori 278. 311. 503.
„ roter 584.
Lorius salvadorii *Meyer* 312.

Machlolophus xanthogenys *Vig.* 490.
Magellanzeisig 341*.
Maidtäubchen 458.
Mainastar 458. 525.
Mahaliweber 179.
Malabarfasänchen 208. 419.
Mamulastelze 49. 111*.
Marabu 328.
Martiniquegimpel 539*. 552.
Maskenamadine 37. 164. 319. 420.
„ kernbeißer 309.
„ organist 334. 335*.
„ würger 49. 243*. 265.
Massenawachtel 320.
Mauersegler 151. 198. 306. 454. 465. 466. 475. 515.
Mäusebussard 139*. 140.
Mausvogel 376.
Mehlschwalbe 465.
Meisen 103. 154. 165. 490.
„ timalie 49. 121*. 446.
„ „ kehlstreifige 431*. 446.
Melanocorypha mongolica *(Pall.)* 310.
Melopyrrha nigra *(L.)* 553.
Mennigvogel 203. 350.
„ kleiner 184*. 204.
Merula simillima *(Jerd.)* 49.
Milan 163.
„ schwarzer 465.
Minla *Hodgs.* 445.
„ jerdoni *J. Verr.* 446.
„ igneitincta *Hodgs.* 445.
Mischlinge
Ammern×Kanarienvogel 91.
Barabandsittich×Blaukappensittich 452.
Blaukappensittich×Rotflügelsittich 452.
Bluthänfling×Kanarienvogel 91. 151. 166.
Buchfink×Kanarienvogel 463. 499. 548.
„ ×Bergfink 558*.
Erlenzeisig×Kanarienvogel 91.
Feldsperling×Haussperlingalbino 247. 548.
Feuerzeisig×Kanarienvogel 341. 410.
(„ × „)×Kanarienvogel 330.
[(„ × „)×Kanarienvogel] ×Kanarienvogel 330.
„ ×[(Feuerzeisig×kanarie×Kanarienvogel)×Kanarienvogel] 341.
Gelbrückenwida×Rotschulterwida 92.
„ ×Schildwida 92.
Gimpel×Kanarienvogel 91.
Graugirlitz×Kanarienvogel 331. 341. 370*. 372.
Grünling × „ 91.
Indigofink × „ 340.
Kanarienvogel×Buchfink 548.
Kardinal, rote×Kirschkernbeißer 401.
Magellanzeisig×Kanarienvogel 330. 341.
Mossambikzeisig× „ 103. 128.
Silberschnäbelchen×Malabarfasänchen 419.

Sperling><Kanarienvogel 91.
Spitzschwanzamadine><Maskenamadine 420*.
Stieglitz ><Kanarienvogel 67. 91. 151. 164. 342. 542.
Webefinken >< „ 91.
Weißwangenbülbül><Rotohrbülbül 119.
Yarellzeisig><Kanarienvogel 331. 341.
(„ >< „)><Kanarienvogel 331.
[(„ >< „)><Kanarie]><Kanarienvogel 342.
Mittelrotschwanz 186.
Mohrenkopf 226. 227*. 238. 467*. 476. 584. 598. 610.
„ meise 491. 497*.
Molothrus badius *(Vieill.)* 463.
Molukkenkakadu 269*. 430.
Mönchsgeier 163.
„ grasmücke 4. 14. 20. 38. 53. 64. 67. 115. 198. 256. 290. 291. 306. 414. 454. 465. 475. 498. 501. 528. 545. 551. 556. 566. 574. 588. 597. 601.
„ „ von Madeira 51. 64.
„ sittich 33. 68. 272. 278.
Mongolenlerche 310.
Monticola rupestris *(Vieill.)* 434.
„ solitarius pandoo *(Sykes)* 265.
Mornellregenpfeifer 563*. 564. 565*.
Mossambikzeisig 148*. 200. 443.
Motacilla boarula schmitzi *Tsch.* 14. 51.
Mövchen, japanisches 10. 37. 92. 209. 259. 472*. 475. 584.
Muscicapula maculata *(Tickell)* 183.
Muskatfink 150*.
Myadestes obscurus *Lafr.* 576.
Myzantha garrula *(Lath.)* 618.

Nachtigall 46. 54. 77. 81. 102. 115. 117. 129. 141. 153. 165. 177. 197. 290. 291. 338. 374. 415. 453. 465. 508. 526. 544. 550. 555. 574. 588. 593. 596. 601.
„ blaue 541*. 553. 565. 584.
Nachtreiher 316.
„ schwalbe 306.
Naschvogel, mexikanischer 576.
Nasenkakadu 86.
Neilgherridrossel 49.
Nektarvogel 535.
Neuguinea-Edelpapagei 553*. 559.
Niltava grandis *(Blyth)* 183.
„ macgrigoriae *(Burt.)* 158.
Niltavaschnäpper 49. 158. 162*.
„ großer 158.
Nonnenlerche 17.
Nymphensittich 33. 46. 79. 240. 248. 474*.

Oceanodroma castro *(Hart.)* 14. 51.
„ leucorrhoa *(Vieill.)* 14.
Olivenastrild 239*.
„ drossel 5*. 16. 28.
Organisten 423. 436. 449.
„ violettblaue 436.
Oriolus auratus *(Vieill.)* 452. 531.
Orangebäckchen 105. 123.
„ blaufink 342. 500. 577.
„ brusttangare 510*.
„ specht 382.
„ weber 308. 456.
Oroscirtetes erythrogaster *(Vig.)* 286.
Orpheusgrasmücke 577. 579*.
Oryxweber 16. 456.
Otocompsa flaviventris *Tickell* 118.
„ leucogenys *(Gray)* 118.

Pagodenrotschwanz 115.
„ graustirniger 127.
„ weißstirniger 126.
„ star 458.
Palamedea 363.
Panamaamazone 433.
Panthervogel 525.
Pandion leucocephalus *J. Gd.* 327.
Papagei 33. 45. 86. 278. 333. 441. 525. 549. 598.
„ amadine, lauchgrüne 521*. 524. 537.
„ „ „ gelbbäuchige 537.
„ „ „ „
Papstfink 342.
Paradieswidafink 16. 26. 168. 456. 541.
Parus cinereus *Vieill.* 490.
„ melanocephalus *Vig.* 531.
„ monticolus *(Vig.)* 445. 490.
„ niger *Vieill.* 591.
„ varius *Tem.* 490.
Passer griseus *(Vieill.)* 26.
Pelargopsis leucocephalus *Gm.* 316.
Pelekan 328.
Penthetriopsis macrura *(Gm.)* 92.
Pericrocotus peregrinus *L.* 204.
„ speciosus *(Lath.)* 204. 350.
Perlbartvogel 179. 277. 458.
Petroeca *Sw.* 202.
„ multicolor *Gm.* 203.
„ phoenicea *J. Gd.* 203.
Petronia petronia maderensis *Erl.* 50.
Peţsittich 33.
Pfefferfresser s. Tukan.
Pholia sharpei *(Jacks.)* 334.
Phoenicurus *Forst.* 87. 99. 114. 126. 138. 149. 162. 186. 199. 209. 222. 244. 255. 269. 281. 292.
„ frontalis *(Vig.)* 264.
Pieper von Madeira 51.
Pinostangare 546.
Pirol 23. 51. 102. 198. 290.
„ Sykes 49.
Pisangfresser 234.
Plattschweifsittiche 33. 525.
Platycercus flaviventris *(Tem.)* 342.
Ploceus auricapillus *(Sw.)* 16. 98.
„ „ finschi *Rchw.* 16.
„ capensis olivaceus *(Hahn)* 16.
Ploceus emini *(Hartl.)* 434.
„ intermedius *Rüpp.* 98.
„ spekei *(Heugl.)* 98.
„ spilonotus *(Vig.)* 16. 98.
„ velatus *(Vieill.)* 98.
Phoephila acuticauda hecki *Heinroth* 175.
Poicephalus citreocapillus *(Heugl.)* 407.
„ flavifrons *(Rüpp.)* 407.
Polytelis alexandrae *J. Gd.* 452.
„ melanura *(Vig.)* 342.
Pomatorhinus *Horsf.* 243.
„ erythrogenys *(Vig.)* 243. 350.
Portorikoamazone 268.
Prachtfinken 36. 123. 208. 248. 346. 418. 443. 456. 458. 525. 559. 572.
„ tangare 27*. 61.
Procnias tersa *(L.)* 334.
Psittacula cyanopygia 473.
„ passerina 473.
Pteroglossus torquatus *(Gm.)* 395.
Ptilogonys cinereus *(Sw.)* 576.
Ptistes erythrapterus *(Gm.)* 452.
Puffinus puffinus puffinus *(Brünn.)* 51.
„ assimilis godmanni *Allen* 14. 51.
„ kuhlii borealis *Cory.* 14. 51. 66.
Purpurhonigsauger 535.
„ nektarvogel 535.
„ tangare 546*. 547. 569. 580.
Pyranga gyrola sanguinolenta *(Lafr.)* 576.
Pyrrhula pyrrhula murina *Godm.* 14.
Pyrrhulagra noctis noctis *(L.)* 552.
Pyrrhulauda leucotis *(Stanl.)* 524.
„ „ melanocephala *(Lcht.)* 524. 531.
„ „ smithi *(Bp.)* 17.
„ verticalis *(A. Sm.)* 17.

Quesal 476.

Rabenvögel 41. 428.
Rake, blaubrüstige 452.
Rallenreiher 328.
Ramphocoelus *Derm.* 547.
„ brasilius *(L.)* 547.
Raubwürger 290. 479*. 493. 507. 607.
Rauchschwalbe 306. 475.
Regenpfeifer 362.
Regulus ignicapillus madeirensis *Hart.* 51.
„ regulus azoricus *Seeb.* 14.
Reisvogel 448*.
Rhamphastos *L.* 396.
„ ariel *Vig.* 396.
Rhinopomastus cyanomela *(Vieill.)* 16. 62.
Riesenniltawaschnäpper 181*. 183.
„ rotschwanz, kaukasischer 245.
„ „ zentralasiatischer 255.
„ tukan 458.
Ringdrossel 379. 454.
Ringeltaube 14. 134. 140.
„ von den Azoren 28.
„ „ Madeira 51.
Rohrammer 498.
„ brossling, gestrichelter 156, 157*.
„ sänger 54. 374. 589.
Rosakakadu 268*.
Rosenkopfsittich 46*.
„ meise 160*.
„ papagei 474. 525.
„ star 458.
Rotbauchdrosselschmätzer 16.
„ „ glanzstar 452.
„ „ organist 437*.
„ „ würger 84.
„ bugamazone 404. 427. 550.
„ drossel 237.
Rötelmerle 280*. 286.
Rothuhn 14. 39. 51.
„ kappenlerche 210*.
„ kehlchen 1. 3*. 11. 14. 23. 35. 39. 54. 65. 67. 81. 248. 300. 301*. 303. 307. 367. 475. 503*. 504. 507*. 508*. 509*. 527. 574. 588. 601. 614.
„ kopfamadine 16. 179. 208. 458.
„ „ stärling 350.
„ „ timalie 143*. 144.
Rotkopfwidafink 318*. 320.
„ „ würger 290.
„ ohramadine 534*. 536.
„ rückenelsterchen 185*.
„ „ würger 102. 290.
„ schnabeldrossel 16. 28.
„ „ kitta 49.
„ „ lerche 209*.
„ „ toko 457*. 459. 481*. 483*.
„ schopfturako 342.
„ schulterwida 92.
„ schwänzchen 54. 87. 114. 126. 138. 149. 162. 186. 199. 209. 222. 244. 255. 269. 281. 292.
„ schwanz, äthiopischer 209.
„ „ mittelafrikanischer 199.
„ „ Pleskes 138.
„ „ südafrikanischer 199.
„ „ sudanesischer 210.
„ strichastrild s. Zügelastrild.
„ wangensäbler 49. 234*. 243. 350.
Rubinnachtigall 49. 311.
Rußköpfchen 33. 79. 449*. 473.

Saatkrähe 401*. 402.
Safranfink 478. 574.
Sammettangare 547
Sarciophorus 362.
Schamadrossel 35. 63. 140. 392. 608.
Scharrdrossel 16. 71. 73*.
Schildwidafink 92.
Schilffink 209.
„ gelber 385. 392.
Schillerorganist 437.
„ tangare 463.
Schlangenbussard 103.
Schleiereule 14. 39.
„ „ von Madeira 51.
„ grasmücke, azorische 39*. 64.
Schmalschnabelsittich 33.
Schmätzerdrossel 335.
Schmetterlingsfink 36. 106. 123. 208. 251. 419. 584.
„ „ dunkler 434.
Schmuckammerfink 219*.
„ tangare 569*. 582. 593.
Schmutzgeier 163.
Schneeammer 39. 568*.
Schnurrbärtchen 16. 458.
Schönbürzelchen 105. 125*.
Schopfadler 163.
„ bülbül 49.
„ wachtel, kalifornische 20. 248. 344. 389*. 391.
„ „ taube 458.
Schreiadler, großer 163.
„ seeadler 163. 327.
Schuppenglanzstar 18. 85*. 86. 97. 452.
Schwalben 439. 619.
„ glanzstar 327*. 334. 452.
Schwanzmeise 166. 336.
„ rosiköpfige 490. 491*.
Schwarzgimpelfink 553.
„ kappenlori 584.
„ „ timalie 49. 450*. 451.
„ köpfchen 36.
„ kopfbülbül 107*. 118.
„ „ pirol 49*.
„ ohrkardinal 292*. 295.
„ schwanzsteinschmätzer 149*.
„ specht 1. 415.
„ stirnwürger 98. 108*.
„ storch 548.
„ tangaren 595.
„ wangenbülbül s. Schwarzkopfbülbül.
„ „ tangare 51.
Schwertflügel 361.
Seeadler 327.
„ regenpfeifer 51.
Segler von Madeira 51.
Seidenrotschwanz 150.
„ Filchners 162.
„ indischer 162.
Sekretär 163. 454.
Selenidera *J. Gd.* 396.
„ bailloni *(Vieill.)* 407.
„ gouldi *(Natt.)* 396.
„ maculirostris *(Lcht.)* 396.
Senegaltäubchen 113. 191*. 204. 215.
Serinus canaria canaria *(L.)* 14. 51.
Sichelhopf 16. 61*. 62.
Siebenfarbentangare 498*. 520.
Sigelus silens *(Shaw)* 16.
Silberhalstaube 51. 65.
„ möwe, fübl. 14. 51.
„ schnäbelchen 105 123*. 419.
„ „ nordöstliches 6. 414. 434. 458.
Singdrossel 23. 102. 198. 225. 237. 249. 261. 263*. 274. 303. 307. 308. 475. 524. 566. 588.
„ habicht 163.
„ sittich 33. 217. 472. 549.
Sittich 33. 46. 79. 151. 278.
Soldatenstar, großer 277. 306*. 458.
Somalilärmdrossel 458.
Sonnenastrild 221.
„ ralle 459.

Sonnenvogel 32. 67. 272. 311. 330.
" " Afsleys 434.
" " indischer 434.
Specht 382.
Sperber 102. 163. 310.
" grasmücke 53. 290. 291. 588.
" täubchen 113.
Sperlingskauz 417. 419*. 597.
" papagei 68. 413. 500. 525. 584. 611.
" " blaubürzeliger 473*. 584.
" " grün " 473. 584.
" " mexikanischer 473. 584.
Spermestes scutata *(Heugl.)* 524.
Spindalis *Jard. u. Selb.* 463.
" pretrii *(Less.)* 532.
" " pinus *(Bang, Zappay)* 546.
Spitzschwanzamadine 37. 96. 223. 251. 284. 319. 420.
" Hecks 175.
Sporaeginthus subflava clarkei *(Shell.)* 16.
Sporengans 362. 364.
" kiebitz 361*. 362.
Spornammer 567*.
Spottdrossel, nordamerikan. 47.
Spreo hildebrandti *(Cab.)* 452.
" pulcher *(P. L. S. Müll.)* 452.
" superbus *(Rüpp.)* 452.
Sprosser 54. 81. 188. 197. 290. 374. 526. 534. 544. 556. 565. 574. 588. 592. 596. 601.
Stachyridopsis ruficeps *(Blyth)* 49.
Stahlfink 25.
Star 14. 41. 115. 248. 307. 426. 475. 599*. 601*. 603*. 604*. 615*.
" von den Azoren 28.
Steganura paradisea *(L.)* 26.
" " verreauxi *(Cass.)* 16.
Steinadler 439. 454.
" kauz 47. 101. 368.
" rötel 200. 290. 322. 323*. 339*. 347. 349*. 351*. 609.
" sperling von Madeira 50.
Stelzenhäherling 49. 78*. 156.
" läufer 459.
Steppenbussard 163.
" weihe 163.
Sterna hirundo hirundo *L.* 14. 51.
" sandwicensis sandwicensis *Lath.* 51.
Sternrotschwanz 222.
Stieglitz 14. 32. 35. 67. 160. 198. 248. 309. 317*. 340. 358. 363. 397. 403. 420. 431. 443. 455. 566. 573. 601. 619.
" von den Azoren 39.
" von Madeira 50.
Stockente 14. 39. 202.
Storch 295.
" schnabel 316.
Streifenhäherling 49.
" trupial 172*. 184.
Strichelblaurake 458.
" häher 49. 65*.
" " drossel 49. 156.
Sturmschwalbe, braune 14.
" " schwarze 14. 51.
" taucher, grauer 14. 51.
" " nordischer 51.
" " schwarzer 14. 51.
" vogel, Bulwers 51.
Sturnus vulgaris granti *Hart.* 14.
Sumpfmeise 166. 262. 274. 354. 358. 512.
" ohreule 163.
" rohrsänger 3. 9. 58. 59*. 70. 82. 229. 290. 352. 361. 379. 498. 500. 527. 538. 551. 574. 589.
Sycalis pelzelni *Scl.* 552.
Sylvia atricapilla atricapilla *(L.)* 14.
" " " aberr. 39.
" " capirote *Flör.* 64.
" " obscura *Tsch.* 64.
" conspicillata bella *Tsch.* 51.

Tachyphorus *Vieill.* 594.
" cornatus *(Vieill.)* 617.
" rufus *(Bodd.)* 604.
Tamborintäubchen 458.
Tanagra abbas *Licht.* 486.
" cana *Sw.* 581.
" cyanoptera *(Vieill.)* 582.
" ornata *Sparrm.* 582.
" palmarum *Wied.* 582.
" sayaca *L.* 581.
Tanagrella *Sw.* 463.
" cyanomelaena *(Wied.)* 495.
Tangaren 423. 436. 449. 461. 485. 510. 525. 546. 569. 580. 593.
" blaugraue 581.
" blutrote 576.
" meerblaue 581.
Tangare, schwarzblaue 495. 496*.
Tannenhäher 466.
" meise 166. 354.
Tarsiger rufilatus *(Hodgs.)* 264.
Tauben 260. 525.
" halsamazone 555*. 556*. 559.
Teichhuhn 202.
" rohrsänger 244*. 302. 305*. 352. 361. 374. 466. 539.
Tetraenura regia *(L.)* 26.
Textor niger *(A. Sm.)* 16.
Thamnobia cambaiensis *(Lath.)* 286.
Thamnolaea cinnamomeiventris *(Lafr.)* 16.
Tigerfink 195*. 224. 373*. 419.
Timalien 119.
Timelia pileata *Horsf.* 49. 119.
Tirikasittich 428. 584.
Toko 481.
Tonkibülbül 368.
Tovisittich 248. 570*. 599.
Toxostoma curvirostre *(Sw.)* 574.
Trachyphonus cafer *(Vieill.)* 16.
Transvaalrotschwanz 199.
Trauerdrongo 16.
" drossel 576.
" fliegenschnäpper 487.
" stelze 532*. 536.
" tangare 604. 605*. 618.
" zeisig 560.
Trochalopterum lineatum *(Vig.)* 242.
Trupiale 458.
Tuisittich 33.
Tukan 384. 394. 396.
Turako, Donaldsons 25*. 28. 61. 235.
" gemeiner 343.
Turacus donaldsoni *Sharpe* 28. 61. 235. 342.
" persa *(L.)* 342.
Turdus amaurochalina *Cab.* 72.
" fumigatus *Licht.* 272.
" fuscescens *Steph.* 272.
" guttatus nanus *Aud.* 576.
" lidonyanus *(A. Sm.)* 16. 28.
" merula cabrerae *Hart.* 51.
" " azorensis *Hart.* 14.
" olivaceus *L.* 16. 28.
" tristis *(Sw.)* 576.
" unicolor *Tickell* 73*. 74.
" ustulatus swainsonii *Cab.* 576.
Turmfalk 8*. 9*. 31*. 41. 487.
" von Madeira 51.
" jegler von Madeira 51.
Turteltaube 175. 391.
" weinrote 193*. 204. 215.
Turtur senegalensis *(L.)* 215.
" vinaceus *(Gm.)* 215.
Tyrannen 277.
Tyto alba schmitzi *(Hart)* 51.

Uhu 206. 207*. 208*.
Unzertrennliche 407. 525. 584.
" Fischers 407. 409*.
" orangegesichtiger 449*. 473. 550.
" schwarzköpfiger 407. 411*.
" Tarantiner 46. 74. 338. 473. 476. 513. 570. 584.
Uraeginthus bengalus angolensis *(L.)* 16. 26.
" granatinus *(L.)* 26.
Urobrachia axillaris *(A. Sm.)* 92.

Venezuelakardinal 606*. 608.
Vidua *Cuv.* 25.
" hypocherina *Verr.* 25.
" serena *(L.)* 25.
Vielstelze 482. 485*. 486*.
Vielfarbentangare 61. 510. 519*.
Vinago waalia *(Gm.)* 17.

Waalia-Papageitaube 17.
Wachtel 14. 290. 306. 525.
" von den Azoren 28.
" " Madeira 51.
" ammerfink 220*.
" astrild 16. 36.
Waldhüttensperling 209.
" kauz 498. 590. 591*. 593*. 594*.
" laubvogel 543*. 544*.
" ohreule 14. 498.
" " von den Azoren 28.
" sänger, blauer weißkehliger 264. 267*.
" schnepfe 51.
Wanderdrossel 283.
" elster 49. 179.
" falke 163. 509.
Wasserhuhn s. Bläßhuhn.
" rotschwanz, braunbäuchiger 282.
Wasserrotschwanz, grauer 292.
" " formosanischer 282.
" " weißtöpfiger s. Weißkopfschmätzer.
" schwätzer 426*. 438. 466. 498.
Webervogel 37. 276. 456. 525.
" dottergelber 456.
" Emins 421*. 434.
" rotbrauner 403.
" Rüppells 98. 101*.
" Spekes 97*. 98.
Wehrvogel 363. 366*.
Weidenlaubvogel 303. 454. 543*. 544*.
" meise 303. 306. 454.
Weißbauchpapagei 459.
" bindendrosselschmätzer 458.
" brustschilffink 319.
" flügelrotschwanz 99*.
" " schmätzerdrossel 15*. 16.
" haubenhäherling 16. 41*. 49. 156. 179.
" " turako 342.
" kehlhäherling 49. 112 156.
" " pfäffchen 473.
" kopfnonne 209.
" " schmätzer 270. 281.
" nackenlori 312.
" ohramadine 319.
" stirnbeutelmeise 491. 495*.
" wangenbülbül 118.
" " lerche 17. 40*. 478. 524. 573.
" " " westliche 524. 531.
Wellenastrild 26. 124.
Wellensittich 20. 33. 44. 56. 67. 77. 79. 104. 115. 116. 128. 151. 248. 272. 307. 308. 342. 441. 470. 472. 478. 487. 512. 513. 525. 535. 549. 584.
" blauer 343. 471. 535.
" gelber 56. 471. 513. 535.
" grauer 343. 471. 535
" jadefarbner s. maigrünen.
" kobaltblauer 331.
" maigrüner 343.
" malvenfarben 343. 471. 535.
" satingrüner 343.
" weißer 343. 472. 487. 535.
Wendehals 102. 303. 354. 355.
Wespenbussard 163.
Widafink 52. 456. 525.
Wiedehopf 51. 405. 415. 548.
Wiesenpieper 498.
" schmätzer, braunkehliger 32. 487.
" " schwarzkehliger 32. 498.
Wintergoldhähnchen 27.
Würger 361. 374.
" schnäpper 16. 17*.
Wüstenläuferlerche 447*. 467.

Xiphidiopterus *Rchb.* 362.

Yuhina *Hodgs.* 446.
" gularis *Hodgs.* 446.
" nigrimentum *Hodgs.* 49. 446.

Zaungrasmücke 53. 301. 304*. 306. 574.
" könig 3. 9. 23. 27. 81. 245*. 301. 302*. 336. 374. 381. 393. 405. 466. 487. 545*.
Zebrafink 208. 356. 419. 456. 472*. 475. 535. 548. 557*.
" täubchen 113*.
Zenaidatäubchen 113.
Zenaidura auriculata *(Des Murs)* 163.
Zitronenkopf 407*.
Zosterops capensis *Sund.* 375.
" japonica *Tem. Schl.* 375.
" lateralis *(Lath.)* 375.
" palpebrosa *(Tem.)* 375.
" " simplex *Swinh.* 310.
Zügelastrild 36. 320.
Zweifarbrötel 335. 337.
Zwergara 551*. 553.
" arassari 396. 397*.
" drossel 576.
" elsterchen 186*.
" fliegenfänger 598.
" lori 584.
" maskenweber 411*. 416.
" niltawaschnäpper 158. 161*.
" ohreule 163.
" rohrdommel 303.
" schnäpper, rotkehliger 49.
" taucher 198.
" timalie, rotbraune 49.
" trauerschnäpper 49. 179*. 183.
" wachtel, chinesische 608.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 1. Januar 1925 | Heft 1

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Rotkehlchenlied.

Von Karl Finck, Neukölln.

(Nachdruck verboten.)

Schneeflocken wirbelten herab, fielen unaufhörlich, und soweit das Auge reichte, dehnte sich die weiße Decke aus. Fichten und Föhren ächzten unter der schweren Last. Ein bläulicher Dunst lag unter den Beständen.

Verschwommen, teilweise noch ganz verhüllt, erschienen die Höhenzüge. Die Sonne hatte noch keine Kraft. Allmählich wurde es aber heller, der Frostnebel stieg hoch und beinahe plötzlich leuchteten die weiten, weiten Bergwälder in märchenhafter Pracht. Rosig färbten sich die vereisten, alten Wettertannen, und das Dürrlaub der Buchenjugend glühte nun in hellem Kupferbronze.

Der liebe Sonnenschein brachte Leben. Erlzeisige schwirrten herbei, suchten emsig Futter, zankten ein wenig und zwitscherten dann mit komischem Eifer. Muntere Kohlmeisen klingelten hell, bald hier, bald da. Im Holze schackerten Elstern, ein Schwarzspecht stob mit gellendem Lachen ab, zeitweise warnte der Eichelhäher.

Rauh tönten die Rufe der Knechte, Schlitten kamen an, mit schweren, rotbunten Ochsen bespannt, um die gefällten Lärchenstämme nach der Schneidemühle abzufahren.

Drüben kletterte unser alter Heger mühsam den Gang hinauf.

Durch das Glas beobachtete ich ihn, wie er den Schuppen öffnete und die Krippen mit Heu füllte; es dauerte nicht lange, so trat aus den anliegenden Stangenbeständen Rotwild, hochgeweihte Hirsche, Alt- und Schmaltiere. Ein Sprung Rehe wartete schüchtern in respektvoller Entfernung.

Unterdessen hatten auf dem Einschlag die Holzfäller mehrere Feuer angezündet, wärmten die mitgebrachte Mehlsuppe und verzehrten ermüdet das Frühstück.

Über den kristallklaren Himmel zogen kleine Schneewölkchen.

Unsagbaren Frieden atmete die Winterlandschaft mit den kaum übersehbaren, dicht bewaldeten Hügelketten, die bloß von wenigen Wiesentälern unterbrochen waren. Dahinter, in duftender Weite, standen mächtige Bergriesen, deren Schneemäntel im Lichtgeflimmer des Tagesgestirnes wundersam sprühten und glitzerten.

„Göp, Göp" klang es aus dem Hochwalde, hüben und drüben lockten auf einmal zahlreiche Kiefernkreuzschnäbel. Papageiartig, kopfüber kletterten die roten und gelblichgrünen Vögel umher, hängten sich an die Zweige, brachen bedächtig die Schuppen der Fichten- oder Kieferzapfen auf und ätzten aus dem Kropfe das bettelnde Jungvolk. Mehrere schön gefärbte Hähne sangen, auf den Wipfeln der Lärchenbesamung sitzend, ihre einfachen, jedoch nicht unschönen Weisen.

Der Tag ging früh zur Neige. Irgendwo wirbelte noch ein Tannenmeischen seine krause Melodie, das uralte, doch immer neue Lied vom Hoffen, Lenz und Liebe.

Langsam sank die Sonne unter, zwischen den Wolken klommen sattrote Lichter hoch, und die einsetzende Dämmerung verwischte schnell alle Konturen. Plastisch, beinahe drohend, hoben sich die schwarzen Silhouetten der wenigen Überständer von dem weißen Hintergrunde ab.

Die Axtschläge verstummten. Truppweise verließen die Waldarbeiter den Kahlschlag. Zuletzt stieg auch ich mit dem Vorknecht Simel talabwärts. Unterwegs teilte mir der Mann seine Sorgen mit, wie die kaum drei Joch*) große Wirtschaft nicht einmal genügend Brot und Kartoffeln für die sechs Kinder lieferte. Zum Glück verdiente der blinde Bruder mit der Korbflechterei manchen Gulden.

Den Blinden kannte ich schon lange. In der knospenden Frühlingszeit sah ich wiederholt, wie er bei Sonnenaufgang am Rande ausgedehnter Kulturen, auf einem Baumstumpf hockend, den Kopf mit beiden Händen gestützt, voll Ergriffenheit dem Jubel der Grasmücken und Drosseln zuhörte. Wir wurden schnell gute Freunde. An manchem Sonntag wanderte ich mit dem Lenzl in Begleitung des Forstaufsehers waldeinwärts. Zuerst bedrückte es mich ungemein, wenn sich vor meinen erstaunten Blicken immer wieder neue, unbeschreiblich schöne Landschaftsbilder entrollten, und der arme Lichtlose durch ständiges Fragen alles Wissenswerte ergründen wollte. Aber bald erkannte ich, daß der Lenzl, obwohl er erst im

*) Ein Joch etwa 2 Morgen.

15. Lebensjahre erblindete, kaum etwas entbehrte, weil in seinem Herzen warme Begeisterung loderte.

Nach ungefähr halbstündiger Wanderung langten wir an. Simels Häuschen bestand aus Wohnung, Stall und Scheune, alles unter einem Dache, wie es in jener Gegend allgemein üblich war.

In der noch dunklen Stube arbeitete Lenzl, dabei erzählte er den Kindern Märchen. Mein Kommen fühlte der Blinde sofort. Seine Freude kannte kaum eine Grenze. Schnell mußte der älteste Knabe die Lampe anstecken.

Selbstverständlich bewunderte ich zunächst gebührend den Vogelbestand.

In einer Fensternische hingen zwei größere Käfige, der eine war mit vier Kreuzschnäbeln bevölkert — Glücksvögel, die beinahe in keinem Hause fehlten —, während der andere Bauer drei Stieglitze und zwei Erlzeisige beherbergte. Außerdem pflegte Lenzl noch ein Schwarzplättchen, zwei Buchfinken und ein Rotkehlchen.

Von diesem Vögelchen berichtete mir die Familie durcheinander wahre Wunderdinge.

Alle Käfige waren verhältnismäßig groß und sauber gearbeitet. Die kleinen, gebräuchlichen Marterkästen verurteilte der Blinde, da er selbst jede Beengung schmerzlich fühlte.

Unterdessen brachte die Hausfrau das bescheidene Abendessen. Wir speisten noch, als auf einmal das Rotkehlchen laut, in langen, silberklaren Touren zu jubeln begann, beinahe feuriger wie eine gute Drossel. Der Lenzl öffnete nun den Käfig, flugs kam das herzige Tierchen auf den Tisch, sträubte die Kopffedern, machte artige Bücklinge, nahm knicksend die Mehlwürmer, flog dann auf die rechte Schulter des Blinden, flötete und sang vom Frühling, Waldesrauschen und Blumenduft.

Bei meinem Lob strahlte der Lenzl förmlich. Niemals habe ich in meinem Leben auf einem Menschenantlitz mehr so viel reine Freude ausgedrückt gesehen.

Das Rotkehlchen bekam im Winter hauptsächlich trockene, selbstgesammelte Ameisenpuppen, zeitweise mit etwas Mohrrübe angefeuchtet, dazu 5—9 Mehlwürmer. Fleisch gab es nur selten in kleinen Mengen und wurde stets vorher in Milch erweicht. Von April an erhielt das Tierchen hauptsächlich frische Puppen bei vorsichtiger Angewöhnung, nebenbei noch Fliegen, Schmetterlinge usw., im Herbst auch die zerdrückten Früchte des Pfaffenhutstrauches (Evonymus europaeus *L.*), welche man Rotkröpfellabel*) nannte.

Nach der Mauser blieben zunächst die Mehlwürmer weg, um eine gewisse Ruhezeit zu erzielen; sie wurden erst von Weihnachten in steigenden Gaben gereicht. Um diese Zeit fing der betreffende Vogel jedes Jahr laut zu singen an. Der Vortrag schwächte sich erst gegen Ende Mai allmählich ab. Vollständiges Schweigen herrschte allein in der Mauserperiode.

Herzlichst verabschiedete ich mich von den einfachen, lieben Leuten.

Einsam lag die Winterlandschaft. Längst war der letzte rötliche Schein verschwunden; Sterne glitzerten am Firmament und warfen ihr mildes Licht über die ruhenden Wälder und Fluren.

*) Rotkröpfelbrötchen.

Aber ich vergaß alle Beschwerden der harten Winterzeit, träumte vom kommenden Frühling, vom Erwachen des Gebirgswaldes. Das kleine Rotkehlchen in der ärmlichen Holzhauerhütte hatte in meiner Brust frohes, sieghaftes Hoffen ausgelöst.

Laute Wintersänger hörte ich in jener Waldgegend bei vielen Kleinhäuslern, Forst- und Eisenhüttenarbeitern.

Zuerst hegte ich die Meinung, daß es sich um die berühmten Gebirgs-Wipfelsänger handelte, bis mich der alte Forstwart Wastl, dessen Vertrauen ich mit der Zeit gewann, in die Wissenschaft der Rotkröpfelpflege einweihte. Alle Vollschläger befanden sich nach seiner festen Behauptung bereits vor der ersten Mauser in der Gefangenschaft. Der Fang erfolgte schon im August, zwar wählte man kräftige, unverfärbte Jungvögel der Frühbruten aus, die voraussichtlich noch den Gesang der alten Hähne gehört haben. Die Wildfänge wurden sofort einzeln gekäfigt, bekamen als Futter frische Ameisenpuppen, Mehlwürmer und im Herbst auch Früchte des Pfaffenhütchen. Exemplare, welche nicht innerhalb 1—2 Wochen fleißig studierten, galten als Weibchen und wurden wieder freigelassen.

Die zurückbehaltenen jungen Männchen mauserten nach meinen Beobachtungen stets rasch durch; sie entwickelten sich bei angeführter Fütterungsweise immer zu wahren Sängerfürsten.

In mancher Hütte flog solch ein Rotkehlchen stundenweise frei umher; hing mit rührender Liebe an allen Hausgenossen, sang einmal da, dann dort fröhlich und saß mit Vorliebe auf dem Fensterbrett, wo es mit schiefgehaltenem Köpfchen neugierig durch die Scheiben das Schneetreiben beobachtete.

Für zahme, laut singende Rotkröpfel zahlten Liebhaber fünf Gulden, eine bedeutende Summe, wenn man in Erwähnung zieht, daß damals gute Milchziegen viel weniger kosteten.

Nachlässige Pfleger sammelten im Sommer oft nicht genügend Ameisenpuppen und mußten in der kalten Jahreszeit notgedrungen den Vorrat durch vermehrte Möhrenbeimischungen, Weißbrot und gequetschten Hanf zu strecken versuchen. Derart gefütterte Vögel sangen fast niemals voll. Häufig wurde in solchen Fällen unser Forstwart als erfahrener Rotkröpfelpfleger zu Rate gezogen.

Seine Untersuchungen bereiteten mir regelmäßig ungeheuren Spaß. Vorsichtig nahm der Wastl solchen bockbeinigen Wicht in die Hand, blies die Bauchfedern auf und steckte das Vögelchen wieder in den Käfig.

Bald brach aber ein fürcherliches Unwetter los. „Hoderlumpen, vadrahte“, brüllte der Jäger mit Aufbietung der ganzen Lungenkraft, „habt's richti dös Kröpfal vafuattat. A aufblahte Wampen*) hot dös armi Viechal, wie a vahatschte Kuah. Enker Ruabupantsch**) kennen net mal Gaos vakochen.“ Wütend stampfte der Grüne davon, brachte jedoch am anderen Tag ein Beutelchen Ameiseneier, damit das Rotkehlchen richtig genährt werden konnte.

*) Aufgeblähter Unterleib.

**) Euer Rübengemisch können nicht einmal Ziegen verdauen.

Ein verfütteter Vogel, dessen Unterleib aufgetrieben war, wurde von Kennern nicht mehr beachtet, weil solches Rotkehlchen nach ihren Angaben selten wieder laut sang. (Fortsetzung folgt.)

Meine Medizin.

Von Paul Schwarz, Leipzig, Südstr. 67.

(Alle Rechte vorbehalten.) (Nachdruck verboten.)

Es ist ein eigenes Ding um das Wort Medizin. Unwillkürlich denkt man an Krankheit und Leiden, und den, der in seinem Leben von Kranksein des eigenen Körpers oder in der Familie nicht verschont geblieben war, gruselt's. Aber gar nichts haben meine Zeilen mit Mixturen und Tinkturen, mit Pflästerchen und Pillen zu tun, sondern mit einem lebendigen Mittel, den vielen Unannehmlichkeiten, die eine zahlreiche Vogelschar mit sich bringt und bringen kann, zu begegnen — einem Würmchen. Und weil ich den Namen des Würmchens nicht kenne — auch trotz Weitergabe zur Namens- und Artfeststellung (s. Ges. Welt, Jahrg. 1923, S. 15) —, ist's meine „Medizin", nicht nur dem Namen, sondern auch der Ergebnisse nach, die ich beim Verfüttern an meine Weichfresser, vom gewöhnlichsten bis zum zartesten, erzielt habe. Also davon will ich berichten und das Interesse der Liebhaber wecken, ich glaube manchem damit einen Dienst zu erweisen zu seinem und seiner Pfleglinge Vorteil.

Auch ich gehöre seit 25 Jahren der Zunft der Liebhaber einheimischer Vögel an und käfigte, wohl mit Ausnahme der Raben und größeren Raubvögel, alle Arten, einerlei ob Zier- oder Singvögel. Ohne Not und Sorge um das Futter für meinen zahlreichen Vogelbestand, lebte ich wie alle übrigen Liebhaber in der Vorkriegszeit für meine Liebhaberei. Das wurde aber durch die Kriegs- und Nachkriegszeit doch wesentlich anders. Eine Jagd um Ameisenpuppen, Weißwurm und was noch alles begann mit wechselndem Glück. Nicht weniger begehrt und kostbar neben all den guten und notwendigen Sachen waren — Mehlwürmer. Ebenso schnell wie die Angebote an Würmern erschöpft waren, ebenso schnell änderten sich die Preise in aufwärtssteigender Linie, und langsam, zu langsam hinkte der Lohn der Tagesarbeit hinterher. Doch Not macht erfinderisch. Unsere Frauen haben uns in der Kriegs- und Nachkriegszeit Erzeugnisse ihres erfinderischen Geistes zum Wohl oder Unwohl genug auf den Tisch gebracht, warum sollte da der Tisch der Natur für meine Pfleglinge kein Einsehen haben. Nach Suchen und Versuchen gelang es mir, das Rätsel zu lösen. Allerdings konnte ich einer solchen Menge lebenden Futters, wie ich brauchte, nicht habhaft werden, aber die gelungene Zucht machte mich doch längere Zeit von Mehlwürmern unabhängig. Jetzt bedarf ich ihrer überhaupt nicht mehr.

Auf einen meiner Geschäftsgänge spielte mir der Zufall eine Anzahl kleiner glänzend schwarzer Käfer in die Hand, die mir bei Schaffung von Mehlwurmersatz zum Versuch dienen sollten. Bei ausgiebiger Wärme und Fütterung gedieh die kleine Zucht ausgezeichnet, und in überraschender Weise vermehrte sich der Bestand um ein vielfaches innerhalb ganz kurzer Zeit. Das Erzeugnis der Käfer ist ein kleiner Wurm von etwa $1^1/_2$ cm Größe in ausgewachsenem Zustande. Er ist unbehaart, hat eine gelblich-graue Farbe und ist äußerst flink.

Die Fütterungsversuche an meinen und den Vögeln anderer Liebhaber ergaben folgendes: Alle Vögel, ohne Ausnahme, von den Rotkehlchen bis zu den Gartenlaubvögeln, Sumpfrohrsängern, Goldhähnchen und Zaunkönigen fraßen von dem zur Hälfte aus mittleren und kleinen Mehlwürmern und der Medizin

Rotkehlchen.

bestehenden Versuchsfutter stets erst die Medizin. Unzählige Male konnte ich die Probe aufs Exempel machen, und immer wieder stimmte das Ergebnis. Meine Vögel fressen die Würmer auch heute, nach fünf Jahren, noch gern, und ebenso berichten mir Liebhaber, denen ich für gleiche Versuchszwecke meine Medizin überließ. Einen besseren Beweis über die Güte und die Zuträglichkeit der lebenden Nahrung als die Bestätigung erfahrener Liebhaber bedarf es zweifellos nicht mehr. Einen sicheren Schluß hierüber ergeben auch ferner noch die ungezählten Wünsche und Ersuchen um Abgabe und Überlassung der Würmchen. Mein Vorrat reicht aber bei weitem nicht h[illegible] allen Liebhabern entgegenzukommen, weil

bisher lediglich nur zu Versuchszwecken mit der Zucht beschäftigte. Wohl aber bin ich bereit, meine Medizin aus einem angesammelten Vorrat, den ich nicht selbst brauche, bis zu dessen Erschöpfung abzugeben, selbstverständlich nur kleineren Mengen.

Welche Wirkung hat nun die Fütterung mit meiner Medizin an meinen Vögeln gezeigt? Liebhaber, die die Resultate etwa in kranken Füßen und sonst noch irgendwelchen, den Liebhabern Sorge machenden Leiden erwarten, kommen, das will ich gleich an erster Stelle sagen, nicht auf ihre Rechnung. So übermäßig füttere ich die Würmer nicht. Es ist doch bekannt, daß neben anderen zweifellos die reiche Würmerfütterung Ursache kranker Fuß- und sonstiger Leiden ist. Meiner Medizin will ich die bedauerliche Wirkung zunächst noch nicht absprechen, weil ich, trotz langer Versuchszeit, nicht genügend Erfahrungen zu sammeln in der Lage war. Aber das ist sicher, und viele mich kennende Liebhaber werden und müssen bestätigen, daß ich manchen Spötter und zarten Vogel mit Hilfe meines Mehlwurmersatzes auf die Beine brachte, der keinen Mehlwurm, noch viel weniger das ihm gereichte Mischfutter fraß und dem Tode verschrieben war. Die Monate Oktober, November, die Sorgenmonate der Pfleger von Spöttern und Sumpfrohrsängern, sind für mich, seit ich die Würmchen zur Verfügung habe, keine Sorgenmonate mehr. Die lebhaften weichen Würmchen wirken so lebhaft und günstig auf die Freßlust der Käfiginsassen ein, daß es in meinen Käfigen keine traurig dasitzenden, sondern nur äußerst gesunde und lebendige Vögel gibt. Der lebhaft gesunde Zustand findet daher folgerichtig auch seinen Ausgang in einer normalen Mauser, und zwar ist es unterschiedslos, ob es der erste oder die folgenden Federwechsel sind. Was nun meinen zarten Weichfressern zuträglich ist, kann den übrigen härteren Vögeln nicht zum Schaden gereichen. Ich muß sagen, daß ich bei letzteren meine Versuche nicht gerade am ausgiebigsten vorgenommen habe. Um schneller zum Ziele zu kommen, stellte ich meine Versuche an den zarten Vögeln an, von dem Gedanken ausgehend, daß die Würmer ohne Schaden bei jenen, auch diesen nützlich sein müssen. Außerdem war auch mein Vorrat nicht derartig groß, daß ich bei 40 Stück Weichfressern, die meinen normalen Vogelbestand darstellen, eine ausgedehnte Versuchsfütterung durchführen konnte.

Zusammenfassend kann ich also berichten, daß die von mir gezüchtete Medizin ein Vogelfutter darstellt, das geeignet ist, den Mehlwurm zu ersetzen, und noch mehr, besser ist als der Mehlwurm.

(Schluß folgt.)

Atlantische Vögel.

Von Adalbert Athen, Hamburg.

(Nachdruck verboten.)

Im Jahrgang 1915 der „Gef. Welt" berichtete ich über meine Beobachtungen im Sommer 1914 auf der Azoreninsel Sankt Michael. In den Sommermonaten 1923 und 1924 konnte ich sie wieder aufnehmen und auch auf Madeira ausdehnen, soweit meine freie Zeit mir das gestattete, und habe nun manches zu berichtigen und zu ergänzen unter Benutzung von Harterts „Vögel der paläarktischen Fauna". Wer versucht hat, in das Vogelleben fremder Länder aus eigener Anschauung einzudringen, findet an der Beschäftigung mit diesem köstlichen, von einem wahren Bienenfleiße zeugenden Werke eines deutschen Gelehrten seine helle Freude.

Da ich auch auf die Kanarischen und Kapverdischen Inseln Bezug nehmen werde, ist ein kurzer Überblick über Lage und Klima der atlantischen Inselgruppen am Platze. Am Grünkap des afrikanischen Festlandes, schon jenseits des Wendekreises, liegen die Kapverden, die bei ihrem ständigen Regenmangel zehn Monate im Jahre wahren Steinwüsten gleichen. Wenn dann im Herbst die ersehnten Regengüsse eintreten, kann es plötzlich grün werden, doch in wenigen Wochen ist alles wieder verdorrt. Bleibt der Regen aber einige Jahre aus, dann kann es sich ereignen, daß ein Teil der Mulattenbevölkerung Hungers sterben muß. Es ist erstaunlich, daß unter Verhältnissen, wo das Vieh meilenweite Strecken zurücklegen muß, um nur zweimal die Woche zur Tränke getrieben zu werden, so zarte Singvögel, wie Schwarzplättchen, Brillengrasmücke und einige Lerchenarten überhaupt ihr Fortkommen finden. Auf einer der Inseln ist an einer Stelle, wo man Wasser vermutete und auch fand, ein tiefer Schacht ausgehoben: ich habe beobachtet, wie Schwarzplättchen und Brillengrasmücken in diesen Schacht hinabflatterten, um zum Wasser zu gelangen, das überdies auch noch etwas salzhaltig war.

Einige Tagereisen weiter nordöstlich, dem afrikanischen Festlande dicht vorgelagert, liegen die viel schöneren Kanaren, die zwar auch noch unter Regenmangel leiden, aber dennoch eine sehr reizvolle Pflanzenwelt aufweisen; ihre Küstengürtel liegen aber noch im Wüstensande. Das Vogelleben auf diesen „Glücklichen Inseln" hat Floericke in seiner Veröffentlichung „Aus der Heimat des Kanarienvogels" geschildert. In zwölfstündiger Fahrt weiter nördlich erreicht man die Insel Madeira, wohl die schönste von allen, die Blumeninsel mit ihrem ewigen Frühling, wo das wärmebedürftige Zuckerrohr gedeiht und die Trauben unter der Glut der südländischen Sonne einen feurigen Wein ergeben. In weiteren zwei Tagen, in nordwestlicher Richtung, gelangt man endlich zu der lieb-

lichen Inselgruppe der Azoren, die ein gemäßigtes, aber sehr feuchtes Klima haben und sich daher einer so großen Fruchtbarkeit erfreuen, daß die Landwirte dort zweimal im Jahre ihre Äcker bestellen können. Zwischen Madeira und den Kanaren liegen noch die unbewohnten Felseneilande der Selvagens, die „Wilden Inseln", die Abertausenden von Seevögeln, besonders dem grauen Sturmtaucher, Brutstätten gewähren.

Ein Blick auf die Karte zeigt, das die aufgezählten fünf Inselgruppen eine Kette oder Inselbrücke bilden, die vom afrikanischen Festlande in den atlantischen Ozean führt. Da könnte man vermuten, daß ihre Besiedelung mit Vögeln den Ausgang von Nordafrika aus genommen haben müsse. Das ist aber nicht der Fall. Die Vögel auf den Azoren und Madeira sind ausnahmslos europäisch, auch mit wenigen Ausnahmen auf den Kanaren und zum überwiegenden Teile sogar auf den tropischen Kapverden. Ich meine daher, daß die atlantischen Vögel dem deutschen Liebhaber viel näher stehen, als die „Exoten".

Die Azoren oder die Habichtsinseln wurden im Jahre 1432 von portugiesischen Seefahrern unter Goncalo Velho entdeckt. Sie fanden dort keine Säugetiere, aber um so mehr Vögel, unter denen ihnen wegen seiner Häufigkeit ein Raubvogel auffiel. Sie hielten ihn für einen Habicht und gaben den Inseln seinen Namen. Das war aber ein Fehler, denn es handelte sich um den Bussard, der dort auch heute noch Charaktervogel ist. Die Gruppe besteht aus neun Inseln, die, wie alle atlantischen Inseln, vulkanischen Ursprungs sind. Ich kenne nur die größte und schönste, die Insel Sankt Michael mit ihrer Hauptstadt Ponta Delgada, die uns zu Weihnachten die in Treibhäusern gezüchtete Ananas beschert. Da diese reizvolle Insel bei uns nicht einmal dem Namen nach bekannt ist, weil die Azoren abseits von den großen Schiffahrtsstraßen liegen, so sei mir eine kurze Schilderung gestattet.

Sie liegt zwischen Neuyork und Lissabon und ist von Portugals Hauptstadt etwa 1400 km entfernt: ihre Länge beträgt 66 km, bei 15 km Breite. Das Landschaftsbild wird durch die vulkanischen Gebilde beherrscht, besonders durch die zackigen Umrisse der Gebirgsketten, deren höchste Erhebung, der Pico da Vara, etwa 1100 m hoch ist. Die Insel ist reich an erloschenen Vulkanen: der größte davon hat einen Durchmesser von 7 km, was einen Kraterumfang von etwa 20 km ergibt. Die Besteigung dieses Vulkans ist außerordentlich lohnend: man genießt dabei ständig den Anblick des Ozeans mit seiner schäumenden Brandung an den steilen zerrissenen Küsten, und oben angelangt, bietet sich einem ganz unvermittelt der überraschende Blick in die Tiefe seines mächtigen Kraters. Mitten in einer prächtigen Pflanzenwelt entdeckt man Weizen- und Maisfelder, Ortschaften mit teilweise sehr armseligen Häusern, aber auch die vornehmen Landhäuser der wohlhabenden Azoreaner mit ihren herrlichen Parkanlagen, die wegen der Mannigfaltigkeit ihrer Pflanzenwelt in Europa nicht ihresgleichen haben sollen, nicht einmal in den berühmten Gärten von Sintra am Kap da Roca, die Lord Byron schon ein „glorious Eden" genannt hatte. An der tiefsten Stelle des Kraters ruht ein See, der mit seiner spiegelblanken Fläche und den Lavaströmen, die ihn durchkreuzen, den Reiz des Landschaftsbildes noch erhöht. Beim Abstieg in den Krater stößt man noch auf andere geologische Wunder. Stellenweise wird einem der Boden heiß unter den Füßen: anderwärts steigen Dämpfe aus der Erde, die einen feinen Schwefelniederschlag verbreiten. Dann wieder trifft man kochende Quellen, die mit brausendem Ungestüm aus dem Boden hervorbrechen und große Dampfwolken verbreiten. Viele Mineralquellen spenden ein vorzügliches Wasser, das zu Heilzwecken gebraucht und in großen Mengen nach Portugal ausgeführt wird.

Olivendrossel (Text in Heft 2).

Die vulkanische Beschaffenheit des Bodens und das milde feuchte Klima erklären die reiche Pflanzenwelt der Insel. Die Bewohner haben noch nach-

geholfen, indem sie Bäume und Sträucher aus aller Herren Länder eingeführt haben. Man findet dort Araukarien, Lorbeerbäume, eine Juniperusart, die Riesenbäume bildet, Cryptomerien, die japanische Zypresse, den Kampferbaum und viele andere. Vorherrschend bleibt aber immer die Strandkiefer. Auch Nutzpflanzen sind eingeführt, wie der Teestrauch, der in großem Maßstabe gebaut wird, der Tabak und andere. Die Blumenpracht im Juni ist überwältigend; ich erwähne nur die Hortensie, die dank dem eisenhaltigen Boden bis zu drei Meter hoch wird und weite Strecken der Landstraßen und Wege auf beiden Seiten besetzt. Man kann sich von dieser Blumenfülle eine Vorstellung machen, wenn man sich unsere holsteinischen Knicks mit weißen, blauen und veilchenfarbigen Blütendolden übersäet denkt.

(Fortsetzung folgt.)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von Karl Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Dank der Rührigkeit und Unternehmungslust unserer großen Tierhandelsfirmen, besonders August Fockelmanns, Hamburg-Großborstel, L. Ruhes in Alfeld und auch der Leitung des Berliner Zoologischen Gartens sind im Jahre 1924 größere Mengen der verschiedensten Vogelarten fremder Länder eingeführt worden, welche bisher noch nicht nach Europa gelangt waren.

Reiche Tiertransporte aus Süd- und Nordostafrika, aus Mexiko und Brasilien, Indien und Australien gelangten zu uns.

Noch war es nicht möglich, alle diese Neuerscheinungen und Seltenheiten, welche im vorigen Jahre eingeführt wurden, den Lesern unserer Zeitschrift in Wort und Bild vor Augen zu führen und schon wieder wird die Ankunft neuer Tiertransporte aus Südafrika und Indien erwartet und in nicht ferner Zeit wird auch Nordostafrika mancherlei neue Bewohner für Käfige und Vogelstuben senden.

Mehrfach waren die Neulinge örtliche Formen einer längst bekannten Art, die aber doch in ihrem eigenartigen Gefieder sich wesentlich von der bekannten Form unterschieden und sehr wohl das Interesse der Liebhaber wachzurufen geeignet sind. Meist entstammen die Formen den Importen aus Nordostafrika, welche wir den Unternehmungen des Zoologischen Gartens zu Berlin verdanken, einem Teil Afrikas, welcher in der Vorkriegszeit trotz seines Vogelreichtums für die Vogelliebhaberei nur sehr selten Beobachtungs- und Züchtungsmaterial lieferte. Im Jahrgang 1924 der Gef. Welt hatten wir Gelegenheit, uns mit einigen geographischen Formen aus der Gruppe der Webefinken zu beschäftigen, deren westliche Vertreter unter dem bekannten Sammelnamen „Senegalvögel" recht häufig auf dem Vogelmarkt erschienen.

Wir sahen den nordöstlichen Bandfinken — Amadina fasciata alexanderi *Neum.*, der sich durch kleinere Maße und schärfere Zeichnung von der westlichen Form unterscheidet, den schönen auf Bürzel und Unterseite intensiv rotgefärbten „abessinischen Amarant" — Lagonosticta senegala carlo *Zedl.* aus Nordsomaliland, den dunklen Blauastrild — Uraeginthus bengalus schoanus *Neum.*, welcher sich durch den grünlichen Ton des blauen Gefieders und die dunklere Färbung der Oberseite von den sonst bekannten Formen der Blauastrilde unterscheidet.

Wesentlich verschieden von der häufig eingeführten westlichen Form ist das

„nordöstliche Silberschnäbelchen" — Aidemosyne cantans orientalis *Lz. Hellm.*

Gleicht es in der Gestalt auch dem westlichen Vogel, so erscheint es doch infolge seiner schönen Färbung schlanker und zierlicher. Hauptsächlich die reinweiße Färbung des Gefieders der Unterseite, der jeder ockergelbliche Ton fehlt, bewirkt diese schlankere Erscheinung. Aber auch die dunklere Färbung der Ohrdecken, welche sich deutlich von dem hellen Braun des Gefieders der Oberseite abhebt, trägt dazu bei.

Graf Zedlitz hat dieses Silberschnäbelchen auf seiner nordostafrikanischen Forschungsreise im ganzen Barkabecken regelmäßig angetroffen und sagt, „daß es ein Freund des Menschen und seiner Ansiedlungen" und „an den Wasserstellen in der Nähe von größeren Ortschaften" regelmäßig anzutreffen sei. Es lebe in kleinen Gruppen von drei bis acht Stück und halte sich mit Vorliebe auf den untersten Seitenästen etwas versteckt im Innern des Busches. „Da hocken dann so vier bis fünf kleine graue Gesellen dicht nebeneinander und scheinen sich leise zwitschernd im kühlen Schatten Geschichten zu erzählen." Von den niederen Zweigen sah sie Graf Zedlitz häufig zur Erde niederflattern, im Gegensatz zu Heuglin, der sie selten am Boden beobachtet hat.

Ihr Benehmen in der Gefangenschaft weicht nicht von dem des westlichen Silberschnäbelchens ab.

Auf der Ausstellung des „Landesverbandes Preußen" in Berlin zeigte die Firma Lenger-Berlin eine Anzahl des seit langer Zeit auf dem Vogelmarkt fehlenden

Haubenfinken — Coryphospingus cristatus *(Gm.)*.

Die Vögel sind von Fockelmann-Großborstel aus Brasilien eingeführt. Von den Brasilianern wird der Haubenfink, den sie „Cardinal" nennen, gern im Käfig gehalten, da er in der Gefangenschaft ausdauernd, im Futter anspruchslos ist — er wird dort mit gestoßenem Mais und Spitzsamen gefüttert —, und besonders geschätzt wird er wegen seines schön gefärbten Gefieders.

Kron- oder Haubenfinken sind schlanke, mittelgroße Finken, mit schlankem, kegelförmigem, seitlich etwas zusammengedrücktem Schnabel mit gerader Firste. Das weiche Gefieder ist auf dem Oberkopf zerschlissen und schopfartig verlängert, eine Haube bildend. In Südamerika leben zwei Arten der Gattung. Das Verbreitungsgebiet des Haubenfinken erstreckt sich über den größten Teil Südamerikas. Er lebt dort ähnlich unseren Finken und treibt sich außerhalb der Brutzeit auf unbebautem Gelände, zuweilen mit anderen Finken, in kleinen Flügen umher, wo er sich von Unkrautsämereien, besonders von Distelsamen, nährt. Zur Brutzeit leben sie paarweise. Das Nest steht ziemlich hoch im dichten Gebüsch, ist napfförmig und enthält 3—4 weiße, nach hinten dichter braungrau getüpfelte Eier (18×24 mm).

Sein Gesang ist eine Aneinanderreihung seines spitzen, scharfen Lockrufes mit zirpenden Tönen und kleinen Trillern vermengt. So wenig angenehm die spitzen Töne sind, welche er nicht allzufleißig hören läßt, so schön ist seine Gefiederfärbung. Wunderbar hebt sich die von schwarzen Federn seitlich begrenzte leuchtend scharlachrote Haube des Männchens von dem mehr oder minder weinrot oder tief scharlachrot gefärbten Körpergefieder ab. Der Haubenfink in seiner vornehmen Farbenpracht ist eine Zierde jedes Käfigs und jedes Flugraumes. Die wenigen Stücke, welche bisher eingeführt waren, haben sich als durchaus friedlich mit allen andern gezeigt. Bei der Fütterung ist zu beachten, daß dieser Vogel leicht zu fett wird. Alles Futter muß knapp gereicht werden, und erregende Futtermittel sind möglichst nicht zu

Haubenfink (s. S. 6).

reichen. Neben Sämereien, wie Spitzsamen, Hirse, etwas Rübsen, Reis in Hülsen und Mohn, dürfen ab und zu einige Hanfkörner gereicht werden, und in der wärmeren Jahreszeit etwas Insektenfresserfutter, wenig frische Ameisenpuppen und ab und zu ein Mehlwurm. Grünkraut wird stets geboten.

Gefiederbeschreibung: ♂ Scheitelmitte breit leuchtend scharlachrot, seitliche Oberkopffedern schwarz; Oberseite weinrötlichbraun, am Hinterhals leuchtender, am Unterrücken, Bürzel, Oberschwanzdecken leuchtendrot; Gefieder oberhalb des Auges und an den Seiten des Oberkopfes leuchtend weinrötlichbraun; Zügel, Umgebung des Auges braungrau, Lidrand weiß; Ohrdecken braungrau, weinrötlich verwaschen; Kinn, vorderer Teil der Wangen weißgrau, hinterer Teil, Unterseite tief scharlachrot, an den Seiten und nach hinten mehr weinrötlich; Schenkel aschgrau, weinrötlich verwaschen; Flügel dunkelbraun, Deckfedern weinrötlich verwaschen, Schwingen und schwärzliche Schwanzfedern schmal weinrötlich gesäumt; Auge braun; Schnabel dunkelschiefergrau, unten heller; Fuß schiefergrau Lg. 137,5 mm.

♀ ohne Haube, oberseits braun; Bürzel, Oberschwanzdecken weinrötlich; Zügel schiefergrau, unterseits hellweinrot, Kropfgegend, Brust bräunlicher, Flügel, Schwanz wie oberseits. (Fortsetzung folgt.)

Individuelle Fütterung.

Von J. Birk, Leipzig.

(Nachdruck verboten.)

Die Pflege unserer Weichfresser und in erster Linie die Fütterung derselben ist ein Thema, das schier unerschöpflich erscheint, wenn man die vielen Wege vor sich sieht, die alle zu dem einen Ziele führen sollen, in unseren Käfigvögeln langausdauernde sangesfreudige Stubengenossen zu besitzen. Wie oft werde ich von auswärtigen Liebhabern durch seitenlange Fragebogen um Auskunft gebeten, was man diesen oder jenen Vogel füttern soll, denn, trotzdem Ameisenpuppen, Weißwurm, überhaupt nur die besten Futterbestandteile zur Verwendung kommen, ein Mißerfolg. Auf derlei Fragen eine wirklich einwandfreie Antwort zu geben, wenn man nicht den Vogel vor sich hat, wenn man nicht seine Körperbeschaffenheit kennt, wenn man nicht das Futter in der verabreichten Menge und in seiner qualitativen Zusammensetzung prüfen kann, ist wirklich schwer, denn man kann, wenn man nur weiß, was gefüttert und nicht auch gleichzeitig wie gefüttert wird, das Übel noch verschlimmern, als es beheben. Die Kunst der sachgemäßen Pflege unserer Weichfresser, und seien es auch die zartesten unter denselben, verliert viel an ihrer schwierigen Ausübung, wenn dabei individuell verfahren wird.

Jeder Liebhaber, der in der Pflege seiner Lieblinge aufgeht, der mehr sieht, als der oberflächliche Pfleger von den Bedürfnissen seiner gefiederten Schar, der wird gefunden haben, daß nicht allein das Beste vom Besten den Erfolg bringt, wenn nicht auch gleichzeitig die Anforderungen des Vogelorganismus ausschlaggebend sind für die Qualität und Quantität des Futters. Nach meinen Erfahrungen stehe ich auf dem Standpunkt, daß weitgehendste Diät und Abwechslung in der Fütterung der Stubenvögel mehr ausdauernde,

sowie auch fangesfreudige Käfigvögel ergibt, als eine schematische Futterzuteilung, ohne Berücksichtigung, erstens der Vogelart und zweitens des Individuums ein und derselben Art. Wie verschieden äußert sich schon das Benehmen eines Käfigvogels. Der eine ein stürmischer, der andere ein stets lebhafter, beweglicher, ein dritter ein phlegmatischer Vogel, fast jeder hat seine Eigenheiten, denen man begegnen soll, falls es verwerfliche sind. Handelt es sich hingegen um notwendige, beim Käfigvogel gern gesehene, so komme man denselben entgegen, aber nur so weit, daß es durch längere Dauer nicht schädlich wirkt. Seine Vögel soll man füttern und nicht mästen, man soll sie nicht darben lassen bei einem nährstoffarmen Futter, sondern soll je nach der Wirkung der Fütterung dieselbe quantitativ, sowohl wie auch qualitativ verbessern oder verringern. Daß unsere Weichfresser nicht zu allen Zeiten des Jahres dasselbe Futterbedürfnis haben, daß sie als Frischfänge ganz andere Quanten Futter verzehren, wie später als ausgefütterte, infolge mangelnder Bewegung und eintretender Ruhe zum Fettansatz neigende Vögel, ist wohl eine jedem Liebhaber bekannt sein dürfende Tatsache. Den Frischfang lasse man fressen so viel er will, denn je mehr er sich eine Güte tut am Ersatzfutter, um so mehr ist die Gewähr vorhanden, daß er die Umwälzung, die in seinem Organismus infolge der unnatürlichen Ernährung, der schroffen Gewöhnung vom Natur- ans Ersatzfutter, vor sich geht, ohne nachteilige Folgen besteht. Bei der Einfütterung der meisten Frühjahrswildfänge stehen uns bereits frische Ameisenpuppen zur Verfügung und hat es zu dieser Zeit wohl gar keine Schwierigkeiten, vorausgesetzt, daß es sich nicht um einen recht störrischen, alles Futter verschmähenden Burschen handelt, den Vogel gesund und normal zu halten. Trotzdem erfordert schon der Frischfang eine eingehende Beobachtung betreffs seiner individuellen Veranlagung, denn schon beim Frischfang ist das Nahrungsbedürfnis ein verschiedenes. Doch fällt diese individuelle Eigenschaft, so lange der Vogel singt, nicht in die Wagschale, er reguliert dadurch den Kräfteverbrauch, ebenso aber auch das Futterbedürfnis automatisch, denn so lange er singt, bleibt er durch diese Ableitung der überschüssigen Säfte bei normaler Körperbeschaffenheit. Frische Ameisenpuppen sind, wenn auch nicht im richtigen Sinne, so doch in ihrer Wirkung auf den Vogelorganismus ein natürliches Ersatzfutter, wie uns leider bis heute kein zweites, abgesehen von den viel schwieriger zu beschaffenden lebenden Insekten, die als Abwechslung und Leckerbissen zu betrachten sind, zur Verfügung steht in der Vogelpflege. Der Mehlwurm, wohl auch ein im Übergangsstadium befindliches lebendes Insekt, bildet trotzdem kein natürliches Futter für alle Vogelarten. Kommt er in Ermangelung der leichten Beschaffung eines anderen Insektes durch aktuelle Züchtung als einziges, dem Natürlichen am nächsten kommendes Ersatzfutter wohl nur in Frage, da dessen Verfütterungswohl dem noch mit reichlichen und gesunden Magensäften ausgestatteten, im Gesange befindlichen Frischfang für kürzere Zeit nichts schadet, so kann er für die Dauer aber nicht als eigentliches Nahrungsmittel im Sinne einer reichlichen Verabreichung für die Stubenvögel gelten. Beim Frischfang ist der Mehlwurm der erste Behelf beim Fang sowohl wie bei der Eingewöhnung, um ihn vom lebenden Futter an das tote Ersatzfutter zu gewöhnen. Ein im Gesang befindlicher Frischfang verträgt wohl länger eine Blankfütterung mit Mehlwürmern, als ein infolge irgendwelcher Umstände stumm gebliebener Frühjahrswildfang. Jeder Liebhaber wird daher seine Frischfänge baldmöglichst an ein Weichfuttergemisch bringen, wenigstens bei Arten, die zu einer Zeit gefangen werden, wo es noch keine frischen Ameisenpuppen gibt wie beim Rot- und Blaukehlchen, Singdrossel, Zaun- und Mönchsgrasmücke usw., selbstverständlich mit einer genügenden Beigabe von Mehlwürmern in deren Anzahl man, falls der Frischfang im Gesange ist, für den Moment nicht zu ängstlich sein braucht. Der Mehlwurm ist in der Stubenvogelpflege ein unentbehrliches, sehr notwendiges, wichtiges Glied in der Reihe der uns zur Verfügung stehenden Futtermittel, doch kann ein falscher Gebrauch bei der Verabreichung oft auch sehr nachteilige

Turmfalk ♂ (s. S. 9).

Folgen haben. Die Verabreichung der Mehlwürmer soll nach der Vogelart und nach der Jahres- und vor allem nach der Gesangszeit reguliert werden. Eine rein individuelle Verfütterung von Mehlwürmern halte ich nicht für ganz notwendig, vorausgesetzt, daß nicht eventuell ein schlechter Körperzustand eines Individuum Ausnahmen notwendig macht. Einem gut genährten Vogel der von Natur aus mehr animalischer Kost zuneigt, wie unsere Rohr- und Laubsängerarten, Zaunkönig, unsere Meisen, Sprosser, Nachtigall usw., dürfen wir als Delikatesse und Abwechslung die Mehlwürmer in einer sehr bescheidenen Anzahl nicht vorenthalten. Doch verlangt manche Vogelart zu ihrem Wohlbefinden auch eine größere Menge täglich, so der Sumpfrohrsänger Gelbspötter, Zaunkönig, Goldhähnchen usw., überhaupt die zarteren Vertreter unserer heimischen Vogelwelt, wollen betr. Mehlwurmfütterung nicht allzu stiefmütterlich behandelt sein. Ja, der Mehlwurmtopf muß jederzeit bei der Hand sein, wenn die zarten Sänger keinen allzugroßen Appetit nach der Weichfütterung zeigen. Leider kommt es bei diesen Arten nur zu leicht vor, daß plötzlich jedes Mischfutter unbeachtet bleibt und tagelang kein Krümelchen davon angerührt wird. Meistens tritt die Antipathie gegen das Mischfutter auch noch in der so wie so gefährlichsten Zeit der kurzen, düsteren November- oder Dezembertage auf und, hat es der Pfleger bis dahin nicht fertig gebracht, seinen leicht hinfälligen, zarten Pfleglingen ein kleines Fettbäuchlein anzumästen, so können derartige kritische Futterverweigerungen gar zu leicht zur Katastrophe werden. So ging es mir dieses Jahr wieder mit meinem Sumpfrohrsänger, der 5 Tage aber auch nicht ein kleines Quantum Weichfutter zu sich nahm. Der Vogel war sehr gut genährt und so war es ein leichtes, den Vogel in dieser Zeit mit zerschnittenen Mehlwürmern durchzuhalten. Man versäume aber dabei ja nicht, das übliche Mischfutter mitzureichen und unter dieses die Mehlwürmer zu schneiden, denn sonst kann es auch vorkommen, daß ein Vogel überhaupt nichts mehr fressen will als Mehlwürmer. Er muß in dieser kritischen Situation überhaupt behandelt werden wie ein Frischfang, denn nur die ins Weichfutter geschnittenen Mehlwürmer mit den daran hängenden Bestandteilen des Mischfutters bringen ihm den Geschmack am Weichfutter wieder bei. Diese kuriose Erscheinung bei ausgefütterten Weichfressern ist individuell, ist aber nicht zu verwechseln mit einer anderen, gleichfalls individuell vorkommenden Futterverweigerung von verfetteten Vögeln, kurz vor dem Gesangsdurchbruch. Bei dieser hartnäckigen Futterverweigerung, bei der vielmals nicht einmal Mehlwürmer angerührt werden, besteht keine Gefahr, wenn der Ausbruch des Gesanges die Ursache dieser „Selbstentfettung" ist. Anders ist es und sogar sehr gefährlich, wenn diese „Selbstentfettung" zu rapid vor sich geht und ihr die Auszehrung auf dem Fuße folgt. (Fortsetzung folgt.)

Junger Turmfalk.

Mein „Seppel".

Von J. Stöß, Mitglied d. F. V. V. d. V. D. „Ornis".

(Nachdruck verboten.)

Anfang August d. J. meldete mir der Unterkassierer unseres Geflügelvereins, mir gleichsam damit die Erfüllung meiner Beitragspflicht versüßend, er habe einen „Taubenstößer" gefangen. Als solcher wurde der Turmfalke — um einen solchen handelte es sich — auch dem nächsten Vereinsabend vorgeführt und dabei wahrscheinlich von den Taubenzüchtern mit mehr oder weniger lauten und sanften Verwünschungen bedacht. Muß allerdings, der Wahrheit die Ehre gebend, gestehen, daß ich weder Augen- noch Ohrenzeuge war. Der über seinen Fang nicht besonders glücklich scheinende Besitzer des „Räubers", der seine Beute sobald wie möglich und um jeden Preis wieder los sein wollte, erzählte mir, daß der Vogel mit einer meterlangen Kette am linken Ständer in sein an einer Berglehne gelegenes Grundstück hereingeflogen kam. Wenn ich (ich der Abladeplatz seit reichlich zwei Jahrzehnten für allerlei Getier, für das andere Liebhaber und Nichtliebhaber keine Verwendung haben) Interesse dafür hätte, könnte ich ihn haben, sonst würde er ihn ausstopfen lassen. Bei diesen letzten Worten erwachte das Mitleid mit dem Tiere und der Abscheu vor derartigen Präparaten, wie sie hier ortsüblich sind, in mir und schon war ich bereit, alle anfänglichen Bedenken wegen Käfigung und Fütterung des Raubvogels zurückstellend, denselben zu erwerben. Noch hatte ich aber ja meinen zukünftigen, meinen meine sowieso schon ziemlich vielköpfige Menagerie noch vermehrenden neuen Hausfreund gar nicht zu Gesicht bekommen. Nun, das Ansehen des doch nicht alltäglichen Tieres war ebenso billig wie der endgültige Erwerb desselben, und so war ich schnell entschlossen, bald an Ort und Stelle. Da saß nun der unschuldig Verdächtige angekettet in einem Exotenkäfig von bescheidenen Dimensionen. Er machte gleich auf mich den friedlichsten, Eindruck. Zu meiner Schande muß ich leider gestehen, daß ich den Harmlosen nicht sofort rechtfertigen, wenigstens nicht reinwaschen konnte. Meine Kenntnisse in der Raubvogelkunde reichten nur soweit, daß ich sicher war, keinen Sperber oder gar Hühnerhabicht vor mir zu haben. Als Mäusebussard war mir der Vogel zu klein. Meine

ziemlich umfangreiche ornithologische Litteratur belehrte mich bald soweit, daß es sich bei dem mittlerweile ohne jede Schwierigkeit in meinen Besitz gelangten Vogel um einen Turmfalken handelte. Weiter muß ich aber zu meinem Bedauern gestehen, daß ich trotz eifrigsten Forschens bis heute keine Gewißheit darüber erlangen konnte, ob ich ein altes Weibchen oder ein noch unausgefärbtes Jungtier besitze (also unter Umständen Fräulein Seppel!). Wer gibt Aufschluß? Auch ist nichts darüber laut geworden, von woher mein Freund gekommen. Allzu schmerzlich scheint der Ausreißer seinen alten Herrn mit seinem Verluste auch nicht getroffen zu haben, sonst wäre doch anzunehmen, daß durch ein Inserat in der Tageszeitung nach ihm geforscht worden wäre. Oder sollte mein Turmfalke eine längere Reise hinter sich haben, also aus dem Verbreitungsgebiete einer mir unbekannten Tagespresse stammen?! Darauf ließe ja vielleicht sein ausgehungert gewesener Zustand schließen.

Mein Turmfalke ist vollständig zahm. Er läßt sich in die Hand nehmen, auf den Finger setzen, schlägt weder mit den Fängen zu, wie ich es vor Jahren einmal bei einem im Jagdeifer auf einen Sperling ins Zimmer geratenen altgefangenen Sperber erlebt habe, noch verletzt er mit seinem doch ziemlich kräftigen Schnabel, welcher Umstand mich auf ein aufgepäppeltes Jungtier schließen lassen möchte. Auch den kleinsten Fleischbrocken nimmt er ganz vorsichtig und zärtlich aus den Fingern. Auf Anruf kommt er nach Art der Katzen nur herbei, wenn es ihm paßt, wenn er sich einen Vorteil ersehen kann. Hat er keinen Appetit, so bleibt er, wo er ist. Erlaube ich mir aber in seiner Nähe meine Katze oder meinen Zwergrehpinscher zu liebkosen, so kommt er sofort voll Eifersucht herbeigestürzt, verfolgt mich auf Schritt und Tritt, soweit sein Käfig erlaubt, und läßt mich nicht mehr aus dem Auge. (Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Ich besitze ein Paar braunbunte **japanische Mövchen**, welche mir bisher in drei Bruten 10 braune Junge aufgezogen haben. Jetzt haben sie zum 4. Male 2 Junge, welche aber gelbweiß ausfallen. Wie kommt das? Ich habe schon seit langen Jahren Mövchen gehalten, auch mit bestem Erfolg, aber stets waren die Jungen braun oder gelb wie gerade die Eltern waren. Diese Tatsache kommt mir sonderbar vor. Woran liegt das? Selbst bei Eltern von verschiedenen Farben fielen bei mir die Jungen stets braun aus, vielleicht einmal eine Schattierung heller, so daß ich glaubte, daß das Braune als Naturfarbe sich am besten vererbte. Anfangs hatte es den Anschein, als wenn die beiden letzten Jungen rein weiß wurden, seit 8 Tagen kommt aber ein reines Gelb zum Vorschein, mit einigen weißen Federn am Kopf und in den Flügeln.

Zu Frage 14 der letzten Nummer kann ich mitteilen, daß ich auch Salmiakgeist zur Milbentötung in den Nistkasten mit bestem Erfolg verwendet habe. Es war, als wenn die Vögel es ganz genau wußten, wenn ein Nistkorb oder Kasten mit Salmiak gereinigt war.

Oldenburg i. Gr. Ed. Spille, Mitgl. 83 der A. Z.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Zur gefälligen Beachtung. Von den Aufgaben, welche der Leitung einer Fachschrift obliegen, ist keine so mühsam und schwierig wie die Beantwortung der aus dem Leserkreis gestellten Fragen. Auch die Gefahr der Einseitigkeit, durch die Beantwortung der Fragen von einer Stelle, ist nicht zu unterschätzen; um dem abzuhelfen, wenden wir uns an den Gemeinsinn der Leser und bitten die Sachverständigen des gerade vorliegenden Falles, ihre Erfahrungen und ihr Wissen dem Fragesteller wie der Allgemeinheit zugute kommen zu lassen. Die an die Schriftleitung der „Gefiederten Welt" zu richtenden Auskünfte werden, wie die Fragen allgemeiner Bedeutung, veröffentlicht werden. Wenn wir auf diesem Wege die große Menge praktischer Erfahrung und vielseitigen Wissens, welche im Kreise unserer Leser vorhanden, für diese selbst nutzbar machen, glauben wir auch dem Ratsuchenden die denkbar beste Auskunft zugänglich zu machen.

Frage 1. Ist die Benutzung von Zinkfreßgeschirren für Weichfutterfresser schädlich? Willenzig.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (E. V.) Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer Werner Geßler, Leipzig, Dresdner Str. 2; Tauschvermittlung — T.-V. —: Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39.

Über Vorgänge innerhalb unseres Verbandes ist zu berichten, daß Aufnahme in den Verband

die Austauschzentrale der Exotenliebhaber und Züchter, der Verein der Vogelfreunde für Remscheid und Umgegend

und als Einzelmitglied

Herr Willy Schmitt-Prym jr. in Aschaffenburg

gefunden haben.

Wir danken den neuhinzugetretenen Mitgliedern für den Vertrauensbeweis, den wir wohl zu würdigen wissen.

Aus Mitgliederkreisen kommt die Anregung auf Anschaffung von Verbandsabzeichen. Wie stellen sich unsere Mitglieder hierzu? Wer wünscht diese Einrichtung?

Um die nötigen Schritte unternehmen zu können, bitten wir alle angeschlossenen Vereine und Einzelmitglieder um Äußerung hierüber bis Ende Januar nächsten Jahres an die Verbandsgeschäftsstelle.

In letzter Zeit mehren sich die Beschwerden beim Reichsverbande über an Betrug grenzende Benachteiligungen unserer Mitglieder. So sind es u. a. folgende Beschwerden:

1. wegen Lieferung von ganz minderwertigem Futter einer bekannten Leipziger Firma,
2. wegen Nichtlieferung von Vögeln trotz vorheriger Bezahlung einer bekannten Thüringer Firma, und
3. wegen an Betrug grenzenden Tausch des Lehrers Syré in Viernau i. Th., vor dem wir unsere Mitglieder bereits früher schon gewarnt haben.

Die Liste kann noch weiter fortgesetzt werden, wir begnügen uns aber mit der Bekanntgabe dieser drei Fälle in der Hoffnung, daß bereits dadurch Abhilfe geschaffen wird.

Immerhin soll unsere Warnung wiederholt und unseren Mitgliedern empfohlen werden, nur mit zuverlässigen Geschäftsleuten in Verbindung zu treten. Gegen Rückporto erklären wir uns zur Namhaftmachung reeller Firmen bereit.

J. A.: Petters, 1. Schriftführer.

Vom Vogelmarkt.

G. Behnke, Berlin O. 34, Petersburgerstr. 29: Sprosser Bachstelze weiß.

H. Bibrack, Aschersleben a. H.: Schneeweiße und isabellfarbige Kanarien.

Jul. Sauer, Leipzig, Neumarkt 16: Rotstirnamazone.

Herrn J. B., Leipzig-Moskau, Herrn W. Sch., Frankfurt/M., Herrn H., Magdeburg, Herrn O., München, Herrn O. F., Heidelberg, Herrn F. M. Bamberg, Herrn H. H., Braunschweig, Herrn A., Hamburg, Herrn A. B., Jena. Beiträge dankend erhalten.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

Jahrgang 54 1. Januar 1925 Heft 1

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Rotkehlchenlied. Von Karl Finck, Neukölln.
Meine Medizin. Von Paul Schwarz, Leipzig.
Atlantische Vögel. Von Adalbert Athen, Hamburg.
Neueinführungen und Seltenheiten. Von Karl Neunzig. (Forts.).
Individuelle Fütterung. Von J. Birk, Leipzig.
Mein „Seppel". Von J. Stöß, Mitglied d. F. B. V. d. V. D. „Ornis".
Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Reichsverband der deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

ußʼsche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen. Alle Vereine und Liebhaber, die unserem Verbande bereits angeschlossen sind, bitten wir an dieser Stelle nochmals, die restlichen Mitgliedsbeiträge unserem Kassierer Herrn Erich Merz, Berlin-Friedenau, Wilhelm-Hanff-Str. 14II, umgehend einzusenden. Vereine und Liebhaber, tretet unserem Verbande bei und unterstützt unsere gute Sache. J. A.: Erich Merz.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden. J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Angemeldet ist Herr Anton Kirch, Vilsen Bez. Bremen. Aufgenommen Mitgl. Nr. 680.
J. Nater, Bukarest (Rumänien) Str. Biserica Ehei Nr. 9. A. Krabbe.

Aus den Vereinen.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen. J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen. J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurter Str. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. V.: Emil Ivo, Schriftführer.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein Vogelschutz u. -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstr. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Bernhard Kühn, Vors.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 3. Januar 1925. Gäste sowie auch Exotenliebhaber stets willkommen. J. A.: Arnold Weber, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden, Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. — A. Voigt, Schriftführer.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorstand. Boppel, 1. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. d. M., abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. J. A.: Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 8. Jan. 1925 Gäste stets willkommen. Der Vorstand. J. A.: J. Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen. K. Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

„Ornis", Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands. Gegründet 1912. Auf vielseitigen Wunsch der alten Mitglieder wollen sich die Waldvogelliebhaber wieder in der „Ornis" zusammenschließen. Als amtliches Organ ist die „Gef. Welt" ausersehen worden, und werden die Artikel, die früher in den „Ornis-Blättern" erschienen, in obiger Zeitschrift gebracht werden. Aus diesem Grunde bittet die Geschäftsführung um eifrige Mitarbeit, damit unserer Waldvogelpflege wieder der Platz eingeräumt wird, der ihr gebührt. Anmeldungen sind unter Beifügung von 2 M. an den Geschäftsführer zu richten; Mitglieder erhalten auf Mischfutterbestellungen 5% Rabatt. Mit treudeutschem Gruß Martin Sperling, Halle/S., Südstr. 49.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am zweiten Mittwoch eines jeden Monats Versammlung im Alten Fritz, Berliner Straße. Beginn 8 Uhr. Gäste sind willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Magdeburg-West, Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlung aller 14 Tage, Samstag abend 8 Uhr, im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken", S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. Daubmann, 2. Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Vereinslokal jeden zweiten Mittwoch im Monat. Franz Heinrich, 1. Schriftführer.

Bayrischer Vogelliebhaberverein, Sitz München (E.V.). Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft im Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Rud. Engel, 1. Schriftführer.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegründet 1. Mai 1923. Vereinsabende aller vier Wochen, in der ersten Woche des Monats verbunden mit Vortrag, in der dritten Woche jeden Monats nur gesellige Zusammenkunft. Vereinslokal „Sächsischer Hof". Gäste stets willkommen. Studienrat Professor Jahn 1. Vorsitzender; Werkmeister Mann 2. Vorsitzender; kaufm. Angestellter Reinhardt Schriftführer.

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Zwickau i. S., Bosenstr. 44.

Für Bienenzüchter

Dzierzon's rationelle Bienenzucht.
Von Pfarrer Dr. Dzierzon. 2. Auflage. Mit vielen Textabbild. Kart. 3.— M.

Leben u. Zucht der Honigbiene
Ein gemeinverständliches Lehrbuch über Behandlung der Bienen und über Tätigkeit, Nutzen und Anatomie d. Biene v. Prof. Dr. O. Kraucher. 2. verbesserte Aufl. Mit einer Tafel, 82 Abbildungen u. 7 Kupfertafeln. Kart. 8.— M.

Bienenzucht im Zargenbreitwabenstock.
Von Jak. Luers. Mit 25 Abbild. im Text. Kart. 2.— M.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung Magdeburg

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 8. Januar 1925 | Heft 2

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Rotkehlchenlied.

Von Karl Finck, Neukölln.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Etliche Jahre später übte ich meinen Beruf im östlichen Norddeutschland aus. Mitte August gaben mir Kinder ein junges Rotkehlchen, dessen linker Flügel verletzt war. Die Verpflegung geschah nach den im österreichischen Gebirge gesammelten Erfahrungen. Zu meiner Freude entpuppte sich das Tierchen als ein Hähnchen, dessen spätere gesangliche Leistungen jeden Liebhaber in Erstaunen versetzte.

Im Frühjahr bis Spätherbst verabfolgte ich tageweise allein lebende Insekten, die mir als Landwirt überreich zur Verfügung standen, gab aber stets dazwischen trockene Ameisenpuppen, um im Winter Ernährungsschwierigkeiten auszuschalten. Frische Puppen vermochte ich aus Zeitmangel nur selten einzusammeln.

Das herzige, überaus zahme Vögelchen befand sich viele Jahre in meinem Besitz.

Jung gefangene Rotkehlchen, richtig gepflegt, bilden angenehme, liebenswürdige Stubengenossen, welche in jedem Jahre ihren schönen Gesang feurig und laut erschallen lassen.

Der bekannte Vogelpfleger und -kenner Herr Wagner besprach in der Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin einmal unser Rotkehlchen.

Nach den Anführungen werden auch in seiner nordböhmischen Heimat mit Vorliebe junge Rotbrüstchen gekäfigt, weil solche vorzügliche Sänger abgeben.

Frühjahrsfänge, vor der Paarung erbeutet, singen bei halbwegs zweckmäßiger Fütterung, beinahe immer laut, lassen jedoch häufig nach dem Überwintern im nächsten Jahre ihren Gesang nicht mehr feurig erschallen. Viele Vogelfreunde behaupten sogar, daß Frühjahrsfänge in Zukunft immer Flüsterer bleiben und schenken daher dem abgesungenen Rotkehlchen noch vor Eintritt der Mauser wieder die Freiheit.

Meine reichen Erfahrungen stimmen damit keineswegs überein; ich habe mindestens 15 im März und April gefangene Männchen Jahre hindurch gepflegt und brachte die Vögel regelmäßig zu vollen, feurigen Leistungen. Allerdings überspringen einzelne Trotzköpfe gerne eine Gesangsperiode oder singen vielmehr weniger laut. Meistens unterlief in der Ernährung ein Fehler, den der gewissenhafte, resp. wissensdurstige Pfleger zu ergründen sucht, um ihn ausschalten zu können.

Gerade beim Rotkehlchen wird der Gesang durch den Sexualtrieb ungemein beeinflußt. Einzelne alte Exemplare flöten zwar feurig, aber nur kurze Zeit; es handelt sich eben um sexuelle Eigenarten, deren Ausgleich selten vollkommen möglich ist. Am ehesten gelingt dies noch bei Vögeln, welche zur Fettsucht neigen.

Gewiß, das Rotbrüstchen hält selbst bei einer ganz unnatürlichen Fütterungsweise jahrelang im Käfig aus, wer aber das Vögelchen im Freien beobachtet hat, vermag mit wenigen Blicken die erbärmliche Verfassung der im wahrsten Sinne des Wortes armen Gefangenen festzustellen.

An einem diesjährigen, sonnigen Oktobertag beschnitt ich Spalierbäume.

Im Garten trieben sich drei Rotkehlchen umher, schnappten nach den spielenden Mücken, fingen aus den Nestern webende Spinnen, machten Jagd nach Brummern, die sich an der Glashauswand sonnten oder suchten zwischen den blühenden Dahlienbüschen verklammte, herabgefallene Raupen der verschiedenen Eulen (Nachtschmetterlinge).

Plötzlich flog ein Rotbrüstchen auf einen Leitzweig, ließ nachlässig die Flügel hängen und jubelte im goldenen Sonnenschein völlig frühlingsmäßig. Sicherlich war es ein junges Männchen. Nicht weit davon träumte leise vom vergangenen Glück ein Rivale.

Abends kaufte ich in einer Handlung etwas Futter. In einem größeren Käfig befanden sich ungefähr 10—12 Stück, nach Angaben des Händlers bereits vollständig eingewöhnte Rotkehlchen. Die Tierchen saßen dick, aufgeplustert da. Das massige Aussehen der übelriechenden Entleerungen kennzeichneten hinlänglich die falsche Fütterung.

Im Freien vorgefundene Exkremente sind immer mehr dünn, wenig kompakt und fein umhäutet.

Wildfänge erhalten im Frühjahre, sobald es durchführbar ist, am besten frische Ameisenpuppen, außerdem noch einige Mehlwürmer, Fliegen, Spinnen, Ohrwürmer, glatte Räupchen usw.

Gute, trockene Ameisenpuppen bilden entschieden das beste Winterfutter, sie werden mit wenig zarter, möglichst fein geriebener Möhre, oder Obstsaft angefeuchtet, zwar so, daß ein lockeres mäßig feuchtes Gemengsel entsteht. Kleine Zusätze von geröstetem Zwieback, Weißwurm und gelegentlich etwas zerquetschter Hanf sind zulässig. Zweimal in der Woche kann auch ein bescheidenes Stückchen gekochtes Fleisch, vorher in Milch erweicht, gut gewiegt, gereicht werden. Durch das Einweichen drückt man den Eiweißgehalt von 15—16 Prozent auf 10—11 Prozent herab und vermehrt gleichzeitig den Kalkbestand.

Sehr wertvoll ist selbstgewonnenes Insektenschrot. Bei bemerkbarer Fettsucht wird die Quantität entsprechend verringert, außerdem das Futter in mehreren Gaben gereicht, damit ein- bis zweistündige Hungerperioden dazwischenliegen.

Ganz verkehrt ist jedoch die Verdünnung mit geriebener, ausgedrückter Möhre. Das Zellengewebe der Mohrrübe wird von keinem Insektenfresser verdaut, nicht einmal vom Starmatz; es wird auch niemals ausgeworfen, sondern passiert, wie Kotuntersuchungen ergeben, unausgenützt die Verdauungsorgane und verursacht schwere, unnatürlich klobige Ausscheidungen.

Der größte Teil der beigemischten geriebenen Möhre bleibt unbeachtet meistens als Rest im Futternapf zurück.

Die eingetrockneten Spännchen führen, wenn sie der Vogel aus Not verzehren muß, leicht gefährliche Erweiterungen herbei, weil sich in solche Gewebsmassen stark, oft erst teilweise im Darm vollsaugen.

Auch das sogenannte Karottenschrot halte ich als schädlich.

Garnelen, Fisch- und Fleischmehl, Hundekuchen, Weizenkleie, Mohnmehl usw. bilden ebenfalls ungeeignete Futterstoffe; einmal sind die drei zuerst angeführten Arten viel zu proteinreich und reizen, wie die übrigen, nicht allein mechanisch, sondern auch durch verschiedene chemische Zersetzungsprodukte die überaus zarten Schleimhäute des Magens und der Därme.

Fisch- und Fleischmehl, dürfen selbst Hühner oder Schweine nur in vorsichtiger Dosierung bekommen.

Verdauungsbeschwerden, hervorgerufen durch ungeeignete Nahrung, drücken erheblich die Lebenskraft herab und lösen immer einschneidende, körperliche Entartungen aus.

Das durchgemauserte Rotkehlchen erhält Oktober und November täglich nur 1—2 Mehlwürmer, sie werden erst später, den gesanglichen Leistungen entsprechend, langsam auf 6—10 Stück und mehr vermehrt.

Als vorzügliches Reizmittel gilt mit vollem Recht gekochtes Eigelb, das bei richtiger Anwendung fast niemals versagt.

In kalten Räumen darf die Reizfütterung selbstverständlich erst später beginnen.

Bei Beachtung der angeführten Fingerzeige treten Mißerfolge kaum ein.

Unbedenklich kann der Pfleger trockene Ameisenpuppen tage-, ja wochenlang verabfolgen, namentlich bei Entfettungskuren, weil sich die Menge leicht abmessen läßt, und der hungrige Vogel keine ungeeignete Stoffe verschlingen kann.

Im Sommer sollte jedes Rotbrüstchen auch frische Puppen bekommen, außerdem nebenbei möglichst viel Fliegen, Schmetterlinge und andere Insekten, es wird dann seine Dankbarkeit durch unermüdlichen Gesangseifer beweisen.

Unser herziges Rotkehlchen ist ungemein verbreitet, wenigstens ich traf das Vögelchen beinahe überall an, sowohl im Gebirge, wo es an den Sonnenseiten ziemlich hoch hinaufgeht, als auch in der Ebene, außerordentlich häufig in Brüchen, am Rande der Moore, in Au- und Niederungswälder, ist aber selbst in trockenen Kiefernwäldern mit ausgedehnten Kulturen keine seltene Erscheinung, besonders wenn Wiesen angrenzen und etwas Wasser die Landschaft belebt.

Die nördlichen Abhänge sind noch mit Schnee bedeckt, aber auf der Südseite läuten bereits Schneeglöckchen, duften zwischen den jungen Gräsern die ersten kurzstieligen Veilchen, blühen Anemonen und violette Küchenschellen. Die Haselnußsträucher prunken in vollem Goldschmuck, und das junge Birkengehölz schimmert schon grünlich. An geschützten Stellen liegt auf den Beständen ein brauner Duft, der grün werden will, bilden blaue Leberblümchen dichte, zusammengewebte Teppiche.

Oben, auf dem Hange flötet eine Graudrossel, sie verkündet jubelnd den Lenz, das holde Auferstehungswunder, Traum von Glück, der nun Wälder, Fluren und Auen durchzittert.

Langsam kommt der Abend, die Sonne versinkt in Purpur und Gold, gleich Feuerbrände lohen die Wipfel der Fichten, wundervoll leuchten die feuchten Stämme, und der magische Schein wirft auf dem schwellenden Moos eigenartige, zart abgestufte Reflexe. In der nächsten Schonung singt ein Rotkehlchen, nicht lange, so klingen von allen Seiten die gleichen Melodien, weich, hingebend, doch wieder kräftig, silberhell, voll Jubel, dann wieder bang, in der abgeklärten Einfachheit ergreifend. Dazwischen mischen sich die Lieder einiger Drosseln und Amseln. Drüben im Eichenholze ruckſen noch Wildtauben, zwitschern schon schlaftrunken Meisen.

Ein Buchfink versucht seinen Schlag, hört aber bald wieder auf.

Schnell wird es dunkel, von der Höhe streicht kalter Wind, im Tale brauen weiße Nebel. Immer mehr verstummen die Vogellieder, nur am Gestellstreifen flötet zuletzt, selbstvergessen ein Rotbrüstchen sein süßes Abendlied. Die schwermütigen Weisen verhallen erst langsam, traumhaft, als Sterne aufblitzen und im Bestande der Kauz bellt.

Mai ist es, die Buchen ziert junges Grün, bloß stellenweise lugt durch die hohen Wipfel ein Stückchen lichtblauer Frühlingshimmel. Überall, namentlich in den räumigen Beständen duften Maiglöckchen, sie bedecken oft weithin den Boden. Blühender Weiß- und Schlehdorn bilden dichte Verhaue. Zwischen Alpenerlen sprudelt fröhlich plaudernd ein Bächlein, ganz von dunklen Gebirgsvergißmeinnicht eingerahmt, dann wieder schwanken im Winde die zierlichen Wedel der Farnkräuter, leuchtet goldgelber Löwenzahn, nicken die Köpfchen des Wildklees, blühen verschiedene Hahnenfußarten und andere Blumen. Blitzschnell verschwinden getupfte Forellen zwischen dem Wurzel-

geflecht der Erlen. Auf einer kleinen Waldwiese stehen über und über in rosiger Pracht mehrere verkrüppelte, wilde Apfelbäume. (Schluß folgt.)

Meine Medizin.

Von Paul Schwarz, Leipzig, Südstr. 67.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Die Zucht meines Mehlwurmersatzes ist nicht schwierig, sie bereitet tatsächlich Freude, wenn man sieht, mit welcher Schnelligkeit er sich vermehrt. Die Fruchtbarkeit der Käfer ist, wie ich schon erwähnte, im Gegensatz zu den Mehlkäfern eine außerordentliche. Während der Mehlwurm bekanntermaßen im günstigsten Falle für eine Brut sechs Monate beansprucht, dürfte es der Wahrheit nahekommen, daß meine Würmer innerhalb dieser Zeit mindestens fünf und sechs Bruten hinter sich haben. Oberster Grundsatz beim Ansetzen der Zucht ist wohltemperierte Wärme zu jeder Zeit. Je wärmer die Tiere gehalten werden, desto wohler fühlen und desto stärker vermehren sie sich. Fehlt die Wärme im Zuchtkasten, erstarren die Tiere und beginnen ihr emsiges Kribbeln und Krabbeln erst wieder, wenn wohltuende Wärme auf sie einwirkt. Haben sie sich in kurzer Zeit vermehrt, so erzeugen sie sich durch das enge Zusammenhalten und die dauernd emsigen Bewegungen die nötige Wärme selbst, so daß diese Sorge wegfällt. Besonderes Augenmerk erfordert die Fütterung. Als Nahrung dienen den Tierchen alle Abfälle aus der Weichfresserfütterung, vornehmlich die Gebäck- und Möhrenreste, die, je größer die Zucht und der lebendige Inhalt ist, mit Weizenmehl vermischt dargeboten werden. Trotzdem die Nahrung immerhin feucht ist, habe ich innerhalb der fünfjährigen Zuchtperiode ein Aufkommen von Milben noch nicht wahrnehmen können. Ich zweifle auch, daß sich die Zuchten mit diesem lästigen Ungeziefer infizieren werden, weil ich wahrnehmen mußte, daß eingesetzte Mehlwürmer zwar nicht zugrunde gingen, doch aber keine Brut erzeugten. Zunächst bleibt mir nichts weiter übrig, als daraus zu schließen, daß die Medizin andere Brut als die seinige, vor allem solche, die nicht ebenso schnellwüchsig und -brütig ist, nicht aufkommen läßt. Die eingesetzten Mehlwürmer erscheinen mir in den Zuchtkästen als beiseite gedrückt, und zwar dorthin, wo weniger Wärme herrscht. Da führen sie ihr beschauliches Dasein, bis sie nach und nach futterreif sind und mit verfüttert werden.

Als Zuchtbehälter dienen bei mir sowohl Holz- wie Blechkisten in nicht zu großem Umfange. Den großen Raum, wie etwa die Mehlwurmzucht, erfordern sie nicht, oder ist, wie ich oftmals im Anfange meiner Zuchtversuche erfahren mußte, wenn nicht gar schädlich, so doch ganz bedeutend für eine befriedigende Zucht hinderlich. Die Tiere beanspruchen, wie schon gesagt, Wärme. Je kleiner nun der Zuchtraum ist, um so bequemer ist er für die Wärmezuleitung. Später, wenn sich die Tiere wesentlich vermehrt haben und künstliche Wärme nicht mehr beanspruchen, weil sie diese selbst erzeugen, finden wir den ganzen lebenden Kisteninhalt immer auf einem Haufen. Von diesem strömt eine angenehme Wärme durch die Kiste und hat zur Folge, daß die tiefersitzende Brut auch ihrerseits alles erforderliche zum Wachstum und Gedeihen vorfindet.

Grauer Lärmvogel (s. S. 16).

Als Inhalt der Kisten sind zu empfehlen alte Wollsachen, etwas Kleie und Weizenmehl. Es ist notwendig, daß täglich, je nach der Besetzungsstärke, mehr oder weniger Feuchtes, und zwar so viel, als die Würmer an einem Tage verzehren, gereicht wird. Ich habe das schon oben erwähnt, wie ich das mache, wiederhole es aber lieber noch einmal. Die Reste des angefeuchteten Weichfresserfutters vermenge ich mit etwas Weizenmehl und reiche das als Nahrung. An einer täglichen Kontrolle der Zucht lasse ich es niemals fehlen. Sowohl in Beziehung

auf die notwendige Wärme, als auch auf genügende Fütterung, schenke ich meinem kostbaren Kisteninhalt Aufmerksamkeit, und greife, wenn es erforderlich ist, hier und da ein. Als Behälter dienen Kisten in mäßigem Umfange, bei einer Wurmmenge von etwa fünf Pfund im Außenmaße von höchstens 50 × 40 × 35 cm. Die oberen Ränder sind mit schmalen Blech- oder Glasstreifen, wie bei der Mehlwurmkiste, versehen. Ebenso habe ich Zuchten in Blechbüchsen im Ausmaße von 30 cm Breite und Tiefe mit einer Höhe von 50 cm untergebracht. Auch diese entwickeln sich durch genügende Wärmezuführung gut. Wenig Sorge mache ich mir mit einem etwaigen Ausbrechen meiner Medizin, wenn das Unglück eintreten sollte, daß dieser oder jener Behälter umgestoßen oder von seinem erhöhten Standort herunterfallen sollte. Weit kommen die Würmer auf kaltem Fußboden nicht, sie erstarren, lassen sich bequem zusammenkehren, und in Ordnung und genügende Wärme gebracht, entwickelt sich das Treiben lustig weiter.

Welche Vorteile bietet nun die Zucht gegenüber der der Mehlwürmer?

Zunächst hat es wohl das Ansehen, als erfordere die Zucht der kleinen Würmer mehr Aufmerksamkeit und Kosten. Das ist aber doch kaum der Fall. Die von mir bereits erwähnte Fruchtbarkeit ist doch gewiß ein nicht zu unterschätzender Vorteil gegenüber der Mehlwurmzucht. Die sowohl im Handel erhältlichen wie selbst gezogenen Mehlwürmer möchten ungefähr $2^1/_2$—3 cm lang sein, um die Zucht nicht in kurzer Zeit zugrunde zu richten. Unter gegebenen günstigen Bedingungen kann der Mehlwurm jährlich wohl zweimal, aber nicht mehr, zur Brut gezwungen werden. Vorbedingung ist hierbei Wärme, Weizenschrot oder Kleie mit Weizenmehl vermischt und Darbietung in Scheiben geschnittener Möhren. Also fast dasselbe, was meine Medizin erfordert, Weizenmehl mit geriebener Möhre, zurückgebliebenes Futtergebäck und Wärme. Wenn auch die Würmchen nur eineinhalb Zentimeter im ausgewachsenen Zustande sind, so ersetzen sie das fehlende durch die intensivere Vermehrung, die in ununterbrochener Fortsetzung das ganze Jahr hindurch anhält.

Mehr will ich von meiner Medizin nicht schreiben. Eine lange Reihe von Liebhabern werden mir die Vorzüglichkeit des Mehlwurmersatzes bestätigen können, während im übrigen den besten Beweis hierüber die zahlreichen Wünsche um Abgabe von Würmern, die ich leider nur Zug um Zug befriedigen kann, bieten.

Gelegentlich meines Besuches der Heidelberger Ausstellung kam bei der Unterhaltung über Liebhaberei die Sprache auf meine Medizin. Ich hätte dabei gern die Würmer zur Ansicht und Probe geboten, wenn ich nur welche mitgehabt hätte. Zunächst lag mir aber gar nichts daran, weil nicht die Absicht bestand, etwa irgendwie auch etwas anzubieten und Geschäfte zu machen. Dem Wunsche des sehr verehrten Herrn Schriftleiters entsprechend, nahm ich aber eine Probe mit nach Berlin zur Verbandsausstellung. Ich muß gestehen, daß ich außerordentlich überrascht war von dem Interesse, was meinen Würmern von vielen Seiten entgegengebracht wurde.

Wenn ich daher über die Zucht, den Verwendungszweck und meine Erfahrungen meiner Medizin dem interessierenden Liebhaber einiges biete, so nehme ich an, es sei willkommen und dem Pfleger und Pflegling zu Nutz und Frommen.

Atlantische Vögel.

Von Adalbert Athen, Hamburg.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Auf diesem paradiesisch schönen Eilande lebt nun eine überreiche Vogelwelt. Die große Anzahl an Vögeln, in der einzelne Arten, besonders unter den Singvögeln auftreten, ist für den deutschen Liebhaber, der gewohnt ist, auf die Vogelwelt zu achten, geradezu überraschend. Es nimmt aber nicht Wunder, daß diese weltentlegene Insel an Arten sehr arm ist. Es gibt dort nur folgende 27 Arten als Brutvögel, die mit Ausnahme einiger Seevögel, alle Standvögel sind: die portugiesischen Lokalnamen habe ich in Klammern beigefügt:

Star (estorninho) Sturnus vulgaris granti subs. nov.
Grünling (verdilhão) Chloris chloris aurantiiventris (*Cab.*)
Stieglitz (pintasilgo) Acanthis carduelis parva (*Tsch.*)
Kanarienvogel (canário) Serinus canaria canaria (*L.*)
Dompfaff (priolo) Pyrrhula pyrrhula murina *Godm.*
Buchfink (tentilhão) Fringilla coelebs moreletti *Puch.*
Gebirgsbachstelze (carvéloa) Motacilla boarula schmitzi *Tschusi*
Goldhähnchen (estrelinha) Regulus regulus azoricus *Seeb.*
Schwarzplättchen (tuto) Sylvia atricapilla atricapilla (*L.*)
Schwarzdrossel (melro) Turdus merula azorensis *Hart.*
Rotkehlchen (vinagreira) Erithacus rubecula rubecula (*L.*)
Waldohreule (mocho) Asio otus subs.?
Schleiereule (coruja) Tyto alba subs.?
Bussard (milhafre, queimado) Buteo buteo insularum *Floer.*
Stockente (pato real) Anas platyrhyncha platyrhyncha *L.*
Ringeltaube (pompo trocaz) Columba palumbus acorica *Hart.*
Felsentaube (pomba da rocha) Columba livia *Gm.*
das schwarze Wasserhuhn (galeirão) Fulica atra atra (*L.*).
Rothuhn (perdiz) Alectoris rufa hispanica (*Seoane*)
Wachtel (codurnitz) Coturnix coturnix conturbans *Hart.*
die braune Sturmschwalbe (andorinha do mar) Oceanodroma leucorrhoa (*Vieill.*)
die schwarze Sturmschwalbe (andorinha do mar) Oceanodroma castro (*Hart.*)
der schwarze Sturmtaucher (cagarro) Puffinus assimilis godmani *Allen*
der graue Sturmtaucher (cagarro) Puffinus kuhlii borealis *Cory.*
Flußseeschwalbe (carajau) Sterna hirundo hirundo *L.*
die südländische Silbermöwe (gaivota) Larus argentatus cachinnans *Pall.*
Heringsmöwe (gaivota) Larus fuscus atlantis.

Durch die geographische Trennung vom Festlande, durch klimatische und andere Einflüsse haben sich nun viele dieser 27 Arten so weit verändert, daß die Wissenschaft ihnen als Subspezies [1]) eigene Namen gegeben hat. Hiervon sind es wieder neun Arten, die den Azoren eigentümlich sind, also nirgendwo auf der Welt wieder vorkommen, nämlich der Star, der Dompfaff, der Buchfink, das Goldhähnchen, die Schwarzdrossel, die Waldohreule, die Ringeltaube, die Wachtel und die Heringsmöwe. Vielleicht kommt noch der Bussard hinzu. Mit Ausnahme von Wachtel und Heringsmöwe habe ich von diesen den Azoren gehörigen Arten eine vollständige Balgsammlung, darunter drei sehr schöne Bälge des seltenen Dompfaffen, mitgebracht und dem Zologischen Staatsinstitut und Museum in Hamburg überwiesen.

Der interessanteste Vogel der Azoren ist ohne Zweifel der Dompfaff. Leider habe ich auf allen meinen Reisen nicht das Glück gehabt, ihn zu beobachten, obwohl ich in diesem Jahre drei Tage daran gewandt habe, ihn in seinem Brutgebiet aufzusuchen. Beide Geschlechter sind grau gefärbt, aber nicht hellgrau, wie das Weibchen unseres Dompfaffen, sondern bräunlich grau. Beiden fehlt der weiße Bürzel. Während bei uns das Weibchen etwas kleiner ist als das Männchen, sind bei dem azorischen beide Geschlechter gleichgroß. Aus der Gleichartigkeit beider Geschlechter zieht Oberst Chaves, mein Gewährsmann in Ponta Delgada, den Schluß, daß sie auch nur gleich zahlreich sein könnten, im Gegensatz zu den anderen Singvögeln, wo die Männchen viel zahlreicher auftreten als die Weibchen, und aus diesem Grunde schöner und stärker sind, um sich bei dem weniger zahlreichen schwächeren Geschlecht durchsetzen zu können. Der azorische Dompfaff kommt nur auf der Insel Sankt Michael vor und lebt hier auch nur in einem eng begrenzten Gebiet, an den Abhängen des Pico da Vara, im Nordwesten der Insel. Noch vor fünfzig Jahren war er in dem bezeichneten Gebiet sehr häufig, richtete aber an den Obstbäumen, besonders an den Pfirsichbäumen, durch Knospenbeißen so viel Schaden an, daß er schonungslos verfolgt worden ist. Es besteht leider die Gefahr, daß er völlig ausgerottet wird. Heute lebt er in der angegebenen, ganz unbewohnten Gegend auf Strandkiefern und Juniperusbäumen, aber im Mai, wenn die Pfirsichbäume blühen, steigt er ins Tal und wird hier mit Pulver und Blei empfangen. (Forts. folgt.)

[1]) Ich schrieb Subspezies, weil Hartert an diesem Ausdruck festhalten will, „da er nun einmal eingeführt ist". An derselben Stelle sagt er aber weiter, daß die zuerst benannte Form eines Vogels nur zufällig zuerst bekannt geworden sei und es daher widersinnig wäre, diese als „Stammform" oder „Stammart" zu bezeichnen. Ist denn aber der Ausdruck „Subspezies", also „Unterart" aus demselben Grunde nicht ebenso widersinnig? Könnte man alle diese Ausdrücke vermeiden und dafür „geopraphische Form" oder „geographische Art" setzen, dann würde es auch jedermann einleuchten, daß die zufällig zuerst bekannt gewordene Form nun auch drei Namen haben muß, um sie von den anderen geographischen Formen zu unterscheiden, auch wenn Namen wie Bubo bubo bubo nicht gerade schön klingen.

Ein Besuch bei August Fockelmann zur Besichtigung eines südafrikanischen Tierimportes.

Von Karl Neunzig.

In einer anmutigen von Wasserläufen und Reihen alter, weitausladender Laubbäume durchzogenen parkartigen Wiesenlandschaft hat seit vielen Jahren die Fa. August Fockelmann ihr Heim aufgeschlagen. Heckenumrahmte Wege führen uns, d. h. mich und meinen ornithologisch interessierten Sohn, von der Hauptstraße zum Tierpark. Wir sind der freundlichen Einladung des Herrn Otto Fockelmann zur Besichtigung der eingetroffenen Tiere Südostafrikas gern gefolgt.

Weißflügelschmätzerdrossel (s. S. 16).

Schon von weitem sieht man die großen, aus Backstein aufgeführten Gebäude, welche in der kälteren Jahreszeit die lebendigen Schätze ferner überseeischer Länder bergen. Auf den Wasserläufen und Teichen tummelt sich allerlei Wassergeflügel.

Lange Reihen von Gehegen und Flugkäfigen mit den dazu gehörigen Schutzräumen, z. Zt. unbewohnt, dienen zur Unterbringung von mancherlei Getier in der wärmeren Jahreszeit.

Da die Art der Tiere, welche die Fa. Aug. Fockelmann einführt, beständig wechselt, müssen Unterkunftsräume für jegliche Art von Tieren zur Verfügung stehen. Der jetzige immer beschäftigte junge Eigentümer der Firma, Herr Otto Fockelmann, hat denn auch dafür gesorgt, daß sowohl der kleinste harmlose Vogel, wie die großen Wildkatzen und die riesigen Dickhäuter

Asiens und Afrikas sicher und sachgemäß in beliebiger Menge untergebracht werden können.

In den unteren Räumen des Hauptgebäudes sehen wir in den Boxen verschiedener Größe der geräumigen Ställe eine große Zahl südafrikanischer Heufresser, darunter einige zwanzig Chapman-Zebras in verschiedenem Alter, die schönen großhörnigen Rappenantilopen, eine stattliche Anzahl blauer Gnus und des südafrikanischen Bläßbockes, alle wohlgenährt und anscheinend in bester Verfassung trotz der überstandenen langen Seereise auf einem Woermanndampfer. Man sollte kaum glauben, daß derartige Mengen großer Huftiere leicht Käufer finden, und doch war dieses „Lager" in wenigen Tagen geräumt.

Die neu eingetroffenen Vögel, wohl über 2000 an der Zahl, sind in einem großen, hellen, gut durchwärmten Raum des Obergeschosses untergebracht, die Weichfutterfresser in kleineren Nebenräumen.

Unter den letzteren sind hervorzuheben das Kaprötel und die zum Erstenmal in mehreren Stücken nach Deutschland eingeführte Weißschulterschmätzerdrossel — Cossypha humeralis *Sm.* (s. Abb. S. 15). Eine Neueinführung ist auch der Rotbauchdrosselschmätzer — Thamnolaea cinnamomeiventris *(Lafr.)*, welcher sich von dem S. 268 des vorigen Jahrganges beschriebenen und auf S. 267 abgebildeten Weißbindendrosselschmätzers nur dadurch unterscheidet, daß nur der hintere Bürzel und die Oberschwanzdecken rotbraun sind. Von echten Drosseln waren vorhanden die Olivendrossel — Turdus olivaceus *L.*, die Rotschnabeldrossel — Turdus libonyanus *(A. Sm.)* und die das Erstemal lebend zu uns gelangte gefleckte Erddrossel — Geocichla litsipsyrupa (*A. Sm.*), von Schnäppern und Würgern in mehreren Stücken: der schöne schwarz- und weißgefiederte Würgerschnäpper — Sigelus silens *(Shaw)*, (s. Abb. S. 17), der sich bei früher eingeführten Stücken als angenehmer und friedlicher Bewohner bevölkerter Vogelstuben gezeigt hat, und der rostbäuchige Flötenwürger — Laniarius rufiventris (*Sm.*), der unter den etwa 25 bekannten Arten der Gattung als der „stimmenreichste, fröhlichste, zutraulichste und, wenn man näher mit ihm bekannt wird, unterhaltendste", bezeichnet wird. Vom Drongos enthielt der Transport nur den über fast das ganze äthiopische Afrika verbreiteten Trauerdrongo — Buchanga afer *(Lcht.)*, dessen Gesang Böhm eine „Aneinanderreihung unzusammenhängender, schwätzender, knarrender und flötender Laute, die äußerst vielfach abwechseln", nennt.

Levaillants Bartvogel — Trachyphonus cafer (*Vieill.*), einer der prächtigsten seiner Sippe, war in mehreren Stücken vorhanden.

In einem noch im Jugendkleid befindlichen Vogel gelangte wohl als erster nach Deutschland der im ausgefärbten Kleid wunderbar gefärbte Schuppenglanzstaar" — Cinnyricinclus *Gm.*, H. verreauxi *Finsch, Hartl.*

Unter den Weichfutterfressern war wohl der interessanteste Vogel der mit prächtig metallisch glänzendem Gefieder bedeckte Sichelhopf — Rhinopomastus cyanomelas *(Vieill.)*, ein Baumhopf mit großem sichelförmigen Schnabel, der nach Art unserer Baumläufer die Rinde der Bäume nach Insekten absucht. Er wurde in einem mit Schlupfkasten versehenen Käfig gehalten, in welchem er sich sofort verbarg, wenn ein Beschauer sich dem Käfig näherte. Der Vogel gelangte das Erstemal auf den Vogelmarkt.

Den farbenprächtigen Turakos nahe steht der graues, schlichtes Gefieder tragende „graue Lärmvogel" — Chizaerhis concolor (s. Abb. S. 13) dessen Haube aus langen zerschlissenen Federn besteht.

Waren unter den insekten- und früchtefressenden Vögeln viele Seltenheiten und eine ganze Anzahl von Neueinführungen, so war der Eindruck, welchen die große Zahl farbenprächtiger Webefinken auf den Beschauer machte, geradezu überwältigend. Wie lange schon mußten wir den farbenprächtigen stattlichen „Buntastrild" entbehren, wie sehnten wir uns nach den Tagen, welche uns wieder „Granatastrilde" und „Elfenastrilde" brachten. Hier haben wir sie vor uns, die lang entbehrten, in schönen unversehrten Exemplaren, leider nur in geringer Anzahl mit Ausnahme des „Elfenastrildes", der reichlicher vorhanden ist. Nie werde ich den Eindruck vergessen, den die in mehreren großen Käfigen untergebrachten Schwärme von Hunderten von „Blauastrilden" — Uraeginthus bengalus angolensis *(L.)* in ihrem zarten und doch so farbenfreudigen Gefieder auf mich machten. Ebenso große Mengen schöner Helenafasänchen bevölkerten andere Käfige. Zahlreich waren die Wachtelastrilde vertreten und der schöne braunköpfige Amaranth, der an Farbenpracht nur durch einige Stücke von Jamesons Amaranth übertroffen wurde. Prachtvoll leuchtete das weitausgedehnte Gelb des Gefieders zahlreicher südlicher Goldbrüstchen — Sporaeginthus subflava clarkei (*Shell.*). Eine stattliche Anzahl von Rotkopfamadinen — Amadina erythrocephala *L.* bevölkert einen der großen Flugkäfige. Ebensogroß war die Zahl der in dem gegenüberliegenden Flugkäfig untergebrachten Hahnschweifwidas, unter denen die Anzahl der Männchen die der Weibchen weit übertraf. Von Widafinken waren sonst noch vorhanden die Königswida, zumeist im Herbstkleid, Gelbschulter- (wohl einem früheren Import entstammend), Gelbrücken- und Weißflügelwida. Zahlreiche im Herbstkleid befindliche Paradieswidafinken müssen ihre Herkunft nach der schönen großen, besonders langschwänzigen Form Steganura paradisea verreanxi (*Cass.*) angehören.

Webervögel waren, abgesehen vom Schnurrbärtchen, nicht in zu großer Anzahl vertreten, am zahlreichsten wohl die Orixweber, einige Blutschnabelweber und der südliche Büffelweber — Textor niger (*A. Sm.*). Von gelben Webern waren vorhanden ein stattliches Paar des großen goldgelben Kaffernwebers — Pl. capensis olivaceus (*Hahn*), ferner in einigen Exemplaren der Gelbscheitelweber — Pl. spilonotos (*Vig.*) und der als Neueinführung in Betracht kommende Goldkopfweber — Pl. auricapillus (*Sw.*), bzw. dessen östliche Form Pl. a. finschi (*Rchw.*)

Die auch als Sänger geschätzten Girlitze waren in 3 Arten vertreten, und zwar durch den Kapkanarienvogel oder Graunackengirlitz, durch den schönen gelbbürzeligen Angolagirlitz und den stattlichen schwefelgelben Girlitz.

Der bald zu den Sperlingen, bald zu den Girlitzen gezählte hübsch gefärbte Alariofink — Alario alario (*L.*) war in mehreren Paaren vorhanden. Er wird in der Heimat vielfach als Käfigvogel seines Gesanges wegen gehalten, den er sehr fleißig vorträgt. Der Gesang ist nicht laut und erinnert mit seinen sanften Flöten an das Lied der Pfäffchen. Außerdem soll dieser kleine Vogel ein Spötter sein, der auch die Lieder anderer Finkenvögel in seinen Gesang aufnimmt und gut wiedergibt.

Großer Beliebtheit erfreuen sich die kleinen Gimpellerchen, welche in zwei Arten vertreten sind, und zwar die südliche Weißwangenlerche — Pyrrhulauda leucotis smithi (*Rp.*), welche sich von der häufiger eingeführten nördlichen Form durch die fast einfarbig erscheinende Rückenfärbung unterscheidet, die hellen Säume des Rückengefieders sind sehr schmal und verschwinden fast ganz, und die hübsche Nonnenlerche — P. verticalis (*A. Sm.*), die sich durch den rundlichen weißen Scheitelfleck hauptsächlich von der Weißwangenlerche unterscheidet.

Kakadus, darunter der schöne Orangehaubige. An Flaschenzügen werden die schweren Transportkästen nach oben befördert, geöffnet und die Insassen veranlaßt, den Reisekäfig mit den für sie bestimmten Wohnkäfig zu vertauschen. Das geschieht trotz Bananen und Orangen nicht immer freiwillig. Zuweilen wird es nötig, durch festes Zugreifen die mit einem recht unangenehmen Gebiß versehenen Perrane und Mandrills zu packen und in den für sie bestimmten Käfig zu bringen, keine kleine Arbeit, die von den geschickten Angestellten der Firma, meist Seeleuten, die Herr Fockelmann als gute Tierpfleger kennen gelernt hat, sachkundig und freudig geleistet wird, zumal sie sehen, daß der Chef des Hauses und sein Vertreter Herr Schmidt selbst kräftig mit Hand anlegen, besonders dann, wenn die zu leistende Arbeit schwierig und nicht gefahrlos ist. Inzwischen werden die Neuankömmlinge von den Wärtern mit Futter und Wasser versorgt, und die Frau des Hauses, Frau Fockelmann, verabreicht besonders Zärtlingen stärkende und sehr begehrte Leckerbissen.

Würgerschnäpper
(s. S. 16).

Die wenigen mitgebrachten Papageien, einige Rosenköpfchen und orangegesichtige Unzertrennliche hatten schnell Liebhaber gefunden.

Das Geschlecht der Tauben wurde vertreten durch einige Hundert der anmutigen Kaptäubchen, eines der besten und am schnellsten zahm werdenden Täubchen, das auch von allen bisher eingeführten Arten am ehesten geneigt ist, in der Gefangenschaft zu erfolgreicher Brut zu schreiten. Die schöne grüne Waaliapapageitaube — Vinago waalia (*Gm.*) gehört zu den recht seltenen Erscheinungen des Vogelmarktes.

Eine größere Herde des Haubenperlhuhnes — Guttera eristato edonards (*Hartl.*) dürfte das Interesse der Ziergeflügelzüchter in Anspruch nehmen.

Und während wir die einzelnen Vögel besichtigen und bisher noch nicht eingeführte Arten bestimmen, geht der Betrieb im Hause emsig vonstatten. Es kommen und gehen Käufer und Tierfreunde, welche die neuangekommenen Tiere besichtigen wollen. Die gekauften Tiere werden verpackt und befördert. Da kommt von Westafrika und Amerika ein Transport Affen und Riesenschlangen, dabei eine Kiste mit

Individuelle Fütterung.

Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Den Mehlwurm betrachte ich nicht nur als Gesangsreizmittel, was er im vorwiegenden Sinne ist, sondern er hat auch einen wertvollen Nährwert. Besonders ist er zur Aufbesserung der Körperbeschaffenheit bei mageren Vögeln ein schätzbares Hilfsmittel. Aus dem nun über den Mehlwurm Gesagten ergibt sich, daß es vorkommt, daß auch seine Verfütterung individuell gehandhabt werden muß, das heißt, je nach Art und Bedürfnis des Vogels, ebenso auch nach der Jahres- und Gesangszeit. Eines muß noch erwähnt werden, daß es viele Liebhaber gibt, die mit einer sehr reichlichen Mehlwurmfütterung arbeiten, aber auch solche, die von der schematischen Mehlwurmgabe nichts wissen wollen, und zu letzteren gehöre auch ich. Und was sind die Folgen dieser beiden auseinandergehenden Methoden? Nun, Erfolge sind auf beiden Seiten, sowohl der nach Schema F fütternde Anhänger einer täglichen Mehlwürmergabe ohne Rücksicht auf die Art und Individualität des Vogels hat singende, ja sogar

manchmal sehr zeitig in den Gesang kommende Vögel, vorausgesetzt, daß sie mit dem Gesang und nicht durch Fuß- oder andere Krankheiten auf die reichliche Mehlwurmfütterung reagieren. Bei einer individuellen Fütterung von Mehlwürmern, bei der der Vogel erstens in der gesanglosen, also ruhebedürftigen Zeit nicht durch dieses zu reichlich bemessene Gesangsreizmittel aufgeregt und nicht zu einem einer Treibhauspflanze ähnlichem Aufflackern des Gesanges verleitet wird, kommt der natürlich einsetzende Gesangstrieb zur vollsten, wenn auch späteren Entfaltung

Elfenastrild. (s. S. 16).

und dauert durch bis zur Mauser, während bei einem künstlich getriebenen Vogel, wenn der Gesang mit seiner ganzen Intensivität eigentlich erst einsetzen soll, ein Abflauen desselben die Folge ist. O ja, ich stehe auch auf den Standpunkt, daß mir meine Vögel im Winter den Frühling vorzaubern sollen, aber man soll nicht so kurzsichtig sein und von einem Vogel etwas Unnatürliches verlangen; man muß mit der Mehlwurmfütterung insofern auch individuell verfahren, indem man berücksichtigt, was für eine Vogelart man vor sich hat, und ob das Individuum im ersten Winter seines Käfiglebens steht oder ein bereits mehrere Jahre im Käfig überwinterter Vogel ist. Will vielleicht ein Pfleger von einem im ersten Käfigwinter befindlichen Gelbspötter, Sumpfrohrsänger, Sprosser, Nachtigall usw. verlangen, daß sie bereits im November oder Dezember mit dem Gesang resp. Schlag beginnen oder gar ins „volle Feuer" kommen, nein, in keinem Fall kann er dieses, ausgenommen sind natürlich Vogelarten wie Rot- und Blaukehlchen, die meistens geschätzte Leichtfänger sind, bereits im ersten Jahre. Wenn wir unseren zarten Vögeln, wie dies Zaunkönige, überhaupt alle Laub- und Rohrsängerarten sind, und speziell auch unseren „Wintermauserern" je nach dem Bedürfnis und Notwendigkeit eine reichlichere tägliche Mehlwurmbeigabe zukommen lassen müssen, so ist damit noch nicht gesagt, daß wir diesen delikaten Leckerbissen den andern Vögeln ganz vorenthalten sollen — nein —, aber der Mehlwurm soll in der Zeit der Gesangsruhe aber auch bleiben, was er sein soll, ein Leckerbissen und eine delikate Abwechslung im „Einerlei" des täglichen Hauptfutters. Der Frischfang, der im ersten Jahre der Käfigüberwinterung steht, ist durch verschiedene auf den Gesangsausbruch günstig wirkende Umstände, wie z. B. die warme Zimmertemperatur, sowie schon auf eine Verschiebung der Gesangszeit eingestellt, und die Praxis hat uns gelehrt, daß längere Jahre überwinterte Stubenvögel von selbst zeitiger in den Gesang kommen, und bei diesen wird der als Leckerbissen gereichte Mehlwurm ebenfalls genügen, wenigstens so lange, bis sie mit dem Gesange beginnen, erst dann hat man, die Anzahl der Mehlwürmer von Tag zu Tag steigend, das für die betr. Vogelart als Höchstzahl in Betracht kommende Quantum zu reichen. Als glänzenden Beweis habe ich in meiner Liebhaberei die großen Erfolge im zeitigen Gesang trotz meiner Gegnerschaft von zu reichlicher Mehlwurmfütterung, außer der Gesangs- und Mauserzeit habe ich doch, trotzdem es in der Woche manchmal nur ein- oder zweimal, ja manchmal gar nicht vorkam, daß Grasmücken, auch Nachtigall und Sprosser, einige Mehlwürmer erhielten, zu Weihnachten das „bezaubernste Frühlingsidyll", welches mein Heim zierte, es war ein „Singen" und „Schlagen" ohne Ende. Die gar nicht als Gesangsreizmittel gereichten Mehlwürmer brachten diese Frühlingsstimmung nicht zutage, sondern andere Umstände, vor allem ein sachgemäßer, vor kalter Zugluft geschützter Stand der Käfige, eine ziemlich gleichmäßige Temperatur und nicht letzten Endes eine „individuelle" Fütterung, die auch eine normale Körperbeschaffenheit, als vorteilhafteste Begünstigerin des Gesangseintrittes, schuf, bewirkten den ohne Treibmittel erfolgten Ausbruch des Gesanges. Wenn alle die vorstehend angeführten Bedingungen vorhanden sind, wird der Liebhaber nicht vergeblich auf zeitigen Gesang bei seinen bereits schon einmal überwinterten Weichfressern warten. Nicht unerwähnt möchte ich lassen, trotzdem es für den Liebhaber eine bereits längst bekannte Tatsache sein dürfte, daß die Mehlwürmer nur vegetabilisch ernährt, also niemals mit animalischer Kost, wie toten Vögeln und Tieren, gefüttert sein dürfen. Die beste vegetabilische Fütterung besteht in guter, wenig ausgemahlener Weizenkleie, Möhren, auch sonstigen Obst- oder Gemüseabfall, doch achte man darauf, daß die Feuchtigkeit, die diesen Futtermitteln anhaftet,

nicht mit der Kleie in Verbindung kommen, denn es besteht dann nur zuleicht die Gefahr einer Vermilbung der Mehlwurmzucht. Ebenfalls ist dies der Fall, wenn mit Zinkblech ausgeschlagene Mehlwurmkisten, oder irdene Töpfe durch Temperaturwechsel schwitzen, also temperieren. Man beachte stets, daß Trockenheit und Wärme die ärgsten Feinde der Milben sind. Vegetabilisch ernährte Mehlwürmer schaden den Vögeln nicht, während animalisch ernährte viel zu hitzig sind, also nicht gereicht werden sollen. Der reichlichen Mehlwurmfütterung während der gesangslosen Zeit wird noch viel zu wenig Beachtung geschenkt, denn mancher Liebhaber wünscht im Winter zeitigen Gesang und denkt dies mit einer reichlichen Mehlwurmfütterung zu erreichen, nichts falscher als das. Glückt es wirklich, daß der Gesang ausbricht, so ist der Sache ein gutes Ende beschieden, aber leider ist dies vielfach nicht der Fall, der Vogel kommt trotz der reichlichen Mehlwurmfütterung nicht in den Gesang. Es fehlt daher an einer Ableitung der scharfen, hitzigen Säfte. Selbe suchen sich meistens einen andern Weg und verschlagen sich auf die Füße oder fördern



Graumückengirlitz.

den Geschlechtsreiz bis zum äußersten. Eine Ableitung durch Befriedigung des Geschlechtstriebes findet nicht statt und gar mancher Vogel endet durch krampfartige Erscheinungen oder durch Lähmungen sein Leben. Also Mehlwürmer meistens ebenfalls individuell und entsprechend der Vogelart und Jahreszeit füttern, in der gesangslosen Zeit sei der Mehlwurm eine wichtige delikate Abwechslung, oder für zu magere oder schlecht fressende Vögel ein gutes Stärkungsmittel und erst, wenn der Gesang einsetzt oder unsere Wintermauserer vor der Mauser stehen, steigere man nach und nach die Mehlwürmerzahl. Wieviel Mehlwürmer man dieser oder jener Vogelart zu dieser oder jener Zeit reichen kann, richtet sich auch nach der Temperatur des Raumes, in dem die Vögel überwintert werden, kühl überwinternde Vögel vertragen ohne Nachteile mehr Mehlwürmer als zu warm gehaltene Vögel. Manche Vogelart verträgt ohne Schaden ein größeres Quantum Mehlwürmer, ja sie haben diese sogar notwendig, so die Laub- und Rohrsängerarten, Zaunkönige usw., hingegen sei man mit fußempfindlichen wie Sprosser, Nachtigall, Blaukehlchen, Rotschwänzen usw. sehr vorsichtig mit der Mehlwurmgabe. Bei den letzten Vogelarten genügt in der gesangslosen Zeit eine Mehlwurmgabe von 3—4 Stück. Mir ist sogar diese Zahl, regelmäßig gegeben, noch zu hoch. Reicht man sie, so muß man dabei ebenfalls individuell handeln, ein Vogel verträgt es, ein anderer nicht. So kann man dem Gelbspötter ohne Berücksichtigung des Individuums ein reichliches Quantum geben, welches in der Mauser- und Gesangszeit auf 30—40 Stück gesteigert werden kann. Eins muß festgestellt werden, daß wir nach dem heutigen Stand der Weichfresserfütterung ohne Mehlwürmer nicht auskommen, so wertvoll und notwendig dieselben für die Vogelpflege sind, so vorsichtig muß mit der Fütterung verfahren werden, sollen sie nicht unliebsame Erscheinungen im Vogelorganismus hervorrufen, und zur falschen Zeit nicht mehr schaden als nützen. Wer gezwungen ist, durch gewisse Umstände die Fütterung seiner Weichfresser mit fertig gekauftem Universalfutter zu bewerkstelligen, hat es natürlich nicht so leicht, seine Fütterungsmethode „individuell" einzustellen, wie derjenige Liebhaber, der sein Weichfuttergemisch selbst zusammenstellt oder, wie ich es bereits lange halte, beim Zubereiten des täglichen Weichfutterquantums die einzelnen Bestandteile zusammensetzt. (Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Einen männlichen **isabellfarbenen Hänfling** sah ich Ende Dezember in der Handlung von Arold in der Fransecky-straße. Der sehr schöne Vogel zeigte auf den Brustfedern deutlich die durch die Federränder verdeckten blutroten Flecken, wie wir sie bei den männlichen Hänflingen finden. R. N.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 2. An meiner Berliner Etagenwohnung befindet sich ein nach den Seiten und nach vorn offener Balkon. Diesen Balkon habe ich im Sommer im unteren Teil mit Fußbodenbrettern, im oberen Teil mit Glaswänden und mit einer dichten Holzdecke versehen lassen, in der noch drei Oberlichtfenster enthalten sind. Es ist eine Veranda in den Größen: 8 m lang, 1,30 m breit und 2,30 m hoch

entstanden. Diese Veranda habe ich in zwei Volieren à 3,50 m Länge eingeteilt und im Sommer mit gutem Erfolg bewohnen lassen; lebende Pflanzen usw. konnten sehr gut gedeihen. Da ich auch noch Zimmervolieren besitze, habe ich zum Beginn des Winters die Balkonvolieren zum Teil eingehen lassen, könnte jetzt aber infolge Erweiterung den Platz gut gebrauchen. Es entsteht für mich die Frage, ob ich auch bei strenger Kälte die Verandavolieren benutzen kann. Die Möglichkeit, einen Ofen (evtl. Anthrazit) aufzustellen besteht, da ein Ofenrohr bis auf den Balkon hinausgelegt worden ist. Meine Befürchtung besteht nur darin, daß bei der Breite von nur 1,30 m die Zugentwicklung durch die drei Glasfronten trotz des eventuellen Ofens zu stark sein wird, und daß dieser sich an den Scheiben entwickelnde Zug den Tieren schädlich sein kann. Ich vermute, daß in richtigen Gartenfreivolieren die zwar wesentlich größere Kälte nicht so gefährlich ist, wie der Aufenthalt der Vögel zu dicht an den Scheiben. Da gewiß einige Liebhaber Erfahrung auf diesem Gebiete haben, wäre ich sehr dankbar, wenn sie diese Erfahrungen mitteilen würden. Zu Gegendiensten bin ich jederzeit gern bereit. Zur Unterbringung kämen eventuell in Betracht: einheimische Finken usw., Wellensittiche und ähnliche harte Ausländer und — falls es geht — einheimische Weichfutterfresser wie Grasmücken usw., die bei mir frei umherfliegen.

Arthur Collignon, Berlin W 62.

Farbenwellensittichzucht, eine Fußringfrage. (Ges. Welt S. 345/24)

Mitglied A.Z. 216 fordert alle einschlägigen Liebhaber u. a. auf, ihre Erfahrungen über die dauernde, einwandfreie Kennzeichnung des Nachwuchses von Wellensittichen mitzuteilen.

Nun, die Kennzeichnung mit widerstandsfähigen Fußringen ist dauernd und mühelos. Ich bediene mich dazu bei Wellensittichen der Zelluloidspiralringe. Sie werden von den Fabriken 5 mm im äußeren Durchmesser weit 1,5 mm stark, gewöhnlich in 5 verschiedenen Farben geliefert. Die Ringe verschiedener Herkunft fallen aber den Farbtönen nach verschieden aus, so daß man dann nicht nur 5 verschiedene Farbtöne zum Kennzeichen hat, sondern 8, ja 10. Auf den linken oder rechten Lauf gezogen, verdoppelt die Möglichkeit des Zeichnens. Die Farben der Ringe sind so kräftig, daß man die mit ihnen kenntlich gemachten Vögel von weitem unterscheiden kann, ohne sie zum Erkennen aus der Behausung heraus fangen zu müssen, eine häufig mühevolle und störende Arbeit.

Am Ringe wird die zweite Windung nur soweit belassen, daß sie die erste reichlich deckt; dann wird sie seitlich mit der Pinzette aufgebogen, der Ring hochkantig auf den Lauf geschoben, gesenkt und endlich die Windung mit der Pinzette wieder zusammengedrückt. Die Ringe werden also nicht aufgedreht und der Lauf dabei gequetscht (A.Z. 14). Keine Spur von Blut fließt beim Aufziehen der Ringe, wie angegeben; sie sitzen dauernd fest und werden nur bei Materialfehlern vom Wellensittichschnabel zerstört.

Meine ersten Ringe kaufte ich gelegentlich eines Berliner Besuches vor mehreren Jahren bei einem Vogelhändler nahe der Schönleinstraße; ich nahm seinen ganzen Vorkriegsbestand von etwa 200 Stück. Meinen letzten Ring erwarb ich in der Sämereienhandlung O. Lübeck, Magdeburg, Leiterstraße, die auf meinen Wunsch mehrere Hundert beschaffte. Aus dieser Erwerbung ließ ich bekanntlich auch A.Z.-Mitgliedern zu den Selbstkosten Ringe ab. A.Z. 12.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (E. V.) Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer Werner Geßler, Leipzig, Dresdner Str. 2; Tauschvermittlung — T.-V. —: Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39.

— Vogelliebhaber! Tretet dem Reichsverband bei! —

Vom Vogelmarkt.

Franks Zool. Handlg., München, Gabelsbergerstr. 9. Roter Edelpapagei, Blaubart-Amazone, Rotstirn-Amazone, Peru-, Guatemala-, Goldstirnsittiche, 1,2 blaue Wellensittiche, 1,2 mexik. Baumwachteln, Klarino, Dayaldrossel, Kardinäle rote, Prachtglanzstare dreif., Trupiale, Trauertangare, Stahlfleckräuber, Hahnenschweifwitwe, Viehweber, gr., Pfäffchen, Schmuckpfäffchen Weibchen, Stieglitzbastarde, weißgescheckte, je nach Schönheit, Kanarienweibchen, weiße, Kanarien, braune, Wasserralle, Mövchen.

A. Krabbe, Anklam, Demminerstr. 10. 1,0 Heuglins-, 1,0 äthiop. Blutschnabelw., 0,1 Napoleonweber.

Paul Tzornack, Berlin, Prenzlauer Allee 189. Kardinäle, Weibchen, Goldstirnblattvogel, Orpheusgrasmücke, Steinrötel, Maskenamandinen, Papstfinken, kleine Kubafinken, kleine Gelbkopfamazone, Tovisittiche.



Herrn Prof. F. B., Danzig-Langfuhr, Herrn F. K. Offenburg, Herrn J. B., Leipzig-Mockau, Herrn A. W., Hamburg, Herrn E. B., Dresden, Herrn A. T., Hannover Beiträge dankend erhalten.

Herrn B. Potsdam, Herrn E. B. Dresden Frl. L. H. Aubstadt, Herrn O. H. Lauterbach ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn St. i. D. An einer Seuche erkrankte Vögel sind kaum zu retten. Jeder erkrankte Vogel trägt zur Weiterverbreitung der Seuche bei. Es ist deshalb nötig, Unterkunftsraum und Pflege der noch gesunden Vögel völlig von erkrankten und krankheitsverdächtigen Vögeln zu trennen. Die gesunden werden in einem seuchenfreien Raum, in gut gereinigten und desinfizierten Käfigen untergebracht und von einer Person verpflegt, welche mit den Erkrankten nicht in Berührung kommt. Der verseuchte Raum darf zur Unterbringung gesunder Vögel und als Lagerstätte für Futtervorräte erst benutzt werden, wenn er nach Erlöschen der Seuche gründlich desinfiziert ist.

Herrn F. R. Sulingen. 1. Wenn die Kahlheit des Oberkopfes beim Schwarzplättchen durch das Umhertoben des Vogels während der Zugzeit, also durch Abscheuern entstanden ist, muß ruhig abgewartet werden, bis eine Neubefiederung eintritt. Das wird vielleicht im Frühjahr der Fall sein. Wenn tatsächlich ein Ausfall der Federn stattgefunden hat, könnte versucht werden, ob wiederholtes dünnes Bestreichen mit Karbolsäureöl (1%) das Federwachstum anregt. 2. Die kalifornische Schopfwachtel ist gegen Kälte nicht empfindlich. Trotzdem ist es ratsam, in der Freivoliere ein Schutzhaus, an drei Seiten geschlossen und überdacht, aufzustellen. Das Wachtelweibchen brütet und führt die Jungen selbst. Es ist aber beim Führen der Jungen so erregt und ängstlich, daß es in der Absicht, die Jungen vor einer vermeintlichen Gefahr zu schützen, diese durch unsinniges Toben auf das Schwerste gefährdet. Man überläßt aus diesem Grunde das Erbrüten und die Aufzucht der jungen Wachteln besser einer Zwerghuhnhenne. 3. Die Schriften besorgt jede Buchhandlung. Das letzte, das ganze Gebiet umfassende Werk, ist im Verlag J. Neumann in Neudamm erschienen.

Herrn Fritz St. Berlin. Die gesandten Bilder sind zur Reproduktion nicht geeignet.

Herrn H. R. Osnabrück. Es ist möglich, daß es sich um den von Ihnen genannten Parasiten handelt und die erwähnte Prozedur in Anwendung zu bringen ist. Das muß bei so kleinen Vögeln natürlich mit größter Vorsicht geschehen. Das Gefieder muß an einer befallenen Stelle auseinander geblasen werden und dann die Hautstelle vorsichtig vermittels eines kleinen Pinsels dünn mit der Mischung bestrichen werden. Am folgenden Tag wird dann eine andere Hautstelle ebenso behandelt werden usw. Von dem Erfolg bitte ich um Bericht.

Herrn E. E. Barmen. Zum Bestreichen kahler Stellen benutzt man am besten Karbolsäureöl (1%). Bei der G. könnte das Bestreichen ruhig vorgenommen werden. Da Gartengrasmücken normalerweise im Frühjahr das Gefieder wechseln, ist es vielleicht ratsam, abzuwarten, ob nicht von selbst die Befiederung eintritt. Zuweilen mausern sie in der Gefangenschaft, aber auch nur im Spätsommer. Auch wenn das bei der Ihrigen der Fall ist, wäre abzuwarten, ob sich das Gefieder im Februar-März nicht von selbst ergänzt.

Herrn J. Sch. Tübingen. Die einzelnen Bestandteile des Futters, von dem eine Probe eingesandt wurde, schienen einwandfrei zu sein, soweit man sie erkennen kann, also Ameisenpuppen, Weißwurm. Die feingemahlenen Bestandteile, anscheinend Garnelenschrot, Gebäck und etwas Fleischmehl, sind bei der fast mehlartigen Beschaffenheit nicht zu definieren und zu begutachten.

Herrn W. München. Der Stieglitz ist an einer mit Abzehrung verbundenen Ernährungsstörung eingegangen.

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen. Alle Vereine und Liebhaber, die unserem Verbande bereits angeschlossen sind, bitten wir an dieser Stelle nochmals, die restlichen Mitgliedsbeiträge unserem Kassierer Herrn Erich Merz, Berlin-Friedenau, Wilhelm-Hanff-Str. 141I, umgehend einzusenden. Vereine und Liebhaber, tretet unserem Verbande bei und unterstützt unsere gute Sache. J. A.: Erich Merz.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden.
J.A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien und Exotenzüchter e. V. Sitz München. Die Generalversammlung des Verbandes findet am 17. 1. 25 in München, Pschorrbräu, Bayerstr. 30, statt.

Die Tagesordnung umfaßt die nach § 15 der Satzung festgelegten Punkte.

Die auswärtigen Mitglieder ersuchen wir, § 16 der Satzung zu beachten.

Anträge und Wünsche sind bis spätestens 8. 1. 25 an den 1. Vors. L. Keidel, München, Schraudolphstr. 44/III zu richten. Mitglieder, die mit ihren Beiträgen im Rückstand sind, werden ersucht, diese sofort einzusenden, widrigenfalls der Ausschluß nach § 5 der Satzung erfolgen müßte.

Die Verbandsleitung.

(A.Z.) Die A.Z., Liebhabervereinigung zur Pflege und Zucht fremdl. Sing- u. Ziervögel, hat in der in Berlin am 19. Dezember 1924 stattgefundenen Generalversammlung zum Präsidenten erwählt Herrn Horst Wagner, Bruchmühle bei Fredersdorf a/Ostbahn, Lindenstr. 32, zum Schatzmeister Herrn Eduard Schütze, Eystrup a/Weser, zum Geschäftsführer Herrn A. Krabbe, Anklam i/Pom., Demminerstr. 10. Aufnahmegesuche mit Rückporto sind an den Präsidenten, Zahlungen an den Schatzmeister auf dessen Postscheckkonto Hannover 56714, sonstige Zuschriften an den Geschäftsführer zu richten. Die Mitglieder gehören gleichzeitig dem Reichsverband der Vogelliebhaber Deutschlands e. V. mit dem Sitz in Leipzig an. Der Jahresbeitrag beträgt Mark 3,30 einschl. Mitlieferung des Jahrbuches und ist zu Beginn des Vereinsjahres zahlbar. Die Aufnahmegebühr Mark 3,00 einschl. Nachlieferung bereits erschienener Jahrbücher ist mitsamt dem Beitrag bei Anmeldung zu zahlen.

Mit Züchtergruß und -heil im Neuen Jahre
der Vorstand, i. A.: A. Krabbe.

(A.Z.) Angemeldet Herr Dr. Knoepfel, Rechtsanwalt, Darmstadt, Heinrichstr. 120. — Aufnahmen seit 1 Dezember 1924 im nächsten Heft.

Aufruf

Die wirtschaftliche Notlage in dem Kreise unserer minder bemittelten Mitglieder, besonders während des Winters, hat den Vorstand veranlaßt, zur Bildung einer „Nothilfe" zu schreiten. Der Vorstand richtet an alle Mitglieder die herzliche Bitte, dazu beizutragen, daß erwerbslose oder im schweren Wirtschaftskampf unterliegende Liebhaber nicht die letzten ihrer gefiederten Freunde verkaufen müssen. Die „Nothilfe" soll diese Liebhaber mit Futterzuweisungen unterstützen. Gibt jedes Mitglied nur 20 Pf., so können dafür schon 3 Zentner Futter verteilt werden. Spenden brieflich an den Schatzmeister oder auf dessen P.-S.-Konto Hannover 56714 mit Vermerk „Nothilfe". In Not geratene Mitglieder, die der A.Z. vor dem 31. Dezember 1924 beigetreten sind und ordnungsmäßig den Beitrag für 1924 bezahlt resp. Antrag auf Erlaß gestellt haben, wollen sich zwecks Futterüberlassung an den Präsidenten wenden mit Angabe der Anzahl und Arten ihrer Vögel nebst kurzer Begründung. Ebenso nimmt der Präsident Anträge auf Beitragserlaß oder Stundung entgegen. Prüfung bleibt dem Vorstand vorbehalten. Die Namen der Antragsteller werden nicht bekannt gegeben, die der Spender öffentlich quittiert.

Der Vorstand:

Horst Wagner, Präsident. Eduard Schütze, Schatzmeister. A. Krabbe, Geschäftsführer.

Aus den Vereinen.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen.
J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurter Str. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. V.: Emil Ivo, Schriftführer.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein Vogelschutz u. -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstr. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Bernhard Kühn, Vors.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 20. Januar 1925. Gäste, auch Exotenliebhaber stets willkommen. J. A.: Arnold Weber, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden, Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. —
A. Voigt, Schriftführer.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler".
Bang, 1. Vorstand. Boppel, 1. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. d. M., abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. J. A.: Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzungen Donnerstag, den 8. und 22. Jan. 1925. Gäste stets willkommen.

Der Vorstand. J. A.: J. Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.
K. Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

„Ornis", Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands. Gegründet 1912. Auf vielseitigen Wunsch der alten Mitglieder wollen sich die Waldvogelliebhaber wieder in der „Ornis" zusammenschließen. Als amtliches Organ ist die „Gef. Welt" ausersehen worden, und werden die Artikel, die früher in den „Ornis-Blättern" erschienen, in obiger Zeitschrift gebracht werden. Aus diesem Grunde bittet die Geschäftsführung um eifrige Mitarbeit, damit unserer Waldvogelpflege wieder der Platz eingeräumt wird, der ihr gebührt. Anmeldungen sind unter Beifügung von 2 M. an den Geschäftsführer zu richten; Mitglieder erhalten auf Mischfutterbestellungen 5 % Rabatt. Mit treudeutschem Gruß Martin Sperling, Halle/S., Südstr. 49.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am zweiten Mittwoch eines jeden Monats Versammlung im Alten Fritz, Berliner Straße. Beginn 8 Uhr. Gäste sind willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Magdeburg-West, Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlung aller 14 Tage, Samstag abend 8 Uhr, im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken", S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. Daubmann, 2. Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Vereinslokal jeden zweiten Mittwoch im Monat.

Franz Heinrich, 1. Schriftführer.

Bayrischer Vogelliebhaberverein, Sitz München (E.V.). Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft im Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Rud. Engel, 1. Schriftführer.

Bayer. Vogelliebhaberverein (e. V.) Ehrenabend am 6. 12. 24 im Pschorrbräuhaus. Die Novemberversammlung wurde abweichend von den übrigen Zusammenkünften im Rahmen eines Begrüßungsabends für die Wiener Delegation, bestehend aus den Herren Karl Salinger u. Joh. Janouscheck, abgehalten.

Der Vorsitzende, Herr Flierl, begrüßte die Herren in unserer Mitte und dankte den zahlreich erschienenen Mitgliedern für den überaus guten Besuch. Weiterhin verbreitete er sich mit der Vorgeschichte des Wiener Anschlusses und dankte den Herren Salinger und Janouscheck in herzlichen Worten für ihren Besuch. Hierauf gab er Herrn Salinger, dem 1. Vorsitzenden des Floridsdorfer Waldvogelvereins die „Edelfinken", das Wort. Herr Salinger gab uns in kurzen Strichen ein Bild über das Wiener Vogelliebhaberleben, die eigentlich einseitige Sportrichtung, die Finkenhetze, Spötter- und Plattlgesangs-Ausstellungen. Auch die Käfigfrage, der Fang der Finken, Plattl und Spötter am Strich mit Leim, die Fütterungsweise usw. streifte der Redner und gab uns so ein getreues Spiegelbild der Wiener „Vogelbucker". Außerdem verbreitete er sich über das in der Münchener Ausstellung Gesehene und gab freudig seiner Verwunderung Ausdruck, was die Münchener Vogelliebhaber in bezug auf Vogelhaltung und Käfigung leisten. In Wien habe er so etwas noch nie gesehen und selbst er als Vogelliebhaber habe hier im Käfig Tiere gesehen, die er bisher nur dem Bilde nach kannte. Er hofft aber auch in Wien durch rege Agitation in diesem Sinne zu wirken und der Vielseitigkeit der Käfighaltung das Wort zu spechen.

Auch Herr Janouscheck als zweiter Redner schloß sich den Ausführungen seines Vorsitzenden an und dankte wie Herr Salinger für die überaus freundliche Aufnahme bei den Münchener Sportleuten.

Die Versammlung lauschte mit großem Interesse den Ausführungen der beiden Wiener Herren und dankte mit reichem Beifall für das Gebotene.

Zum Andenken an den den beiden verbrüderten Vereinen historisch werdenden Besuch überreichte Herr Flierl 2 silberne Ehrenplaketten des Bayer. Vogelliebhabervereins. Hierauf folgte der gegenseitige Austausch der Vereinsabzeichen, Wien und Münchens.

Anschließend hieran übergab Herr Flierl die von der Vereinigung „Ornis" der Vogelliebhaberei Deutschlands gestifteten Plakette Herrn Keibel in Anbetracht seiner großen Arbeitsleistung beim Zustandekommen der diesjährigen Ausstellung und ersuchte die Plakette als äußeres Zeichen des Dankes entgegenzunehmen. Herr Keibel dankte für die ihm zuteil gewordene Ehrung, will aber das Lob nicht ganz allein in Anspruch nehmen, sondern gedachte dabei auch besonders der Herren Rosenberger und Kaiser, die ihn in jeder Weise unterstützt haben.

Hiermit schloß der offizielle Teil des Abends und war der weitere Verlauf dem geselligen Zusammensein in engerem Kreise gewidmet; Toaste, Vorträge und Musik bildeten noch eine angenehme Unterhaltung.

Wir hoffen, daß alle Teile diesen Abend in ihrem Gedenken behalten und erwarten, daß die Sympathien der beiden Vereine auch weiterhin die gleichen bleiben und schloß auch der Abend ganz im Sinne der ausgeführten Vorgeschichte unseres Herrn Flierl zum Wohle der beiden Hochburgen der deutschen Vogelliebhaber Wien-München.

Rudolf Engel, 1. Schriftführer.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegründet 1. Mai 1923. Vereinsabende aller vier Wochen, in der ersten Woche des Monats verbunden mit Vortrag, in der dritten Woche jeden Monats nur gesellige Zusammenkunft. Vereinslokal „Sächsischer Hof". Gäste stets willkommen. Studienrat Professor Jahn 1. Vorsitzender; Werkmeister Mann 2. Vorsitzender; kaufm. Angestellter Reinhardt Schriftführer.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegründet 1. Mai 1922. Die für den 8. Dez. anberaumte Versammlung im sächsischen Hof war leidlich besucht, obwohl das Thema des Vortragenden alle Mitglieder auf die Beine hätte bringen müssen. Über Vogelschutzbestrebungen sprach der Gründer unseres jungen Vereines, Herr Jalousiefabrikant Herrmann sen. Interessantes wurde geboten, verknüpft mit Erfahrungstatsachen. Der Vortrag hatte den praktischen Erfolg, daß 2 Nistkasten im Stadtpark vom Verein versorgt, aufgestellt und mit Futter für den Winter versehen werden. Mit Freuden wurde von der Versammlung begrüßt die Einrichtung einer zirkulierenden Lesemappe der gefiederten Welt. Mit einem Appell an die Mitglieder, sich mit Rücksicht auf die öffentliche Meinung und Ehre des Vereines des Vogelfanges und -handels zu enthalten, schloß der Verein die Mitgliederversammlung.

Nächste Zusammenkunft im Januar: Vortrag des Herrn Lehrer Dörfel-Calbitz. Gäste dazu sind willkommen.

Studien-Rat Professor Jahn,
1. Vorsitzender.

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Zwickau i. S., Bosenstr. 44

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

Jahrgang 54 8. Januar 1925 Heft 2

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Rotkehlchenlied. Von Karl Finck, Neukölln. (Forts.).
Meine Medizin. Von Paul Schwarz, Leipzig. (Schluß).
Atlantische Vögel. Von Adalbert Athen, Hamburg. (Forts.).
Ein Besuch bei August Fockelmann zur Besichtigung eines südafrikanischen Tierimportes. Von Karl Neunzig.
Individuelle Fütterung. Von J. Birk, Leipzig. (Forts.).
Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Reichsverband der deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf. vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber. Mitgliederversammlung vom 13. November 1924. Anwesend waren 19 Herren. In Abwesenheit des ersten Vorsitzenden eröffnete Herr Becker die Versammlung mit einem Gruß an die Erschienenen. Er wies darauf hin, daß am 13. November 1920 die erste Versammlung der Vereinigung stattfand, die kurz vorher von einigen Herren ins Leben gerufen war. Es wurde sodann mitgeteilt, daß am 25. Januar 1925 bei Herold Buhmann, Handelsschule, Georgstraße, ein Filmvortrag über das Vogelleben auf Mellum, 2 Finken und andere Naturbilder — Dr. Weigold wird wahrscheinlich die Begleitworte sprechen — von uns veranstaltet wird. Die Anwesenden wurden gebeten, nach besten Kräften jetzt schon dafür zu werben. Wir brauchen wieder einen vollen Saal. Hingewiesen wurde auch auf die Vortragsreihe von Dr. Weigold im Provinzial-Museum „Wanderfahrten eines Naturforschers in China und Tibet" im Lande der Lamas und der Bambusbären am 14., 21. und 28. November. Es stand wieder Futter zum Verkauf, insbesondere Zwieback, der von Herrn Greite 4 Wochen lang ausprobiert und für gut und zweckmäßig befunden ist. Herr Troschütz hielt sodann einen Vortrag über den „Kärrekiet". Am Norder Teich hat er ihn während seines Aufenthaltes in Bad Neinberg viel beobachtet. Angeregt durch diese Beobachtungen hat Herr Tr. den Vogel dann auch in der Gefangenschaft gehalten. Der erste ging ein, doch der zweite erfreut auch jetzt noch den Besitzer durch sein anziehendes Wesen. Herr Greite ergänzt diese Ausführungen und berichtet dann über das Zusammenleben seiner Vögel, wie sich oft Tiere im Käfig vertragen, von denen man es nicht annehmen würde. Auch Herr von Cölln hat in dieser Beziehung interessante Beobachtungen gemacht, die er mitteilte. Herr Becker erzählte, daß er im Mai 1921 am Maschteich einen Drosselrohrsänger verschiedentlich beobachtete, auch an der Gracht in Herrenhausen, an den Laatzener Teichen, am Nackenberge komme der Vogel vor. Nach einer lebhaften Unterhaltung, angeregt durch Herrn Kühnes Erzählungen, über Harzer und Thüringer Vogelleben, wurde die Versammlung geschlossen. Eskuche.

Empfehlenswerte Bücher für Vogelfreunde

Für Freunde der heimischen Vogelwelt

Die deutsche Vogelwelt nach ihrem Standort.
Ein Beitrag zur Zoogeographie Deutschlands und zugleich ein Exkursionsbuch zum Kennenlernen der Vögel. Von Werner Hagen. Mit 74 Abbildungen und 4 Schwarzdrucktafeln. Kart. 3.— M.

Die Einheimischen Stubenvögel,
ihre Naturgeschichte und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 6. Auflage des Dr. Karl Rußschen Handbuchs für Vogelliebhaber Band II.). Mit 22 Farbentafeln und 188 Textabbildungen. Geh. 14.—, geb. 17.— M.

Die gefiederten Sängerfürsten des europäisch. Festlandes,
ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Mathias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln und 16 Textabbildungen. Kart. 3.— M.

Die Hauptregeln der Sprosserpflege.
Scherzreime von Oskar M. Kisch. Mit 2 Abbildungen. 1.— M.

Der Dompfaff,
seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Zucht. Auf Grund 54jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8. bis 10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Kart. 1.— M.

Die deutschen Sumpf- und Strandvögel.
Von Dr. Kurt Floericke. Mit ca. 44 Abb. auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.

Die deutschen Schwimm- und Wasservögel.
Von Dr. Kurt Floericke. Mit ca. 45 Abb. auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.

Die mitteleuropäischen Vögel.
Von Dr. E. Bade. Band 1. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Tafeln in Photographiedruck uud 144 Textabbild. von Nestern, Eiern u. Vogelteilen. Geb. in Ganzleinen 5.— M.

Allerlei sprechendes gefiedertes Volk.
(Raben- und Krähenvögel, Starvögel usw.) Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Kart. 3.— M.

Gefiederte Hausfreunde I.
Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung üb. d. Pflege heimischer Stubenvögel. Kart. 1.— M.

Die Fänge der Raubvögel Mitteleuropas.
Von Prof. Dr. Karl R. Hennicke. Mit 33 lithogr. Tafeln. Kart. 5.— M.

Für Liebhaber fremdländischer Vögel

Die fremdländischen Stubenvögel,
ihre Naturgeschichte, Pflege u. Zucht. Von Karl Neunzig. (Zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Rußschen Handbuchs für Vogelliebhaber Band I.) Mit 42 Fabentafeln und 400 Textabb. Geh. 30.— M. geb. 35.— M.

Die fremdländischen Weichfutterfresser
(Insekten- oder Kerbtierfresser, auch Wurmvögel genannt, Frucht- oder Beerenfresser und Fleischfresser). Mit Anhang: Tauben- und Hühnervögel. Von Dr. Karl Ruß. (Die fremdländischen Stubenvögel Band II.) Mit 10 Farbentafeln. Geh. 30.— M.

Gefiederte Hausfreunde II.
Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbild. Kart. 1.— M.

Dr. Karl Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel,
ihre Naturgeschichte Pflege und Zucht. Band I—IV. Geh. 150 M., in Halbleder geb. 176.— M. Band I. Körnerfresser ist einzeln nicht käuflich. Band II. Weichfresser. Geh. 30.— M. Band III. Papageien. Geh. 30.— M. Bd. VI. Lehrbuch der Stubenvogelpflege.

Bilder aus der Vogelstube.
Schilderungen aus dem Leben fremdl. und einheimischer Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruß. Kart. 3.— M.

Für Papageien-Pfleger

Die Papageien,
ihre Naturgeschichte, Pflege, Züchtung u. Abrichtung. Von Dr. Karl Ruß. (Die fremdl. Stubenvögel Bd. III.) Mit 10 Farbentafeln. Geh. 30.— M.

Der Wellensittich,
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete und verwehrte Auflage. Mit 1 Farbendrucktafel und 31 Textabbildungen. Kart. 2.50 M.

Sprechende Papageien.
Ein Hand- u. Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farben- u. 32 Schwarzdrucktaf. Kart. 4.50 M.

Der Graupapagei,
seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. 2. von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit 1 buntfarbigen Aquarelldruck, 16 Textabbild. u. 1 Verbreitungskarte. Kart. 2.50 M.

Der Graupapagei
in der Freiheit und in der Gefangenschaft. Von Dr. Carl Hennicke. Mit 1 Buntbild. Geh. 1.50 M.

Die Amazonen-Papageien,
ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. 2. von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 buntfarbigen Aquarelldruck u. 21 Textabbildungen. Kart. 2.50 M.

Für Sammler

Der Präparator und Konservator.
Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugetieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Boegler. 4. verb. und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. 2.— M.

Der philosophische Bauer
oder Anleitung, die Natur durch Beobachtung und Versuche zu erforschen, von Johann Andreas Naumann. Neudruck nach der ersten Orig.-Ausgabe von 1791, besorgt u. herausgeg. von Paul Leverkühn. Geh. —.50 M.

Für Vogelschutz

Handbuch des Vogelschutzes.
Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Doppeltontaf., 1 Karte u. mehr als 200 Textabbild. Geh. 8, geb. 10 M.

Für Aquarienfreunde

Praxis der Aquarienkunde.
Aus der Praxis für die Praxis. Von Dr. E. Bade. 4. u. 5. Auflage. Mit 1 Farbentafel, 12 Schwarzdrucktafeln und 203 Textabbild. Kart. 5.— M.

Die ausländischen Aquarienfische,
Ihre Naturgeschichte, Pflege und Züchtung. Von Dr. E. Bade. Mit einer Farbentafel und vieleu Abbild. im Text. (Erscheint demnächst! Preis ca. 6.— M.)

Katechismus für Aquarienliebhaber.
Fragen und Antworten über die Einrichtung, Besetzung und Pflege des Süßwasser-Aquariums sowie über Krankheiten und Züchtung der Fische. Von Wilhelm Geyer. 8. und 9. von Hanns Geyer besorgte Aufl. Kart. 3.— M.

Zimmer- und Freiland-Agarienpflanzen.
Von Mönkemeyer. Mit 26 Abbildungen. Kart. 1.20 M.

Der Schleierschwanz und der Teleskopschleierschwanz,
ihre Zucht, Pflege und die Beurteilung ihres Wertes. Von Dr. E. Bade. Mit 5 Schwarzdrucktafeln u. 19 Textabbildungen. Geh. 2.— M.

Die künstliche Fischzucht.
Von Dr. E. Bade. Mit 2 Schwarzdrucktafeln u. 16 Textabbildungen. Geh. 1.— M.

Das Seewasser-Aquarium,
seine Einrichtung, seine Bewohner u. seine Pflege. Mit einem Anhange: Das Brackwasser-Aquarium. Von Dr. E. Bade. Mit 1 Farbentaf. 14 Schwarzdrucktaf. u. 104 Textabb. Kart. 5.— M. geb. 6.— M.

Zu beziehen durch

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Postscheckkonto: Magdeburg 3148 / Postschließfach 148

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 15. Januar 1925 | Heft 3

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Rotkehlchenlied.

Von Karl Finck, Neukölln.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Buchfinken halten große Wettbewerbe ab, überall orgeln Grasmücken, zittert die weiche Stimme des Fitis, jodelt der Mönch, dazwischen ruft hell der Kleiber. Hoch in der Luft zieht jauchzend ein Bussard seine Kreise. Unaufhörlich ruft der Kuckuck. Weithin schallt das melancholische herrliche Flöten einer Waldamsel. Aber im Mischwalde auf den hohen Eichenüberständern jubeln Singdrosseln, flötet einmal hier, manchmal dort der ruhelose Pirol.

Steil steigt die Lehne hoch, ausgedehnte Kulturen mit hohem Graswuchs und einzelne Fichtenhorste folgen. Nicht selten bildet die Himbeere undurchdringbare Dickungen. Wütend schimpft der Zaunkönig über die Störung, hebt keck das Schwänzchen hoch, schmettert übermütig sein Trutzliedchen und verschwindet vorsichtig zwischen dem Gekräute. Rotschwänzchen, Finken, Hänflinge, Meisen, Bachstelzen und Rotkehlchen füttern eifrig ihre Bruten.

Im Fichtenholze wetzt das herzige Tannenmeischen sein komisches Geleier, flüstern die winzigen Goldhähnchen, klagt einförmig der Weidenlaubvogel.

Mein Weg führt nun durch hochragende Fichten und Lärchenbestände, überreife, urwüchsige Stämme, teilweise mit langen Flechten bewachsen. Fröhliche Haubenmeisen turnen umher, an einem abgestorbenen Stamme hämmert unablässig der Schwarzspecht, fliegt zum nächsten Baum und streicht schließlich höhnisch schreiend davon.

Mehrere Blößen öffnen sich, vollständig mit der herrlichen alpinen Waldflora bedeckt. Weich locken Dompfaffen. Zwei Blaumeisen können nur mit Mühe das flügge quecksilberige Jungvolk zusammenhalten.

Immer lichter wird der Wald, viele Bäume sind sturmzerzaust, andere krank, abgestorben.

Der Steinschmätzer läuft behende über das rauhe Gerölle, woraus sich vielfach bemooste Blöcke erheben. Die steinigen Abhänge sind mit verzweigten Wacholderbüschen bedeckt, dann wieder wuchert in den erdgefüllten Ritzen Wolfsmilch, Fingerhut, Mauerpfeffer und Thymian. Über das duftende Krautwerk tanzen kleine blaue Schmetterlinge auf und ab. Auf einer halbhohen Lärche trägt unaufhörlich eine Misteldrossel ihre schwerfälligen Strophen vor.

Sattgrüne, blumenreiche Matten breiten sich sanft ansteigend aus, manchmal von Felsrunsen unterbrochen, die mit Alpenrosengestrüpp bewachsen sind. Verwundert blicken die vielen Blumengesichter in die grandiose Gebirgslandschaft, welche sich drüben, jenseits des Tales himmelhoch aufbaut. Nichts als blauende, bewaldete Berglehnen, von Gräben wild zerrissen, und dahinter schneebedeckte Riesen. Tief unten lange gestreckte Täler mit wenigen Bauerngehöften, Saatfeldern, Wiesen und hellgrünen Buchenhalden.

Ringsum herrscht feierlicher Friede, nur selten bringt der leichte Luftzug einzelne abgerissene Vogellaute.

Ganz unerwartet zu meiner Überraschung beginnt in dem spärlichen Lärchenanflug, wo vor wenigen Minuten mehrere Haselhühner absurrten, ein Rotkröpfchen laut zu flöten. Das fröhliche, manchmal wehe Lied wirkt in der Einsamkeit wie eine ergreifende Predigt.

Und doch — und doch singt das Rotbrüstchen im Gebirge nicht lauter, nicht voller als die Artgenossen in der Ebene und in den sandigen, armen Kiefernheiden.

Wunderschön sind die Sonnenauf- und untergänge in der weiten, weltfernen Heide.

Kalt ist die sternenklare Aprilnacht, und ich vermag mich auf der Kanzel trotz der dicken Bekleidung kaum warmzuhalten. Ein leises, ahnungsvolles Rauschen geht durch den Kiefernwald. Schon verstummt das teuflische Gelächter des Kauzes, im Moore lärmen Wasservögel, trompeten Kraniche, quarren abstreichende Entenzüge. Allmählich verblassen die Sterne. Gespensterhaft braut dicker, weißer Nebel, nicht lange aber, so schweben vom Winde zerrissen, einzelne Fetzen über die Ebene dahin.

Nun bricht im Osten ein rötlicher Schein hervor, der schnell auf die kleinen Lämmerwolken überspringt. Mehr und mehr hellt es sich auf. Blutrot glühen die Wasserlachen. Hasen hoppeln nach der Schonung. Weiter unten äsen Rehe dem Holze zu. Der anliegende Acker nimmt warme Töne an, und die Wiese vor dem Moore wird grün.

Das ausgedehnte, noch bereifte, von einzelnen sturmerprobten Altkiefern und phantastisch verkrümmten

Wacholderstauden bestandene Ödland flimmert in reiner Silberbronze, die am Horizont bläulich verdämmert oder in satte, dunkle Farben übergeht.

Der Waldrotschwanz beginnt sein einfaches Geklirre, jubelnd steigen Feldlerchen hoch, in den Vorhölzern und auf den verheideten Kahlschlägen lullen zahlreiche Heidelerchen. Vom Bruche her tönen die Lieder der Singdrosseln, worunter sich das melodische Flöten einiger Amseln mischt.

Nun singt auch das erste Rotkehlchen in den köstlich kühlen Morgen hinein, und in kurzer Zeit klingen von allen Seiten die gleichen Weisen. Buchfinken schlagen an, immer vielseitiger, ergreifender wird das Vogelkonzert.

Die Sonne geht auf. Goldene Lichtwellen überfluten die Welt. Schnell wird es wärmer. Gar bald umsummen unzählige Insekten die süß duftenden, blühenden Weiden. Stare schwirren herbei, bäumen auf, pfeifen und schwatzen ohne Unterlaß. Reisegeschichtchen erzählt sich das Völkchen, von den Rohrbrüchen der Donau, den sonnigen Gestaden des Mittelmeeres, wie es aber in der lieben norddeutschen Heimat mit den trauten Dörfern, harzigen Kiefernheiden, Seen und Brüchen noch viel, viel schöner ist.

Hungrig und ermüdet wandere ich heimwärts. Massig erheben sich die schlagreifen Bestände von dem flammenden Abendhimmel ab. Wie flüssiges Feuer wallt das Wasser des kleinen Heidetümpels, selbst die Stämme der Erlen, die noch voll Kätzchen hängen, schimmern gelbrot. Leise streiche ich durch die Stangenörter, dann den Gestellstreifen entlang. In der sandigen Schonung singen zahlreiche Rotbrüstchen, sitzen mit Vorliebe auf den Wipfeln der manneshohen Kiefern und verfolgen sich eifersüchtig. Die vielen Stimmen schmelzen zusammen und bilden ein süßes, wehes Lied voll zärtlicher Innigkeit. Wolken türmen sich auf, schwarz erscheint das Holz, braun und düster die Kultur. Kalt, eisig weht der Wind. Nicht weit von meinem Standplatz flötet noch ein Rotbrüstchen sein banges, banges Abendgebet.

Selbst in den Großstädten ist unser Rotkehlchen kein seltener Gast, wenn es auch vornehmlich nur größere Parkanlagen und Friedhöfe bevölkert.

Anfangs März (1924) starb ein lieber Bekannter und Freund, der Lehrer Schalow. Mehrere Wochen später besuchte ich mit dem fünfzehnjährigen Töchterchen die Grabstätte. Schnee und Regen fielen unaufhörlich herab. Unsagbar traurig war es im Freien. Dann aber siegte die Sonne und brachte Stimmung. Sofort lärmten Stare, eine Amsel begann zu studieren, schüchtern lockten Meisen und hoch oben sangen mehrere Lerchen ihre Auferstehungslieder. Aber im alten Quartier träumte auf einem bereits schief stehenden Kreuz ein Rotbrüstchen vom nahen Glück, es sang von Leid und Hoffnung, von einem ewigen duftdurchwehten Frühling, dessen Blumen nie verblühen.

O, wenn Du bist zum Tode wund,
Wenn Dich zu schwer die Leiden trafen,
Dann komm' in stiller Abendstund'
Dahin, wo Deine Lieben schlafen!

Die Sage spricht, in Blut getaucht
Hab' einst ein Vöglein seine Kehle,
Als ihren Odem ausgehaucht
Vereinsamt eine Menschenseele.

Rotbrüstchen singt im Fliederstrauch,
Wenn tief herab die Schatten schweben
Und bringt dem Schmerz die Lieder auch,
Der in Erinn'rung hat das Leben.

Der Tag versank — in goldenen Duft
Hüllt sich die Sonne, die geschieden. —
Komm'! Bet an Deiner Totengruft
Für ihre Ruh' und Deinen Frieden! —

Emil Ritterhaus.

Von allen Vogelliedern dringt im Vorfrühjahr, wenn Lenz und Winter um die Herrschaft streiten, der klare, wehe Gesang des Rotkehlchens am tiefsten ins menschliche Herz, erweckt neue Hoffnungen, macht froh und frei.

Die Rotbrüstchen verlassen uns verhältnismäßig spät. Bereits verlieren die vergilbten Birken in den schwarzgrünen Kiefernbeständen ihre Blätter, hier und da lohen gleich Feuerbrände einzelne Ahorne, und im Buchenwalde mischen sich zwischen dem dunklen Grün warme, kupferrote und gelbe Farben.

An den Gestellrändern streichen hastig Meisenschulen dahin, Kohl-, Blau- und fröhliche Sumpfmeisen gemischt, vielfach von einem Kleiber angeführt. Im Stangenholze, wo die roten, weißpunktierten Fliegenpilze prahlen, wispern Goldhähnchen, und geistern Schwanzmeisen.

Seidene Marienhaare schweben in der milden Luft. Die wunderbare Klarheit rückt den Horizont auseinander, leitet jeden Ton weithin.

Mittags, wenn die Sonne recht warm scheint, singen überall noch Rotkehlchen, selten laut, fast immer leise und schmerzvoll. Die meisten Wanderer gehen zugrunde, werden gefangen, verspeist, fallen Witterungseinflüssen und Raubvögeln zum Opfer. Nur wenige Exemplare kehren zurück, jubeln wieder im deutschen Walde und bauen ein Nestchen. Vielleicht sind deshalb die Abschiedslieder so unsagbar traurig — ich weiß es ja nicht.

Brausende Winde treiben schwere Regenwolken vor sich her. Eine schwarze, unheimliche Melancholie liegt über der Landschaft. Aus den brauenden Nebeln klingen die scharfen Rufe der wandernden Wasservögel, dann wieder ziehen krächzende Krähenschwärme vorüber. Vereinzelt hört man noch das kurze Locken eines Rotbärtchens.

Manche alte Männchen bleiben bei uns, so überwinterte einmal in unserer Gutsgärtnerei in Westpreußen ein Rotkehlchen, suchte eifrig die Vorräume der Gewächshäuser ab, nächtigte häufig im Warmhause, obwohl hier eine Temperatur von +12—15° herrschte, blieb dann wieder tagelang im Freien, oft bei — 18° R. Die Wärmeschwankungen schienen dem Tierchen, das regelmäßig die ausgelegten Mehlwürmer und Ameisenpuppen verzehrte, vollständig gleichgültig zu sein.

Möge das herzige Rotkehlchen noch viele Freunde gewinnen, nicht als schlecht gepflegter Gefangener, sondern als treu gepflegter Hausgenosse, dessen Lieder Waldespoesie hervorzaubert, und der dazu beiträgt, daß in dem Herzen der Kinder wahre Heimatsliebe aufblüht, und sich ein unstillbares Sehnen nach allem Reinen und Schönen entwickelt.

Ein kleines Rotbrüstchen gehört zu meinen schönsten Jugenderinnerungen.

Zu den Ausführungen des Herrn Krabbe über die Gattung Vidua.

Von A. Adlerſparre.

(Nachdruck verboten.)

Die intereſſanten Ausführungen des Herrn Krabbe über die Gattung Vidua (Geſ. Welt 1924, S. 323) bringen in meiner Erinnerung eine Sache, die vielleicht von allgemeinem Intereſſe ſein könnte. Der geehrte Verfaſſer ſchreibt: „Findet man beim Händler einmal Atlasfinken mit korallrotem Schnabel, ſo kann man gewärtig ſein, eine Glanzwitwe vor ſich zu haben". Aber es könnte wohl auch möglicherweiſe eintreffen, daß man in ſolchem Falle eine wahrſcheinlich noch ſeltenere Form von blauem Stahlfink vor ſich hatte. In Briefen vom 9. und 16. November 1920 erbat ſich der bekannte Herr Victor Wieſe, Dänemark (der „langjährige Vogelliebhaber" in Geſ. Welt), meine Anſicht betreffend einen Stahlfink von ultramarina-Typ, der aus Oſtafrika gekommen, ſeit vielen Jahren in ſeinem Beſitz geweſen, und der ſich von allen anderen Stahlfinken, die er früher geſehen, darin unterſchied, daß der Schnabel korallrot war — angeblich dieſelbe Nuance wie die des Zebrafinken. Da Wieſe ein erfahrener Vogelwirt war und ſelbſtverſtändlich bei den Umfärbungen die verlängerten Schwanzfedern hätte bemerken müſſen, hielt und halte ich eine Verwechſlung von ſeiner Seite mit Vidua hypocherina für ausgeſchloſſen. Beim Durchblättern der einſchlägigen Literatur fand ich auch unter Hypochera ultramarina im großen Werk Shelley's: The Birds of Africa, folgende intereſſante Mitteilung, die ich an W. weiterſchickte: „In Southern Abyssinia Lord Lovat shot a full plumaged male at Kassim River, Jan. 18, 1899, and according to his notes the bill and leggs*) were pale coral". Dieſes ſpricht ja einigermaßen dafür, daß es wirklich eine Hypochera ultramarina war, die in dem Beſitz Wieſes gekommen iſt. Zwar gibt Layard als rot auch den Schnabel der amauropteryx an, nach Stark aber haben alle ſüdafrikaniſchen Stahlfinken weiße Schnäbel. — Wie ſoll man ſich nun die Farbenabweichungen der Wieſeſchen und Lovatſchen Vögel deuten? Gehören rote Schnäbel zu den Entwicklungstendenzen der Stahlfinken? Oder handelt es ſich vielleicht, da ja beide Arten im ſüdlichen Abeſſinien heimiſch ſind, um Kreuzungsprodukte aus dem Freileben von Hypochera ultramarina × Vidua hypocherina mit dominant roten Schnäbeln und rezeſſiver Schwanzverlängerung? Ich laſſe dieſe Frage offen.

Leichter zu beantworten iſt die Frage des Herrn Krabbe (a. a. O.): „Wie kam der Vogel (vgl. Vidua hypocherina) in einer ſüdafrikaniſchen Sendung zuſammen mit Königswitwen, die in einer Kiſte von Lorenzo Marques kamen, wenn die Heimat Oſtafrika ſüdlich bis Ugogo iſt? Das Vorkommen der Glanzwitwe muß alſo weit ſüdlicher liegen als bisher feſtgeſtellt." — Daß Vögel von ſehr verſchiedenen Örtlichkeiten zuſammen exportiert werden können, beruht ganz einfach darauf, daß unter verſchiedenen Diſtrikten Afrikas Handelsaustauſch von Vögeln vorkommt, beſonders längs der Küſte und in den Hafenſtädten. Selbſt ich habe von Afrika ſogar indiſche und auſtraliſche Vögel erhalten.

Ferner ſchreibt Herr Krabbe unter Dominikanerwitwe (S. 324): „Laut Bericht in Heft 4 des ‚Journal für Ornithologie' hielt Herr Oskar Neumann anläßlich der Beſichtigung der Neueingänge im Zoologiſchen Garten zu Berlin einen Vortrag, in dem er u. a. ausführte, daß nach den neueren Forſchungen von Auguſtin Roberts und van Someren dieſer Vogel Brutparaſit iſt, alſo nach Art unſeres Kuckucks die Eier in anderer Vögel Neſter legt — — —. Es wundert mich (vgl. Herrn Krabbe) höchlichſt, daß ſich hierüber noch kein in Afrika anſäſſiger oder zeitweiſe wohnender Vogelkundiger ausgelaſſen hat; Ornithologen in Kapſtadt müßten ſich darüber doch wohl äußern können." — Hierzu iſt nur zu bemerken, daß alle beide der von Krabbe angeführten Herren, Roberts und van Someren, in Afrika anſäſſig geweſen ſein dürften, jedenfalls wohnt Dr. van Someren noch heute dort. Ferner ſind dieſe Fragen ſchon ſeit etwa anderthalb Jahrzehnten eben von ſüdafrikaniſchen Ornithologen wiederholt diskutiert, u. a. im Journal of the South African Ornithologists' Union, wo eben die Arbeit von Mr. Auſtin Roberts ſ. Zt. veröffentlicht wurde. Daß dieſe ſüdafrikaniſchen Beobachtungen über

Donaldſons Turako.

*) Auch die Füße der Wieſeſchen Vögel waren korallrot.

Brutparasiten vor annähernd drei Jahren auch in der Gefiederten Welt erwähnt wurden (Jahrg. 1922, S. 10, in einem Aufsatz über Widafinken von meiner Wenigkeit), scheint ebenfalls der Aufmerksamkeit des geehrten Verfassers entgangen zu sein, trotzdem seine anderen Literaturnachweisungen sich bis 1910 erstrecken.

Da die interessante Frage vom Brutparasiten der Widafinken nun wieder aktuell geworden, und da vermutlich nicht alle Leser ältere Jahrgänge der Zeitschrift besitzen, erlaube ich mir noch einmal rührigen Liebhabern zu empfehlen, Züchtungsversuche mit diesen Witwen in der Gefangenschaft anstellen zu wollen. Angegebene Brutparasiten sind „laut neuerer Forschungen über ihr Wildleben — — — nicht nur die Dominikanerwitwe Vidua serena (*L.*) [angegeb. Wirttiere: Wellenastrild, Estrilda astrild (*L.*)], sondern auch die in Gefangenschaft hier in Europa bzw. Australien angeblich schon nichtparasitisch gezüchteten Arten: Paradieswitwe, Steganura paradisea (*L.*) [angegeb. Wirttier: Graukopfsperling, Passer griseus (*Vieill.*)], Königswitwe Tetraenura regia (*L.*) [angegeb. Wirttier: Granatastrild, Uraeginthus granatinus (*L.*)], Hypochera-Arten [angegeb. Wirttier: Blauastrild, Uraeginthus angolensis (*L.*)] und vielleicht noch andere" (Adlersparre, Ges. Welt 1922, S. 10). Außer den Granatastrilden machen die angeführten Wirttiere bekanntlich in bezug auf Nisten keine unüberwindlichen Schwierigkeiten; ja es ist sogar nicht unwahrscheinlich, daß die Witwen im Notfall auch mit anderen, den genannten nahestehenden Arten vorlieb nehmen.

Stockholm, den 30. November 1924.

Vogelschutz.

Von A. Voigt, Jena.

(Nachdruck erbeten.)

Die Jenaische Zeitung schreibt in Nr. 289 vom 9. Dezember 1924: „Hat das Halten von Waldvögeln in Käfigen eine Berechtigung? Der Bund für Vogelschutz e.V. im Herzogtum Coburg schreibt: Die immer lauter werdenden Klagen über den Rückgang unserer nützlichen Vogelwelt und die dadurch entstehende Raupenplage sollten doch endlich sachlich denkende Vogelfreunde veranlassen, das Halten der Waldvögel zu verdammen, statt ihm das Wort zu reden. Was soll der Hinweis, daß eine seit Jahrhunderten im Volksleben wurzelnde Liebhaberei nicht auszurotten sei? Sie wird ausgerottet sein, wenn es keine Waldsänger mehr zu fangen gibt. Diese Liebhaberei mochte vor Jahren und Jahrzehnten hingehen, wo der Wald noch lebte, alle Fluren mit breiten, dichten Hecken durchzogen waren, wo unsere lieben Sänger, voran die Nachtigall, alljährlich Brutvögel bei uns waren, wo auch fast in jedem Kleingarten soviel Nistgelegenheit geboten war, daß Hänfling, Zeisig und Stieglitz alljährlich ihre Jungen aufziehen konnten: aber heute? Durch die fortschreitende Kultur, das unruhevolle Getriebe unserer Zeit — wo finden diese Tierchen noch den nötigen, natürlichen Schutz? Die klein gewordenen Sängerscharen ziehen sich mit Vorliebe nach dem Thüringer Wald, wo sie ihre Lebensbedingungen noch finden, um dann dort auf verwerflichste Weise gefangen zu werden und arbeitsscheuen Menschen die Taschen zu füllen zu Bier und Schnaps.

Welchen Zweck haben nun alle Bestrebungen der stattlichen Vogelschutzstationen und Vereine zur Erhaltung unserer nützlichen Vogelwelt? Sind es nicht zwecklose Opfer an Zeit und Geld, solange ein Gesetz nicht den Schutz unserer nützlichen Vögel während des ganzen Jahres verlangt, ja besser noch: ein Verbot für das Halten der Waldvögel in Bauern erläßt. Damit wäre doch das Übel an der Wurzel gefaßt; wenn keine Waldvögel mehr gehalten werden dürfen, fällt der grausame Fang und Massenmord von selbst weg. Es ist empörend, in heutiger Zeit noch Liebhabereien das Wort reden zu wollen, zumal, wenn solche auf Kosten der Allgemeinheit gehen, zum besonderen Schaden unserer Land- und Forstwirtschaft. Wenn durchaus ein Vogel im Bauer die Liebe zur Natur wecken soll, so sperrt doch Spatzen ein, deren es leider mehr als gut ist, gibt, nicht aber unsere so selten gewordenen kleinen Waldsänger. Das ist und bleibt eine Tierquälerei mit wenig Ausnahmen. Solange diese Mißstände in Deutschland herrschen, wird der Vogelschutz nie den Platz einnehmen, der ihm gebührt. Es ist zwingende Pflicht vorhanden, diesem schmachvollen Handel mit Waldvögeln ein Ende zu machen. Deutschland sollte nicht Amerika und England nachstehen, sich mit Italien gleichstellen. Jeder Mensch, der wahre Liebe zur Natur und ihren Geschöpfen hat, wird auf die Frage: Hat das Halten von Waldvögeln eine Berechtigung? mit einem entschiedenen Nein antworten."

Immer wieder kehren solche Artikel in den kleinen Provinzblättern. Und wenn man den vorstehenden aufmerksam durchliest, merkt man so recht, welch krasser Laie ihn verfaßt hat. Wahres und falsches wirft er bunt durcheinander. Ich selbst bin Gartenbesitzer seit Jahren und habe stets auf Nutzen und Schaden der Vögel im Garten geachtet. Ich war in jungen Jahren Forstbeamter und achtete auf Nutzen und Schaden in Wald und Feld, ich war und bin Naturfreund und achte als solcher noch heute auf jeden Vogel, den ich sehe oder höre. Aber wenn ich ehrlich Nutzen und Schaden abwägen soll, den Körnerfresser verursachen, so fällt mir das schwer, trotz meiner 50 Jahre! Ich füttere die Vögel im Winter, sorge für Nistgelegenheit der Höhlen- und Halbhöhlenbrüter, lasse Stachelbeerbüsche verwildern, tränke im Sommer, und das Recht, mir einen meiner Lieblinge von draußen ins Zimmer zu nehmen, um ihn hier mit aller Liebe zu umgeben, daß soll mir genommen werden? Diese Liebhaberei soll grausam sein, Tierquälerei? Das soll dem wirklichen Vogelschutz hinderlich sein? Nein, verehrter Bund für Vogelschutz, da haust Du gründlich daneben und wenn Du zehnmahl ein e. V. bist! Und nun mal zu Einzelheiten: „Wo in fast jedem Kleingarten so viel Nistgelegenheit geboten war, daß Hänfling, Zeisig (!) und Stieglitz ihre Bruten aufziehen konnten." — Da haben wir ja den Salat, der Verfasser hat wirklich keinen Dunst vom Leben der Vögel im Freien! Denn für Hänflinge findet sich noch heute in jedem Schrebergarten ein Stachelbeerbusch, Zeisige brüteten nie in Hausgärten, und in den Wäldern gibt es

noch heute für sie hinreichend Nistgelegenheit, und Stieglitze bauen in den Obstbäumen noch heute ihre Nester wie schon vor Jahrhunderten. Diesen allen schadet die fortschreitende Kultur am wenigsten. Aber dieser eine Satz beweist, was bezweckt ist: Gimpelfang! Leute, die selbst keine blasse Ahnung haben, wie und wo die allerhäufigsten Vogelarten nisten, werfen sich zum Richter auf über die Vogelhaltung in Käfigen!

In meinem Garten brüten fast alljährlich Hänflinge, Grünfinken, Rotschwänzchen und Meisen, die Amseln werden uns Gartenbesitzern oft zur Plage, Finken schlagen hier alle 30 Schritt voneinander entfernt. Nein, die Körnerfresser und Amseln nehmen entschieden nicht ab! Und gerade erstere erwähnt der Verfasser. Wäre er mal jetzt zur Winterszeit in einen Erlenbestand gegangen, wie wir ihn z. B. hier am Saaleufer haben, da könnte er hunderte von Zeisigen sehen, wenn er überhaupt imstande ist, draußen einen Zeisig zu erkennen! Nach obigem möchte ich es fast bezweifeln. Gegen das Wegfangen der Nachtigall in Gegenden, wo sie selten ist, ist jeder vernünftige Vogelliebhaber. Daß das Fangen von zweifelhaften Personen besorgt wird, dagegen wandte sich „unser" Birk sehr oft, daß aber nun alle Vogelfänger arbeitsscheue Subjekte sind, die den Erlös für die gefangenen Vögel in Bier und Schnaps anlegen, das zu behaupten, ist ein starkes Stück, das auch von großer Unkenntnis des Vogelfanges zeugt. Ich kenne fleißige, arbeitsame Wäldler, die trotzdem der Passion der Vogelfänger fröhnen. Ererbt haben sie diese Passion von ihren Ahnen, wie sich die Jagdpassion vererbt. Was daneben noch von Massenmord, Schaden für die Land- und Forstwirtschaft, usw. gesagt wird, ist von keiner Sachkenntnis getrübt. Es fehlt nur noch, daß die Raubvögel in Acht und Bann erklärt werden, ein richtig gehender „Vogelschutzverein" bringt auch mal das zu wege. Doch genug. Ich möchte nur den Reichsverband bitten, sich mal dieses Vereines anzunehmen. Wundern sollte es mich allerdings, wenn dieser darauf reagieren würden.

Prachttangare.

Atlantische Vögel.

Von Adalbert Athen, Hamburg.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Das azorische Goldhähnchen ist eine geographische Form unseres Wintergoldhähnchens, unterscheidet sich von ihm aber augenfällig durch seinen längeren Schnabel und durch seinen Gesang, den es so laut vortragen kann, wie etwa unser Zaunkönig; oft genug singt es aber auch leiser. Während das Liedchen unseres Wintergoldhähnchens, wegen seiner Hebungen und Senkungen an die Braunelle erinnert, singt das azorische nach der Art unseres Augenstreifgoldhähnchens. Im Schema würde also sein Gesang einer geraden, leicht ansteigenden Linie gleichen. Es besteht aus sieben oder acht gleichhohen Tönen, etwa im Zeitmaße des Goldammerliedes, mit denen das Vögelchen auf den unschönen, lange ausgekosteten Schlußton zueilt, der in der Klangfarbe an den Girlitz und an den Schlußton unseres Grauammerliedes erinnert. Als im Kiefernwalde einmal ein Singvogel mit seinem Schlage einsetzte, glaubte ich einen Buchfink zu hören; es kam aber nicht der Überschlag, sondern der Schlußton des Grauammerliedes. Ein Goldhähnchen hatte so kräftig gesungen, daß ich mich täuschen ließ. Das erste beobachtete ich schon im Stadtpark von Ponta Delgada, in einem riesigen Lorbeerbaum; später fand ich es überall auf der Insel, wo immer nur kleinere Gruppen von Strandkiefern standen. Die Portugiesen nennen es estrelinha, das heißt „kleiner Stern", ein sehr bezeichnender Name, wenn es sich, nach Meisenart, von unten an die Äste hängt und so den gelben Scheitel in dem dunklen Laub eines Lorbeerbaumes aufblitzen läßt.

Der Buchfink ist in den Stadtgärten und auf den Bergen einer der häufigsten Vögel; man kann ihn in Schwärmen beobachten. Wenn man ihn auch sofort als Buchfinken anspricht, so ist er von unserem Vogel doch recht verschieden. Die Spiegelzeichnung ist ganz anders, der Rücken viel dunkler und über den Nacken verläuft ein breites dunkles Band, das wie ein Sattel aussieht. Merkwürdigerweise ist bei den azorischen Buchfinken die Schnabelbildung nicht immer gleich; viele fallen durch einen klobigen Schnabel auf. Sein Schlag ist kräftig, aber nicht schön zu nennen; er klingt rauh und blechern. Das „pink" bringt er nicht; dafür verfügt er über ganz andere Lautäußerungen, die unserm Buchfink ganz fremd sind. So bringt er halblaut fünf ansteigende Töne unserer Tonleiter, wie man Ähnliches bisweilen am Schlusse des Liedes unseres Trauerfliegenfängers hören kann.

Ebenso gemein ist die azorische Schwarzdrossel, die von der unsrigen auch ziemlich beträchtlich abweicht. An dem fliegenden Vogel fallen sofort die kürzeren Flügel und der kürzere Schwanz auf. Die Erklärung, daß hier die Flugwerkzeuge kleiner geworden sind, weil es sich um einen Standvogel handelt, erscheint nicht begründet, denn andere Standvögel, wie das Schwarzplättchen, zeigen diese Erscheinung nicht. Die Weibchen sind dunkler. Im Gesang habe ich gegen unsere Amseln keinen Unterschied bemerken können, mit Ausnahme einiger, deren Gesang dann so sehr aus der Art fiel, daß ich sie gar nicht für Amseln angesprochen hätte. Einen auffallenden Unterschied zeigen sie aber gegen den bekannten Alarmruf unseres Vogels, der auf den Azoren Ähnlichkeit mit dem Frühlingsruf unseres Grünspechtes hat. Die Rufreihe sinkt aber nicht, wie bei diesem, sondern hält sich auf derselben Höhe und bricht mit einem harten Ton ab. Auch das „srih" klingt ganz anders. Einmal scheuchte ich ungewollt und aus nächster Nähe eine Schwarzdrossel auf; der Fluchtruf, den sie nun hören ließ, klang ganz überraschend, nämlich wie schnell gereihte Kuckucksrufe.

Auch der Star ist eine den Azoren eigentümliche Form. Wer ihn aber aus der Ferne beobachtet, kann keine Unterschiede feststellen. Der Schnabel soll etwas kürzer sein. Die Gefiederfärbung ist genau die gleiche. In seinen Lautäußerungen hörte ich aber manches, was mir fremd erschien. Die Wachtel ist von Hartert als eine besondere azorische Form beschrieben; sie ist kleiner und kurzflügeliger als unsere. Auf Sankt Michael überall häufig und Standvogel. Es hat mir immer Freude gemacht, ihren Schlag aus nächster Nähe zu vernehmen. Sie lebt aber so versteckt, daß es mir nie glückte, sie zu beobachten, abgesehen von den Fällen, wo ich sie unabsichtlich aufscheuchte. Die Ringeltaube ist satter und dunkler gefärbt als unser Vogel. Sie ist häufig und lebt auf den Strandkiefern, Juniperusbäumen und in den Baumheidegehölzen. Die Waldohreule nimmt Oberst Chaves als besondere azorische Form in Anspruch, obwohl Hartert schreibt, daß sich Unterschiede gegen unseren Vogel nicht nachweisen lassen. Die Heringsmöve scheint erst neuerdings von amerikanischen Ornithologen als eine nur den Azoren angehörige Form beschrieben worden zu sein.

Zu diesen azorischen Vögeln im engeren Sinne gehört nach Reichenow vielleicht noch der Bussard, obwohl Hartert schreibt, daß er von Floerickes „Inselbussard" der Kanarischen Inseln nicht zu unterscheiden sei. Der Inselbussard ist kleiner als unser Vogel. Auf den Azoren ist er der einzige Tagraubvogel und überall sehr häufig. Die Azoreaner behaupten, daß er dort dem Hühnerhof sehr schädlich würde. Er horstet an Felsen und auf Bäumen. Einen Horst fand ich sogar im Stadtpark von Ponta Delgada. Ich beobachtete, daß die Bussarde dort niedriger fliegen als bei uns, wodurch er noch auffälliger wird.

Die nun folgenden sind atlantische Vögel im weiteren Sinne, da sie auch auf anderen Inselgruppen als Brutvögel vorkommen. (Forts. folgt.)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

In dem Bericht über den südafrikanischen Import August Fockelmanns ist bereits mitgeteilt, daß neben der Rotschnabeldrossel — Turdus libonyanus *(A. Sm.)*, die schon in früheren Jahren einigemal in den Zoologischen Garten von Berlin gelangt war, auch einige Exemplare einer anderen südafrikanischen Drossel, der

Olivendrossel — Turdus olivaceus *L.*

eingeführt wurden. Auch diese Drossel — eine der gemeinsten Drosseln Südafrikas — war bereits in einigen Stücken nach Europa gebracht worden, aber immerhin so selten, daß sie in dieser Arbeit Aufnahme finden mußte. In ihrem Wesen unterscheidet sie sich kaum von anderen Drosseln. Leider fehlen über den Gesang Angaben. Ihre Verbreitung erstreckt sich über das Kapland im Osten nördlich bis Transvaal. Ihr Nest baut sie im dichten Gebüsch oder auf niederen Bäumen, nach Art der Singdrossel, kleidet aber die mit Erde oder Lehm geglättete Nestmulde stets mit feinem Gras aus, was auch ein gelungener Züchtungsversuch eines englischen Vogelwirts bestätigt. Ein Paar dieser Vögel baute gegen Ende April, das ist auch die Nistzeit der um Kapstadt lebenden Olivendrosseln, in einem Lorbeerbusch ein gutes, festes Nest in der oben angegebenen Art. Das Gelege, aus zwei grünlichblauen, rotbraungefleckten Eiern bestehend, wurde in 14 Tage erbrütet. Nach weiteren 5 Tagen öffneten die mit langem gelblichen Flaum bedeckten Jungen die Augen, und die Federn begannen durchzubrechen. 15—16 Tage alt, verließen die gut entwickelten und fast ganz befiederten Jungen das Nest. Neben einem Präparat wurde anfangs als Aufzuchtfutter Milchsemmel gereicht und später wurden von den Alten mit Vorliebe Regenwürmer gereicht, die sie nach Art der Singdrossel mit Erde präparierten. Das Jugendkleid der Olivendrossel ist dem der Singdrossel sehr ähnlich. Es ist oberseits braun, die Kehle ist weiß, Brust und Flanken sind hellbräunlichgelb und überall braun gefleckt.

Gefiederbeschreibung (Abb. S. 5): Oberseits grünolivbraun, Kehle weiß, schwarzbraun gestrichelt; Kropfgegend wie oberseits, heller und wärmer im Ton; Unterkörper lebhaft orangerostfarben; Unterschwanzdecken weiß, zuweilen olivgrau gesäumt; Flügel, Schwanz wie Oberseite; Schnabel horngelb, nach der Spitze dunkler; Auge braun; Füße gelblich horngrau; Lg. 240—250, Fl. 120—135, Schw. 95—105, Schn. 20—24, Lf. 33—35 mm. Die Geschlechter sind gleichgefärbt.

Pisangfresser — Musophagidae, unter denen die Turakos den meisten der Leser wohlbekannte Erscheinungen sind, leben ausschließlich in Afrika. Man kennt etwa 40 Arten, die in mehrere Gattungen aufgeteilt sind. Zwei bisher noch nicht eingeführte Arten Donaldsons Turako — Turacus donaldsoni *Sharpe* aus Somaliland und der graue Lärmvogel Chizaerhis concolor *(A. Sm.)* aus Südafrika befinden sich zurzeit im neuen Vogelhause des Berliner Zoologischen Gartens. Die letztgenannte Art ist auch von Aug. Fockelmann eingeführt. Die Pisangfresser sind Vögel von Elstergröße bis zu der eines Fasanes. Sie werden in die Nähe der Klettervögel gestellt,

weil die Außenzehe in beschränktem Maße nach hinten wendbar ist. Der an der Wurzel hohe Schnabel ist seitlich zusammengedrückt und die Schneiden sind sägeartig gezähnelt. Der hinten abgerundete zehnfederige Schwanz ist länger als die kurzen abgerundeten Flügel, deren Spitzen die Schwanzwurzel nur wenig überragen. Die Pisangfresser sind Baumvögel, die den Hochwald bewohnen, aber auch im freien Gelände der Steppenwälder und den Baumpflanzungen vorkommen. Sie streichen in kleinen Gesellschaften umher, wobei sie die Baumkronen bevorzugen. Ihre Stimme ist laut, und „man wird förmlich erschreckt durch Stimmlaute, die so überraschend klingen, daß ihre Beschreibung nur schwer zu geben ist". Zuweilen gleichen die Laute dem Lachen der Menschen, Katzenmiauen, Hundegebell oder dem Gackern von Hühnern. Ihr Flug ist leicht und schwebend. Die Nahrung besteht in Insekten, Beeren und Früchten. Sie bauen ihre Nester in den Bäumen. Die Eier sind weiß.

Das Gefieder der meisten Angehörigen der Familie ist sehr farbenprächtig und zum Teil stark metallisch glänzend. Am wenigsten anspruchsvoll in der Gefiederfärbung sind die der Gattung Lärmvogel — Chizaerhis *Wagl.* angehörenden Arten, von denen eine, der



Graue Lärmvogel — Chizaerhis concolor *(A. Sm.)*

auf S. 13 abgebildet ist. Der schlicht graugefärbte Vogel fällt vor allem durch die eine Haube bildenden, langen, zerschlissenen Federn des Oberkopfes auf und sein lautes durchdringendes Geschrei, das er unter Aufrichten des Schopfes und nickenden Schwanzbewegungen vom höchsten Baumwipfel her erschallen läßt, das die englischen Jäger mit „go — away" (geh fort) wiedergeben. Von den Buren wird er „det grote Mäusvogel" genannt, weil er, wie Anderson angibt, mit aufgerichteter Haube auf der Spitze eines Baumes sitzend, einem riesigen Mausvogel ähnlich sehe und diesem im Klettern, Fliegen und im ganzen Wesen gleiche. An seiner steten Unruhe und Unrast ist er stets zu erkennen; Haube, Flügel und Schwanz sind auch beim Stillsitzen in Bewegung, selbst wenn er, um den heißen Strahlen der Mittagsonne zu entgehen, im dichten Laube der Baumkronen ruht. Sein schwimmender Flug, der zur schnelleren Vorwärtsbewegung nur ab und zu durch ein paar kräftige Flügelschläge unterbrochen wird, wobei der lange Schwanz bald ausgebreitet, bald wieder geschlossen wird, ist kennzeichnend für ihn. Scheu, vorsichtig und außerordentlich unstet lebt er in den dichtesten Partien der Baumkronen, der dicht bewaldeten beeren- und früchtetragenden Schluchten und Täler. Gewöhnlich lebt er in kleineren Gesellschaften. Im Blätterwerke ruhend, liegt die Haube dicht auf dem Hinterkopf. Aufgescheucht laufen sie den Ästen entlang bis zu den Spitzen, um Umschau zu halten, dabei laut rufend. Um sich in Sicherheit zu bringen, laufen sie von Ast zu Ast, fliegen von einer Baumkrone zur anderen, bis sie nach gehaltener Umschau in Sicherheit zu sein glauben.

Ihre Nahrung besteht in Insekten, Beeren und kleinen Vögeln, die sie mit den Federn verschlingen. Er verzehrt auch die Steinfrüchte von Schmarotzerpflanzen, die er mit dem Kern verschluckt; auch den jungen Schoten soll er nachgehen.

Das aus Reisern gebaute Nest soll nicht hoch auf Zweigen eines Baumes errichtet werden. Es enthält 3 (?) Eier mit bläulichweißer Schale. Nach „Alexander" soll dieser Lärmvogel in Baumhöhlen nisten, was wenig wahrscheinlich ist, da andere Pisangfresser, soweit bekannt, in offenen Nestern brüten.

Gefiederbeschreibung: Gefieder grau; Kropfgegend zuweilen grünlichverwaschen; Handschwingen und die großen Deckfedern bräunlich mit mattem Glanz; Ende der Schwanzfedern schwärzlichbraun; Schnabel, Füße schwarz; Auge hell- bis graubraun; Lg. 450—460, Fl. 210—220, Schw. 250—270 mm. (Fortsetzung folgt.)

Buntastrild (s. S. 16).

Individuelle Fütterung.

Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Diese Methode halte ich nach meinen Erfahrungen nicht etwa für die allein richtige und vorteilhafteste, denn es gibt auch andere gute Methoden, aber wenn ich meinem Prinzip, einer „individuellen Fütterung" als eine in der Praxis gut bewährte Methode treu bleiben will, muß ich mein Weichfuttergemisch selbst zusammenstellen. Hervorgehoben muß werden, daß es ebenfalls nicht viel mehr Zeit beansprucht als die Verwendung der bequemen Universalfutter. Diesen kann ich nur das Wort reden, wenn die Mischung einwandfrei ist. Vor allem muß der Liebhaber stets die in einem empfehlenswerten Universalfutter enthaltenen Futterstoffe feststellen können. Kann er dieses nicht, so hege man Mißtrauen betreffs der einwandfreien und brauchbaren Bestandteile desselben; es gibt wirklich Universalfutter, das man keinem Vogel anbieten kann. Je feiner pulverisiert ein solches ist, umso schwerer sind seine Bestandteile festzustellen. Leicht verdaulicher, daher bekömmlicher für den Verdauungsapparat des Vogels ist ein Weichfuttergemisch,

dessen Bestandteile sich in pulverisiertem Zustande befinden, es wird dadurch auch dem Vogel die Wahl der einzelnen Bestandteile genommen. Ob es nun richtig ist, was der Pfleger oder Futterhändler nach Gutdünken zusammengemischt hat, nun dahinter ist vielfach ein großes Fragezeichen zu stellen. Richtig ist, wie ja jedem Liebhaber bekannt sein dürfte, daß der Vogel mit Vorliebe erst die Futterbestandteile in grobkörnigem Zustande heraussucht, dies liegt ja auch in seiner natürlichen Veranlagung infolge seiner Insektennahrung, die sich meistens in größerer, fester Form befindet. Bedeutet auch das Weichfutter in mehr pulverisierten Substanzen eine bessere Ausnützung seiner Nährwerte für den nicht mehr in natürlicher Gründlichkeit arbeitenden Magen des Stubenvogels, weil es leichter löslich und verdaulich ist, so ist auch wiederum nicht abzuleugnen, daß man aus praktischen Gründen und speziell zwecks einer besseren individuellen Fütterung die grobkörnige Form der Futter-

Alario (s. S. 17).

bestandteile meistens vorzieht. Das Nahrungsbedürfnis eines Vogels nach Art und Individuum festzulegen und danach zu füttern, ergab ebenfalls noch Fehler, die uns bei der Vogelpflege unterlaufen würden. Ebenso wie das Benehmen des Vogels im Käfig vom ersten Tage an ein individuelles ist, ebenso wie sich ein tatsächlich vorhandenes, selbstverständlich nicht nach menschlichen Begriffen und Seelenleben zu beurteilendes Seelenleben auch beim Vogel für den, der hierfür Verständnis und Beobachtungssinn hat, individuell äußert, so ist auch das Nahrungsbedürfnis infolge eines schwankenden Verbrauches im Vogelorganismus ein individuelles und demzufolge muß auch die Zufuhr in seinen Abweichungen individueller Natur sein. Derjenige Verdauungsapparat, der infolge einer kräftigen gesunden Beschaffenheit auf eine intensive Verarbeitung und demzufolge auch auf eine intensive Ausnützung der durch die Nahrung zugeführten Aufbaustoffe der Zellen eingestellt ist, wird dem Körper stets vollwertigen Ersatz, ja sogar einen überschüssigen Bestand der durch die Kraft erfordernde Arbeit des Körpers verbrauchter Energie zuführen. Ganz logisch ist nun durch eine anstrengende Tätigkeit des Vogelkörpers, wie viel Bewegung durch Freiflug in einem größeren Raum, der Verbrauch der aufgespeicherten Energien eine viel intensivere als beim Vogel im Einzelkäfig, so muß auch die Nahrungszufuhr dementsprechend eingestellt werden. Nehmen wir von allem, nachdem wir bei der Käfigung der Vögel den Maßstab vorlegen, die Natur zum Beispiel, so ergibt sich, daß beim freilebenden Vogel derjenige Vorgang, den wir beim Käfigvogel als individuelle Fütterungsmethode bezeichnen wollen, in wohlweislicher Fürsorge der Natur im Existenzkampf ihrer Geschöpfe sich gewissermaßen automatisch verschiebt und wieder regelt. Betrachten wir einmal das Tageswerk irgend eines Vogels im Kreislauf des Jahres. Neben den sonstigen Beschäftigungen, wie Gesang, Brutgeschäft usw. besteht die Tatsache, daß im Leben der Vögel die meiste Zeit zur Nahrungssuche verwendet wird. Würde er zum Beispiel im Winter zur Zeit der spärlichen Nahrungsfunde noch mit anderen Beschäftigungen, wie Gesang und Brutgeschäft, belastet sein, so würden Eltern und Nachkommen elend zugrunde gehen müssen. Dieses läßt sich also nur bewerkstelligen, wenn die Natur den Tisch mit Überfluß von Nahrungsmitteln gedeckt hat. Den besten Beweis haben wir ja im Winterbrutgeschäft der Kreuzschnäbel. Das viele Kräfte erfordernde und verbrauchende Brutgeschäft kann nur durch einen reichlichen und bequemen Nahrungsfund erfolgreich beendet werden. Über gar manche Katastrophe im Brutgeschäft der Vögel könnte der Feldornithologe berichten, wenn mitten im Brutgeschäft eine langandauernde kühle, nasse Witterung eintritt. Der Überfluß an Nahrung ist verschwunden und sofort zeigt sich, daß den Anforderungen des Organismus nicht mehr Genüge geleistet werden kann. Gleichzeitig zeigt uns auch der harte Kampf der bei uns überwinternden Vogelarten, falls nicht ein katastrophaler Wettersturz alle Nahrungsquellen plötzlich und auf kürzere Zeit verstopft, daß der trotz Kälte und vieler Bewegung bei der Nahrungssuche so wie so schon geschwächte Körper des Vogels bei geringer Futteraufnahme in seinem Organismus lebensfähig bleibt. Die Natur schützt in wohlweislicher Vorsehung ihre Geschöpfe durch den harten Kampf um die Existenz vor einer Verweichlichung und bewahrt sie dadurch vor einer Degeneration, sowohl die Art als auch das Individuum. Als Hauptfaktor der stets in neuer Kraft und Natürlichkeit erstehenden Generationen muß die freie Zuchtwahl zu erwähnen nicht vergessen werden, ebenso auch nicht die freie Wahl des am meisten begehrten und zusagenden Naturfutters. Und wie steht es im Vergleich zu dem den Unbilden der Witterung und ständigen Suchen nach Nahrung ausgesetzten Wildvogel mit unseren Käfigvögeln. Darüber sind wir

uns wohl klar, daß der Fischfang, je mehr sein Käfigleben fortschreitet, desto mehr seine Natürlichkeit verliert, nicht etwa äußerlich, sondern im Organismus; der weitere Aufbau und Erhalt desselben wird durch die Aufnahme eines natürlichen Ersatzfutters ungünstig beeinflußt und führt ihn nach und nach einer Verweichlichung, oder offen gesagt, einer Degeneration entgegen, die dem Vogel nicht etwa seine Lebensdauer verkürzt, wohl aber, wenn wir mit unseren gekäfigten Vögeln durch Generationen fort weiter züchten könnten, nach und nach immer mehr vom Natürlichen abweichende, empfindliche, offen gesagt Kunstprodukte zutage fördern würden, die wir mit ihren Stammeltern wohl kaum noch vergleichen könnten, so entartet, so degeneriert wären diese Nachkommen. Den besten Beweis liefert ja der Kanarienvogel, diese Treibhauspflanze in Gestalt eines Vogels, und wäre es den Exotenzüchtern nicht mehr möglich, durch importiertes Zuchtmaterial für Blutauffrischung zu sorgen, so träten nach vielen Generationen dieselben Erscheinungen zutage. Die fehlende natürliche Nahrung, die fehlende frische sauerstoffreiche Luft, der fehlende Regen und Sonnenschein, also eine unnatürliche Nahrung und ein eben solcher Aufenthaltsort sind es, was unsere Stubenvögel zu Sorgenkindern ihrer Pfleger macht. Dem zu begegnen mit den schwachen Mitteln, die uns die Stubenvogelhaltung in die Hand gibt, soll die Hauptaufgabe des Liebhabers sein. In erster Linie ist es eine Fütterung, die den Ansprüchen der Art und denen des Individuums in weitgehendstem Maße gerecht wird, worauf der Vogelpfleger sein Hauptaugenmerk legen muß. Richtlinien lassen sich wohl anführen, die eventuell ihre Anwendung finden können bei der Art, die sich aber niemals festlegen lassen auch für das Individuum. Da muß nun die scharfe Beobachtung des Pflegers das richtige Maß in quantitativer, wie qualitativer Hinsicht zu finden suchen. Und wer seine gefiederten Lieblinge mit den Augen eines um ihr Wohl besorgten Freundes betrachtet, wer seine Lieblinge mit verständnisvoller Liebe betreut, wird gar bald in ihren Lebensäußerungen, ihrem Wohlbefinden erkennen, daß die durch eine individuelle Fütterung zustande gekommene normale Körperbeschaffenheit die Ursache ihre Widerstandskraft, ihrer Beweglichkeit und ihres Gesanges ist. (Forts. folgt.)

Junger Turmfalk.

Mein „Seppel".

Von J. Stöß, Mitglied d. F. V. V. d. V. D. „Ornis".

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Leider nimmt der Turmfalke als Raubvogel auch in der Gefangenschaft nur rohes Fleisch an, was ja aus verschiedenen Gründen nicht jedermann Geschmack an seiner Käfigung finden läßt. Doch bei meinem reichen Tierbestande hat er bis jetzt noch keinen Mangel gelitten, so daß er sich so angefressen hat, daß er recht gut einen feisten Kirmesbraten abgeben könnte, wovor ihm aber nicht Angst zu werden braucht. An einer großen verendeten Henne (schwarze Wyandotte) fraß er bereits in zwei Fällen je 14 Tage lang, das Madenheer, das in der letzten Zeit darauf herummarschierte, nicht achtend. Er ist also auch unbeschadet seiner Gesundheit Aasfresser. Gern hat es mein Turmfalke, wenn ich größere Beutetiere aufschlitze. Dann beginnt er bei dem Gedärm und sonstigem Eingeweide zu fressen. Ein vorgeworfenes totes, unverletztes, etwa sechswöchiges Kaninchen schnitt er an den Löffeln an und arbeitete sich, diese in großen Stücken zuerst verzehrend, nach dem leckeren Gehirne vor. Übrig blieben von dem zarten Braten nichts als die Hinterläufe. Auch bei den zur Kartoffelernte leicht erhältlichen und darum in dieser Zeit öfter gereichten Feldmäusen jeden Alters fing er beim Kopfe an zu fressen und verzehrte sie so mit Stumpf und Stiel. Rohes Rindfleisch, das die städtische Freibank ab und zu liefert, zieht er aber den Mäusen vor. Einem toten Maulwurfe schien er überhaupt keinen Geschmack abgewinnen zu können, sondern ließ ihn unbeachtet liegen. Auch die Annahme von Heuschrecken und Ligusterraupen verweigerte er sonderbarerweise, während er sich doch im Freien nach der Aussage glaubwürdiger Beobachter neben Mäusen hauptsächlich von größeren Insekten nähren soll und in seiner südlichen Winterherberge sich dadurch verdient machen soll, daß er die ungeheuren Schwärme der gefräßigen Wanderheuschrecken lichtet. Ist mein Turmfalke gesättigt und hat er Überfluß an Nahrung, so schleppt er diesen in der rechten Klaue, hinkend, in eine Ecke des Bodens der Freivoliere und drückte ihn mit dem Schnabel fest hinein. Er hat also auch das Hamstern gelernt, was eigentlich auf ein höheres Alter schließen ließe, als von mir eingangs angenommen wurde. Spielend trägt er auch manchmal in der Klaue unter allerlei komischen Sprüngen auf dem Boden Holzstückchen und Erdklumpen herum oder scharrt und paddelt hier mit gelüfteten Flügeln nach Art der Hühner.

Anfangs hatte ich meinen Turmfalken auf meinem Hühnerhofe, der auch von Küken, schwerfälligen Trommeltauben und Jungenten bevölkert wurde, auf einem Pflaumenbaume so angekettet, daß er zu dem gemeinsamen Wassertroge gelangen konnte. Er nahm von seiner Umgebung kaum Notiz, von Angriffen auf das nicht allzuschwer zu erreichende Geflügel gar nicht zu reden. Aber diese gefesselte Art des Haltens eines Raubvogels schien mir bald zu unnatürlich, ja grausam. So sann ich hin und her auf eine menschlichere Gefangenschaft und rang mich schon nach wenigen Tagen zu dem Entschluß durch, es zu wagen, und den Turmfalken mit in die große Gartenvoliere unterzubringen. Ermutigt zu diesem Schritte hat mich der Altmeister unserer edlen Liebhaberei, Dr. K. Th. Liebe, mit seinem mit einem

Turmfalken unbehelligt in einem Käfig zusammengehaltenen Gimpelweibchen. Ich löste also die Kette und ließ den doch als so harmlos geschilderten Turmfalken, aber vorsichtshalber noch mit dem Fußring bekleidet, in die etwa 25 cm fassende Gartenvoliere einfliegen. Dieselbe hat einen kleineren gedeckten Innenraum. Die Außenvoliere ist ziemlich dicht mit Hirschholunder u. a. bewachsen. Hier fliegen zurzeit nur noch 1,0 Schwarzdrossel, 1,0 Feldlerche, 3,0 Buchfinken, 1,0 Grünfink, 1,1 Birkenzeisige und einige Haussperlinge, deren Zahl beständig wechselt, da von Zeit zu Zeit solche durch das lecke Gitterdach freiwillig in die Voliere einmarschieren, aber den Rückweg in die leichtsinnigerweise aufgegebene Freiheit nicht wiederfinden. In diese seiner Zeit meist stark in der Mauser liegende Gesellschaft kam also mein aller Fesseln lediger Turmfalke. Die Mitinsassen wichen dem Riesen natürlich anfangs scheu aus, was bei der Zweiteiligkeit und bei der üppigen Bepflanzung des Käfigs keine Schwierigkeiten machte. Der Turmfalke nickte zwar eifrig mit dem Kopfe, wie er es immer tut, wenn etwas Ungewohntes seine Aufmerksamkeit erregt, zeigte sich aber sonst nicht feindselig. Erst am dritten Tage ihres Zusammenseins konnte ich beobachten, wie der Turmfalke von Zeit zu Zeit mit großen Sätzen die Feldlerche verfolgte, die sich aber immer durch Auffliegen noch rechzeitig rettete. Da mir die Gefahr des Erwischtwerdens für die Lerche für die Dauer doch zu groß erschien, nahm ich sie heraus und brachte sie in meiner Vogelstube im Einzelkäfig unter. Seitdem herrscht im großen und ganzen Ruhe und Frieden in der Voliere. Wohl fährt der Turmfalke noch einmal hüpfend unter die schmausende Gesellschaft, wenn er sich gerade zufällig in allzu verführerischer Nähe des Futterhäuschens befindet. Doch ein ernstliches Verfolgen der Kleinvögel habe ich in diesem doch monatelangem Zusammenhalten nicht wieder beobachten können. (Schluß folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Braunkehliger Wiesenschmätzer am 13. Dezember 1924 erbeutet. Herrn Oberlehrer A. Günther in Lommatzsch wurde ein am 13. Dezember 1924 erbeutetes Braunkehlchen überbracht. Ein so spätes Vorkommen dieses Vogels, der gewöhnlich im August, spätestens bis Mitte September fortzieht, ist bisher kaum bekannt. Vom schwarzkehligen Wiesenschmätzer ist es bekannt, daß einzelne im Brutgebiet zuweilen überwintern.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 3. Im Frühjahr beabsichtige ich eine Stieglitz-Kanarienzucht einzurichten und möchte aus Liebhaberkreisen gern einmal hören, wie man am praktischsten hierbei verfährt. 1. Welcher Stieglitzhahn eignet sich am besten, muß es ein einjähriges oder kann es auch ein älteres Exemplar sein? 2. Kann derselbe mit dem Kanarienweibchen zusammen gehalten werden oder nicht. 3. Welche Fütterung ist die geeignete und welche Zeit ist zum Einwerfen die beste?
H. Eberhardt, Nordhausen.

Auf Frage 1. Ich hatte vor zwei Jahren eine Singdrossel; dieselbe erhielt während ¼ Jahr ihr Weichfutter stets in einem Zinkfreßnapf. Der Vogel gedieh sehr gut, sang fast den ganzen Tag und war aalglatt im Gefieder. Gg. Becker.

Vom Vogelmarkt.

Johannes Clauß, Grimma i. Sa. Stieglitz×Kanarie 1,0 Oryxweber, 1,0 Flammenweber.

Jos. Fiesel, Karlsruhe (Baden), Klauprechtstraße 47. Wander-Drossel.

H. v. d. Höh, Köln a. Rh., Ulrichgasse 19. Steinkauz.

Friedrich Lange, Wiesau (Kreis Glogau), Telefon 29. 3,0 Napoleonsweber, 1,0 Textorweber, 1,0 Feuerflügelsittich.

Gustav Müller, Vogel-Großhandlung, Hamburg 31, Langenfelderdamm 27. Rote Kardinäle, Dominik Kardinäle, Blaustirn-Sittiche, Papstfinken, schwefelgelbe Tyrannen, Feldspötter, Mexikan. Grünheher.

Bernd Regge, Lötzen, Ostpr. 1,1 Weißkehlpfäffchen, jap. Mövchen, weiße, dito 2,0 Rotkopfamand.

Gustav Reiß, Zoologische Großhandlung, Berlin C 25, Gontardstraße 4, Gegründet 1877. Goldbrüstchen, Helenafasänchen, Amaranten, Rotkopf-Amandinen, Papstfinken, Mönch-, Kaktus-, Tovi-, Yerdaya-Sittiche, Dreifarb-Glanzstare.

M. Sachs, Plauen i. V., Mozartstr. 27 II. A. Z.-Mtgl. 398. Schneeweißer Hänfling m. dunkl. Flügel- u. Schwanzspitze.

A. Schäfer, Karlsruhe (Baden), Gartenstr. 57. 1,0 Blaukehlchen.

Rich. Schwarzkopf, Ingelfingen (Wttbg.), A.Z.-Mtgl. 216. 20 grüne Jungen verschiedener Schattierungen mit Fußringen und Abstammungsnachweis.

Max Wischendorff, Lübeck. 3,0 Isabellkanarien je 3,0 Hänfling und Stieglitzbastarde.

A. G. v. Zitzewitz, Berlin W 50, Kurfürstendamm 243, A. Z.-Mtgl. 308. 1,1 Stieglitz-Kanarien.



Herrn Dr. L., Brüssel; Herrn Dr. W., Salzbrunn; Herrn R. T., Altona; Herrn M. S., Wurzen; Herrn G. B., Nassau; Herrn N. G., Wien; Herrn K. R., Bremen; Herrn Sch., Fechenheim; Herrn A. A., Stockholm; Herrn M. K., Lüdenscheid: Beträge dankend erhalten.

Herrn W. G. D., Kötzting. Der Kadaver des Papstfinken kam hier, da er nicht in einer festen Schachtel verpackt war, völlig zerquetscht an, so daß eine Untersuchung unmöglich war. Zu empfehlen ist aber, dem P. neben den Sämereien stets ein Ameisenpuppengemisch, Obst, besonders Äpfel und Grünkraut zu reichen.

Herrn H. H. Essen. Vermutlich ist der Sonnenvogel bei dem gereichten stark fetthaltigen Futter, auch Mohnsamen ist sehr fetthaltig, zu fett geworden und infolgedessen im Spätsommer nicht in die Mauser gekommen. Andernfalls müßte er doch im Spätsommer neues glattes Gefieder bekommen haben. Statt Mohn wird besser weiße Hirse gereicht und dazu täglich reichlich Obst (süße Äpfel). Es wäre auch gut, einmal mit dem Hauptfutter zu wechseln und ein Futtergemisch zu reichen, welches mit geriebener Möhre zurechtgemacht ist. — Mit dem Stieglitz verhält es sich wahrscheinlich ähnlich. Auch er bekommt eine zu fettreiche Kost. Negersamen bleibt am besten für einige Zeit fort. Statt dessen kann Spitzsaat und Distelsamen gereicht werden, daneben auch reichlich Grünkraut (Vogelmiere) und Zweige mit Blattknospen von Weiden-, Birken-, Hasel-, und Obstbäumen. Die Mauser bei roten Kardinälen dauert 4—6 Wochen. Wodurch die helle Färbung veranlaßt ist, kann ich nicht ergründen. Die Schwarzfärbung tritt gewöhnlich ein, wenn sehr viel fettreiches Futter gereicht und die Vögel in dunklen Räumen gehalten werden.

Herrn G. H., Braunschweig, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Berichtigung.

Auf S. 17, linke Spalte, Z. 10 von unten, muß es heißen: „des Haubenperlhuhnes — Guttera cristata edouardi *(Hartl.)*.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

ahrgang 54 15. Januar 1925 Heft 3



DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Rotkehlchenlied. Von Karl Finck, Neukölln. (Schluß).
Zu den Ausführungen des Herrn Krabbe über die Gattung Vidua. Von A. Adlerſparre.
Vogelſchutz. Von A. Voigt, Jena.
Atlantiſche Vögel. Von Adalbert Athen, Hamburg. (Fortſ.).
Neueinführuugen und Seltenheiten. Von K. Neunzig. (Fortſ.).
Individuelle Fütterung. Von J. Birk, Leipzig. (Fortſ.).
Mein „Seppel". Von J. Stöß, Mtgl. d. F. B. V. d. V. D. „Ornis". (Fortſ.).
Kleine Mitteilungen - Sprechſaal - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkaſten - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächſte Poſtamt bzw. der zuſtändige Briefbote. / Poſtverſand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'ſche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Poſtſchließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen. Alle Vereine und Liebhaber, die unserem Verbande bereits angeschlossen sind, bitten wir an dieser Stelle nochmals, die restlichen Mitgliedsbeiträge unserem Kassierer Herrn Erich Merz, Berlin-Friedenau, Wilhelm-Hanff-Str. 14II, umgehend einzusenden. Vereine und Liebhaber, tretet unserem Verbande bei und unterstützt unsere gute Sache. J. A.: Erich Merz.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden. J.A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Angemeldet ist Herr Heinz Appel, Fabrikbesitzer, Hannover, Nienburger-Str. 7 A/I. Aufgenommen seit Beginn des neuen Vereinsjahres, dem 1. Dezember 1924, sind die Mitglieder Nr. 68 n I. Naier, Bukarest (Rumänien) Str. Biserica Ebei Nr. 9; Nr. 69 n Anton Kirch, Vilsen Bez. Bremen; Nr. 81 n Dr. Knoepfel, Rechtsanwalt, Darmstadt, Heinrichstr. 120.

Das neue Jahrbuch mit Farbentafel und doppeltem Umfang wird Ende des Monats vorerst an diejenigen Mitglieder zur Ausgabe gelangen, die den Beitrag bezahlt resp. die Bestandsliste zurückgesandt haben. Beitragserlasse rechnen als Zahlungen. Inhaltsangabe wird an dieser Stelle bekannt gegeben. Ich bitte also die mit Beiträgen rückständigen Mitglieder um baldgefl. Einsendung des Beitrages von Mk. 3,30. Durch den vergrößerten Umfang des Jahrbuches werden große Anforderungen an die Kasse gestellt, die allen Verpflichtungen prompt nachzukommen bemüht sein muß. A. Krabbe.

Aus den Vereinen.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen. J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.

Generalversammlung. Am Donnerstag, den 15. Januar, abends 8 Uhr im Vereinslokal „Zum Alexandriner" Alexandrinenstr. 37a.

Gäste haben zu dieser Sitzung keinen Zutritt.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurter Str. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. V.: Emil Ivo, Schriftführer.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein Vogelschutz u. -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstr. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Bernhard Kühn, Vors.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 20. Januar 1925. Gäste, auch Exotenliebhaber stets willkommen. J. A.: Arnold Weber, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden, Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. —

A. Voigt, Schriftführer.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler".

Bang, 1. Vorstand, Boppel, 1. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. d. M., abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen.

J. A.: Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 22. Jan. 1925. Gäste stets willkommen.

Der Vorstand. J. A.: J. Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.
K. Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

„Ornis", Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands. Gegründet 1912. Auf vielseitigen Wunsch der alten Mitglieder wollen sich die Waldvogelliebhaber wieder in der „Ornis" zusammenschließen. Als amtliches Organ ist die „Gef. Welt" ausersehen worden, und werden die Artikel, die früher in den „Ornis-Blättern" erschienen, in obiger Zeitschrift gebracht werden. Aus diesem Grunde bittet die Geschäftsführung um eifrige Mitarbeit, damit unserer Waldvogelpflege wieder der Platz eingeräumt wird, der ihr gebührt. Anmeldungen sind unter Beifügung von 2 M. an den Geschäftsführer zu richten; Mitglieder erhalten auf Mischfutterbestellungen 5% Rabatt. Mit treudeutschem Gruß Martin Sperling, Halle/S., Südstr. 49.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am zweiten Mittwoch eines jeden Monats Versammlung im Alten Fritz, Berliner Straße. Beginn 8 Uhr. Gäste sind willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Magdeburg-West, Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlung aller 14 Tage, Samstag abend 8 Uhr, im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken", S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. Daubmann, 2. Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Vereinslokal jeden zweiten Mittwoch im Monat. Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Bayrischer Vogelliebhaberverein, Sitz München (E.V.). Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft im Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Rud. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegründet 1. Mai 1923. Vereinsabende aller vier Wochen, in der ersten Woche des Monats verbunden mit Vortrag, in der dritten Woche jeden Monats nur gesellige Zusammenkunft. Vereinslokal „Sächsischer Hof". Gäste stets willkommen. Studienrat Professor Jahn 1. Vorsitzender; Werkmeister Mann 2. Vorsitzender; kaufm. Angestellter Reinhardt Schriftführer.

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Zwickau i. S., Bosenstr. 44.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 22. Januar 1925 | Heft 4

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Über die künstliche Aufzucht junger Papageien.

Von Friedrich v. Lucanus, Berlin.

(Nachdruck verboten.)

Seit einer Reihe von Jahren beschäftige ich mich für tierpsychologische Studien mit der Aufzucht von Papageien, besonders kleiner Sittiche, und will, einer Aufforderung des Herrn Neunzig folgend, die Erfahrungen, die ich hierbei sammeln konnte, mitteilen.

Für tierpsychologische Versuche eignen sich am besten völlig zahme Vögel, die vor dem Menschen keine Furcht haben, und deren Handlungen nicht durch den Schreck- und Fluchtreflex beeinflußt werden. Dies ist aber nur der Fall bei Vögeln, die man im jugendlichen Alter dem Nest entnimmt und mit der Hand aufzieht, die also gewissermaßen den Menschen für ihresgleichen halten. Der Einwand, daß solche aufgezogenen Vögel viel von ihren natürlichen Eigenschaften einbüßen und uns daher zu falschen Schlüssen verleiten, ist durchaus nicht zutreffend. Im Gegenteil, wir sehen gerade bei der Aufzucht und der Entwicklung unsrer Pfleglinge, daß fast alle Eigenschaften der Vögel weiter nichts als angeborene Triebe sind. Der von Menschenhand aufgezogene Würger beginnt, wenn er selbständig geworden ist, von ganz allein Mehlwürmer oder kleine Fleischstückchen auf einen im Käfig angebrachten Dornenzweig aufzuspießen, ohne daß er es jemals von anderen Würgern gesehen hat, und der junge aufgefütterte Star zirkelt im Zimmer die Ritzen des Fußbodens in derselben Weise ab, wie die alten Stare in der Freiheit die Rasenfläche, um nach Nahrung zu suchen. Ein Baumfalk, den ich selbst aufgezogen hatte, beachtete die im Käfig befindlichen Vögel gar nicht, machte aber sofort auf jeden im Zimmer freifliegenden Vogel Jagd, wußte ihn sehr geschickt im Fluge zu fangen und dann durch einen Biß in den Kopf zu töten. Das Beutemachen im Fluge ist also dem Baumfalken angeboren, er braucht es nicht erst durch einen Unterricht seitens der alten Falken zu erlernen, wie der Laie annimmt. Wir sehen aus allen diesen Beispielen, daß die Art des Nahrungserwerbs eine erbliche Eigenschaft ist, die der Vogel nicht erst zu erlernen braucht, sondern die er als Erbstück mit auf die Welt bringt. Ebenso verhält es sich mit den anderen Lebensgewohnheiten, wie z. B. mit dem Nestbau. Kein Vogel bedarf einer Unterweisung in der Kunst des Nestbaus. Die Technik des Nestbaus ist dem Vogel angeboren, denn der jung aufgezogene Vogel, der noch niemals das Nest anderer Vögel gesehen hat, erbaut, wenn er fortpflanzungsfähig wird, ein Nest, wie es für seine Art durchaus typisch ist. Mag auch mitunter der erste Versuch noch etwas mangelhaft ausfallen, so entspricht doch die Art des errichteten Baues durchaus der Bauweise des alten Vogels. Wir sehen hieraus, daß die künstliche Aufzucht im Zimmer die typischen Eigenschaften und Gewohnheiten des Vogels in keiner Weise verändert.

Während wir die größeren Papageien, wie Graupapagei, Amazonen, Araras und Kakadus meist als bereits zahme Vögel im Handel erhalten, die in ihrer Heimat von den Eingeborenen aus der Nisthöhle geraubt und aufgezogen sind, ist dies bei den kleineren Sittichen gewöhnlich nicht der Fall. Nur einige Schmalschnabelsittiche, wie Feuerflügelsittich und Tuisittich, sowie einzelne Keilschwanzsittiche, besonders Blaustirn-, Goldstirn- und Petzsittich kommen hin und wieder in jung aufgezogenen und ganz zahmen Stücken in den Handel. Bei den australischen Plattschweifsittichen ist dies leider niemals der Fall. Sie werden in ihrer Heimat nicht aus dem Nest genommen und aufgezogen, sondern erst nach dem Ausfliegen mit Netzen gefangen. Solche Vögel bleiben mit wenigen Ausnahmen immer scheu und schließen sich dem Menschen nicht mehr an, lassen wenigstens, auch wenn sie ihre Scheuheit bis zu einem gewissen Grade ablegen, doch die Anhänglichkeit und liebevolle Zuneigung zu ihrem Pfleger vermissen, die junge, aufgezogene Papageien zu so angenehmen Stubengenossen machen. Um diesen Grad der Zahmheit zu erreichen, muß man hier in Europa gezüchtete junge Vögel selbst aufziehen.

Ich versuchte die Aufzucht zuerst mit dem Wellensittich, später auch mit anderen Sittichen und Zwergpapageien, so mit Singsittichen, Rußköpfchen, Nymphensittichen, Mönchssittichen und dem Königssittich, die Liebhaber, welche diese Vögel züchteten, in liebenswürdiger Weise für meine Versuche mir zur Verfügung stellten.

Nun die Aufzucht selbst. Sie ist nicht allzu schwierig, aber ungeheuer zeitraubend. Man nimmt

die Vögel am besten aus dem Nistkasten, wenn die Federn etwa zur Hälfte aus den Blutkielen hervorsprießen, die Vögel also schon teilweis befiedert, aber noch völlig unflugfähig sind. In diesem Alter sind Körper und vor allem der Knochenbau schon so weit ausgebildet, daß die künstliche Aufzucht im allgemeinen keinen Nachteil mehr ausübt und die Pfleglinge gut gedeihen. Verluste kommen freilich immer vor. Darauf muß man von vornherein gefaßt sein. Sie sind aber bei sorgsamer Pflege nicht allzu groß. Sind die Vögel schon älter und schon fast flugfähig, dann hält es meist sehr schwer, sie an die künstliche Fütterungsweise, die ich noch beschreiben werde, zu gewöhnen. Sie kennen schon ihre Eltern, die angeborene Scheu vor dem Menschen ist schon entwickelt, und sie sind außerordentlich schwer zur Annahme des Päppelfutters zu bewegen. Der erste Wellensittich, den ich aufzog, war schon völlig befiedert und flugfähig, als ich ihn dem Nistkasten entnahm. Erst am dritten Tage, als der Vogel schon ganz schwach und matt war, entschloß er sich endlich, das gereichte Futter anzunehmen. Er gedieh gut, wurde sehr zahm und lernte vortrefflich sprechen.

Nimmt man die Vögel in sehr jugendlichem Alter, solange sie noch im Dunenkleid sind, aus dem Nistkasten, so hat dies den Vorteil, daß sie sich ohne weiteres an die künstliche Ernährungsweise gewöhnen, aber andererseits den Nachteil, daß sie leicht zugrunde gehen. Dem künstlichen Futter fehlt ein wichtiger Bestandteil, nämlich der Kropfschleim der alten Vögel, der für die Ernährung der Jungen offenbar eine wichtige Rolle spielt. Er enthält anscheinend Bestandteile, die für die Knochenbildung sehr wichtig sind, und die man durch künstliche Präparate, wie Nährsalz und Kalk, nicht ersetzen kann. Ich habe wenigstens bei jungen Vögeln keine Erfolge damit erzielt. Ein einigermaßen gutes Ersatzmittel ist nach meinen Erfahrungen Holzkohle, die man in ganz geringen Dosen, fein geschabt, dem Päppelfutter zusetzt.

Welch großen Wert der Kropfschleim der alten Vögel für die Ernährung junger Körnerfresser hat, geht ja am besten daraus hervor, daß die Tauben ihre Jungen in den ersten Tagen ausschließlich mit ihrem Kropfschleim, der sogenannten Taubenmilch, ernähren. Wer große Papageien hat, kann sich auf folgende Weise den Kropfschleim zur Aufzucht kleiner Sittiche verschaffen. Graupapagei, Amazonen und Araras würgen in geschlechtlicher Erregung in Gegenwart ihres Pflegers häufig ihren Kropfinhalt aus. Sie wollen ihrem Herrn die unter Papageien übliche Liebkosung erweisen und ihn aus dem Kropf füttern. Ein sehr anhänglicher Papagei läßt sich sehr leicht durch Liebkosung hierzu anregen. Ich fange dann den reichlich ausgewürgten Kropfinhalt mit einem Löffel auf und mische ihn unter das Aufzuchtfutter. Hiermit habe ich ausgezeichnete Erfolge erzielt.

Das künstliche Aufzuchtfutter wird in folgender Weise hergestellt. Man kocht aus geschälter Hirse und Weizengrieß einen dickflüssigen Brei, dem man eine geringe Spur geschabter Holzkohle zusetzt. Die Hirse wird vorher in einem Mörser zu feinem Mehl gestoßen. Ich nehme für gewöhnlich $^1/_3$ Hirse und $^2/_3$ Weizengrieß bei der Zubereitung des Futters, doch kann man auch Hirse und Grieß zu gleichen Teilen mischen. Um die Nahrung etwas abwechslungsreich zu gestalten, verwende ich an manchen Tagen anstatt der Hirse oder anstatt des Grieß, Maismehl, oder feingestoßenen Spitzsamen. Der Spitzsamen wird in einem Mörser zerrieben und dann durch ein feines Sieb geschüttet. Das Mehl fällt durch, während die gröbere Schale zurückbleibt. Das Zerreiben und Durchsieben muß aber mehrere Male wiederholt werden, um alle Teile des Kerns aus den Hülsen zu entfernen. Eine Abwechslung im Futter ist jedenfalls sehr ratsam, da ja jede Frucht besondere Bestandteile enthält, die für die Ernährung von Bedeutung sind.

Der Brei wird in einem kleinen Löffel, am besten einem Teelöffel, in gut warmem Zustande den Vögeln gereicht. Er muß noch etwas dampfen, darf jedoch nicht zu heiß sein. Man fühlt die Wärme am besten mit den Lippen ab. Da der Kropfinhalt, den die alten Papageien den jungen einwürgen, warm ist, so muß eben das Atzfutter auch angewärmt sein. Die jungen Vögel verweigern das Futter sofort, wenn es abgekühlt ist. Der Schluckreflex wird ebennur durch die Wärme ausgelöst. (Schluß folgt.)

Die Vogelschau zu Hamburg.

Von A. Weber.

(Nachdruck verboten.)

Der Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg veranstaltete am 14. und 15. Dezember v. Js. in Bans Gesellschaftshaus eine Vogel-Ausstellung. Diese Zeilen können nun leider nicht mehr dazu dienen, zum Besuche der Ausstellung zu locken, da dieselbe ja bereits wieder vorüber ist.

Das ist nun sehr schade. Denn wie sagt Thomas Hübbe doch so treffend von den Großstädtern:

„Die Großstädter, die, zum Himmel aufblickend, das Auge an den Telegraphendrähten, Straßenbahndrähten, Hochbahnbögen, Wolkenkratzdächern und stillstehenden Turmuhren zu erfreuen haben, und es fertig bringen, an der Gertrudenkirche vorbeizuhasten, ohne oben an dem Turme Rinaldo, den prachtvollen Wunderfalken, zu bemerken, der da sein Täubchen rupft, und deren ornithologische Kenntnisse sich in dem Bewußtsein erschöpfen, daß die Kraftwagenerzeugung der Ernährung des Haussperlings abträglich —, diese Großstädter sollten gut und gern einmal mit den Augen sehen, welcher Reichtum an Waldvögeln unsere deutsche Heimat segnet, und welche Herrlichkeiten und Lieblichkeiten sie entdecken können, wenn sie — selbst in Winterzeit — in Wald und Feld nur die Augen aufmachen wollen."

Dazu sollte diese Ausstellung mithelfen, und darum ist es bedauerlich, daß sie schon vorbei ist.

Beim Betreten der Ausstellung fiel dem Besucher zunächst die große Voliere von Herrn Wilckens ins Auge (siehe Bild S. 35). Die Größenmaße derselben waren etwa 2 m lang, 2 m hoch und etwa 1 m tief. Besetzt war sie mit folgenden Vögeln: Alpenbraunelle, Birkenzeisig, Rothänfling, Buchfink, Dompfaff, Erlenzeisig, Gartengrasmücke, Grünhänfling, Haubenmeise, 2 Tannenmeisen, 2 Stieglitzen, Sonnenvogel und Rotkehlchen.

Angenehm fiel die Voliere durch ihre naturgemäße Einrichtung auf. Der Boden derselben war teilweise mit Waldmoos belegt und in der Mitte eine prachtvoll gewachsene Fichte aufgestellt. Dieselbe war zur Hälfte an die mit einer prachtvollen Gebirgslandschaft bemalte Rückwand gestellt und erweckte einen Gesamteindruck, als wenn die Landschaft der Rückwand mit dem Boden der Voliere ineinander verschmolzen. Es gewährte nun einen besonders schönen Anblick, wenn die eleganten Stieglitze auf der Spitze der Fichte ruhten und daran herumbastelten. Ferner war der allgemeine Liebling des Publikums das zutrauliche Rotkehlchen, welches sich seinen Lieblingsplatz auf einem Naturzweige unmittelbar dicht an dem Vordergitter der Voliere erwählt hatte und von hier zum Entzücken der lauschenden Besucher seinen feierlichen Gesang vollkommen laut und ungeniert erklingen ließ.

Daran reihte sich in dunkelgrün gestrichenen, einheitlichen Käfigen der Stand meiner Wenigkeit (siehe Bild S. 37). In den 12 Käfigen befanden sich die durchschnittlich gehaltenen besseren Stubenvögel, wie Blaukehlchen, Heidelerche, 2 Gartengrasmücken, 2 Schwarzplättchen, darunter ein guter Haidijohlschläger, der aber noch nicht laut im Gesang war, 2 Gelbspötter, Sprosser, Sperbergrasmücke, die besonders dunkel gefärbt war, als auffallend großer und dunkelgefärbter Vogel ein Rotkehlchen und eine Schamadrossel. Dieselbe war sehr schön im Gefieder und ebenfalls ein recht großer Vogel. Es war interessant, die fabelhafte Eifersucht und die große Erregung zu beobachten, welche sich dieses Vogels bemächtigte, als er in seiner Nähe Herrn Menraths Schama hörte. Die Aufregung war so groß, daß sich meine Schama den ersten Nachmittag überschrieen hatte und nach jeder lauten Strophe einige piepsende Töne von sich gab. Jedoch gab sich diese unangenehme Erscheinung im Laufe des Tages wieder.

An meiner Schamadrossel machte ich folgende auffallenden Beobachtungen. Während sie einige Vögel, wie Goldstirnblattvogel, Rothänfling usw. sofort innerhalb 3 Tagen wiedergab, kramte sie mit ihren anderen Kenntnissen erst viel später aus. So brachte sie vier bis fünf Nachtigalltouren erst im November, nachdem sie die Nachtigall also seit etwa 4 Monaten nicht mehr gehört hatte. Ebenso Spatzengeschilpe, Amseltouren, Buchfinkenschlag usw. Warum bringt sie von den Gesängen, welche sie alle gleichzeitig hörte, einige sofort und die anderen erst nach 4 Monaten, indem sie für die Wiedergabe der letzteren erst einer Studienzeit von etwa 14 Tagen bedurfte, ehe dieselben rund und klangvoll zum Ausdruck gebracht wurden, während sie für die ersteren zur lauten Wiedergabe keine Studienzeit benötigte. Da dieser Vogel meine erste Schamadrossel ist, welche ich mir halte, so habe ich mit diesen bildschönen Tieren leider noch keine weiteren Erfahrungen machen können. Vielleicht äußert sich dieser oder jener Liebhaber einmal über dieses Thema an dieser Stelle, wofür ich demselben sehr verbunden wäre.

An diese Käfige reihten sich noch 2 Flugkäfige desselben Besitzers. Der erste war mit einem Kleiber besetzt und seine Seitenwände mit grobrissiger Baumrinde ausgestattet. Desgleichen die links daneben aufgestellte Voliere in Größe von 1,5 × 1 m bei 50 cm Tiefe. Besetzt war diese Voliere ebenfalls mit einem Kleiber, 3 Schwanzmeisen, Haubenmeise, Tannenmeise und einem Erlenzeisig. Ich ging hierbei von dem Grundsatze aus, dem Publikum auch mal etwas Besonderes zu bieten, und fand dann während

Teilansicht der Voliere des Herrn Wilkens auf der Hamburger Vogelschau (s. S. 34).

des Besuches auch bestätigt, daß sich die Herrschaften über die beiden Kleiber mit ihrem sonderbaren, drolligen Gebahren, sowie über die allerliebsten Schwanzmeisen am meisten freuten und sich die Schar der Besucher gerade hier sich staute. Auch die Liebhaber freuen sich, wenn sie Gelegenheit haben, mal etwas „Besonderes" zu schauen. Jedenfalls geht es mir so. Es ist für mich ein wahrer Genuß, das Gebahren von Vögeln beobachten zu können, die in Käfigen oder Volieren zu halten sonst nicht allgemein üblich ist und hierbei den Reiz des Neuen auf mich wirken zu lassen. Und gerade solche Darbietungen machen die Vogelausstellungen für den Liebhaber ja besonders interessant und anziehend. Wie hätte ich mich beispielsweise gefreut, wenn auf unserer Ausstellung unter anderem auch Bachstelzen in ihrer eleganten

Erscheinung, Wiedehopfe mit ihrem stolzen Kopfschmucke, beide Arten Baumläufer mit ihren interessanten Unterscheidungsmerkmalen und noch viele andere sonst nicht allgemein von Liebhabern gehaltene Käfigvögel gezeigt worden wären. Dieses soll jedoch nicht besagen, daß ich mit unserer Ausstellung unzufrieden gewesen wäre, nein, in Hinsicht auf unseren schwachen Hamburger Verein, bin ich bei dieser, unserer ersten Ausstellung, besonders darauf stolz, daß die Mitglieder trotz unendlich großer Schwierigkeiten, den Vorstand nicht im Stich ließen, sondern von weither unter viel Mühe und großer Arbeit ihre Vögel und Käfige herbeischafften. Und dafür spreche ich den Mitgliedern unseres Vereins auch an dieser Stelle nochmals, im Namen des Gesamtvorstandes, unseren verbindlichsten Dank aus. Als weiterer Stand schlossen sich hieran die 3 Käfige des Herrn Nölting mit je einem Rot- und Blaukehlchen, und im 3. Käfige mit einem Zeisig, Stieglitz, Buchfink und Rothänfling. Besondere Anerkennung verdienten die beiden ersteren Weichfresser und von den Körnerfressern besonders der Rothänfling, welcher trotz der sich drängenden Besucher, seine prachtvollen Strophen unermüdlich laut und fleißig vortrug. Es war einer jener seltenen Rothänflinge, welche mal wirklich lang durchsingen und besonders das langgezogene Krähen gut bringen. (Schluß folgt.)

Ein weiterer Beitrag zur Fütterung der Prachtfinken.

Von Rudolf Neunzig.

(Nachdruck verboten.)

Im Laufe der Jahre bewohnte meine Käfige und Flugräume eine Anzahl von Vögeln der verschiedensten Arten, die uns die Wälder und Felder unserer Heimat, wie die Steppen, Urwälder, Gebirge und Kulturlandschaften ferner Zonen bescheren. Körnerfressende, Fruchtfressende und Insektenfressende, wenn wir diese willkürliche und unrichtige Einteilung der Vogelpfleger bestehen lassen, befanden sich darunter und verlangten verschiedenartige Kost und Pflege. In den letzten Jahren, nachdem die Einfuhr ausländischer Vögel in reichem Maße eingesetzt hat, hielt ich neben zarten heimischen hauptsächlich Vertreter der Webefinken aus dem ganzen Verbreitungsgebiet, wie sie ja so häufig und zahlreich auf den Vogelmarkt gelangen. Bei vielen Vogelpflegern und -händlern scheint die Ansicht vorzuherrschen, daß die Pflege dieser Vögel, wie die der „körnerfressenden" überhaupt, weniger Schwierigkeiten, Verständnis und Anforderungen an den Pfleger stellen als die insektenfressenden heimischen oder ausländischen Vögel. Gerade auf diesem Gebiete wird vielfach in reichlichem Maße gesündigt, und Herr Birk hat ja in seinen Ausführungen „Liebhabersorgen" auf alle diese Übelstände hingewiesen, so daß sich ein weiteres Eingehen darauf erübrigt.

Die Fütterung der Vögel in der Gefangenschaft sollte nach bestimmten Richtlinien vor sich gehen, die eine gesunde und natürliche Ernährung der Pfleglinge gewährleisten. Es sollen ihnen alle die Nährstoffe zugeführt werden, die ihnen die Freiheit bietet und deren sie zum Aufbau und zur Erhaltung ihres Körpers und zur Ausübung ihrer natürlichen Funktionen bedürfen. Unser verehrter Mitarbeiter Dr. Adlersparre hat ja in seiner Abhandlung über Vitamine (Ges. Welt 1924 S. 9 f.) einen Fingerzeig gegeben, in welcher Richtung wir die Fütterung einzustellen haben. Das gilt natürlich nicht nur für die Insektenfresser und echten Finkenvögel, sondern auch für die Webefinken, deren Fütterung hier eingehender behandelt werden soll. Wenn wir die Befunde der Mägen in ihrer Heimat von den Forschern erlegter Webefinken an den Etiketten und verstreut auch in einigen Abhandlungen lesen, so finden wir zumeist die Angabe: Insekten und Grassämereien. So seien hier nur einige Befunde von Emin im Auszug angegeben: Schmetterlingsfink: „Außer Sämereien nehmen sie gern kleine Würmer und Larven von Fliegen; diese letzteren sah ich sie oft im Fluge erhaschen"; Schwarzköpfchen: „Die Nahrung besteht in allerlei feinen Sämereien, doch werden auch winzige Fliegen und Insekten gern mitgenommen"; Goldbrüstchen: „Jetzt, wo die Gräser meist niedergebrannt sind, sieht man sie viel auf der Erde, wo sie ausgefallene Gramineen-Samen aufpicken, auch wohl kleine Fliegen haschen"; Rotstrichastrild und Grauastrild: „Um diese Zeit enthält ihr Magen meist kleine Insekten und vegetabilische Massen, vielleicht Grasspitzen und Blätterteile"; ebenso finden wir im Werk von Stark einige weitere Angaben: Blauastrild: „Obwohl die Nahrung der alten Vögel ausschließlich in Grassamen zu bestehen scheint, werden die Jungen mit kleinen Larven und Insekten aufgefüttert"; Grauastrild: „Die Jungen werden mit kleinen Heuschrecken aufgefüttert". So ließe sich die Zahl der Beispiele aus der Literatur vermehren und sie ergeben, daß nicht nur zur Aufzucht, sondern auch zur teilweisen Ernährung von den Webefinken neben den vegetabilischen auch animalische Stoffe verzehrt werden.

Aus diesen Gründen werden meinen Vögeln neben vegetabilischen Stoffen auch animalische regelmäßig gereicht, die in einem guten Weichfutter mit vielen Ameisenpuppen, Mehlwürmern und gekochtem Ei bestehen. Die Annahme des Weichfutters und der Mehlwürmer ist nicht nur nach der Art des Vogels, sondern auch individuell verschieden. So verzehrt ein Paar Maskengrasfinken regelmäßig das dargebotene Weichfutter, während ein anderes Paar, das ebenso lange wie das erstere in meinem Besitz ist, die Annahme verweigert. Häufig trat der Fall ein, daß das anfangs verweigerte Weichfutter später und seitdem regelmäßig angenommen wurde.

Bei einer Anzahl aus dem Fockelmannschen südafrikanischen Transport stammender Webefinken, wie Bunt-, Elfen-, Granat-, Blau- und Wachtelastrilden, Helenafasänchen und Braunkopfamaranten machte ich die Beobachtung, daß die Vögel einen wahren Heißhunger nach animalischer Kost hatten. Alle, insbesondere Bunt-, Elfen- und Granatastrilde stürzten sich wild auf die ersten dargereichten Mehlwürmer, die sie nun regelmäßig erhalten. Ein krankes Männchen Buntastrild, welches stets den Kopf unter das Gefieder steckte, wurde dabei sehr munter und verfolgte die in seiner Nähe kommenden anderen Genossen. Leider ging der Vogel bald nach Ankunft des Transportes in Hermsdorf ein. Sämt-

liche oben angeführten Vögel verzehrten von dem ersten Tage ihres Daseins in Hermsdorf an Ameisenpuppen, Weichfutter, Eigelb, zerschnittene und ganze Mehlwürmer. Ich halte die Darbietung von animalischer Kost, besonders bei so zarten Vögeln wie Elfen- und Granatastrilden, für notwendig, die sie vielleicht auch in der Heimat zu sich nehmen.

Einen ähnlichen Erfolg hatte die Darbietung von abgekochter Kuhmilch, die sofort von einem Teil der Vögel, besonders den braunköpfigen Amaranten, gern getrunken wurde. Abgekochte Milch erhalten meine Vögel des öfteren, und sie trinken wohl fast alle davon.

Von den Webern ist ja bekannt, daß sie auch in der Gefangenschaft Insekten und Weichfutter verzehren. Doch glaube ich, daß im allgemeinen schwanz-, Masken-, Gouldsamandinen, Rotstrich- und Grauastrilde, und weitere Vertreter dieser Gruppe. Sie alle sind ja in ihrer Fütterung in gewissem Sinne ziemlich einheitlich. Doch suche ich die Fütterung recht mannigfaltig zu gestalten. Neben dem üblichen Körnerfutter, wie Spitzsaat, den verschiedenen Hirsearten, erhalten sie Mohn und Gras- sowie Rübsaat, welch letztere von einer Anzahl Prachtfinken im angekeimten Zustande recht gern verzehrt wird. Auch Hirse und Spitzsaat wird gekeimt und ungekeimt gereicht.

Um dem bei gefangengehaltenen Vögeln eintretenden Mangel an Vitaminen vorzubeugen und um dem Organismus Vitamine zuzuführen, werden wöchentlich einmal Hirse und Spitzsaat leicht mit wenigen Tropfen reinen Lebertrans befeuchtet und so durchgerüttelt, daß sämtliche Körner schwach vom



Stand des Herrn A. Weber auf der Vogelschau zu Hamburg (s. S. 35).

diese Seite der Fütterung bei den Webefinken vernachlässigt wird. Ebenso scheint es mit der Fütterung angekeimter Sämereien der Fall zu sein, worauf auch Herr Voigt, Jena sowohl in der Sitzung der A. Z., als auch in unserer Zeitschrift hingewiesen hat. Doch ist die Darbietung von Insekten, gekeimten Sämereien usw. notwendig aus den Gründen, die Dr. Adlersparre in seiner Arbeit dargelegt hat.

Ganz besonders angeregt durch die eben erwähnte Arbeit, aber auch schon früher, suchte ich meinen Vögeln, ganz gleich welcher Nahrung sie bedürfen, eine ihnen zuträgliche vitaminreiche Ernährung zu bieten. Die Vögel sollen nicht nur so gefüttert werden, daß sie sich in Gefangenschaft halten, sondern es müssen ihnen zu ihrem Wohlbefinden alle die Nährstoffe zugeführt werden, die ihnen in der Freiheit zur Verfügung stehen. Nach diesen Gesichtspunkten habe ich versucht, die Fütterung mancher Vögel, die seit längerer Zeit von mir gehalten werden, einzustellen. Es sind mehr oder weniger seltene Webefinken, wie Spitz-

Lebertran überzogen sind. Dies geschieht wöchentlich einmal für eine Tagesportion. Seit dieser systematischen Zuführung von Lebertran, gekeimten Sämereien und Grünkraut macht sich bei meinen Vögeln eine weit größere Lebenslust bemerkbar als vorher. Ich möchte vorläufig allerdings das Urteil nicht zu positiv fassen. Es ist ja auch möglich, daß die Brütlust und die gesteigerte Lebenslust bei vielen Prachtfinken auf die gerade in dieser Jahreszeit in ihrer Heimat stattfindende Brutperiode zum Teil zurückzuführen ist. — Aber schlecht befiederte Vögel mit kahlen Stellen am Kopf oder anderen Körperteilen, besonders frisch importierte, befiederten sich schnell, während ich vorher bei frisch angekommenen häufig Verluste hatte und die Befiederung langsamer vor sich ging. Legenot, die ja so häufig bei diesen Vögeln auftritt und so manches Opfer fordert, kenne ich seitdem nicht mehr, während sie vorher des öfteren auftrat. Japanische Mövchen, die stark nervöse Erscheinungen und sonstiges Unbe-

hagen zeigten und wohl auch erheblich unter der jahrelangen Inzucht leiden, und daher allmählich zur Züchtung unbrauchbar werden, erholten sich bei der Fütterung allmählich und sehen, nach dem Äußeren zu urteilen, weit gesünder aus. Es scheint so, als ob im allgemeinen die japanischen Möwchen in ihrem Gesundheitszustand viel zu wünschen übrig lassen. Ich habe im vergangenen Jahre eine Reihe Möwchen von verschiedenen Händlern erhalten, die ebenso wie meine noch vorhandenen fünf Paare nicht zur Fortpflanzung zu bewegen sind. Wie schon erwähnt, verursachen Atembeschwerden, nervöse Erregungszustände und Verdauungsstörungen erhebliche Verluste, über die besonders Händler klagen. Die Sektion einiger eingegangener Vögel ergab unter anderem, daß die Geschlechtsorgane sehr wenig entwickelt waren.

Auch die Zufuhr von Phosphaten sorgt für eine erhöhte Lebenstätigkeit, insbesondere der Muskulatur. Am Institut für vegetative Physiologie der Universität Frankfurt haben Prof. G. Embden, Eduard Gräfe und Ernst Schmitz Versuche an Soldaten durchgeführt, die ergaben, daß eine Zufuhr von Phosphat die Tätigkeit der Muskulatur erhöhen. Diese Arbeiten „Untersuchungen über das Lactacidogen und über die Bedeutung der Phosphorsäure für die Muskeltätigkeit und Leistungsfähigkeit" sind in der Zeitschrift für physiologische Chemie, Bd. 113 (1921), von Hoppe-Seyler nachzulesen. Gaben von Phosphatpräparaten in der der Größe des Vogels entsprechenden Verminderung werden, glaube ich, auch hier sehr gutes tun. Sie werden vielleicht die Brutlust steigern und vor allen Dingen mit der vorher erwähnten vitaminreichen Fütterung von gekeimten Sämereien, Grünkraut und Lebertran verbunden, dem allgemeinen Befinden der Vögel recht zuträglich sein, deren Äußerung wir ja in einem schön befiederten Kleide, vorhandener Brutlust, fehlender Legenot u. a. sehen. Leider liegen, soweit ich unterrichtet bin, hierüber keine systematischen Versuche aus dem Vogelreich vor. Hoffentlich kann ich hierüber später eingehender berichten, sobald meine Versuche, systematisch durchgeführt, einen Abschluß gefunden haben.

Atlantische Vögel.

Von Adalbert Athen, Hamburg.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Unter den Singvögeln fällt dem Fremden zuerst der wilde Kanarienvogel auf. Es gibt dort keinen Garten und kein Feld, wo man ihn nicht häufig anträfe. Er sieht wie unser Girlitz aus, ist etwas größer als dieser, aber kleiner als unser Käfigvogel. Auf dem Rücken herrscht grau vor; im übrigen ist er gelbgrün. Schnabel und Füße sind rotbraun, die aber in der Gefangenschaft schnell verblassen. Pater Schmitz glaubte festzustellen, daß beim Männchen die grüne Farbe der Kehle nicht unterbrochen ist, und daß sich um die Augen ein vollständiger grüner Ring zieht, während beim Weibchen eine graue Querbinde die grüne Färbung der Kehle unterbricht und der Augenring kein vollständiger ist. Im Frühjahr macht die Beobachtung eines Pärchens viel Vergnügen; so der köstliche Wohllaut ihrer Locktöne, das singende Männchen mit geblähter Kehle und der zierlichen Haltung des gegabelten Schwanzes, das nun folgende wirbelnde Jagen beider, wobei sie oft aneinander geschmiegt einige Meter steil in die Höhe fliegen, um dann auf einen niedrigen Baum wieder einzufallen. Das Männchen hat auch einen Balzflug. Es fliegt singend in wagerechter oder absteigender Richtung, wobei es die Flügel ganz eigenartig bewegt. Ich möchte es einen Flatterflug nennen. Nach seinem Gesang würde ihn jeder Fremde sofort als Kanarienvogel ansprechen, obwohl er etwas anders singt, als unser Käfigvogel. Der wilde Vogel kostet die Roller nicht lange aus, wechselt damit schnell durch andere Höhenlagen, bringt auch sonst mehr Abwechslung in den Gesang und singt besonders viel zarter. Ihr Nest besteht zumeist aus weißer Pflanzenwolle; in einem dunklen Erikabäumchen gewährt es mit den hilflosen und so weich gebetteten Jungen einen ganz reizenden Anblick. In dem sonnigen Dasein des wilden Vogels gibt es aber auch eine sehr häßliche Seite, denn im Herbst, wenn sie recht fett geworden sind, werden sie gefangen und verzehrt. Hundert Stück sollen auf eine Mahlzeit gehen. Es gibt aber genug Liebhaber, die sie nur fangen, um sie zu käfigen; andere holen sich die flüggen Jungen mitsamt dem Nest und päppeln sie mit Maisgrieß und Milch auf.

Wer eine besondere Vorliebe für das Schwarzplättchen hat, ist angenehm überrascht, diesem herrlichen Sänger auf Sankt Michael fast auf Schritt und Tritt zu begegnen. Er ist dort ebenso häufig wie der vorige und genau der gleiche Vogel, der bei uns lebt. Wer dort im April oder Mai einen Garten aufsucht oder ins Freie geht, braucht nur zu lauschen; er hört bestimmt eins, und kommt auf seine Kosten, denn es sind hervorragende Sänger darunter. Ich möchte hier eine allgemeinere Bemerkung einschalten. Ich hatte Gelegenheit, das Schwarzplättchen unter verschiedenen Himmelsstrichen zu verhören, so in Portugal und auf allen atlantischen Inselgruppen. Mit Ausnahme der Kapverden, wo aus dem jubelnden Überschlage ein kraftloser melancholischer Schlag geworden ist, der mir so recht der trostlosen Umgebung angepaßt erschien, hat das Schwarzplättchen ihn auf den Kanaren, den Azoren und auf Madeira zu einer Vollendung gebracht, die jeden Liebhaber wahrhaft entzücken muß. Das darf man aber durchaus nicht verallgemeinern, denn man hört dort selbstverständlich auch Stücke, die gar nicht befriedigen. In Portugal habe ich keinen hervorragenden Schläger gefunden; mehrfach vernahm ich dort Vögel, die als Überschlag nichts weiter brachten, als vier oder fünf aufwärts gerichtete, gleich hohe Töne, und denselben eigenartigen Schlag hörte ich später mehrfach auf Madeira. Die Frage, ob das Vögel vom Festlande gewesen sein könnten, wage ich nicht zu entscheiden.

Das Schwarzplättchen wird auf den Azoren vielfach in Käfigen gehalten. Es handelt sich hier aber ausnahmslos um aufgepäppelte Vögel. Wildfänge bringen die Liebhaber dort nicht durch, weil ihnen das Weichfutter unbekannt ist, was natürlich daran liegt, daß unsere rote Waldameise dort fehlt. Die flüggen Jungen werden mit Maisgrieß und

Milch, dem sie einige Fliegen beimischen, aufgepäppelt. Die Pfleglinge sind zwar reizend zahm und bringen einen kräftigen Schlag, der aber an den Gesang der Wildlinge bei weitem nicht heranreicht.

Die azorische Schleiergrasmücke (Lokalname touto vinagreiro) ist keine besondere Art, auch keine geographische Form, sondern nichts weiter als ein seltener Melanismus des Schwarzplättchens, der aber merkwürdigerweise beständig ist, das heißt, alle Schleiergrasmücken sind untereinander ganz gleich gefärbt. Ich habe das an fünf lebenden Stücken und mehreren Bälgen bestätigt gefunden. Die Liebhaber erzählten mir übereinstimmend, daß man beim Aufpäppeln der Jungen von Schwarzplättchen nur ganz selten einmal das Glück hätte, eins davon als Schleiergrasmücke sich entwickeln zu sehen, während seine Geschwister normale Schwarzplättchen würden. Von Thanner erwähnt einen Fall, bei dem normale Junge im Käfig zu Schleiergrasmücken vermauserten. Floericke hat sie auf den Kanaren am Nest beobachtet, sagt aber nichts von den Jungen; die Feststellung, ob sich aus dem Gelege nun auch Schleiergrasmücken oder Schwarzplättchen entwickelten, wäre doch sehr interessant gewesen. Es darf aber wohl angenommen werden, daß die Nachkommen wieder normale Vögel werden. Kopf, Hals und Brust sind bei der Schleiergrasmücke tiefschwarz. Die schwarze Färbung reicht genau so weit, wie bei dem Rotkehlchen das Rot. Das übrige Gefieder ist ein sattes Olivbraun. Auch bei den Weibchen kommt diese Abänderung vor; sie sind einfarbig olivbraun, Kopf und Hals etwas verdüstert. Hiervon habe ich nur Bälge im Museum auf Madeira gesehen; auf Sankt Michael habe ich über melanistisch gefärbte Weibchen nichts erfahren können, ja man behauptete sogar, daß diese Abänderung bei den Weibchen überhaupt nicht vorkäme. Es war mir nicht vergönnt, die Schleiergrasmücke im Freien zu beobachten, sie scheint aber auf den Azoren garnicht so selten zu sein. Im Jahre 1914 erwarb ich ein dreijähriges aufgepäppeltes Stück, das dann noch sechs Jahre bei mir im Käfig eifrig gesungen hat. Im Juli 1923 brachte man mir einen Wildfang, der sich in ein Treibhaus verflogen hatte. Obwohl ich kein Weichfutter besaß, glückte es mir, den Vogel mit Polenta und Bananen in die Heimat zu bringen. Interessenten zeige ich ihn gern. Es sei bemerkt, daß der wissenschaftliche Name für die azorische Schleiergrasmücke Sylvia atricapilla atricapilla aberr. ist, nicht aber Sylvia atricapilla heineken.

Die Landbevölkerung auf den Azoren hat für Tierschutz wenig Verständnis. Es gibt dort aber einen Singvogel, den sie aus religiösen Gründen heiligen und schützen; das ist die Gebirgsbachstelze. Wer sie tötet, kommt ins Fegefeuer oder es stößt ihm schon bei Lebzeiten ein Unglück zu, denn sie war es doch, die der heiligen Familie auf ihrer Flucht nach Ägypten die Wege wies. Kopf und Oberseite sind bei dieser Bachstelze ganz dunkel, die Kehlzeichnung tiefschwarz und die Unterseite ist noch leuchtender gelb, als bei unserem Vogel. Er ist nicht nur auf dem Lande überall gemein, sondern auch inmitten der Stadt, wo er sich gern auf den Dächern der niedrigen Häuser herumtreibt, als hastiger, unruhiger Vogel, mit durchdringenden Rufen. Wahrscheinlich haben ihn die vielen öffentlichen Brunnen in die Stadt gelockt. In Ponta Delgada vertritt er unseren Haussperling, der dort, wie auch auf allen atlantischen Inseln, ganz unbekannt ist.

Das azorische Rotkehlchen weicht von dem unsrigen in keiner Weise ab. Der Grünling unterscheidet sich von unserem Vogel durch sattere goldgelbe Färbung; es ist der südwesteuropäische Vogel, der erst in neuerer Zeit aus Portugal eingeschleppt worden

Schleiergrasmücke.

ist. Der Stieglitz weicht dagegen wieder bedeutend von der deutschen Form ab, durch geringere Größe, kleineren Schnabel und kürzere Flügel. Sein Gesang ist derselbe.

Hiermit sind alle auf den Azoren brütende Singvögel aufgezählt. Überraschend ist es, daß die hochnordische Schneeammer dort gut bekannt ist. Der Azoreaner nennt sie caiado, der „Weißgetünchte". Der Vogel bezieht die Azoren als Wintergast. Ich habe ihn nur in Volieren gesehen, darunter einige prachtvoll gefärbte schneeweiße Männchen; das war im Sommer, also in einer Zeit, wo die alten Männchen das schönste Gefieder haben.

Die Schleiereule scheint dieselbe zu sein, wie bei uns. Die Stockente, von den Azoreanern Königsente genannt, ist wahrscheinlich die einzige dort brütende Wildente. Das schwarze Wasserhuhn brütet dort ganz vereinzelt. Bei den Felsentauben soll es sich, nach Hartert, nur um verwilderte Haustauben handeln. Unser Rebhuhn wird dort durch das Rothuhn vertreten. Es ist ein Rebhuhn mit roten Beinen. Der kräftige Wildgeschmack, durch den sich unser Rebhuhn auszeichnet, fehlt ihm.

(Fortsetzung folgt.)

Individuelle Fütterung.

Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Was steht uns nicht alles an Futtermitteln zur Verfügung. So groß die Menge derselben ist, ebenso gering ist ihr Gleichwert mit dem Naturfutter des wildlebenden Vogels. Bei unseren ausschließlich samenfressenden Vögeln weicht die Fütterung in ihrer Natürlichkeit nicht so weit ab wie bei den insektenfressenden Vögeln, wenn auch die Körnerfresser in der Natur im Wandel der Jahreszeiten einen solchen reich und vielseitig gedeckten Tisch vorfinden, daß wir auch da beim Käfigvogel nicht von einer natürlichen Fütterung reden können, so kommen wir mit den uns durch den Handel zur Verfügung stehenden Sämereien doch so weit, daß wir den Vogel damit, wenn wir auch da nach Arten und individuell füttern, eine, wenn auch nicht vollwertige, so doch zu ihrer Erhaltung hinreichende Nahrung bieten können. Die infolge der veränderten Fütterung im Käfig verursachte Umstellung im Vogelorganismus wirkt dadurch und durch die im Kropfe erst vor sich gehende Erweichung in einen breiartigen Zustand beim Körnerfresser lange nicht so tief einschneidend auf den Verdauungsapparat als beim kerbtierfressenden Vogel. Bei diesem müssen wir daher auf ein soviel wie möglich natürliches Ersatzfutter den Hauptwert legen, das heißt den Mangel an Naturfutter müssen wir etwas ausgleichend zu gestalten suchen, indem wir ein Ersatzfutter in leichtverdaulicher Form bieten, das in seinen Gehalt an Nährwerten in prozentualer Hinsicht dem Naturfutter weitgehendst nahekommt. Vergleichen wir daher unsere Hauptfuttermittel in ihrer Zusammensetzung der Bestandteile mit denen der lebenden Insekten, so werden wir finden, daß wir mit frischen Ameisenpuppen, ebenso auch mit getrockneten, sowie Weißwurm usw. wohl in der Lage sind, unsere Weichfresser kräftig zu ernähren und sie bei diesem Ersatzfutter lange Jahre gesund und sangesfroh zu erhalten. Der Stand der modernen Stubenvogelpflege ist ein derartiger, daß wir behaupten können, daß diese nur zur Ernährung unserer Stubenvögel zur Verfügung stehenden Stoffe vollständig genügen, wir uns also wegen eines Ersatzes dieser Futterstoffe nicht zu bemühen brauchten, wenn nicht die teilweise schwierige Beschaffung, und letzten Endes dazu noch ihre Überteuerung nicht genügend Grund wären, nach billigerem aber ebenso vollwertigem Ersatz Umschau zu halten. Aber leider ist die Bemühung in dieser Hinsicht bis jetzt ohne definitiven Erfolg geblieben. Viel wurde versucht und als unbrauchbar wieder beiseite gestellt. Die einen Industriezweig bildende Futterherstellung hat sich redliche Mühe gegeben, alles Mögliche auf den Markt zu werfen; da aber nicht eine Brauchbarkeit des Erzeugnisses in der Praxis, sondern die Aussicht auf Gewinn vielfach der Grund dieser Bemühungen ist, so müssen wir mit derlei Angeboten sehr vorsichtig sein, wenn wir unsere Lieblinge nicht als Opfer derartiger Versuchstheorien gebrauchen und verlieren wollen. Wir sind also schon gezwungen, an den bewährten Futterstoffen und -methoden bis auf weiteres festzuhalten, so dringend notwendig und wünschenswert eine Ausbreitung auf diesem Gebiete sowohl für den Pfleger, wie für den Pflegling auch wäre. Zählen wir einmal alle Futterstoffe auf, die wir bis heute in der Weichfresserpflege aus eigener Verwendung oder durch empfehlende Anpreisung kennen, so ergibt sich eine Auswahl, die für viele Liebhaber verwirrend und infolge ihrer falschen Anwendung für die damit Betrauten Gefahren für Wohlbefinden und ihre Gesundheit heraufbeschwören. Frische und getrocknete Ameisenpuppen (selbstverständlich in Ia Qualität durch eine sachgemäße Behandlung bei der Ernte und Abtrocknung), getrocknete Eintagsfliegen, im Handel unter der Bezeichnung „Weißwurm“ allen bekannt, Zecke, ein getrocknetes überseeisches Insekt, leider zurzeit selten erhältlich, aber wertvoll, Käferschrot, Garnelenschrot, lange nicht so wertvoll und empfehlenswert wie ersteres, Quark, bekannt auch als Weißkäse, Käsequark und Topfen, gequetschter Hanfsamen, nur empfehlenswert in Beimischung kleiner Quanten, Eierbrot, Zwieback, geriebene Semmel im Quantum nur als Mittel zur Behebung überschüssiger Feuchtigkeit des Futters zu verwenden, weil sehr fettbildend wirkend, geriebene Möhre muß süß sein, dient als Anfeuchtungsmittel der Futterstoffe, rohes und gekochtes mageres Fleisch, gekochtes Rinderherz, gekochtes Hühnerei, Larven des Mehlkäfers (Mehlwürmer), des Speck-, Pelz- und Kornkäfers, Beeren und Obst verschiedener Art sind so die bekannteste Auslese unter den gebräuchlichsten Futter- und Gesangsreizmitteln. Ganz unerwähnt will ich die verwerflichen Futtermittel,

Weißwangenlerche (s. S. 17).

die heute noch in Gegenden Deutschlands üblich sind, wie eingeweichte Semmel, tierische sowie pflanzliche Fette, Maismehl, Weizenkleie usw. nicht lassen, doch haben diese Dinge mit der fortgeschrittenen Vogelpflege nichts mehr zu tun, wenigstens nichts mit der Haltung unserer edlen Sänger. Härtere und größere Vogelarten, wie Drosseln, Stare, Rabenvögel, überhaupt sämtliche Allesfresser, sind mit derartigen Futtermitteln wohl zufrieden, gedeihen und halten dabei in der Gefangenschaft längere Zeit aus.

Wenn ich nun auf Einzelheiten einer individuellen Fütterung näher eingehe, so tue ich dieses nur, um eine Anregung zu geben, dieser wichtigen Fütterungsmethode stets die ihr gebührende Aufmerksamkeit zu schenken, hierzu gehört nichts weiter als ein sehr scharfes Auge, daß die Praxis so wie so mit sich bringt, zur Beobachtung des Vogels, seiner Körperbeschaffenheit und der Einwirkung dieser oder jener Futtermischung auf dieselbe. Ferner muß ich die Gewißheit haben, welche Eigenschaft wohnt diesem oder jenem Futterstoffe inne, wirkt er fettbildend oder entgegengesetzt, und dies etwas zu beleuchten, soll auch mit der Zweck dieser Abhandlung sein. Von einer Zerpflückung dieses oder jenen Futterstoffes in seine, nach Prozenten vorhandenen Bestandteile an Wasser, Eiweiß, Fetten, Mineralen, Kohlehydraten und unverdaulichen Stoffen, will ich, da es nur eine Wiederholung an bereits Geschriebenem bedeuten würde, absehen, noch dazu die in einer der Nummern der Ges. W. v. 1924 abgebildeten „Ornistafel" über die Zusammensetzung unserer Hauptfuttermittel genügend Aufschluß gibt. Mein täglich vor Gebrauch zusammengemischtes Weichfutter besteht aus: Geriebener Möhre, bei Grasmücken auch nach Bedarf aus geriebenem Apfel, gemahlenem Zwieback oder auch weißer Semmel, getrockneten Ameisenpuppen, Weißwurm, gemahlenen Fleischgarnelen, ebensolchen Hanf und Quark oder Weißkäse und aufgequellten oder gemahlenen roten und schwarzen Holunderbeeren. Wenn ich nun dieses „Vielerlei" ohne Berücksichtigung der Art und des Individuums planlos zusammenmischen würde, so wäre, so gut und empfehlenswert diese Bestandteile eines brauchbaren Weichfuttergemisches sind, es ein falscher Weg, der wohl bei diesem oder jenem Individuum Erfolge, bei einem anderen aber auch Mißerfolge bringen würde. Die Praxis hat dem erfahrenen Liebhaber gelehrt, daß ein und dasselbe Futter nicht auch ein und dieselbe Wirkung auf jede Art und jedes Individuum hervorbringt, denn wie oft kommt es vor, daß selbst bei einem nahrhaften Futter ein Vogel ständig unter normaler Körperbeschaffenheit bleibt, während hingegen ein anderes Individuum derselben Art bei demselben Futter zur Fettsucht neigt. Zur Beurteilung dieser öfter in Erscheinung tretenden Tatsache bei der Vogelpflege ist vor allem zu berücksichtigen, ist das in Frage kommende Individuum ein starker Fresser, demzufolge ein guter Futterkonsument und -verwerter, steht ihm eine größere Bewegungsfreiheit zur Verfügung, wie dem Vertreter derselben Art bei demselben Futter, handelt es sich um einen Frischfang oder um einen bereits überwinterten Käfigvogel. Diese Umstände müssen vor allem mit in Betracht gezogen werden, wenn wir uns mit dem Thema: „individuelle Fütterung" erfolgversprechend in der Praxis beschäftigen wollen. (Schluß folgt.)

Weißhaubenhäherling (s. S. 16).

Mein „Seppel".

Von J. Stöß, Mitglied d. F. V. V. d. V. D. „Ornis".
(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Die alte Amsel studiert unbesorgt wieder ihre neuen Frühlingsweisen. Die Finkenhähne jagen sich einander in der bekannten hitzigen Art durch die Voliere, und des öfteren ruht ein besonders dreister Fink in kaum Halbmeterentfernung auf derselben Stange aus, auf der der krummschnäblige Riese sitzt. Nur einmal hat der Turmfalke in meiner Abwesenheit einen Sperling geschlagen und bis auf wenige große Federn verzehrt. Bei ihm handelte es sich aber um einen Frischfang, der in seinem ungestümen Triebe, die goldene Freiheit wieder zu erlangen, dem Falken wahrscheinlich direkt vor die Fänge geflogen ist. Die Kleinvögel sind aber auch auf ihrer Hut. Besonders des Morgens sitzt der Turmfalke gern im oberen Flugloche zur Innenvoliere, um die ersten wärmenden Sonnenstrahlen zu genießen. Hier herrscht sonst reger Verkehr den ganzen Tag über. Aber sobald der immerhin verdächtige Riese diesen Posten besetzt hat, wird das Aus- und Einfliegen unterbrochen. Die Amsel, die sich meist auf dem Boden herum-

treibt, gibt auch im Käfig den wachsamen Polizisten ab. Sobald sich der Turmfalke einmal an einem ungewohnten Orte oder ein etwas auffälliges Wesen zeigt, läßt sie ihr warnendes: „Tack, tack, tack!" vernehmen, und schon herrscht eisige Ruhe in der Voliere, da alle Insassen nur die angezeigte Gefahr im Auge haben und behalten. Betonen muß ich allerdings auch, daß ich nicht durch Darbenlassen den Selbsterhaltungstrieb in meinem Turmfalken gereizt habe. Erwähnt sei auch, daß bei ihm die obere Hälfte des rechten Auges einen grauen Schleier trägt, welcher vielleicht das Sehvermögen doch etwas beeinträchtigt, aber den Vogel sicher nicht unfähig macht, seine Beute zu verfolgen.

Der Lieblingsplatz meines Turmfalken ist dicht an der Vorderseite der Voliere auf einer berindeten Fichtenstange. Hier sitzt er meist träge. Dieses geringe Bewegungsbedürfnis hat mich zu der Erkenntnis gebracht, daß sich der Turmfalke sehr wohl für die Käfigung eignet, unter Umständen sogar für Fesselung mit einer entsprechend leichten Kette. — Wie gesagt, saß mein Turmfalke meist mit eingezogenem Kopfe und einem angezogenen Ständer ruhig auf seinem Platze, so wurde er Anfang Oktober etwas lebhafter. Ziellos durchflog er den Raum, lief hurtig an den Gitterwänden empor. Wahrscheinlich hing dieses Verhalten mit dem beginnenden Zuge zusammen. In dieser Zeit zeigte er sich auch etwas bösartiger. Meine halbwüchsige Katze, die durch das Gitter sehnsüchtig nach den umherliegenden Mäusen spannte, flog er grimmig an. Dasselbe tat er mit meiner in die Voliere gehaltenen Hand, ohne sie aber im geringsten zu verletzen. Doch diese Unruhe legte sich bereits nach wenigen Tagen wieder. Heute läßt er sich vor wie nach selbst beim Fressen ohne Gegenwehr wieder Kopf und Rücken streicheln. Unterhalte ich mich durchs Gitter mit ihm liebkosend, so läßt er ein andauerndes, halblautes, gleichsam bittendes Wispern hören, hält das Köpfchen hoch und schief, gleich als wollte er sich nach Papageienart kraulen lassen. Außer dem eben genannten Wispern habe ich bis jetzt von meinem Turmfalken noch keinerlei Lautäußerungen vernommen. — So ausgiebig des öfteren mein Turmfalke im Badenapfe sein Gefieder durchnäßt, so wenig ist er Freund von unfreiwilligem Naßwerden. Bespritze ich ihn beim Aufwaschen der Hasennäpfe nur ein wenig mit der nassen Bürste, so zieht er sich sofort mißgelaunt in die Innenvoliere zurück. In diesem geschützten Raume hält er sich auch bei Regenwetter auf. Hier verbringt er auch regelmäßig die Nacht. Wie werden ihm da im bevorstehenden Winter Schnee, Eis und Kälte zusagen? Das Trinkbedürfnis meines Turmfalken ist auch ein sehr geringes, trotz der doch hitzigen Fleischnahrung. Nie sah ich ihn den Wassernapf aufsuchen, um nur den Durst zu löschen. Dies tat er nach meiner Beobachtung immer nur in Verbindung mit einem genossenen Bade, das aber durchaus nicht tägliches Bedürfnis zu sein scheint.

Jamesons Amarant (s. S. 16).

So hat also mein Turmfalke recht gut verstanden, sich in kürzester Zeit meine Zuneigung zu erwerben, was übrigens bei meiner ausgesprochenen Tierliebe nicht allzu schwer hält. Aufrichtig leid würde mir es tun, müßte ich mich wieder von ihm trennen. Daß sich der rechtmäßige Eigentümer noch einmal melden könnte, ist wohl kaum zu befürchten. In diesem Falle müßte ich wohl oder übel meine Futterkosten- und andere Ansprüche sehr hoch schrauben, um den Geschmack nach Wiedererwerb nach Kräften zu verderben. Am meisten Spaß machte mir es nun noch, wenn ich den Vogel vollständig frei fliegen lassen könnte. Kann man den Stimmen in der einschlägigen Literatur voll vertrauen, die dies befürworten? Wer hat ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiete? Für diesbezügliche Belehrung wäre ich sehr dankbar. Aber was wäre wohl das Ende vom Liede, beim endgültigen Gelingen des gedachten Unternehmens? Könnte der Falke auch dem Winken der vielgepriesenen Freiheit widerstehen, so wäre doch sehr unwahrscheinlich, daß er für alle Zeiten dem blindwütigen Schießen mancher Gottesebenbilder im mehr oder weniger grünen Rocke entginge.

Da seit Verfassen des vorstehenden Aufsatzes fast ein Vierteljahr verstrichen ist, will ich mir erlauben, folgende Ergänzung zu bringen: Von vornherein muß ich betonen, daß sich im Verhalten meines Turmfalken an und für sich, sowie seinen Mitinsassen gegenüber, eigentlich wenig geändert hat, und doch will ich folgende Erfahrungen nicht unerwähnt lassen: Anfang November stellte ich im Futterhäuschen der Voliere einen Klappbauer auf, um das Pärchen Birkenzeisige zu fangen. Kaum war einer davon hineingegangen, so flog mein Turmfalke herzu und schlug den Hilflosen durchs Gitter des Bauers todwund, so daß er bald verendete. Als ich darauf dem Turmfalken den Leichnam des Leinfinken vorwarf, ließ er ihn bis zum nächsten Tage unbehelligt liegen, ein Beweis, daß dem „Harmlosen" nicht der Hunger, sondern eine Mordgier zu seinem blutigen Handeln getrieben hatte. Also sind hinter der Harmlosigkeit des Turmfalken immerhin einige Fragezeichen berechtigt. Doch

noch eine Beobachtung! Kinder brachten mir für meinen Turmfalken eine tote blaue Taube, die sie wenige Tage nach dem vorstehenden Ereignis auf einem Felde gefunden hatten, wo sie, nach ihrem etwas eingetrockneten Zustande zu urteilen, schon längere Zeit gelegen haben mag. Die Taube war äußerlich unverletzt, hatte wahrscheinlich ihr vorzeitiges Ende an einem Starkstromdrahte der Überlandzentrale gefunden. Diese nahm der Turmfalke sofort unter gleichsam freudig klingendem J-i-i-Gekicher an, brachte sie in der bereits geschilderten Weise in Sicherheit, fing an zu rupfen und fraß sie innerhalb eines Tages auf, obgleich die Voliere seit einigen Tagen stets tote junge, nur zum Teil von dem Turmfalken angeschnittene Kaninchen „zierten". Ist dieses Verhalten des Turmfalken nun ein Beweis dafür, daß er Federvieh anderer Beute vorzieht, oder hatte er gerade einmal ein besonderes Bedürfnis nach Abwechslung in seinem Speisezettel?!

Das Trinkverlangen meines Turmfalken ist, wie schon erwähnt, noch immer ein sehr geringes. Es geht in folgender eigenartigen, gleichsam umständlichen Weise vor sich: Der Turmfalke setzt sich mitten in den Wassernapf, taucht mehrere Male den Schnabel bedächtig ein, ohne Schluckbewegungen zu zeigen, und schüttelt jedesmal heftig den Kopf, was den Eindruck erweckt, als bereite ihm das Trinken durchaus keinen Genuß, sondern er tue es nur gleichsam widerwillig.

Ausstellungen.

Der Verein der Vogelliebhaber zu Lübeck hatte vom 15. bis 17. November 1924 seine **allgemeine Vogelausstellung** im Turnerschaftshaus An der Mauer 55a. Die Ausstellung war interessant und lehrreich, besonders auch für Schulen, und wurde deshalb auch sehr gut besucht, denn es waren insgesamt 295 einheimische und fremdländische Stuben- und Kanarienvögel ausgestellt. Prämiiert wurden die Vögel durch die drei Lübecker Preisrichter, Herren Hagen, Strunck und Sagell. Die Ausstellung war in zwei Abteilungen, Selbstzucht- und allgemeine Klasse, eingeteilt.

In der Selbstzuchtklasse hat Herr Otto Steinhagen am besten abgeschnitten. Es war dem Herrn gelungen, in diesem Jahre zwei sehr seltene Bastarde zu züchten, durch Kreuzung des Erlenzeisigs mit dem Grünhänfling. Beide Tiere waren hübsch in Gestalt und glatt im Gefieder, und waren so die seltensten Vögel der Selbstzuchtklasse. U. a. wurden von demselben Herrn auch sehr schöne Füchse und „Cayenne" gefütterte Kanarienvögel ausgestellt. Herr Otto Steinhagen erhielt deshalb mit 1482 Punkten die Silberne Verbandsmedaille und vier Ehrenpreise.

Herr Marschallek hatte eine schöne Kollektion Füchse und Kanarienhähne ausgestellt und erhielt mit 1043 Punkten die Silberne Verbandsmedaille.

Herr Frank zeigte in diesem Jahre eine große Kollektion Kanarienhähne und -weibchen und japanische Mövchen. Unter ersteren erregten die hochgelben Tiere das meiste Interesse. Er erhielt mit 968 Punkten die große silbervergoldete Vereinsmedaille und einen Ehrenpreis. Eine Anzahl hübscher Stieglitzbastarde und Kanarienweibchen war von Herrn Hänsel ausgestellt worden, und erhielt derselbe bei 838 Punkten die große silberne Vereinsmedaille. Ebenfalls hatte Herr Wischendorf eine Anzahl hübscher Bastarde vom Stieglitz, Rothänfling und Girlitz neben hübschen Isabell-Kanarienhähnen ausgestellt und erhielt mit 773 Punkten die kleine silbervergoldete Vereinsmedaille, einen Ehrenpreis und Wanderpreis auf die meisten ersten Preise der Selbstzucht. Herr Bösel stellte einige Zeisig- und Hänflingbastarde aus und erhielt mit 608 Punkten die kleine silberne Vereinsmedaille. Auf eine Anzahl Kanarienhähne und -weibchen erhielt Herr Erbe mit 574 Punkten die große bronzene Vereinsmedaille. Auf gelbe, bunte und Isabell-Kanarienhähne und -weibchen erhielt Herr Platthoff mit 521 Punkten die kleine bronzene Vereinsmedaille und Trostpreis und Herr Adolf Steinhagen auf grüne Wellensittiche die kleine bronzene Vereinsmedaille mit 110 Punkten.

In der zweiten Abteilung, allgemeine Klasse, hatte Herr Otto Steinhagen ebenfalls am besten abgeschnitten. Seine vorzüglichen großen Käfige ließen einen freien Anblick der Vögel zu. Herr Steinhagen hatte Weichfresser ausgestellt, wie Nachtigall, Gartenrotschwanz und Singdrossel. Alle Vögel waren im gesunden Zustande. Besondere Aufmerksamkeit erregte ein drollig aussehender Steinkauz, der von Herrn Steinhagen selbst großgezogen und deshalb sehr zahm war. Ein großer Käfig mit einheimischen Körnerfressern, wie Stieglitz, Erlenzeisig, Rothänfling, Grünhänfling, Goldammer, Bergfink, Buchfink und Girlitz machte sich besonders gut aus. Zwei besonders seltengezeichnete Stieglitzbastarde mit weißem Unterleib und hellen Flecken an Kopf und Flügel lenkten das Auge des Kenners auf sich. Auch ausländische Vögel hatte Herr Steinhagen ausgestellt, wie Wellensittiche, Bandfinken, Grauedelsänger, Grauastrilden, rote Amaranten und Schmetterlingsfinken. Für die vielen Kollektionen in- und ausländischer Körner- und Weichfresser, und Kanarienvögel erhielt Herr Steinhagen die silberne Verbandsmedaille und 4 Ehrenpreise bei 1868 Punkten.

Herr Adolf Steinhagen hatte deutsche Waldvögel, Kanarienvögel und Wellensittiche ausgestellt und erhielt mit 678 Punkten die große silbervergoldete Vereinsmedaille. Herr Bösel bekam auf deutsche Waldvögel und Kanarienvögel mit 665 Punkten die große silberne Vereinsmedaille. Herr Wischendorf auf deutsche Waldvögel und Sperlingstäubchen mit 598 Punkten die kleine silbervergoldete Vereinsmedaille.

Herr Platthoff stellte Kanarienvögel, deutsche Waldvögel und Girlitzbastarde aus und erhielt bei 399 Punkten die kleine silberne Vereinsmedaille. Herr Sagell hatte zwei allerliebste, selbst aufgezogene Steinkäuze und eine Kollektion deutscher Waldvögel ausgestellt und bekam mit 380 Punkten die große bronzene Vereinsmedaille. Herr Bredernitz erhielt auf eine Kollektion Kanarienhähne mit 346 Punkten die große bronzene Vereinsmedaille. Herr Haensel hatte mehrere Kanarienweibchen und eine Gruppe deutscher Körnerfresser ausgestellt und erhielt bei 346 Punkten die große bronzene Vereinsmedaille. Herr Marschallek bekam ebenfalls die große bronzene Vereinsmedaille auf Wellensittiche, japanische Mövchen und Grauedelsänger, die zusammen 271 Punkte erhielten. Herr Zembsch erzielte auf Wellensittiche und deutsche Waldvögel u. a. einem hübschen roten Kreuzschnabel 270 Punkte und bekam die kleine bronzene Vereinsmedaille. Herr Frank erhielt ebenfalls die kleine bronzene Vereinsmedaille bei 179 Punkten auf Kanarienvögel und Wellensittiche, Herr Erbe die kleine bronzene Vereinsmedaille bei 176 Punkten auf Kanarienhähne und Weibchen. Herr Matiessen hatte einen großen Buntspecht ausgestellt im guten Ernährungszustand und Gefieder, ein Vogel, der sehr schlecht in einem Käfig zu halten ist, und den man deshalb meistenteils in der Natur von weitem zu sehen bekommt. Niedlich war es anzusehen, wenn der Vogel an einem ihm in den Käfig gestellten Stück Baumstamm auf- und abkletterte und mit dem Schnabel auf denselben einhieb, als wollte er ihn in Stücke schlagen. Dabei stob die Borke in seinem Käfig. Der Vogel brachte seinem Besitzer 60 Punkte ein, wofür letzterer eine kleine bronzene Vereinsmedaille und einen Trostpreis erhielt.

Alle Vögel waren in gutem Gefieder und Ernährungszustand und erfreuten die Besucher der Ausstellung durch ihr trautes und anmutiges Wesen. Leider war der Saal für die große Menge Vögel in der regen Besuchszeit zu eng, und es wäre besser gewesen, wenn ein anderer Saal zur Ausstellung hinzugenommen wäre. Die Ausstellung war jedoch ein Zeichen, daß auch hier in Lübeck sehr viele Vogelliebhaber sind, die in ihrer Liebhaberei vollständig aufgehen und nicht müde werden, neue Zuchtversuche an einheimischen und fremdländischen Vögeln anzustellen.

Mit der Ausstellung zugleich wurde eine Verlosung von Vögeln veranstaltet, bei der eine Anzahl deutscher und ausländischer Stubenvögel vergeben wurde. Am Sonnabend darauf war für die Mitglieder des Vereins mit ihren Damen und für die Preisrichter ein Essen im Vereinslokal mit nachfolgendem, vergnügtem Beisammensein.

Hermann Bösel, Schriftführer.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 4. Können Vogelliebhaber Auskunft geben, ob Bastarde untereinander zeugungsfähig sind? Wenn ja, in wie weit und welche Kreuzungen.

Wilh. Maresch, Schriftführer.

Antworten.

Auf Frage 1. Bei Verwendung von Zinkfreßgeschirren ist in Betracht zu ziehen, daß Zink sich auch in ganz verdünnten Säuren zu mehr oder weniger giftigen Salzen löst. Da nun Weichfresser, besonders Sylvien, mit zerriebenen Früchten, Obst usw. gefüttert werden, die so ziemlich alle Fruchtsäuren enthalten, so muß eventuell mit einer Zinkvergiftung gerechnet werden; gut verzinnte Gefäße zeigen diesen Übelstand nicht, können aber, wie auch z. B. Aluminium, die Farbe des Futters beeinflussen. Glas oder Porzellan ist unter allen Umständen als reinlicher und hygienischer vorzuziehen. R. Haefner, Apotheker.

Auf Frage 1. Zink — Zn — aus Galmei gewonnen, wird zwar als Blech zu Eimern, Badewannen, Dachrinnen, zur Dachbedeckung, ferner zu Legierungen, galvanischen Elementen usw. verwendet, jedoch empfiehlt es sich für genannten Zweck nicht. In trockener Luft seinen Glanz längere Zeit behaltend, läuft es bei Feuchtigkeit derselben an und bedeckt sich mit einer grauen Schicht. In Verbindung mit Säuren löst es sich um so schneller, je weniger rein es ist, und käufliches Zink enthält fast immer Teile anderer Metalle: Blei, Kupfer, Arsen usw. Da Weichfutter besonders im Sommer leicht säuert, und erst recht bei nicht ganz sorgfältiger Vogelpflege liegt immerhin die Gefahr nahe, wie ich vor langen Jahren feststellen mußte, durch Benutzung derartiger Gefäße zarte Insektenfresser gesundheitlich zu schädigen. Ich habe sie deshalb später nicht mehr in Gebrauch genommen. Schilling.

Reichsverband d. Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Tauschvermittlung T.-V.: Richard Borwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39; Kassierer Werner Geßler, Leipzig, Dresdner Str. 2.

An unsere Mitglieder!

Während der diesjährigen Ausstellungssaison macht sich wieder die Unsitte recht bemerkbar, Vögel, seien es Exoten oder Waldvögel, das ist einerlei, zu verlosen. Haben sich die die Ausstellung gebenden Vereine und deren Mitglieder nicht überlegt, welchen Schaden diese Unsitte unserer Liebhaberei zufügt? Scheinbar wird dieses gedankenlose Unterfangen geübt, um einen Anreiz zum Besuche der Ausstellung zu bieten, zur Werbung der noch abseits stehenden Liebhaber aber ganz gewiß nicht. Wie oft kommt es vor, daß die verlosten Tiere in die Hände Sachunkundiger gelangen, die weder für die Vögel Käfige haben noch wissen, welche Pflege und welches Futter die Vögel haben müssen. Ist das Vogelschutz, den die Liebhaber durch solche Verlosungen ausüben? Sicher nicht! Die Hände weg von derartigen Veranstaltungen. Wenn man dadurch die Unkosten zu decken gedenkt, dann lieber keine Ausstellung. Der Besuch der Ausstellung allein nützt uns Liebhabern gar nichts, wenn nicht alles vermieden werden kann, was zum Schaden der Vogelwelt gereicht. Man soll durchaus nicht auf dem Standpunkte stehen, es seien nur Exoten oder einige Vögel der gewöhnlichsten Arten. Jede Vogelverlosung ist so lange verwerflich, als nicht die Sicherheit vorhanden ist, daß der Gewinn in die Hände eines sachkundigen Liebhabers kommt. Mit einer öffentlichen Verlosung ist die Gewähr niemals gegeben und diese daher durchaus nicht zu billigen.

Im Interesse unserer guten Sache, die an sich schon genügend Feinde hat, müssen wir alle Vereine und Liebhaber, einerlei, ob sie dem Reichsverbande angeschlossen sind oder nicht, auffordern, den gerügten Übelstand mit den stärksten Mitteln zu bekämpfen, wo immer er zutage tritt.

Der Zweck der Ausstellung ist, die Allgemeinheit davon zu überzeugen, daß die Vogelkäfigung guten Sinn und Zweck hat, und nicht, um durch Verlosungen von Vögeln Gewinn zu erzielen. Es wird bestimmt erwartet, daß die Liebhaber danach handeln, dann werden wir mehr Freunde als Feinde haben. J. A. Petters, 1. Schriftführer.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf dem Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

K. Buchholz, Schneidemühl, Brückenstr. 4. Norwich-Kanarien.

H. Ditzell, Leipzig, Wilhelmstr. 68, Telephon 52275. 1,1 gehaubt. Glanzkäfertauben, 1,0 Rosttäubchen, weißbäckige Lerchen.

Max Kleinert, Berlin NO 18, Strausbergerstr. 13, Fernruf Alexander 3313. Roter Arara, Große Alexandersittiche, kleine Alexandersittiche, Tarant. Unzertrennliche, Goldstirnblattvögel, roter Kardinal, Katzendrosseln, Soldatenstare, langschwänz. Glanzstare, Albinodrossel, Zebrataubchen, Gilb-, Tahaweber, kleine Kubafinken, schwarzköpfige Gouldamadinen.

Math. Lefebre, Merzig, Saar, Postfach 115. 1,0 Somalibülbül.

Pippel, Gestemünde, Ludwigstraße 8III. 1,1 Nandaysittich.



Herrn H. R., Hamburg. Besten Dank für freundliche Benachtigung.

Herrn H. H., Braunschweig; Herrn Dr. L., Brüssel; Herrn A. Th., Altona; Herrn P. Sch., Leipzig: Beiträge dankend erhalten.

Herrn F. H., Erfurt. Das derartige Fehler entstehen, erklärt sich sehr einfach aus dem Umstand, daß bei den Einsendungen und Anfragen Orts- und Personennamen so undeutlich geschrieben sind, daß es geradezu ein Glücksfall ist, wenn sie richtig wiedergegeben sind, das ist z. B. auch bei der Wohnungsangabe des Beschwerdeführers der Fall.

Herrn K. H., Berlin-Baumschulenweg. Das Buch befindet sich im Druck. Die andere Anfrage wird durch einen besonderen Artikel, der rechtzeitig erscheinen wird, erledigt.

Herrn A. Th., Altona. Der Brief ist weitergesandt.

Herrn St. Qu., Reichenberg. Die „Internationale Vogelschutzkonvention" wurde im Jahre 1902 in Paris abgeschlossen. Sie ist auch von der ehemaligen Österreich-Ungarischen Regierung unterzeichnet. Im „Handbuch für Vogelschutz" von Dr. Karl R. Hennicke, Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, ist die Konvention im Wortlaut wiedergegeben.

Herrn K. G., Wiesbaden. Das Blaukehlchen litt an krampfartigen Anfällen. Sobald diese sich wiederholen, ist mit dem Eingehen des Vogels zu rechnen. Wodurch diese Anfälle hervorgerufen wurden, ist nicht zu ermitteln, wenn man die Umstände, unter denen der Vogel gehalten wurde, nicht näher kennt.

Herr G. B., Nassau. Das Verbreitungsgebiet des Goldstirnsittichs ist Guinea bis Paraguay und Bolivien. Den G. mit Wellensittichen zusammenzuhalten ist nicht ratsam, da der G. kleinere Papageien verfolgt und verwundet. Ein G. wird am besten allein im Käfig gehalten. Wenn es dann gelingt ihn zu zähmen, ist es ein sehr netter Vogel. Ernährt wird er mit Spitzsamen, Hirse, Reis in Hülsen, Hafer, Hanf, Früchten, Grünkraut, frischen Zweigen und Blattknospen.

Herr A. H. D. ♀Bandfink konnte ein schalenloses Ei nicht legen. Es ist in Folge von Legenot eingegangen.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

Jahrgang 54 22. Januar 1925 Heft 4

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Über die künstliche Aufzucht junger Papageien. Von Friedrich von Lucanus, Berlin.

Die Vogelschau zu Hamburg. Von A. Weber.

Ein weiterer Beitrag zur Fütterung der Prachtfinken. Von Rudolf Neunzig.

Atlantische Vögel. Von Adalbert Athen, Hamburg. (Forts.)

Individuelle Fütterung. Von J. Birk, Leipzig. (Forts.)

Mein „Seppel". Von J. Stöß, Mtgl. d. F. B. V. d. V. D. „Ornis". (Schluß.)

Ausstellungen - Sprechsaal - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.) Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen. Alle Vereine und Liebhaber, die unserem Verbande bereits angeschlossen sind, bitten wir an dieser Stelle nochmals, die restlichen Mitgliedsbeiträge unserem Kassierer Herrn Erich Merz, Berlin-Friedenau, Wilhelm-Hanff-Str. 14 II, umgehend einzusenden. Vereine und Liebhaber, tretet unserem Verbande bei und unterstützt unsere gute Sache. J. A.: Erich Merz.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden. J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aufgenommen ist Mitglied 84 n Herr Heinz Appel, Fabrikbesitzer, Hannover, Nienburger Str. 7 A/I.

Das Jahrbuch 1925 ist 96 Seiten stark und enthält 29 S. Bestandsangaben von 233 Mitgliedern, die über einen Gesamtbestand von 8093 Köpfen verfügen, darunter 5699 Exoten, 784 einheimischen Körner- und 291 Weichfresser, 1196 Gesangs- und 223 Farben- resp. Gestaltskanarien. Die Mitgliederzahl beträgt 346. Der textliche Teil enthält hervorragende Aufsätze von Stefani über die bis heute gezüchteten Farbenvarietäten des Wellensittichs, von Dr. Weigold über Käfigvögel der Chinesen, von Haberlandt über Beleuchtungsarten der Vogelstuben, verschiedene Zuchtberichte u. a. m. Mit dem Versand wird sofort nach Fertigstellung begonnen. Ich verweise auf die Bekanntmachung in Heft 3.

A. Krabbe.

Aus den Vereinen.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen. J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monates im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen. J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurter Str. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. V.: Emil Ivo, Schriftführer.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein Vogelschutz u. -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstr. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Bernhard Kühn, Vors.

Generalversammlung am 8. Januar 1925. Die Versammlung wurde vom 1. Vorsitzenden Herrn Kühn eröffnet. Nach einem herzlichen Willkommensgruß an die zahlreich erschienenen Mitglieder (28 Mann) wurde die reichhaltige Tagesordnung von 12 Punkten bekanntgegeben. 1. Eingänge verschiedener Zeitungen und Schreiben. 2. verliest Unterzeichneter die letzte Niederschrift. 3. wurden die Herren Knöfel und Pöblein als Mitglieder aufgenommen. 4. wurde ein Schreiben vom Landesverband verlesen. 5. wurde über verschiedene Zeitungen berichtet. 6. Infolge Stärkerwerden des Vereins macht sich ein Lokalwechsel notwendig. 7. wurde ein Bericht über die abgehaltene Ausstellung verlesen, welche uns einen Reingewinn von 200.— M. eingebracht hat, ferner wurde das Protokoll über die Prämiierung verlesen und nach diesem die Preise verteilt, welche in 2 Uhren, 7 Büchern, 1 Vase und 1 Geldpreis von 10.— M. bestanden. Zu Punkt 8 wurde unser langjähriges Mitglied und Kassierer Herr Paul Baudisch als Ehrenmitglied ernannt. Er dankte in rührendsten Worten. 9. gab unser 2. Kassierer Herr Curt Köhler den Kassenbericht bekannt, welcher wie folgt lautet:

Gesamteinnahmen 1924	M. 527.97
Gesamtausgaben „	„ 327.24
Kassenbestand am 1. Januar 1925	M. 200.73

10. berichtete unser ornithologische Leiter Herr Paul Heinrich über die abgehaltenen ornithologischen Abende. 11. verliest Unterzeichneter den Jahresbericht nebst der Jahresanwesenheit der Mitglieder. 12. erfolgte die Neuwahl des Gesamtvorstandes, welcher sich wie folgt zusammensetzt: 1. Vorsitzender Herr Paul Burghard, 2. Vorsitzender Herr Joseph Schreiber, Kassierer Herr Curt Köhler, ornithologischer Leiter Herr Paul Baudisch, Schriftführer und Schrankwart Unterzeichneter. Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 20. Januar 1925. Gäste, auch Exotenliebhaber, stets willkommen. J. A.: Arnold Weber, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden, Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. A. Voigt, Schriftf.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst., Boppel, 1. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. d. M., abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 22. Jan. 1925. Gäste stets willkommen.

Der Vorstand. J. A.: J. Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen. K. Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.



„Ornis", Freie Bezugs-Vereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands. Gegründet 1912. Auf vielseitigen Wunsch der alten Mitglieder wollen sich die Waldvogelliebhaber wieder in der „Ornis" zusammenschließen. Als amtliches Organ ist die „Gef. Welt" ausersehen worden, und werden die Artikel, die früher in den „Ornis-Blättern" erschienen, in obiger Zeitschrift gebracht werden. Aus diesem Grunde bittet die Geschäftsführung um eifrige Mitarbeit, damit unserer Waldvogelpflege wieder der Platz eingeräumt wird, der ihr gebührt. Anmeldungen sind unter Beifügung von 2 M. an den Geschäftsführer zu richten; Mitglieder erhalten auf Mischfutterbestellungen 5% Rabatt. Mit treudeutschem Gruß Martin Sperling, Halle/S., Südstr. 49.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am zweiten Mittwoch eines jeden Monats Versammlung im Alten Fritz, Berliner Straße. Beginn 8 Uhr. Gäste sind willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Magdeburg-West, Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlung aller 14 Tage, Samstag abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken", S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. Daubmann, 2. Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Vereinslokal jeden zweiten Mittwoch im Monat. Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Bayrischer Vogelliebhaberverein, Sitz München (E. V.). Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft im Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Rud. Engel, 1. Schriftf.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Gäste stets willkommen. Donnerstag, dem 5. Februar 1925, abends 8 Uhr, Generalversammlung. — Sonnabend, dem 7. Februar 1925, im Künstlerhaus, Bosestraße, 27. Stiftungsfest, verbunden mit Konzert, Vorträgen, Theater und Ball, wozu alle Freunde und Gönner des Vereins herzlichst eingeladen sind.

J. A.: J. Birk, 1. Vors.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.

K. Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Unsere nächste Versammlung findet am Mittwoch, dem 4. Februar, abends 8 Uhr, bei unserem Mitgliede Herrn Normast im Gasthof „Kaiser Friedrich," Breslauer Str. 50, statt. Liebhaber sind als Gäste willkommen. Wichtige Tagesordnung.

J. A.: Friedrich.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am zweiten Mittwoch eines jeden Monats Versammlung im Alten Fritz, Berliner Straße. Beginn 8 Uhr. Gäste sind willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Magdeburg-Westl, Schenkendorffstr. 14.

Der **Verein der Vogelliebhaber Mannheim** hält aller 14 Tage im Restaurant zum goldenen Falken seine Mitgliederversammlung ab. Nächste Versammlung am Freitag, dem 6. Februar und 20. Februar 1925 und so fort. Freunde und Gönner stets willkommen.

Der Vorstand. J. V. Rutschle, 1. Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). An jedem zweiten Mittwoch im Monat findet in unserem Vereinslokal „Parkhotel", Epinaystraße 1, unsere Versammlung statt. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an.

Franz Heinrich, 1. Schriftf

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegründet 1. Mai 1923. Vereinsabende aller vier Wochen, in der ersten Woche des Monats verbunden mit Vortrag, in der dritten Woche jeden Monats nur gesellige Zusammenkunft. Vereinslokal „Sächsischer Hof". Gäste stets willkommen. Studienrat Professor Jahn 1. Vorsitzender; Werkmeister Mann 2. Vorsitzender; kaufm. Angestellter Reinhardt Schriftführer.

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

J. A.: Paul Schmidt, 1. Vorsitzender, Zwickau i. S., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per ef od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

käfige u. Gerätschaften

Neueste **Preisliste** über alle Arten

ogelkäfige

z Hartholz versendet gegen Einsendung von 25 Pfg. in Marken

Thür. Vogelkäfig-Fabrik

dolf Vogt & Co.

Ebeleben 667.



hlagnetze für Sperlinge, Amseln . 2.50 M, für Tauben, Rebhühner . 4.50 M. Nachn., bei Voreinsendung Betrag. franko. [168] Fangnetzfabrik **S. A. Müller, Schlotheim Th. 3.**

liere, sehr gut erhalten, ganz von all. 100 cm lang, 82 cm hoch, 42 cm für kleinste Exoten passend, mit Verpackung 40 M.

Josef Ehrlich, Würzburg, Weißenburgstraße. [169

Flugkäfig

br., 70 tief, 90—1.10 hoch 70—80 M.

Insektenfresserkäfig

reit, 37 hoch, 25 tief Stück 15 M.

zinnte u. lackierte Drahtkäfige

nd ohne Glaswände Stück 6—10 M.

Messingkäfig

mit Glaswänden 15—18 M.

gständer und Tische 9—15 M.

Harzer Roller 9—12—15 M.

Vorsänger 20—30 M.

Zuchtweibchen 3—4 M.

Stenger, München,

Türkenstraße 53/2.

vom Sieger- u. Gruppenmeisterspreis. — Eigene Großzüchterei. olle Garantie und Reellität.

Das Wichtel.

nan einen ausgestopften Steinkauz, dann ist das Wichtel zum Rufen behrlich. Voreinsendung 2 Mark.

ann Fischer in Waldsassen, Mitterteicherstraße 54.

Reform-Käfige

Zerlegbar, Leichteste Reinigung, Einfachster sicherer Transport

1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919/22 (siehe Gefiederte Welt 1920, Heft 14—16), Goldene Medaille Leipzig 1921/22 werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannäpfe, Ledertuchdecke.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!

Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.

Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe

Heck-, Flug-, Einsatz-Käfige.

Ausstellungs-Käfige nach Vorschr. d. V. D. K.

Transport-Käfige, jeden Posten.

Anfragen Rückporto beifügen. Katalog gegen Einsendung von 0,50 M. in Briefmarken. [172

Schlagnetze ohne Mittelsteg

für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware.

Kühn & Muschter, Leipzig,

Promenadenstraße 29. Telephon 10 226.

Bankkonto: Allgem. Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna; Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506. — Postscheck.: Leipzig 92 250. Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Wer auf eine ausgiebige, gesunde Nachzucht rechnen will

der verabreiche täglich den Weibchen „L. K." trocken so viel sie fressen mögen, den Hähnen „L. K." mit geriebener Karotte angefeuchtet, täglich 1 Teelöffel gestrichen vorgesetzt. [173

Ich liefere franko jeder Poststation:

Postkolli 8 Pakete 1/2-Kilo-Packung inkl. . . 11,— M
1 Paket 1/2-Kilo-Packung inkl. . . . 1,20 M
Probe-Beutel franko . . . . . 0,80 M

Ia. Rübsen, Glanz, Hanf, Mohn, Schälhafer, Hirse, Sepia usw. stets zu billigen Tagespreisen am Lager.

Lorenz, Dresden, Drehgasse 5.

Futtermittel

Vogelfutter [174

für **Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser.** Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,

Tröndlinring 1. Telephon 14 958.

Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Ia Deutsche Ameisenpuppen (1924) pro Pfund 8 M.

Ia Elbweißwurm (1924), pro Pfund 5 M. [175

Ia Muska (Zecke), neue Ernte pro Pfund 3 M.

Fleischkrissel (vollfett) . . p. Pfd. 0.50

Waffelbruch (gemahlen) p. Pfd. 0.60

Weichfutter I für Drosseln usw. pro Pfund 1 M

Weichfutter II für bessere Weichfresser pro Pfund 2 M

Versand erfolgt per Nachnahme od. Voreinzahlung des Betrages zuzüglich Porto und Verpackung auf Postscheckkonto Berlin 149951.

Hermann Arold, Berlin N 58, Fransecky-str. 4.

Weisswurm

(vorzügl. Vogelfutter) liefert ab Schandau i. Sa, verzollt, solange Vorrat reicht,

Rudolf Frolik,

Rongstock-Nestersitz bei Bodenbach, 176] Böhmen. Muster gratis.

Insektenmehl

fein gemahlen, in Päckchen von 1 1/2 Pfd. gegen Voreinsendung von 2 M franko einschl. Verpackung. [177

A. Böcher & Co., Heidelberg-Kirchheim.

178] **Mehlwürmer,** reine Ware, gegen Eins. von 1.75 M 1/4 Pfd. franko.

Th. Witte, Niederndodeleben b. Magd.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co., Biesenthal I (Mark).** [179

Mehlwürmer Pfd. 5 M, 6 Pfd. 30 M frc. Nachn. 180] **Jeltner, Breslau,** Weinstr. 12.

Mehlwürmer

à Pfund 5 M, bei 6 Pfund Porto und Verpackung frei.

Ia Ameiseneier . . . à Pfd. 7 M
Ia Weißwurm . . . à „ 6 M
Ia Muska-Zecken . . à „ 3 M
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen . . . . à Pfd. 1 M
Ia Garnelen, gem. à Pfd. 0.40 M

Ia Universalfutter.

Aleckwa I für Nachtigallen 22 M
„ **II für Grasmücken** 1.80 M
„ **III für Drosseln** . 1.50 M

Proben und Analysen zur Verfügung. Vertreter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [181

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser

A. Eckrich II., Waldsee (Pfalz).

Mehlwürmer rein vegetabilisch ernährt, à Liter (ca. 600 g) R.-M. 3.—, 1/4 Liter (ca. 150 g) R.-M. 2.— **franko** bei Voreinsendung des Betrages. [182

Bonitas-Versand, Rostock i. M. III.

Prima Ameiseneier pro Pfund 8.— ℳ
„ Weißwurm „ „ 8.— ℳ
„ Muska „ „ 3.— ℳ
„ Trocken-Eigelb „ „ 4.— ℳ
„ Körnerfutter „ „ 0.60 ℳ
Versand erfolgt per Nachnahme oder vorher. Einsendung. [183
Postscheckkonto: Berlin Kt.-Nr. 158990.
Friedr. Gust. Müller, Zoolog. Handl., Berlin SW 61, Blücherstr. 61.

Vögel

Hochedle Gesangs-Kanarien

tourenreiche, fleißige Sänger (Edelroller). **Rein gelbe Gesangs-Kanarien**, Hähne sowie Zuchtweibchen, auch geeignet für Bastardzucht. Garantie: Versand nur kerngesunder Vögel, streng reelle Bedienung. Zuchtpärchen 20 ℳ.

J. Franke, Dresden A
Lortzingstraße 3. [184
Prämiiert: Vogel-Ausstellung Dresden 1924 „Goldene Medaille".

Distelfink × Kanarie

wundervolle Zeichnung, fl. Sänger, 20 Mark. [185
Brune, Hude (Oldenburg)

Weißes Kanarienweibchen

zu kaufen gesucht.
Albert Edelmann, [186
Berlin-Friedenau, Elsastraße 4.

20 Kanarien-Hähne, 20 Kanarien-Weibchen,

(Knorr, Hohl, Schockel)
hat abzugeben. [187

Heinrich Leverkus, Barmen-Rittershausen,
Meyerstraße 36.

2,0 Isabell-Kanarien à 20 ℳ
2,0 Stieglitzbastarde à 15 ℳ
1,0 Hänflingsbastard 15 ℳ
Max Wischendorff, Lübeck,
Hüxstraße 89. [188

Suche: Rot- und schwarzköpfige
Gouldamadinen,

auch einzelne Tiere, zu kaufen. [189
E. Thieß, Zwenkau bei Leipzig.

Heidelerche

zu kaufen gesucht.
Offerten mit Preis unter **L. F. 100** an die Geschäftsstelle der Gefiederten Welt erbeten. [190

Achtung! **Ausschneiden!**

Echt engl. Farbfutter

Garantiert unschädlich — ohne Schärfe
Zum Züchten von orangeroten Kanarien.
Erfolg sicher!
Viele Dankschreiben beweisen es!
150 g Blechdose 2.30 Mark,
bei 10 Dosen à 2.20 „
„ 25 „ à 2.10 „
Voreinsendung am besten, da Nachnahme verteuert.
[191 **Genaue Gebrauchsanweisung liegt bei.**
Auslandsversand!
Martin Schöll, Garmisch (Oberbayern).

Südd. Vogelexporthaus J. Götz, Neu-Ulm (Bayern)

hält am Lager in schön befiederten gesunden Exemplaren und bietet freibleibend an:

Schamadrosseln, Männchen 50—70 M., je nach Sangesleistung, Zuchtweibchen 60 M.; Dayaldrosseln, Männchen 60 M., Zuchtweibchen 60 M.; Damadrosseln, Männchen 60 M.; Caprötel 100 M.; Klarinos 80 M.; Silberrohrsonnenvögel 60 M.; blaue Japan. Fliegenschnäpper und braunbrüstige Blauschnäpper Stück 50 M.; Braunscheitel-, braunköpfige Goldaugen- und Zwergtimalien in Rotkehlchengröße Stück 45 M.; siebenfarbige Tangaren Stück 50 M.; Zuckervögel (Guit-Guits) Stück 50 M.; Gangesbrillenvögel Paar 50 M.; Wagler's Trupial, Spiegeltrupial Stück 50 M.; Prachtglanzstare, gut singend, Stück 30 M.; afrikan. Glanzstare, große Art, 18 M.; langschwänzige Glanzstare Stück 15 M.; Soldatenstare Paar 20 M.; feuerrote Kardinäle, Männchen 35 M., Zuchtweibchen 40 M.; rotgehäubte und Dominikanerkardinäle Stück 9 M.; Weißkopfviehweber Stück 12 M.; blaue mexikan. Kernbeißer Stück 35 M.; Peru-Grünhäher Stück 35 M.; schwarzkäppige Blauhäher Stück 35 M.; Guatemalastitsche Paar 38 M.; Blumenau- und Kaktussittiche Paar 18 M.; Pflaumkopfsittiche, etw. best. Gefieder, Stück 15 M.; grüne Wellensittiche, unausgefärbt, Paar 12 M.; gelbe Wellensittiche Paar 15 M.; tarant. Zwergpapageien Paar 30 M.; Timneh-Graupapageien Stück 90 M.; Kongo-Graupapageien, sehr gelehrig, schon sprechend, Stück 120 M.; Müller's Edelpapageien Stück 45 M.; Liebestäubchen Paar 15 M.; Halsbandtäubchen Paar 8 M.; Bronzefleck-, Palm- und Kaptäubchen Paar 10 M.; Lachtauben, gelb, Paar 8 M.; Glanzkäfertauben Paar 35 M.; Papstfinken und Indigofinken, Männchen 18 M., Weibchen 9 M.; Orangeblaufinken Paar 50 M.; kleine Kubafinken Paar 20 M., Männchen Stück 6 M.; große Kubafinken Paar 15 M.; Schmuckpfäffchen Paar 15 M.; Jakarinifinken Paar 15 M., Weibchen 7.50 M., große Textorweber Paar 10 M, kleine Textorweber, i. Pr., Paar 10 M.; dottergelbe Weber Paar 6 M.; Gilbweber Paar 6 M.; Blutschnabelweber Paar 4 M.; Feuerweber, grau, Paar 3 M.; Gelbkehl- und Swainsonsperlinge Stück 5 M.; Brasil. Kurzschnabelgirlitze Paar 12 M.; Atlasfinken i. Pracht Paar 5 M., grau, Paar 3 M.; Silberfasänchen, Bandfinken, Schmetterlingsfinken, Amaranten, Grauastrilde Paar 4 M.; Schönbürzelchen Paar 6 M.; Zwergmaskenweber Paar 10 M.; Tigerfinken, hochrote, Paar 5 M. In 6 Tagen eintreffend: Sonnenvögel (chin. Nachtigallen), Nonnen, Muskatfinken, Reisfinken usw., Weißwangenlerchen Stück 6 M.; Erlen- und Birkenzeisige Stück 3 M., Weibchen 1.50 M.; Zitronenzeisige, Männchen 6.50 M., Weibchen 3 M.; Dompfaffen Paar 6 M.; Kreuzschnäbel, rot, 4.50 M., grün, 3 M., Weibchen 1.50 M.
Lapunderaffen Stück 60 M. [192

Versand gegen Nachnahme unter Garantie lebender Ankunft.

Alfred Troschütz,

Buchhändler und Antiquar
Hannover

Postscheck-Konto: Hannover 200 (Cr
Buchhandlung), Große Aegidienstr.
Demnächst erscheint zum Preise von et
M. 8.— (Porto besonders)
Rich. Schlegel, „Die Vogelw des nordwestl. Sachsenlandes
Versuch einer Avifauna der Leipzi
Flachlandsbucht, zugleich ein Beitrag
Zoographie des Freistaates Sachse
Aus dem Inhalt: Die heimi
Vogelwelt in ihrem Werden, Verände
und gegenwärtigen Bestand. Allgeme
Charakteristik der heimischen Vogelw
Geschichtlicher Überblick über die or
thologisch-faunistische Erforschung der H
mat. Systematisches Verzeichnis
Arten und Vergleiche mit den das
biet umgebenden Lebensräumen.
matliche Sammlungen. [

Gustav Reiß

Zoologische Großhandlung
Berlin C 25
Gontardstraße 4. Gegr. 1876
empfiehlt:

Graupapageien, sprechend und pfeifend	Stck.	160.
Große Alexandersittiche	„	20.
Kleine „	„	12.
Pflaumenkopfsittiche, Männch., prächtig ausgef.	„	18.
Toysittiche, leicht zahm werd.	„	16.
Kaktus „	„	9.
Mönchssittiche, sprechen lernend, zahm werdend	„	7.
Blaubür. Sperlingspapag.	„	10.
Tarant. Inseparables	Paar	50.
Gelbe Wellensittiche	„	19.
Grüne „	„	16.
Dreifarb. Glanzstare	Stck.	20.
Glanzstare	„	6.
Schamadrosseln im vollen Gesang	„	60.
Schamadrosselweibchen	„	60.
Dayaldrosseln	„	60.
Chinesische Nachtigallen Männchen	„	15.
Weibchen	„	5.
Graue Kardinäle mit roter Haube	„	10.
Dominikaner Kardinäle	„	8.
Rotkopfamadinen	Paar	16.
Goldbrüstchen aus Südafrika	„	10.
Amaranten „	„	10.
Helenafasänchen „	„	10.
Blaubrüstige Astrild. „	„	15.
Bombay-Tigerfinken	„	
Senegalfinken, wie Schmetterlingsfin Amaranten, Bandfinken, Atlasfin Webervögel	Paar	
Prima Kanarienvögel, Männch. feinste Roller	Stck.	17 bis 2
Kanarien-Weibchen	Stck.	
Kreuzschnäbel, Männchen	„	
Zeisig, Männchen	„	
Helle u. dunkle Kapuzineraffen	„	11.
Java-Affen	„	7.
Rheius-Affen	Stck.	40.— bis 6
Südafrik. Gelenkschildkröten	Stck.	2
Erd-Eichhörnchen aus Süd-Afrika	Paar	

Sämtliche Utensilien zur Zuch Pflege der Vögel, ebenso pr Vogelfutter.

Heidelberger Vogelfutter

Auf unsere zum Versand gekommenen Probesendungen sind uns ohne Aufforderung zahlreiche Anerkennungen und Dan schreiben zugegangen, die sich fast alle ausnahmslos dahin aussprechen, daß nur

Heidelberger Vogelfutter

eine Überwinterung aller, auch der zartesten Weichfresser garantiert. Vielen Anregungen entsprechend, beabsichtigen wir allen größeren Plätzen Verkaufsniederlagen zu errichten, bei denen unsere Fabrikate auch in kleinen Packungen zu hab sind. Wir bitten daher Firmen und Vogelliebhaber, die für den Verkauf Interesse haben, sich umgehend mit uns in Ve
[195 bindung zu setzen.

A. Böttcher & Cie., Fabrik für Heidelberger Vogelkäfige und Vogelfutter, Heidelberg-Kirchhein

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 14
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 29. Januar 1925 | Heft 5

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Über die künstliche Aufzucht junger Papageien.

Von Friedrich v. Lucanus, Berlin.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Die alten Papageien atzen ihre Jungen bekanntlich in der Weise, daß sie den Schnabel des jungen Vogels mit ihrem Schnabel erfassen und dann den im Kropf aufgeweichten Samen in den Schlund hineinwürgen. Die jungen Sittiche sperren also nicht die Schnäbel auf, um sich füttern zu lassen, wie es z. B. junge Stare und andere Singvögel tun. Infolgedessen ist die Aufzucht schwieriger. Es kommt zunächst darauf an, den Vogel daran zu gewöhnen, das Futter selbständig aus einem vorgehaltenen Löffel zu fressen, wenn man ihn nicht aus dem Munde atzen will, was schließlich nicht jedermanns Sache ist und auch nicht zu empfehlen ist, da zuviel Bakterien durch den menschlichen Speichel auf den Vogel übertragen werden, die nachteilige Folgen haben können. Die Papageien neigen ja sehr zur Tuberkulose, die allzu leicht durch den Menschen übertragen wird, denn Tuberkelbazillen hat schließlich jeder Mensch mehr oder weniger im Speichel, ohne daß er selbst erkrankt zu sein braucht. Man läßt den aus der Nisthöhle genommenen Sittich zunächst 24 Stunden hungern, was ihm durchaus nichts schadet. Dann nimmt man den Vogel in die Hand, taucht seinen Schnabel in den warmen Brei und bewegt den Löffel leise etwas hin und her. Hierdurch wird bei dem Vogel das Gefühl erzeugt, als würde er von dem alten Vogel gefüttert. Der sehr hungrige Sittich wird meist sofort etwas von dem Brei herunterschlucken, und tut er es nicht das erste Mal, dann wird er nach einigen, zeitweisen Wiederholungen bestimmt sich dazu bequemen. Dann hat man gewonnenes Spiel. In kurzer Zeit gewöhnen sich die Vögel an die künstliche Ernährung. Sobald sie den Löffel sehen, recken sie sich in ihrem Nest in die Höhe, betteln flügelschlagend um Futter und fressen gierig aus dem vorgehaltenem Löffel. Man muß nur immer darauf achten, daß das Futter auch warm genug ist. Sobald es sich beim Füttern etwas abkühlt, hören die Vögel sofort auf zu fressen. Der Brei muß dann von neuem angewärmt werden. Man hält am besten immer einen kleinen Spirituskocher zu diesem Zwecke bereit. Nach der Fütterung ist das unverbrauchte Futter kühl zu stellen, damit es nicht verdirbt. Der Brei wird sehr leicht sauer, und wird daher am besten jedesmal frisch zubereitet. Das Kochen darf nicht zu lange geschehen, da dadurch der Nährwert des Futters leidet. Ein einmaliges, schnelles Aufkochen genügt vollkommen.

Über die Unterbringung der jungen Sittiche und ihre Pflege wäre folgendes zu sagen. Da die Papageien in einer dunkeln Niststätte heranwachsen, so muß man die Pfleglinge auch dunkel halten, denn dies entspricht den natürlichen Lebensbedingungen. Ich fülle einen Blumentopf etwa zur Hälfte mit Holzwolle, drücke mit der Faust eine Mulde hinein, setze die jungen Sittiche hinein und bedecke den Topf mit einem zweiten umgestülpten Blumentopf, der mit seinem Rande in den ersten Topf hineingreift. In den übergestülpten Blumentopf wird vorher ein halbkreisförmiges, größeres Loch geschnitten, was sich mit einem Raspel ohne Mühe ausführen läßt. Das Flugloch wird durch Drahtgaze oder Gitterwerk verschlossen, damit die jungen Vögel, wenn sie größer geworden sind, nicht herausfallen können. Da die Exkremente der jungen Papageien sehr weich sind, wird die Holzwolle, die alle Flüssigkeit gut aufsaugt, schnell naß. Sie muß daher mehrmals am Tage erneuert werden. Solange die Sittiche noch wenig befiedert sind, müssen sie warm gehalten werden. Man stellt sie in die Nähe des Ofens, oder im Sommer an den Kochherd. Die Fütterung muß von Sonnenaufgang bis zum Abend alle zwei Stunden erfolgen, im Winter bei den kurzen Tagen natürlich auch noch abends bei Licht. Bei der Atzung füttere man nicht zu viel auf einmal. Die Vögel fressen, sobald sie sich erst eingewöhnt haben, mit großer Gier, bis ihre Kröpfe fast zum Platzen voll sind. Hierdurch entstehen Kropfkrankheiten, die leicht zum Tode führen. Da der Kropf, namentlich solange die Vögel noch nicht völlig befiedert sind, leicht sichtbar ist, so kann man dies ohne weiteres regeln. Ist der Kropf mäßig gefüllt, dann breche man die Fütterung ab. Man muß bedenken, daß die jungen Papageien von den Eltern doch auch nur immer wenig Futter erhalten, denn der Kropfinhalt muß ja auf mehrere Kinder verteilt werden.

Sobald die Jungen flugfähig sind, hält man sie noch einige Tage in der künstlichen Niststätte, bevor man sie ausfliegen läßt. Sie sind dann widerstandsfähiger und verunglücken nicht so leicht. Nach dem Ausfliegen streut man etwas Hirse und Spitzsaat auf den Käfigboden, um die Vögel an das Alleinfressen zu gewöhnen. Die Sämereien brauchen durchaus nicht aufgequellt werden, im Gegenteil die jungen Vögel nehmen harte Sämereien sogar lieber an, als gequollene. Der Schnabel der jungen, ausgeflogenen Papageien ist bereits stark genug, um den Samen zu enthülsen. Das Alleinfressen ist freilich ein schwieriger Punkt bei der Aufzucht der Papageien. Sie betteln immer wieder ihren Pfleger um Atzung an und wollen sich durchaus nicht entschließen, sich selbständig zu ernähren. In der Freiheit werden offenbar die jungen, bereits flüggen Sittiche noch sehr lange von den Eltern gefüttert, und gerade diese Eigenschaft macht die Aufzucht der Sittiche so sehr mühsam. Ein Königssittich ließ sich fast noch 2 Monate nach dem Ausfliegen von mir füttern. Er fraß wohl allein, aber nicht genügend, um sich zu ernähren, und bettelte immer wieder, wenn er mich sah, um Atzung. In solchen Fällen gibt es ein gutes Mittel, um den Trotz des Vogels zu brechen. Man gibt ihn in fremde Pflege. Die ganz veränderten Verhältnisse, vor allem das Fehlen des Herren, den der Vogel genau kennt, zwingen ihn dann zur Selbständigkeit. Nach einigen Tagen hat sich der Vogel an die selbständige Ernährung gewöhnt und man kann ihn wieder zu sich nehmen. In der Freiheit werden die jungen Papageien wohl dadurch zur Selbständigkeit gebracht, daß sie von den alten Vögeln, die eine neue Brut beginnen, einfach verlassen werden. Das Gelingen der Aufzucht hängt überhaupt in erster Linie davon ab, daß man alles so natürlich wie möglich macht.

Auf diese Weise erhält man reizend zahme und anhängliche Vögel. Ich hatte überaus zahme, aufgezogene Wellensittiche und andere Sittiche, die mir sofort auf den Ruf auf die Hand flogen und überallhin folgten. Dann lernen solche Vögel sehr gut sprechen und Lieder pfeifen, falls sie überhaupt dazu veranlagt sind. Mit dem Wellensittich habe ich in dieser Beziehung die größten Erfolge erzielt, worüber ich in dieser Zeitschrift schon früher berichtet habe. Mein Wellensittichmännchen „Puck" entwickelte sich zu einem erstklassigen Sprecher. Der Vogel sprach viele Sätze und Redensarten, zählte von 1 bis 10 fehlerfrei, sang in Worten die Liederstrophe: „Blau blüht ein Blümlein, dies heißt vergiß nicht mein" und ahmte außerdem noch vieles andere nach. Gelehrig sind aber nur die Männchen, weniger die Weibchen. Dasselbe scheint auch beim Nymphensittich der Fall zu sein. Ich habe bisher vier junge Nymphen erzogen, die leider alle Weibchen waren und nichts lernten.

Sehr dankbar wäre ich, wenn Liebhaber, welche Sittiche züchten, die Güte hätten, mir junge Vögel für meine weiteren Versuche zu überlassen. Es kommt mir in erster Linie auf Nymphensittiche, Rosenkopfsittiche und tarantinische Zwergpapageien an, um die geistigen Fähigkeiten und ihr Seelenleben näher beobachten zu können.

Die Vogelschau zu Hamburg.

Von A. Weber.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Darauf folgte der Stand von Herrn Becker mit 7 schönen einheitlichen Käfigen, besetzt mit folgenden Vögeln: Gelbspötter, Gartengrasmücke, Schwarzplättchen, Sperbergrasmücke, Blaukehlchen, Rotkehlchen und wilder Kanarienvogel. Ganz besonders schön im Gefieder war der Gelbspötter, und so gebe ich denn gern der Hoffnung Ausdruck, daß es Herrn Becker gelingen möchte, den Vogel gut durch die Mauser zu bringen, damit nach so viel Mühe und Arbeit Herr Becker auch seinen wohlverdienten Lohn in Gestalt eines fleißig vorgetragenen Gesanges erhalten möge. Ferner erfreute die Gartengrasmücke die Liebhaber und die übrigen Besucher durch ihr fleißig vorgetragenes und schon lautes Orgeln. Dem verständnisvoll lauschenden Zuhörer wurde beim Klange dieser altvertrauten Töne recht warm ums Herz, und das geistige Auge sah schon die warme Maisonne durch junges Buchengrün scheinen. Sehr interessant und daher besonders zu begrüßen war der wilde Kanarienvogel, da man diese Freiheitsgeschöpfe bei Liebhabern und in Handlungen nur äußerst selten zu sehen bekommt.

Der nächste Stand gehörte Herrn Regel, welcher folgende Vögel zur Ausstellung gebracht hat: Gartengrasmücke, Schwarzplättchen, Singdrossel und Rotkehlchen. Bei diesen Tieren ist zu bemerken, daß dieselben alle tadellos im Gefieder und auch sonst in hervorragendem Zustande waren.

Hieran reihte sich der Stand von Herrn Weyrich mit: Schwarzplättchen, Gartengrasmücke, Blaukehlchen, Dayaldrossel und Rothänfling. Die Tiere waren ebenfalls von hervorragendem Äußeren und besonders die Dayaldrossel mutete mit ihrem schwarzweißen Kleide wie eine kleine Miniaturelster an. Es ist nur schade, daß diese exotischen Drosseln mit ihem Gesange den Liebhaber nicht recht befriedigen und keineswegs einen Vergleich mit den Gesangeskünsten unserer guten Singdrosseln auszuhalten vermögen.

Weiter folgte der Stand des Herrn Schacht. Es wurden in 5 grünen Käfigen von Herrn Schacht ausgestellt: Schwarzplättchen, Gartenrotschwanz, Rothänfling, grauer Kardinal und Nachtigall. Hervorzuheben ist von diesen Vögeln zunächst wegen ihrer schlanken und eleganten Erscheinung die Nachtigall, welche daher auch gebührend gewürdigt wurde. Es ist dies ein Vogel, welcher sich erfreulicherweise stets schlank und aalglatt im Gefieder hält und dadurch von seinesgleichen vorteilhaft absticht, daß er sich nicht, wie so viele andere, aufplustert und träge auf eine Sitzstange hinsetzt. Dem ganzen Gebahren nach mußte man als Liebhaber vermuten, daß dieser Vogel bald zu schlagen anfängt, und so wünsche ich Herrn Schacht dann auch gern, daß er zum Weihnachtsfeste eine schlagende Nachtigall in seinem Heim haben möge. Weiterhin zeichnete sich der Mönch von Herrn Schacht durch seinen vollkommen lauten und äußert fleißig dargebrachten Überschlag aus und ergötzte dadurch die Besucher, welche dichtgedrängt seinen Käfig umstanden.

Neben diesem Stande befanden sich die Vögel von Herrn Ewald, und zwar 1 Star und 1 Stieg-

litz-Kanarienbastard (Albino). Der Star zeichnete sich durch seine großen Sprachkenntnisse und sein drolliges Gebahren aus. Unter anderen Worten und Sätzen, die ihm nicht etwa absichtlich beigebracht wurden, greife ich folgende heraus: „Bitte, bitte lieber Papi, du kommst zu spät. Papi, du bist ein Schmutzfink. Bitte, Herr Ewald, Jakob." Der Bastard ist, wie bereits gesagt, ein Albino, nur haben sich die Flügeldecken nach der letzten Mauser leider etwas gelb gefärbt. Er sang sehr fleißig und brachte einen sehr schönen Stieglitz-Gesang.

Darauf folgten die schönen Käfige des Herrn Evers mit je einem Star, Schwarzdrossel, Singdrossel und mehreren Körnerfressern. Sämtliche Vögel waren prachtvoll im Gefieder und machten in ihren herrlichen Käfigen ein sehr schönes Bild. Besonders der Star stellte einen auffallend stattlichen und sauberen Vertreter seiner Art dar. Die Käfige waren, was Größe und saubere Arbeit anbelangt, vorbildlich und sämtlich von Herrn Evers selber angefertigt.

Darauf folgten ein Gartenrotschwanz und ein Sonnenvogel von Herrn Dr. Höft, und die Vögel von Herrn Thoretz. Letzterer stellte in 3 Käfigen einen Sonnenvogel, eine Gartengrasmücke und einen Fitislaubvogel aus. Von Letzterem ist zu bemerken, daß er bereits 3 bis 4 Jahre gekäfigt ist und trotzdem sich ebenso schlank und tadellos im Gefieder hielt wie die anderen Vögel des Herrn Thoretz.

Ein Käfig mit einem Buchfink und einem leider sehr scheuen Rothänfling, welcher daher hoch aufgestellt wurde, gehörte Herrn Schmidt. Nun zu Herrn Menraths Stand! Neben einer Schamadrossel, amerikanischer Spottdrossel, und einer Nachtigall zeigte Herr Menrath auch einen allerliebsten Steinkauz. Der Vogel war prachtvoll im Gefieder, und was das Bemerkenswerteste an ihm war, er zeichnete sich durch vollkommene Zahmheit und Gutmütigkeit aus. Wie oft haben Vereinskollegen und ich diesen Vogel mit ins Grüne genommen und uns köstlich darüber amüsiert, wenn Hans ohne Leine beim Anlocken von Singvögeln sein Stellholz verließ und gleich darauf hübsch artig wieder hinaufsprang. An eine Flucht dachte der drollige Bursche hierbei nicht im geringsten, trotzdem er sich im Besitze seiner vollen Flugkraft befand. Die Schamadrossel von Herrn Menrath war ein kleinerer Vogel von hervorragendem und prachtvollem Äußeren und bot neben der amerikanischen Spottdrossel ein sehr schönes Bild.

Hierbei möchte ich nicht zu bemerken verfehlen, daß diese Spottdrossel in der Voliere eines Liebhabers nach etwa 14 Tagen plötzlich mehrere kleinere Vögel umbrachte, als sie, da sie nicht in die Mauser kommen wollte, zwecks Hervorrufung derselben in diesem Flugraum einige Zeit untergebracht wurde. Der Hauptzweck wurde aber doch noch erreicht und die Mauser gründlich und glücklich überstanden.

Besonderen Dank schuldet unser Verein dem Hamburger botanischen Institute, welches durch Herrn Theil eine Sammlung Berlepscher Nisthöhlen, selbstgebauter, sehr praktischer und hübsch ansprechender Futterhäuser, Meisenglocken usw. ausstellte. Als Neuheit und eigenes Fabrikat stellte Herr Theil eine Anzahl kleiner Meisenglocken aus, welche in äußerst gefälliger Weise an einem kleinen Baum aufgehangen waren. (Siehe Bild.) Diese Theilschen Futterglocken bestehen aus der Hälfte einer in der Mitte querdurchgesägten Kokosnuß, in welcher ein Stiel befestigt ist und welche dann mit einem Gemisch von Talg, Hanf, Sonnenblumkernen usw. vollgegossen wird.

An dem Stiele halten sich unsere Meisen in ihrer äußerst geschickten Kletterkunst fest und picken emsig das über ihnen befindliche Futter heraus, während den Sperlingen wegen ihrer Schwerfälligkeit der Weg zu dem Futter versperrt ist. Das Ganze sieht aus wie ein Pilz, an dessen Dache sich

Stand des Herrn Theil auf der Vogelschau zu Hamburg.

zum Aufhängen eine Drahtöse befindet. Verkäuflich sind diese Futterpilze zum Preise von G.M. 1.— pro Stück.

Weiter stellte Herr Theil auch einen Nistkasten aus, welcher bereits mehrere Jahre im Walde gehangen und für Spechte bestimmt war. Jedoch hatte Freund Kleiber diese Nisthöhle als sehr passend für sich selber in Besitz genommen und den Eingang bis auf ein kleines Schlupfloch zugebaut. Auch hierbei konnte der Naturfreund wieder feststellen, wie in der Natur nichts Unvollkommenes geschaffen ist, denn dem Kleiber wurde nicht nur von der Natur die Gabe des Zementierens verliehen, sondern auch die architektonische Ausführung. Und da sah man denn, daß der Kleiber das Loch in der Weise zugebaut hat, daß der untere Rand des belassenen Schlupfloches nach außen hin abgeschrägt war, sodaß das Regenwasser nicht ins Innere der Nesthöhle gelangen konnte.

Durch die Liebenswürdigkeit von Herrn Kretschmann konnten wir auf unserer Ausstellung auch

einen großen Stand ornithologischer Schriften und Bücher verzeichnen. So wurde unserer Ausstellung durch den Stand der Creutz'schen Verlags-Buchhandlung und des Botanischen Institutes ein würdiger Rahmen gegeben. Ich spreche den Herren Ausstellern auch an dieser Stelle unseren schuldigen Dank aus.

Eine unerwartete und freudige Überraschung erfuhren wir durch den Besuch unseres allgemein verehrten Herrn Neunzigs, des altbewährten Redakteurs dieser Zeitschrift. Herr Neunzig verband die Besichtigung unserer Ausstellung in Hamburg mit einem Besuche bei der Firma August Fockelmann in Groß-Borstel. Leider hatte Herr Neunzig seinen Besuch nicht vorher angemeldet, so daß bedauerlicherweise keines unserer Mitglieder für Nachtquartier hatte sorgen können. Es war mir aber ein Vergnügen, diese Unterlassungssünde dadurch gutzumachen zu versuchen, daß ich Herrn Neunzig und Herrn Cretschmann zu einem einfachen Mittagessen in mein Heim aufforderte, wo ich mit den Herren einige recht gemütliche Plauderstunden verleben konnte. Als ich dann am nächsten Tage erfuhr, daß die beiden Herren bei August Fockelmann eine äußerst liebenswürdige und gastfreundschaftliche Aufnahme gefunden hatten, durfte ich in meinem Innern die leise Überzeugung hegen, daß die Herren sich in unserer alten Hansastadt wohl und zufrieden gefühlt haben und uns auf unserer nächstjährigen Ausstellung durch ihr Erscheinen wiederum erfreuen werden.

Nun wünsche ich unserem Verein, daß seine erste Ausstellung auch Früchte tragen möchte, und zwar dahingehend, daß recht viele Ausstellungsbesucher, nunmehr auf unseren Verein und seine Bestrebungen aufmerksam gemacht, demselben als Mitglieder beitreten und dadurch dazu beitragen werden, daß derselbe sich bedeutend vergrößere und in seiner Leistungsfähigkeit beträchtlich gestärkt werde. Dann werden wir in der angenehmen Lage sein, unsere nächstjährige Ausstellung bedeutend artenreicher zu gestalten und dadurch den Hamburger Naturfreunden noch zahlreiche andere Bekanntschaften ermöglichen. Dann werden auch die Liebhaber noch mehr auf ihre Rechnung kommen und wir hoffentlich auch von auswärts recht zahlreichen Zuspruch haben.

Wundervoll wäre es, wenn eine solch vollständige Ausstellung einmal zustande käme. Man könnte es schon verantworten, so viele Vögel zu diesem Zwecke zu käfigen, denn die Tausende und Hunderttausende im Wald und Feld würden hierdurch nur Gutes haben. Erst durch den Umgang mit den gefiederten Lieblingen in der Stube werden viele Menschen auch auf die freilebenden Geschöpfe und ihre bittere Not in schweren Wintern aufmerksam und würden die lieben Sänger schonen und hegen, ihnen über den Winter helfen lernen und dem deutschen Walde eine Fülle von unermüdlichen, treuen Schützern retten, die mit ihren Schnäbelchen Baum und Busch, Feld und Flur von bösen, vernichtenden Feinden säubern.

Indier bei Fockelmann.

Von K. Neunzig.

(Nachdruck verboten.)

Nach vielen Jahren wieder ein großer Transport indischer Vögel. Am Sonntag, den 11. Januar d. Js., abends 7 Uhr, meldete der Draht, daß der Dampfer „Trautenfels", der Hansalinie gehörig, von Kalkutta kommend, Kuxhaven passiert habe.

Am folgenden Morgen hatte der Indienfahrer im Hansahafen angelegt und harrte seiner Entladung.

Außer mancherlei Rohprodukten brachte das Schiff eine große Anzahl Vögel und Säugetiere Indiens für die Firma August Fockelmann nach Hamburg.

Morgens um 7 Uhr, noch vor dem Morgengrauen, führte uns der Kraftwagen des Herrn Otto Fockelmann in schneller Fahrt durch das Gewirr der Hafenstraßen zum Liegeplatz des „Trautenfels", eines stattlichen 12000 Tonnendampfers.

Während der Fahrt von Kalkutta bis Port Said in dem wärmeren Klima des indischen Ozeans und des roten Meeres waren die Tiere auf dem Deck an geschützten Stellen untergebracht. Geleitet wurde der Transport von einem in Kalkutta ansässigen Vertreter der Firma Fockelmann, unter dessen Leitung und Aufsicht drei Hindus die Fütterung der Tiere und die Reinigung der Käfige besorgten. Von Port Said aus übernahm die Leitung ein von Hamburg aus dorthin gesandter Angestellter der Fa. Herr Thiel.

Für die Fahrt durch das Mittelmeer, Atlantischen Ozean bis Hamburg wurden die Tiere in den auf dem Deck des Mittelschiffes an den Seiten des Brückenhauses vorhandenen entleeeten geräumigen Kohlenbunkern untergebracht, vor Sturm und Kälte geschützt. Die weiten Öffnungen der Bunker konnten durch feste Vorhänge geschlossen werden. In den Bunkern angebrachte elektrische Sonnen spendeten nötigenfalls Licht und Wärme.

In einem der Bunker waren die großen Tiere, Leoparden, schwarze Panther, Hyänen, Bären, Mungos, Hunderte von Affen, darunter auch der den Indern heilige Wanderu, Riesenschlangen, Halsbandkraniche, Marabus, Jabirus, Wollhalsstörche, weiße indische Ibisse und ein Teil der Papageien, große und kleine Alexandersittiche und Pflaumenkopfsittiche untergebracht.

Nun zu dem anderen Bunker, welcher die Vögel enthält, die für uns von besonderem Interesse sind. Dabei kann ich die Mengen von Tiger-, Reisfinken und Sonnenvögeln, welche sich darunter befanden, übergehen.

Alle anderen Vögel sind Weichfutterfresser, etwa tausend an der Zahl, darunter einige hundert Schamadrosseln, Männchen und Weibchen, zum Teil auch junge, noch nicht ganz ausgefärbte Vögel. Jeder Weichfresser war in einem besonderen Käfig untergebracht, evtl. in einer Abteilung der aus Bambusstäben hergestellten, etwa 1,10 m langen Käfige, welche durch fünf Zwischenwände in sechs Abteilungen geteilt sind. Diese Käfige sind in Stapeln von 8—10 Stück ringsum an den Wänden aufgestellt, so daß jeder Käfig gut erreichbar, und Fütterung und Tränkung, hierzu sind drehbare Zinkgefäße angebracht, keine Schwierigkeiten macht. Um das Durchfallen der Entleerungen durch den aus Bambusstäben hergestellten Gitterboden der Käfige und die Beschmutzung der darunter befindlichen Vögel zu verhindern, ist jeder Käfig mit einem Streifen Dachpappe bedeckt.

Gefüttert wurde das in Indien übliche Futter bestehend aus einem gelben (Erbsen- oder Bohnen-)

Mehl, welches mit gewiegtem Fleisch und geschmolzenem Hammeltalg vermischt, ein krümeliges Gemisch darstellt und von allen Vögeln gern gefressen wird, und wie ihr Zustand und die sehr geringen Verluste beweisen, ihnen auch gut zu bekommen scheint. Es war gewiß keine Kleinigkeit, während der 4—5-wöchigen Reise neben all dem anderen Getier, die große Zahl der Weichfresser regelmäßig zu versorgen. Die drei Söhne Indiens haben sich dabei gut bewährt. Dafür überließen sie auch die Arbeit des Entladens bereitwilligst den Hamburger Hafenarbeitern. Diese Arbeit war mit Hilfe des elektrischen Kranes innerhalb 2 Stunden erledigt, in schonendster Weise für die lebenden Insassen der Behälter, die auf vier großen, z. T. geschlossenen Wagen, welche die Käfige mit den kleinen

Schwarzkopfpirol.

Vögeln aufnahmen, verladen und nach Groß-Borstell gebracht wurden.

Wohl konnte man schon auf dem Schiff und beim Entladen so manchen der Neuankömmlinge erkennen. Hier sah man das feurige Rot des Mennigvogels durchs Käfiggitter schimmern, da das leuchtende glänzende Blau des Niltawaschnäppers, das grelle Gelb der Pirole, ab und zu hörte man die Strophe einer Schama und die Lockweise des Silberohrsonnenvogels. Einen rechten Überblick konnte man aber erst gewinnen, als die Käfige in den Räumen des Fockelmannschen Tierparkes Aufstellung gefunden hatten und auch da war man zuerst verwirrt und benommen durch die Fülle der ungewohnten Erscheinungen.

Die großen Vögel wie Rotschnabelkitta, Wanderelstern, Weißhauben- und Weißkehlhäherlingen, eine größere Anzahl des seltenen Stelzenhäherlings — Argya malcolmi waren schnell in großen Flugkäfigen untergebracht und versorgt.

Es galt nun den Inhalt der einzelnen Käfige festzustellen. Da waren dann unter vielen Seltenheiten eine ansehnliche Zahl der zum erstenmal eingeführten, unter denen besonders einige Arten kleinerer Timalien, wie die Braunscheiteltimalie — Stachyridopsis ruficeps, die rotbraune Zwergtimalie — Dumetia hyperthyra, die Braunkopftimalie — Timelia pileata hervorzuheben sind. Auch die bekannte schöne Schwarzkappentimalie ist in mehreren Stücken vorhanden, von Häherlingen der kleine Borstenhäherling, der schöne dunkelrotbraune weißgestreifte Häherling und die Meisentimalie Yuhina nigrimentum.

Die zum erstenmal eingeführte rotbraune Strichelhäherdrossel Argya earli, die Goldaugentimalie und der Rotwangensäbler mit langem sichelförmigen Schnabel. Fünf Arten der begehrten farbenprächtigen Fliegenschnäpper sehen wir vor uns, außer dem Niltawa-, den hellblauen und den braunbrüstigen Blauschnäpper, den kleinen rotkehligen Zwergschnäpper und als Neueinführung den schwarz- und weißgefiederten Zwerg-Trauerschnäpper. Außerordentlich muntere Tiere sind die eigenartigen indischen Kronenmeisen und die schlicht aber sehr ansprechend gefärbten indischen Graumeisen. Von Würgern sind vorhanden der Lathora- und Maskenwürger, besonders letzterer ein herrlicher Vogel. Ihnen reihen sich an Flaggen- und Graubauchdrongo, Sytes- und Schwarzkopfpirol (s. Abb.) und der schöne schwarzköpfige Strichelhäher. Die farbenprächtige Bengalenpitta wird an Schönheit noch übertroffen durch die wunderbare Erscheinung der Rubinnachtigall (Erithacus pectoralis), die leider nur in einem Stück vorhanden ist, wie die stattliche Mamulabachstelze. Von Drosseln sind hervorzuheben, die schlichte, aber recht angenehm gefärbte Einfarbdrossel, die das erstemal eingeführte Neilgherri-Drossel (Merula simillima), die Bülbülamsel, die bunte Drossel (G. varia), Damadrossel und das schöne farbenprächtige Bergrötel. Einige Arten Schopfbülbüls und Blattvögel,

darunter auch der blaubärtige, vertreten die Bülbüls. In größerer Anzahl sehen wir den braunrückigen Strauchschmätzer und die muntere Dayaldrossel, beide auch im weiblichen Geschlecht vertreten, ebenso die kleineren Formen indischer Stare, den Greisen- und den Pagodenstar.

Zu begrüßen ist es, daß jetzt der Tisch für die Liebhaber fremdländischer Vögel wieder reichlich gedeckt ist. Daß ein großes Verlangen nach diesen besteht, beweist wohl die Tatsache, daß der südafrikanische Transport, der vor etwa 14 Tagen eintraf, schon „ausverkauft" ist. Und nicht lange wird es dauern, bis die schönen Indier in den Käfigen und Vogelstuben unserer Liebhaber Unterkunft gefunden haben. Die Unternehmungslust und der weitausschauende Blick des Herrn Otto Fockelmann wird sicherlich dafür sorgen, daß dem lebhaften Bedürfnis unserer Vogelliebhaber nach schönen Ausländern stets Genüge getan werden kann.

Hoffen wir, daß die folgenden Importe in derselben Reichhaltigkeit an Arten und Individuen unter gleich günstigen Verhältnissen zu uns gelangen, die eine Bürgschaft dafür bieten, daß die Vögel in ebenso gesundem kräftigen Zustand hier eintreffen, wie es bei diesem indischen Import der Fall war.

Atlantische Vögel.

Von Adalbert Athen, Hamburg.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Madeira, die „Holzinsel", liegt gegen 1000 km von Lissabon und etwa 500 km vom afrikanischen Festlande entfernt. Ihre größte Ausdehnung läuft von Westen nach Osten und beträgt etwa 55 km; die Breite etwa 20 km. Im Jahre 1418 wurde sie von den Portugiesen unter Gonçalves Zarco entdeckt und langsam besiedelt. Von dem großen Holzreichtum, den die Entdecker dort vorfanden und dem die Insel ihren Namen verdankt, ist nicht viel übriggeblieben. Man kann sich Madeira als einen gewaltigen Berg vorstellen, dessen Gipfel aus dem Ozean ragt. Er teilt sich in mehrere Spitzen, die gegen 1800 m über dem Meeresspiegel liegen und fast ständig in Wolken eingehüllt sind. Abgesehen von einigen wenigen Kratern kleinen Umfanges, die nichts Bemerkenswertes bieten, tritt der vulkanische Ursprung der Insel für den Laien nicht zutage. Der Gebirgsstock verläuft auf der Längsachse der Insel, ist in der Mitte am höchsten und endet an der Ostküste in einer schmalen Klippenkette, die sich nach Süden wendet und 20 km südlicher in Gestalt der drei Felseneilande der Desertas noch einmal zutage tritt. Der Gebirgsstock bildet das Rückgrat der Insel; von ihm führen nach der Nord- und Südküste hohe Gebirgszüge ab, mächtigen Rippen vergleichbar, die an der Küste in schroff nach dem Meere zu abbrechenden Vorgebirgen endigen. An einer Stelle der Südküste bildet ein solches Kap eine senkrechte Wand von 600 m Höhe ohne irgendwelche Strandbildung, die es auf Madeira überhaupt nicht gibt. Zwischen diesen Gebirgszügen erstrecken sich tiefe, kesselartige Täler, die durch Wassergewalt ausgewaschen wurden. Im Sommer liegen sie zum größten Teil ganz trocken, oder es rieselt darin ein dürftiger Bach dem Meere zu, der mit den riesigen Ausmessungen seiner Umgebung gar nicht in Einklang zu bringen ist. Im Winter freilich, wenn auf dem Gebirge heftige Regen einsetzen, können diese Wässerchen zu reißenden Strömen werden, die Geröll und Schutt mit sich führen und das Meer auf weite Strecken hinaus färben. Die Insel wird wegen der wunderbaren Gleichmäßigkeit ihres warmen Klimas und wegen ihrer Blumenpracht bei ständig blauem Himmel und fast ewigem Sonnenschein im Bereiche des Küstengebietes die „Perle des Ozeans" genannt. Die ganze Südküste ist freilich kahl. Die nächste Umgebung der Haupt- und Hafenstadt Funchal mit ihrem berühmten Ausflugsorte Monte, der 600 m über der Stadt liegt, bildet hier eine Oase. Die üppige Pflanzenwelt in den Gärten und auf den öffentlichen Plätzen ist in ihrer Farbenpracht in der Tat überraschend. Die Gärten haben zu allen Jahreszeiten Blumen in zahllosen Arten. Unter den Bäumen fällt dem Fremden zuerst der blau blühende Jacarandabaum auf. Die deutschen Waldbäume findet man hier nur vereinzelt, aber in wahren Prachtbäumen wieder.

Wer Madeira kennen lernen will, darf sich nicht auf Funchal und Monte beschränken, wie das meistens geschieht; viel schöner in landschaftlicher Beziehung ist die Nordseite, die noch reich an Nadel- und Laubbäumen ist. Leider ist sie schwer zu erreichen. Wer zu Pferde oder im Hängenetz, dem hier üblichen Beförderungsmittel, nach vielstündiger Reise und endloser Wiederholung von Berg und Tal, einen Paß des Gebirgsstockes erreicht hat, kann einen großen Teil der nördlichen Inselhälfte übersehen. Von dieser Paßhöhe aus bietet sich den staunenden Blicken eine Küstenlandschaft dar, die an Großartigkeit in der Bodengestaltung, mit dem weiten Ozean als Hintergrund, alle Erwartungen übertrifft. Am Himmelsrande, in nordöstlicher Richtung, entdeckt man von dieser Stelle aus auch die kleine Nachbarinsel Porto Santo, die von einigen tausend Menschen bewohnt wird, und rückwärtsschauend, in südöstlicher Richtung, die schon erwähnten nackten Felseneilande der Desertas, die „wüsten Inseln", die besonders des Abends, von der untergehenden Sonne vergoldet und umspült von den blauen Fluten des Meeres, einen zauberhaften Anblick gewähren.

Der während des Weltkrieges verstorbene deutsche Pater Schmitz, weiland Leiter des Priesterseminars in Funchal, hat in dieser Stadt ein sehr sehenswertes Museum geschaffen. Von seinem Nachfolger in der Museumspflege, dem Pater Barreto, ist in einer besonderen Abteilung eine anscheinend vollständige Sammlung aller auf der Madeiragruppe nachgewiesenen Brutvögel aufgestellt worden. Hiernach zu urteilen, brüten auf Madeira und den umliegenden Eilanden 36 Arten, also schon bedeutend mehr als auf der Azorengruppe. Es sind folgende:

Pirol (—) Oriolus oriolus oriolus (*L.*)

Steinsperling (pardal) Petronia petronia maderensis *Erl.*

Buchfink (tentilhão) Fringilla coelebs maderensis *Sharpe*

Stieglitz (pintasilgo) Acanthis carduelis parva (*Tsch.*)

Kanarienvogel (canário) Serinus canaria canaria (*L.*)
Hänfling (pintaroxo) Acanthis cannabina nana (*Tsch.*)
Gebirgsbachstelze (lavandeira) Motacilla boarula schmitzi *Tschusi*
Pieper (corre-caminhos) Anthus berthelotii maderensis subsp. nov.
Goldhähnchen (bis-bis) Regulus ignicapillus maderensis *Harc.*
Schwarzplättchen (tutinegra) Sylvia atricapilla heineken (*Jard.*)
Brillengrasmücke (cigarrinha) Sylvia conspicilata bella *Tsch.*
Schwarzdrossel (melro preto) Turdus merula cabrerae *Hart.*
Rotkehlchen (papinho rouxo) Erythacus rubecula rubecula (*L.*)
Segler (andorinha da serra) Apus unicolor unicolor (*Jard.*)
Turmsegler (andorinha do mar) Apus murinus brehmorum *Hart.*
Wiedehopf (poupa) Upupa epops epops *L.*
Schleiereule (coruja) Tyto alba schmitzi (*Hart.*)
Turmfalk (francelho) Falco tinnunculos canariensis *Koenig*
Bussard (manta) Buteo buteo subsp. nov.
Sperber (gavião) Accipiter nisus granti *Sharpe*
Seeregenpfeifer (rola) Charadrius alexandrinus alexandrinus *L.*
Waldschnepfe (galinhola) Scolopax rusticola rusticola *L.*
Ringeltaube (pombo branco) Columba palumbus maderensis *Tsch.*
Silberhalstaube (pombo preto) Columba trocaz *Heineken*
Felsentaube (pomba da rocha) Columba livia livia *Gm.*
Rothuhn (perdiz) Alectoris rufa hispanica (*Seoane*)
Wachtel (codorniz) Coturnix coturnix confisa *Hart.*
die schwärzliche Sturmschwalbe (roque de Castro) Oceanodroma castro (*Harc.*)
der weißbäuchige Teufelssturmvogel (freira) Pterodroma mollis feae (*Salvad.*)
Bulwers Sturmvogel (anjinho) Bulweria bulwerii bulwerii (*Jard. & Selby*)
der schwarze Sturmtaucher (pintainho) Puffinus assimilis godmani *Allen*
der nordische Sturmtaucher (furamar) Puffinus puffinus puffinus (*Brünn*)
der graue Sturmtaucher (cagarro) Puffinus kuhlii borealis *Cory*
Flußseeschwalbe (garajáu) Sterna hirundo hirundo *L.*
Brandseeschwalbe (pardáu) Sterna sandvicensis sandvicensis *Lath.*
die südländische Silbermöwe (gaivota) Larus argentatus cachinnans *Pall.*

Der Pirol mußte in diese Liste aufgenommen werden, doch ist er nur ein einziges Mal als Brutvogel nachgewiesen worden. — Der atlantische Steinsperling lebt nur auf Madeira und den Kanaren und unterscheidet sich von dem europäischen durch dunklere Färbung. Ich habe ihn in der Stadt Funchal besonders an der alten Domkirche und auf den umliegenden Dächern beobachtet, aber auch vielfach auf dem Lande. Er ist bei weitem nicht so häufig wie unser Spatz. Den gelben Kehlfleck konnte ich selbst im Glase nicht erkennen, aber man brachte mir einen geschossenen Vogel, an dem er sehr auffällig war. Über den Scheitel verlaufen zwei dunkelbraune Streifen auf schmutziggelbem Grunde. Die Oberseite ist braun mit dunkelbraunen Flecken; die Unterseite schmutziggelb und ebenfalls dunkel gefleckt. Der Oberschnabel ist hornfarben, der Unterschnabel

Ind. Chellismeise (s. S. 49).

dagegen hellgelb, wie wenn sich der Kehlfleck in ihm widerspiegelte. Die Gestalt des Vogels ist ganz sperlingsartig und es überrascht daher einigermaßen, wenn man ihn plötzlich wie eine Bachstelze laufen sieht. Sein Lockruf ist sehr klangvoll, gedehnt und deutlich zweisilbig; er erinnerte mich sehr an den reizenden Lockruf des Berglaubsängers. Der Vogel brütet schon im Februar! Noch im April sah ich ihn in den Löchern des alten Kirchengemäuers verschwinden und auf dem Lande unter den gewölbten Dachziegeln.

Madeira hat seinen eigenen Pieper, der durch langen Schnabel auffällt. Er lebt in den höchsten Schichten des Gebirges, wo er sehr häufig ist. Ich habe ihn nur ein einziges Mal, auf einer Hochebene, beobachtet, wo er auf den Spitzen der Strandkiefern fußte. Auffallend ist bei ihm die helle Unterseite und die schwarzen Flecken an der Kehle und den Kopfseiten. Obwohl andere Beobachter seinen Lockruf mit dem des Wiesenpiepers vergleichen, konnte ich nur ein klagendes sli-epp vernehmen, das aber mit dem Lockruf seines Verwandten gar keine Ähnlichkeit hat. Von Gesang habe ich nichts gehört. Auch er brütet schon im Februar.

Der Buchfink ist dem azorischen sehr ähnlich, aber der Rücken ist lebhaft olivengrün und die Kopfseiten sind viel heller. Sein Schlag klingt genau wie bei uns, aber auch er kennt nicht das Pink unseres Buchfinken, sondern verfügt über ganz andere

Laute. So bringt er oft mehrere, schnell gereihte, gleichhohe Laute; außerdem noch drei abwärts gerichtete Laute, die man zum Überdruß hören kann. Es hatte einige Zeit gedauert, bis ich feststellen konnte, welchem Vogel diese Laute eigentlich angehörten, denn in den dunklen Kronen der Lorbeerbäume ist er nicht so schnell zu entdecken. Er ist auf Madeira sehr häufig, aber im Gegensatz zu Sankt Michael kein Gartenvogel; er lebt mehr auf den Höhen der Berge in den Lorbeerwäldern, weshalb er auch Lorbeerfink genannt wird.

Stieglitz und Hänfling sind auf Madeira auffällig kleiner als bei uns. Während jener im Gesang genau derselbe ist, glaube ich bei dem Hänfling bemerkt zu haben, daß er immer nur sehr kurze Liedchen, ohne jede Abwechselung, bringt.



Braunrückenstrauchschmätzer (s. S. 49).

Die Gebirgsbachstelze ist derselbe schöne und lebhafte Vogel, der auf den Azoren zu Hause ist, gerade so häufig und ebenfalls Stadtvogel. Auf den benachbarten Kanaren lebt dagegen merkwürdigerweise unser deutscher Vogel!

Ein ganz reizendes Vögelchen, das sich ohne Scheu aus nächster Nähe betrachten läßt, ist das Madeira-Goldhähnchen mit seiner weißen Stirn und dem gelben Scheitel. Während auf den Azoren das Wintergoldhähnchen lebt, finden wir hier als eigene geographische Form das Sommer- oder Augenstreifgoldhähnchen, das nirgend anderswo wieder vorkommt. Es singt kurze Liedchen, die an Braunelle und Zaunkönig erinnern, hält sich hier also nicht an die gerade Linie unseres Sommergoldhähnchens. (Schluß folgt.)

Individuelle Fütterung.

Von J. Birk, Leipzig.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Ganz besonders muß man sich darüber klar sein, daß oft ein an Nährwerten sehr armes Mischfutter schon genügt, um den Vogel auf den gewünschten, etwas über normal zeigenden Körperzustand zu bringen, wiederum aber gibt es auch Vögel, die selbst bei dem nahrhaftesten Futter unter normal, also mager bleiben. Magere Vögel darf es im Bestande nicht geben, denn ein magerer Vogel ist keinen Anforderungen gewachsen, seien es welche, hervorgerufen durch den eintretenden Gesang und die Mauser, Temperaturschwankungen, kurze Tage usw. Unter „individueller Fütterung" versteht man also, das Futter nach dem Bedürfnis des betreffenden Individuum in quantitativer und qualitativer Hinsicht einzustellen, die Nährwerte desselben je nach Notwendigkeit zu erhöhen, oder zu vermindern. Eine schematische Fütterung für alle Arten und Individuen nach Schablone F wird leider noch von vielen Liebhabern in der Praxis geübt, was wohl auch einzelne Erfolge bringt, die aber verschwindend erscheinen zu den sie begleitenden Mißerfolgen, die wohl auf irgendwelche falschen Ursachen zurückgeführt werden, aber niemals auf die einzig wahre Ursache, das Fehlen einer individuellen Fütterung. Dieser Vogel ist an Auszehrung eingegangen, jener an Fettsucht, ein anderer an Darmkrankheiten usw., das sind so die üblichen Redensarten mancher Liebhaber, wenn sie wieder einen Verlust zu beklagen haben, bedenken dabei aber nicht, daß sie wohl die Ursache des Todes, aber nicht die Ursache der zum Tode geführten Krankheit erkannt haben. Daß der Bestand eines Liebhabers auch mal durch den Tod eines Vogels gelichtet wird, ist eine Tatsache, die jedem Liebhaber bekannt ist, doch ist die Tatsache, daß oft einige Jahre vergehen, ehe wieder ein Todesfall zu verzeichnen ist, wohl keine allzu häufige Erscheinung bei vielen Liebhabern. Wollen wir körperlich gesunde und normale Vögel und vor allem lange Jahre ausdauernde Vögel in unseren Käfigen haben, so müssen wir sachgemäß und individuell füttern.

Unsere Grasmückenarten neigen alle, die eine mehr, die andere weniger als Käfigvögel zum Fettansatz, brauchen also dementsprechend auch eine dieser Eigenart Rechnung tragende Fütterungsmethode. Wie bekannt, sind unsere Weichfresser naturgemäß auf eine schnelle Verdauung eingestellt, insbesondere tritt diese schnelle Funktion des Verdauungsapparates bei unseren Grasmücken ganz auffallend in Erscheinung. Das tägliche Futterbedürfnis ist dementsprechend auch ein viel größeres als bei anderen Arten, folglich muß das Grasmückenfutter mehr quantitativ als qualitativ sein, das heißt, infolge der Verkonsumierung eines größeren Quantums, muß die Qualität des Futters eine geringere sein als bei anderen Vogelarten oder Individuen. Wollten wir z. B. unseren Grasmücken ein ständiges Futter unter Beimischung von Weißwurm, Quark, gekochtem Hühnerei, Rinderherz und gemahlenem Hanf geben, so würden wir dieselben schon bei der ersten Überwinterung zu trau-

rigen, teilnahmslosen Fettklumpen heranmästen und eine Verfettung der inneren Organe würde gar bald den Tod herbeiführen. Wenn es auch Tatsache ist, daß bei den Grasmücken eine individuelle Fütterung sich selten nötig macht, da das leichte Fettwerden eine Eigentümlichkeit der Art ist, so muß das Futter eben in seiner Zusammenstellung dieser Arteigentümlichkeit gerecht werden. Mein tägliches Hauptfutter für Grasmücken besteht aus geriebener Möhre, ab und zu wechselnd auch aus geriebenem Apfel, gemahlenem Zwieback und ebensolchen Fleischgarnelen und getrockneten Ameisenpuppen. Diesem Gemisch wird noch ein Quantum roter und schwarzer Holunderbeeren in aufgequollenem oder gemahlenem Zustande zugesetzt und das Grasmückenfutter ist fertig. Das Verhältnis der Futterstoffe zu einander richtet sich nach der für die Anzahl der Grasmücken nötigen geriebenen Möhre oder Apfel, z. B. für meine augenblicklich gekäfigten 6 Grasmücken, davon 2 Sperbergrasmücken, 2 Gartengrasmücken und 2 Schwarzplättchen ist das Verhältnis ungefähr folgendes: Auf 3 Teile Möhre, je nach Feuchtigkeitsgehalt derselben, denn Möhre drücke ich nie aus, da ich nicht zu saftige Möhren durch längeres Lagern im Zimmer verwende, ungefähr 1 Teil Zwieback oder auch geriebene weiße Semmel, 1 Teil Fleischgarnelen, 1 Teil Ameisenpuppen und 2 Teile Holunderbeeren. Verträgt es der Körperzustand der Grasmücken, so gibt es auch als Abwechslung, Delikatessen, einmal Rosinen, ein anderes Mal Feigen, alles im zerkleinerten Zustand, doch heißt es bei diesen zuckerhaltigen Früchten, auch Birnen, in der Darreichung sehr sparsam zu sein, weil sie vor allem gerne gefressen werden und schnell fettbildend wirken. Ein sehr begehrter Leckerbissen meiner Grasmücken im Zeitraum der Überwinterung ist gebratener Apfel ans Gitter geklemmt, er wirkt dem Drang nach Fettansatz entgegen. In der Zeit der Fructternte gibt es natürlich von allem einmal zu naschen, ganz gleich ob Erdbeeren, Kirschen, Pflaumen, Pfirsiche usw., alles sind begehrte, eine Abwechslung bringende Leckerbissen. Die Mehlwurmgabe meiner Grasmücken ist folgende, in der gesangslosen Zeit, also in der Zeit der Ruhe, verabreiche ich für ständig keine Mehlwürmer, eine Ausnahme findet nur statt, wenn sich eine gewisse Appetitlosigkeit in bezug auf das Weichfutter einstellen sollte. Beginnen die Grasmücken mit dem Gesang, so erhalten sie, mit 2 Würmern beginnend, nach und nach steigend 4—6 Würmer. Daß manche Schwarzplättchen überhaupt keine Mehlwürmer beachten, andere wieder solche nur in der gesangsstillen Zeit verschmähen, ist eine altbekannte Tatsache. Nehmen meine Schwarzplättchen in der natürlichen Gesangsperiode als die ich beim Käfigvogel nach einmaliger Überwinterung die Zeit vom Januar bis Juni anspreche, Mehlwürmer an, so erhalten sie bis zu 4 Stück ohne irgendwelche Nachteile, ebenso ist dies die Zahl der Gartengrasmücken, bei Sperbergrasmücken kann man ruhig einige Mehlwürmer mehr reichen als bei den beiden vorgenannten Arten, ebenso vertragen Dorn- und Zaungrasmücken in der Gesangszeit einige Mehlwürmer mehr, die Dorngrasmücke verlangt auch ein mehr animalisches, nahrhaftes Futter als die übrigen Arten. Man soll in der Gesangsperiode mit der Mehlwurmgabe nicht lange wägen und wiegen, ob es 3 oder 4 oder 5 bis 6 Stück sein sollen, etwas anderes ist es in der Zeit der Gesangsruhe. Die

Bild von der Münchener Vogelschau (s. S. 55).

Stückzahl regelt sich bei meiner Vogelpflege nach dem Fortschritt des Gesanges und auch nach der Größe der Futterwürmer; vollständig ausgewachsene Mehlwürmer verfüttere ich nicht gerne, trotzdem es in materieller Hinsicht ein Vorteil ist, nehmen die Vögel lieber die „Kleinen" und „Halbwüchsigen"; große Würmer zerschneide ich bei kleinen Vögeln nach Eindrücken des Kopfes mit einer Scheere. Bei dieser Pflege meiner Grasmücken habe ich bei Gesangsbeginn in der Zeit um Weihnachten meistens ziemlich normale Vögel im Käfige sitzen, die mit unverstoßenen Schwänzen noch nicht viel von der schönen Form eines Frischfanges verloren haben. Bei Gartengrasmücken und Sperbergrasmücken, manchmal auch bei Schwarzplättchen tritt dieser schwanzlose Zustand unangenehm in Erscheinung und ist solch einem schwanzlosen Vogel noch ein Fettbäuchlein angemästet, so ist eine solche verunglimpfte Jammergestalt von einem Vogel wirklich ein das Auge beleidigender, unästhetischer Anblick. Aber leider nur zu oft verunzieren solche Produkte einer, nicht nach Art und Individuum eingestellten Fütterung die Käfige vieler Liebhaber.

Sprosser, Nachtigall, Rotkehlchen, Blaukehlchen, Rotschwänze, Laub- und Rohrsänger usw. verlangen ein kräftiges, vorwiegend animalisches Futter und gerade bei diesen Arten zeigt sich der Vorteil und vor allem die Notwendigkeit einer individuellen Fütterung am auffallendsten. Welcher Vogelpfleger wüßte nicht, was ihm z. B. dieser oder jener Sprosser, diese oder jene Nachtigall usw. für Schwierigkeiten bereitet hat. Trotz vollwertigen Futters ein Körperzustand unter normal, während ein Individuum derselben Art bei gleichem Futter zusehends fetter wurde. Hier haben wir nun verschiedene Futterstoffe an der Hand, die den Regulator in der Qualität des Futters abgeben müssen. Von vorneherein muß gleich erwähnt werden, daß es leichter ist, bei einer individuellen Fütterung seine Vögel normal zu halten als verfettete Vögel wieder normal zu bekommen; wer natürlich denkt, einen solchen verfetteten Vogel aus einem Futter, das aus geriebener Möhre, gemahlenem Zwieback, Fleischgarnelen, Hanf, Weißwurm, Quark und Ameisenpuppen bestanden hat, nun plötzlich nur den Hanf, Weißwurm und Quark als fettbildende Stoffe wegzulassen braucht, damit sich gar bald ein normaler Körperzustand zeigt, hat die Rechnung ohne die Gefahr, die dabei für den Vogel besteht, gemacht. Dieses vorgenannte sehr nahrhafte Futtergemenge ist wirklich manchmal bei Individuen einzelner Arten nötig, um sie nur normal zu halten, von einer Verfettung dabei gar nicht zu reden, hingegen genügt wiederum bei manchen Individuen ein bedeutend weniger nahrhaftes Futter unter Weglassung entweder von Quark oder Weißwurm oder gar von beiden, um eine zufriedenstellende Körperbeschaffenheit zu erlangen. Speziell unsere zarten Sänger wie Sumpfrohrsänger, Gelbspötter halte man weit über normal, denn ein mehr als gutgenährter Vogel verträgt eine plötzlich auftretende Krisis infolge Mischfutterverweigerung viel eher als unter normal gehaltene Vögel. Wer derartige Krisen aus der Praxis kennt, weiß auch vollends zu schätzen, was für ein wertvolles Futtermittel der Mehlwurm ist beim Eintritt solcher hartnäckiger Mischfutterverweigerung. Wollte man auf alle Einzelheiten einer individuellen Fütterung erschöpfend eingehen, so müsse man das ganze „Fütterungsproblem der Stubenvogelhaltung" aufrollen, doch genügt meiner Ansicht nach schon der Hinweis auf eine individuelle Fütterung und die Kenntnis der Nährwerte und sonstigen Eigenschaften der zur Verwendung kommenden Futterstoffe, um dementsprechend die Pflege der Stubenvögel einzustellen. Ganz besonders muß noch

Bild von der Münchener Vogelschau (s. S. 55).

vor einer Darreichung von säuerndem Futter und zu reichlicher Verwendung von gemahlenem Hanf im Weichfutter gewarnt werden, ein kleines Quantum macht das Futter infolge seiner öligen Substanz für die Eingeweide geschmeidig, doch hat der Hanf auch Stoffe in sich, die in größeren Mengen dem Vogel zugeführt, allerlei Erscheinungen hervorrufen können, wie Geschwüre, Entzündungen, Lähmungen, krampfartige Anfälle, schlechte Befiederung. Ist es auch nicht ganz so kraß, wie es durch die Meinung, die ich über eine reichliche Hanffütterung habe, erscheint, so ist doch äußerste Vorsicht am Platze.

Die Resultate und Erfolge einer individuellen Fütterung lassen sich nicht durch Worte charakterisieren und veranschaulichen, nur angesichts der dadurch vorhandenen Tatsachen und das sind in diesem Falle meine lebhaften, beweglichen, gesunden, körperlich über Normal stehenden Vögel in meinen Käfigen, deren Gesangsfreudigkeit und natürliche Körperformen mir der beste Beweis ist, daß die von mir stets geübte Methode einer individuellen Fütterung die Richtigste, sicher Erfolg versprechende ist, außerdem weiß ich auch, daß nicht nur ich, sondern noch ein großer Teil der Liebhaber seine Pfleglinge individuell behandelt, ferner auch, daß wiederum viele Liebhaber viel zu schematisch in der Stubenvogelpflege sind, denen sollen die Worte von der Notwendigkeit und Vorteilhaftigkeit einer individuellen Fütterung ganz besonders gelten. Mögen sie sich alle, nicht etwa durch meine Worte überzeugen, sondern nur anregen lassen, den wohlgemeinten Rat in der Praxis zu verwenden und es wird sich bei einer sachgemäßen Anwendung zeigen, daß es die Käfigvögel durch ihre Munterkeit und Gesangsfreudigkeit als Folgen einer ziemlich normalen Körperbeschaffenheit, danken.

Da der Hauptzweck unserer Liebhaberei dahin zielt, recht lange ausdauernde, stets im Gesang fleißige gefiederte Stubengenossen zu besitzen, so gehe man in der Praxis der Stubenvogelpflege nicht achtlos vorüber an der Notwendigkeit einer individuellen Fütterung.

Kleine Mitteilungen.

Naturfreunde! In der „Deutschen Jägerzeitung" vom 21. Dezember 1924 finden wir in einem Artikel betitelt „Der Eisvogel" unter anderem folgende Mitteilung: „Erst kürzlich las ich in Nr. 24 von „Wild und Hund", daß einer solcher Herrn" — gemeint sind Besitzer von Fischteichen — „sage und schreibe schon 200 (!) Eisvögel zum Präparator brachte". —

Nun möchte ich besonders die Gegner unserer Liebhaberei, die jeden verfluchen, der sich einmal einen Vogel für den Käfig fängt oder der gern mit Vögeln handelt, fragen, ob er gegen diesen Vogelmord, dessen sich der Herr noch dazu in einer angesehenen Jagdzeitung rühmt, eingeschritten werden kann und eingeschritten werden wird? Wehe dem Liebhaber oder dem Vogelfänger, welcher der Natur einige Vögel für seine Liebhaberei entnimmt und dabei von irgend einem Polizeiorgan ertappt wird. Am liebsten möchte man den schlechten Kerl gleich ins Zuchthaus stecken. Jene aber, zum Glück nicht alle, welche eine Jagd oder gar Fischteiche ihr eigen nennen, können mit ihrer Schrotspritze alles, was buntes Gefieder oder einen krummen Schnabel trägt, herunterknallen, ganz gleich ob Sommer oder Winter, ob geschützt oder durchs Vogelschutzgesetz geächtet und es als Jagdtrophäe nach Hause tragen. Ich kenne Präparatoren, die es verdammen, daß ihnen sogar während der Brutzeit soviele Vogelkadaver zur Präparation übersandt werden, aber die Leute leben eben auch von ihrem Beruf und stopfen aus, was ihnen gesandt wird. Und wieviel derartige Jagdbeute kommt in völlig unbrauchbarem Zustande an! Besonders im Frühjahr, wenn es noch wenig zum Knallen gibt, beginnt als Ersatz für die Jagd des noch geschützten Wildes das Vogelmorden. Was kann man da nicht alles bei den Präparatoren finden? Besonders sind es Blauraken, Eichelhäher, Eisvögel, Spechte, Nachtschwalben, Elstern, aber auch kleinere Singvögel, sodann alle Arten Tagraubvögel und Eulen. Wer kümmert sich darum? Niemand! Wir haben wohl ein „Reichsvogelschutzgesetz"! Aber in jedem Freistaat, ja beinahe in jedem Polizeibezirk wird es anders ausgelegt. Es scheint nur zur Erschwerung der Vogelliebhaberei und des Vogelhandels da zu sein.

Ist es bei diesem leichtfertigen Hinmorden unserer farbenprächtigsten Vögel wunderbar, daß Naturfreunde, welche hinausgehen, um solche Vögel zu sehen und zu beobachten, das vergeblich tun!

In allen Zeitungen wird der „Schutz der Natur" gepredigt, aber es geschieht nichts, um die farbenprächtigen Vögel, die massenhaft den Schießern zum Opfer fallen, der Natur zu erhalten. E. Schöndube.

Betrachtungen gelegentlich der „Münchener Vogelschau". Wie aus dem Bericht von Herrn K. Neunzig über die Heidelberger Ausstellung zu ersehen war, muß das Gebotene dort großartig gewesen sein, zudem die Veranstaltung von einem einzelnen Manne, Herrn Prof. Otto Fehringer, ausgegangen ist.

Da es mir aus verschiedenen Gründen unmöglich ist, weit entlegene Ausstellungen zu besuchen, so haben mein Freund, Herr Anton Wimmer sen. und ich beschlossen, die Münchener Vogelschau, welche vom 6. bis 11. Dezember stattfand, zu besuchen, zudem wir Provinzmitglieder des Bayr. Vogelliebhaber-Vereins, Sitz München, sind, und die Ausstellung von der Weltbundesgruppe Oberbayern, dem Bayr. Vogelliebhaber-Verein und dem Verbande der deutschen Gestalts-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter veranstaltet wurde. Leider konnten wir die Vogelschau nicht schon am 6. Dezember besuchen, wo abends Versammlung mit Familienunterhaltung stattfand, zu Ehren der Wiener Delegation, welche zur Ausstellung erschienen war.

Wir besuchten am 8. Dezember das Unternehmen und waren beim Betreten der Ausstellung über deren Reichhaltigkeit sehr überrascht. Die dekorative Aufmachung machte einen künstlerischen Eindruck. Es war da eine Schar von Vögeln aus den verschiedensten Erdteilen zur Schau gestellt, und das Leben und Treiben der farbenprächtigen Schar fesselte das Interesse der Besucher. Neben den verschiedensten Kanarien und Exoten war auch unsere heimische Avifauna gut vertreten. Manch Kenner und Liebhaber unserer heimischen Vogelwelt wird manchen Vogel entdeckt haben, der ihn interessierte. Die Tiere waren auch in schönen zweckmäßigen Käfigen untergebracht. Während der Nachmittagsstunden herrschte ein starker Andrang zur Ausstellung und man konnte so recht beobachten, wie sehr das Publikum für die ausgestellten Vögel interessiert war. Es bildeten sich Grüppchen, es wurde da erzählt und geplaudert über Gesang, Pflege usw. und man konnte so recht zufrieden lächelnde Gesichter wahrnehmen. Es war eine Freude, das so beobachten zu können, denn man konnte sehen, wie überaus lebhaft sich die Leute für diese oder jene Vogelart interessierten. — An Käfigen waren ebenfalls verschiedene Typen ausgestellt, worunter die durch ihre Gediegenheit auffallenden Münchener Käfige allgemeines Interesse fanden. — Bücher über praktischen Vogelschutz und -Pflege waren in großer Auswahl vorhanden, und man konnte in allem sehen, wie sehr sich die Vereine bemühten, um die Ausstellung schön und reichhaltig zu gestalten. — Nach Besichtigung der Ausstellung erfolgte ein Imbiß im dortigen Gastlokale und dabei hatten wir Gelegenheit, den 1. Vorsitzenden Herrn Ing. Flierl nebst den anderen Vorstandsmitgliedern kennenzulernen, sowie die Wiener Delegierten Herren Janouschek und Salinger, nebst einigen Augsburger Herren, welche zur Ausstellung gekommen waren. Es wurde da geplaudert und Gedanken ausgetauscht über unsere Liebhaberei, und so verging die Zeit, welche leider so kurz bemessen war, allzuschnell.

Wir kamen vollbefriedigt nach Hause; es waren schöne Stunden, welche uns die Vogelschau bereitet hat, und wir haben empfunden, daß eine Vogelausstellung die beste Stätte ist für Belehrung und Gedankenaustausch. Möge der Ausstellungssinn stets wach bleiben, getreu unserer Devise: Wer rastet — rostet.

Anton Luginger, Pfarrkirchen.

Sprechsaal.

Frage 5. Ich möchte die einschlägigen Liebhaber bitten, ihre Erfahrungen in nachfolgenden Fragen mitzuteilen:

1) Kann man zur Züchtung ein grünes und ein gelbes Paar in einem Käfig beisammenlassen? Ich beobachte, daß das grüne Weibchen sehr viel auf das gelbe Weibchen herumhackt.
2) Hat es irgend eine Bedeutung oder ist es zum Nachteil, wenn die Pärchen, sobald man jedes Paar allein käfigt, bedeutend an ihrer Lebhaftigkeit einbüßen; hat dieses dann eine Einwirkung auf die Zucht?
3) Ist es überhaupt zweckmäßig, mehrere Pärchen während der Brut in einem Käfig zu halten; ist es überhaupt möglich, ein gelbes und ein grünes Pärchen zusammen zu gewöhnen.

A. B., Hamburg.

Reichsverband d. Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Tauschvermittlung T.-V.: Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39; Kassierer Werner Geßler, Leipzig, Dresdner Str. 2.

In der letzten Vorstandssitzung sind aufgenommen worden die Herren Willy Riese in Guben und Oberlehrer Günther in Lommatzsch. Beide Herren erhalten noch brieflich Nachricht.

Nicht umsonst ist unsere Bitte um außerordentliche Unterstützung des Verbandes gewesen. Eingegangen sind zu diesem Zwecke 6.— M. von Herrn W. Schmitt-Prym, Aschaffenburg. Wir nehmen gern Anlaß, dem genannten Herrn für diesen Beitrag allerbestens zu danken und ihn auch unseren übrigen Mitgliedern zur Nachahmung zu empfehlen.

J. A. Petters, 1. Schriftführer.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf dem Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

H. Ditzell, Leipzig, Wilhelmstr. 68. 1,1 gehaubte Glanzkäfertauben, 1,0 Rosttäubchen, weißbäckige Lerchen.

N. Diwersy, Merzig a. d. Saar, A. Z.-Mtgl. 183. Dayaldrossel.

Wilhelm Eimeke, Hamburg 23, Eilbecker Weg 90. Spottdrosseln, mex. Kuckuck, Indigofinken, Kubafinken, Papstfinken, rote Kardinäle, Schwarzkehltrupiale, Klarinettenvögel, Fischertukane, Katharinasittiche, Massenawachteln, grüne Häher.

G. Haase, Grohn b. Vegesack, A. Z.-Mtgl. 385, Ornis 352. 1,1 Kakussittich, 1,1 großen Alexandersittich.

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a. Schamadrosseln, Weibchen, Goldstirnblattvögel, Blaubärtige Blattvögel, Bergrötel, Braunrückenstrauchschmätzer, Schwarzkappentimalien, Weißkehldrosseln, Klarinettenvögel, Braunbrüstige Blauschnäpper, graublaue Fliegenschnäpper, Rotbauchfliegenschnäpper, Zwergtrauerschnäpper, Rubin-Nachtigall, Mennigvogel, Molukkenkakadu, Gelbnackenamazonen, Mohrenkopfpapageien, Toviisittiche, satingrüne Wellensittiche, olivgrüne Wellensittiche, weiße Reissinken, Wachtelastrilden, Elfenastrilden, Mosambikzeisige, Maskenweber, Tahaweber, afrikanische Zwergtäubchen, Sperlingskauz.

Gustav Reiß, Berlin, Gontardstr. 4. Meyers Papageien, Pflaumenkopf-, kleine und große Alexandersittiche, Schamadrosseln, Männchen, Weibchen, Dayaldrosseln.

Ed. Schütze, Eystrup a. d. Weser. 1,1 Gay's Ammerfinken, 2,0 dottergelbe Weber, 1,1 Mosambikzeisige.



Herrn W. B., Heilbronn; Herrn R H., Kehlheim; Herrn A. A., Hamburg; Herrn N. G., Wien; Herrn Sch., Fechenheim; Herrn M. K., Dessau: Beiträge dankend erhalten.

Herrn J. St., Köln; Herrn Dr. med. B., Natibor; Herrn A. W, Rio de Janeiro; Herrn E. St., Dresden-A.; Herrn E. M., Küllstedt: Ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn Dr. med P., Klötze. Der Zebrafink ist einem Herzschlag erlegen. Krankheitskennzeichen konnten nicht festgestellt werden.

Herrn G. Z., Eisenwerk Pfeilhammer. Man kann nichts tun, um Wellensittiche zur Fortpflanzung zu bewegen als sie richtig füttern und ihnen sachgemäße Nistgelegenheit zu bieten.

Hern E E., Barmen. Zum Bestreichen kahler Stellen benutzt man am besten Karboliäureöl (1%). Bei der G. könnte das Bestreichen ruhig vorgenommen werden. Da Gartengrasmücken normalerweise im Frühjahr das Gefieder wechseln, ist es vielleicht ratsam, abzuwarten, ob nicht von selbst die Befiederung eintritt. Zuweilen mausern sie in der Gefangenschaft, aber auch nur im Spätsommer. Auch wenn das bei den Ihrigen der Fall ist, wäre abzuwarten, ob sich das Gefieder im Februar-März nicht von selbst ergänzt.

Herrn J. Sch., Tübingen. Die einzelnen Bestandteile des Futters, von dem eine Probe eingesandt wurde, schienen einwandfrei zu sein, soweit man sie erkennen kann, also Ameisenpuppen, Weißwurm. Die feingemahlenen Bestandteile, anscheinend Garnelenschrot, Gebäck und etwas Fleischmehl. sind bei der fast mehlartigen Beschaffenheit nicht zu definieren und zu begutachten.

Herrn W., München. Der Stieglitz ist einer mit Abzehrung verbundenen Ernährungsstörung eingegangen.

A. G., Hamburg. Es ist möglich ein grünes und ein gelbes Paar Wellensittiche in einen Raum zu halten und zu züchten. Wellensittiche sind gesellig nistende Vögel. Erfahrungsgemäß werden in kleinen Räumen am besten 2 Paar zusammengehalten. Da die grünen Wellensittiche im allgemeinen lebenskräftiger sind als die gelben, werden letztere von ihnen zuweilen tyrannisiert. Es kann auch mal umgekehrt sein. Dazu kommen die Eigentümlichkeiten des einzelnen Vogels. Es lassen sich für solche Dinge keine allgemein gültigen Regeln aufstellen. Auch mit einzeln gehaltenen Paaren lassen sich gute Züchtungserfolge erzielen. Zänkische Wellensittichweibchen sind für den Verlauf der Brut anderen immer gefährlich.

E. G., Ludwigslust. Der Käfig für einen Züchtungsversuch mit roten Kardinälen muß sehr geräumig sein (1—1,5 qm). Am besten eignet sich hierfür ein größerer Außenflugraum, der mit Gebüsch und einem Nadelholzbaum (Kiefer) ausgestattet ist, auf den wagerecht laufenden Zweigen wird meist ein freistehendes Nest aus allerlei Halmen und anderen Nistitoffen erbaut. Ein Harzer Bauer wird selten zum Nestbau benutzt. Gelege, 4—5 Eier, wird in etwa 14 Tagen vom Weibchen erbrütet. Brutzeit April—Juli. Junge werden von beiden mit Insekten, frischen Ameisenpuppen, Mehlwürmern (s. unten), später nach dem Nestverlassen, noch etwa 12 Tage, auch mit Obst und Beeren gefüttert. Gesang laut melodisch, wechselvoll, allmählich fallend und dann wieder steigend, laut und voll. Überwinterung am besten in ungeheiztem Zimmer oder im Freien. Baden gern. Ernährung: Sämereien (Hafer, Hülsenreis, Spitzsamen, Rübsen, Buchweizen, Sonnenblumenkerne, wenig Hanf). In der wärmeren Jahreszeit und als Aufzuchtfutter Insekten oder Ersatz dafür (Gemisch aus gleichen Teilen Ameisenpuppen, Weißwurm, Zwieback und fein geriebener Möhre, mit wechselnder Beigabe, wie hartgekochtes, feingehacktes Ei, rohes fein gewiegtes, mageres Fleisch. Notwendig sind immer Beigaben von Obst, besonders Apfel, Beeren, Grünkraut und frischen Zweigen mit schwellenden Blattknospen.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

hrgang 54 29. Januar 1925 Heft 5

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Über die künstliche Aufzucht junger Papageien. Von Friedrich von Lucanus, Berlin. (Schluß.)
Die Vogelschau zu Hamburg. Von A. Weber. (Schluß.)
Indier bei Fockelmann. Von Karl Neunzig.
Atlantische Vögel. Von Adalbert Athen, Hamburg. (Forts.)
Individuelle Fütterung. Von J. Birk, Leipzig. (Schluß.)
Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.) Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf. vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

reutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen. Alle Vereine und Liebhaber, die unserem Verbande bereits angeschlossen sind, bitten wir an dieser Stelle nochmals, die restlichen Mitgliedsbeiträge unserem Kassierer Herrn Erich Merz, Berlin-Friedenau, Wilhelm-Hanff-Str. 14II, umgehend einzusenden. Vereine und Liebhaber, tretet unserem Verbande bei und unterstützt unsere gute Sache. J. A.: Erich Merz.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden.
J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Angemeldet sind die Herren Gerhardt Clauß, Grimma i. Sa., Lorenzstr. 3; Otto Wolschendorf, Bäckermeister, Pößneck i. Thür., Saalfelderstraße 3; Carl Schneider, Manns Au, Bankoberbeamter; B. Budweis (Tschechoslovakien), Sokolska 17. — Für die „Nothilfe" sind eingegangen von: Unbenannt Mk. 1,00, Mtgl. 14 Mk. 2,70, Mtgl. 30 Mk. 5,00, Mtgl. 61 Mk 2,00, Mtgl. 72 Mk. 3,00, Mtgl. 171 Mk. 3,00, Mtgl. 221 Mk. 2,00, Mtgl. 296 Mk. 2,00. Zusammen Mark 20,70. A. Krabbe.

Aus den Vereinen.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquarums. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen.
J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurter Str. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. V.: Emil Ivo, Schriftführer.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein Vogelschutz u. -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstr. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Bernhard Kühn, Vors.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 3. Februar 1925. Gäste, auch Exotenliebhaber, stets willkommen. J. A.: Arnold Weber, 1. Vors.

Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber. 48. Mitgliederversammlung am 11. Dezember 1924. Anwesend waren 14 Personen. Neu aufgenommen wurde: Kaufmann Wilhelm Härke. Es wurden eine ganze Reihe von Eingängen verlesen und besprochen und eine lebhafte Aussprache ergab sich über die Ausstellung in Berlin, an der unser Mitglied Böniker teilnahm. — Es soll versucht werden, die Mitglieder des Lindener Vereins wieder zum regelmäßigen Besuch unserer Veranstaltungen zu gewinnen. — Dr. Neuwerth macht nach wie vor für die Mitglieder die Untersuchung kostenlos, zieht aber für jeden Fall einen kleinen Betrag ein, der in unsere Vereinskasse fließen soll. Dann hielt Dr. Neuwerth einen wertvollen, wissenschaftlichen Vortrag über die richtige Ernährung, vor allem unserer Körnerfresser. Auch der Laie muß daraus entnehmen, daß in dem Futter die hauptsächlichsten Grundstoffe stets vertreten sind. Er muß für ständige Abwechslung sorgen, und auch dafür, daß nicht zu viel fetthaltiges Futter gegeben wird. Das Grundfutter soll in der üblichen Mischung immer aus Rübsen, Glanz, geschältem Hafer, Hirse und Leinsamen bestehen, dann müssen den Vögeln etwas Sonnenblumenkerne und Hanf und regelmäßig etwas Eifutter, entweder in der Form von Pulver oder von Eierkäse, gegeben werden, wie letzterer in der „Gefiederten Welt" ausführlich beschrieben ist. Wesentlich ist die Bekämpfung der Milben, die am besten durch gutes Insektenpulver geschieht. Alle Vögel sollen stets einen kleinen Zusatz von Lahmanns Nährsalz zum Futter haben. — An den Vortrag schloß sich eine rege Aussprache über die Futterfrage. Appel.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden, Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen.

Die Versammlung am 17. Januar war von 14 Mitgliedern besucht. Der Vorsitzende hielt einen Vortrag über die Winterpflege der beliebtesten einheimischen Käfigvögel, dem sich eine längere Aussprache über Fußkrankheiten der Erdsänger, Mehlwurmfütterung usw. anschloß. — Der Schriftführer verlas einen längeren Artikel von Thienemann über die Vogelwarte in Rossitten. — Die nächste Versammlung am 31. Januar ist Hauptversammlung. Gäste sind, wie immer, jederzeit willkommen. A. Voigt, Schriftf.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst., Boppel, 1. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. d. M., abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Die Neuwahl des Gesamtvorstandes in der Sitzung am 16. Januar 1925 brachte folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Herr Stadtverwaltungs-Inspektor Reinholdt; 2. Vorsitzender Herr Kaufmann Ließmann; 1. Schriftführer Herr Dentist Kaczoreck; 2. Schriftführer Herr Kaufmann Paßlack; Kassierer Herr Stadtsekretär Bouillon; Beisitzer die Herren Lehrer Blochberger, Kaufm. Siebert und Präparator Wadewitz; Ehrenrat die Herren Maler Engelbrecht, Landesversicherungsbeamter Oltersdorff und Kaufmann Oetzel. J. A.: Kaczorek. 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Gäste stets willkommen. Nächste Sitzung Donnerstag, den 5. Februar 1925, Generalversammlung. Der Vorstand. J. A.: J. Birk, 1. Vors.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.
K. Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Unsere nächste Versammlung findet am Mittwoch, dem 4. Februar, abends 8 Uhr, bei unserem Mitgliede Herrn Normast im Gasthof „Kaiser Friedrich," Breslauer Str. 50, statt. Liebhaber sind als Gäste willkommen. Wichtige Tagesordnung.
J. A.: Friedrich.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am zweiten Mittwoch eines jeden Monats Versammlung im Alten Fritz, Berliner Straße. Beginn 8 Uhr. Gäste sind willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Magdeburg-West, Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber zu Mannheim. Versammlung aller 14 Tage, Samstag abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Restauration z. gold. Falken", S. 1. 17. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. Daubmann, 2. Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). An jedem zweiten Mittwoch im Monat findet in unserem Vereinslokal „Parkhotel", Epinaystraße 1, unsere Versammlung statt. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an.
Franz Heinrich, 1. Schriftf

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Bayrischer Vogelliebhaberverein, Sitz München (E.V.). Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft im Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Rud. Engel, 1. Schriftf.

Am Samstag, dem 31. Januar 1925, findet die heurige Generalversammlung im Vereinslokal „Pschorrbräu", Bayerstraße, statt. Tagesordnung: 1. Jahresbericht des Vorsitzenden, 2. Kassenbericht des Kassierers, 3. Bericht der Revisoren, 4. Neuwahl der Vorstandschaft, 5. Anträge und Verschiedenes. — Mitglieder, die mit den Beiträgen im Rückstande sind, werden ersucht, diese bis zur Generalversammlung zu begleichen, widrigenfalls die Streichung beantragt werden müßte. — Die aus der Bibliothek entliehenen Bücher sind zur G.-V. einzuliefern.

Die Vorstandschaft. J. A.: Rud. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegründet 1. Mai 1923. Vereinsabende aller vier Wochen, in der ersten Woche des Monats verbunden mit Vortrag, in der dritten Woche jeden Monats nur gesellige Zusammenkunft. Vereinslokal „Sächsischer Hof". Gäste stets willkommen. Studienrat Professor Jahn 1. Vorsitzender; Werkmeister Mann 2. Vorsitzender; kaufm. Angestellter Reinhardt Schriftführer.

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

J. A.: Paul Schmidt, 1. Vorsitzender, Zwickau i. S., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Hilfswärter [127

für Vögel und kleine Säugetiere gesucht.
Zoolog. Garten Berlin.

Schlagnetze für Sperlinge, Amseln p. 2.50 ℳ, für Tauben, Rebhühner p. 4.50 ℳ. Nachn., bei Voreinsendung d. Betrag. franko. [128] Fangnetzfabrik **E. A. Müller, Schlotheim Th. 3.**

Mehlwürmer

g. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. anko versend. **D. Waschinski & Co., Biesenthal I (Mark).** [129

Mehlwürmer Pfd. 5 ℳ, 6 Pfd. 30 ℳ frc. Nachn.

0] **Jeltner, Breslau,** Weinstr. 12.

1] Mehlwürmer, reine Ware,

gen Eins. von 1.75 ℳ 1/4 Pfd. franko. h. **Witte,** Niederndodeleben b. Magd.

Deutsche Ameisenpuppen (1924) pro Pfund 8 ℳ,
Ia Elbweißwurm (1924), pro Pfund 5 ℳ. [132
NB. Versand erfolgt per Nachnahme. ei Anfrage bitte Rückporto.
ermann Arold, Zoolog. Handlung, **Berlin N 58,** Franseckstr. 4.

as beste Weichfresserfutter ist

uska	Pfd. 3.—
eißwurm	„ 6.—
neiseneier (finnische) .	„ 6.—
neiseneier (deutsche) .	„ 7.—

eine allseitig anerkannten Weichfutterischungen sind:

imus	Pfd. 2.50
mis	„ 0.80
lbenhirse	„ 1.60
lberhirse	„ 0.60

W. Lenger, Berlin N 58
Schönhauser Allee 70 a. [133

Vogelfutter [134

Kanarien, Waldvögel, Exoten, pageien, Weichfresser. Anerkannt ährteste Mischungen auf Grund langiger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,
ndlinring 1. Telephon 14 958.
Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Reform-Käfige

Zerlegbar, Leichteste Reinigung, Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919/22 (siehe Gefiederte Welt 1920, Heft 14—16), Goldene Medaille Leipzig 1921/22 werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannäpfe, Ledertuchdecke.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!

Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.

Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe

Heck-, Flug-, Einsatz-Käfige.
Ausstellungs-Käfige nach Vorschr. d. V. D. K.
Transport-Käfige, jeden Posten.

Anfragen Rückporto beifügen. Katalog gegen Einsendung von 0,50 M. in Briefmarken. 135

Schlagnetze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware.

Kühn & Muschter, Leipzig,
Promenadenstraße 29. Telephon 10 226.

Bankkonto: Allgem. Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna; Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506. — Postscheckk.: Leipzig 92 250.
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Ornis-Haus Halle-Saale

Gegründet 1912

Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)

Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall., Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspött., Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [143

Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1
Preisliste auf Wunsch!

Mehlwürmer rein vegetabilisch ernährt, à Liter (ca. 600 g) R.-M. 8.—, 1/4 Liter (ca. 150 g) R.-M. 2.— **franko** bei Voreinsendung des Betrages. [144
Bonitas-Versand, Rostock i. M. III.

Wer auf eine ausgiebige, gesunde Nachzucht rechnen will

der verabreiche täglich den Weibchen **„L. K."** trocken so viel sie fressen mögen, den Hähnen **„L. K."** mit geriebener Karotte angefeuchtet, täglich 1 Teelöffel gestrichen vorgesetzt. [136

Ich liefere franko jeder Poststation:

Postkoll 8 Pakete 1/2-Kilo-Packung inkl. . .	11,— ℳ
1 Paket 1/2-Kilo-Packung inkl. . . .	1,20 ℳ
Probe-Beutel franko	0,80 ℳ

Ia. Rübsen, Glanz, Hanf, Mohn, Schälhafer, Hirse, Sepia usw. stets zu billigen Tagespreisen am Lager.

Lorenz, Dresden, Drehgasse 5.

Mehlwürmer

à Pfund 5 ℳ, bei 6 Pfund Porto und Verpackung frei.

Ia Ameiseneier . . . à Pfd.	7 ℳ
Ia Weißwurm . . . à „	6 ℳ
Ia Minska-Zecken . . à „	3 ℳ
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen . . . . à Pfd.	1 ℳ
Ia Garnelen, gem. à Pfd.	0.40 ℳ

Ia Universalfutter.

Alleckwa I für Nachtigallen	22 ℳ
„ **II für Grasmücken**	1.80 ℳ
„ **III für Drosseln** .	1.50 ℳ

Proben und Analysen zur Verfügung. Vertreter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [145

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser

A. Eckrich II., Waldsee (Pfalz).

Prima **Ameiseneier** pro Pfund	8.— ℳ
„ **Weißwurm** „ „	8.— ℳ
„ **Muska** „ „	3.— ℳ
„ **Trocken-Eigelb** „	4.— ℳ
„ **Körnerfutter** „ „	0.60 ℳ

Versand erfolgt per Nachnahme oder vorher. Einsendung. [146
Postscheckkonto: Berlin Kt.-Nr. 153990.
Friedr. Gust. Müller, Zoolog. Handl., **Berlin SW 61,** Blücherstr. 61.

Gebe ab: 1 Zuchtp. Ia gelb. Gestaltskanarien

(Münchener Holländer), 1923er Brut gegen Höchstangebot. Ferner: **2,0 Gesangskanarien** (Selbstzucht 1924) zu ℳ 18.— und 25.—; flotte Sänger, letztere kann auch als Vorsänger gebraucht werden. Sämtliche Vögel haben geschl. Fußringe. [137
Jos. Seger, Schopfheim (Baden).
A. Z.-Mtgl. 311.

Schamadrossel-Zuchtweibchen, 2 jährig, schon mit Erfolg gebrütet 100 Fr. **Mex. Blausplötter Männch.** 50 Fr. Beide ganz tadellos im Gefieder und Kondition. Einige 100 kg. getrockneten **Ia Seidenwurm,** garant. extra für Vogelfutter ohne Säuren oder Soda bearbeitet, per kg. 2 Fr. Nur in größeren Posten, keine Postkollis. [138

Jos. Meyer,
Verwalter der Städtischen Volieren.
Luzern (Schweiz).

Mehrere echte Gemsbärte

noch ungebunden, billig zu verkaufen.
Joh. Ruppert, Würzburg,
Mettengasse 18. [139

Goldhähnchen, gut eingew. Stck 6 ℳ
Schmetterlingsfinken . . Paar 5 ℳ
Atlasfinken in Pracht . . „ 5 ℳ
Silberschnäbel . . Paar 4.50 ℳ
Amaranten . . . . . „ 4.50 ℳ
Bandfinken . . . . . „ 6 ℳ
Rotschwänzchen . . . „ 6 ℳ
Weißwangenlerchen . . Stck. 4 ℳ

E. Schöndube, Berlin.
140] **Elisabethkirchstraße 1.**

Schönes Hündchen.

Hündin, zirka 30 cm hoch, kupiert, rehfarbig, im Winterfell, verkauft oder vertauscht **Johann Fischer, Waldsassen,** Mitterteicherstraße 54. [141

0,1 Angorakatze

wenn möglich jung, sucht zu kaufen
142] **E. Fredenhagen,**
Offenbach a. M., Kaiserstraße 1 II.

Verkaufe:

6,12 Kanarien, prämiiert mit 1. u. 2. Preisen, **Wellensittiche,** Zuchtpaar, grün und gelb, mit Jungen, sowie **1,2 Tigerfink, 1,2 Silberschnabel, 1,1 Mosambikzeisig** und **verschiedene Weber** krankheitshalber billig [147
K. Schurz, Würzburg, Pleitenturm 6, II. Aufgang, III. Stock

Offeriere hiermit freibleibend in erstklassigen einwandfreien Exemplaren:

Molukken-Kakadus

fingerzahm und sprechend

Stück 225 Mark.

Roter Arara . . . . . Stck. 200 ℳ
1 gar. Zuchtpaar rot. **Kardinäle,** 80 ℳ
1 Goldaugentimalie . Stck. 30 ℳ
1 Orphensgrasmücke . Stck. 50 ℳ
Weißblütige **Nachtigallkanarien** 40 ℳ
Graupapageien, große helle fingerzahme sprechende Kongovögel Stck. 150 ℳ
nicht ganz zahme . . Stck. 90 ℳ
Blaustirnamazonen . Stck. 50—60 ℳ
Große **Alexandersittiche,** Zuchtp. 40 ℳ
Kleine „ Stck. 12 ℳ
Tarant. Unzertrennliche . Paar 25 ℳ
Wellensittiche, grün und gelb Paar 15 ℳ
Schamadrosseln, Männch. . Stck. 60 ℳ
Weibchen . Stck. 60 ℳ
Goldstirnblattvögel . . . Stck. 45 ℳ
Roter Kardinal, ganz erstklassig im Gesang . . . . . Stck. 40 ℳ
Katzendrosseln . . . . . Stck. 30 ℳ
Schwefelgelber Tiran . . . Stck. 30 ℳ
Goldkopfstar . . . . . Stck. 30 ℳ
Soldatenstare . . . . . Paar 25 ℳ
Langschwanz. Glanzstare Stck. 20 ℳ
Schwarzplatten im Gesang . Stck. 15 ℳ
Zebrataubchen . . . . . Paar 12 ℳ
Möwchen . . . . . Paar 12 ℳ
Graugeh. Kardinäle, Paar 15, Stck. 8 ℳ
Gilb- und Tahaweber . . Paar 12 ℳ
Orangeweber in Pracht . . Paar 8 ℳ
Kleine Kubafinken . . . Paar 25 ℳ
Schwarzköpfige Gouldamadinen Ia Zuchtp., 6 Mon. gekäf. Paar 100 ℳ
Kanarienroller, flott i. Ges. Stck. 15 ℳ
Kanarienweibchen . . . Stck. 3 ℳ
Nesusaffen . . . . . Stck. 40 ℳ
Weißkopftapuziner, zahm . „ 125 ℳ

Grundreelle Bedienung.

Tierhandlung

Max Kleinert

Berlin NO 18, Strausberger Str. 13,
Fernruf Alexander 3313. [148

Da ich Lötzen verlasse, muß ich leider meine Vogelzucht auflösen. Ich habe daher abzugeben **gegen Gebot** (die gewöhnlicheren Arten ganz billig) folgende Vögel in meistens erprobten Zuchtpaaren:

Große u. kleine Kubafinken, Gouldamadinen, Rotkopfamadinen, Schnurrbärtchen, importierte Zebrafinken, jap. Möwchen, Wellensittiche, tar. Unzertrennliche, Weißkehlpfäffchen, Bandfinken, Safranfinken, Mosambikzeisige, Grauedelsänger, Papstfinken.

Versandbauer muß eingesandt werden. Ich garantiere für erstklass. Zuchtvögel.

149] **Bernd Regge,**

Lötzen (Ostpr.). A.Z.-Mtgl. 264.

Edle, reingelbe Gesangs-Kanarien 12 ℳ, **bunte** 10 ℳ, **reingelbe Weibchen** 3 ℳ, **bunte** 2 ℳ. **6teil. Heckeinrichtung** von Muschter, fast neu, **Einsatzkäfige, Flugkäfige, Schindler-Sprosserkäfige usw.** zusammen ganz billig. [150

E. Blankenburg, Kolberg i. Pomm.,
Münderstraße 30.

Ia Zuchtmaterial, St. Seifert.

Gebe von mein. mit gr. Gold- u. Silb. Med. höchstpräm. Hohl- u. Knorrstamm tief tremulierend, geb. Hohlroller, weich. Hohlkl., Ia Pfeifen usw., preiswert ab: **Hähne,** je nach Leistung, 14, 17, 20, 25, 30 bis 40 Goldm., **ff. Weibchen,** mit besten Eigenschaften, 3—4 Goldm. Möglichst selbst kommen, sonst bitte um Vertrauen. Bei Anfragen Rückporto.

Karl Eichholz, Dresden 22,
Leisniger Straße 24 III. [151

Von meinen neuen Eingängen kann ich heute in sehr schönen Exemplaren empfehlen:

Schamadrosseln, Ia im Gesang Stck. 60.—
„ Weibchen . „ 60.—
Goldstirnblattvögel . . . „ 45.—
Blaubrüstige Blattvögel . . „ 60.—
Bergrötel . . . . . „ 60.—
Schwarzkappentimalien . . „ 55.—
Weißkehldrosseln . . . . „ 15.—
Klarinettenvögel . . . . „ 85.—
Braunbrüstige Blauschnäpper „ 60.—
Rubin-Nachtigall . . . . „ 150.—
Mennigvogel . . . . . „ 130.—
Graupapageien, große, helle, vom Kongo, die sprachbegabtesten „ 110.—
schon ganz zahme . . . „ 140.—
Blaust.-Amazonen, jg., s. gelehr. „ 60.—
m. kleinem Krallenfehler „ 50.—
Gelbnackenamazonen, junge „ 75.—
Mohrenkopfpapageien, junge „ 40.—
Tovisittiche . . . . Paar 36.—
Grüne Wellensittiche, junge „ 16.—
Grüne Wellensittiche (Import) Paar 20.—
Gelbe Wellensittiche . . . „ 20.—
Saftgrüne Wellensittiche . „ 60.—
Olivgrüne Wellensittiche . „ 60.—
Weiße Reisfinken . . . . „ 75.—
Grau-Kardinäle m. roter Haube Stck. 10.—
Elfenastrilden . . . . Paar 20.—
Tigerfinken . . . . . „ 6.—
Schmetterlingsfinken . . . „ 5.—
Atlasfinken . . . . . „ 4.—
Bandfinken . . . . . „ 5.—
Silberschnäbelchen . . . . „ 4.20
Amaranten . . . . . „ 4.—
Grauastrilden . . . . . „ 3.80
Klein Elsterchen . . . . „ 7.—
Grauedelsänger . . . . „ 6.—
Mosambikzeisige . . . . „ 9.—
Blutschnabelweber . . . . „ 5.—
Orangeweber . . . . . „ 6.—
Tahaweber . . . . . „ 10.—

Versand per Nachnahme oder Voreinsendung. Porto und Verpackung 3.50 ℳ, dringend 6.50 ℳ [152

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a.

Wir suchen

Photographien von Tieren, Pflanzen, Gesteinsarten

und bitten um Einsendung von Rohabzügen. Es kommen nur Aufnahmen aus der freien Natur in Frage, nicht Bilder aus zoologischen und botanischen Gärten. Einsendungen werden „eingeschrieben" erbeten und eingeschrieben zurückgesandt; Portoersatz wird geleistet. Honorar nach Übereinkunft. [153

Verlagsbuchhandlung

Ferdinand Hirt & Sohn,

Leipzig, Salomonstraße 15.

Bastarde:

Stieglitz-, Zeisig-, Hänfling-, Ia Sprosser-Bastarde 12—25 ℳ, **Kanarien,** spez. Schockel (Nitschke) 10—50 ℳ, Weibch. 2,50, **Schwarzplättchen,** Ia, Doppelschläger, 16 ℳ. **Tausche Waldvögel,** Rückpor., desgl. **Chin. Nachtigall, 10 Paar Wellensittiche,** streng reell.

J. Schaal, Stuttgart,
Böblinger Straße 14, I r. [154

Habe noch abzugeben in Ia Exemplaren:

Steinrötel . . . . . 50 ℳ
Orpheusgrasmücke . . . 60 „
Deutsche Nachtigallen i. Schlg. . . . . . 40—50 „
Sperbergrasmücke . . . 25 „
Gartengrasmücke . . . . 25 „
Schwarzblättchen . . . 15—20 „
Rotkehlchen . . . . . 5—8 „
Kleiber . . . . . 8 „
Feldlerchen . . . . . 5—8 „
Lerchenammer . . . . . 10 „
Singdrosseln . . . . . 10—20 „
Amseln . . . . . 12—15 „
Schamadrosseln . . . . 60 „
Wellensittiche, Zuchtpaare, gelbe und grüne . . Paar 20 „
Ia Blaustirnamazonen, sprechend . . . . . 75 „
0,1 Edelmarder, zahm . . 100 „

Versand per Nachnahme oder Vorhereinsendung. Porto und Verpackung 3.50 ℳ, dringend 6.50 ℳ.
Bei Anfragen bitte Porto beifügen.

G. Behnke, Berlin O 34,
Petersburger Straße 29. [155

Sperlingspapagei,

blaubürzl., 1,0 gibt ab oder tauscht gegen **junge Möwchen** bei Zuzahlung.

Enno Schlosser, Weischlitz (Vogtl.).
A. Z.-Mtgl. 196. [156

Hochedle Gesangs-Kanarien

tourenreiche, fleißige Sänger (Edelroller). **Rein gelbe Gesangs-Kanarien,** Hähne sowie Zuchtweibchen, auch geeignet für Bastardzucht. **Garantie:** Versand nur kerngesunder Vögel, streng reelle Bedienung. Zuchtpärchen 20 ℳ.

J. Franke, Dresden A

Lortzingstraße 3. [157
Prämiiert: Vogel-Ausstellung Dresden 1924 „Goldene Medaille".

Abzugeben:

1,5 Kanarienstieglitzbastarde 20 ℳ,
1,4 gelbe Harzer Kanarien 20 ℳ.

Suche:

[158
Nachtigall oder Sprosser.
W. Kinast, Überlingen a. Bodensee.

Sprosser

gebe ab für 60 ℳ.

Schwarzplatte

12 ℳ. (Rückantwort.)
P. Rückert, Berlin O 112,
Simon-Dachstraße 7. [159

Blaue Wellensittiche

zu kaufen gesucht, zahle hohen Preis. Bitte auch andere aparte Farben anbieten.

Richard Heydenreich,

160] **Bad Suderode,** Harz.

Wellensittiche

Aus meiner Spezialzucht kann einige prima Exemplare in Farbe, blau sowie grün mit 3/4 Blau-Blut abgeben. Blau per Stück ℳ **60,** grün mit 3/4 Blau-Blut ℳ **25.** Nur reelle Bedienung.

Hans Steiner, Wirt zum Merkur,
Biel (Schweiz). [161

Flugkäfig
1.50 br., 70 tief, 90—1.10 hoch 70—80 ℳ.
Insektenfresserkäfig
65 breit, 37 hoch, 25 tief Stück 15 ℳ.
Verzinnte u. lackierte Drahtkäfige mit und ohne Glaswände Stück 6—10 ℳ.
Messingkäfig
mit Glaswänden 15—18 ℳ.
Käfigständer und Tische 9—15 ℳ.
Harzer Roller 9—12—15 ℳ.
Vorsänger 20—30 ℳ.

162] **Zuchtweibchen** 3—4 ℳ.

J. Stenger, München,

Türkenstraße 53/2.
Inh. vom Sieger- u. Gruppenmeisterschaftspreis. — Eigene Großzüchterei.
Volle Garantie und Reellität.

Anbiete Import a Mexiko:

Hochrote Kardinäle Stück 30.—
„ Weibch. „ 40.—
Amerik. Spottdrosseln „ 30.—
Papstfinken, 2jährige Paar 25.—
Wunderschöne rote Arara Stück 175.—
Doppelgelbkopf-Amazonen „ 45.—
Trupiale „ 30.—
Klarinos, prachtvoll schlagend „ 75.—
Kubafinken Paar 25.—
Indigofinken „ 25.—
Rotbrustfinkenlinge Stück 15.—
Grüne Häher „ 25.—
Katzendrosseln „ 20.—
Weißkehldrosseln „ 35.—
Papstfinken „ 15.—
Massenawachteln „ 25.—
Katharinasittiche „ 20.—
Falken „ 30.—

Alle Vögel in bester Verfassung.

Gemischte Importen

Kapuzineraffen Stück 75.—
Zahme Stunks „ 100.—
Opossums „ 60.—
Graue Füchse aus Florida „ 75.—
Waschbären aus Mexiko „ 100.—
Alligatoren von 60, 90 u. 120 cm Länge
kleine Schildkröten. Leguane
Zierfische in vielen Seltenheiten vorhanden. [
Stets Eingang von reichhaltigen Importen.

Zoologisches Im- und Exporthaus

Wilh. Eimeke, Hamburg 25
Eilbecker Weg 90.

Blaustirnamazone,

gut eingewöhnt, schön im Gef., finge zahm, kommt auf d. Hand, kein Schreie sehr gelehrig (kl. Krallenf. an einem Fuß 50 ℳ, eventuell Tausch. [1

Udo Mertes, Mainz, Wallaustr. 6

Nanday-Sittiche

1,1 gegen Gebot abzugeben.

Heinrich Breuer,
Lehe. [165

In Gründung begriffener Vere
erbittet von Händlern und Züchte
Preislisten und Lagerverzeic
nisse über alle Arten Vögel un
andere Tiere, Literatur un
Zuchtutensilien etc. [1

Carl Schneider-Manns Au, B. Budwe
Sokolska 17 CSR.

Beschwerden wege
Nichtzustellung der „G
fiederten Welt" sind bei
zuständigen Postamt a
zubringen.

Inserate

für das am 5. Febr. 1925 zur A
gabe gelangende Heft 6 der G
Welt erbitten bis 31. Jan. 1925 fr

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdb.



Johann Friedrich Naumann
geb. 1780 — gest. 1857

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 5. Februar 1925 | Heft 6

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Johann Friedrich Naumann.

Johann Friedrich Naumanns Ruhm wird nicht verblassen, solange es eine deutsche Wissenschaft gibt. Er ist es, der den Namen Naumann mit unvergänglichem Glanze umkleidete, strahlend und leuchtend bis in die fernste Zukunft. Wo immer begeisterte Freunde der Ornithologie sich zusammen finden, sie versammeln sich in seinem Geiste, wo immer vogelkundliche Naturforschung am Werke ist, sie wird und muß getragen sein von dem tiefen und lauteren wissenschaftlichen Ernste, der dem großen Manne aus dem Anhaltischen inne wohnte. Was war es, das ihn so hoch aus seinen Zeitgenossen heraus- und in die Höhe hob? War es ein Leben, das in seinen äußeren Geschehnissen besonders merkwürdig, besonders ereignisreich war? Führten ungehemmte Tatenlust und unbezwinglicher Forscherdrang ihn in weitentlegene Gegenden ferner Weltteile, die noch keines anderen Fuß betreten? Oder verblüffte er die Welt durch aufsehenerregende Entdeckungen, die das wissenschaftliche Weltbild umgestalteten? Oder entzückte er den Leser seiner Schilderungen aus dem Leben der Vögel durch eine berückende Darstellung, durch einen hinreißenden Vortrag, durch einen blendenden Stiel? — Nichts von alledem war es, das den Mann so hoch emporhob, daß seinen Namen über das kleine Herzogtum Anhalt, über Deutschland hinaustrug. Es war etwas ganz anderes! —

Das äußere Leben Johann Friedrich Naumanns bietet nichts Merkwürdiges, nichts Ungewöhnliches. Es floß in einfacher schlichter Bahn ruhig dahin, zeitlich fast ganz auf die Scholle, die ihn gebar, beschränkt. Es läßt sich in knappen Linien umreißen.

Johann Friedrich Naumann war, wie schon in der Skizze über das Leben Johann Andreas Naumanns*) erwähnt wurde, das älteste Kind des „alten Naumann". Er wurde am 14. Februar 1780 in Ziebigk bei Cöthen in Anhalt geboren. Den ersten Unterricht erhielt er in der Dorfschule seines Geburtsortes. Im Alter von 10 Jahren kam er in die Hauptschule nach Dessau, die er aber schon nach vier Jahren wieder verlassen mußte. Es erwarteten ihn zu Hause die Arbeit und der Beruf, der sein Lebensberuf wurde, der des Landwirts. Eine weitere Schulbildung hat Naumann nicht genossen. Um so erstaunlicher und bewunderungswürdiger, was er späterhin auf wissenschaftlichem Gebiete leistete. Zunächst unter der Anleitung und Mitwirkung seines Vaters, dann nach dessen im Jahre 1826 erfolgtem Tode allein bewirtschaftete er das vom Vater übernommene Gut. Im Jahre 1807 vermählte er sich mit Marie Juliane Troitzsch, die ihm im Jahre 1849 durch den Tod entrissen wurde. Elf Kinder entsproßten diesem Bunde. Im hohen Alter von 77 Jahren entschlief Johann Friedrich Naumann in Ziebigk am 15. August 1857. Fast bis an sein Lebensende durfte er sich des Vollbesitzes der körperlichen und geistigen Kräfte erfreuen. Noch im Jahre 1856 konnte er an der Ornithologenversammlung in Cöthen teilnehmen, auf der, um ihn zu ehren, seine mit Lorbeer bekränzte Büste aufgestellt worden war. Auf dem Gottesacker zu Prosigk, eine halbe Stunde von Ziebigk entfernt, hat er an der Seite seiner Gattin die letzte Ruhestätte gefunden.

Es mußte doch wohl schon etwas Außergewöhnliches dem Manne anhaften, dessen Bildnis bei der glänzenden zehnten Versammlung der deutschen Ornithologen-Gesellschaft zu Cöthen vom 2. bis 5. Juni 1856 aufgestellt wurde, einer Versammlung, die gerade, um seine Teilnahme zu ermöglichen, in der genannten Stadt, abseits vom großen Weltgetriebe, abgehalten wurde, und an der die berühmtesten Ornithologen der damaligen Zeit wie H. Blasius, Chr. L. Brehm, Johannes Jäckel, Bernhard Altum, Prinz Charles Lucien Bonaparte, Nils Kjärbölling, C. L. Gloger, W. Päßler, E. Baldamus u. a. teilnahmen! Es war die Anerkennung der wissenschaftlichen Tätigkeit, des ganzen Lebenswerkes Johann Friedrich Naumanns, die in dieser einfachen, aber deshalb umso ausdrucksvolleren Ehrung ihre äußere Form gefunden hatte.

Sein Lebenszweck war eine Tat im Reiche des Geistes; es war die Fortsetzung, die völlige Neubearbeitung der von seinem Vater Johann Andreas Naumann begonnenen großen Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Der vollständige Titel dieses Werkes lautet: „Johann Andreas Naumanns mehrerer gelehrter Gesellschaften Mitgliede, Naturgeschichte der Vögel Deutschlands, nach eigenen Erfahrungen entworfen. Durchaus umgearbeitet, systematisch geordnet,

*) Ges. Welt Jahrg. 53 (1924) S. 331.

sehr vermehrt, vervollständigt, und mit getreu nach der Natur eigenhändig gezeichneten und gestochenen Abbildungen aller deutschen Vögel, nebst ihren Hauptverschiedenheiten, aufs neue herausgegeben von dessen Sohn Johann Friedrich Naumann". Der erste Teil dieses Werkes in der sog. 2. Auflage mit 48 kolorierten und 2 schwarzen Kupfern in Oktav erschien im Jahre 1820 bei Ernst Fleischer in Leipzig, der zwölfte im Jahre 1844 und ein dreizehnter Teil (Nachträge, Zusätze und Verbesserungen) im Jahre 1847. Als Naumann im Jahre 1844 das Werk mit dem 12. Bande abgeschlossen hatte, dem „er ein Vierteljahrhundert hindurch sein ganzes Leben gelebt hatte", feierte er in der Stille mit einigen Freunden diesen Abschluß durch ein stilles Fest*).

Zur Schaffung eines solch groß angelegten Werkes befähigte Naumann eine Reihe hervorragender Eigenschaften: neben seinem beispiellosen Fleiß und einer bewunderungswürdigen Hingabe, eine vom Vater und den Vorvätern ererbte unendliche Liebe zur Vogelwelt und derart Hand in Hand eine hervorragende Beobachtungsgabe, eine unermüdliche Lust zu jagen, zu fangen, zu sammeln. Zu diesem Zwecke unternahm Naumann auch die wenigen Reisen, die Abwechslung brachten in seine ländliche Stille und Weltabgeschiedenheit. So führte ihn im Juni und Mai 1819 der Weg nach der Insel Sylt und im Jahre 1835 nach Syrmien. Hierüber veröffentlichte er besonders prächtige begeisterte Berichte. Was aber der Abfassung seines großen Lebenswerkes noch besonders nützlich und fördernd war, das war die künstlerische Befähigung Naumanns, die von ihm aufs genaueste beschriebenen Vögel auch im Bild festzuhalten. Er erlernte auch unter der Anweisung seines Vaters den Kupferstich und so konnte er seiner „Naturgeschichte der Vögel Deutschlands" außer 3 Bildnissen nicht weniger als 5 schwarze und 396 kolorierte Tafeln beifügen, die für sich allein schon eine Lebensarbeit umfassen würden. Meisterhaft und von großem künstlerischen Reize sind diese bildlichen Darstellungen. Daß das gesamte einschlägige damalige Schrifttum nicht unbeachtet blieb, bedarf kaum einer besonderen Betonung. Ohne einen eigentlichen Unterricht im Englischen erhalten zu haben, machte er sich durch Privatstudium die Kenntnis dieser Sprache zu eigen, bis daß er die für ihn in Betracht kommenden englischen Werke in ihren Quellen nachprüfen und für seine Arbeit sich zunutze machen konnte. Die Haupteigenschaft aber, die ihn zur Abfassung eines solch bedeutenden, den ganzen gewaltigen Stoff umfassenden Werkes befähigte, war die strenge Sachlichkeit, die deutsche Gewissenhaftigkeit und wissenschaftliche Treue, die ihre Grundlage hatten in einem reinen lauteren Charakter.

Mag ihm auch der eine oder andere Fehler unterlaufen sein — wo bleibt der unfehlbare Forscher? — An Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt naturwissenschaftlicher Forschungsarbeit hat ihn niemand übertroffen!

So war es denn kein Wunder, daß in dem nach außen hin so bescheiden und anspruchslos verlaufenden Leben unseres Johann Friedrich Naumann wissenschaftliche und andere Ehren nicht ausblieben. Nach Vollendung des achten Bandes seines großen Werkes erhielt Naumann von Herzog Heinrich von Anhalt-Cöthen den Professortitel und nach Beendigung des neunten Bandes verlieh ihm, der nie studiert, der die Schule nur bis zu seinem 14. Lebensjahr besucht hatte, eine deutsche Hochschule ehrenhalber den Grad eines Doktors der Philosophie. Eine große Anzahl von wissenschaftlichen Vereinigungen ernannte ihn zum korrespondierenden, zum wirklichen und zum Ehrenmitgliede.

Auch nach seinem Tode hat ihn die deutsche Wissenschaft noch geehrt. Hundert Jahre nach seiner Geburt, am 6. November 1880, wurde in Cöthen ein Denkmal enthüllt, das die Erzbüste Johann Friedrich Naumanns trägt, und auf welchem gleichzeitig die Köpfe des Vaters Johann Andreas und des Bruders Karl Andreas*) in Flachbildern dargestellt sind. Der greise Baldamus hielt die Festrede, die Deutsche Ornithologische Gesellschaft zu Berlin, vertreten durch Anton Reichenow und die Ornithologische Gesellschaft in Wien, durch Hermann Schalow vertreten, ließen Lorbeerkränze am Denkmal niederlegen. Und daß auch heute noch nicht die Verehrung für den Altmeister deutscher vogelkundlicher Wissenschaft erloschen ist, beweist, daß mitten im großen Weltkriege im Oktober 1916, anläßlich der Tagung der Jahresversammlung der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft in Cöthen ein Naumann-Museum als Erinnerungsstätte für den großen Sohn Anhalts eröffnet wurde. Der Ornithologische Verein in Cöthen, der sich nach Johann Friedrich Naumann nennt, war der Anregung Professor Hermann Schalows nachgekommen und hatte ein Museum zum Andenken an den berühmten klassischen Ornithologen gegründet, zu welchem ihm der Herzog von Anhalt nicht nur die Räume, sondern auch die in seinem Besitze befindlichen Sammlungen Naumanns, vor allem die zumeist von seiner kunstfertigen Hand aufgestellte Vogelsammlung, und noch lebende Verwandte Naumanns dessen wertvollen Nachlaß in freigebigster Weise überließen.

Das schönste und dauerndste Denkmal aber hat sich der große Ornithologe selbst gesetzt. Er lebt fort in seinem Werke und wird von längerer Dauer sein, als Denkmäler von Stein und Erz, und als die Stätten der Erinnerung, die ihm treue und begeisterte Anhänger gestiftet haben. W. Bacmeister.

*) In den Jahren 1898—1903 ist im Verlag von Fr. Eugen Köhler Gera—Untermhaus eine neue (3.) Auflage durch Dr. C. R. Hennicke in 12 Bänden unter Mitwirkung einer großen Anzahl zeitgenössischer Ornithologen herausgegeben worden.

Sumpfrohrsänger.

Von Paul Schwarz in Leipzig, Südstraße 67.

(Nachdruck verboten.)

Alle Vögel sind schon da, alle Vögel alle ... Ja, sie sind da, wenn auch nicht alle zu der Zeit, die mich überall und nirgends findet, auch nicht zu Hause. Nehmen die Tage zu, erwärmt sich die Luft, und sprossen gar die ersten Frühlingsblumen, dann

*) Karl Andreas Naumann, herzoglicher Förster in Kleinzerbst bei Cöthen, ist wissenschaftlich nicht hervorgetreten. Er war aber ein hervorragender Vogelkenner und großer Jäger, der seinen Vater und älteren Bruder aufs eifrigste bei ihren Arbeiten unterstützte.

schlägt das Herz in froher Erwartung des Genusses der gesanglichen Darbietungen unserer einheimischen Vogelwelt gar unruhig. Dann streiche ich umher, ruhelos und bereit, alles, auch den kürzesten Vogellaut in mich aufzunehmen und zu deuten. Müde und hungrig nach leiblichen Bedürfnissen kehre ich abends zurück, ruhe mich für die kommende Tagesarbeit aus und schlafe den Schlaf der Gerechten. Das ist viele Jahre meines Lebens Kreislauf, den höchstens die natürlichen Hindernisse des Alters ändern können. Doch jetzt bin ich noch jung, so jung im Herzen und Gemüt, wie mancher Jüngling an Jahren. Und daher will ich genießen, genießen als Vogelliebhaber bis auch meine Zeit geschlagen hat. Kein Mensch wird mir es verargen, wenn ich mich, kommt der Frühling, auf und davon und der Mutter Natur meine Aufwartung mache. Stets hat die schönste Zeit im Jahre etwas für mich bereit gehalten, um mich zu beglücken. Ein Erlebnis folgt dem anderen und reiht wie Perlen an langer Kette, eins immer schöner als das andere. Später dann, im Spätherbst und Winter, wenn der Tag schneller schwindet, wenn ich meine Ruhe gefunden und mich mit meinen Pfleglingen beschäftige, dann kommen die Erlebnisse eins nach dem andern wieder. Das ist auch eine wunderschöne Zeit. Jede Vogelart erinnert mich an etwas, was mir früher oder später mal der Frühling bot. Das macht wohl auch das Leben lebenswert, trotz Trübnis und Sorge.

Heute bin ich nun wieder mal dabei, in meinen Erinnerungen aus vergangenen Jahren zu kramen. Und da fällt mir auch ein Erlebnis ein, erzählenswert, wie sie schließlich alle wären. Da es aber nun gar eine Art meiner Lieblingsvögel betrifft, so ziehe ich sie vor. Auf den Gedanken der Schreiberei bin ich gekommen durch Aufmunterung des sehr verehrten Herrn Schriftleiters und durch eine weitere Ursache, nämlich den herrlichen Gesang eines meiner Sumpfrohrsänger. Von ihm, der mir jetzt im November eine so ausgewählte Freude bereitet, seine Pflege und Behandlung bei mir und auch darüber, wie ich ein so ausgesprochener Liebhaber der Spötter geworden bin, sollen meine Zeilen handeln.

Vor einer Reihe von Jahren im Frühjahr, die Kinder sangen wie alle Jahre beim Einzug des Frühlings, gewiß mit Berechtigung, das eingangs erwähnte Lied, führte mich mein Weg gerade und krumm durchs Land, durch Wald und Heide, und Feld und Au'. Mein Ziel war, was es in jedem Frühjahr ist, das Gott werden läßt, das Studium der Vogelwelt nach Art und Gesang zum Vergleich vor allem der gesanglichen Darbietungen zwischen meinen Pfleglingen und der sich der Freiheit erfreuenden gefiederten Sänger.

Von bewohnten Ortschaften weit entfernt, in denen das ganze Jahr die Tag und Nacht kläffenden Hunde keine Ruhe aufkommen lassen, übermittelte die helle Frühjahrsnacht uns zwei Menschen, einen verständnisvollen Freund und mir, ihre köstliche Gabe, mit der sie jedem aufwartet, Ruhe und würzige Luft. Wohl lebt und webt es in einem fort, auch Stimmen, einmal zagend und andermal wieder brünstig, sind vernehmbar, aber all diese Lebensäußerungen wirken weder störend noch schädigend auf den nach Natur durstenden Menschen.

Der Aue galt heute unser Besuch. Wer sie nachts durchwandert, ob einsam oder in zusagender Gesellschaft, hat mit Langeweile nicht zu rechnen, und Trieb und Sehnsucht des Verstehenden kommt zur Erfüllung. Alles findet man hier vereinigt, Wasser, Sumpf, Teiche, Strauch- und Baumgruppen und ebenso kleinere und größere Bestände an Hölzern. Wo alles das vorhanden ist, fehlen sicher auch deren Nutznießer, die Vögel, verschieden nach Art und Zahl,

Sumpfrohrsänger.

nicht. Der jung anbrechende Tag beschert uns dann eine solche Fülle von lustig frohen Vogelstimmen, daß es fast unmenschlich erscheint, nach Stimmen und Gesang alle Arten der frohen Gesellschaft festzustellen. Es gelingt aber doch. Was der eine nicht weiß, kann der andere ergänzen, und sollte das Wissen beider gar einmal versagen, nun, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. In den Großstädten bieten sich genug Gelegenheiten, das Fehlende zu ergänzen. Uns vom vielen Laufen müden und hungrigen Menschen bot eine frischgrüne Wiese, in der etwas weit ab von unserem Pfad eine ausgedehnte Sumpflache lag, mit Schilf und anderen hohen Gräsern, auch ab und zu mit einzelnen Sträuchern bewachsen, Gelegenheit Platz zur Rast und Stärkung zu nehmen, wo es uns beliebte. Drüben erscholl unermüdlich der Gesang eines Rohrsängers. Wie manchem Genußmenschen bietet Gesang oder noch besser Musik eine

hocherfreuliche Zugabe zum Essen. Warum sollten nun wir uns bei der Vorsorge für den Körper nicht heranmachen, um den Gesang des gefiederten Wesens als Zubrot für die gut ausgefallene Wegezehrung obendrein noch aufzunehmen. Hinderungsgrund ist keiner vorhanden. Also hinüber, hundert, zweihundert Schritt. Platz bietet der Wiesenteppich für uns zwei übergenug und ist bald gewählt. Das Essen aber verbot sich von selbst. Bei jeder Kaubewegung gingen Laut um Laut verloren. Die Befriedigung leiblicher Bedürfnisse hatte Zeit und konnte zu besserer Zeit erfolgen. Was uns der kleine Sänger bot, war mehr, bedeutend mehr als das Brot im Rucksack oder in der Tasche. Keine Silbe, kein Laut durfte uns verloren gehen, denn so etwas einzigartiges in Vielseitigkeit und im Wohllaut bot die Aue wohl ab und zu, aber selten. Ja, hier gab es die im eingangs erwähnten Lied fortgelassene Fortsetzung: Amsel, Drossel, Fink und Star zu Gehör, allerdings noch mit weiteren Zugaben. Jeder neue Laut versetzte den Menschen in andere Umgebung. Der Sperling kam zu Gaste, und wie üblich schimpfte er, man sah ihn nicht; Der Hänfling giggerte und sang, ohne da sein zu können, weil er noch schlief; die Schwalbe zwitscherte, sie konnte es aber noch nicht sein, weil sie noch müde war vom Nahrungsfang und unermüdlichen Flug; die immer geschäftigte Kohlmeise bot ihr Lied, auch sie dachte noch nicht ans Aufstehen; das Rebhuhn knarrte, wo es nicht sein konnte — im Sumpf. Auch die Wachtel, der Bussard, die Goldammer und gar noch viele andere Vögel, darunter solche, die in unserer Au' nie einheimisch sein können, waren vernehmbar durch die Kehle des kleinen Vögleins, des Sumpfrohrsängers. Die Moorsee, gäbe es eine, könnte es wohl zufrieden sein, mit dem kleinen Sänger in nachtschlafender Zeit. Besser hätte sie auch nicht locken können. Auch wir beide waren zufrieden, der kleine nimmermüde Kerl hatte sich zwei Menschenherzen ersungen zum späteren Schaden einiger seiner Sippe. Nach genossener Ruhe bei grauendem Morgen empfahlen wir nns, unser Ziel führte uns die Wege weiter kreuz und quer, neuen Beobachtungen entgegen. Oft haben wir noch da und dort gestanden und dem oder jenem Vogel gelauscht, aber nichts konnte mich so sehr fesseln, daß meine Gedanken keine Seitensprünge mehr machten. Sie waren bei dem kleinen Rohrsänger, tausende Meter entfernt und selten da, wo sie sein sollten. Sie haben auch nicht eher Ruhe gelassen, bis zwar nicht der eine aber ein anderer seiner Art Einzug in einen Käfig hielt.

Welche Erfolge habe ich nun in der Pflege dieser Vögel aufzuweisen?

Kommen Sie und besuchen Sie mich. Bequemlichkeit ist das halbe Leben für kurze Lauscherstunden. Setzen Sie sich auf den Stuhl da oder dort, in den Korbsessel, bequem und gepolstert, in eine Sophaecke, oder wohin Sie wollen. Ich erkläre mich sehr gern bereit, Ihnen nicht nur meine Spezialität, eben die Spötter — Gartenlaubvögel und Sumpfrohrsänger —, sondern auch andere Arten zu zeigen und hören zu lassen, soweit bereits Gesang vorhanden ist. Eins versichere ich Sie bestimmt, einen Sumpfrohrsänger hören Sie ganz gewiß. Der kleine Kerl befindet sich im anstoßenden dunklen Zimmer. Sein Käfig hängt einen Meter hoch von der Stubendiele entfernt, und davor habe ich eine Krippe mit Blatt- und rankenden Pflanzen aufgestellt. Ehe wir nun hinübergehen und den Vogel besichtigen, ist es besser, wir widmen ihm zunächst nur unser Ohr, um erst seinen Gesang genießen zu können. Es dauert denn auch nicht lange, so setzt er laut und freurig mit seinem Vortrag ein. Ist das nicht wunderschön? Das Zimmer ist nur schwach vom zum Fenster hereinfallenden Schein der Straßenbeleuchtung erhellt. Und wieder sind es die bekannten Laute, Schwalbe, Hänfling, Sperling, Fink, Meise, Nachtigall, Goldammer, Bussard und noch eine Anzahl Laute anderer Vögel. Man sollte es nicht glauben, daß ein solches kleines Vögelchen seinen Gesang in solcher Fülle und Lautstärke zum Vortrag bringen kann. Zwar reicht die Stimme des Rohrsängers nicht an die seines Genossen, den Gelbspötter, der die erlauschten Rufe anderer Vögel mit seinem eigenen Gesange geschickt und angenehm verbindet, aber oft habe ich gefunden, daß der gute Rohrsänger mit einem guten Gelbspötter in der Anzahl übernommener Vogelrufe wohl konkurrieren kann. Hätte der Rohrsänger den eigenartigen Wohllaut der Stimme des Gelbspötters, dann schlüge er seinen etwas größeren Bruder zweifellos im Sängerwettstreit.

Gar oft habe ich Vergleiche angestellt zwischen dem Gesange meiner Spötter und dem meiner Rohrsänger. Immer wieder bleibt es dasselbe Ergebnis: Spöttergesang, mag er noch so einwandfrei sein, ermüdet und wirkt mit der Zeitlänge nervenreizend, während der Gesang des Sumpfrohrsängers diese Nachteile niemals mit sich bringt. Voraussetzung hier wie dort ist, wenn von Vergleichen die Rede ist, stets immer in Gleichheit der Qualität, d. h. gleich gute Vögel ihrer Art. (Fortsetzung folgt.)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Mit einem der von dem Zoologischen Garten zu Berlin unternommenen Importe aus Somaliland und Abessinien gelangte eine Art der Gattung „Turako" in das neue Vogelhaus des Zoologischen Gartens, die bisher wohl kaum in einem Zoologischen Garten gezeigt wurde,

Donaldsons Turako — Turacus donaldsoni *Sharpe*

wie alle Turakos, ein außerordentlich farbenprächtiger Vogel. Die hervorstechendste Farbe des Turakogefieders ist das leuchtende Grün des Körpergefieders und das Purpurrot der Schwingen. Beide Farben haben ihre Eigentümlichkeit. Während das Grün im Gefieder anderer Vögel durch den Bau der Federn entsteht, ist bei den Turakos ein grüner Farbstoff das „Turakoverdin" vorhanden und das Purpurrot der Schwingen färbt, sobald es naß wird, ab, so daß das Wasser, in welchem ein Turako badet, leicht rötlich gefärbt ist. Selbst bei sehr häufigem Baden und damit verbundenem starkem Farbenverlust verliert das Rot nichts von seiner prächtigen Färbung. Der rote Farbstoff enthält gewisse Mengen von Kupfer und wird „Turacin" genannt.

Die Turakos leben wie der Lärmvogel in den belaubten Kronen hoher Bäume in kleinen Gesellschaften. Sie nähren sich hauptsächlich von Früchten und suchen auch die Pflanzungen heim, in denen sie neben andern Kulturgewächsen besonders den Bananen zusprechen. In ihrem Wesen sind sie lebhaft und unruhig, scheu und mißtrauisch. Sie haben laute, kurze Rufe, die sie mehrfach hintereinander ausstoßen. Ihr Flug ist schwerfällig, schwebend. Ihre Bewegungen beim Klettern und Schlüpfen durch das Gewirre der Äste sind außerordentlich gewandt.

Gefiederbeschreibung: Kopf, Hals, Brust grün, die Haubenfedern sind am Ende rot, die oberen fahler; ein Fleck von dem Auge und ein Band über die hintere Kopfseite bis auf die Halsseite weiß; unter dem Auge ein schwarzgrauer Fleck; übrige Oberseite, Flügeldecken, Schwanzfedern blaugrau, metallisch glänzend; übrige Unterseite schiefergrau; Schwingen weinpurpurrot mit schwarzen Außensäumen und Spitzen; Auge dunkel, Lidrand rot; Schnabel braunrot; Füße schwarz; Lg. 370—420, Fl. 175 bis 185, Schw. 190—200 mm.

Die auf S. 27 abgebildete

Prachttangare — Calospiza pretiosa (*Cab.*)

war bisher nicht in den Besitz eines deutschen Liebhabers gelangt, wohl aber schon früher in die Käfige englischer Liebhaber. Der Vogel wurde im November v. J. von Lenger-Berlin in den Handel gebracht.

Die Prachttangare gehört zu jener Gruppe kleiner Tangaren, welche wegen des metallischen Glanzes ihres hauptsächlich blauen oder grünen Gefieders „Schillertangaren — Calospiza *Gr.*" genannt werden. Man kennt mehr als 100 Arten, welche in Mittel- und Südamerika leben.



Kopf (s. S. 62).

Eine ganze Reihe von Vögeln dieser Gattung werden häufiger eingeführt, wie z. B. die Dreifarbenkalliste, andere kommen vereinzelt als besondere Seltenheiten nach Europa. Immer aber bereitet ihre Haltung den Vogelpflegern große Schwierigkeiten und ein allzulanges Leben ist diesen schönen Vögeln meist nicht beschieden, wenn sie auch nicht in dem Grade hinfällig sind, wie häufig angenommen wird, besonders dann nicht, wenn sie gesund in die Hände eines Vogelpflegers kommen, der über größere Flugräume verfügt. Hier sind sie lebhaft und beweglich und mit ihrem wunderbaren Federkleid eine Zierde jeden größeren Flugraumes, mit dessen Insassen, soweit Beobachtungen vorliegen, sie sich gut vertragen. Im kleinen Käfig dagegen sind sie wenig beweglich und nicht gerade kurzweilige Vögel.

Die Schillertangaren wurden und werden von den Vogelpflegern allgemein wie ausschließliche Frucht- und Insektenfresser behandelt und ernährt. Man gab ihnen als Futter allerlei Früchte, frisch und getrocknet, Gemische von zerkleinerter Frucht und einem guten Insektenfresserfutter mit allen den üblichen Beigaben. Man glaubte, die Berichte von Forschern, in welchen mitgeteilt wurde, daß der Mageninhalt erlegter Schillertangaren auch Samen enthielt, so auslegen zu müssen, daß man in diesen Samen die Kerne von verzehrten Beeren oder Früchten sah. Man wurde in dieser Ansicht bestärkt durch Mitteilung, wie die Pelzelns bezüglich C. brasiliensis „Im Magen Samenkörner von Früchten" (Ornithol. Brasil., S. 207), an diesem Befund ist nicht zu zweifeln. Wenn aber Frantzius schreibt: „Bei den verschiedenen Kalliste arten fand ich als Mageninhalt gewöhnlich weiche Samenkörner verschiedener Gewächse" (J. f. O. 1869, p. 208), und Taczanowski im Magen von C. tatao „Samen und Insekten" fand (Ornith. Pérou), so ist doch wohl anzunehmen, daß diese Vögel auch allerlei Kraut-, vielleicht auch Baumsamen verzehren. Burmeisters Angabe: „Ihre Nahrung besteht ausschließlich in Sämereien" (Systemat. Übersicht der Tiere Brasiliens), dürfte unzutreffend sein.

Nun weist in Heft 3 des Aviculr. Mag. 1924 ein englischer Vogelpfleger darauf hin, daß mancherlei Arten von Tangaren, einschließlich der Schillertangaren, sicherlich auch reichliche Mengen von allerlei Wildsämereien verzehren und gründliche Beobachtung dieser Vögel im Freien feststellen würde, daß diese Samen einen großen Teil ihrer Nahrung bilden. Man solle gefangenen Tangaren stets Samen geben, den sie gern annehmen. Eine von ihm gehaltene Vielfarbenkalliste — C. fastuosa (*Less.*) und eine Schwarzwangenkalliste — C. cajana (*L.*) verzehren Hirse und Spitzsamen, aber besonders erpicht seien sie auf den Samen der Kardendistel und mancherlei anderer Wildsämereien. Dabei seien diese Vögel stets in bester Verfassung und der Federwechsel gehe glatt vonstatten. Wenn man bedenke, wie nahe

die Tangaren unsern Finken stehen, sei das nicht gerade überraschend. Ich hoffe, daß Pfleger von Kalliſten Versuche auch mit Darbietung von Samen machen und das Ergebnis zu Nutz und Frommen der gehaltenen Schillertangaren und ihrer Pfleger mitteilen. Über das Freileben der Prachttangare, welche in den südbrasilianischen Provinzen Paraná, Rio Grande do Sul, Mattogrosso und in Paraguay vorkommt, finde ich keine Mitteilungen.

Gefiederbeschreibung: ♂ Kopf, Hals, Oberteil bis auf die Rückenmitte kupfrig kastanienbraun; Zügel schwarz; Unterrücken hell ockergelb; Unterseite grünlichblau; Bauchmitte heller und reiner blau; Flanken, Aftergegend, Schenkel kastanienbraun; Flügeldecken leuchtend ockergelb; Schwingen, Schwanzfedern schwarz, bläulich gesäumt; Auge dunkel; Schnabel, Füße schwarz; Lg. 157, Fl. 82, Schw. 57 mm. ♀ dunkelgrün, Kopf, Hals kupfrig verwaschen; unterseits heller, trüber; Bauchmitte weißlich; After kastanienbräunlich; Flügel, Schwanz schwärzlich mit grünlichen Säumen.

Im Vogelhaus des Berliner Zoologischen Gartens befindet sich zurzeit der durch August Fockelmann, Hamburg-Gr.-Borstel, aus Südafrika importierte

Sichelhopf — Rhinopomastus cyanomelas (*Vieill.*),

der das erstemal lebend zu uns gelangte (s. Abb. S. 6).

Die Gattung Hopfe — Upupidae zerfällt in zwei Gruppen, welche sowohl im Körperbau wie in ihrer Lebensweise sehr verschieden sind, in Wiedehopfe und Baumhopfe. Die ersteren gleichen in der Gestalt und im Wesen unserem bekannten Wiedehopf. Sie nisten in Baumhöhlen, die einen üblen Geruch verbreiten, wie man annimmt, weil die Alten den Kot der Jungen nicht aus der Nisthöhle entfernen. Als Bewohner freien Geländes ernähren sie sich von Maden und Würmern, welche sie vom Boden aufnehmen. Man kennt etwa 7 Arten, die sich äußerlich nicht allzusehr unterscheiden. Die Baumhopfe trennt man in drei Gattungen, die sich zum Teil durch den anatomischen Bau des Fußes, durch Körpergröße, Flügellänge und durch die Form des Schnabels unterscheiden. Dieser ist bei zwei Gattungen säbelförmig wie beim Wiedehopf, bei der Gattung Rhinopomastus *Jard.* sichelförmig und sehr dünn. Auch die Baumhopfe sind Höhlenbrüter. In ihrer Lebensweise ähneln sie den Baumläufern, indem sie wie diese an der Rinde der Bäume umherklettern oder sich wie die Meisen an den Ästen und Zweigen anhängen. Ihre Nahrung bilden Insekten, deren Larven und Eier, auch Ameisen. Ihrem Gefieder haftet ein starker Moschusgeruch an.

Die Verbreitung des südafrikanischen Sichelhopfes erstreckt sich über Südafrika nordwärts bis zum Zambesi und Kongo. Er wurde einzeln, paarweise und auch in kleineren Gesellschaften angetroffen, wie er nach Baumläuferart die Rinde der Bäume nach Insekten durchsuchte. Es ist anzunehmen, daß das, was von Böhm über die ostafrikanische Form R. c. schalowi *Neum.* berichtet wird, auch auf ihn zutrifft, daß er außerordentlich gewandt im Geäst umherklettere, wobei er nicht selten den Kopf nach unten gewendet habe, er hänge sich an die untere Seite der Äste an und suche so Blätter und Rinde ab.

Der schwedische Reisende Granvik bemerkte, daß, jedesmal, wenn ein Baumhopf sich seinem Neste näherte, er hatte ein solches in einem toten Baum ungefähr 5 m über dem Boden entdeckt, der für diese Vögel charakteristische unangenehme Moschusgeruch zu bemerken war. Granviks Untersuchungen haben ergeben, daß der scheußliche Gestank, welcher den Wiedehopfen und ihrem Nest anhaftet, irrtümlich auf die „Unreinlichkeit" des Vogels, der die Entleerungen der Jungen im Nest liegen läßt, zurückgeführt werde. Der Geruch entstehe durch die stinkende Ausscheidung der Bürzeldrüse. Granvik hat die Bürzeldrüse von 20 Wiedehopfen untersucht und gefunden, daß sie außerordentlich groß sei und der zähe, schwarzbraune Inhalt der Bürzeldrüse den strengen, unangenehmen Geruch hervorbringe. Ob aber auch die Baumhopfe eine so große Bürzeldrüse besitzen, deren Ausscheidung den strengen Moschusgeruch hervorbringt, konnte noch nicht festgestellt werden. In den meisten Fällen dient der Inhalt der Bürzeldrüse, mit welchem die Vögel die Federn bestreichen, zum Schutze gegen Nässe und das Entweichen der Körperwärme. Vielleicht aber dient der strenge Geruch, welcher den Vogel umgibt, auf gewisse Entfernungen hin auch zum Schutz gegen Angriffe.

Über die Stimme der eingeführten Vögel liegen keinerlei Mitteilungen vor. Aber Elliot nennt eine nahestehende in Somaliland verbreitete Art „einen der lautesten Vögel im Somalilande. Der Lärm und die Mannigfaltigkeit der Töne, die eine Schar dieser Vögel hervorbringt, ist so ungewöhnlich, daß man oft zweifelt, ob sie aus Vogelkehlen kommen. Die Rufe beginnen mit einem Triller und gehen dann in ein Klappern über".

Während der Sichelhopf sich in Hamburg beständig der Beobachtung entzog und meist nur seinen Schlupfkasten verließ, wenn er in diesem beunruhigt wurde, zeigt sich der schöne, schlanke, metallisch glänzende, schwarzblaue Vogel im Zoolog. Garten fast andauernd dem Beschauer.

Gefiederbeschreibung: Metallisch glänzend schwarzblau mit veilchenfarbenem Schimmer, der am Vorderhals matter und mehr blaugrünlich ist, während Stirn und Kopfseiten stärker blaugrünlich glänzen; Unterseite mattschwärzlich; auf den Innenfahnen der Handschwingen, zuweilen auch auf den Außenfahnen, eine weiße Binde, welche Farbe auch zuweilen die Handdecken aufweisen; äußere Schwanzfedern zuweilen mit schmaler weißer Querbinde oder weißem Fleck an der Spitze. Lg. 240—260, Fl. 105—115, Schw. 120 bis 145, Schn. 44—46, Lf. 19—20 mm. (Forts. folgt.)

Dresdener Vogelausstellung.

Von E. Steinbaur.

(Nachdruck verboten.)

In der Zeit vom 20.—22. Dezember 1924 veranstalteten der „Verein für Vogelschutz und -pflege-Dresden" gemeinsam mit dem „Kanarienzüchterklub Groß-Dresden" im Kurfürsten-Saal des „Italienischen Dörfchens" ihre diesjährige Vogelschau.

Schon beim Betreten des Vorsaales drangen wohlbekannte Laute an unser Ohr. Dort sangen in modern bemalten, harmonisch wirkenden Trillerkasten Kanarienhähne, abgeschlossen von der Außenwelt, um die Wette. — Wenige Schritte nur, wir befanden uns im großen Ausstellungsraum. Selbst wer mit großen Erwartungen gekommen, war von der Fülle des Gebotenen überrascht. — Ein geschmackvolles, sinnreiches Arrangement bot so viel des Sehenswerten, daß es nicht leicht ist, zu schildern, ohne zu benach-

teiligen. Zur Rechten begrüßten uns im Tannengrün die bekannten v. Berlepschen Nist- und Futtergelegenheiten, alsdann ein großer Flugbauer mit allerlei Waldvolk. Dann folgten, in langen Reihen übersichtlich gruppiert, unsere einheimischen Körner-, Misch- und Insektenfresser, sowie Bastarde und Exoten.

In den verschiedensten Käfigsystemen sorgsam untergebracht, sahen wir an Körnerfressern: Buch- und Grünfink, Stieglitz, Hänfling, Erlen- und Birkenzeisig, Girlitz, Gimpel, Fichtenkreuzschnabel und Rohrammer; an Mischfressern: Hauben-, Heidelerche und Heckenbraunelle; dann kamen die sogenannten Insektenfresser, die ja als besonders gute Sänger stets großes Interesse erregen.

In durchweg schönen Exemplaren waren vertreten: Star, Amsel, Sing- und Weindrossel — unsere Sängerfürsten Sprosser und Nachtigall, ferner Gartenrotschwanz, Gelbspötter, Rot- und Blaukehlchen —, die verschiedenen Grasmückenarten, wie Garten-, Mönchs-, Sperber- und Dorngrasmücke, Kleiber und Zaunkönig. — Der Kleiber, in einem geräumigen, mit Korkplatten zweckmäßig ausgestatteten Burghard-Käfig, erregte viel Interesse durch sein munteres Wesen. Auch der sangeslustige Zaunkönig fand immer neue Freunde. — An Bastarden waren ausgestellt: Stieglitz- und Zeisigbastard.

Dann die Exoten: Schamadrosseln waren in prächtigen Exemplaren mehrfach vertreten, darunter tadellose Jungtiere, sämtlich aus der Zucht des in weiten Kreisen bekannten Herrn Walter Schmidt-Dresden. Alle Ehre dem sach- und fachkundigen Züchter! —

Große Bewunderung erregte eine vorteilhaft aufgestellte, erstklassig gearbeitete Exoten-Voliere mit allerlei afrikanischen Prachtfinken. Als hätte kein Krieg die Welten je getrennt, so sah man hier wieder, wie einst im Frieden: Mozambikzeisige, Japanische Möwchen, Zebra- und Schmetterlingsfinken, Tigerfinken, Goldbrüstchen u. a. m. In einem Einzelkäfig untergebracht war der vielen unbekannte, farbenprächtige Goldstirnblattvogel mit seinem charakteristischen langen, gebogenen Schnabel.

Und ein Konzert hob an, das dem Liebhaber das Herz höher schlagen ließ und den Laien mit sich fortriß. Die Schamas sangen, Nachtigallen schlugen, Rotkehlchen ließen ihr zartes Lied ertönen und in all das mischte sich melodisch der Gesang der Zeisige, Hänflinge, von Star und Amsel, selbst der muntere Zaunkönig ließ sein fröhlich Liedchen erschallen. — Die sachkundige Pflege und Warte spiegelte sich so recht in dem Wohlbefinden und der Sangeslust unserer gefiederten Freunde wieder, ein eklatanter Beweis dafür, wie richtige Erfüllung der Lebensbedingungen dem Vogel seine einstige Freiheit völlig vergessen läßt.

Einem äußerst regen Interesse begegnete die Käfigfrage. Da waren die alten Bekannten Schindler und Rausch, neben Liebhaberschöpfungen — eine Kategorie fiel Kennern wie Laien aber ganz besonders ins Auge —, schmucke, schnittige, gelblackierte Erlenholzkäfige, mit peinlichst sauber grün lackiertem Gitterwerk. — Immer wieder drängte sich das staunende und begeisterte Publikum vor diese wohlgefälligen, zweckmäßigen Käfige. Große Debatten entspannen sich über die Außen- und Innen-Ausstattung, wie immer: viel Köpfe — viel Sinne. Allgemein war aber die Anerkennung der sorgfältigen und mustergültigen Ausführung, ein Urteil, dem sich auch der bekannte Schriftleiter der „Gef. Welt", Herr Carl Neunzig-Berlin, anschloß, der die Ausstellung mit seinem Besuch beehrte. Diese mustergültigen Weich- und Hartfresserkäfige entstammten der Werkstatt P. Burghard-Dresden 23, Pennricher Str. 40.

Wer weiß, wie Krieg und Inflationszeit den Käfigbau nahezu zum Aussterben gebracht, der wird es mit Freuden begrüßen, wenn endlich von sach- und fachkundiger Seite dieser Fabrikationszweig wieder

Brillengrasmücke (s. S. 64).

aufgenommen wird. Dem allgemeinen Interesse entsprechend noch kurz einiges über die erwähnten Käfige.

Aus Erlenholz hergestellt, in den Abmessungen den verschiedenen Vogelarten angepaßt, waren strittige Fragen hinsichtlich der Innenausstattung, wie Anbringung der Futter-(Porzellan-)Näpfe, Fortfall der Staubleiste durch Verjüngung der Rückwand, Bodeneinsatz, Sprungholzbefestigung — man kann sagen — einwandfrei gelöst. Auswechselbare Tuch- und Drahtdecken, offene und geschlossene Rückwand, die Fallklappe, Sicherungsverschluß der Futtereinrichtung, ovale Sprunghölzer, tropfwassergeschützte Badehäuser, alles zeigte, hier wurde neben erstklassiger Handarbeit Geistesarbeit geleistet und vielseitige Erfahrungen zweckmäßig verwertet. Auch der äußere und Gesamteindruck war wohlgefällig und die gebrachten Käfige wurden — wie schon gesagt — viel und ausnahmslos anerkennend besprochen. Herr Burghard brachte Schama-, Drossel- und Rotkehlchenkäfige, auch die Schmidtsche Exotenvoliere war ein sehenswertes Meisterwerk aus seiner Hand. Herr Burghard konnte für seine preiswerten Käfige vielfach Bestellungen entgegennehmen, viel Glück seinem weiteren Emporkommen.

Ein anderer Aussteller, der Inhaber der Fa. Heinrich-Dobritz, brachte eine sehr hübsche und

naturgetreue Zusammenstellung ausgestopfter Tiere, geschmackvoll arrangiert. Auch eine selbstverfertigte Landkarte zeigte den Vogelzug in äußerst belehrender Form.

Der Junior-Chef der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung Magdeburg und Verleger unserer „Gefiederten Welt", Herr Kretschmann, übrigens selbst großer Liebhaber, zeigte die einschlägige Fachliteratur für einheimische Vögel und Exoten und die Fa. Fritz Wend-Dresden, Zahnsgasse, stellte hübsche Winter-Fütterungs-Apparate aus, sowie die üblichen Futtersorten in reicher Auswahl und guten Mischungen. Eine allübliche Tombola mit Kanarienhähnen und -weibchen vervollständigte das Ausstellungsbild, von weitem schon gekennzeichnet durch die kleinen, weißen Überbleibsel einstiger Hoffnung. Es gab aber nicht



Grauschwanzdrossel.

nur Nieten und manch einer verließ glückstrahlend mit seinem billigen „Gelben" das Lokal.

Alles in allem: Die Ausstellung war eine wohlgelungene Leistung der beiden Veranstalter, dem rührigen Vorstand sowohl wie den opferbereiten Ausstellern — sämtliche Vögel entstammten Privathand — an dieser Stelle der gebührende Dank!

Weit über 1000 Besucher bekundeten das rege Interesse. Freilich hätte eine frühzeitiger einsetzende Propaganda noch manchen herangelockt, der vielleicht zu spät aus dem Munde glücklicherer von der diesjährigen Vogelschau erfuhr. Auch Schulen vermißte ich leider, für die der Besuch nicht minder anregend, wie belehrend gewirkt hätte, ganz abgesehen von dem ethischen Wert. Die Liebe zur Tierwelt fördert die Liebe zur Heimat und — zu den Menschen, sie schafft Ideale. So sei auch an dieser Stelle dankbar der Behörde gedacht, die, alle Bedenken zurückstellend, schließlich die Ausstellung genehmigte und so der idealen Sache wertvolle Dienste leistete.

Auf Wiedersehen im kommenden Jahr!

Atlantische Vögel.

Von Adalbert Athen, Hamburg.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Der gesanglich schönste Vogel ist auch auf Madeira das Schwarzplättchen. Hier und ebenfalls auf den Kanaren lebt aber eine geographische Form, die von unserem Schwarzplättchen durch dunklere Färbung ziemlich merkbar abweicht. Im Museum von Funchal sah ich Bälge, bei denen die Federn des Kleingefieders in feine, tiefschwarze Spitzen auslaufen, wodurch die Vögel ein verdüstertes Aussehen erhalten. Tschusi benannte den Vogel auf Madeira Sylvia atricapilla obscura und Floerike gab dem Schwarzplättchen auf den Kanaren, nach dem spanischen Lokalnamen capirote, den wissenschaftlichen Namen Sylvia atricapilla capirote. Hartert weist aber nach, daß beide Vögel dieselben sind und daß beiden gemeinsam nach dem Prioritätsgesetz, daher der Name Sylvia atricapilla heineken gebührt, weil Jardine hierunter, freilich in der irrigen Annahme, eine gute Art vor sich zu haben, die Schleiergrasmücke (Lokalname tutinegra de capello) beschrieben hat, die aber nur ein abweichender „Schlag" des Schwarzplättchens ist. Auffällig bleibt es immerhin, daß genau derselbe Schlag nicht nur bei der verdüsterten Form von Madeira und den Kanaren, sondern auch auf den Azoren auftritt. Dort lebt aber unser deutsches, silbergraues Schwarzplättchen. Will man also die Schleiergrasmücke wissenschaftlich benennen, muß man genau wissen, ob sie von den Azoren oder von den beiden anderen Inselgruppen stammt.

In der geographischen Verbreitung gibt uns das Schwarzplättchen ein großes Rätsel auf. Ich erwähnte schon, daß auf den Azoren das deutsche silbergraue Schwarzplättchen wohnt. Merkwürdigerweise trifft dasselbe auch für die tropischen Kapverden zu. Während also auf den beiden äußersten Gliedern der atlantischen Inselkette, die von dem europäischen Festlande am weitesten entfernt liegen, unser deutsches Schwarzplättchen lebt, finden wir auf den beiden mittleren Gliedern, die Europa am nächsten liegen, die abweichende verdüsterte Form.

Die Beobachtung der Brillengrasmücke hat mir ein großes Vergnügen gemacht. Sie ist nicht über die ganze Insel verbreitet; man findet sie nur an bestimmten Stellen, ist dann aber nicht selten. Auf diesem engbegrenzten Gebiet hat sie also eine ähnliche Verbreitung, wie bei uns in Nordwestdeutschland die Sperbergrasmücke. Sie lebt auf Madeira, den Kanaren und Kapverden, dagegen nicht auf den Azoren. Von der südeuropäischen Form weicht sie durch ihre dunklere Kopfplatte ab. Die Zügelgegend ist schwarz und die Kehle auffällig weiß, die Flügel braun. Die hellen Augenringe heben sich von dem dunklen Grunde sehr deutlich ab. Sie erinnert flüchtig an eine Orpheusgrasmücke im kleinen, ist aber in ihrer Lebensweise das Abbild unserer Dorngrasmücke. Sie lebt auf Madeira in Höhen von 800 bis 1200 m, an Bergabhängen die dicht mit Besen- und Stechginster bestanden sind durchsetzt mit vereinzelten Strandkiefergruppen. Besen-

und Stechginster blühen leuchtend gelb. Das gibt mit dem dunklen Grün der Kiefern und dem tiefblauen Himmel ein farbenprächtiges Bild. Wenn in einer solchen Umgebung die Beobachtung eines so reizenden Vogels noch hinzukommt, kann man die deutschen Sorgen wirklich einmal vergessen, an die man gerade im Auslande so leicht erinnert wird. Die Brillengrasmücke ist ein ebenso unruhiger Geist wie die Dorngrasmücke, hat auch denselben Balzflug, wobei sie sich einige Meter in die Luft wirft, um dann in schräger Richtung singend wieder herabzugleiten. Sie bringt auch das Schnarren der Sperbergrasmücke, aber in höherer Tonlage, was ihr den Lokalnamen cigarrinha (kleine Grille) eingebracht hat. Der Gesang wird fleißig vorgetragen, in kurzen Liedchen mit gleichmäßigen Unterbrechungen, also metronomartig, ganz wie bei unserer Dorngrasmücke. Sie singt aber zarter und höher; dabei hat der Gesang nichts grasmückenartiges, sondern erinnert etwas an den Gartenrotschwanz. Der Vogel setzt auch immer mit demselben Ton ein, wie dieser; die nun folgenden sind zwar gut gebunden, aber einzeln vernehmbar. Es ist also nicht das Regellose wie bei den meisten deutschen Grasmücken.

Die Schwarzdrossel ist auf Madeira kein guter Sänger. Sie unterscheidet sich von der unsrigen durch tieferes und glänzenderes Schwarz sowie durch kürzere Flügel. Auf den Kanaren lebt derselbe Vogel.

Madeira ist das Land der Rotkehlchen; keinen Vogel trifft man dort so häufig wie diesen, sowohl im Küstengebiet wie auf den Höhen der Berge. Möglicherweise ist er eine der Insel eigentümliche, geographische Form, denn es fiel mir auf, daß die Brust in einem satteren Rot prangt, als bei unseren und den azorischen Rotkehlchen. Dabei übertreffen sie unsere Vögel nicht nur im Gesang, sondern auch in der Gesangesfreudigkeit, denn auch in den heißen Mittagsstunden singen sie unermüdlich. Bei so zahlreichem Vorkommen kann man hier auch leichter Beobachtungen machen, die bei uns nur zufällig gelingen. So habe ich mehrfach beobachten können, wie das Männchen sein Weibchen fütterte; dieses kauert nieder, schlägt mit den Flügeln und zirpt dabei wie ein Nestjunges. Der Futtertrieb erwacht also schon mit der Hochzeit und ist so mächtig, daß sie ihn schon vor der Brutzeit betätigen müssen.

Madeira hat zwei Segler. Der eine sieht genau so aus wie bei uns, obwohl die Wissenschaft ihm einen besonderen Namen gegeben hat. Der andere ist dagegen bedeutend kleiner und einförmig schwarz, also auch die Unterseite. Seine Rufe sind nicht so durchdringend. Man sieht dort häufiger einzelne Pärchen, als größere Schwärme. Beide leben auch auf den Kanaren. Auf Madeira sind sie Standvögel.

Von den drei Tauben ist die Felsentaube häufig. Sie lebt besonders an den steilen Abhängen der Meeresküste, wo man sie von den Küstendampfern aus in Schwärmen beobachten kann. Die Madeirenser machen in Booten Jagd auf sie. Die der Insel eigentümliche Silberhalstaube nennt Pater Schmitz einen majestätischen Vogel. Ich habe ihn nicht gesehen, obwohl ich in den höher gelegenen Lorbeerwäldern auf sie gefahndet habe. Die drei Raubvögel sind auf Madeira bei weitem nicht so häufig wie etwa der Bussard auf den Azoren.

Das Seevogelleben um die Azoren und Madeira herum ist zwar außerordentlich reichhaltig, aber dennoch bekommt der Reisende sehr wenig davon zu sehen. Die Seevögel brüten weniger auf Sankt Michael und Madeira, als vielmehr auf den vielen unbewohnten Felseneilanden, die ich als natürliche Schutzgebiete bezeichnen möchte. Der Mensch kann entweder überhaupt nicht oder doch nur unter Schwierigkeiten dahingelangen, ganz abgesehen von den hohen Kosten, die der Fremde aufwenden müßte, um diese Brutgebiete zu besuchen. Es kommt weiter hinzu, daß die meisten Seevögel dort zu den Sturmvögeln gehören, die alle eine mehr nächtliche Lebensweise führen. Besonders in der Brutzeit leben sie tagsüber in ihren Höhlen und gehen nur des Nachts



Strichelhäher (s. S. 49).

auf Beute aus. So bleiben nur zwei Seevögel, die man häufig zu sehen bekommt: die südländische Silbermöwe und die Flußseeschwalbe, denn die Brandseeschwalbe auf Madeira ist selten. Auf Sankt Michael sind die beiden erstgenannten auch Binnenlandvögel; sie leben dort auf den Kraterseen. Ich fand sie beide vereint auf einem See, der auf der einen Seite einen schönen Strand bildet. Dort lagerten die Silbermöwen, während sich die Flußseeschwalben auf den erstarrten Lavaströmen aufhielten, die den See durch-

queren. Auf Madeira gibt es keine Seen; dort leben beide an der steilen Meeresküste, wo man sie nur von den Küstenfahrzeugen aus beobachten kann oder in dem kleinen Hafen von Funchal, wo die Silbermöwen die vielen Fischerboote dicht besetzt halten. Diese unterscheiden sich von der unsrigen nur durch gelbe Beine; die mannigfachen Lautäußerungen und Rufe sind genau die gleichen. Die Sturmvögel, diese seltsamen Wesen mit den röhrenförmigen Nasenlöchern, habe ich nur von den Ozeandampfern aus beobachten können und mich dabei mit mehr oder weniger Glück versucht, die eine oder andere



Oben: Käfig von Madeira für Weichfresser.
Unten: Indischer Käfig zum Transport von Schamadrosseln (s. S. 48).

der sieben verschiedenen Arten im Fernglase festzustellen. Dabei ist es leichter, die Sturmschwalben und Sturmtaucher im Fluge auseinander zu halten. Es gewährt einen besonderen Genuß, den gewandten und reißenden Flug der Sturmtaucher zu beobachten. Selbst bei stark bewegter See halten sich diese Seeflieger immer dicht über dem Wasser, so daß ihr Flug einem fortgesetzten Auf- und Niederschnellen gleicht. Dabei macht es ihnen aber nichts aus, auch einmal eine sich brechende Welle zu durchstoßen. Ihre Stimmen habe ich auf dem Wasser nie vernommen, wohl aber um Mitternacht an der Meeresküste. Es ist eine der absonderlichsten Vogelstimmen, die ich je gehört habe. Dicht über mir machte sich ein ungestümes Wesen bemerkbar, das ich in der Dunkelheit nicht sehen konnte. Es gemahnte mich an den Spuk in der Wolfsschlucht; mit heiserem Geschrei, untermischt mit fauchenden und platzenden Lauten, fuhr es wie eine abirrende Rakete hin und her und ebenso unvermutet wie es gekommen, war es auch wieder verschwunden. Als ich halb entsetzt und halb belustigt meine Begleiter anrief, was denn eigentlich los sei, hörte ich, daß ich die Bekanntschaft mit einem Sturmtaucher gemacht hatte. Ich vermute, daß es sich dabei um den großen grauen Sturmtaucher (Puffinus kuhlii borealis) gehandelt hat.

Dieser größte von den drei Arten ist auch der häufigste und brütet besonders auf den Desertas in der Nähe von Madeira und auf den weiter südlich gelegenen Selvagens. Pater Barreto erzählte mir, daß die Scharen über ihren Brutplätzen nur mit riesenhaften Mückenschwärmen verglichen werden könnten. Es werden jährlich etwa 20000 Stück erbeutet, ohne daß die Vögel abnehmen, obwohl sie nur ein Ei legen und es sich auch noch um Raubbau schlimmster Art handelt. Die Jagd gilt nämlich nicht den erwachsenen Vögeln, die im großen wegen der Kosten überhaupt nicht erlegt werden könnten, sondern den flüggen Dunenjungen, die einfach gesammelt werden. Daß der Bestand bei dieser schlimmen Verfolgung dennoch nicht abnimmt, liegt nur daran, daß der weitaus größere Teil der Brutplätze für die Sammler nicht erreichbar ist. Diese töten die unappetitlichen und vor Fett strotzenden Jungen durch einen Biß in den Nacken. Die Leute rüsten Anfang September ein Segelschiff nach den Selvagens aus und kommen erst im November zurück. Die Ausbeute beträgt dann gewöhnlich dreißig Fässer Pökelfleisch, einige Fässer Öl und fünfzehn Ballen Federn. Das Fleisch wird nur von der ärmsten Fischerbevölkerung Madeiras genossen.

In geringer Anzahl brüten die Sturmvögel auch auf Madeira selbst, aber nicht etwa an den schroffen Abhängen der Küste, sondern hoch im Gebirge. So sind im Curral grande, einem riesigen Kesseltal, das an den Riesengrund an der Schneekoppe erinnert, Bruthöhlen in einer Höhe von 1000 bis 1200 m entdeckt worden. Da dieses Tal in der Mitte der Insel liegt, so müssen die Brutvögel einen Weg von 10 km zurücklegen, um an das Meer zu gelangen. Ihr Gelege findet man in Bruthöhlen und Brutgängen, die sie selbst angelegt haben, oder in bewohnten Kaninchenbauten.

Ich habe mich auf den Inseln nur in den Sommermonaten aufgehalten. In den Wintermonaten wird die Beobachtung der Vogelwelt wegen der vielen Durchzuchsgäste noch viel reizvoller sein. Auf der Azorengruppe sind im ganzen hundertundzwanzig Arten, einschließlich der Brutvögel, gezählt worden, auf den günstiger gelegenen Kanaren schon hundertundsiebzig Arten und auf der viel kleineren Madeiragruppe sogar hundertfünfundachtzig Arten. Pater Schmitz schreibt, daß sich die Wintergäste besonders nach heftigen Stürmen auf Madeira einzustellen pflegten. Da drängt sich einem der Gedanke auf, wieviel ungezählte Zugvögel wohl alljährlich in den Fluten des unermeßlichen Ozeans umkommen mögen, weil sie nicht das Glück hatten, nach dem winzigen Madeira verschlagen zu werden.

Kleine Mitteilungen.

Frühling oder Winter! Dezember, die Weihnachtszeit rückte näher und näher, noch hatte der Winter seine strenge Herrschaft nicht begonnen. Doch wie lange wird es dauern, und draußen hält die Natur in Eis und Schnee ihren Winterschlaf. Doch ganz anders bei mir. Es ist Nachmittag drei Uhr, ein Rotkehlchen singt leis und feierlich sein Liedchen. Warum auch nicht, der Tisch ist ja reichlich gedeckt und von Kälte nichts zu spüren. So scheinen auch all die anderen kleinen Sänger zu denken, denn plötzlich setzt mitten im feierlichen Akkord das Rotkehlchen einen Moment unterbrechend ab, ein Stieglitz schmettert sein Lied aus voller Kehle, ein prächtiger Kerl, herrlich im Gesang und Gefieder, ein Meister seiner Art, er weiß was er kann. Doch dies war das Zeichen der großen Sinfonie, denn plötzlich hört man das Gezwitscher der Schwalbe, das Quaken eines Frosches, ein Sperling ruft schilp schilp und leise vermeint man das Schwirren vorüberziehender Libellen zu hören, ein Landmann wetzt seine Sense, und wie aus weiter Ferne klingt der monotone Ruf eines Wasservogels. Doch woher kommen all diese Laute von der Schwalbe bis zum Wasservogel? Ein Blaukehlchen ist es, ein kleiner Meister der Imitation. Alles will seine Kunst zeigen, wenn auch nicht aus voller Brust, so übt sich doch alles zum kommenden Frühling. Und bei mir im Zimmer wirds Frühling und draußen Winter. Doch da horch, plötzlich wohlklingende Laute, bald dem Überschlag des Schwarzköpfchens ähnelnd, bald dem Jodler der Gartengrasmücke, auch glaubt man Touren einer Amsel zu hören, jedoch nicht leis, sondern alles aus voller Kehle, es ist der Sonnenvogel. Alles andere ist verstummt, bis auch letzterer zu singen aufhört, nur Rotkehlchen und Schwarzköpfchen singen wieder verträumt ihre lieben Weisen von Frühling und Sonnenschein.

Karl Homann, Erfurt, Löberstr. 58.

Als langjähriger Liebhaber und Züchter von Sittichen, hauptsächlich Wellensittichen, möchte ich kurz zwei auffallende Erscheinungen bei zwei meiner **Wellensittichen** schildern, die vielleicht für manchen Leser von Interesse sind. Der erste Fall war bei einem gelben Wellensittichweibchen. Den Vogel habe ich mir in einer zoologischen Handlung gekauft, weiß also nicht, wie alt er war und aus welcher Zucht er stammte. Auf jeden Fall machte er einen guten gesunden Eindruck. Als ich nun das gelbe Paar dieses Frühjahr zu meinen anderen Sittichen in die Freivoliere brachte, machte es auch bald Anstalten zur Brut. Es dauerte aber recht — recht lange. bis das erste Ei kam, obwohl sich niemals Anzeichen von Legenot bemerkbar machten. Und bei dem einen Ei blieb es! Es wurde einige Tage gebrütet und dann war es spurlos verschwunden Aber dennoch blieb das Weibchen immer im Nistkasten, als ob es legen wollte oder brütete. Und so die vielen Wochen den ganzen Sommer über! Eines Tages merkte ich, daß der Hinterleib stark angeschwollen war und die Anschwellung wurde immer mehr und schließlich fast nußgroß und kahl. Es sah übrigens scheußlich aus! Dabei war der Vogel allem Anschein nach gesund und munter, täuschte aber immer noch eifriges Brüten im Kasten vor und ließ sich vom Männchen aus dem Kropfe füttern. Beim Fliegen schien es, als ob die Wasserblase — denn so sah die Anschwellung aus und fühlte sich auch so an — für den Vogel zu schwer sei. Erst vor acht Tagen fing das Tierchen an zu kränkeln und sträubte sein Gefieder. Als es am nächsten Tage schon nicht mehr fliegen konnte, ließ ich es töten. Leider wurde der Kadaver während meiner Abwesenheit beseitigt, so daß ich ihn nicht mehr genau untersuchen lassen konnte. Den zweiten Fall erlebte ich bei einem jungen Wellensittich. Als dieser so weit war, daß sich die ersten Federstoppeln zeigten, bekam er ein Bläschen ins Genick. Bei Kontrolle des Nistkastens zeigte es sich, daß dieses immer größer wurde und schließlich doppelt so dick wurde als das Köpfchen und sich auch um den ganzen Hals ausdehnte. Der Vogel fing an zu kränkeln und blieb in der Entwicklung zurück. Ich glaubte, die Blase sei mit Wasser gefüllt, und um dem Tierchen etwas Erleichterung zu verschaffen, stach ich sie kurz entschlossen auf. Und siehe — es war Luft. Die große Blase war verschwunden und zeigte ihre Spuren nur noch in der jetzt faltigen Haut. Ich glaubte nun, der Vogel sei bis zum andern Tag verendet, aber nein, er war wieder quietschfidel. Er nahm nun zusehends zu, die faltige Haut um den Hals war bald wieder glatt, und bis der Vogel ausflog, war er gerade so schön im Gefieder und so stark wie seine fünf Geschwister*).

Ado Mertes, Mainz.

Sprechsaal.

Frage 6. Seit Jahren habe ich speziell Stieglitz-Bastarde gezüchtet. Möchte nun aber Vögel mit mehr Gelb haben, und habe mir deshalb kürzlich einen Mozambique-Zeisig zugelegt. Der Gesang der Bastarde von unserem Zeisig soll ja nur unbedeutend sein, dagegen hat mein Mozambique eine kräftige Stimme. — Hat nun vielleicht einer der verehrten Züchter schon Erfahrung mit dem Mozambique gemacht? Muß die Anpaarung nicht jetzt im Winter geschehen? Ich habe ein zweijähriges, hochgelbes, bewährtes Kanarienweibchen, das jetzt schon sehr paarungslustig ist.

G. Braune.

Antworten.

Auf Frage 3. In den Jahren 1887—92 befaßte ich mich u. a. auch eingehend mit der Bastardzucht zwischen Kanarienvogel und unseren einheimischen Finkenarten. Meine damaligen Lehrmeister waren Ruß, „Der Kanarienvogel", und Geb. Müller, „Gefangenleben der besten einheimischen Singvögel". Bei den Versuchen mit Kanarien und Stieglitz brachte ich stets Kanarienweibchen mit Distelfinkhähnen zusammen, nie umgekehrt. Ich kann den Satz der Geb. Müller: „Der Distelfink paart sich in der Gefangenschaft mit Kanarienweibchen lieber als mit seinesgleichen", unterschreiben, jedoch nicht einen andern der Genannten: „Es gibt aber auch viele, besonders unter den Wildfängen, welche durchaus keine Kanarienweibchen annehmen". Im Gegenteil, so unwahrscheinlich es auch manchem Leser klingen mag, die besten Erfolge wurden mit Frühjahrswildfängen gezeitigt, die, eingesetzt, sich sofort in feurigster Weise paarten und Nachzucht ergaben. Auch gelang ihre Eingewöhnung viel leichter als bei vorheriger Einzelkäfigung. Diesen Frischfängen reichte ich eine Mischung von Hanf, Mohn, Kanarien- und Distelsamen; später traten die beiden ersten Bestandteile zurück. In allen Fällen werden als Weibchen nur schon erprobte Zuchttiere benutzt und nach dem Einsetzen zunächst wie bisher weiter gefüttert. Da, wie ich las, der Stieglitz meist die Jungen nach dem Verlassen des Nestes töten soll, habe ich die Hähne vor dem Ausfliegen der Kleinen aus der Hecke entfernt. Irgendwelche Angriffe auf Eier oder Nestlinge konnte ich jedoch nicht feststellen. Bei fast allen Paaren erfolgte mit dem üblichen Heckfutter für Kanarienvögel die Aufzucht der Jungen nur durch die Weibchen. Der Nachwuchs war, in Gestalt dem Vater ähnelnd, zumeist recht unscheinbar — grau, bräunlich — gefärbt, nur einmal fiel ein Vogel von wunderbarer Schönheit. Bei schneeweißem Körper zeigte er am Kopfe das Rot des Distelfinken und auch dessen Flügelzeichnung einschließlich der gelben Binden, während die Außenfedern des schwarzen Schwanzes ebenfalls weiß waren.

Schilling.

Zur Fußringfrage. Die Angelegenheit hat mir auch viel Kopfzerbrechen gemacht. Aluminium und Celluloid eignen sich für Wellensittiche nicht, da sie sie in kurzer Zeit zerstören. Nun habe ich mir aus Neusilber und aus Messing Ringe (2 mm Metallstärke) gemacht, welche ich für 4 Paar Wellensittiche folgendermaßen benutze: 1. Paar Messing am rechten Fuß, 2. Paar am linken Fuß, 3. Paar Neusilber am rechten Fuß, 4. Paar am linken Fuß. So kann ich die Jungen der einzelnen Paare genau auseinander halten. Um die Reihenfolge der Bruten festzustellen, erhalten die ersten den glatten Ring, bei den zweiten mache ich mit kleiner dreieckiger Feile auf den Ring eine scharfe Kerbe, bei der dritten zwei Kerben, bei der vierten drei usw. Notiere ich dann die einzelnen Daten, so kann ich

*) In beiden Fällen handelt es sich anscheinend um eine sog. „Windgeschwulst". Im ersten Falle ist es leider nicht festgestellt. Die „Windgeschwulst" (Emphysem) ist eine Ansammlung von Luft in den Geweben unter der äußeren Haut. Sie stellt sich als eine elastische Anschwellung dar, bei deren Berührung ein leise knisternder Ton zu vernehmen ist. Die Windgeschwulst kann sich sehr stark ausbreiten. Sie verschwindet wieder, wenn die Ursachen erkannt und beseitigt sind. Am schnellsten wird sie beseitigt, wenn man sie vorsichtig mit einer Nadel öffnet, wie es in dem mitgeteilten Falle geschehen ist. N.

genau den Tag der Geburt angeben. Bei größerer Zuchtzahl kann man ja leicht noch einen Ring derselben Farbe mit anlegen, in größter Zucht zwei verschiedene verwenden. Es lassen sich so sicher eine ganze große Anzahl Wellensittiche beringen. Mitglied 83 der A. Z.

Bücher- und Schriftenschau.

Tierbestimmungsbuch. Von Prorektor Dr. P. Brohmer. 196 Seiten. Mit 727 Abbildungen im Text und auf 16 Tafeln. In Leinenband 3.20 Mark. Verlag von Quelle & Meyer in Leipzig.

Brohmers Fauna, die bereits in mehreren Auflagen vorliegt, ist längst zu einem unentbehrlichen Bestimmungsbuch geworden. Aber für den Gebrauch an Schulen ist dies Buch etwas zu umfangreich und teuer. Deshalb erscheint jetzt das vorliegende kleine Bestimmungsbuch „Tierbestimmungsbuch", das ganz auf die Bedürfnisse der Schule und des wissenschaftlich nicht geschulten Naturfreundes zugeschnitten ist. Hier wird das Bestimmen so leicht wie möglich gemacht, auf seltene Arten ist verzichtet, nur eine Auswahl der häufig vorkommenden und wichtigen Vertreter unserer deutschen Tierwelt sind aufgenommen. Die Erfahrungen des Herausgebers und der Verfasser bei den bisherigen Auflagen der Fauna ermöglichen eine didaktisch so geschickte Auswahl, daß alle Schwierigkeiten vermieden werden. Die Tabellen sind zuverlässig und so einfach wie möglich gestaltet. Durch eine außerordentlich große Zahl guter Abbildungen im Text und auf 16 Tafeln wird das Bestimmen noch wesentlich erleichtert. Jeder Naturfreund wird sich leicht in dem Büchlein zurechtfinden, und die Beschäftigung mit der heimischen Tierwelt kann noch mehr als bisher von jedem gepflegt werden, der ihr Interesse entgegenbringt. Unsere Jugend wird sicher künftig den „kleinen Brohmer" in den Rucksack stecken und draußen in Flur und Wald die Tierwelt belauschen und besser kennenlernen als bisher, denn in die Tabellen sind zahlreiche biologische Notizen eingefügt, die zu Beobachtungen anregen wollen.

Reichsverband d. Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Tauschvermittlung T.-V.: Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39; Kassierer Werner Geßler, Leipzig, Dresdner Str. 2.

An unsere Mitglieder.

Ein recht dankbares Betätigungsfeld bietet sich allen unseren angeschlossenen Mitgliedern, vor allem unseren Vereinsvorsitzenden in der Einwirkung auf Benutzung zweckmäßiger Käfige.

Zur Erleichterung dieses Zweckes hat der Vorstand des Reichsverbandes beschlossen, die Mindestmaße der Käfige wie folgt festzusetzen:

Körnerfresserkäfige für Zeisig, Hänfling, Stieglitz oder gleichgroße Vögel	30 cm lang,	25 cm hoch,	20 cm tief,
für Grasmücken	50 cm lang,	30 cm hoch,	23 cm tief,
für Nachtigallen	60 cm lang,	30 cm hoch,	25 cm tief,
für Singdrossel und ähnlich große Vögel	70 cm lang,	45 cm hoch,	30 cm tief.

Sämtliche Maße sind Mindestmaße, die nur beim Vorliegen ungünstiger Umstände Verwendung finden sollten. Wenn zweifellos der größte Teil der Liebhaber ohne unsere Anregung den Erfordernissen entgegengekommen ist, so soll uns das noch nicht befriedigen solange, als auch der kleine Teil gewonnen ist.

Wir erwarten ganz bestimmt die Nachachtung, Einwirkung und Unterstützung seitens sämtlicher uns angeschlossener Mitglieder. J. A. Petters, Schriftführer.

Vom Vogelmarkt.

G. Behnke, Berlin O 34, Petersburger Str. 29. Steinrötel, Orpheusgrasmücke, Sperbergrasmücke, Kleiber, Lerchenammer, Schamadrosseln.

Heinrich Breuer, Lehe. Nanday-Sittiche.

Wilhelm Eimeke, Hamburg 23, Eilbecker Weg 90. Rote Kardinäle mit Weibchen, amerikanische Spottdrosseln, Papstfinken, rote Arara, Doppelgelbkopf-Amazonen, Trupiale, Klarinos, Kubafinken, Indigofinken, grüne Häher, Katzendrosseln, Weißkehldrosseln, Massenawachteln, Katharinasittiche.

W. Kinast, Überlingen a. Bodensee. 1,5 Kanarienstieglitzbastarde.

Max Kleinert, Berlin NO 18, Strausberger Str. 13, Fernruf Alexander 3313. Molukken-Kakadus, roter Arara, Zuchtpaar rote Kardinäle, 1 Goldaugentimalie, 1 Orpheusgrasmücke, weißblütige Nachtigallkanarien, tarant. Unzertrennliche, Schamadrosseln, Goldstirnblattvögel, Katzendrosseln, schwefelgelber Tyran, Goldkopfstar, Soldatenstare, langschwanz. Glanzstare, Zebrataubchen, Gilb- und Tahaweber, kleine Kubafinken, schwarzköpfige Gouldamadinen.

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a. Schamadrosseln, Goldstirnblattvögel, Blaubärtige Blattvögel, Bergrötel, Schwarzkappentimalien, Weißkehldrosseln, Klarinettenvögel, braunbrüstige Blauschnäpper, Rubin-Nachtigall, Mennigvogel, Mohrenkopfpapageien, Tovisittiche, satingrüne Wellensittiche, olivgrüne Wellensittiche, weiße Reisfinken, Elfenastrilden, Tahaweber.

Jos. Meyer, Verwalter der Städtischen Volieren, Luzern (Schweiz). Schamadrossel-Zuchtweibchen, mex. Blauspötter Männchen.

Bernd Regge, Lötzen (Ostpr.), A. Z.-Mtgl. 264. Große und kleine Kubafinken, Gouldamadinen, Rotkopfamadinen, Schnurrbärtchen, tarant. Unzertrennliche, Weißkehlpfäffchen.

P. Rückert, Berlin O 112, Simon-Dachstr. 7. Sprosser.

J. Schaal, Stuttgart, Böblinger Straße 14, Ir. Stieglitz-, Zeisig-, Hänfling-Bastarde.

E. Schöndube, Berlin, Elisabethkirchstraße 1. Goldhähnchen, Weißwangenlerchen.

Jos. Seger, Schopfheim, Baden, A. Z.-Mtgl. 311. 1 Zuchtpaar Ia gelbe Gestaltskanarien (Münchner Holländer).

Hans Steiner, Wirt zum Merkur, Biel (Schweiz). Wellensittiche, blau sowie grün mit 3/4 Blau-Blut.



Herrn A. Sch., Zschoppau. Besten Dank für den Bericht. Da die Ausfuhr von Vögeln aus Südafrika sehr erschwert ist, ist es fraglich, ob die genannten Vögel in absehbarer Zeit noch einmal auf den Vogelmarkt gelangen.

Herrn M., Dörnhagen, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn Prof. Dr. B., Langfuhr, Herrn M. K., Dessau: Beiträge dankend erhalten.

Herrn M. E., Demmin. Es ist nicht ratsam, die im allgemeinen recht angriffslustigen Mönchsittiche mit Wellensittichen zusammenzuhalten. Die Sperlingspapageien, welche nach Deutschland kommen, sind ausgewachsen, selbstverständlich wachsen ihnen die Schwanzfedern wieder, aber der Schwanz der Sperlingspapageien ist kurz, nicht etwa so lang, wie der der Wellensittiche.

Herrn Dr. A. K., Frankfurt a. M. Der Waldrotschwanz leidet an einer Störung des Nervensystems, die nach den bisherigen Erfahrungen nicht heilbar ist. Wahrscheinlich hat er sich eine Verletzung des Schädels oder der Wirbelsäule zugezogen. Die andere Angelegenheit habe ich der Verlagsbuchhandlung zur Erledigung übergeben.

Herrn A. J., N. b. Immenstadt. Gewöhnlich beginnen überwinterte Frühjahrsfänge der N. nicht so frühzeitig mit dem Gesang, wie schon mehrere Jahre gehaltene. Häufig lassen sie sich erst im Januar oder Februar hören. Zwei N. sollte man während der Gesangszeit nicht in demselben Raum halten. Wenn sie im selben Raum gehalten in Gesang kommen, so bleibt es gewöhnlich nicht aus, daß eine die andere überschreit und vorzeitig zum Einstellen des Gesanges bringt. Die Geschlechter sind nicht zu unterscheiden. Der geäußerte Wunsch wird erfüllt werden.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

Jahrgang 54 5. Februar 1925 Heft 6

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Johann Friedrich Naumann. Von W. Baemeister.
Sumpfrohrsänger. Von Paul Schwarz, Leipzig.
Neueinführungen und Seltenheiten. Von K. Neunzig. (Forts.)
Dresdener Vogelausstellung. Von E. Steinbaur.
Atlantische Vögel. Von Adalbert Athen, Hamburg. (Schluß.)
Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Bücher- und Schriftenschau - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.) Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. 1. Vors.: Hermann Höhne, Leipzig-Volkmarsdorf, Eisenbahnstr. 84 IV. 1. Schriftführer: Max Hunger, Leipzig-Gohlis, Polizeigebäude, Zimmer 196. Kassierer: Ludwig Böttcher, Leipzig, Inselstr. 17 II. Am Sonntag, den 15. Februar 1925, findet in der Gastwirtschaft „Feldschlößchen" in Aue i. E. eine Bezirksversammlung statt. In freundlicher Weise hat hierzu auch der 1. Vorsitzende des Reichsverbandes, Herr Joh. Birk, seine Mitwirkung in Aussicht gestellt, so daß eine belangreiche Aussprache zu erwarten ist. Wir bitten alle Vogelliebhaber, Mitglieder und Nichtmitglieder, durch zahlreiches Erscheinen der Versammlung einen würdigen Ausdruck zu geben. Unser Bestreben wird es sein, durch sachliche Erledigung der wichtigsten Tagesfragen den Teilnehmern einige wertvolle Stunden zu bereiten, die dazu beitragen mögen, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu festigen.

J. A.: Hunger, Schriftführer.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen. Alle Vereine und Liebhaber, die unserem Verbande bereits angeschlossen sind, bitten wir an dieser Stelle nochmals, die restlichen Mitgliedsbeiträge unserem Kassierer Herrn Erich Merz, Berlin-Friedenau, Wilhelm-Hanff-Str. 14 II, umgehend einzusenden. Vereine und Liebhaber, tretet unserem Verbande bei und unterstützt unsere gute Sache. J. A.: Erich Merz.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden.
J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Angemeldet ist Herr Math. Lefebre, Handelsmann, Merzig (Saargebiet), Postfach 115; Zoologischer Garten der Stadt Halle a. d. Saale, Halle.

Aufgenommen sind die Mtgl. Nr. 86 n Gerhardt Clauß, Grimma i./Sa., Lorenzstr. 3, Mtgl. Nr. 87 n Otto Wolschendorf, Bäckermstr., Pößneck i./Thür., Saalfelder Str. 3, Mtgl. Nr. 99 n Carl Schneider, Manns Au, Bankoberbeamter, B. Budweis, (Tschechoslovakien), Sokolska 17.

Den seit dem 1. Dezember 1924 aufgenommenen Mitgliedern werden die rückliegenden Jahrbücher nebst Mitgliedkarte gleichzeitig mit dem neuen Heft in einigen Tagen zugehen, falls bei Erscheinen dieses inzwischen nicht geschehen. A. Krabbe.

Aus den Vereinen.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen.
J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37 a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurter Str. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. V.: Emil Ivo, Schriftführer.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein Vogelschutz u. -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstr. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Bernhard Kühn, Vors.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 17. Februar 1925. Gäste, auch Exotenliebhaber, stets willkommen. J. A.: Arnold Weber, 1. Vors.

Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber. Mitgliederversammlung am 8. Januar 1925. Anwesend 20 Personen. Neu aufgenommen wurde: Kaufmann Gustav Link und Fräulein R. Spier. Die übliche Aussprache und Behandlung der Eingänge drehte sich um eine Fülle von Fragen aus allen Gebieten unserer Vereinigung. Allen Mitgliedern wurde empfohlen, mit dem neuen Kräftigungsmittel „Venezin" einen Versuch zu machen. Das Mittel wird von vielen Seiten bestens empfohlen. Unser Mitglied Böneker, Eichstr. 8, hält es vorrätig. — Es werden verschiedene Vögel angeboten und dabei als Zeichen der Zeit erwähnt, daß eine deutsche Nachtigall über M. 66.— kosten soll. — Wir wollen versuchen, in und um Hannover Vogelschutz-Gehölze entstehen zu lassen und uns zu diesem Zwecke demnächst mit der Stadt, ferner aber mit den Siedler- und Laubengarten-Genossenschaften in Verbindung zu setzen.

Unser Mitglied Winter hielt aus seiner langen Vogelpflege-Erfahrung einen sehr fleißig ausgearbeiteten Vortrag über das Alter der Käfigvögel. Er hat eine große Menge von Jahrgängen der Fachzeitschriften, vor allem der „Gefiederten Welt" durchgearbeitet, und dabei über das Alter fast aller unserer bekannten Käfigvögel Zusammenstellungen gemacht, die auf Vorschlag von unserem Mitglied Dr. Weigold an andere Stellen weitergegeben werden sollen. Aus seinen Ausführungen ging hervor, daß sich selbst sehr zarte Vögel, wie Rohrsänger, Gartenspötter, Meisen und andere bei sachgemäßer Pflege viele Jahre gesund erhalten und dabei ihre Pfleger bis zu ihrem Ende mit ihrem Gesang erfreuen. Am ältesten werden im Durchschnitt Kanarienvögel, die ja in gewissem Sinne Kunstzüchtungen sind. Daß es unsere bekannten Körnerfresser, wie Stieglitz, Zeisig, bis auf über 20 Jahre bringen, ist vielfach belegt, aber auch Weichfresser, wie Grasmücken, sind häufig bis zu 25 Jahren alt geworden. Turteltauben sind mehrfach 28 Jahre lang gehalten, und am längsten hat es nach seinen Feststellungen ein Kolkrabe ausgehalten, der es nachgewiesenermaßen auf 90 Jahre brachte. Daß manche Papageien noch wesentlich älter werden können, wurde nebenbei erwähnt. Demgegenüber ist festgestellt, daß die Vögel im Freien mit verschwindenden Ausnahmen nur wenige Jahre alt werden. Sie fallen den Raubtieren, der Ungunst der Witterung, dem Futtermangel zum Opfer. Dieser Vortrag ist so recht dazu angetan, die ewig wiederkehrenden Einwände der „unbedingten" Vogelschützer zu entkräften, für die das Halten von Vögeln immer eine Art Tierquälerei bleibt. Solche Leute haben sich mit all dem, was für Vogelpflege spricht, eben nie richtig abgegeben, und sie urteilen von dem allzusehr vermenschlichten Gefühlsstandpunkte aus.

Unser Dr. Weigold hielt dann einen fesselnden, wissenschaftlichen, längeren Vortrag über die Bedeutung der Vogelnamen im allgemeinen und der lateinischen im besonderen. Es würde zu weit führen, all das hier wiederzugeben, was er uns, von der Entwicklungslehre ausgehend, vorgetragen hat, und wir hoffen, seine Ausführungen einmal in einem Sonderdruck zu begegnen. Nur kurz sei zum Beweise dafür, wie die Wissenschaft emsig weiter arbeitet, erwähnt, daß der erste Vogel-Systematiker Linne 1758 nur 929 Arten unterscheidet, während in dem jetzt maßgebenden Buche von Hartert 25000 Arten beschrieben werden. — Außerordentlich wertvoll sind für alle Naturfreunde in Hannover die beiden Aufsätze, die Herr Dr. Weigold im hannoverschen Kurier über den Plan geschrieben hat, in Hannover ein neues Naturmuseum zu bauen. Die Aufsätze sind so warmherzig und klar geschrieben, daß sie hoffentlich ihre Wirkung nicht verfehlen werden. Appel.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden, Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst., Boppel, 1. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. d. M., abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegründet 1. Mai 1923. Vereinsabende aller vier Wochen, in der ersten Woche des Monats verbunden mit Vortrag, in der dritten Woche jeden Monats nur gesellige Zusammenkunft. Vereinslokal „Sächsischer Hof". Gäste stets willkommen. Studienrat Professor Jahn 1. Vorsitzender; Werkmeister Mann 2. Vorsitzender; kaufm. Angestellter Reinhardt Schriftführer.

Berichtigung: Im Bericht unseres Vereins auf Seite 22 Zeile 9 von oben muß es heißen statt „Nistkästen," „Futterplätze."

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
I. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Zwickau i. S., Bosenstr. 44

Anzeigenteil

ie viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per rief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Käfige u. Gerätschaften

chlagnetze für Sperlinge, Amseln w. 2.50 M, für Tauben, Rebhühner w. 4.50 M. Nachn., bei Voreinsendung s Betrag. franko. [88] Fangnetzfabrik . E. A. Müller, Schlotheim Th. 3.

Spottbillig
halten Sie Ihre Nistkästchen, Einsatz, ransportbauer usw. bei einwandfreier uberer Bearbeitung. Kurzfristig liefer- r. Großabnehmer günstige Gelegenheit. Musternester mit Preisliste geg. Einsendung von 50 Pfg. [89
. W. Fricke, Braunlage (Harz).

Futtermittel

Mehlwürmer

g. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. anko versend. D. Waschinski & Co., Biesenthal I (Mark). [90

Mehlwürmer Pfd. 5 M, 6 Pfd. 30 M frc. Nachn.] Jeltner, Breslau, Weinstr. 12.

Mehlwürmer, reine Ware, gen Eins. von 1.75 M 1/4 Pfd. franko. h. Witte, Niederndodeleben b. Magd.

Deutsche Ameisenpuppen (1924) pro Pfund 8 M,
Ia Elbweißwurm (1924), pro Pfund 5 M. [93
NB. Versand erfolgt per Nachnahme. Anfrage bitte Rückporto.
ermann Arold, Zoolog. Handlung, Berlin N 58, Fransecksstr. 4.

as beste Weichfresserfutter ist

uska	Pfd.	3.—
eißwurm	„	6.—
eiseneier (finnische)	„	6.—
eiseneier (deutsche)	„	7.—

ine allseitig anerkannten Weichfuttermischungen sind:

imus	Pfd.	2.50
m	„	0.80
lbenhirse	„	1.60
berhirse	„	0.60

W. Lenger, Berlin N 58
Schönhauser Allee 70 a. [94

Vogelfutter [95

Kanarien, Waldvögel, Exoten, ageien, Weichfresser. Anerkannt ärfteste Mischungen auf Grund langer Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.

B. Göpel, Leipzig,
dlinring 1. Telephon 14 958.
Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Reform-Käfige

Zerlegbar, Leichteste Reinigung, Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919/22 (siehe Gefiederte Welt 1920, Heft 14—16), Goldene Medaille Leipzig 1921/22 **werden für alle Vogelarten hergestellt.**

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannäpfe, Ledertuchdecke.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe

Heck-, Flug-, Einsatz-Käfige.
Ausstellungs-Käfige nach Vorschr. d. V. D. K.
Transport-Käfige, jeden Posten.

Anfragen Rückporto beifügen. Katalog gegen Einsendung von 0,50 M. in Briefmarken. [96

Schlagnetze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware.

Kühn & Muschter, Leipzig,
Promenadenstraße 29. Telephon 10 226.
Bankkonto: Allgem. Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna; Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506. — Postscheck.: Leipzig 92 250.
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Versäumen Sie nicht das Abonnement der „Gefiederten Welt" zu erneuern!

Wer auf eine ausgiebige, gesunde Nachzucht rechnen will der verabreiche täglich den Weibchen „L. K." trocken so viel sie fressen mögen, den Hähnen „L. K." mit geriebener Karotte angefeuchtet, täglich 1 Teelöffel gestrichen vorgesetzt. [97
Ich liefere franko jeder Poststation:

Postkolli 8 Pakete 1/2-Kilo-Packung inkl.	11,— M
1 Paket 1/2-Kilo-Packung inkl.	1,20 M
Probe-Beutel franko	0,80 M

Ia. Rübsen, Glanz, Hanf, Mohn, Schälhafer, Hirse, Sepia usw. stets zu billigen Tagespreisen am Lager.
Lorenz, Dresden, Drehgasse 5.

Gesucht:

Gefiederte Welt, Jahrgänge 1872—82; 1884; 1889—90; 1892—97; 1900; 1903—1905; 1907; 1910—11; 1913; 1918. Angebote unter „Liebhaber" an die
Creutz'sche Verlagsbuchhandl., Magdeburg.

Einbanddecken

für die „Gef. Welt" 1924 sind da!

Preis mit Schutzpappen und Porto 2.— M.

Creutzsche Verlagsbuchhandlung Magdeburg
Postscheck: Magdeburg 3148 Postschließfach 148

Reines Insektenschrot

feine Körnung

1 1/2 Pfund frei. Mark 2.50. [98
Ornis-Haus Halle-Saale II

Vögel

Hochedle Gesangs-Kanarien

tourenreiche, fleißige Sänger (Edelroller). **Rein gelbe Gesangs-Kanarien,** Hähne sowie Zuchtweibchen, auch geeignet für Bastardzucht. Garantie: Versand nur kerngesunder Vögel, streng reelle Bedienung. Zuchtpärchen 20 M.

J. Franke, Dresden A
Lortzingstraße 3. [99
Prämiiert: Vogel-Ausstellung Dresden 1924 „Goldene Medaille".

Schönfelders Kanarienfeinzucht, Dresden-Trachau,

gold. Med. präm., Urstamm Seifert-Wolf, empfiehlt tiefe Hohlroller, Knorren, Schockel, schöne tiefe Flöten, Zuchthähne und ff. Tag- und Lichtsänger à 12, 15, 18 M., 3 Stück zus. 40 M., erstklassige Vorsänger und Ausstellungshähne à 20, 25, 30 M., 3 Stück zus. 60 M., prima Zuchtweibchen à 4 M. Machen Sie bitte einen Versuch und Sie werden zufrieden sein. 100te von Dankschreiben im Besitz. [100

Preisliste über Papageien, Zier- und Singvögel, Käfige

aller Art, von der gewöhnlichsten bis zur feinsten Ausführung. Vogelfutter versende an Private umsonst. [101
Gustav Müller, Vogel-Großhandlg., **Hamburg 31,** Langenfelderdamm 27.

Ia Zuchtmaterial, St. Seifert.

Gebe von mein. mit gr. Gold- u. Silb. Med. höchstpräm. Hohl- u. Knorrstamm tief tremulierend, geb. Hohlroller, weich. Hohlkl., Ia Pfeifen usw., preiswert ab: **Hähne,** je nach Leistung, 14, 17, 20, 25, 30 bis 40 Goldm., **ff. Weibchen,** mit besten Eigenschaften, 3—4 Goldm. Möglichst selbst kommen, sonst bitte um Vertrauen. Bei Anfragen Rückporto.
Karl Eichholz, Dresden 22,
Leisniger Straße 24 III. [102

Singdrosseln

Wildfang, halblaut singend, 15 Mark, **Rotkehlchen,** Ia, 6 Mark, verkauft **O. Naue,** Hildesheim
Peiner Landstraße 27 b. [103

Vornehm — Einfach — Praktisch

sind die Vorzüge, die der

Musil-Weichfresser-Käfig

in sich vereinigt. Auf mehreren Ausstellungen rühmlichst hervorgehoben und von ersten Vogelliebhaber-Autoritäten glänzend begutachtet.

Alleiniger Hersteller: **Josef Musil, München,** Geroltstraße 3.

Vorsänger und pa. Zuchtmaterial rein durchgezüchtet. Hohl- und Schockel-Stamm, 2 Staatsmedaillen, gebe preiswert ab. Am liebsten selbst kommen. [105

Paul Holzky, Cöthen IV.

Meyers Papageien	Stck.	75.—
Pflaumenkopf-Sittiche	„	18.—
Kleine Alexander-Sittiche	„	12.—
Große Alexander-Sittiche	„	20.—
Schamadrosseln, Männchen	„	75.—
Schamadrosseln, Weibchen	„	75.—
Dayaldrosseln	„	75.—
Chinesische Nachtigallen, Mchn.	„	15.—
Chinesische Nachtigallen, Wbch.	„	5.—
Tigerfinken	Paar	6.—
Erdeichhörnchen aus Südafrika	„	50.—

106] **Zoologische Großhandlung**

Gustav Reiß, Berlin, Gontardstr. 4.

Wegen Platzmangel gebe ab:

1 Zuchtpärchen

gr. Wellensittiche

ganz erstklassig, 20 Mk.

E. Pankatz, Stettin,

107] **Blumenstr. 16.**

Import von Mexiko eingetroffen:

Spottdrosseln, mex. Kuckuck
Indigofinken,
Kubafinken,
Papstfinken,
Rote Kardinäle,
Schwarzkehltrupiale,
Klarinettenvögel,
Fischertukane,
Katharinensittiche,
Noter Arara,
Massenawachteln,
Flamingo,
Rotbrusthänflinge,
Grüne Häher,
Nasenbären,
Krokodile,
Schildkröten u. dgl. [108

Interessenten finden große Auswahl.

Wilhelm Eimeke,
Hamburg 23, Eilbecker Weg 90.

Bastarde:

Stieglitz-, Zeisig-, Hänfling-, Ia Sprosser-Bastarde 12—25 ℳ, **Kanarien,** [pez. Schockel (Nitschke) 10—50 ℳ, Weibch. 2,50, **Schwarzplättchen,** Ia, Doppelschläger, 16 ℳ. **Tausche Waldvögel,** Rückpor., desgl. **Chin. Nachtigall, 10 Paar Wellensittiche,** streng reell.

J. Schaal, Stuttgart,
Böblinger Straße 14, I r. [109

Abzugeben

in Ia eingewöhnten Exemplaren:

1,1 **Gay's Ammerfinken** 25 ℳ
2,0 **dottergelbe Weber** à 5 ℳ
1,1 **Zebrafinken** 15 ℳ
1,1 **kl. Elsterchen** 6 ℳ
1,1 **jap. Möwchen, braunb.,** 13 ℳ
1,1 **Mosambikzeisige** 8 ℳ

Gesucht in Kauf oder Tausch:

1,0 **Buntastrild**
0,1 **Schmetterlingsfink**
0,1 **Schönbürzelchen**
0,2 **Grauastrilde**
0,1 **Amarant**
0,1 **Orangebäckchen** [110
1,0 **westafr. Goldbrüstchen**
Ed. Schütze, Eystrup a. d. Weser.

Von meinen neuen Eingängen kann ich heute in sehr schönen Exemplaren empfehlen:

Schamadrosseln, Ia im Gesang	Stck.	60.—
„ „ Weibchen	„	60.—
Goldstirnblattvögel	„	45.—
Blaubärtige Blattvögel	„	60.—
Bergrötel	„	60.—
Braunrückenstrauchschmätzer	„	50.—
Schwarzkappentimalien	„	55.—
Weißkehldrosseln	„	15.—
Klarinettenvögel	„	85.—
Braunbrüstige Blauschnäpper	„	60.—
Graublaue Fliegenschnäpper	„	50.—
Rotbauchfliegenschnäpper	„	55.—
Zwergtrauerschnäpper	„	50.—
Rubin-Nachtigall	„	150.—
Mennigvogel	„	130.—
Graupapageien, große, helle, vom Kongo, die sprachbegabtesten	„	110.—
schon ganz zahme	„	140.—
Molukkenkakadu, ganz zahm	„	225.—
Blaust.-Amazonen, fg., sprechlehr.	„	60.—
„ m. kleinem Krallenfehler	„	50.—
Gelbnackenamazonen, junge	„	75.—
Mohrenkopfpapageien, junge	„	40.—
Toviisittiche	Paar	36.—
Grüne Wellensittiche, junge	„	16.—
„ „ (Import)	„	20.—
Gelbe Wellensittiche	„	20.—
Saftgrüne Wellensittiche	„	60.—
Olivgrüne Wellensittiche	„	60.—
Weiße Reisfinken	„	75.—
Grau-Kardinäle m. roter Haube	Stck.	10.—
Wachtelastrilden	Paar	36.—
Elfenastrilden	„	20.—
Tigerfinken	„	6.—
Schmetterlingsfinken	„	5.—
Atlasfinken	„	4.—
Atlasfinken in Pracht	„	6.—
Bandfinken	„	5.—
Silberschnäbelchen	„	4.20
Amaranten	„	4.—
Grauastrilden	„	3.80
Klein Elsterchen	„	7.—
Grauedelsänger	„	6.—
Mosambikzeisige	„	9.—
Paradieswitwen	„	5.—
Blutschnabelweber	„	5.—
Orangeweber	„	6.—
Dottergelbe Weber	„	6.—
Maskenweber	„	6.—
Tahaweber	„	10.—
Afrikanische Zwergtäubchen	„	6.—
Sperlingskauz	Stck.	65.—

Versand per Nachnahme oder Voreinsendung. Porto und Verpackung 3.50 ℳ, dringend 6.50 ℳ [111

E. W. Lenger, Berlin N. 58, Schönhauser Allee 70a.

Wir suchen

Photographien von Tieren, Pflanzen, Gesteinsarten

und bitten um Einsendung von Rohabzügen. Es kommen nur Aufnahmen aus der freien Natur in Frage, nicht Bilder aus zoologischen und botanischen Gärten. Einsendungen werden „eingeschrieben" erbeten und eingeschrieben zurückgesandt; Portoersatz wird geleistet. Honorar nach Übereinkunft. [112

Verlagsbuchhandlung

Ferdinand Hirt & Sohn,
Leipzig, Salomonstraße 15.

Suche

für gr. Gartenvoliere zur Zucht: 0,1 **Nachtigall,** 0,1 **Bachstelze** (w.), 1,1 **Goldhähnchen,** 1,1 **Zaunkönige.**

G. Bick, Hamburg 13,
Grindelberg 3a. [118

Vertausche 1 **Stieglitz** und 1 **Hänfling,** aufgezogene, zahme Vögel, fleißig singend, eignen sich zur Bastardzucht, gegen 1 **guten Kanarienhahn** oder **Bastardhahn.**

R. Diwersy, Merzig/Saar.
A. Z.-Mtgl. 183. [114

Grüne Wellensittiche

erprobte Zuchtpaare, 23er Brut, Paar 14 Mark.

Jungtiere vom Sommer 24, grüne und einige gelbe, zirka 50 Stück, pro Stück 5 Mark, unter 2 werden nicht versandt. Porto und Verpackung Selbstkostenpreis. Tausche evtl. auch gegen Zebrafinken.

R. Huth, Perleberg. [115

Suche

2,2 **Zebrafinken,** 2,2 **Grauedelsänger,** Zuchtpaar. [116

Gebe ab: 1,1 **Mönchsittich,** 1,1 **Kaktussittich,** 1,1 **großen Alexandersittich,** 1,1 **blaubürzl. Sperlingspapageien.**

G. Haase, Grohn b. Vegesack.
A. Z.-Mtgl. 385. Ornis 352

Bestellungen für Februar sofort der Post übergeben!

Bestellzettel für Deutschland.

Postbestellzettel.

Hiermit bestelle ich für den Monat **Februar 1925**

1 „Die Gefiederte Welt"

(eventuell mit Nachlieferung). — **Erscheinungsort Burg Bz. Mgdb.**

Name: .....

Wohnung: .....

Postquittung: ..... Mk. ..... Pf. sind heute bezahlt worden.

Ort: ..... den .....

Postannahme

.....

1,1 **gehaubt. Glanzkäfertauben,** 1,0 **Rosttäubchen, hochrote Tigerfinken, Graukardinäle,** mit roter Haube, **weißbäckige Lerchen, Zuchtpaare Wellensittiche** offeriert [117

Zoologische Großhandlung

H. Ditzell, Leipzig,
Wilhelmstr. 68. Telephon 52275.
Bei Anfragen bitte Rückporto beizufügen.

Dayaldrossel,

zahm und fleißig singend, gebe ab für 40 Mark franko. [118

N. Diwersy, Merzig a. d. Saar.
A. Z.-Mtgl. 183.

Blaustirnamazone

herrl. Vogel nur 50 Mark

Niedl. Spielaffen

poss., droll. Tiere nur 60 Mark
Verpackung gratis Porto 5 Mark
119] **Willers Tierpark**
Altona a. d. E., Kirchenstr. 34.

Vertausche

1,2 **Wellensittiche,** 24er Brut, gegen guten **Kanarienhahn.** [120
Albert Hack, bei Ernst Mehl,
Garmisch (Oberbayern).

Vertausche

3,1 Ia Zuchtpaare **gr. Wellensittiche** gegen 15 Ia gelbe 24er **Kanarien weibchen.** Gefl. Angebote an
Louis Köther, Hildesheim,
121] Jakobistr. 11.

---

1 Davidzippe, ff. Säng. 10 ℳ, 1 ff. pfeif. u. sing. Star, 12 ℳ, 1 ff. sing. Brauneli m. blauer Brust, 7 ℳ, 1 Zuchtpaar gelb. Zeisige, 7,50 ℳ, 1 Zuchtpaar Edelfinken 6 ℳ, 1 herrl. sing. zah. Rothänfling, 7 ℳ, 1 f. sing. Grünhänfg. 5 ℳ.

A. Engelken, Delmenhorst. [12

Gesucht: ein gesundes Weibch. **Rotkopfamadine.**

Josef Porzelt,
München, Klara-Straße 3. [1

Suche

Gefiederte Welt, Jahrgang 1909, 04, 02, 01, 00, gebunden oder ungebunde gut erhalten. [1

Th. Vandenhoff, Köln,
Norberstraße 14.

Naumann, Vögel Mitteleuropas, 4 u. 5; **Neunzig,** Einheimische Stubenvögel u. a. abzugeben. Anfr. Porto. [
Waldschmidt, Kassel, Frankf. Str

Mehrere echte Gemsbär
noch ungebunden, billig zu verkaufen.
Joh. Ruppert, Würzburg,
Rottengasse 18. [

Beschwerden wegen Nichtzustellung der „Gefiederten Welt" sind bei zuständigen Postamt zubringen.

Inserate

für das am 29. Jan. 1925 zur Ausgabe gelangende Heft 5 der Welt erbitten bis 26. Jan. 1925

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 12. Februar 1925 | Heft 7

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Die Rätsel des Vogelgesangs.

Von Karl Reich, Bremen.

(Nachdruck verboten.)

Wie das menschliche Lied, wie Instrumentalmusik unser Ohr ergötzt, so erfreut und entzückt das Lied der gefiederten Sänger, und eine der Eigenschaften, welche vor allem uns unsere gefiederten Freunde liebenswert und begehrenswert machen, ist ihr Gesang. Der Gesangstrieb der Vögel ist abhängig von ihrer Gesundheit und ihrem Wohlbefinden, und stets im Zusammenhang mit ihrem Fortpflanzungstriebe, am feurigsten zur Zeit des Paarungstriebes, kurz vor Beginn und während der Dauer des letzteren. Mancher von dieser Annahme scheinbar abweichend auftretender Gesangsdrang einiger Vögel hat bei Gelehrten und Forschern zu anderen Annahmen Veranlassung gegeben. Ich neige aber der Ansicht zu, daß diese Vorgänge sich mehr oder weniger dehnbar in die Anschauung der Zusammenhangsbeziehungen von Fortpflanzungstrieb und Gesangstrieb einordnen lassen. Jedenfalls muß ich mich auf Grund meiner gemachten Beobachtungen mit den Ausführungen des Herrn F. Cristoleit identifizieren, welche derselbe über Vogelsang und Fortpflanzungsgeschäft im Journal für Ornithologie, Heft 1, Jahrgang 1924, Seite 10 bis 113, macht, im Gegensatz zu den Ausführungen der Arbeit des Herrn Prof. Böcker, Freiburg, im Journal für Ornithologie. Der Gesangstrieb ist ein besonderes Vorrecht der Männchen, um die Weibchen anzulocken, ihre Liebe zu erringen und sie in Liebesrausch zu versetzen. Auch spielt der feurige Gesang der Männchen eine Rolle hinsichtlich der Zuchtwahl, in der Bekämpfung der Männchen untereinander und der Begrenzung ihres Brutreviers.

Wie die Natur die Vögel mit Augenlinsen in der feinsten technischen Vollendung ausgestattet hat, so daß sie in der Sehschärfe trotz ihrer Kleinheit alle anderen Geschöpfe übertreffen, so ist es gleicherweise zu bewundern, welches Kunstwerk an instrumentaler technischer Feinheit die Natur in die Gesangsmuskeln der kleinen Kehlen hineingebaut hat, durch die sie befähigt sind, die entzückendsten Gesangsweisen hervorzuzaubern in für Menschen nicht nachzuahmender Vollendung. Kein Wunder, wenn dadurch in den für Vogelgesang empfindlich eingestellten Gehörnerven der feinste Sinnen- und Genußreiz ausgelöst wird.

In der Art des Gesanges der Vögel unterscheiden wir zwei Hauptarten, nämlich den Schlag und den Gesang. Z. B. spricht man beim König der Singvögel, dem Sprosser und bei der Königin, der Nachtigall, sowie beim Buchfink vom Schlag. Sie schlagen, weil sie ihre einzelnen Tongebilde zum größten Teil kräftig in gestoßenen, nicht zu langen Strophen zum Teil metallisch klingend zum Vortrag bringen, während wir bei der Lerche, beim Hänfling, Zeisig, Stieglitz, Gartengrasmücke, Gelbspötter, Kanarienvogel usw. von Gesang reden, weil der Gesang in mittelstarken, zum Teil auch starken und wieder leiser zwitschernden Lauten, mit flötenartigen und dudelnden gemischt, in längerem Vortrag gebracht wird. Hinsichtlich des Artengesanges unterscheidet man dann Originalsänger und Spötter. Originalsänger sind solche Vogelarten, welche stets nur an dem ihrer Art eigenen Gesang bzw. Schlag festhalten und sich durch keine Einwirkung auf andersgeartete Touren bringen lassen. Spötter nennt man diejenigen Vogelarten, welche zwar einen allgemeinen eigenen Gesang haben, jedoch auch Touren aus den Liedern anderer Vögel aufnehmen und in ihren Gesang hineinzuweben verstehen. Mit einem vorzüglichen Spöttertalent an hervorragender Stelle der Gattung „Spötter" steht unser Gelbrock, der Kanarienvogel. Keiner anderen Vogelkehle ist das Talent vielseitiger Nachahmung in derart reichem Maße verliehen. Infolge seines Talentes neue auf ihn einwirkende Töne und Touren aufzunehmen, Tonschönheiten daraus zu modeln, selbst neue hinzuzuerfinden, und diese zusammen zu tonkünstlerischem Aufbau neuer Stammeslieder zu verwenden, ist es den verschiedenen deutschen bekannten Stammeszüchtern gelungen, jeweilig ihren besonderen Stamm zu begründen und auszubauen. So die Vögel des Trutes-chen, Erntgeschen und Seifert-Stammes, der Waterslager und Nachtigall-Edelsänger, die in den Stammestouren selbst für den Laien wesentlich voneinander verschieden sind.

Diese Spötterbegabung ist auch die Unterlage gewesen, auf der ich mein Experiment aufgebaut und durchgeführt habe, dem Kanarienvogel einen neuen Gesang anzulernen und erblich in ihm zu befestigen, und zwar auf dem Wege des Vorsingens und dem der Vererbung der erworbenen Eigenschaft. Im Laufe der Erfahrungen in meinem Vogelliebhaberleben war

mir die Erkenntnis geworden, daß nur das Gelingen dieser beiden Maßnahmen dieses Ziel erreichbar werden lassen könnte, und so trat ich vor etwa 14 Jahren an diese Aufgabe heran. Zunächst galt es die Auswahl unter den tonbegabtesten gefiederten Sängerfürsten als Lehrer zu treffen, von denen reichlich 50 Vertreter der edelsten, aus allen Erdteilen in Einzelkäfigen (damals vor dem Kriege) in meinem Besitz waren. In die engere Wahl kamen Sprosser, Nachtigall, indische Schamadrossel, amerikanische Spottdrossel, letztere beiden vorzügliche Spötter, ferner Schwarzplattel, Gartengrasmücke, Schwarzdrossel und Heidelerche. Die Wahl fiel als verlockenste Tonquelle auf die Nachtigall. Nachdem ich eine vorsichtige Auswahl gesunder, für mein Vorhaben meinem Ermessen nach wohlbegabter Kanarienelterntiere getroffen hatte, versuchte ich nun mein Heil in allmählichem Überleiten der Gesangtouren der jungen Kanarienhähne auf die Nachtigalltouren, indem die Junghähne nie ihre Väter, sondern stets nur den Nachtigallschlag zu hören bekamen. Es war eine Geduldsarbeit. Besonders in den ersten Jahren. Langsam, aber von Generation zu Generation steigend, kam dann der Erfolg immer mehr nachtigallähnlicher Sänger. Die geistvolle, interessante und spannende Mitarbeit meines hochgeschätzten Freundes, Herrn Dr. Duncker, hat mich oft über die Last schwerer Geduldsarbeit hinwegkommen helfen. Der Erfolg wäre aber doch immer wieder zurückgeworfen worden, wenn es mir nicht gelungen wäre, den jungen Studenten das ganze Jahr hindurch Nachtigallengesang vorzuführen.

In den ersten Jahren hatte ich während der ersten Monate immer vielversprechende Erfolge bei den begabtesten Junghähnen. Wenn dann die vorsingenden Nachtigallen aber normalerweise ihren Gesang einstellten, dann verschwand allmählich von Woche zu Woche bemerkbarer das mühsam wunderschön Erlernte, und die ihnen in ihrem Stammgesang liegenden echten Kanarientouren drangen durch und verdrängten fast vollkommen die erlernten Touren, und mir schwammen damit wie dem betrübten Lohgerber die schönen Felle immer wieder weg. Das durfte so nicht weiter gehen, sonst ging es mir grad wie den vielen Züchtern, denen schon seit mehr als hundert Jahren dieses Problem vorbeigelungen war. Da gelang es mir, bei einer Anzahl von Nachtigallen infolge künstlicher Verschiebung der Mauser durch plötzliche Fütterungsänderung und plötzlichen starken Temperaturwechsel, die erwartete Verschiebung der Gesangszeit zu erreichen. Diese Verschiebungen des Gesangstriebes bei den einzelnen Nachtigallen, entsprechend dem Ablauf der Kette der aufeinanderfolgenden Einzeltriebe, ermöglichte es mir, auf meine jungen Kanarienhähne fast ohne Unterbrechungen das ganze Jahr hindurch Nachtigallengesang einwirken zu lassen. Diese Verschiebung des Gesangstriebes ist der Beweis für die Abhängigkeit der verschiedenen aufeinanderfolgenden Triebe von dem Ablauf der Einzelglieder der Triebkette, und ist damit der Grund meiner Einstellung zu den Anschauungen Altums und der diese Anschauungen verfechtenden Aufsätze von Fritz Braun und F. Cristoleit. (Schluß folgt.)

Sumpfrohrsänger.

Von Paul Schwarz in Leipzig, Südstraße 67.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Die leise Unterhaltung über anderes, was mein Gast sonst noch von seinem Platze erspähen kann, ist längst verstummt. Beide Teile haben ihre Aufmerksamkeit nur dem unsichtbaren Sänger in der angrenzenden Stube gewidmet und darüber ist die Zeit vergangen. Schließlich interessiert sich mein Besuch auch noch für anderes, was das Bürschen drüben angeht. Weiter aber sind auch noch andere Vögel da, die einer kritischen Betrachtung wohl Stand halten dürften. So wollen wir nun denn die Sache einmal etwas näher betrachten. Wo steckt er denn? Ja, da muß ich erst das davorstehende Blumenarrangement wegnehmen, um ihn zeigen zu können. Bücken muß man sich auch. Bei einer Vogelschar wie der meinigen muß man weit unten anfangen, um alles in hübscher gefälliger Weise einrichten zu können. Mit ein paar Handgriffen ist es getan und bitte, hier ist der kleine Kerl, der uns die Zeit vergessen ließ. Hin und her, auf und ab, dann zum Futternapf und auch ein Tröpfchen getrunken, und munter gehts weiter. Nicht den Käfig und seine Einrichtung trifft zunächst der kritische Blick, sondern nur seinen Insassen, der sich vollfedrig und bei guter Körperbeschaffenheit in seinem Tun und Treiben kaum stören läßt. Als wüßte es das Tierchen, was wir von ihm wollen, von allen Seiten zeigt er sich ohne Scheu in allen möglichen Stellungen und springt auch wohl gar mal ans Gitter, das helle Gefieder der Unterseite zeigend. Gib dir keine Mühe weiter du kleiner Kerl, deine schlichte Schönheit ins rechte Licht zu rücken, du hast die Prüfung wohl bestanden. Wir wollen nur noch die Einrichtung deines Käfigs und diesen selbst besehen, dann kannst du, wenn du willst, der Ruhe pflegen.

Der Käfig ist, wie alle anderen, 60 cm lang, 30 cm hoch und 25 cm tief. Es ist ein Kistenkäfig mit doppeltem Boden und abnehmbarer weicher Decke ohne allen Zierrat. An der Vorderseite ist eine praktische Tür mit Federschluß und an der rechten Seitenwand das Badehaus angebracht. Der Anstrich ist außen ein lichtgrüner und innen ein weißer Lackanstrich. Die Inneneinrichtung ist ebenso einfach wie praktisch und sowohl für Pfleger als auch Pfleglinq bequem. Der Bodenkasten ist aus Holz bzw. Zinkblech. Der Futternapf steht innen auf dem mit Papier belegten Käfigboden, er ist aus Porzellan und mißt im Durchmesser $6^1/_2$ cm. Die drei Sprungstangen, im Dreisprung nach unten geordnet, in der wagerechten in halber Höhe soweit auseinander angebracht, daß sich der Vogel nicht am Schwanze bestoßen kann, sind aus Naturholz — Holunder.

Auch diese Prüfung ist vorüber. Ob hier mein Gast zufrieden ist, kann ich nicht erkennen. Die Höflichkeit fordert schließlich, daß man seinem Gastgeber nichts Unangenehmes sagt. Ich will auch hierin keine grundstürzende Änderung herbeiführen, aber mir wäre es nicht unangenehm, die Wahrheit zu hören über das, was meinem Gaste nicht gefällt. Innenfütterung! Na, ich will das Thema lieber nicht anschneiden, es gibt darüber recht viel verschiedene Meinungen. Zweifellos mag der oder jener Einwand gegen diese berechtigt sein, doch ich lasse mich von ihr nicht abbringen, weil die

zahlreichen Vorteile ganz gewiß die oder jene Nachteile überwiegen. Für mich ist maßgebend, daß meine Vögel gesund und munter sind und erhalten werden. Und diesen Nachweis kann ich bei allen meinen Vögeln erbringen.

Außer dem kleinen Sänger besitze ich noch drei seiner Art. Allerdings bin ich bei diesen nicht von dem seltenen Glück begünstigt, daß sie singen; wer wollte das auch von diesjährigen Frischfängen verlangen! Nach drei, vier Jahren aber werden auch sie dem abnormalen Zustande verfallen sein, wie alle unsere edlen Sänger in warmer Stube bei mehrjähriger Käfigung.

Die Gefiederbeschaffenheit dieser drei Frischfänge läßt freilich zu wünschen übrig, soweit es sich um die Zierde jedes Vogels handelt, das Schwänzchen. Es ist bedauerlich, daß die Vögel in der Gefangenschaft recht oft gerade an diesem Schmucke Anstoß nehmen und nicht eher ruhen wollen, bis er Stückchen um Stückchen verschwunden ist. Und gar mancher Vogelwirt wird wie ich, den Ursachen dieses Übels nachgegangen sein und diese und jene vergeblichen Versuche angewandt haben. Mit Ausnahme unsachgemäßer Käfigung liegt dies zweifellos am Vogel selbst. Es gehört eben ein gut Teil Glück dazu, solche Vögel zu bekommen, die trotz Unruhe immer ein einwandfreies Gefieder behalten. Heute mache ich mir jedoch darum keine Sorgen mehr. Ein Frischfang im ersten Jahre mag es sich wohl erlauben können, ohne Schwanz mein Pflegling zu sein, im zweiten und den folgenden Jahren trägt er seine Zierde um so stolzer. Damit will ich aber nicht etwa sagen, daß ich das Mittel erfunden habe, die Käfigvögel im vollen Gefieder erhalten zu können. Das liegt, wie ich schon sagte, zum größten Teil am Vogel, zum kleinsten Teil am Pfleger durch Darbietung eines sachgemäßen Käfigs.

Was verstehe ich unter sachgemäßer Käfigung? Nun, jedenfalls nicht das, was Rausch empfiehlt, einen Zweisprungkäfig von 28 cm Länge, 15 cm Breite und 20 cm Höhe. Solche Marterkästen kommen nicht in mein Haus. Meine Vögel, einer wie der andere, mit Ausnahme der Singdrossel und ähnlich großer Vögel, haben einen 60er Käfig wie bereits beschrieben, eingerichtet mit Dreisprung nach unten.

Ein großer Käfig gestattet dem Vogel Ausarbeitung und Bewegung. Der Selbsterhaltungstrieb hat doch unter anderem gerade bei dem Sumpfrohrsänger die außerordentliche Beweglichkeit gesteigert, die der Vogel zwar nicht in der Gefangenschaft fortzusetzen brauchte, weil er alles zum Leben notwendige im Käfig vorfindet, aber auch zur Verarbeitung der aufgenommenen Futterstoffe, die in jedem Falle nur Ersatzstoffe sind, ist Beweglichkeit nötig. Also biete ich sie auch meinen Pfleglingen. Einwände über Vor- und Nachteile der großen Käfige können gewiß ihre Berechtigung haben. Ich habe aber, wie mancher alte Liebhaber, alle möglichen Käfigsysteme, große und kleine, enge und weite, ausprobiert, und der Vorteile in meinen großen Käfigen mehr gefunden als Nachteile. Ich werde daher stets einer derjenigen Vogelpfleger sein und bleiben, der für große geräumige Käfige eintritt.

Den Sitz- oder Sprungstangen schenke ich meine besondere Aufmerksamkeit. Der Sumpfrohrsänger erhält Stangen eine Idee unter Normalbleistiftstärke, er muß durchgreifen können. Zweckmäßig sind sie deshalb, weil dadurch das Breit- und Austreten der Zehen und der Füße verhindert wird. Ein Vogel

Südafr. Scharrdrossel (s. S. 73).

mit derartig vom Pfleger verschuldeten Füßen besitzt nicht das muntere Wesen und hüpft kaum von Stange zu Stange. Er wird faul, unter Umständen auch fett, und dafür bin ich nicht zu haben. Ein munteres Hin und Her, Auf und Ab ist mir viel lieber und gibt mir neben anderen den Beweis des Wohlbefindens. Ich glaube auch bestimmt, daß die Bewegung auch nicht ohne Einfluß auf den Gesamtorganismus sein muß, wie auch später der Mauser zugute kommt. Federnde Sitzstangen verwerfe ich. Die Federung ersetzt meiner Ansicht nach keinesfalls den federnden Ast in der Natur. Der aufmerksame Beobachter in der Natur wird mir bestätigen müssen, daß das künstliche Federn keinesfalls, auch nicht nur nahekommend, dem des lebenden Astes oder Ästchens entspricht. Federnde Sitzstangen sind Fußprellen und daher eher schädlich als dem Vogel angenehm. Ich klemme die Stangen an die Rückwand und den Vordergitterdraht so weit in der wagerechten auseinander, daß der Vogel den Weg von einer Stange

zur anderen mit Flügelschwung erreichen muß. Dadurch erreiche ich zweierlei, einmal die von mir gern gesehene Beweglichkeit und zum anderen ein leiseres Aufsitzen als im Sprunge. Zweifellos ist das eine Ursache mehr mit, sogenannte Elefantenfüße zu vermeiden. Reinlichkeit ist das halbe Leben. Manche Sorge hat sich der Liebhaber selbst bereitet, wenn er es an der unbedingt nötigen Reinlichkeit fehlen ließ. Beim täglichen Wechsel des Bodenbelags allein darf es nicht bewenden, es sind ebenso die Sprungstangen im Auge zu behalten und so oft es nur möglich auszuwechseln. Wie viele Liebhaber gibt es aber, die diese Reinlichkeit nicht für nötig und übertrieben halten. Nun, übertrieben und unnötig ist das nicht, sondern das halte ich für die erste Pflicht und Schuldigkeit des Vogelpflegers. Es ist eben doch ein himmelweiter Unterschied zwischen Vogel halten und Vogel pflegen. Gerade diese peinliche Sauberkeit ist mit als Ursache anzusehen, daß den Vogelpflegern manche schöne Erfolge beschieden sind.

Zur Vogelpflege gehört auch sachgemäße Fütterung, und zwar ist sie das Herz des Ganzen. Unsachgemäße Fütterung vernichtet ein Vogelleben in der Hand des Unkundigen in einem Tage. Anders solls beim Liebhaber sein. Er soll, wenn er das Recht, Vögel zu käfigen, genießen und begründen will, den Beweis erbringen, daß er mit Hilfe seines Verständnisses, wenn nicht länger so doch mindestens ebenso lange als in der Freiheit gewährleistet ist, erhalten kann. Sonst die Hände weg. Lehrgeld muß jeder zahlen, wird eingewendet werden. Gewiß, aber wo ein Leben, ob das eines Vogels oder eines anderen Geschöpfes, auf dem Spiele steht, ist einerlei. Da darf es kein Lehrgeld mehr kosten. Lehrmeister sind genügend vorhanden, deren man sich bedienen kann, wenn es sich um die Schaffung der dringend nötigen Kenntnisse über die oder jene Vogelart handelt.

Meine Sumpfrohrsänger erhalten eine streng individuelle Fütterung. Gott sei Dank sind wir Liebhaber noch nicht so weit, ein Futter herstellen zu können, das für alle Vögel passend ist. Wäre es erst einmal soweit, dann gäbe es keinen Liebhaberehrgeiz mehr, dann könnten Hinz und Kunz auch Pfleger sein, und die ganze herrliche Liebhaberei hätte ihre letzten Tage gesehen. Und da es noch nicht soweit ist, haben die Liebhaber alle Ursache, sich der Kunst der Vogelkäfigung und -pflege würdig zu erweisen.

Aus dem Grunde, daß jeder Vogel nach Art und Befund verschieden zu füttern ist, verwende ich kein vorbereitetes Mischfutter, sondern jeden Tag, den Gott werden läßt, werden die einzelnen Bestandteile vorbereitet und gemischt. Sumpfrohrsänger erhalten bei mir im Frühjahr, wenn es frische Puppen gibt, Ameisenpuppen blank bis zum Ende der Saison. Bei diesem Idealfutter ist weder über Mangel an Gesang noch über das Wohlbefinden dieser weichen zarten Vogelart zu klagen. Sie sammeln sich Kräfte für eine glatte Mauser und nebenbei auch noch einen kleinen Fettansatz an, der dem Vogel sehr zweckdienlich ist, wenn der Oktober, November, zwei Sorgenmonate für die Liebhaber von Spöttern und Sumpfrohrsängern kommt. Ändern sich die Verhältnisse durch ungenügende Ausbeute der Ameisenhaufen im August, dann gehts an die Umfütterung. Hat der Vogel Fettansatz, dann bekommt er weißes Gebäck, gemahlenen Hanf, Garnelenschrot zu gleichen Teilen, angefeuchtet und gemischt mit geriebener Möhre und als Zukost bis zu 60 Stück meiner Medizin in abgetötetem Zustand. Nach Verbrauch des Fettansatzes treten noch Weißwurm und getrocknete Ameisenpuppen hinzu. Die Verbesserung des Futters erfordert zur Vermeidung von Verschwendung natürlich die Einschränkung der Menge des Futters und der Würmer. Dabei wird jeder einzelne Vogel fortgesetzt beobachtet und notfalls hier und da eingegriffen, sei es mit Ameisenpuppen oder Weißwurm oder gar Medizin. Die Menge, die ein einzelner Sumpfrohrsänger erhält, läßt sich nicht nach Gewicht angeben, weil eine Schematisierung das verderblichste Beginnen ist. Es kann nämlich dem Vogel das beste Futter verabreicht werden und er kränkelt, während bei Wechselfolge in dem oder jenem Nährmittel der beste Erfolg verzeichnet wird. Beobachten und immer wieder beobachten ist die Losung. Ein geübtes Auge erkennt sofort, ob etwas fehlt, und ist etwa der Fehler im Futter zu suchen, so genügt auch hier ein Blick, der Futternapf wirds ausweisen. Da ist es wohl gut, wenn man Würmer zur Verfügung hat. Die harten Mehlwürmer freilich wirken aber doch nicht so erkenntlich schnell, als die kleinen weichen Würmchen, meine Medizin. —

(Schluß folgt.)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Auf der Ausstellung des Landesverbandes Preußen im November 1924 hatte W. Lenger-Berlin unter anderen eine Drossel ausgestellt, welche bisher nur in einigen wenigen Exemplaren nach Europa gelangt ist, die auf S. 64 abgebildete

Grauschwanzdrossel — Turdus amaurochalina *Cab.*,

deren Verbreitungsgebiet sich über einen großen Teil Südamerikas erstreckt. Sie lebt in Uruguay, Paraguay, Argentinien, Brasilien, im Gebiet des Amazonenstromes und Bolivien. Anscheinend hält sie sich, ähnlich unserer Amsel, im Gebüsch, auf Hecken, in Gärten und Pflanzungen auf, kommt aber, wie Burmeister (System. Übers. d. Tiere Brasil.) berichtet, auf den Erdboden herab: „Läuft viel am Boden und bekommt sogar Sandflöhe in seine Zehen, wie eins meiner Exemplare ... beweist". Ihre Nester finden sich im Gebüsch, in Hecken, auf Bäumen in Gärten, meist in mittlerer Höhe, etwa 2 m über dem Boden. Es steht auf fester Unterlage, bald frei, bald ist es in eine Astgabel gebaut, zuweilen ist es auch dicht am Stamm errichtet und an diesen angelehnt. Immer ist es gut im Laub versteckt. Es ist napfförmig auf eine Unterlage von dürren, biegsamen Pflanzenstengeln, welche mit feuchter Erde zu einer Masse verbunden sind, ebenso die Seitenwände, welche aus Pflanzenstengeln und Wurzeln erbaut sind. Die Erde kommt an den Seiten, stellenweise auch außen und am oberen, anscheinend glattgestrichenen Nestrand zum Vorschein. Außen ist das Nest reichlich mit grünem Moos umgeben, die

innere Mulde ist mit weichen, zarten Wurzeln gut ausgefüttert, aber nirgends mit Erde verstrichen. Die Eier sind zart meergrünlichblau mit rostroten, zahlreich und gleichmäßig über das Ei verteilten Punkten und Flecken. In Buenos Aires ist sie ein sehr häufiger Jahresvogel auf Bäumen und Sträuchern, welche an den Ufern des La Plata wachsen. Hier sammeln sie sich im Winter in großen Scharen an. Daß ein so gemeiner Vogel so selten nach Europa kommt, hat wohl seinen Grund in der Tatsache, daß der an sich schlicht gefärbte Vogel auch nicht über einen besonders angenehmen Gesang verfügt. Durmford vergleicht ihn mit „den gedämpften, aber zankenden Tönen der Amsel, welche sie hören läßt, ehe sie aus dem Dickicht hervorkommt". „So täuschend war es für mich, daß ich, als ich den Laut zum erstenmal vernahm, sicher glaubte, er rühre von einer entkommenen Schwarzdrossel her." Herr Frank in Liverpool, welcher Dr. Karl Ruß ein Pärchen dieser Drosseln übersandte, nennt den Gesang „wenn auch leise und unzureichend, aber doch angenehm". Er wurde ziemlich häufig vorgetragen. Dr. Ruß urteilt ähnlich.

Gefiederbeschreibung: ♂ Kopf blaugrau, übrige Oberseite bräunlich olivengrau, am Oberrücken mehr gelblichgrau; Kehle meist braunschwärzlich gestreift; auf der Kropfgegend ein rein weißer Fleck; übrige Unterseite weiß, Seiten gelblich olivengrau; Flügel wie Oberrücken, Schwingen mattgelb, außen gesäumt; Unterflügeldecken blaßgelb; Schwanz blaugrau; Augen braun; Schnabel hellbraun, Unterschnabel heller; Füße horngrau; Lg. 225, Fl. 108, Schw. 75 mm. ♀ kleiner, fahler; Kehle blaßgelblich, mattbraun gestreift, kein weißer Fleck unter der Kehle; Bauchmitte, Steißgegend gelblichweiß.

Viel eigenartiger und interessanter aber, wenn wir den vorliegenden spärlichen Berichten der Reisenden folgen, gleichfalls keine hervorragende Sängerin ist die auf S. 71 abgebildete

Südafrikanische Scharrdrossel — Geocichla litsipsirupa (*A. Sm.*),

welche mit Fockelmanns letztem südafrikanischen Import zu uns gelangte. Ich konnte nicht feststellen, ob dieser Vogel schon einmal nach Deutschland gebracht ist. Anscheinend ist er bereits lebend nach England eingeführt. Sie wird „Scharrdrossel" oder auch „Rauschedrossel" genannt, weil sie sich sehr viel auf dem Erdboden aufhält und nach Kerfen und Würmern, wie alle Drosseln, eifrig scharrt und, wenn dies Scharren im am Boden liegenden dürren Laub vor sich geht, ein stark rauschendes Geräusch entsteht, daher „Rauschedrossel". „Südafrikanische" müssen wir sie nennen, weil andere Formen dieser Drossel im Niassagebiet nördlich bis in Nordostafrika vorkommen.

Das Verbreitungsgebiet unserer Drossel ist Südafrika von Benguella bis Damaraland und vom Kaffernland bis Maschona. In letzterem Gebiet fand sie Marshall nicht allzu häufig in kleineren Flügen in entlegeneren Teilen des Buschwaldes. Nach Stark verbringt sie den größten Teil ihres Daseins auf dem Erdboden, auf dem sie Anderssson ungemein schnell laufen sah. Sie scharrt viel im trockenen Laub auf der Jagd nach Insekten und Würmern, unter denen sie Heuschrecken, Raupen und Käfer bevorzugt. Das bestätigt auch der Mageninhalt einiger von Marshall untersuchter Stücke. Sie macht sich aber wie Klunkerstar und andere auch die Steppenbrände zunutze und jagt, wie Rendal zweimal zu beobachten Gelegenheit hatte, die durch diese Brände



Einfarbdrossel (s. S. 74).

aufgescheuchten Insekten. Ihre Stimme ist rauh stark klagend, ihr Lied halb Gesang, zur andern Hälfte besteht er aus schlagartigen Rufen, die so klingen, als ob der Vogel heiser wäre. Das Nest fand Ayres auf einer Mimose und sagt, daß es dem unserer Misteldrossel gleiche. Stark fand es auf dem Ast eines Baumes etwa 2,5 m über dem Boden. Es war aus Grashalmen gebaut und innen mit Federn und Daunen gepolstert. Das Ei ist nach Stark glänzend weiß mit sehr dunklen und fahlen, rotbraunen Flecken (28 × 22 mm). Der schöne Vogel benahm sich im Käfig nicht besonders scheu. Er lief viel auf dem Käfigboden umher und beobachtet, hoch aufgerichtet, alle Vorgänge in seiner Nähe.

Gefiederbeschreibung: Oberseits braungrau; Zügel, Schläfenband, Kopfseiten weiß, über der Ohrgegend zwei schwarze Binden; unterseits weiß, jederseits der Kehle ein Bartstreif aus schwarzen Flecken gebildet, übriger Unterkörper schwarz gefleckt; Kropfgegend zuweilen rostgelblich verwaschen; Flügeldecken, innere Schwingen wie Oberseite, übrige Schwingen schwarzbraun mit isabellgelber Innenfahne; Unterflügeldecken rostgelb; Schwanzfedern dunkelbraun im frischen Gefieder mit weißem Endsaum. Lg. 210 bis 235, Fl. 125—132, Schw. 70—80, Schn. 24—28, Lf. 33—37 mm.

Eine einfach, aber sehr ansprechend bläulichgrau gefärbte und auch als Sängerin sehr beachtenswerte Drossel brachte der indische Import Fockelmanns in größerer Anzahl, darunter auch Weibchen und junge Vögel, die

Einfarbdrossel — Turdus unicolor *Tick.*

Sie kommt in einem großen Teil des Himalajagebietes, von Kaschmir bis Sikkim, als Brutvogel vor. Im Winter verläßt sie die Himalajagebirgsländer und sucht die stärker bewaldeten Gebiete der indischen Ebene auf. Sie ist dann in der Umgegend von Kalkutta ein sehr gemeiner Vogel. Im Sommer werden die Nordwestgebiete des Himalaja bevorzugt. In Kaschmir wird sie die „Singdrossel von Kaschmir" („Song Thrush" of Caschmere) genannt. Jerdon bezeichnet den Gesang als ähnlich dem unserer Amsel, aber er sei ärmer an Strophen und infolgedessen nicht so abwechselungsreich. Herr v. Lukanus, welcher diese Drossel besaß, sagt: „Der Gesang dieser Drossel besteht aus singdrosselartigen Rufen, die mehrmals wiederholt werden. Die weiche und flötende Stimme, die etwas leiser ist als die der Singdrossel, kommt durch die getragene und ruhige Vortragsweise prachtvoll zum Ausdruck. Meine Einfarbdrossel verfügte über etwa 12 verschiedene Strophen, und trotz der Mannigfaltigkeit des Liedes wurde diese durch keine spitzen und schrillen Töne beeinträchtigt, wie es leider im Gesang unserer heimischen Singdrosseln der Fall ist. Als Sängerin gebührt der Einfarbdrossel jedenfalls ein hoher Rang in der artenreichen Gruppe der Turdiden." Hutton fand ihr Nest im Juni. Es war aus Wurzeln und Moos erbaut. Gewöhnlich stand es am Stamm eines Baumes auf einigen hervorschießenden Zweigen oder auf einem wagerechten Ast. Das Gelege besteht aus 3—4 trübgrünlichweißen Eiern mit rostbraunen Punkten, Flecken und Flatschen.

Gefiederbeschreibung: ♂ oberseits dunkelschiefergrau; Kinn weißlich; übriger Vorderhals hellgrau; Brust grau; übrige Unterseite weiß; Flanken rostbraun; Flügel schwarzgrau; Unterflügeldecken rostbraun; Schnabel horngelb; Auge braun, Lidrand gelb; Füße braungelb; Lg. 225, Fl. 112,5, Schw. 78 mm. ♀ oberseits olivbraun; Bürzel grau; Ohrdecken graubraun mit schmalen, weißlichen Schaftstrichen; Kinn, Kehle weißlich, jederseits durch graubraunen Strich begrenzt; Faden an Kopf und Hals mit schwarzbraunem Schaftstrich; Brust, Seiten graubraun rostfarben verwaschen, Flanken olivbraun; übrige Unterseite weiß.

(Fortsetzung folgt.)

Einiges über den Kleiber oder die Spechtmeise (Sitta europaea europaea *Linné*).

Von Wilhelm Schreitmüller, Frankfurt a. M.

(Nachdruck verboten.)

In meinem Leben habe ich schon die verschiedensten Vögel gepflegt und beobachtet, auch solche, welche für viele Liebhaber wenig oder gar kein Interesse wachzurufen vermochten. Unscheinbar gefärbte, nicht oder nur wenig und primitiv singende Tiere, wie: Haus- und Feldsperling, grauer Fliegenschnäpper, Haubenlerche, Ziegenmelker, Pieper, Stein- und Waldkauz, Hohl- und Ringeltaube, Krähen und Dohle habe ich im Laufe der Jahre schon beherbergt und doch auch an diesen Vögeln meine Freude gehabt. Auch solche Tiere bieten dem wahren Naturfreund und Vogelliebhaber eine Unmenge des Interessanten und Beobachtenswerten.

Im folgenden möchte ich auf einen einheimischen Vogel hinweisen, welcher wohl ganz ansprechend gefärbt, der aber vielfach wegen seiner etwas lärmenden Lebensweise nicht besonders beliebt ist. Ich meine den hübschen, munteren Kleiber, auch Spechtmeise (Sitta europaea europaea *L.*) (s. Abbildung S. 75) genannt, diesen unermüdlichen Kobold unserer Wälder und Anlagen, der ohne Unterlaß, ständig tätig, ruckweise an den Baumstämmen emporrutschend, auf und ab läuft, woselbst er die zwischen den Rindenritzen, in den Astlöchern und Zweiggabeln usw. sitzenden Puppen, Raupen, Ohrwürmer, Spinnen und Insekten nebst deren Eier absucht und verzehrt. Hierbei läßt er von Zeit zu Zeit sein scharfklingendes, durchdringendes zit-zit-zit ertönen.

In mit Sonnenblumenkernen, Hanf, Speck und Kürbiskernen beköderten Meisenkästen, Schlagbauern und mit dem Schlaggarn ist der Kleiber im Herbst und Winter sehr leicht zu fangen, ja man braucht hierzu nicht einmal einen Lockvogel. Seine Eingewöhnung im Käfig ist jedoch nicht ganz so einfach, wie diejenige vieler Meisen, besonders dann nicht, wenn diese nicht richtig erfolgt.

Der Kleiber ist gewöhnt, seine Nahrung zwischen Rindenritzen, Astgabeln u. dgl. festzuklemmen, worauf er sie vermittels seines langen, spitzen Schnabels bearbeitet, zerkleinert und frißt. Danach hat man sich auch bei der Einrichtung seines Käfigs zu richten. Dieser ist also dementsprechend auszustatten und innen an der Hinterwand und möglichst auch an den Seitenwänden mit Baumrinde (möglichst rissige wie: Kiefer, Eiche u. dgl.) völlig zu verkleiden, ferner sind kräftige, nicht zu schwache Kletteräste (5—6 cm im Durchm.), welche regellos angeordnet werden können, anzubringen. Am besten gewöhnt man frischgefangene Kleiber mit Bucheckern, Kürbis- und Sonnenblumenkernen, Hanfsamen und Mehlwürmern ein. Er trägt die Kerne nach oben und steckt sie hierauf fest in einen Rindenspalt oder dgl., um sie hier vermittels seines spitzen Schnabels durch Aufschlagen auf die Fruchtnaht zu öffnen, was ihm ein unbedingtes Bedürfnis ist, da er nicht, wie die Meisen, imstande ist, das Futter zwischen die Zehen zu nehmen, um es hierauf zu bearbeiten. Übersieht oder unterläßt man bei Einrichtung des Kleiberkäfigs Baumrinde mit einzubringen, so kann es vorkommen, daß ein frischgefangener Kleiber — trotzdem sich Futter reichlich im Käfig vorfindet — einfach verhungert, weil er keine Gelegenheit hat, die Nahrung irgendwo festzuklemmen und aufzuhacken.

Der Käfig für den Kleiber soll nicht zu klein und eher höher als lang sein, da der Vogel andauernd klettert. Ich habe im Jahre 1903 in München vier Kleiber in einem größeren Bauer von 150 × 100 × 60 cm Größe gehalten, worin den Tieren genügend Bewegungsfreiheit geboten war. In solchen Behältern ist es auch möglich, die Eigenart und Bewegungen der Vögel genau zu studieren.

Es ist ferner nötig, daß man stets einige Nistkästen in den betr. Käfig aufhängt, worin die Kleiber ihre Nachtruhe verbringen. Wenn die Sitta solche

nicht vorfindet und sich des Nachts nicht verkriechen kann, merkt man den Tieren ständig an, daß ihnen etwas fehlt und sie sich nicht wohlfühlen. Sie kriechen dann abends meist in die Käfigecken (am Boden) oder zwängen sich zwischen die Zweiggabeln, wo sie sich sichtlich mit Widerwillen niederlassen.

Während der ersten Zeit ihrer Gefangenschaft sind die Kleiber ziemlich scheu und ängstlich. Sie halten sich meistens umherkletternd an der Decke des Käfigs oder an den höchsten Punkten der Kletteräste auf, hierbei ständig das Gitter mit dem Schnabel bearbeitend, so daß es meist verletzte Schnabelwurzeln und bestoßene Köpfe gibt. Es ist aus diesem Grunde angebracht, frischgefangene Kleiber nicht sofort in einen großen Käfig zu bringen, vielmehr lasse man die Vögel in einem kleineren Käfig, welcher verhängt werden muß, sich erst einige Zeitlang eingewöhnen.

Betreffs der Nahrung ist der Kleiber nicht wählerisch. Während des Winters fütterte ich meine Tiere vorwiegend mit Kürbis- und Sonnenblumenkernen, Hanfsamen, Bucheckern, Nüssen, Eicheln, Linden- u. a. Baumsamen. Hierzu bekamen sie etwas Weichfresserfutter und erhielten ab und zu rohes Fleisch, Speck, Talg und täglich 6—8 Mehlwürmer pro Kopf. Auch gekochten Reis nehmen sie ganz gerne an. — Während des Sommers benötigt dieser Vogel — ebenso wie die Meisen — reichlich Insektennahrung, wie frische Ameisenpuppen, glatte Raupen, Spinnen, Schaben, Fliegen, Käfer u. dgl. Tiere. Erhält er solche nicht, so verblaßt die schöne rostrote Farbe seines Bauches nach der Mauser sehr und erscheint dann hellgelblichbraun. Weichfutter und Insektennahrung sind also für diese Art unbedingt vonnöten. Auch verschiedene Beeren und Früchte verschmäht der Kleiber nicht.



Kleiber.

Schon öfter habe ich gehört und gelesen, „daß der Kleiber (im Freien) die von ihm irgendwo versteckte Nahrung sehr oft nicht wieder aufzufinden imstande sei, und daß der Ortssinn dieses Vogels anscheinend nicht besonders stark ausgeprägt zu sein scheint." — Ich kann mich dieser Ansicht nicht anschließen, und zwar deshalb nicht, weil folgende Beobachtungen das gerade Gegenteil zu beweisen scheinen. — (Ich will hier noch einschalten, daß es auch gar nicht schlimm ist, wenn ein Kleiber wirklich einmal die von ihm versteckten Körner nicht wiederfindet, letztere findet eben dann ein anderer Vogel derselben Art beim Ab- und Auflaufen der Bäume. Die Sache beruht also sozusagen „auf Gegenseitigkeit", denn die überall aufgespeicherten Nahrungsmittel sind ja in den Wäldern, in welchen Kleiber auftreten, sozusagen gleichmäßig verteilt, sie gehen also den Kleibern nicht verloren, ganz gleich, ob ein Vogel die von ihm selbst versteckten Sachen oder die eines anderen findet. Hierdurch wird auch hier wieder ein Ausgleich geschaffen, wie so oft in der Natur.)

Im Herbst 1901 fanden sich an meiner Futterstelle auf dem Balkon neben anderen Vögeln auch vier Kleiber ein, welche bis zum Frühjahr 1902 täglich erschienen. An der Hauswand hatte ich oberhalb der Balkontür zwei Brutkästen angebracht (im Frühjahr), in welchen während des Sommers zwei Starenpaare genistet hatten. Diese beiden Kästen wurden im Herbst von den beiden Kleiberpaaren bezogen und zur Nacht als Schlafraum benutzt. Beide Paare trugen während des Herbstes größere Mengen Bucheckern, Nüsse, Eicheln u. dgl. in die Kästen, so daß diese etwa 10 cm hoch damit angefüllt waren. Nebenbei beobachtete ich aber auch, daß die Kleiber allerlei Genießbares zwischen den Rindenritzen einiger hoher Fichten, welche bis über meinen Balkon hinaufreichten, klemmten, wobei jedes Paar bestimmte Bäume benutzte. Ich sah ferner, daß die Vögel Körner u. a. auch unter die Dachziegel eines Stalles versteckten. Selbst an unserer Hauswand (Rückseite des Hauses) klemmten sie allerlei Genießbares zwischen die aus dem aufgeworfenen Mörtelbelag hervorstehenden Steine, in Ritzen und und Löcher. Streute ich nun während des Winters absichtlich einige Tage lang kein Futter aus, so fanden die vier Vögel mit tötlicher Sicherheit die von ihnen an obengenannten Orten versteckten Sachen, die sie dann meist auf die Starkästen schleppten und hier zwischen Hauswand und Kasten klemmten, worauf sie die Kerne mit dem Schnabel bearbeiteten und öffneten. Ich habe mich oftmals über diese originellen Tiere gefreut, wenn sie die Baumstämme bald aufwärts, bald mit nach unten gerichteten Köpfen abwärts liefen, wobei sie ständig ihr durchdringendes „zit-zit-zit" erschallen ließen.

Gelegentlich stritten die Vögel auch miteinander, wobei sie ein zeterndes Geschrei ausstießen und sich die Nahrung streitig zu machen suchten. Ich habe die vier munteren Gesellen seinerzeit den ganzen Winter 1901/02 hindurch beobachtet. Die Tiere wurden mit der Zeit ganz zahm und kamen sofort

herbeigeflogen, wenn ich auf den Balkon kam und das Futter brachte. Sie saßen dann meist unweit von mir entfernt auf dem Geländer oder auf den Starkästen, wobei sie unaufhörlich ihr scharfes „zit-zit-zit" erschallen ließen. Dies ging bis Anfang März so fort, worauf sie eines Tages nicht mehr erschienen; sie waren in den nahen Wald abgezogen. Im Herbst 1902, mit Anfang der ersten Frosttage, erschienen aber auch sie wieder bei mir und bezogen ihre Starkästen, nachdem sie vorher zwei Sperlingspaare daraus vertrieben hatten. Zu gleicher Zeit mit diesen vier Kleibern erschien damals noch ein drittes Paar, welches, wie ich beobachtete, des Abends regelmäßig den Dachboden eines Stalles aufsuchte, wo es übernachtete.

Sämtliche drei Paare verbrachten den Winter 1902/03 ebenfalls wieder in meiner Nähe. Bei

dem dritten Paar handelte es sich um Jungvögel des vorhergehenden Sommers, sie waren wohl den alten Vögeln gefolgt. (?) Dieselben vier alten Vögel erschienen auch während des Winters 1903/04 wieder, während das dritte (junge) Paar dann ausblieb. — Ich glaube annehmen zu dürfen, daß durch erwähnte Fälle zur Genüge bewiesen ist, daß der Ortssinn des Kleibers doch ausgeprägter ist, als vielfach angenommen wird, sonst hätten sich wohl die beiden erwähnten Paare nicht während mehrerer Winter immer wieder an derselben Stelle eingefunden.

Die Vögel wurden mit der Zeit ganz zutraulich, so daß sie durch das offene Küchenfenster hereinkamen und sich allerlei Genießbares vom Küchentisch wegholten. Es genierte sie absolut nicht, wenn jemand in der Küche anwesend war, man durfte sich ihnen nur nicht nähern.

Im Zimmer gehalten wird der Kleiber mit der Zeit ebenso zahm wie Meisen u. a. Vögel; er kommt sofort herbei, wenn man den ihm bekannten Mehlwurmtopf hervorholt. Ich habe in späteren Jahren noch öfter Kleiber gehalten, und zwar teils freifliegend im Zimmer, teils gekäfigt, und habe ständig meine Freude an den intelligenten Vögeln gehabt.

Im Käfig gehalten hat der Kleiber jedoch etwas Unangenehmes an sich, das ewige Klopfen und Hämmern mit dem Schnabel und das ständige Auf- und Abwärtsklettern am Gitter, an der Decke und an den Wänden des Käfigs kann einem manchmal lästig werden; für empfindliche oder nervöse Liebhaber ist der Kleiber infolgedessen kein geeigneter Vogel.

Ich möchte noch bemerken, daß im Freien wohl viele Kleiber eines unnatürlichen Todes sterben. Diese Vögel haben ebenso wie Baumläufer, Zaunkönige, viele Meisen u. a. die Gewohnheit, in jede Ritze, Spalte, in jedes Loch oder dgl. zu kriechen, um daselbst nach Insekten usw. zu suchen. Hierbei kommt es vor, daß die Vögel den Ausgang nicht mehr finden und dann elend umkommen müssen. So fand ich z. B. einmal in Frankfurt a. M. einen verhungerten Kleiber zwischen dem Fenster und dem davor angebrachten Schutzgitter eines Kellers vor. Der Vogel war durch ein kleines Loch im Gitter dahin gelangt, fand den Ausweg nicht mehr und kam um. Einen anderen Kleiber fand ich 1889 zu Schloß Belvedere bei Weimar zwischen den doppelten Glaswänden eines Gewächshauses, ebenfalls verhungert, vor. Ebenda fand ich einen toten Vogel dieser Art in dem leerstehenden Eckpavillon eines Winterhauses, in welches das Tier durch eine defekte Scheibe gelangt war und umkam.

Auf ähnliche Weise fand ich in Frankreich (zu La Fère) einen Zaunkönig, der in eine Rattenfalle gekrochen war, den Ausweg nicht mehr fand und verhungern mußte. Auf diese und ähnliche Art mögen wohl viele dieser nützlichen Vögel jährlich ihr Leben einbüßen.

Mit anderen Vögeln zusammen gehalten, habe ich bisher noch nie beobachtet, daß der Kleiber solchen gefährlich wurde. Ich hielt ihn zusammen mit Meisen, Finken, Grünlingen, Hänflingen, Stieglitzen, Zeisigen u. a., doch hat er sich mit diesen stets gut vertragen und ich habe Beißereien oder gar Todesfälle, die er verursacht hätte, nie beobachtet, obwohl er sich von anderen Vögeln nichts gefallen läßt! Ausnahmen kommen jedoch vor*).

Mir war dieser Vogel stets ein lieber und interessanter Bursche, der es verdient, gepflegt und beobachtet zu werden; ich kann das Tier allen Liebhabern nur bestens empfehlen.

Ein eigenartiges Trio.

Von Helmut Hampe.

(Nachdruck verboten.)

Wintersüber pflege ich häufig 1, 2 oder auch 3 besonders zahme Vögel aus der Vogelstube, in der das Gros meines Vogelbestandes untergebracht ist, in das Wohnzimmer, worin wir uns dann hauptsächlich aufhalten, da die Vogelstube ihrer Größe und vielen Fenster wegen schlecht heizbar ist, mit herüberzunehmen. In diesem Jahre hatte ich dazu 3 aufgepäppelte, zahme Vögel ausersehen, und zwar

*) In engen Käfigen kann er aber anderen, kleinen Vögeln gefährlich werden. Der Verf.

ein Nachtigallmännchen, ein Wellensittichweibchen und einen männlichen — Sperling, einen richtigen, ganz gewöhnlichen Spatz.

Diesen hatten wir im Laufe des Sommers in unserem Garten gefangen. Er mochte vielleicht seit 2—3 Tagen das Nest verlassen haben, konnte jedoch noch nicht fliegen und war sehr heruntergekommen. Einige Tage gestopft, begann er zu sperren und ließ sich noch längere Zeit päppeln. Als Päppelfutter bekam er hauptsächlich frische Ameiseneier, Mehlwürmer, auch Eifutter und Hirsebrei. Später gewöhnten wir ihn dann an Glanz als Hauptfutter, wobei er sich sehr gut hält. Lange Zeit vermochte er nicht richtig zu fliegen; erst nach der Mauser und nachdem ihm die z. T. beschädigten Schwungfedern gezogen waren, lernte er es und entwickelte sich mit einem Schlage ganz prächtig, besonders als er, der bis dahin nur Sandbäder genommen hatte, auch im Wasser zu baden begann. Seitdem präsentiert er sich in wirklich tadellosem Gefieder; er ist überhaupt ein hübscher Vogel, der einen Vergleich mit Zeisigen oder Hänflingen keinesfalls zu scheuen braucht. Davon abgesehen, ist er auch bedeutend intelligenter als diese. Fremde Personen kennt er sofort und zeigt sich ihnen gegenüber sehr zurückhaltend, ja direkt scheu. Ebenso will er von mir nichts wissen, da ich ihn öfters geärgert habe. Hingegen liebt er meine Frau innig, was übrigens auf Gegenseitigkeit beruht. Sie hat sich immer viel mit ihm beschäftigt, freundlich mit ihm geredet und ihm manchen Leckerbissen zugesteckt. Das weiß das Tier ganz genau und vergilt es ihr durch große Anhänglichkeit. Sowie wir uns zum Essen setzen, beginnt er in seinem Käfig zu toben und beruhigt sich erst dann, wenn die Tür geöffnet wird. Dann kommt er augenblicklich heraus, setzt sich auf ihre Schulter, um ihr die besten Happen aus dem Munde zu nehmen. Aber auch sonst läßt er sich dort nieder und bleibt gern längere Zeit sitzen. Er kommt also nicht etwa nur des Fressens wegen, wie das z. B. die Nachtigall tut, er ist vielmehr als ausgesprochen anhänglich zu bezeichnen. Sehr angenehm ist, daß er stets auf Ruf antwortet und auch tatsächlich herbeikommt, auch wenn er sich, wie er besonders des Abends gern zu tun pflegt, in irgend einer Ecke, hinter ein Buch, einen Kasten oder dgl. versteckt hat. Man kann ihm dann allerdings anmerken, daß er diesen Versteck höchst ungern verläßt. Nichtsdestoweniger läßt er sich schließlich doch herbei, dem Rufe Folge zu leisten. So macht er uns viel Freude, wenn er auch nur ein verachteter Spatz ist und sein „Gesang", offen gesagt, gegen den der Nachtigall nicht aufzukommen vermag.

Diese Nachtigall, ein großes, schönes Exemplar und gut im Gefieder, ist als ungeselliger Vogel natürlich nicht anhänglich. Sie kommt nur zu uns, wenn sie hungrig ist. Man kann eben von einem Vogel nur das verlangen, was seiner Natur angemessen ist, wenn auch unter Umständen bis zu einem gewissen Grade durch Dressur gegen die natürliche Veranlagung gehende Kunststücke sich erzielen lassen. Ob das allerdings schön ist, ist eine andere Frage. Ich für meinen Teil lege auf solche Mätzchen keinerlei Wert. So verlange ich auch von meiner Nachtigall nur, daß sie so zahm ist, wie eine Nachtigall eben überhaupt werden kann. Und das ist sie. Sie kommt vor und zeigt nicht die geringste Scheu, frißt natürlich anstandslos aus der Hand, läßt sich sogar gelegentlich anfassen, was doch ein jeglicher Vogel sich nur höchst ungern gefallen läßt. Schon im Oktober brachte sie ab und zu laute Strophen und jetzt singt sie schon ziemlich häufig und nicht schlecht, wenn auch als aufgepäppeltes Tier ohne artgleiche Vorsänger keinesfalls besonders gut. Als Erdsänger hält sie sich viel auf dem Fußboden auf. Man muß dann sehr aufpassen, sie nicht zu treten; denn ein Ausweichen hält sie nicht für erforderlich. Sie hat eine besondere Vorliebe für Butter. Kaum ist der Tisch gedeckt, so kommt sie herbei, hüpft zwischen den Tellern hindurch, immer ihre eigentümlichen

Bergrötel (s. S. 49).

Wippbewegungen vollführend, auf die Butter los, um sich ausgiebig daran gütlich zu tun.

Wie das Sperlingsmännchen mit meiner Frau Freundschaft geschlossen hat, hält sich das Wellensittichweibchen mehr an mich. Ob das nun mit der bekannten Überkreuzregel, nach dem männliche Tiere sich gern an Frauen anschließen und umgekehrt, zusammenhängt, wage ich nicht zu behaupten. Die Erklärung dafür scheint sich nur einfach daraus zu ergeben, daß, wie schon erwähnt, sich meine Frau viel mit dem Spatze beschäftigt hat, während ich umgekehrt mich mehr mit dem Sittich abgegeben habe und daß sich so eben die Tiere in der beschriebenen Weise an uns gewöhnt haben. Immerhin ist ja nicht ausgeschlossen, daß besagtes Gesetz wenigstens hierin mit hineinspielt.

Der Sittich wurde öfters mit dem Spatzen längere Zeit in gleichem Käfig gehalten. Darum gewöhnte er sich ziemlich an diesen, lief ihm überall nach

Stelzenhäherling (s. S. 49).

und suchte ihn zu kraulen und zu liebkosen, was dieser jedoch in Verkennung der guten Absicht mit Schnabelhieben zu beantworten pflegte. Im übrigen war er ein ziemlicher Tyrann, der keinen andern Vogel in seiner Nähe duldete; er scheute sich auch nicht, bedeutend größere Vögel anzugreifen und zu vertreiben. So brachte ich einmal einen Kaktussittich, der ihn mit seinem großen Schnabel doch mit Leichtigkeit hätte töten können, zu ihm. Erst ging er wohl etwas vorsichtig um diesen herum, doch schon nach etwa einer halben Stunde nahm er ihm das Futter vor dem Schnabel weg und scheut sich nicht, sogar nach ihm zu beißen. Nur einmal geriet er in Angst, als ich mal einen Sperber in dem Zimmer fliegen ließ. Noch nach einigen Stunden hatte er danach eine ganz eigene Starrheit an sich. Vor Menschen, auch vor fremden, zeigte er nie die geringste Scheu; wir konnten ihn in die Tasche stecken, mit ins Bette nehmen und ihn jederzeit anfassen. Hielt man ihm den Finger hin, so stieg er stets sofort darauf und ließ sich so durch die ganze Wohnung tragen, ohne daß er daran dachte, fortzufliegen. Nur wenn man mit ihm in die Vogelstube ging, flog er sofort ab und ließ sich auf den Flugkäfigen häuslich nieder. Es mußte ihm dort wohl ganz ausnehmend gut gefallen. Denn er wollte absolut nicht wieder daraus fort; ihn zu fangen, gelang dort nur nach längerem Jagen und unter Zuhilfenahme des Netzes. Ähnlich verhielten sich übrigens auch andere zahme Sittiche, deren ich in diesem Sommer ein volles Dutzend aufgepäppelt hatte. Von allen diesen war der in Rede stehende wohl der drolligste; wenn er rannte, so hüpfte er mitunter dabei wie eine Tänzerin und überschlug sich fast vor Eile. Gab man ihm ein Geldstück, einen Fingerhut oder dgl., so trug er dies regelmäßig unter merkwürdigen Kapriolen auf den Tisch umher und warf es schließlich auf den Fußboden, um dann stolz und zufrieden hinterherzusehen. Eine andere Marotte von ihm war, alles mögliche anzunagen. So hat er am Fenster ein gut 20 □cm großes Stück der Tapete völlig abgefressen; kommt abends das Brot auf den Tisch, so hat er nichts eiligeres zu tun, als sofort daran herumzuknabbern, ohne aber davon zu fressen. Ebenso macht er es mit Obst und anderen Dingen. Sein Nachahmungstrieb, bzw. seine Neugierde ist bedeutend. Sieht er einen der andern Vögel irgendwomit beschäftigt, sofort geht er hin und macht das nach, wobei er meist die andern Vögel zu verjagen pflegt. Besonders komisch wirkt es, wenn die 3 Vögel baden. Die Nachtigall und der Spatz setzen sich mitten ins Wasser und plantschen gewaltig. Unser Sittich jedoch zieht es vor, sich auf den Rand der Schale zu setzen und sich von den andern naßspritzen zu lassen. Dabei macht er aber dauernd die typischen Badebewegungen, was geradezu lächerlich aussieht.

Aber auch von Eifersucht war er nicht verschont; nahm ich einen anderen zahmen Sittich in die Hand und kraulte ihn, so kam er sofort herbei, schlich sich vorsichtig mit der unschuldigsten Miene von der Welt näher, betrachtete dann seinen Nebenbuhler eine Zeitlang mit boshaften Blicken, um plötzlich dem Ahnungslosen einen tüchtigen Schnabelhieb zu versetzen. Der wußte dann später schon Bescheid

und räumte schimpfend das Feld, sowie der andere in seine Nähe kam.

So haben uns diese drei so verschiedenen Vögel, die hochbeinige, elegante Nachtigall, der behäbige Spatz und der nervöse, niedliche Sittich, manche frohe Stunde bereitet. Sie haben, sage ich; denn der Clou des Ganzen, der Sittich, ist, als er eines Tages wieder in die so sehr geliebte Vogelstube entwichen war, nachdem er bis dahin immer kerngesund gewesen war, unter den Erscheinungen einer schweren Vergiftung erkrankt und elend zugrunde gegangen. Sic transit gloria mundi!

Über Brutwilligkeit bei Sittichen.

Von Norbert Grasl, A. Z. 41.

(Nachdruck verboten.)

Wie oft hört oder liest man, daß ein Vogelpärchen, trotzdem der Pfleger es an nichts fehlen läßt, nicht zur Fortpflanzung schreiten will. Das Pärchen ist gesund, in tadelloser Verfassung, im Käfig oder Flugraum sind alle nur denkbaren Vorkehrungen getroffen und trotzdem wollen die Vögel nicht brüten.

Vielleicht wird aber ein Moment doch zu wenig beachtet, daß nach meinen Beobachtungen häufig Brutwilligkeit herbeiführt und das im nachstehenden näher erörtert werden soll, da besonders bei seltenen, oder bisher noch nicht gezüchteten Tieren, kein Mittel unversucht bleiben soll, daß eine erfolgreiche Züchtung fördern könnte.

Wohl jeder Aufsatz über die Züchtung von Wellensittichen enthält die Bemerkung, daß die gegenseitige Eifersucht die Tiere zum Brüten anregt, und daß es deshalb bei Züchtungsversuchen vorteilhaft ist, gleich zwei oder mehrere Pärchen in den Züchtungskäfig unterzubringen. Das ist nicht nur für Wellensittiche zweifellos richtig, sondern gilt sicher auch für viele andere Vögel.

Als ich nach dem Kriege infolge der furchtbar schlechten Verhältnisse fast ein volles Jahr lang keine Vögel halten konnte und mich schließlich doch wieder dazu entschloß, waren es für den Anfang zwei Pärchen schöner grüner Wellensittiche, die als erste gegen Ende Juni ein geräumiges Gartenflughaus bezogen.

Morgensonne, frisches Grün, verschiedene, oft erprobte Nistgelegenheiten, alles war vorhanden, aber die beiden Paare dachten nicht ans Brüten. Nachdem ich doch durch Jahre hindurch mit der Züchtung dieser Vogelart, als auch mit Nymphensittich und Rußköpfchen, die besten Erfolge erzielt hatte, hätte ich es glatt für unmöglich gehalten, daß es mir trotz langjähriger Erfahrung und Praxis nicht gelingen sollte, die Wellensittiche zur Fortpflanzung zu bringen.

Nun ging der Herbst bereits ins Land, als mir ein befreundeter Liebhaber von einem seiner Wellensittiche erzählte, der, ein Weibchen, zwar sehr brutlustig sei, jedoch wurden die Eier von dem Tier stets aufgefressen. Ich ersuchte nun den Besitzer, mir dieses brutlustige Weibchen, daß er abstoßen wollte, für einige Zeit in Pflege zu geben. Tags darauf hielt der Vogel bei meinen 4 Grünen seinen Einzug. Das neue Weibchen machte sich auch alsbald an den Nistkästen zu schaffen und meine Sittiche waren mit einem Schlage wie ausgewechselt. Binnen 8 Tagen waren bei jedem Weibchen Eier vorhanden. Die Animierdame, die auch mir sich als Eierfresserin bestätigte, wurde schleunigst entfernt, und im November flogen 11 Stück junge Wellensittiche in der Voliere. —

Daß ein Pärchen Rußköpfchen, die ersten, die ich hatte, 8 Tage, nachdem ich sie gekauft hatte, bereits brüteten, schreibe ich hauptsächlich dem Umstande zu, daß im selben Flughaus Wellensittiche brüteten.

Ein im abgelaufenen Jahre von der Menagerie Schönbrunn im Tauschweg erworbenes Nymphensittichweibchen, das in der Menagerie jahrelang gelebt hatte, ohne zu brüten, hatte bei mir in unglaublich kurzer Zeit 15 Eier gelegt, die mit großer Hingebung, allerdings ohne Erfolg, bebrütet wurden. Im benachbarten Flugraum atzten ein anderes Nymphenpaar nicht nur ganz kleine, eben dem Ei entschlüpfte Junge, sondern auch noch die bereits 10 Wochen älteren, längst flüggen Jungen der ersten Brut. Im übrigen hatte ich auch schon vor Jahren bei Nymphensittichen die Wahrnehmung gemacht, daß ein neuerworbenes Paar schon am dritten Tage nach der Ankunft sich zu begatten versuchte. Die Vögel konnten aber in nächster Nähe brütende Artgenossen beobachten.

Mein Weibchen tarentinischer Bergpapagei ist jetzt besonders erregt, seit im benachbarten Käfig die blauen Wellensittiche wieder Anstalten zum Brüten machen. Von einem befreundeten Liebhaber wird mir ebenfalls versichert, daß ein Pärchen Tarentiner, die sonst ziemlich scheu sind, immer sehr interessiert aus ihrem Nistkasten herauskommen, wenn die in dem oberhalb ihres Käfigs untergebrachten noch ganz jungen Wellensittiche piepsen.

Kleine Mitteilungen.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Ursachen der Abnahme unserer Vogelwelt. Alljährlich, wenn der Sommer zur Neige geht, vollzieht sich in den Lüften ein großartiges Naturschauspiel, der Vogelzug, die Reise unsrer Zugvögel nach dem Süden. Schon lange zuvor sind die Tiere von einer stetig steigenden Unruhe ergriffen, die Flüge werden täglich größer und größer, bis wir eines Tages alle vermissen. Wohl mag vielen nicht bekannt sein, was für Gefahren sie unterwegs ausgesetzt sind. Nicht erst bei den Südländern, sondern schon bei uns müssen manche ihr Leben lassen. In dem Dunkel der Nacht streben die Tiere dem fernen Ziele zu. Viele prallen an die Drähte der Überlandzentralen und finden so ein jähes Ende. So fand man während des diesjährigen Herbstvogelzuges in einigen Tagen auf dem Wege von Jüdenhain bis Skt. Micheln etwa 70 tote Vögel unter der Leitung der Überlandzentrale liegend. Darunter waren vertreten: Singdrosseln, Stare, Lerchen, Rotkehlchen, Rotdrosseln. Weitere gefahrvolle Hindernisse finden wir in den Telegraphenleitungen, sowie in den des Nachts dahinbrausenden Schnellzügen. Die Vögel zu erhalten, sollte die Aufgabe aller sein. Und was erfordert bei sachgemäßer Ausführung die Pflege unserer Lieblinge für Opfer im Gegensatz zur modernen Kultur, Feld- und Forstwirtschaft? Nur allein „Liebe und Aufmerksamkeit". — Vor dem Kriege hatte der Zoologische Verein zu Zwickau während der kalten Jahreszeit zahlreiche Futterstellen unterhalten, die jedoch leider infolge des wirtschaftlichen Niederganges eingegangen waren. Diese sollen nunmehr wieder eingerichtet werden, um den Vögeln das Überstehen des Winters zu erleichtern. — Der Verein veranstaltet im nächsten Jahre eine Aus-

stellung, worauf schon jetzt hingewiesen sei. Die Versammlungen finden jeden Freitag nach dem 1. und 15. im Monat im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof, statt. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Auskunft erteilt jederzeit gern der 1. Vorsitzende Paul Schmidt, hier, Bosenstr. 44.

Zool. Verein zu Zwickau i. S.
J. A.: W. Fritzsche, Schriftführer.

Bücher und Zeitschriften.

Fritz Braun, **Die wissenschaftlichen Grundlagen der Vogelhaltung.** Sammlung Bornträger Bd. 5. Berlin 1924. 156 S. Oktav-Format. Pappband M. 4.20.

Das Buch wendet sich, wie der Verfasser sagt, an alle die, „bei denen die Liebe zu den Gefiederten einen unverkierbaren Teil des Wesens ausmacht, die Vogelliebhaber waren, sind und immer sein werden und sich deshalb stets mit gefiederten Pfleglingen abgeben müssen." Für solche soll „dies Buch ein wirkliches „Handbuch" werden, ein Werkchen, zu dem sie immer wieder greifen, um die darin ausgesprochenen Ansichten zu überdenken, anzunehmen oder auch — abzulehnen."

Professor Fritz Braun ist den Lesern der „Gef. Welt" kein Fremder. „Seit einem Menschenalter hindurch eine schier märchenhafte Anzahl von Stubenvögeln verpflegend", hat er seine Erfahrungen in so manchen Aufsatz niedergelegt, wissend, „daß die Vogelliebhaber in der Regel einen fast unersättlichen Hunger nach Fachliteratur zeigen".

Ich kenne selbst einen großen Teil der „Vogelbücher" die im Handel sind. Noch keins hat mich so gefesselt, wie dieser schmucke Band. Die Erfahrungen, die Mißerfolge, die man wohl selbst auch so erlebt, wie man es anfangen, was man lassen soll; das ist mit so wohltuender Frische und Anschaulichkeit geschrieben, daß es den meisten Lesern so gehen wird wie mir: ich habe die halbe Nacht hindurch im „Braun" gelesen. Dabei bin ich über die besten Kapitel „Vom Eingewöhnen der Vögel — Von den Käfigen der Stubenvögel — Die Zähmung der Stubenvögel" noch gar nicht viel hinaus. Was Professor Braun über den „Gesang der Vögel — Vom Sprechenlernen der Papageien — Über die Zucht der Stubenvögel — Beobachtungen an Kanarienbastarden — Die Krankheiten der Vögel" sagt, enthält so viel Wissenswertes, daß dazu ein förmliches Studium gehört. — Wir Vogelfreunde können herzlich dankbar sein für dies Buch, das so recht zum eignen Nachdenken anregt.

A. Troschütz.

Ornithologische Monatsschrift; herausgegeben vom Deutschen Vereine zum Schutze der Vogelwelt e. V., Schriftleitung Prof. Dr. Carl R. Hennecke in Gera (Reuß). 50. Jahrgang, Nr. 1. Die nun fünfzig Jahre bestehende Zeitschrift bietet in dem ersten Hefte eine Reihe interessanter Abhandlungen: Über die Ausbreitung einiger Vogelarten bei und in der Stadt Braunschweig. — Beobachtung einer geschlechtlichen Entartung beim Haussperling. — Der Alpenflüevogel in Bad Harzburg? von A. Sievers in Braunschweig. Die Flugbildsilhouetten der Vögel von F. Seidenstücker. — Geier und Adler in der Bibel von Landgerichtsdirektor Reinberger. — Die „Spalthöhle", eine neue, vielversprechende Abart der Halbhöhle, sowie Bestätigung des Wasserstarnestes in der Nisthöhle von B. Quantz. — Mein Star von Kurt W. Schmidt in Gera (Reuß) — Von Borkums Vogelwelt von Dr. F. Sehlbach. — Der Kranichtanz von Bengt Berg. — Kleinere Mitteilungen. — Bücherbesprechungen.

Reichsverband d. Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Tauschvermittlung T.-V.: Richard Borwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39; Kassierer Werner Geßler, Leipzig, Dresdner Str. 2.

Alle angeschlossenen Vereine und Einzelmitglieder bitten wir, sich zu dem zur Kenntnis gebrachten Vorschlag auf Beschaffung eines Verbandsabzeichens recht bald zu äußern, soweit es noch nicht geschehen ist.

J. A.: Petters, Schriftführer.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf dem Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Braune, Hude (Oldenburg). Distelfink×Kanarie.

J. Götz, Südd. Vogelexporthaus, Neu-Ulm, (Bayern). Schamadrosseln, Männchen u. Weibchen, Dayaldrosseln, Männchen u. Zuchtweibchen. Damadrosseln, Caprötel, Klarinos, Silberrohrsonnenvögel, blaue Fliegenschnäpper, braunbrüstige Blauschnäpper, Braunscheitel-, braunköpfige Goldaugen- und Zwergtimalien, siebenfarbige Tangaren, Zuckervögel, Gangesbrillenvögel, Wagler's Trupial, Spiegeltrupial, Prachtglanzstare, afrikan. Glanzstare, langschwänzige Glanzstare, Soldatenstare, feuerrote Kardinäle, Männchen u. Zuchtweibchen, Dominikanerkardinäle, Weißkopfviehweber, blaue mexikan. Kernbeißer, Peru-Grünhäher, schwarzkäppige Blaubäher, Guatemala-, Blumenau-, Kaktus-, Pflaumkopfsittiche, tarant. Zwergpapageien, Timneh-Graupapageien, Müller's Edelpapageien, Liebes-, Halsband-, Bronzefleck-, Palm-, Kaptäubchen, Glanzkäfertauben, Orangeblaufinken, kleine u. große Kubafinken, Schmuckpfäffchen, Jakarinifinken, dottergelbe Weber, Gilbweber, Gelbkehl-, Swainsonsperlinge, brasil. Kurzschnabelgirlitze, Zwergmaskenweber, Weißwangenlerchen, Zitronenzeisige.

Gustav Reiß, Zoologische Großhandlung, Berlin C 25, Gontardstraße 4, Gegr. 1876. Pflaumkopfsittiche, Kaktus-, Mönchssittiche, tarant. Inseparables, dreifarb. Glanzstare, Glanzstare, Schamadrosseln, -Weibchen, Dayaldrosseln, Dominikaner Kardinäle, Rotkopfamadinen, Goldbrüstchen aus Südafrika.

Paul Tzornack, Tierhandlung, Berlin, Prenzlauer Allee 189, Tel. Humboldt 2063, gegründet 1905. Schamadrosseln, -Weibchen, rote Kardinäle, Dominikaner, Weißbauch-Papageien, Kaptäubchen, Stahlfleckentäubchen, kleine Kubafinken, Isabellkanarien, Silberohrsonnenvögel.

Max Wischendorff, Lübeck, Hüxstr. 89 2,0 Isabell-Kanarien, 2,0 Stieglitzbastarde, 1,0 Hänflingsbastard.



Herrn A. T., Hannover; Herrn A. L., Pfarrkirchen; Herrn W. Sch., Frankfurt a. M.; Herrn J. K., Berlin; Herrn Dr. R. D., Helgoland; Herrn A. L., Pfarrkirchen; Herrn E. K., Berlin; Herrn F. F., Saarbücken: Beiträge dankend erhalten.

Herrn A. T., Hannover. Es handelt sich um die indische Graumeise — Parus cinereus, die sich sehr wesentlich von der Bergmeise unterscheidet. Einige Tropfen Lebertran werden ab und zu unter das Insektenfresserfuttergemisch gegeben und mit diesem verarbeitet.

Herrn F. B., Tichau. Solche Adressen kann ich nicht mitteilen. Benutzen Sie für evtl. Fragen gefl. den Sprechsaal.

Herrn A. L., Pfarrkirchen; Herrn Dr. B., Dresden-Kl. Sch.: Ist brieflich Nachricht gegeben.

Fräulein L. H., Aubstadt. Die Angelegenheit mit der zu fetten Nachtigall ist in der Arbeit von Birk „Individuelle Fütterung" doch wohl hinreichend erörtert. Fleisch und Weißwurm waren vom Übel. — Daß die Arbeit verloren gegangen bedaure ich sehr. Die andere Arbeit wird demnächst veröffentlicht.

Herrn H., Magdeburg. ♀-Wachtel ist infolge „harten Kropfes" eingegangen. Es handelt sich um die gemeine Wachtel, die im indischen Winterquartier gefangen ist.

Herrn E. B., Schlawe. Der Schuppen wird den Pfauen zur Übernachtung genügend Schutz gewähren. Die offene Seite könnte bei sehr strenger Kälte mit Strohmatten oder alten Säcken verhängt werden. Häufig sah ich Pfauen hoch auf dem Dachfirst sitzend übernachten. Im Winter suchten sie dann die Nähe des Schornsteins auf, der ihnen Schutz gegen starken Wind und auch Wärme gewährte.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

rgang 54 12. Februar 1925 Heft 7

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Die Rätsel des Vogelgesangs. Von Karl Reich, Bremen.
Sumpfrohrsänger. Von Paul Schwarz, Leipzig. (Forts.)
Neueinführungen und Seltenheiten. Von K. Neunzig. (Forts.)
Einiges über den Kleiber oder die Spechtmeise. Von Wilhelm Schreitmüller, Frankfurt a. M.
Ein eigenartiges Trio. Von Helmut Hampe.
Über Brutwilligkeit bei Sittichen. Von Robert Grasl.
Kleine Mitteilungen - Bücher- und Zeitschriften - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.) Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf. vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

utz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Anschrift: H. Höhne, Leipzig-Vo., Eisenbahnstraße 84. — Wir laden nochmals herzlichst ein zu unserer Bezirksversammlung in Aue i. Erzgeb. am 15. Februar 1925, nachmittags 2 Uhr, im „Feldschlößchen". — Ferner teilen wir mit, daß folgende Vereine neu aufgenommen worden sind: Verein für Vogelschutz, -pflege und -liebhaberei zu Aue i. Erzgeb., Anschrift: Albin Pollmer, Aue i. Erzgeb., Steinstraße 3; Zier- und Singvögel-Verein in Bernsbach i. Erzgeb., Anschrift: Albin Drechsler, Bernsbach i. Erzgeb., Nr. 65 c.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen. Alle Vereine und Liebhaber, die unserem Verbande bereits angeschlossen sind, bitten wir an dieser Stelle nochmals, die restlichen Mitgliedsbeiträge unserem Kassierer Herrn Erich Merz, Berlin-Friedenau, Wilhelm-Hanff-Str. 14II, umgehend einzusenden. Vereine und Liebhaber, tretet unserem Verbande bei und unterstützt unsere gute Sache. J. A.: Erich Merz.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden. J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

Aufgenommen ist Mitglied Nr. 102n Math. Lefebre, Handelsmann, Merzig (Saargebiet) Postfach 115; Mitglied Nr. 104n Zoologischer Garten d. Stadt Halle, Halle a./Sa.

Denjenigen Mitgliedern, die ihrer Beitragsverpflichtung entsprochen haben bzw. s. Zt. die Bestandsangabenliste einsandten, ist inzwischen das neue Jahrbuch zugestellt worden. Ich bitte die mit der Beitragszahlung noch rückständigen Mitglieder sofort Mk. 3,50 auf Postscheck-Konto Hannover 56714 des Schatzmeisters Herrn Eduard Schütze einzuzahlen, damit die Zustellung erfolgen kann.

A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen. J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen. J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurter Str. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. V.: Emil Ivo, Schriftführer.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Protokoll der Mitglieder-Versammlung vom 23. 11. 1924. Die rückständigen Beiträge zu Punkt 1 mußten unkassiert bleiben, da unser Kassierer verhindert war, zu erscheinen, zu Punkt 2 der Tagesordnung wurden sich die Mitglieder einig, für die edlen Weichfresser „Weißwurm" auswärts in Bestellung zu geben. Punkt 3. Es wurde einstimmig beschlossen, am 21. 12. morgens 8[30] Uhr mit der Straßenbahn nach Mengede zu fahren, um mit Kollege Lapp dortselbst eine Wanderung zum „Vogelparadies" zu unternehmen. Zu Punkt 4 der Tagesordnung wurde einstimmig der Beschluß gefaßt, am 3. Januar 1925 das Fest der Weihnachtsfeier im Verein zu begehen. Für die Kinder stiftet jedes Mitglied 2 Düten, a 3 Pfd.-Größe, mit Inhalt als Weihnachtsgabe. Zur Ausschmückung des Tannenbaumes stiftet jeder Kollege einige Kerzen. Zur Verlosung innerhalb der Kollegen bringt jedes Mitglied ein Geschenkgegenstand mit. Ferner wird den Kollegen anheimgestellt, für die amerikanische Verlosung nach Kräften beizutragen. Zu Punkt 5 Verschiedenes wurde im Verein beschlossen, zur Weihnachtsfeier die Damen und Herren vom „Hörder Bruderverein" hierzu einzuladen. Unsern Besuch zur Weihnachtsfeier am 27. 12. erwidern wir hiermit nach Hörde.

Verein der Vogelliebhaber, Dortmund und Umgegend. Die Vereinssitzungen finden jeden 4. Sonntag im Monat, abends 6 Uhr beginnend, in unserem Lokal „Thüringerhof", Mallinkrodtstr. 180, statt. Liebhaber jederzeit herzlich willkommen. Der Vorstand.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein Vogelschutz u. -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schillers Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstr. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Bernhard Kühn, Vors.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 17. Februar 1925. Gäste, auch Exotenliebhaber, stets willkommen. J. A.: Arnold Weber, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden, Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen.

Jahresbericht für 1924, erstattet vom Schriftführer A. Voigt. 12 Vereinsabende liegen hinter uns, da geziemt es sich, einmal ein wenig rückwärts zu schauen. Am 12. Februar 1913 wurde der Verein gegründet, von den 10 Gründern gehören ihm heute noch 5 an. 21 Mitglieder zählt er heute und wir hoffen, daß er im neuen Jahre noch Zuwachs an neuen erhält. Der Zweck der Gründung war für uns damals, alle Jenaer Vogelliebhaber zusammenzuschließen. besonders aber die Vogelhalter. Uns schwebten damals bei der Gründung vor: Die Schaffung einer mit einheimischen Vögeln besetzten großen Voliere innerhalb einer städtischen Anlage, die Veranstaltung von Vogelschauen, die Versorgung der Jenaer Zeitungen mit Artikeln über Vogelpflege. Wenn wir ehrlich sein wollen, sind wir noch recht weit von den damals dem Vereine gesteckten Zielen entfernt. Dagegen kann mit Freude festgestellt werden, daß in den letzten Monaten sowohl der Versammlungsbesuch als auch das während der Versammlungen bezeugte Interesse am Gebotenen ein sehr reges war. Da ich erst im November vorigen Jahres infolge plötzlichen Austritts des bisherigen Schriftführers dessen Amt übernahm, kann ich nur auf Grund der Protokolle bis 8. Juli über die Vereinstätigkeit speziell berichten. Vorträge hielten: Herr Jahn: Nachtigall und Sprosser; Herr Borggreve: Ornithologische Beobachtungen; Herr Bischof: Ameisen; Herr Dr. Sack: Der Vogelzug; Herr A. Voigt: Die Prachtfinken; Herr Borggreve: Allerlei Bewerbungskunst während der Minnezeit der Vögel; Herr Jahn: Die Schamadrossel; Herr Uhlmann: Der Kolkrabe; Herr Jahn: Vogelliebhaber in Wien; Zeitschriften der Vogelliebhaber; Herr Dr. Sack: Archäopteryx; Herr Voigt: Aus meiner Vogelstube; Herr Jahn: Der Vogelzug und seine Erforschung; Herr A. Voigt: Die Berliner Vogelschau; Herr Dr. Sack: Vogelschutz im falschen Sinne, Reisebeobachtungen an der Ostsee. Angeschafft wurden von verschiedenen Mitgliedern Nisthöhlen für 10 M. Hanf wurde aus der Vereinskasse gekauft. Bei dem milden Winter wurde bis jetzt wenig davon verbraucht. Besonders interessante Artikel aus der „Gefiederten Welt", dem „Vogelliebhaber" und der „Wochenschrift f. d. Liebhaber fremdl.

(Fortsetzung auf der 8. Umschlagseite.)

u. einh. Stubenvögel" wurden verlesen und besprochen, ebenso Artikel über den Vogelzug, die Vogelwarte Rossitten u. a. m. Alle Versammlungen fanden in der Wohnung des Vorsitzenden statt, und es ist mir eine Ehrenpflicht, im Namen des Vereins auch heute noch einmal unserm lieben Wirte und seiner verehrten Gattin unsern herzlichsten Dank auszusprechen. Viele frohe Stunden verlebten wir in seinem Hause und oft kam der Humor zur Geltung, wenn nach Erledigung der Vogelliebhaberversammlung der „Bunte Teil" des Abends einsetzte und lustige Geschichten von Löns oder unserem Jenaer Dialektdichter Ludwig vorgetragen wurden. Durch die dienstliche Versetzung des Vorsitzenden nach Erfurt ist die Verlegung der Versammlung auf den Sonnabend nötig geworden, da er nur Sonnabends abends und Sonntags in Jena weilt. Die beiden Herren Kämpfe und Landmann wurden zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt. Gemeinsame Besichtigungen: Der lebende Uhu des Herrn R.; die Vogelstube des Schriftführers. Für den Vogelliebhaber fremdländischer Stubenvögel war das Jahr 1924 insofern ein Fortschritt, als es, als eine Folge der stabilen Währung, wieder reiches Angebot an Vögeln aller Zonen brachte. Leider sind gerade die Preise für Vögel ungeheuer gestiegen. Auch für einheimische Vögel muß der Liebhaber Summen opfern, die die Vorkriegspreise um 100—150% übersteigen. Hoffen wir, daß bald die Zeit kommt, wo es jedem Vogelliebhaber möglich ist, sich seine Käfigvögel selbst zu fangen, ohne daß er in Verruf gerät, ein Verbrechen zu begehen. — Dem Landesverbande Sachsen-Groß-Thüringen des Vereins der Vogelliebhaber Deutschlands gehört der Verein als treues Mitglied an. Mit ihm hoffen wir, daß es im kommenden Jahre gelingt, allenthalben im Lande Thüringen Vogelliebhabervereine zu gründen, steht doch bis jetzt unser Verein als einziges Mitglied des Landesverbandes aus Thüringen da. Und so möchte ich meinen Jahresbericht schließen mit der Aufforderung an alle Mitglieder, nicht nur das bisher Geschaffene festzuhalten, sondern weiter bauen zu helfen zum Nutzen der Vogelliebhaber und damit auch zum Nutzen der Vogelwelt. Denn nur der kann die Vogelwelt schützen, der ihr Leben kennt. Adolf Voigt.

Der Verein hielt am 31. Januar 1925 seine Hauptversammlung ab. Es waren 11 Mitglieder erschienen. Der Schriftführer erstattete den Jahresbericht, der Kassierer den Kassenbericht, der 72,20 M. Einnahme, 35,55 Ausgabe und 36,65 M. Überschuß ergibt. Hiervon sollen 20 M. für die Anschaffung von Nisthöhlen verwendet werden, der Rest wird aufgespeichert, bis es möglich ist, Brahms Tierleben zu erwerben. Aus den laufenden Einnahmen sollen die Beiträge für den Verein Naturschutzpark, den Bund für Vogelschutz, Stuttgart, sowie den Leipziger Vogelliebhaberverband bestritten werden. Herr Dr. Birkreich hielt einen Vortrag über das Fliegen der Tiere, mit Ausnahme der Vögel, der in 14 Tagen fortgesetzt werden wird mit dem Thema: die Flugsaurier. Die Vorstandswahlen ergaben die Wiederwahl des bisherigen Vorstandes. Neugeschaffen wurde der Posten des 2. Vorsitzenden, der Herrn Bischoff übertragen wurde.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vors., Boppel, 1. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, dem 19. Februar 1925. Gäste stets willkommen.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.

J. V.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Unsere nächste Versammlung findet am Mittwoch, dem 4. Februar, abends 8 Uhr, bei unserem Mitgliede Herrn Normast im Gasthof „Kaiser Friedrich," Breslauer Str. 50, statt. Liebhaber sind als Gäste willkommen. Wichtige Tagesordnung.

J. A.: Friedrich.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am zweiten Mittwoch eines jeden Monats Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Straße. Beginn 8 Uhr. Gäste sind willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Magdeburg-Westl, Schenkendorfstr. 14.

Zusammenkunft! Alle Liebhaber exotischer Vögel aus Magdeburg und Umgebung werden gebeten, sich an einem Sonntag in einem noch zu bestimmenden Lokal in Magdeburg zu treffen. Zuschriften mit Vorschlägen an den Verlag (Telefon 1323).

Der Verein der Vogelliebhaber Mannheim hält aller 14 Tage im Restaurant zum goldenen Falken seine Mitgliederversammlung ab. Nächste Versammlung am Freitag, dem 20. Februar 1925 und so fort. Freunde und Gönner stets willkommen.

Der Verein hielt am 18. Januar 1925 seine diesjährige Generalversammlung ab. Die Mitglieder waren zahlreich vertreten. Der 1. Vorsitzende eröffnete die Versammlung um 5,15 Uhr. Die Tagesordnung bestand aus 6 Punkten. 1. Verlesung des Protokolls von der Generalversammlung vom 21. Januar 1924. 2. Neuaufnahmen. 3. Jahresbericht. 4. Kassenbericht. 5. Ausscheiden und Neuwahl des Gesamtvorstandes. 6. Vereinsangelegenheit.

Bei Punkt 1 wurde das Protokoll der Generalversammlung vom 21. Januar 1924 verlesen und angenommen. In Punkt 2 wurde Herr Heinrich Schmidt einstimmig aufgenommen. In Punkt 3 gab der 1. Vorsitzende den Jahresbericht bekannt. Er erklärte, daß das verflossene Jahr noch ein sehr mißliches war für unsere Liebhaberei und er hoffe, daß es dieses Jahr besser werde. Abgehalten wurde ein Kaffeekränzchen. An Ausflügen sind zu verzeichnen ein Nachtausflug, ein Familienausflug und ein Tanzausflug. Sodann dankte der 1. Vorsitzende den Mitgliedern für die Treue und Unterstützung im verflossenen Jahre. In Punkt 4 gab der Kassierer den Kassenbericht bekannt, welcher 114,36 M. beträgt. Hierauf wurde dem Kassierer ein Geschenk von 10 M. überreicht. Unter Punkt 5 legte der Gesamtvorstand sein Amt nieder und es wurde zur Neuwahl geschritten. Der neue Vorstand setzt sich folgendermaßen zusammen: 1. Vorsitzender Herr Konrad Stanz. Ehren- und 2. Vorsitzender Herr Ludwig Frank. Kassierer Herr August Sommer. 1. Schriftführer Herr Friedrich Rütschle. 2. Schriftführer Herr Johann Daubmann. Revisoren die Herren Heinrich Eidmannn und Anton Hoffmann. Materialverwalter Herr Heinrich Eidmann. Vereinsdiener Herr Alois Precht. Der neugewählte Vorstand nahm das Amt an und der 1. Vorsitzende führte die Versammlung weiter. In Punkt 6 kam der Monatsbeitrag zur Sprache. Es gingen 2 Anträge ein von 0,40 M. und 0,50 M. Es wurde darüber abgestimmt und 0,40 M. angenommen. Aufnahme beträgt 2,— M. Weiter wurde bekanntgegeben, daß der Verein aus 25 Mitgliedern besteht. Darauf wurde noch beschlossen, daß von heute ab die Mitgliederversammlungen auf Freitag verlegt werden. Der 1. Vorsitzende hielt darnach eine kleine Ansprache und wünschte dem Verein ein glückliches Gedeihen im neuen Jahr. Da keine Anträge mehr einliefen, schloß der 1. Vorsitzende die Versammlung um 8.30 Uhr.

Der Vorstand J. V. Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). An jedem zweiten Mittwoch im Monat findet in unserem Vereinslokal „Parkhotel", Epinaystraße 1, unsere Versammlung statt. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an.

Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegründet 1. Mai 1923. Vereinsabende aller vier Wochen, in der ersten Woche des Monats verbunden mit Vortrag, in der dritten Woche jeden Monats nur gesellige Zusammenkunft. Vereinslokal „Sächsischer Hof". Gäste stets willkommen. Studienrat Professor Jahn 1. Vorsitzender; Werkmeister Mann 2. Vorsitzender; kaufm. Angestellter Reinhardt Schriftführer.

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

J. A.: Paul Schmidt, 1. Vorsitzender, Zwickau i. S., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Käfige u. Gerätschaften



Schlagnetze für Sperlinge, Amseln usw. 2.50 ℳ, für Tauben, Rebhühner usw. 4.50 ℳ. Nachn., bei Voreinsendung des Betrag. franko. [219] Fangnetzfabrik

K. E. A. Müller, Schlotheim Th. 3.

Neueste

Preisliste

über alle Arten

Vogelkäfige

aus Hartholz versendet gegen Einsendung von 25 Pfg. in Marken

Thür. Vogelkäfig-Fabrik

Adolf Vogt & Co.

[220 **Ebeleben 667.**

Flugkäfig
1.50 br., 70 tief, 90—1.10 hoch 70—80 ℳ.
Insektenfresserkäfig
65 breit, 37 hoch, 25 tief Stück 15 ℳ.
Verzinnte u. lackierte Drahtkäfige mit und ohne Glaswände Stück 6—10 ℳ.

Messingkäfig
mit Glaswänden 15—18 ℳ.
Käfigständer und Tische 9—15 ℳ.
Harzer Roller 9—12—15 ℳ.
Vorsänger 20—30 ℳ.
221] **Zuchtweibchen** 3—4 ℳ.

J. Stenger, München,
Türkenstraße 53/3.

Inh. vom Sieger- u. Gruppenmeisterschaftspreis. — Eigene Großzüchterei.

Volle Garantie und Reellität.

Flugkäfig

95 cm lang, 84 cm hoch, 42 cm tief, Handarbeit, zusammenlegbar, grün gebeizt, Außenfütterung, Zinkschublade mit Zubehör, wenig gebraucht, Preis ℳ 40 franko. **Verkaufe ferner:** 1,0 **Stieglitz,** 1,0 **Zeisig,** 1,0 **Girlitz,** 0,1 **Dompfaff,** 0,2 **Kanarien** zum Preise von zusammen ℳ 20 franko. [222

Rudolf Lippert,
Dresden-A. 24, Ostbahnstraße 20.

Abzugeben:

Zerlegb. Schindlerhecktäfig, 75 cm lang, für Exoten, und je 1,0 **Dompfaff, Stieglitz, Zeisig.** Tausche auch. [223

H. Kircheisen, Chemnitz,
Katharinenstraße 3.

Futtermittel

Vogelfutter [224

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.

Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Mehlwürmer Pfd. 5 ℳ, 6 Pfd. 30 ℳ frc. Nachn.
225] **Jeltner, Breslau,** Weinstr. 12.

Reform-Käfige

Zerlegbar, Leichteste Reinigung, Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919/22 (siehe Gefiederte Welt 1920, Heft 14—16), Goldene Medaille Leipzig 1921/22
werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannäpfe, Ledertuchdecke.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe

Heck-, Flug-, Einsatz-Käfige.
Ausstellungs-Käfige nach Vorschr. d. V. D. K.
Transport-Käfige, jeden Posten.

Anfragen Rückporto beifügen. Katalog gegen Einsendung von 0,50 M. in Briefmarken. [226

Schlagnetze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware.

Kühn & Muschter, Leipzig,
Promenadenstraße 29. Telephon 10 226.

Bankkonto: Allgem. Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna; Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506. — Postscheckk.: Leipzig 92 250.
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Bei Anfragen und Bestellungen bitten wir, sich auf die „Gef. Welt" zu berufen

Werte Züchterkollegen!

Es ist mir gelungen, meine **L. K.-Nahrung** in bezug auf Blut-, Knochen- und Federbildung zu verbessern.
Es wird weiter mein Bestreben bleiben, für die Kanarienzucht fördernd zu arbeiten. [227

Hochachtungsvoll

H. Lorenz, Dresden, Drehgasse 5.

Chemisches Laboratorium Weber
Amtliche Untersuchungsstelle für die Amtshauptmannschaften Rochlitz und Schwarzenberg
Dresden-A., Wettinerstraße 31
Fernsprecher 16 723 Den 28. Januar 1925

Herrn H. Lorenz, Kanarienzüchterei, Dresden-A., Drehgasse 5

Die Untersuchung der mir am 12. Januar 1925 übersandten Probe
Lorenz' Kanarien-Nahrung
lieferte folgendes Ergebnis:

100 Gramm der Probe enthielten 5,970 Gramm Wasser.
In 100 Gramm der Trockenmasse waren enthalten:

Mineralstoffe	4,02	Gramm
Eiweiß	27,46	„
Fett	1,80	„
Kohlenhydrate	66,72	„

100 Gramm der Mineralstoffe enthielten:

Kali (K_2O)	11,96	Gramm
Kalk (CaO)	33,25	„
Magnesia (MgO)	5,05	„
Phosphorsäure (P_2O_5)	24,47	„
Schwefel (SO_3)	4,70	„
Kieselsäure (SiO_2)	5,68	„
Eisen (Fe_2O_3)	0,045	„
Mangan (MnO)	0,174	„

Die Mineralstoffe enthalten 48,8% Basenüberschuß im Sinne von Ragnar Berg.

Aus diesem Befund ergibt sich nicht nur, daß die wesentlichen Bestandteile eines guten Nahrungsmittels: Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate und Mineralstoffe (Nährsalze) in Lorenz' Kanarien-Nahrung in sehr günstigem Verhältnis enthalten sind, sondern auch, daß die Mineralstoffe aus solchen Salzen bestehen, welche Kali-, Eisen-, Mangansalze) für die Ernährung junger Vögel sowohl wie auch für die Entwickelung des Knochengerüstes und der Befiederung (Kalk, Phosphorsäure, Kieselsäure) von großer Wichtigkeit sind.

Als weiterer Vorzug muß der Basenüberschuß der Mineralstoffe im Sinne von Ragnar Berg bezeichnet werden, dem seitens der modernen Ernährungsphysiologen erheblicher Wert beigemessen wird. Für die Aufzucht junger Vögel stellt demnach Lorenz' Kanarien-Nahrung ein sehr geeignetes Präparat dar.

Hochachtungsvoll
Chemisches Laboratorium Weber.
Weber,
vereid. chemischer Sachverständiger des Amtsgerichts Dresden und der Handelskammer zu Dresden.

Vorstehende Analyse hat uns im Original vorgelegen. Die Schriftleitung der „Kanaria".

Mehlwürmer

à Pfund 5 ℳ, bei 6 Pfund Porto und Verpackung frei.

Ia Ameiseneier	à Pfd.	8 ℳ
Ia Weißwurm	à „	6 ℳ
Ia Muska-Zecken	à „	3 ℳ
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen	à Pfd.	1 ℳ
Ia Garnelen, gem.	à Pfd.	0.40 ℳ

Ia Universalfutter.

Alecwa I für Nachtigallen 2 ℳ
„ **II für Grasmücken** 1.80 ℳ
„ **III für Drosseln** 1.50 ℳ
Proben und Analysen zur Verfügung. Vertreter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [228

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
A. Eckrich II., Waldsee (Pfalz).

Mehlwürmer rein vegetabilisch ernährt, à Liter (ca. 600 g) R.-M. 8.—, 1/4 Liter (ca. 150 g) R.-M. 2.— **franko** bei Voreinsendung des Betrages. [226
Bonitas-Versand, Rostock i. M. III.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Reutemark 1/4 Pfd franko versend. **D. Waschinski & Co.** Biesenthal I (Mark). [23

231] **Mehlwürmer,** reine Ware
gegen Eins. von 1.75 ℳ 1/4 Pfd. franko
Th. Witte, Niederndodeleben b. Magd

Ia Deutsche Ameisenpuppen (1924) pro Pfund 8 ℳ,
Ia Eibweißwurm (1924), pro Pfund 5 ℳ. [23
Ia Muska (Zecke), neue Ernte pro Pfund 3 ℳ.
Fleischfrissel (vollfett) . . p. Pfd. 0.5
Waffelbruch (gemahlen) p. Pfd. 0.6
Weichfutter I für Drosseln usw. pro Pfund 1 ℳ
Weichfutter II für bessere Weichfres pro Pfund 2 ℳ
Versand erfolgt per Nachnahme od. Vo einzahlung des Betrages zuzüglich Por und Verpackung auf Postscheckkonto Berlin 149951.
Hermann Arold, Berlin N 5 Fransecksstr. 4.

Prima **Ameiseneier** pro Pfund		8.—.
„ **Weißwurm**	„ „	8.—.
„ **Muska**	„	3.—.
„ **Trocken-Eigelb**	„	4.—.
„ **Körnerfutter**	„ „	0.60.

Versand erfolgt per Nachnahme oder v her. Einsendung. [2
Postscheckkonto: Berlin Kt.-Nr. 15899
Friedr. Gust. Müller, Zoolog. Hand Berlin SW 61, Blücherstr. 61.

Ornis-Haus
Halle-Saale

Gegründet 1912

Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)
Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall. Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspött. Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [23

Inhaber langjähriger Fachmann siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk.
Preisliste auf Wunsch!

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 145.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdeb.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 19. Februar 1925 | Heft 8

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Die Rätsel des Vogelgesangs.

Von Karl Reich, Bremen.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Interessant ist es, wie der Gesang der verschiedenen gefiederten Sänger stimmungsmäßig von dem menschlichen Gemüt empfunden wird. So bezeichnen wir den Gesang der Schwarzdrossel, wenn sie im Frühjahr als eine der ersten ihre köstliche Geige unter dem schwarzen Mantel hervorzieht als schwermütig getragene Weisen. „Du bist ein Jesuiter" übersetzt ihn das Volk, das tut das Volk gern, daß es einen Scherz oder einen Spott in das Vogellied hineindichtet. Aber nur dein Kleid ist schwarz liebe Amsel, aber Gold ist dein Schnabel, aus dem es so wunderbar ergreifend vom hohen Dachfirst oder vom hohen Baumwipfel herab in den schweigenden Abend hinausklingt und auf die Menschenseele wirkt.

Frohlockend herausfordernd dagegen die Rufe der Graudrossel, des Herolds unserer Wälder.

Das Rotkehlchen ist mit seinen feierlichen Weisen unser Kirchensänger, im Gegensatz zu unserem Schwarzplättchen, daß mit seinen lustigen Wirtshausliedern, Jodlern und Überschlägen unser Bänkelsänger ist. Die Gartengrasmücke singt und orgelt und selbst bei Regenwetter warme Sonne ins Herz hinein. Der Gelbspötter räsonniert, lacht, schäkert, ein unverwüstlicher Fidelio. „Schmidt, Schmidt, Schmidt hat sieben Töchter, sieben Töchter, sieben Töchter, dazu jetzt sieben Schwiegersöhne möcht' er, Schwiegersöhne möcht' er", so spöttelte übersetzend unser hochverehrter Dr. Heinroth während seines vorjährigen Aufenthalts, einem eifrigen Gelbspötterchen, den wir am Osterdeich hörten, nach. Ich hatte in dem Augenblick die wohl etwas boshafte Empfindung, zwei hervorragende Spötter zu hören, von denen Dr. Heinroth zu dem noch der größere war. Hellschmetternd klingt uns die Fanfare unseres Landsknechtes des Buchfinken entgegen. Der Goldammer dagegen singt, wie Mosen so innig übersetzt: Wie hab' ich dich lieb, oder wie der Volksmund ihm andichtet, „Mutter ich kann nichts zu trinken krieg'n", man hört den Ammer nämlich bei sonnigem Wetter besonders ausdauernd sein Liedchen wiederholen, weshalb der dauernd durstige Bruder Studio ihn sehnsuchtsvoll übersetzt: Wirt, Wirt, Wirt gibt's wohl bald Bier.

Der wahrste Lebenskünstler der Welt ist unser kleiner Zaunkönig. Er kennt keine Sorgen, aber die stets geschäftige Arbeit die kennt er restlos hin und her, auf und ab, „weg mit den Grillen und Sorgen", so singt und perlt es aus seinem Kehlchen „tu was, tu stets was, dann geht's dir nicht schlecht, selbst ist der Mann", das schmettert sein sieghaftes Lebenslied selbst in harten Wintertagen uns zu, unverdrossen schafft und sinkt er, er jammert nicht um Schutz des kleinen Mannes, er lebt als Kleiner, aber er lebt sein Leben als König der Arbeit. Wenn ein anderer Vogel infolge hervorragender Gaben und Fähigkeiten uns Veranlassung gibt, ihn als König anzusprechen, so ist es der Sprosser, der unbestrittene König der Töne. Er vertritt in seinem Liede die edle männliche faszinierende Ruhe, Würde und Kraft mit seinen Baß-Glocken, Metall- und Stahltönen.

Edler im Ton ist die Königin, die Nachtigall, die gefeiertste Sängerin der Erde — nicht. Aber sie ist vielfertiger und an Reichtum der Töne und Wiedergabe von „Empfindungen" dem Sprosser überlegen. In ihren wundervoll vollendeten, oft leidenschaftlichen, oft sehnenden klagenden bald jubelnden Strophen klingen wahrhaft rein menschliche Empfindungen in uns wieder. Es ist, als ob große seelische Erregungen die kleine Brust heiß durchfluten, und diese in köstlichem Durchleben Freude, Liebe, Klage, Schmerz, Entsagung, Trost und dann wieder Jubel und selige Liebe zu wundervollem Ausdruck bringt.

Ein besonderer Genuß ist es, auf der Wanderung Rast zu machen und unserem farbenschönsten Wurmvogel, unserem Blaukehlchen am Weiher, am Flußufer, im Weiden- oder Schilfgebüsch zu lauschen. Ungeniert kramt es alle seine kleinen Geheimnisse aus, die es in seinem Leben irgendwo erhaschen konnte, und wer sich etwas Mühe gibt, es zu verstehen, oder gar schon die Blaukehlchensprache erlernt hat, dem erzählt es, wie die Frösche und Unken sich unterhalten, was die Regenpfeifer, Uferläufer, die Wachteln, die Kiebitze, die Bekassinen, die Rotschenkel usw. sich zurufen, dann — was ihr aus den Liedern der Feld- und Heidelerchen am interessantesten erschien, ferner wen alles sie auf ihren Wanderungen nach dem fernen Afrika und zurück als Reisegesellschaft gehabt hat und erzählt uns weiter in der Wiedergabe der Stimmen

von Fremdlingen, welche bunten interessanten Bekanntschaften es drüben in Afrika machte. Ja selbst vor der Ausplauschung königlicher Geheimnisse scheut das Blaukehlchen nicht zurück — wenn es sein Nest in der Nähe einer Nachtigall hatte, und bei den Kennern und Liebhabern des Blaukehlchens sind gerade diese Klatschbasen die am höchsten geschätztesten. Nicht unerwähnt möchte ich lassen den wunderbaren, fast märchenhaft lieblichen Genuß, den das Dichten der Jungvögel im August und September eben vor dem Herbstzuge der Vögel uns bringt, wenn es aus Busch und Haag ganz entzückend süß und leise zu uns dringt, wie das Sprossen und Sprießen junger Knospen, das Üben und Dichten der werdenden Künstler, wie leises Ahnen kommender Lebensfreuden.

Zu den Rätseln des Vogelgesanges gehört, daß einige Vogelarten, die von Natur nur einen reizlosen, anspruchslosen Gesang besitzen, unter Anleitung des Menschen wundervoll melodisch Lieder flöten lernen, so unser Dompfaff, ferner der Eichelhäher. Übertroffen werden diese beiden noch von dem Graupapagei und — in seltenen Fällen allerdings — von dem kleinen Wellensittich. Wohl einen der hervorragendsten Vertreter dieser kleinen Sippe habe ich und wohl verschiedene der Herren unter uns Gelegenheit gehabt, bei Herrn von Lucanus in Berlin zu hören. Dieser kleine Wellensittich war geradezu ein Überwellensittich. Er sang mit wundervoller melodischer Stimme und klarster deutlicher Aussprache, so daß einem keine Silbe des Textes entgehen konnte, das Liedchen „Blau blüht ein Blümelein". Er zählte fehlerfrei bis 10, unterlief ihm mal ein Fehler beim Zählen, dann verbesserte er sich. Er sprach eine Menge Worte und kurze Sätze ohne Fehler, und was deutlich auffiel, in dem markanten, soldatischen Tonfall der Stimme seines Herrn, den er überraschend genau kopierte.

Eigentümlich ist es, daß ein täuschend genaues Nachahmen des Vogelliedes bis jetzt nicht möglich ist. Anders ist es mit den kurzen Rufen der Vögel. Diese können von Kennern zum Teil täuschend genau wiedergegeben werden, wie es uns bekannt ist von Jägern, Trappern und Indianern. Einer der unsrigen, d. h. nicht — Indianer, sondern Landsmann und Freund, Prof. Wellmann, der nicht nur hoch hinaus kann, sondern auch platt weg, wie er es uns in seinen einzigartigen Jagd- und Vogelgeschichten und seinen die Vögel Niedersachsens behandelnden Schriften vorführt. Professor Wellmann hat uns schon verschiedentlich das Vergnügen bereitet, bei kleinen Ausflügen den Waldlaubsänger durch seinen täuschend nachgeahmten Lockton oft fast auf Reichweite an uns heranzulocken. Die ähnlichste Wiedergabe von Vogelgesängen ist wohl durch die Grammophonaufnahmen erreicht worden, wenngleich leider auch hier ein gewisser Ausfall an Tönen das Lied nicht vollendet wiedergeben kann. Das Grammophon nimmt nämlich hohe Töne nur in abgeschwächter Lautstärke auf. Zischlaute läßt es leider fast ganz aus, so daß bei einigen der schönsten Touren der Nachtigall und des Sprossers durch das Fehlen der Zischlaute die faszinierende Klangwirkung der Verbindung beherrschter Dissonanz mit reinem Vokalton verstümmelt wird. Zum Beispiel bringt das Grammophon statt des schönen zorr zorr zorr und zü zü zü der Nachtigall nur orr orr orr und ü ü ü zu Gehör. Immerhin bringt das Grammophon die Lieder doch so weit naturgetreu, daß selbst Nachtigallen auf den Schwindel hineinfallen, wie ein Erlebnis zeigt, das ich gelegentlich eines Besuches bei einem Freunde im benachbarten Delmenhorst hatte. Dieser besaß einen großen parkähnlichen Garten, in dessen vier Ecken sich je ein Nachtigallenpärchen sein Brutrevier gesichert hatte. Als wir in die Mitte des Parks in den Büschen ein Grammophon aufgestellt hatten, um von der etwas entfernt liegenden Villenterrasse aus die Grammophongesänge auf uns einwirken zu lassen, und eine Nachtigallplatte aufgelegt hatten, kamen sämtliche vier Nachtigallmännchen herbeigeflogen in der deutlich erkennbaren Absicht, den fremden Eindringling zu vertreiben, indem sie in großer Erregung und selbst laut schlagend auf das spielende Grammophon herniederstießen.

Wenn ich mir zum Schluß erlaube, Ihre Zeit noch kurz in Anspruch zu nehmen durch Vorführung einiger Vogelgesänge auf dem Grammophon, so verbinde ich dabei noch einen Wunsch, einen einstweilen noch krausen Gedanken. Man erzielt durch ein sehr langsames Spielenlassen der Platten eine Verlangsamung der Schwingungen und kann so die Töne in ihre Untertöne zerlegen. Ich hätte den Wunsch, daß aus ornithologisch musikalischen Kreisen heraus der Versuch gemacht würde, unter Mitarbeit eines geschickten Instrumentenmachers vielleicht und Zuhilfenahme der Grammophonvogelgesänge, ein neues Instrument zu erfinden, auf dem Vogellieder bzw. Gesänge gespielt werden könnten. Die Gesänge vom Grammophon ab in Noten zu setzen, würde unter der leicht faßlichen und hochinteressanten Anleitung, wie sie Dr. Cornel Schmitt und Dr. Hans Stadler in ihrem Büchlein „Die Vogelsprache", eine Anleitung zu ihrer Erkennung und Erforschung (Franckhsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart), gelingen. Ich würde gern bereit sein, Interessenten für diese Arbeiten in dieser Richtung behilflich zu sein und auch diesen Gedanken gelegentlich eines Besuches bei mir am Grammophon näher zu demonstrieren. Ein Gelingen würde der Musik eine kleine, aber reizvolle neue Bereicherung zuführen.

Lassen Sie mich bitte schließen mit den Worten: Wie bist du unvergleichlich schön du deutscher Wald mit deinem Waldkonzert, der Vogelstimmen Chor. Die Tropenwelt, und sei's die größte Pracht, kennt deine tiefe Seele nicht. —

Sumpfrohrsänger.

Von Paul Schwarz in Leipzig, Südstraße 67.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Jedes Jahr hat zwei Monate, die für den Pfleger von Spöttern und Sumpfrohrsängern zwei Sorgenmonate sind, den Oktober und November. Da sitzen die zarten Sorgenkinder, die dem Pfleger besonders ans Herz gewachsen sind, weil sie eben Sorgenkinder sind, und verschmähen alles Gute. Der gefüllte Futternapf steht abends eben noch so wohlgefüllt als am Morgen. Mischfutter — das ist zu solcher Zeit nicht gerade die gern genommene Nahrung. Da möchten schon Mehlwürmer, je kleiner je lieber, in reichlicher Zahl dabei sein. Der Sumpfrohrsänger

ist meiner Erfahrung nach noch nicht einmal ein so arger Mischfutterverächter wie der Gelbspötter, doch auch ersterer läßt im Oktober und November am Mischfutterfressen nach. Und was er da nicht mag, soll er auch nicht haben, wenigstens nicht in größerer Menge. Dann bekommt er eben Würmer, klein, weich und lebend. Der Appetit kommt beim Fressen, die Würmer wirken belebend und anregend, nicht allein auf die Freßlust, sondern auch auf den Vogel. Ich muß offen gestehen, seit der Züchtung und Verfütterung meines Mehlwurmersatzes habe ich keinen traurigen Sumpfrohrsänger in meinen Käfigen. Freilich biete auch ich meinen Vögeln nach Einbruch der Dunkelheit noch Möglichkeit zum Fressen bis in die zehnte Stunde und öfter noch länger, wenn ich den oder jenen Liebhaber zu Gaste habe. Und wie Licht des Abends, so ist auch gleichmäßig temperierte Wärme ein unerläßliches Erfordernis, wenn die zarten Vögel überhaupt den Winter durchgebracht werden sollen. Es soll nicht zu warm sein, unter Umständen mausern sie, aber es darf die Temperatur nicht wesentlich schwanken. Nachts über, wo gewohnheitsmäßig die Zimmertemperatur zurückgeht, ist es kein Fehler, wenn der Ofen auch noch einige Nahrung für seinen unersättlichen Magen bekommt. Des Morgens ist es dann noch warm im Zimmer, es kann auch dann, wenn der Ofen erneut Wärme hergibt, ausgiebig und ohne Schaden gelüftet werden.

Frische Luft ist das Mittel, was Mensch und Tier zur Lebenserhaltung unbedingt braucht. Auch die lasse ich meinen Pfleglingen im Winter wie im Sommer in ausgiebigster Weise zukommen.

Das Schwierigste in der Sumpfrohrsängerpflege erscheint mir die Mauser. Geht es dem Frühjahr zu, naht sich auch die Zeit des Federwechsels. Und Hoffen und Harren macht manchen zum Narren. Die Zeit ist schließlich da, aber vom Federwechsel keine Spur. Ja ja, da möchte die Lupe zur Hilfeleistung herangezogen werden, jeden Morgen oder Abend, je nachdem der Vogel neuen Käfigbelag erhält, wird gesucht ob doch nicht ein Federchen zu finden ist. Aber nichts von alledem. Doch nicht verzagt, der Rohrsänger ist wie alle anderen Vögel keine Präzisionsmaschine. Er richtet sich nicht darnach, was etwa in den Büchern steht, sondern die Mauser beginnt, wenn Umstände und Zeit geboten sind; also ein Spielraum von einem Monat ist keine Seltenheit und auch kein Anlaß zur Beunruhigung. Das einzige, was der Pfleger zunächst tun kann, ist die Feststellung, ob der Vogel normale Körperbeschaffenheit hat, er darf nicht fett und auch nicht mager sein. Ist diese Bedingung erfüllt, liegen auch keine Hinderungsgründe für die Mauser vor. Eines Tages sind die Sorgen des Pflegers doch behoben, beim Käfigreinigen finden sich abgeworfene Federn. Ist der Anfang da, mausert der Vogel auch durch, wenn nicht äußere Einflüsse, wie etwa Zug und stark schwankende Temperatur einwirken. Für Zug ist jeder Vogel sehr empfindlich und noch mehr während des Federwechsels. Zugluft muß man unter allen Umständen zu vermeiden suchen, es ist der Tod des zarten Vogels. Ebenso gefährlich kann auch Temperaturschwankung sein. Deren häufigste Folge ist Stocken der Mauser, kränkeln des Vogels mit dem Eingehen als Auswirkung. Wird beides ferngehalten, dann ist eins nur noch erforderlich, nämlich kräftiges Futter und Würmer soviel der Vogel mag.

Die Mauser im ersten Jahre der Käfigung ist die schwierigste. Oft findet man nur den Wechsel

Rostbäuchiger Flötenwürger (s. S. 84).

des Kleingefieders und man möchte verzagen. Doch dazu liegt kein Grund vor. Mausert der Vogel im ersten Jahr nicht vollständig durch, das ist meist der Fall, und nimmt er die Flug- und Schwanzfedern mit ins zweite Jahr, dann weg mit den Sorgen, im zweiten Jahr wirft er sie bestimmt mit ab. Vom Ziehen der Federn Hand weg. Künstliche Mauser bringt in der Regel einen unordentlichen Federwuchs mit sich, außerdem dürfte das Tier körperlich zu sehr geschädigt werden. Liegen äußerlich erkennbare Ursachen vor, daß der Vogel nicht mausert, dann suche man sie zu beheben. Fettsucht wird beseitigt durch weniger kräftige Nahrung, unternormale Körperbeschaffenheit durch kräftiges Futter. Der durch diese Maßnahmen normal gewordene Vogel wird auch in die Mauser kommen, zu spät ist es damit niemals, es sei denn,

der Gesang leidet darunter. Wenn ich einen guten Sumpfrohrsänger am Leben erhalten kann, so tue ich das unter allen Umständen, selbst wenn es infolge später Mauser mit Gesang im Frühjahr und Sommer sehr schlecht bestellt sein sollte. Der Vogel entschädigt mich im kommenden Jahre ganz gewiß durch zeitig beginnenden Gesang und damit bin ich zufrieden.

Über den Fang der Sumpfrohrsänger will ich mich nicht verbreiten, dafür aber einige Worte über die Eingewöhnung der Frischfänge sagen. Grundsätzlich nehme ich Vögel nur auf, wenn sie sich noch nicht gepaart haben.

Jeder frische Vogel kommt erstmals in einen kleinen mit einer Sprungstange versehenen Kistenkäfig. Die Vorderwand wird verdeckt, die Rückwand hat ein Beobachtungsloch, groß genug, um mit einem Auge beobachten zu können. Futter und Wassergeschirr, ersteres mit Würmern versehen, wird in den Käfig gestellt. Stelle ich nun fest, daß der Insasse das gereichte Futter annimmt, oder angenommen hat, wechselt er sein Quartier. Der Wechsel kann sich innerhalb einer Stunde aber auch erst andern Tags vollziehen, je nach der Futterannahme. Der nächste Käfig, den der Vogel nun bezieht, ist ein sogenannter Absingkäfig, der meinen übrigen Käfigen entspricht, aber nur 43 cm lang, 20 cm tief und 20 cm hoch ist. Die vordere Käfigseite wird mit lichtdurchlässigem weißen Stoff bespannt. Der Käfig hat doppelten Boden und weiche Decke. Sitzstangen sind zwei Stück vorhanden. Die Fütterungsvorrichtung ist auf der linken Schmalseite angebracht. Bei ausschließlicher Puppenfütterung, notfalls und die ersten Tage gebe ich von meiner Medizin, kommt der Vogel leicht in den Gesang und dauert auch bis zum Ende der Gesangsperiode aus. Der Käfig findet Aufstellung direkt an der Fensterseitenwand, wo das Licht ungehindert Zutritt hat. Ist der Gesang zu Ende, dann wechselt der Vogel seinen Fensterplatz und die Käfighülle wird, Eile mit Weile, gelüftet. Unversehrt im Gefieder, eher etwas fett als normal, präsentiert sich nun der Insasse. Wenn dann nach vollständiger Entfernung des Tuches noch einige Tage vergangen sind, und der Vogel sich an seine Umgebung gewöhnt hat, dann erhält er wie alle übrigen seinen geräumigen Käfig. Sogenannte Tober, wie es vor einiger Zeit in der Gefiederten Welt zu lesen stand, habe ich keine, weder gehabt, noch anderwärts gesehen. Herrgott, wäre das bei mir ein lustiges Treiben jeden Tag, wenn ich meine Spötter und Sumpfrohrsänger, zehn Stück zusammen, einsäckeln und an die Decke hängen müßte, um sie am andern Morgen, abgehetzt und im Gefieder zerwurstelt, daß sie keinem Vogel mehr ähnlich sehen, wieder in die Käfige zu setzen. Wie kann ein Liebhaber überhaupt auf solche Gedanken kommen? Dann sollen die Vögel bleiben wo sie sind, zu solchen Experimenten ist kein Vogel da und wäre es der gemeinste.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Ein sehr schöner Flötenwürger gelangte im Jahre 1913 in Besitz des Herrn Kuntzendorff, von Ruhe-Alfeld eingeführt. Es war ein Vogel von wunderbarer Farbenpracht. Das blauschwarze Gefieder der Oberseite stand in starkem Gegensatz zu dem prachtvollen Mohnrot der Unterseite und erschien noch dunkler durch die weiße Längsbinde des Flügels. Der Rotbauchwürger — Laniarius atrococcineus (*Burch.*) wurde im Drosselkäfig gehalten bei einem Insektenfressenfutter, wie etwa das der Schamadrossel, dazu erhielt er täglich 20 Mehlwürmer und viele lebende Insekten, in deren Ermangelung ihm morgens rohes Fleisch gereicht wurde, das er jedoch nicht gern annahm. Sein eigenartiger Gesang begann mit einer Reihe krächzender Töne, die ab und zu von reinen glockenklaren Flöten unterbrochen wurden. Eine Reihe melodischer Töne folgte. Nachahmungen anderer Vögel ließ er nicht hören.

Der südafrikanische Import August Fockelmanns brachte eine Anzahl eines nahen Verwandten der vorstehenden Art, den

rostbäuchigen Flötenwürger — Laniarius rufiventris (*Sw.*)

der sich in der Gefiederfärbung von jenem besonders durch die weiße „oft rosig angehauchte" Unterseite unterscheidet.

Eigentümlich ist den Flötenwürgern, man kennt etwa 25 in Afrika lebende Arten, ein eigenartiger Gesang, der wohl auch die Veranlassung war, der Gattung den Namen „Flötenwürger" zu geben. Verschiedene Forscher berichten eingehend darüber. So sagt Böhm von einer in Nordost- und Ostafrika lebenden Art: „der Schlag des Trauerwürgers ist einer der auffälligsten Vogellaute der hiesigen Gegend, zeichnet sich durch Tiefe und Fülle des Tones aus und ist so bezeichnend, daß er, wenn einmal gehört, schwerlich mit anderen verwechselt werden kann." Böhm teilt weiter mit, daß er in den mannigfachsten Abwechselungen vorgetragen wird, daß aber zwei Sätze hauptsächlich auffallen und fährt dann fort: „das Männchen beginnt mit drei vollen, tiefen, denen einer Glasglocke ähnlichen Tönen „tunk-tunk-tunk", denen sich noch zuweilen ein gleichsam aufjauchzendes „rö-a" anschließt, während das Weibchen mit einem tief schnarrenden „ürr" oder „huerr" einfällt. Oder aber das Männchen stößt einen überraschend scharfen und heftigen, zischenden und zuweilen verdoppelten Laut aus, der sich noch am ehesten mit den Tönen zweier vorbeigeschlagener Becken vergleichen läßt. Dann folgen die Glockentöne und die einfallenden Laute des Weibchens. Das Antworten der Gatten eines Paares selbst auf weite Entfernungen hin, scheint eine Eigentümlichkeit der Gattung zu sein, so daß bei mancher Art der Gesang durch das Zusammenwirken beider Gatten des Paares zustande kommt. „Seine Flötentöne haben den Tonfall lang-kurz-lang, der mittelste kurze Ton wird vom Weibchen hervorgebracht, doch lautet das Ganze wie von einem und demselben Vogel herrührend" sagt Fischer von L. sublacteus (*Cass.*) und Böhm schildert den Gesang des äthiopischen Flötenwürgers: „Bei jeder der Strophen, die tief und getragen erschallen, wirken beide Gatten eines Paares mit. Das geschieht regelmäßig in der Weise, daß der eine der Vögel volle und doch weiche, von nahe gehört, oft ganz überraschend starke Töne, der andere einfallend ein flötendes „hü" oder „hö" ausstößt. Beide Tonarten werden in der verschiedensten Weise vereinigt, so daß die mannig-

faltigsten Strophen entstehen." Eine eingehende Schilderung des Gesanges des rostbäuchigen Flötenwürgers bringt W. Gueinzius im Journ. f. Ornithol. 1873. Die von Fockelmann eingeführte Art ist demnach bisher die einzige Flötenwürgerart, die in ihrem Gesang auch die Lautäußerungen anderer Tiere aufnimmt, der also die Gabe des „Spottens" wie unseren heimischen Würgern eigen ist. Er sagt: „Von allen seinen Verwandten ist dieser Vogel der stimmreichste, zutraulichste und, wenn man näher mit ihm bekannt wird, unterhaltendste. Überall an den Waldrändern und zu jeder Tageszeit hört man die eine oder andere seiner verschiedenartigen Stimmen, bald ein pirolartiges „„guliej! guliej!"" bald ein wohltönendes „„hububub-hububub"", worauf das Weibchen ähnlich und unmittelbar antwortet. Dann vernimmt man wieder einen langgezogenen Pfiff wie „„wiek! wiek!"" worauf das Weibchen augenblicklich ein kurzes helles „„wiek"" oder „„wiekuck"" zurücksendet oder man hört „„gieg-gieg-gieg-gieg"", wenn er sagt Gueinzius „die nicht einmal rein tierischer Art zu sein scheint, da ich ein zahm gewordenes Weibchen sehr gern die vor der Tür meines Hauses liegenden Fruchthülsen von Arachis hypogaea*) aufhacken sah, um die öligen Samen zu fressen". Nach Rüppell verzehren sie „Insekten". Aber nicht alle Arten scheinen sich auf die Insekten- und Wurmnahrung zu beschränken und stellen ähnlich den Laniusarten auch kleinen Vögeln nach. Alexander berichtet von einer ostafrikanischen Art „die kleinen Astrilden werden ihm oft zur Beute".

In seinem Wesen ist der Flötenwürger lebhaft und vorsichtig, beweglich und im Gezweig des Buschdickichtes sehr gewandt, vertraut nur, wenn er sich sicher fühlt. In der Erregung hört man von ihm schnatternde Töne.

Er scheint ungern das Gebüsch zu verlassen und streicht meist niedrigen Fluges über Lichtungen hin.

Anscheinend bauen die Angehörigen der Gattung kunstlose napfförmige Nester aus Fasern in die Astgabel eines dichtbelaubten Baumes oder größeren Strauches in mäßiger Höhe.

Schuppenglanzstar (s. S. 86).

Langeweile zu haben scheint. Das Weibchen quält sich oft ab, seine Stimme in die unmöglichsten Töne zu verwandeln, die bald das Geschrei junger Katzen oder Hunde, bald das Quieken von Schweinen wiedergeben. Das Männchen ahmt mit der größten Leichtigkeit die verschiedensten Vogelstimmen nach: die fragenden Rufe des Glanzkuckucks, das dohlenähnliche Stimmengewirr einer Schar rotflügeliger Glanzdrosseln, die hellen Rufe der Totaniden, den Wechselruf der Pärchen des Schreiseeadlers".

Als Aufenthaltsort scheinen die Flötenwürger mehr offenes Gelände, welches von niedrigem dichtem Gebüsch und Dornendickicht besetzt ist zu bevorzugen und, wenn sie höhere Bäume aufsuchen, solche, die dichtes Laub tragen und in deren Nähe sich dichtes Unterholz befindet, welches sie bei Gefahr sofort aufsuchen, um sich in ihm zu verbergen. Frei auf einem hervorragenden Zweig, auf einer Warte sitzend, wie unser Würger, sind sie nicht beobachtet worden. Die Nahrung suchen sie am Boden oder in den Zweigen der Gebüsche. Sie besteht in Würmern, Raupen, Ameisen, Käfern und Gradflüglern (Heuglin). Von der Nahrung des rostbäuchigen Flötenwürgers

Die Verbreitung des rostbäuchigen Flötenwürgers erstreckt sich über Südafrika nordwärts bis Sululand und Transvaal.

Gefiederbeschreibung: ♂ oberseits schwarz, auf dem Bürzel verdeckte weiße Flecke, hintere Bürzelfedern mit blaßgelbbräunlichen Spitzen; Unterseite weiß, zuweilen rosig angehaucht; Körperseiten, hinterer Teil des Unterkörpers, Unterschwanzdecken, Schenkel ockergelblichbraun; Flügel, Schwanz schwarz; Spitzen der mittleren Flügeldecken, Außensäume einiger innerer großer Flügeldecken und Armschwingen weiß, eine weiße Flügelbinde bildend; Unterflügeldecken ockergelblichweiß, äußere schwarz; Schnabel schwarz; Auge dunkel; Füße blaugrau; Lg. 200—240, Fl. 90—104, Schw. 90—110 mm. ♀ oberseits schwarzgrau; Vorderhals, Brust ockergelblich verwaschen.

Zu den zahlreichen Arten afrikanischer Glanzstare welche als Neueinführungen im Jahrgang 1924 dieser Zeitschrift besprochen und abgebildet wurden, ist eine neue Art aus Südafrika hinzugekommen, deren Färbung besonders eigenartig und prächtig metallglänzend ist, ein Angehöriger der Gattung

*) Die als Papageienfutter gebräuchliche Erdnuß.

„Schuppenglanzstar — Cinnyricinclus *Less.*“, welche zwei Arten umfaßt. Diese unterscheiden sich lediglich durch die Färbung des Wurzelteiles an den Außenfahnen der äußersten Schwanzfedern. (S. Abb. S. 86.)

(Fortsetzung folgt.)

Anpassung.

Von Emil Kaforke, Berlin.

(Nachdruck verboten.)

Alle Lebewesen auf dem Erdball bedürfen zu ihrer Existenz der Bewegung, des Stoffwechsels, der Fortpflanzung und der Anpassung. „Das Bedürfnis schafft sich seine Organe“.

Ein Strauß kann die Ebene weit überblicken und außerordentlich schnell laufen, um bei seiner Flugunfähigkeit den Feind früh wahrzunehmen und rechtzeitig zu entrinnen. Adler erspähen aus ganz beträchtlicher Höhe die Beutetiere, welche sie mit ihren scharfen Fängen ergreifen. Augen und Füße sind eben dem Bedürfnis angepaßt, sie bedingen die Erhaltung der Art. Die Papageien verfügen über ein wunderbares Zusammenwirken von Fuß und Schnabel; beide dienen zum Klettern und zugleich der Ernährungsweise. Indes gibt es auch Papageien, deren Füße ausschließlich dem Laufen und Klettern dienen, weil die Nahrungssuche nicht mehr im Gezweige der Bäume, sondern auf dem Boden der Steppe stattfindet und nur in kleinen Sämereien besteht, die ein besonderes Festhalten mit den Füßen nicht benötigen. Erwähnt seien Wellensittiche, Keilschwanzkakadu, Erdsittich, sowie Unzertrennliche und Sperlingspapageien. Diese bunte Gesellschaft hat auch die Eigentümlichkeit, beim Krauen des Kopfes den Fuß nicht frei vor, sondern zwischen Flügel und Körper emporzuheben. Ganz nach Art ihrer großen Brüder führen hingegen die Papageichen Früchte mit den Füßen zum Schnabel, um kleine Stückchen abbeißen zu können; als Fruchtfresser vermögen sie die Hilfe des Fußes nicht zu entbehren.

Ein Beispiel vollendeter Anpassung ist der Schnabel des Araratakadus und der großen Araras. Ersterer lebt vorzugsweise von den sehr harten Nüssen des Kanaribaumes auf den Aru-Inseln und Neuguinea. Um zu dem Kern der dreikantigen, völlig glatten Frucht zu gelangen, soll der Vogel zunächst die Nuß der Länge nach zwischen seine Schnabelhälften spannen und mit der Querkante seiner unteren, indem er dieselbe von rechts nach links hin und her bewegt, einen Spalt in die Schale sägen, darauf sie wieder mit dem Fuß festhalten, ein Stück Blatt mit der Zunge gegen die Querleiste des Oberschnabels andrücken und nun die Nuß wieder in die alte Lage bringen, den Rand des Unterschnabels wieder in den vorher gemachten Spalt schieben, drücken und ein Stück der Schale absprengen. Das Blattstück verhindert als weiches Polster das Herausgleiten der Frucht.

Da ich zu den Leuten zähle, die alles, was sie hören und lesen nicht ohne weiteres kritiklos hinnehmen, sondern geistig verarbeiten, so will mir die Zuhilfenahme des Blatteils beim Sprengen der Nuß als überflüssig oder wenigstens entbehrlich erscheinen. Wenn die tausende Meilen vom Araratakadu entfernt wohnenden großen Araras die ähnlich harten Nüsse der Macaw- und Tukumalpalme einfach mit dem Schnabel öffnen, dann ist kein genügender Grund vorhanden, anzunehmen, daß jener eines besonderen Hilfsmittels bedarf, denn das Bedürfnis schafft sich seine Organe vollkömmen. Entgleitet die glatte Frucht beim ersten Bearbeiten nicht dem Schnabel, dann erübrigt sich zum Sprengen, da ja bereits eine Kerbe vorhanden, erst recht jeder weitere Gegenstand. Außerdem verfügt der Kakadu über eine gewaltige Kaumuskulatur; das elastische Blattpolster ist vielleicht bemerkt worden, ohne jedoch notwendig zu sein. Leider konnte ich die zwei von mir beobachteten Exemplare nicht näher prüfen.

In Südamerika — Chile — lebt der Langschnabelsittich und in Australien wohnen zwei Kakadus, Nasen- und Wühlerkakadu, die Orchideenknollen und dergleichen aus der Erde mit ihrem Schnabel graben, dessen obere Hälfte man seiner langen Form nach als ein natürliches Garteninstrument ansprechen darf.

Staunenswert erleichtert die Natur ihren Kindern den Kampf ums Dasein durch eine große Anpassungsfähigkeit.

Alle Tiere, welche in Gefangenschaft gelangen, müssen nun so verpflegt und gehalten werden, daß die dem Leben in freier Wildbahn angepaßten Organe sich auch im neuen Heim betätigen können. Nur dann hat eine Tierliebhaberei Berechtigung. Wenn wir zum Beispiel — wie ich es mit eigenen Augen gesehen — den tasmanischen Wombat, der in selbstgegrabener Erdhöhle wohnt, in einem aus Stein und Eisen gebauten Behältnis unterbringen, so ist das natürlich falsch und wenig förderlich für das Gedeihen des Bewohners, da seine Füße eben zum Graben eingerichtet sind und arbeiten wollen. Eine Wachtel, der das Scharren unmöglich, genießt ein elendes Dasein. Die erwähnten drei Langschnabelpapageien soll man in einem recht geräumigen Käfig, dessen Boden mit einer dicken Schicht von Erde und Sand bedeckt ist, einquartieren, um ihnen das Wühlen mit dem eigens geformten Schnabel nicht vorzuenthalten. Dem Kea wäre die Behausung mit Steinen auszustatten, damit er wie in der heimatlichen Flur von einem Felsstück zum andern springen kann. Im Gegensatz hierzu gehört ein Arara als ausgesprochener Baumvogel in eine mit verschieden starken Ästen versehene Voliere. Wellensittiche, welche ein schöner schwalbenartiger Flug vor allen Papageien auszeichnet, bedürfen selbstverständlich eines sehr langen Gebauers, und Papageichen — Fledermauspapapeien? — verlangen Gelegenheit, sich an der Käfigdecke zu Ruhe mit den Füßen festhalten zu können. Zu diesem Zweck sind jedoch nicht die Drahtstäbe gedacht, sondern praktisch angebrachte Zweige; ähnliche Vorrichtung beanspruchen die Mausvögel. Dem Eulenpapagei müßten wir die Winter- und Sommerwohnung mit Moos auslegen und einige hohle Wurzelstöcke hineinbringen. Unleugbar lassen sich die Verhältnisse der absoluten Freiheit in der Gefangenschaft beim besten Willen nur höchst unvollkommen wiedergeben, indes doch immer so, daß die überkommenen Eigenschaften der Tiere nicht ausgeschaltet zu werden brauchen. Und dieser Umstand fördert die Anpassung wilder Tiere an die neue Heimstätte.

Einen sachgemäßen Wohnraum muß eine naturgemäße Ernährung zur Seite gestellt werden. Bei den Papageien geben Form von Schnabel und Zunge eindeutigen Aufschluß. Ich erinnere nur an die Pinselzüngler, die Loris. Allein, es gibt normal denkende, gebildete Menschen, die mit einer herzerfrischenden Naivität ausgerüstet, Wunderdinge vollbringen. So versorgte eine geistreiche Dame ihren großen Gelbhaubenkakadu mit Pumpernickel und Milch; sie war baß erstaunt, als ich sie auf die völlig unrichtige Pflege des Vogels aufmerksam machte. „Er lebt aber doch", ja ja, aber wie und wie lange. Allerdings besitzt so leicht kein Tier eine gleich außerordentliche Gabe der Anpassungsfähigkeit an ungewohnte Sachlagen wie der Papagei. Die mir bekannte, vernünftige Jungfer Soundso fütterte eine prachtvolle Gelbnackenamazone ausschließlich mit den Speisen, die sie selbst verzehrte: Eierkuchen mit Blaubeeren, Kartoffelsuppe mit Gänseklein, Kalbsbraten mit jungem Gemüse usw. Und der Vogel pfiff, sang und sprach, daß es eine Lust war, ihn anzuhören.

Trotzdem und alledem müssen wir den durch das Bedürfnis in der jungfräulichen Natur geschaffenen Organen Rechnung tragen durch sachgemäße Lebenshaltung. Der höchste Gipfel, zu dem sich die menschliche Einsicht erheben kann, ist das Erkennen der reinen Natur.

Rotschwänze — Phoenicurus *(Forst.)*.

Eine Monographie von John Kuntzendorff.

(Nachdruck verboten.)

Zu den Vogelgruppen, die über mehrere Erdteile verbreitet sind, gehören die Rotschwänze, Phoenicurus (*Forst.*), denn sie sind nicht nur in Europa, sondern auch in Asien und Afrika, besonders in ersterem, vertreten. Trotz ihrer unter sich verschiedenen Wohn- und Brutgebiete weisen alle Rotschwänze dieselben Charaktereigenschaften und dieselbe Lebensweise auf, so daß man eine allgemeine Beschreibung der einzelnen Arten voranschicken kann.

Es sind gewandte, lebhafte, unruhige und flüchtige Gesellen, die stets munter und guter Dinge, fortwährend in Bewegung sind und auf dem Boden wie im Fliegen die gleiche Fertigkeit besitzen. Wenn sie auch zum größten Teile nicht den guten Sängern zugerechnet werden dürfen, so ist doch der Gesang, so anspruchslos er sich anhört, vielfach anheimelnd und nett. An ihrer charakteristischen Haltung erkennt man diese Vögel schon von weitem, schlank und mit aufgerichtetem Körper sitzen sie auf ihrem Standort, nach fliegenden wie kriechenden Kerfen ausspähend, ruhig da. Ab und zu wird diese Bewegungslosigkeit durch schnelle Bücklinge unterbrochen, begleitet von wippenden oder zitternden Bewegungen

Gartenrotschwanz (s. S. 88.)

ihres Schwänzchens. Schlanker Körper, ziemlich lange Flügel, die über den gerade abgeschnittenen, in der Verlängerungslinie des Körpers oder etwas hängend getragenen Schwanz liegen, hochläufige, schwächliche Füße, pfriemenförmiger, an der Spitze zu einem Häkchen gebogener, nicht eingekerbter Schnabel mit meist sehr deutlich entwickelten Schnabelborsten, lockeres meist nach Geschlecht und Alter verschieden gefärbtes Gefieder kennzeichnen des weiteren die Rotschwänze. Im Fluge bewegen sie sich schnell, leicht und unregelmäßig wellenförmig, indem sie größere wie kleinere Bögen abwechselnd ausführen. Ihre Wohngebiete sind sehr verschieden; die einen bevorzugen das Gebirge, zum Teil auch das Hochgebirge, die anderen tiefer gelegenes Land oder das Flachland, diese Wälder, jene bewohnte Gegenden, andere wieder die Ufer reißender Gebirgsbäche. Sie bauen ihre Nester in Höhlungen, Löcher oder Ritzen schroffer Felswände, Mauerspalten an Gebäuden, auf Balkenköpfen, in Baumhöhlen, auf deren Anfertigung sie nicht viel Mühe verwenden, sondern nur Wurzeln, Pflanzenfasern, Halme zusammentragen

und einzig bei der Auspolsterung der Mulde mit Federn, Haaren, Wollflocken und dergleichen einige Sorgfalt an den Tag legen. Das Gelege dürfte durchschnittlich aus 5—6 Eiern bestehen, die beide Eltern abwechselnd etwa 13—14 Tage eifrig bebrüten*). Sie zeigen eine sehr große Anhänglichkeit ihrer Brut gegenüber und sind um ihre Jungen sehr besorgt, so daß sie dadurch sofort den Standort des Nestes oder ihrer Jungen verraten. Nach den einheimischen Rotschwänzen zu urteilen, werden wohl alle Arten jährlich zwei Gelege haben.

Als Käfigvögel sind die Rotschwänze, trotzdem sie größten Teils zu den weichlicheren Stubenvögeln gehören, sehr zu empfehlen, einerseits wegen ihrer zierlichen Bewegungen und ihres sympathischen Wesens, andererseits wegen ihrer Farbenschönheit wie leichter Unterhaltung und Reinhaltung ihrer Behausungen. Auch, daß sie ihre schönen Farben in der Gefangenschaft nicht nur nicht einbüßen, sondern diese nach jeder Mauser bei sachgemäßer Pflege an Schönheit

Graubauchdrongo
(s. S. 49).

gewinnen, stempelt sie zu angenehmen Zimmergenossen, besonders, da sie dem Pfleger gegenüber bald zahm und zutraulich werden und manche Arten einen sehr hübschen Gesang besitzen. Infolge ihrer eleganten Bewegungen gewinnen sie sehr in einem möglichst großen Gebauer; am besten hält man sie in Flugkäfigen oder Volieren, in denen ihr schöner Flug und ihr interessantes Wesen am meisten zur Geltung kommen, jedoch muß man dabei Vorsicht walten lassen, da einerseits viele Rotschwänze streit- und zanksüchtig sind, andererseits man auch wieder diese vor Angriffen anderer Vögel schützen muß.

Die Klassifizierung der Rotschwänze nehme ich nach der Kleinschmidt'schen Methode vor, die sie in selbständige Untergruppen oder Formenkreise gruppiert und die Zugehörigkeit der einzelnen Arten am besten dartut:

1. Die Formenkreise der beiden europäischen Rotschwänze.
2. Die Formenkreise der beiden kurzflügligen Rotschwänze.
3. Der Formenkreis Erithacus hodgsoni.
4. Der Formenkreis der afrikanischen Rotschwänze.
5. Die Formenkreise der vier asiatischen Gebirgsrotschwänze.
6. Die Formenkreise der beiden Riesenrotschwänze, unter Zuziehung von Chaimarrhornis.

1—4 sind Vögel, die an menschlichen Wohnstätten oder in deren Umgebung nisten und zugleich im Gebirge wohnend und brütend angetroffen sind. Die Riesen- und Gebirgsrotschwänze hingegen sind ausgesprochene Gebirgsvögel. Die Verwandtschaft der einzelnen Arten läßt sich durch die Ähnlichkeit des weiblichen Gefieders dartun, wenn das männliche andere Färbung zeigt, wie auch durch Vorhandensein oder Fehlen gemeinsamer Brutgegenden.

Der Formenkreis — Erithacus phoenicurus, erstreckt sein Verbreitungsgebiet über Europa, Südwestasien und Nordafrika. In ihm werden vereinigt Erithacus phoenicurus *(L.)*, E. algeriensis *Kl.* und E. mesoleucus *(Hempr. & Ehr.)* und E. bonapartei *(v. Müll.)* Im allgemeinen ähneln sich diese vier Arten sehr, die Hauptunterscheidungsmerkmale sind: E. phoenicurus und E. algeriensis gräulichbraune Oberseite, E. mesoleucus und bonapartei reingraue; phoenicurus dunkelbraune Schwingen mit fahl rostfarbenen Säumen, kein Flügelspiegel, algeriensis dunkelbraune Schwingen mit rahmfarbenen Säumen, angedeuteter Flügelspiegel; mesoleucus schwärzlichbraune Schwingen mit weißen Säumen nnd fahl hellbraunen Spitzensäumen, großer Flügelspiegel; bonapartei desgleichen, doch Bauchmitte rotbraun. Die Farbenverteilung und -nüanzierung variiert bei jeder Art.

Der Gartenrotschwanz — Erithacus phoenicurus (*L.*)

♂ ad: Schmaler das Auge einschließender Stirnstreif, Kopfseiten, Kinn, Kehle tief schwarz; übriger Teil der Stirn, Scheitel, über die Augen hin, die Ohrgegend begrenzend weiß, in der Breite variierend und in die bläulich graubraune Färbung der Oberseite übergehend; Bürzel, Oberschwanzdecken rostrot, desgleichen auch Kropfgegend, Oberbrust, Brustseiten, die nach hinten allmählich heller werden; Unterbrustmitte, Bauchmitte weißlich; Flügelfedern dunkelbraun, außen fahl rostrot gesäumt, kleine Flügeldecken aschgrau; Schwanzfedern rostrot, mittelstes Paar dunkelbraun, rostrot gesäumt. ♀ ad: oberseits bräunlichgrau; Bürzel, Oberschwanzdecken, Flügel und Schwanz wie beim ♂; Unterhals, Brust weißlichgrau, rostfarben verwaschen; übrige Unterseite trübweiß. Jugendkleid: oberseits braungrau, die Federn dunkelbraun gesäumt mit rostroten Spitzenflecken; Kehle düster gelblichweiß, fein dunkelgrau gefleckt; Schwanz fahlgelblich rostfarben; Schwingen breit heller rostrot gesäumt; Unterseite düsterweiß mit dunkelbraunen Federrändern. Bei

*) Es sind Fälle bekannt, in denen sich das Männchen am Erbrüten der Eier nicht beteiligte. R.

jungen ♂ sind Bürzel und Schwanz lebhaft roströt. Lg. 140, Fl. 76—83, Schw. 57—61, Schn. 11—12, Lf. 20,5—21,5 mm.

Das Verbreitungsgebiet dieses bei uns gern gesehenen Rotschwanzes ist Asien, wo er sich östlich bis Jenessei und Lena vorfindet — äußerste Ostgrenze Sajangebirge und Baikalsee — und südlich im Kaukasus und Europa, mit Ausnahme von Spanien, wo er nur im Norden vorkommt, und Griechenland, das er nur auf dem Zuge berührt. Im allgemeinen begleitet er den Menschen bei seinen Siedlungsversuchen, ist daher stets in der Nähe menschlicher Wohnstätten zu finden; in Gärten, Parks, ja sogar inmitten der Städte und Dörfer schlägt er seine Behausungen auf. Aber ebenso wird er tief in den Wäldern gefunden, entfernt von menschlichen Niederlassungen, vorzugsweise in der Nähe von Wasser. Er liebt dicke Kopfweiden und Hecken aus alten Hainbuchen. Ins Gebirge geht er bis zu einer Höhe von 2500 m hinauf. Nach Radde kommt

Braunohrbülbül
(s. S. 40).

E. phoenicurus im Kaukasus zusammen mit seinem nahen Verwandten, E. mesoleucus, vor, und zwar ist ersterer dort im Hochgebirge vorherrschend, während letzterer die mittleren und tiefer gelegenen Gebiete als Wohnstätten sich ausgesucht hat, doch kommen beide Arten, sogar in den Tiefländern, nebeneinander vor. Durch Angaben ehemaliger kaukasischer Auslandsdeutscher wird dieses bestätigt; diese haben beide Arten im Kaukasus sogar brütend angetroffen, an der Küste, wie z. B. in Sotschi und Umgebung, wie auch höher hinauf im Gebirge. Nach Bogdanow wurde phoenicurus bis zum Paß des großen Kaukasus angetroffen. Zum Winter sucht er wärmere Gegenden auf und zieht nach West-, Nordost-, Zentralafrika und Persien.

Er ist lebhaft, gewandt und dreist, aber Menschen gegenüber nicht zutraulich, sucht sich vorstehende Zweige, Pfähle, Gartenzäune, Dächer als Sitzgelegenheit aus, von wo er kopfnickend, sich verbeugend und schwanzwippend in aufrechter Haltung nach Insekten Ausschau hält. Der Flug ist leicht, schnell und wellenförmig. Der Lockruf klingt hell pfeifend, der Gesang ist unbedeutend und besteht aus kurzen Strophen aus flötenden und sanften Töne, in welche er Laute anderer Vögel vermengt. Seine Nahrung besteht aus allerhand Kerbtieren, die er entweder von den Blättern oder vom Boden aufliest, oder wie die Fliegenschnäpper fliegend im Fluge erhascht, wie auch aus Würmern und Beeren. Anscheinend findet nur eine Brut statt, anfangs April; beide Gatten brüten. Das Nest wird in Baum- oder Mauerlöchern, Felsspalten, Reisighaufen, in Erdlöchern und in Nistkästen angelegt und mit Haaren, Federn oder Wolle gepolstert. Das Gelege besteht meist aus 6 hellblaugrünen Eiern, deren Farbe bis ins dunkelblaugrüne variiert und die zuweilen fein rot gepunktet sind. Es findet nur einmal im Jahre, im Juli-August, eine Mauser statt.

Der Gartenrotschwanz gehört zu den weichlicheren Vögeln, seine Haltung erfordert sorgsamste Pflege. Ältere, frisch eingefangene Vögel sind sehr stürmisch und lassen sich nicht leicht eingewöhnen. Bei jung gefangenen gestaltet sich diese bedeutend leichter, sie geht am leichtesten bei Fütterung von Würmern, Raupen, Fliegen, Ameisenpuppen vonstatten. Das Futter besteht am besten aus einem Gemisch von Ameiseneiern, Weißwurm, Muska, mit einer kleinen Beigabe von geriebenem Eierbiskuit, angefeuchtet mit geriebener Möhre. Eingewöhnt, wird der Rotschwanz zahm und zutraulich und nimmt seinem Pfleger die Mehlwürmer von der Hand. Dann hat man an seiner Haltung viel Freude, denn er ist ein munterer, lebhafter Vogel, der ständig in Bewegung, durch sein sympathisches Wesen sich die Zuneigung des Liebhabers schnell erwirbt. Der Gesang ist, wenn auch niedlich, so doch unbedeutend.

Den Hauptreiz gewinnt die Käfigung des Gartenrotschwanzes bei Unterbringung dieses Vogels im Flugraum, denn in diesem kommt sein munteres Wesen und seine Flugfertigkeit erst richtig zur Geltung. Während man im allgemeinen hört, die Gartenrotschwänze wären unverträglich, kann ich dem nicht beipflichten, weder in meinem Vogelhause in Zürich, noch in dem Flugraum in Frohnau haben sich die dort fliegengelassenen Exemplare als streitsüchtig erwiesen. Somit ist die Verträglichkeit dieser Art eine rein individuelle und man muß bei der Unterbringung in Volieren große Aufmerksamkeit und

Sorgfalt walten lassen. Die Züchtung ist nach mehrfachen, vergeblichen Versuchen 1904 in einem Kistenkäfig geglückt, wobei beide Gatten abwechselnd gebrütet haben. Nach 14 Tagen waren 6 Junge geschlüpft. Bei einem anderen Versuch, Brutdauer 13 Tage, beteiligte sich nur das Weibchen am Brutgeschäft. Daß eheliche Treue bei schon gepaarten Vögeln und eine schon geschlossene Ehe nicht immer eingehalten wird, beweist ein Erlebnis, das ich mit einem einjährigen Gartenrotschwanz hatte. Im alten Apfelbaume, vor der damaligen Vogelstube, hatte ein altes Rotschwanzpärchen, das alljährlich wiederkehrte, seine gewohnte Behausung wieder bezogen und angefangen, sie instand zu setzen. In der Vogelstube befand sich in einem Käfig ein noch nicht ausgefärbtes, fleißig singendes, einjähriges Männchen, das durch seinen Gesang die Aufmerksamkeit des alten Weibchens im Garten erregte. Ein Locken hin und her begann und schließlich besuchte das ungetreue Weibchen den gefangenen Vogel und versuchte vergebens, zu ihm in den Käfig zu gelangen. Durch die vielen täglichen Besuche des weiblichen Vogels erregt und vor lauter Liebessehnsucht vergaß das junge Männchen das Fressen, so daß, um ihn am Leben zu erhalten nichts anderes übrig blieb, als ihm die Freiheit wiederzugeben. In der äußersten Ecke des Gartens, möglichst entfernt vom alten Pärchen, erhielt er diese und benutzte seinen ersten Flug in die Natur, um sofort von hoher Warte aus das Weibchen emsig zu locken. Sofort hatte sich dieses eingestellt und das nun beginnende Liebesspiel wurde in jäher Weise von dem alten, farbenprächtigen, verlassenen Männchen gestört, das, seine älteren Rechte geltend machend, sich auf seinen Rivalen stürzte. Bei dem sich nun entspinnenden Kampfe zog das jüngere Männchen den kürzeren und entfloh, gefolgt von dem Weibchen, eifrig verfolgt von dem siegreichen Männchen, das aber trotz seines Sieges das Weibchen nicht zur Umkehr zu bewegen vermochte. Denn am nächsten Tage hatte es sich wieder im Garten eingestellt, jedoch allein. In der Folgezeit aber erfreute es uns mit einem neuen Weibchen und einer stattlichen Kinderschar; wo das geflüchtete Rotschwanzpaar aber sich angesiedelt hatte, konnte ich nicht ermitteln. Man sieht, daß bei den Vögeln, die monogam veranlagt sind, auch Eheirrungen vorkommen können und daß der dazu Anlaß gebende Teil hier das Weibchen war, da dieses es war, welches mit dem Locken zuerst begann. (Forts. folgt).

Die Fruchtbarkeit der Mischlinge.

(Eine Antwort auf Frage 4.)

Von Rudolf Neunzig.

(Nachdruck verboten.)

Die Frage der Fruchtbarkeit (Fertilität) bzw. Unfruchtbarkeit (Sterilität) bewegt seit langem die Gemüter nicht nur der Vogelzüchter, sondern auch der Wissenschaftler. Sie ist bisher, soweit ich unterrichtet bin, keineswegs endgültig gelöst.

Bei der Einteilung der Mischlinge geht man meist von der systematischen Verwandtschaft der Eltern aus, die nicht immer eine natürliche zu sein braucht, und bezeichnet sie als Rasse-, Art-, Gattungs- usw. Mischlinge (Blendlinge, Bastarde, Hybriden). Diese Einteilung ist soweit unnatürlich, als die systematische Stellung den wirklichen verwandtschaftlichen Verhältnissen, die ja auch häufig schwer zu ergründen sind, nicht immer entspricht.

Einen neuen Weg zur Erforschung der verwandtschaftlichen (genealogischen) Zusammenhänge der Vogelwelt hat Professor Poll gegeben, in dem er die Mischlingskunde

Kronenmeise (s. S. 49).

in ihren Dienst stellte. Er hat versucht, die Fruchtbarkeit der Mischlinge in ein Verhältnis zu den verwandtschaftlichen Beziehungen der Stammeltern zu bringen. Die systematisch durchgeführten Versuche wurden an Arten der Wildenten, Fasanen und Finkenvögel im Berliner Zoologischen Garten durchgeführt und zeitigten eine Anzahl auch für den Vogelliebhaber wertvoller Ergebnisse.

Wir müssen zunächst auf den Ursprung der neuen Lebewesen, das zwei Eltern zeugen, zurückgehen auf die mütterliche Keimzelle, die Eizelle, und auf die väterliche, die Samenzelle. Sie sind bei den höheren Tieren die Elemente, durch deren Vereinigung ein neues Lebewesen entsteht. Beide machen eine mannigfaltige Entwicklung durch, die sich in den Keimdrüsen, Eierstock und Hoden abspielt, ehe sie die Fähigkeit zur Fortpflanzung erlangen. Eine Anzahl von Teilungs- und Entwicklungszuständen, die als Ei- oder Samen-Reifung bezeichnet werden, sind nötig bis sie das endgültige und letzte Stadium, das reife

befruchtungsbedürftige Ei und die reife, befruchtende Samenzelle geworden sind. Es würde zu weit führen, auf alle die Einzelheiten dieser interessanten Vorgänge einzugehen.

Dies alles spielt bei der Zeugungsfähigkeit der Mischlinge untereinander eine wesentliche Rolle. Es hat sich erwiesen, daß eine große Zahl von Mischlingen nicht fähig ist, Nachkommen zu erzeugen. Die Gründe hierfür sind in Störungen bei der Ei- oder Samenreifung zu suchen. Sie bleibt auf irgendeiner Phase der Entwicklung stehen und gelangt nicht zu ihrem natürlichen Ende, liefert Geschlechtsprodukte, die verkümmert und daher nicht fortpflanzungsfähig sind.

Die Fähigkeit, Nachkommen zu erzeugen, wird als ein Zeichen gemeinsamer, naher Abstammung aufgefaßt, so kann auch unter Umständen die Unfähigkeit dazu als ein Zeichen entfernter Verwandtschaft aufgefaßt werden. Der Grad dieser Verwandtschaft wird dann der entfernteste sein, je früher die Störungen in der Entwicklung der Keimzellen auftreten und wird der nächste sein, wenn diese Störungen überhaupt nicht auftreten. Zwischen diesen beiden Extremen liegen eine Anzahl verschiedener Grade der Verwandtschaft, die sich je nach dem Auftreten der Störungen und Hemmungen in der Entwicklung der Samenreifung richten.

Demnach stehen sich zwei große Gruppen von Mischlingen gegenüber, die theoretisch Fruchtbaren, welche in ihren Keimdrüsen reife Samenfäden oder Eier entwickeln und die theoretisch Unfruchtbaren, die dazu unfähig sind. Es ist damit nicht gesagt, daß jeder Mischling, der nicht fähig ist sich fortzupflanzen, unfruchtbar ist. Die Unfruchtbarkeit, Sterilität, in dem oberen Sinne, läßt sich nur mikroskopisch nachweisen. Es treten häufig Fälle auf, daß theoretisch fruchtbare Mischlinge nicht in der Lage sind, sich fortzupflanzen. Hier liegen Ursachen zugrunde, die mit den vorher erwähnten Vorgängen nichts zu tun haben. Zustände, die irgendwelcher krankhaften, physischen oder chemischen Natur sein können, spielen hier eine Rolle. Es kann z. B. der Fall eintreten, daß die Anzahl der reifen Samenfäden im Hoden des Männchens äußerst gering an Zahl ist, so daß höchst selten ein Ei befruchtet wird, oder es können die Eier irgendwelche Mängel haben u. a. Häufig spielt auch mangelhafte Ernährung und Pflege der Eltern und Jungen eine Rolle.

Praktisch sind natürlich diese Mischlinge unfruchtbar. Doch besteht bei ihnen die Möglichkeit, daß sie doch einmal erfolgreich brüten.

Es ist vor allen Dingen durch eine richtige, planmäßige Fütterung danach zu streben, den Elterntieren und den Jungen eine natürliche, vitaminreiche Ernährung zukommen zu lassen. Dann werden vielleicht Mischlinge, die an der Grenze der Fruchtbarkeit zur Unfruchtbarkeit stehen, doch noch fähig sein, Nachkommen zu erzeugen. Es wird auch häufiger der Fall sein, daß manche Mischlinge, die schon wiederholt bei einem und dem anderen Liebhaber Nachzucht in der zweiten Generation geliefert haben, bei dem andern, der weniger Wert auf eine planmäßige Fütterung legt, nicht zur Fortpflanzung zu bewegen sind. So sehen wir der Ursachen viele, die die Fähigkeit der Mischlinge, sich fortzupflanzen, verhindern: Einerseits ungenügende Produktion von Keimzellen, unbekannte, teilweise vielleicht auch bekannte, chemische und physische Hindernisse; ungenügende Ernährung der Elterntiere und Jungen bei den theoretisch Fruchtbaren, praktisch häufig Unfruchtbaren. Auf der anderen Seite steht das Heer der Unfruchtbaren, denen von vornherein die Möglichkeit genommen ist, sich fortzupflanzen. Die Ursachen liegen hier, wie schon ausgeführt, in den Störungen bei der Entwicklung der Keimzellen.

Die Angaben über die Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit der Mischlinge von Finkenvögeln lauten, wie schon erwähnt, verschieden. Von ein und derselben Mischlingsform liegen verschiedene Berichte vor, die im Gegensatz zueinander stehen. Hier wird von Unfruchtbarkeit, dort von Fruchtbarkeit bei Zuchtversuchen von Mischlingen untereinander berichtet, auch so ist es oft der Fall, wenn versucht wird, den Mischling mit einer Stammform zurückzukreuzen. Die Mitteilungen hierüber lauten sehr verschieden und erwecken den Eindruck großer Unregelmäßigkeit.

Die größte Zahl von Finkenmischlingen sind zweifellos von Männchen der verschiedenen Finkenarten mit Weibchen vom Kanarienvogel erzielt worden. Bei der nahen Verwandtschaft des letzteren mit dem Girlitz ist es auch wiederholt gelungen, die Mischlinge Girlitz-Kanarien untereinander zu kreuzen und erfolgreich zu züchten. Je entfernter nun der Grad der natürlichen Verwandtschaft ist, der hier mit der Systematik bei vielen Arten übereinzustimmen scheint, desto schwieriger scheint es zu sein, diese Finkenmischlinge untereinander erfolgreich zu züchten. Die Kreuzung von Stieglitz, Zeisig und Grünling mit dem Kanarienvogel ist wiederholt erzielt worden, während sie mit Hänfling und Gimpel etwas schwieriger zu sein scheint. Doch sollen nach den Angaben von Ehrat (Schweiz. Blätt. f. Ornithol. 1910, p. 287, Bastard-Bastard-Zucht) auch von Stieglitz-Mischlingen untereinander gezüchtet sein.

Nach den Untersuchungen von Poll und Tiefensee an den Hoden der Finken-Kanarienbastarde zeigten sie alle, Stieglitzkanarien, Girlitzkanarien, Grünlingkanarien, Hänflingkanarien und Zeisigkanarien, daß sie fruchtbare Mischlinge sind. Die Hoden untersuchter Stieglitzkanarien zeigten ein recht verschiedenes Bild, in dem einen fanden sich eine große Anzahl von Samenfäden vor, während bei einem anderen nur ganz wenige Samenfäden nachweisbar waren. Wahrscheinlich bestand bei dem ersten Fall die Möglichkeit der Weiterzüchtung, während sie im zweiten sehr fraglich oder gar fast ausgeschlossen ist. Auf jeden Fall erwiesen sich sämtliche oben angeführten Mischlinge als fruchtbar, in ihren Hoden fanden sich entwickelte Samenfäden vor, deren Zahl, wie bereits erwähnt, bei den Stieglitzmischlingen sehr schwankend war.

Über Züchtungen von Mischlingen an Kanarien mit den Sperlingen liegen bisher keine einwandfreien Ergebnisse vor, ebenso von Mischlingen mit Ammern und Webefinken einerseits und Kanarien andererseits. Hier eröffnet sich für den Liebhaber ein großes Betätigungsfeld. Er kann durch planmäßige Zuchtversuche dazu beitragen, wissenschaftliche Arbeiten zu fördern, indem er genaue Angaben über seine Zuchterfolge macht und zur gelegentlichen Bearbeitung sein

einwandfreies Material denen überläßt, die zur Bearbeitung desselben berufen sind. Hier zeigt sich wieder der enge Zusammenhang von Wissenschaft und Vogelpflege, deren Zusammenarbeit oftmals zur Förderung beider recht gedeihlich werden kann.

Kleine Mitteilungen.

Auslandsbericht. In England werden ab 1. Januar 1925 die beiden dort bestehenden großen Vogelliebhabervereine, The Avicultural Society und The Foreign Bird Club, zu einem einzigen Verein verschmolzen, und zwar mit der sehr berechtigten Begründung, daß ein starker Verein besser ist als zwei schwache. Der Einigung gingen langwierige Verhandlungen voraus, die hauptsächlich die finanzielle Lösung betrafen. Die Avicultural Society ist 1894 gegründet und etwa 10 Jahre älter als der Foreign Bird Club. Alle Mitglieder dieses Klubs werden automatisch von der A. S. übernommen; der Klub hört auf zu bestehen, ebenso das von ihm herausgegebene Monatsheft. Es ist klar, daß die A. S. und ihre Zeitschrift The Avicultural Magazine durch diese Verschmelzung nur gewinnen können. Am 1. Januar 1924 betrug die Mitgliederzahl 385; im Laufe des Jahres 1924 sind 47 Neuaufnahmen erfolgt. Die Übernahme der Foreign Bird Club Angehörigen wird die Zahl wohl noch um einige Hundert erhöhen.

Über die Zucht des Gelbrückenwidafinks, Penthetriopsis macrura (Neunzig S. 398 u. Gef. Welt 24 Nr. 44) schreibt W. Shore-Baily im Novemberheft der A. S., daß er eine Anzahl dieser Tiere aus Senegambien erhielt. Im Winter blieben die Vögel in geschützter Voliere. Zu Beginn des Frühjahres 1924 kamen sie ins Freie. Im Juni legten zwei der Widas das Hochzeitskleid an, entpuppten sich also als Männchen. Gleichzeitig begannen auch zwei der Weibchen mit dem Nestbau, doch ging eins derselben noch im Laufe des Sommers ein. Bei dem anderen Paar baute das Männchen in eine Tanne das Nest, das vom Weibchen ausgepolstert wurde; es war das übliche Widanest mit seitlicher Öffnung. Es wurden zwei Eier von grüner Farbe mit rotbraunen Flecken gelegt; diese Eier sollen größer und stärker gezeichnet gewesen sein, als die der Gelbrückenwitwe, die von Unganda herstammt. Dreizehn Tage betrug die Brutdauer; nur ein Junges kam aus, das die ersten Tage von der Mutter ausschließlich mit Insekten gefüttert wurde, später jedoch auch mit Sämereien. Trotz des schlechten Wetters gedieh das Junge prächtig und war bald selbständig; z. Z. (Oktober 1924) ist es wie die Mutter befiedert, aber ohne gelben Schulterfleck. Es dürfte sich hier wohl um die erstmalig gelungene Zucht in der Gefangenschaft handeln.

Demselben Züchter gelang vor einigen Jahren die Kreuzung der weibl. Gelbrückenwitwe mit dem C. ardens (Schildwitwe S. 395) einerseits und der Urobrachya axillaris (Rotschulterwitwe S. 400) anderseits. Das Kreuzungsprodukt mit C. ardens war genau so befiedert wie die Gelbrückenwitwe, jedoch von schmächtigerem Körperbau. Dr. Luig.

Ebenso wie Herr Spille, habe ich im Sommer 1923 von einem Paar braunbunter **japanischer Möwchen** ein gelbbuntes Junges erzielt, während die anderen Jungen derselben Brut sowohl als auch die vorhergehender wie auch nachfolgender Bruten stets braunbunt ausfielen. Dies ist leicht erklärlich. In solchen Fällen handelt es sich um Rückschläge. Bei oben erwähntem Paare stammte das Weibchen von braun- und gelbbunten Eltern. Es kommt dann vor, daß mal ab und zu von solchen braunbunten Vögeln ein gelbbuntes Tier fällt. Bei einem mir befreundeten Liebhaber erbrütete beispielsweise ein Paar grüne Wellensittiche in fast jeder Brut neben grünen Jungen 1—2 gelbe. Als dann plötzlich das Weibchen starb und das Männchen mit einem anderen grünen Weibchen verpaart wurde, fielen keine gelben Vögel mehr. In diesem Falle muß das Weibchen von grünen und gelben Eltern abgestammt haben, hatte also gelbes Blut in sich. Bei Möwchen von verschiedenen Farben fielen die Jungen stets gemischt, doch waren überwiegend braunbunte dabei. Ich bin auch eifriger Möwchentaubenzüchter. Doch dies nur nebenbei. Bei dieser Rasse kann man auch alle möglichen und unmöglichen Rückschläge beobachten. So fielen bei mir von einfarbigen schildige (mit farbigen Flügeln) oder von glattköpfigen gehäupte, und auch umgekehrt. In Nr. 34 der „Gef. Welt" S. 272 (1924) berichtet ein Liebhaber, bei dem ein Paar blaue Brieftauben neben einem normal gefärbten blauen Jungen in zwei Bruten ein weißes erbrüteten; sonderbarerweise war das weiße Junge stets blind.

A. Schiebe, A. Z. 282.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf dem Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Brummund, Prenzlau, Neustadt 692a. 5 Pfäffchen, 1,0 Jakarinifink.

Jos. Fiesel, Karlsruhe (Baden), Klauprechtstr. 47, 4. Stock. Wander-Drossel, Rotbauch-Drossel.

Hoffmann, Magdeburg, Sieverstorstr. 42. 2,2 Maskenamadinen.

Max Kleinert, Berlin NO 18, Strausbergerstr. 13, Fernruf Alexander 3313. Schamadrosseln, Schamaweibchen, Goldstirnblattvögel, Orpheusgrasmücke, Katzendrossel, schwefelgelber Tyran, Goldkopfstar, dreif. Prachtglanzstare, Langschwanz-Glanzstar, Zebrataubchen, Gilb- und Tahaweber, schneeweiße Nachtigallkanarien, tarant. Unzertrennliche, Molukkenkakadu, roter Arara.

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a. Schamazuchtweibchen, Damadrosseln, Dayaldrosseln, Männchen, Zuchtweibchen, Bergrötel (ind.), Goldstirnblattvögel, Blaubartblattvögel, Rubinnachtigall, Mennigvogel, Graubauchdrongo, graublauer Fliegenschnäpper, Braunrückenstrauchschmätzer, Weibchen, Braunbrüstige Blauschnäpper, Borstenhäherling, Schwarzkappentimalie, 1 kleine Haubentimalie, Braunkopftimalien, Braunscheiteltimalien, Rotaugentimalien, indischer Grauwürger, indische Maskenwürger, Rostbäuchige Flötenwürger, Würgerschnäpper, Weißschulterdrosselschmätzer, Rostbauchdrosselschmätzer, Kaprötel, rote Kardinäle, Weibchen, Papstfinken, Indigofinken, Vielfarbenfinken, Organisten, Kaptäubchen, Tovisittiche, Mohrenkopfpapageien, Tahaweber.

A. Petermann, Glauchau, Theaterstr. 53. Stieglitz-Bastardhahn.

F. Pistor, Apotheker, A.Z.-Mtgl. 3, Oberaula, (Bz. Cassel). 0,1 Stieglitz×Grünling.

Otto Steinhagen, Lübeck, Beckergrube 7, I. 2,0 Zeisig× Grünfinkbastard, 1,1 hell gez. Stieglitzkanarienbastard, Nacken, Rücken, Brust, Schwanz weiß, 1,0 Girlitzkanarienbast., 2,6 Fußkanarien, 1 Kiebitz, 0,1 Steinkauz.



Herrn J. Sch., Westenholz. Gesunde Gimpel sind sämtlich zur Züchtung brauchbar. Man nimmt gern für derartige Zuchtversuche aufgepäppelte oder wenigstens sehr zahme Weibchen. Das ist aber nicht durchaus notwendig. Der Züchtungsversuch kann im Zimmer wie in Flugräumen im Freien vorgenommen werden. Es können auch mehrere Zuchtkäfige, die etwa 1×1½, 0,75 m groß sind, in einem Raum stehen. Die Vögel können auch jetzt noch beschafft werden. Besondere Zuchtanweisungen für Gimpelzüchtung gibt es nicht. Wenn alles beachtet wird, was darüber in „Einheimische Stubenvögel" steht, so ist das Weitere den Vögeln zu überlassen.

Herrn A. S., Oldenburg; Herrn A. D., Berlin SO; Herrn A. R., Stargard; Herrn W. Sch., Frankfurt a. M: Beiträge dankend erhalten.

Herrn M. K., Lüdenscheid. Zur Reproduktion ist die zuletzt gesandte Bearbeitung verwendet, besten Dank.

Herrn W. S., Berlin-Steglitz. Die Mönchgrasmücke war ein Weibchen. Sie ist infolge einer mit Abzehrung verbundenen Ernährungsstörung eingegangen.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite).

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Die Rätsel des Vogelgesangs. Von Karl Reich, Bremen. (Schluß.)
Sumpfrohrsänger. Von Paul Schwarz, Leipzig. (Schluß.)
Neueinführungen und Seltenheiten. Von K. Neunzig. (Forts.)
Anpassung. Von Emil Kaforke, Berlin.
Rotschwänze. — Phoenicurus (*Forst.*). Eine Monographie von John Kuntzendorff.
Die Fruchtbarkeit der Mischlinge. (Eine Antwort auf Frage 4.) Von Rudolf Neunzig.
Kleine Mitteilungen – Vom Vogelmarkt – Redaktionsbriefkasten – Aus den Verbänden – Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. 1. Vors.: Hermann Höhne, Leipzig-Vo., Eisenbahnstraße 84 VI. 1. Schriftführer: Max Hunger, Leipzig, Inselstraße 17 II. — Wir teilen mit, daß folgende Vereine neu aufgenommen worden sind: Verein für Vogelschutz, -pflege und -liebhaberei zu Aue i. Erzgeb., Anschrift: Albin Pollmer, Aue i. Erzgeb., Steinstraße 3; Zier- und Singvögel-Verein in Bernsbach i. Erzgeb., Anschrift: Albin Drechsler, Bernsbach i. Erzgeb., Nr. 65c. J. A.: Hunger, Schriftführer.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen. Alle Vereine und Liebhaber, die unserem Verbande bereits angeschlossen sind, bitten wir an dieser Stelle nochmals, die restlichen Mitgliedsbeiträge unserem Kassierer Herrn Erich Merz, Berlin-Friedenau, Wilhelm-Hanff-Str. 141 II, umgehend einzusenden. Vereine und Liebhaber, tretet unserem Verbande bei und unterstützt unsere gute Sache. J. A.: Erich Merz.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden. J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

Denjenigen Mitgliedern, die ihrer Beitragsverpflichtung entsprochen haben bzw. s. Zt. die Bestandsangabenliste einsandten, ist inzwischen das neue Jahrbuch zugestellt worden. Ich bitte die mit der Beitragszahlung noch rückständigen Mitglieder sofort Mk. 3,50 auf Postscheck-Konto Hannover 56714 des Schatzmeisters Herrn Eduard Schütze einzuzahlen, damit die Zustellung erfolgen kann. — Angemeldet sind die Herren G. Beyer, Liegnitz, Schützenstr. 14; A. Knoll, Studienrat, Groß-Umstadt i. Hessen; Ludwig Wolf, Obersäger, München, Hirschbergstr. 2/4. A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen. J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen. J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurter Str. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. V.: Emil Ivo, Schriftführer.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Die Vereinssitzungen finden jeden 4. Sonntag im Monat, abends 6 Uhr beginnend, in unserem Lokal „Thüringerhof", Mallinkrodtstr. 180, statt. Liebhaber jederzeit herzlich willkommen. Der Vorstand.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Protokoll der Mitglieder-Versammlung vom 3. Januar 1925. Punkt 1. Das Protokoll der letzten Mitglieder-Versammlung wurde vorgelesen und einstimmig genehmigt. Zu Punkt 2 wurden die rückständigen Beiträge an den Kassierer bezahlt. Punkt 3. Jetzt begann unsere schöne Weihnachtsfeier im Kreise der Damen und Kinder. So weit es eben möglich war, waren trotz des schlechten Wetters die Frauen der Kollegen zur Feier vollständig erschienen. Unter dem Anbrennen der Lichter am Weihnachtsbaume und dem Absingen der Lieder „Stille Nacht" usw. wurde die Feier eingeleitet, und nun kam plötzlich ganz überraschend der Knecht Ruprecht mit einem vollen Sack Geschenke beladen auf dem Rücken für unsere lieben Kinder. Da gab es vorerst eine große Furcht, denn ein jedes Kind wurde getadelt oder gelobt vom Knecht Ruprecht; und die nicht artig waren, auch die großen Kollegen, bekamen die harte Rute zu schmecken. Sodann aber lachten die Kleinen als der Knecht Ruprecht die Geschenke verteilte, und der böse Knecht war beliebt bei allen. Sodann wurden die Geschenke unter die Mitglieder (welche sich gegenseitig selbst beschenkt hatten) verlost, wobei es viel Humor gab. Kollege Luig hatte viel Glück und bekam eine schöne Kuckucksuhr. Zwischendurch wurde zur gemütlichen Stimmung außer den Weihnachtsliedern humoristische Vorträge und Couplets vom Stapel gelassen, auch für die Damenwelt fehlte der Schaukelwalzer nicht. Um unsere Verhältnisse aufzubessern, wurde zum Schluß die amerik. Versteigerung abgehalten. Kollege Lappe hatte ein amerik. Gimpel mit Bauer und Kollege Staube eine Zimmerlinde gestiftet. Im gemütlichen Kreise vereint blieben wir alle bis 12 Uhr nachts zusammen. Allen Mitgliedern sei für ihr Streben zur Förderung unserer edlen Liebhaberei und für ihre Mitarbeit herzlich gedankt. Möge uns das Jahr 1925 bessere Zeiten bringen zum Wohle unserer gesamten deutschen Waldvogelliebhaberei.

Protokoll der Mitglieder-Versammlung vom 25. Januar 1925. Um im neuen Jahre für unseren Verein mehr Werbetätigkeit zu üben, hatte der Vorstand in einer hiesigen Tageszeitung eine Vereinseinladung für fremde Kollegen losgelassen. Zu unserer größten Freude konnten wir auf dieses Inserat hin, gleich zu Beginn der obigen Sitzung, 6 neue Kollegen im Verein begrüßen, welche einstimmig ihren Beitritt in unseren Verein erklärt haben. Wir bitten alle noch fremden Herren sich nunmehr hierin „Groß-Dortmund" in unsere Reihen zusammenzuschließen, damit unser Verein blühe und gedeihe für das Wohl unserer echten Waldvogelpflege. Zu Punkt 2 wurden die rückständigen Beiträge bezahlt. Zu Punkt 3 und 4 wurde beschlossen einige Ausstellungsplakate und 5 Diplome für unseren Verein zu bestellen. Punkt 5. Es wurde angeregt, jetzt da unser Verein größer wird, neue Mitgliedskarten und Statuten drucken zu lassen. Vorher sollen die alten Statuten noch berichtigt werden. Zu Punkt 6: Verschiedenes wurde beschlossen, die losen Zeitungen aus 1924 für unsere Bibliothek einbinden zu lassen. Der Vorstand.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schrift.

Verein Vogelschutz u. -pflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Schiller-Restaurant", Ecke Stifts- und Ehrlichstr. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Bernhard Kühn, Vor.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag den 17. Februar 1925. Gäste, auch Exotenliebhaber, stets willkommen. J. A.: Arnold Weber, 1. Vor.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1886. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst., Boppel, 1. Schrift.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vor.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.

J. V.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Jahresbericht 1924. Am 21. Januar d. J. fand unsere Generalversammlung mit folgender Tagesordnung statt: 1. Verlesen des Protokolls. 2. Bericht des Gesamtvorstandes. 3. Neuwahl desselben. 4. Anträge. 5. Vereinsangelegenheiten. 6. Beobachtungen in Natur und Daheim. In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt. 1. Vorsitzender Karl Scholtissek, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30. 1. Schriftführer Wilhelm Maresch. 1. Kassierer Richard Michaelis, Leipzig-Lindenau, Odermannstraße 11. Archivar Richard Müller. Aus dem Jahresbericht wäre folgendes zu erwähnen: Da bei Beginn des Jahres 1924 die wirtschaftliche, sowie finanzielle Lage im allgemeinen wieder gefestigt war, wurde beschlossen, unsere Vereinssitzungen nicht mehr in Wohnungen der Mitglieder, sondern im Gosenschlößchen, Leipzig-Plagwitz, abzuhalten. Am 18. Februar fand unsere 1. Sitzung daselbst statt. Hierbei wollen wir noch der Liebenswürdigkeit unseres Schriftführers Herrn Wilh. Maresch und seiner Gattin gedenken, welche in der schweren Zeit uns allen über ein ½ Jahr einen behaglichen Aufenthalt bereitete. Wir bitten unsere einstigen Gastgeber, den innigsten Dank des Vereins entgegenzunehmen. Der gleiche Dank gebührt Herrn Paul Scherling für die Stiftung einer Vereinsstandarte. Es fanden 24 Sitzungen sowie eine Generalversammlung statt, welche immer sehr gut besucht waren. Im Laufe des Jahres wurden 10 Herren in den Verein aufgenommen. Dank der besseren wirtschaftlichen Verhältnisse konnte der Verein in diesem Jahre verschiedenes Anschauungsmaterial anschaffen. Als Fachschrift lagen die Gefiederte Welt sowie die Wochenschrift für Liebhaber fremdländischer und einheimischer Vögel und wissenschaftliche Bücher aus. Die Vereinsabende wurden ausgefüllt mit lehrreichen Diskussionen, Gedankenaustausch über Eingewöhnung, Käfigung, Mauser, Krankheiten, deren Ursache und Verhütung derselben, ferner über Beobachtungen in der Natur sowie Ankunft und Abzug unserer Vogelwelt. Vorträge wurden gehalten vom 1. Vorsitzenden über Eingewöhnung von Körner- und Weichfressern. 2. Über das Leben des Heuschreckenrohrsängers oder Schwirl. 3. Der Wiedehopf. Desgleichen von Herrn Kliebe über Eingewöhnung der Weichfresser. Herr Wilhelm Maresch über Erlebnisse aus seiner Gefangenschaft in Frankreich, welche er zum großen Teile in Wäldern verbrachte. Außerdem wurden viele in das Fach der Stubenvogelliebhaberei einschlägige Fragen berührt und soweit wie möglich beantwortet. Zwecks ornithologischer Studien beteiligten sich die Vogelfreunde stark an den festgelegten Ausflügen, am 18. April Halbtagswanderung nach Gundorf, am 10. Mai Nachtausflug nach Dürrenberg, 15. Juni zum Schkeuditzer Auwald, 20. Juli Familienausflug nach Großzschocher, 14. September Besuch der Sümpfe bei Gundorf. Bei letztgenanntem Ausflug hatten wir leider die Rechnung ohne das Hochwasser gemacht. Nach einem gründlichen Fußbade verlegten wir unser Ziel nach den höher liegenden Feldern von Dölzig und zuletzt in den Bienitzwald. Am 20. September fand unser 1. Stiftungsfest unter Mitwirkung des Reingold-Quartetts Leipzig im Gosenschlößchen, Leipzig-Plagwitz, statt, wobei alt und jung auf ihre Rechnung kamen. Vom Briefwechsel der Vereins waren zu melden 20 Eingänge (14 Briefe, 6 Karten). Dem standen 19 Ausgänge (5 Briefe, 13 Karten, 1 Postanweisung) gegenüber. Vom Kassenbericht ist kurz zu erwähnen:

Übertrag 1923	Mark	000,00
Einnahme 1924	„	247,07
Ausgabe 1924	„	187,99
Kassenbestand	Mark	59,08

Aus diesem kurzen Berichte ist zu ersehen, daß der Verein in seinem ersten vollen Geschäftsjahr in bezug auf seine Mitgliederzahl wie Fundierung seiner Kasse gute Fortschritte gemacht hat. Möge auch fernerhin unserem Verein ein stetes Blühen und Gedeihen beschieden sein.

J. V. Karl Scholtissek, 1. Vors.
Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, dem 19. Februar 1925. Gäste stets willkommen.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung bei unserem Mitgliede Herrn Normast im Gasthof „Kaiser Friedrich", Breslauer Str. 50. Liebhaber sind als Gäste willkommen. J. A.: Friedrich.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am zweiten Mittwoch eines jeden Monats Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Straße. Beginn 8 Uhr. Gäste sind willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Magdeburg-West, Schenkendorfstr. 14.

Zusammenkunft! Alle Liebhaber exotischer Vögel aus Magdeburg und Umgebung werden gebeten, sich an einem Sonntag in einem noch zu bestimmenden Lokal in Magdeburg zu treffen. Zuschriften mit Vorschlägen an den Verlag (Telefon 1323).

Der **Verein der Vogelliebhaber Mannheim** hält aller 14 Tage im Restaurant zum goldenen Falken seine Mitgliederversammlung ab. Nächste Versammlung am Freitag, dem 20. Februar 1925 und so fort. Freunde und Gönner stets willkommen.

Der Vorstand. J. V.: Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). An jedem zweiten Mittwoch im Monat findet in unserem Vereinslokal „Parkhotel", Epinaystraße 1, unsere Versammlung statt. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an.

Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegründet 1. Mai 1923. Vereinsabende aller vier Wochen, in der ersten Woche des Monats verbunden mit Vortrag, in der dritten Woche jeden Monats nur gesellige Zusammenkunft. Vereinslokal „Sächsischer Hof". Gäste stets willkommen.

Studienrat Professor Jahn, 1. Vorsitzender.

Zoolog. Verein zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

J. A.: Paul Schmidt, 1. Vorsitzender, Zwickau i. S., Bosenstr. 44.

Die Vereinigung hannov. Vogelliebhaber will dem Vogelpfleger Ratgeber und Helfer sein, will die Liebe zum Tier und zur Natur wecken und stärken, will beitragen zum Kennenlernen der Vögel in Wald und Flur. Monatlich einmal kommen die Mitglieder zusammen, tauschen die Erfahrungen aus, hören Vorträge aus allen Gebieten der Vogelkunde, -schutz und -pflege an. Ein- oder zweimal im Jahre veranstalten wir große Lichtbilder- und Film-Abende. Im Frühjahr finden Beobachtungsausflüge unter Führung statt. Den Mitgliedern stehen zahlreiche Fachzeitschriften und Bücher kostenlos zur Verfügung. Regelmäßig berichtet die Zeitschrift nieders. Vereine über unsere Veranstaltungen. An den Vereinsabenden ist Rat und Auskunft, Kauf- und Tauschgelegenheit geboten. Jahresbeitrag Mk. 2,—, für Auswärtige und Schüler Mk. 1,—. Anmeldungen an Heinz Appel, Nienburgerstr. 7A I. Auskunft: Buchhändler A. Troschütz, i. Fa. Cruses Buchhandlung, Gr. Ägidienstr. 4.

Die Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber. hatte alle Naturfreunde Hannovers zum 19. und 20. Januar in die Handelsschule Buhmann eingeladen, um der Vorführung einiger Naturfilme beizuwohnen, die die Vereinigung im Interesse des Naturschutzgedankens mit erheblichen Selbstkosten für ein geringes Eintrittsgeld veranstaltet hatte. Zahlreich war man der Einladung nachgekommen, so daß der große Saal der Handelsschule fast bis auf den letzten Platz besetzt war. Leuchtenden Auges folgten alle, Erwachsene wie Kinder, den Vorgängen auf der Leinwand, die durch einen mit heißer Liebe zur Natur durchglühten Vortrag des Museumsdirektors Dr. Weigold eingeleitet und erläutert wurden. Zu Anfang des Abends hatte der Vorsitzende der Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber, Heinz Appel, mit einigen Worten die Ziele des Vereins dargelegt, der dem Vogelpfleger Rat und Helfer

(Fortsetzung auf der 4. Umschlagseite.)

sein, die Liebe zum Tier und zur Heimat wecken und stärken und zum Kennenlernen der Vögel in Wald und Flur beitragen will. An diese Worte schloß Dr. Weigold an. Er wies darauf hin, welche Gefahren der Tierwelt und besonders unseren Vögeln durch den Eigennutz des Menschen drohen, wie Heide, Wald und Strand entvölkert und ihres Schönsten des lebendigen Treibens unserer Lieblinge, beraubt werden, wenn nicht das Gewissen des Volkes erwache, das dem Morden Einhalt gebiete. Durch die Vogelschutzbewegung ist schon manches gebessert worden, aber erst die Schaffung von Tierfreistätten und die scharfe Durchführung von Schonzeiten und Verboten hat einen wirksamen Heimat- und Naturschutz möglich gemacht. So sind mit der Zeit Naturschutzgebiete entstanden, die den Tieren ein ruhiges, von Verfolgungen freies Leben gestatten. Sie haben erfreulicherweise bereits dazu beigetragen, Deutschland einige seltene Arten zu erhalten, die sonst sicherlich für unsere Fauna verloren gewesen wären. Zwei dieser Schutzgebiete wurden im Film vorgeführt; die Ostseeinsel Hiddensoe und das Steinerne Meer unweit Berchtesgaden an der deutsch-österreichischen Grenze. Die Bilder, die gezeigt wurden, waren über alles Lob erhaben und erfüllten alle Zuschauer mit Entzücken.

Wie dankbar muß man den Photographen sein, daß sie keine Mühe gescheut haben, um diese Tierurkunden auf die Platte zu bannen. Einer monatelangen Arbeit hat es oft bedurft, um nur ein einziges Bild herzustellen. Zuerst mußte die Scheu der Tiere überwunden werden, die sie vor dem ratternden Aufnahmeapparat hatten. Stundenlang mußten die Photographen täglich im Wasser stehen, um endlich den Film eines brütenden Vogels oder das Herausschlüpfen und Gefüttertwerden der Jungen zu gewinnen. Und welche Schwierigkeiten machte es, hoch oben, in über 2000 Meter Höhe, das Nestleben eines Königsadlerpaares oder auch das Treiben der flüchtigen Gemsen oder der vorsichtigen Murmeltiere festzuhalten! Aber auch die schönen Bilder unserer brütenden Singvögel und Reiher in der Ebene sowie die vom Tierleben im deutschen Walde verdienen die höchste Anerkennung. Auch hier bedarf es geduldigsten Ausharrens und höchster photographischer Erfahrung. — So boten die beiden Abende des Guten und Schönen sehr viel. Mit dankbarem Herzen verließen die Zuschauer die Vorstellungen mit dem festen Vorsatz, alles, was in ihren Kräften steht, zu tun, um den Zielen der Naturschutzbewegung zum Erfolg zu verhelfen. **Klocke.**

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Käfige u. Gerätschaften



Schlagnetze für Sperlinge, Amseln usw. 2.50 ℳ, für Tauben, Rebhühner usw. 4.50 ℳ. Nachn., bei Voreinsendung des Betrag. franko. [266] Fangnetzfabrik
K. E. A. Müller, Schlotheim Th. 3.



Neueste
Preisliste
über alle Arten
Vogelkäfige
aus Hartholz versendet gegen Einsendung von 25 Pfg. in Marken
Thür. Vogelkäfig-Fabrik
Adolf Vogt & Co.
[267 **Ebeleben 667.**

Voliere
1.50 brt., 70 tief, 90—1.10 hoch, 70—80 ℳ
Verzinnte u. lackierte Drahtkäfige, mit u. ohne Glaswände, Stck. 6—10 ℳ
Käfigständer und Tische 9—15 ℳ
Harz. Roller 9-15, **Vorsäng.** 15-30 ℳ
Zuchtweibchen 4 ℳ [268
Eigene Großzüchterei
J. Stenger, München, Türkenstr. 53/2

Futtermittel

Vogelfutter [269
für **Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser.** Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Mehlwürmer Pfd. 5 ℳ, 6 Pfd. 30 ℳ frc. Nachn.
270] **Jeltner, Breslau,** Weinstr. 12.

Mehlwürmer
pro 1/4 Pfund ℳ 2.— liefert franko [271
Reichard, Berlin N, Böttgerstr. 23.

Versäumen Sie nicht das Abonnement der „Gefiederten Welt" zu erneuern!

Reform-Käfige

Zerlegbar, Leichteste Reinigung, Einfachster sicherer Transport
1. Preis beim Käfig-Wettbewerb Leipzig 1919/22 (siehe Gefiederte Welt 1920, Heft 14—16), Goldene Medaille Leipzig 1921/22 werden für alle Vogelarten hergestellt.

Ausführung: Hartholz, grünlackiert oder naturlackiert, Zinkschublade, Porzellannäpfe, Ledertuchdecke.

Keine Fabrikware, sondern beste Spezialarbeit!
Anfertigung als Kistenkäfig oder Wiener Form (halboffen) oder halboffen mit fester Rückwand. Ohne jedes Werkzeug in einer Minute zusammengestellt resp. zerlegt. Verpackung zum Selbstkostenpreis.
Fertigen auch jede Art Käfige u. Volieren n. Zeichnung od. Maßangabe

Heck-, Flug-, Einsatz-Käfige.
Ausstellungs-Käfige nach Vorschr. d. V. D. K.
Transport-Käfige, jeden Posten.

Anfragen Rückporto beifügen. Katalog gegen Einsendung von 0.50 M. in Briefmarken. [272

Schlagnetze ohne Mittelsteg
für schädliche Vögel, prima handgeknüpfte Ware.
Kühn & Muschter, Leipzig,
Promenadenstraße 29. Telephon 10 226.
Bankkonto: Allgem. Deutsche Credit-Anstalt Zweigstelle Borna; Stadt-Girokasse Borna b. Leipzig Nr. 1506. — Postscheck.: Leipzig 92 250.
Zahlreiche Anerkennungs- und Dankschreiben.

Heidelberger Vogelfutter

nach Angaben von **Prof. Dr. Otto Fehringer.**

1. **Braune Packung**	(Erdsänger)	. . .	1 1/2 Pfd.	R.-M. 5.25
2. **Graue** „	(Grasmücken)	. . .	2 „	„ 6.00
3. **Blaue** „	(Drosseln)	. . . .	2 „	„ 3.00
4. **Rote** „	(Stieglitze)	. . . .	1 1/2 „	„ 0.90
5. **Grüne** „	(Hänflinge)	. . . .	1 1/2 „	„ 0.90
6. **Gelbe** „	(Kanarien)	. . . .	2 „	„ 1.00

Alle Anfragen über Pflege unserer heimischen Käfigvögel werden sachgemäß gern ausführlich beantwortet. Rückporto erbeten. [273

Fabrik für Heidelberger Vogelkäfige und Vogelfutter
A. Böcher & Co., Heidelberg-Kirchheim.

274] **Mehlwürmer,** reine Ware
gegen Einf. von 1.75 ℳ 1/4 Pfd. franko
Th. Witte, Niederndodeleben b. Magd

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd
franko versend. **D. Waschinski & Co.**
Biesenthal I (Mark). [27

Mehlwürmer rein vegetabilisch ernährt, à Lite
(ca. 600 g) R.-M. 8.—, 1/4 Liter (ca. 150 g
R.-M. 2.— **franko** bei Voreinsendung des Betrages. [27
Bonitas-Versand, Rostock i. M. III

Prima **Ameiseneier** pro Pfund 8.— ℳ
„ **Weißwurm** „ „ 8.— ℳ
„ **Muska** „ „ 3.— ℳ
„ **Trocken-Eigelb** „ 4.— ℳ
„ **Körnerfutter** „ „ 0.60 ℳ
Versand erfolgt per Nachnahme oder vorher. Einsendung. [27
Postscheckkonto: Berlin Kt.-Nr. 158990
Friedr. Gust. Müller, Zoolog Handl.
Berlin SW 61, Blücherstr. 61.

Mehlwürmer
à Pfund 5 ℳ, bei 6 Pfund Porto und Verpackung frei.
Ia Ameiseneier . . . à Pfd. 8 ℳ
Ia Weißwurm . . . à „ 6 ℳ
Ia Muska-Zecken . . à „ 3 ℳ
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen . . . . à Pfd. 1 ℳ
Ia Garnelen, gem. à Pfd. 0.40 ℳ

Ia Universalfutter.
Alecwa I für Nachtigallen 2.— ℳ
„ **II für Grasmücken** 1.80 ℳ
„ **III für Drosseln** . 1.50 ℳ
Proben und Analysen zur Verfügung. Vertreter oder Wiederverkäufer erhalte hohe Rabatte. [27

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
A. Eckrich II., Waldsee (Pfalz)

Ia Deutsche Ameisenpuppen (192 pro Pfund 8 ℳ,
Ia Eibweißwurm (1924), pro Pfund 5 ℳ. [2
Versand erfolgt per Nachnahme. Anfragen bitte Rückporto. [2
Hermann Arold, Berlin N 5
Zoologische Handlung, Fransecky-straße

Getrocknete Ameisenei
à Kilo ℳ 14 gibt ab [2
R. Seyfert, Magdebur
Zoologische Handlung. Lödischehofstr.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 26. Februar 1925 | Heft 9

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Wieder eine Vogelstube!

Von Dr. A. Schramm, Karlstadt am Main.

(Nachdruck verboten.)

Wieder eine Vogelstube! rufe ich frohjauchzend aus in der wohl für die meisten Fälle nicht irrtümlichen Meinung, daß jeder, der das Glück hat eine Vogelstube zu besitzen, mir meine Freude nachzufühlen imstande ist. Ob mir jedoch Herr Neunzig, unser allverehrter Schriftleiter der „Gefiederten Welt", ohne weiteres beistimmt, bezweifle ich, wenn er immer und immer wieder Berichte über Vogelstuben zur Begutachtung ihrer Tauglichkeit für die Spalten der uns Vogelliebhabern so vertraut gewordenen Wochenschrift durchlesen muß. Vielleicht ruft er auch beim Empfange meiner Mitteilung aus: „Wieder eine Vogelstube!", aber in ganz anderer Betonung der Worte, als ich sie auf diese lege. Und wie viele Leser der „Gefiederten" werden mit ihm den gleichen Unwillen empfinden und mißlaunig auf den langweiligen und eintönigen Inhalt der Zeitung schimpfen, weil sie so wenig für sie, die Nörgler, bringt, da sie ja in der Vogelpflege ganz andere, von ihnen die als die allein maßgebend und richtig erkannten Ziele verfolgen. Glücklicherweise gibt es aber auch andere Leser, ich nehme sogar an, daß es die größere Anzahl der Leser unserer an jedem Donnerstag sehnsüchtig erwarteten Zeitschrift ist, der Leser meine ich, die jeden darin enthaltenen Aufsatz mit ungeteilter Aufmerksamkeit und mit Liebe zur Sache durchlesen. Zu diesen „freundlichen" Lesern der „Gefiederten Welt" gehöre ich selbst. Wenn man auch ziemlich oft Allbekanntes vor die Augen bekommt, so erlahmt doch nicht die Anteilnahme an den zugunsten der gefiederten Lieblinge mit innerlicher Zufriedenheit und Glückseligkeit geschriebenen Schilderungen gleichgesinnter Vogelliebhaber. Und wenn die neueste Nummer der „Gefiederten" von A bis Z durchgelesen ist, was sich auch auf die Anzeigenseiten bezieht, dann sucht man sich alte Jahrgänge der Zeitschrift hervor und liest immer und immer wieder von neuem die „ollen Kamellen" in den Berichten über das Leben und Treiben der gekäfigten Vögel. Dabei werden alle menschlichen Leidenschaften erregt: Zustimmung oder Zweifel, Mitgefühl oder Schadenfreude, liebevolle Teilnahme oder Mißgunst bis zum schnöden Neid, besonders dann, wenn ein mit dem nötigen Klein- oder vielmehr Großgelde beglückter Vogelliebhaber in den Besitz eines für den armen Schlucker nicht erreichbaren, aber von ihm mit allen Fasern des Herzens begehrten Vogels gelangt ist, ihn pflegen und beobachten darf. Wiederum liest man mit Vergnügen die Berichte über das Leben der Vögel in der Vogelstube, über ihr gegenseitiges Betragen, über ihre Mucken und Launen, über ihre Lebenszähigkeit oder ihre Hinfälligkeit, über Brüterfolge oder -mißerfolge und bildet sich dann selbst ein Urteil darüber, was man seinen gefiederten Lieblingen gegenüber versäumt hat zu tun oder was man zu beobachten nicht aufmerksam genug gewesen ist. Kurz und gut: Nichts ist dem Vogelliebhaber und -Pfleger wohl lieber und angenehmer als sich mit Gleichgesinnten über die Leiden und Freuden seiner gefiederten Freunde auszusprechen und Gedanken auszutauschen. Dazu bietet die „Gefiederte Welt" in so schöner und ungezwungener Weise Gelegenheit, was vor allem der einsichtsvollen Führung der Schriftleitung zu verdanken ist, die einem jeden die Spalten öffnet, der sich dazu berufen fühlt, weil sein Herz voll, die Beobachtungen an seinen Lieblingen niederzuschreiben und hinaussenden zu lassen in die weite Welt, um auf diese Weise sich geistig und seelisch mit gleichgesinnten Vogelliebhabern in Verbindung zu bringen, mag die räumliche Entfernung noch so weit sein. Hierin erblicke ich den großen, gemeinnützigen Vorzug einer jeden Liebhaber-Zeitschrift neben ihrem belehrenden Inhalte, den sie zu bieten bestrebt ist. Daß die „Gefiederte Welt" wertvolle und lehrreiche Mitteilungen in hinreichender Menge seit ihrem Bestehen gebracht hat und immer wieder bringt, beweisen die herrlichen, für jeden Vogelliebhaber unentbehrlichen Ruß'schen Handbücher, die in ihrer letzten Bearbeitung durch Herrn Neunzig wohl unübertroffen dastehen. Denn in diesen Handbüchern über die fremdländischen und die einheimischen Stubenvögel sind in meisterlicher Weise die Erfahrungen in der Vogelpflege verwertet, die von Vogelliebhabern in ihren Berichten der einzelnen Jahresbände der „Gefiederten Welt" niedergelegt sind. Und so bildet fast jeder Bericht in dieser Zeitschrift einen Baustein zum Gebäude, das zu Nutz und Frommen der Vogelliebhaber und nicht minder zum Wohlbefinden unserer gefiederten Lieb-

linge in der Gefangenschaft errichtet ist und immer noch weiter ausgebaut werden soll und muß!

Nach diesen meinen folgenden unbedeutenden Mitteilungen zur Entschuldigung dienen sollenden Leitgedanken beginne ich mit der Schilderung dessen, was meinem Gefühle nach bei dem einen Teil der Liebhaber fremdländischer Körnerfresser Zustimmung und Beifall erwecken, bei dem andern jedoch nur mitleidiges Lächeln oder gar überlegenes Kopfschütteln verursachen dürfte, weil ich ja nur über unwesentliche Vorkommnisse aus dem längst bekannten Leben und Treiben ganz weniger und dazu noch ganz gewöhnlicher Fremdländer berichte.

Die Erinnerung an meine erste, mit etwa 60—70 Vögeln besetzte Vogelstube, über die ich 1911 in der „Gefiederten Welt" Seite 307 berichtet habe und die ich in meiner ehemaligen Wohnung in den Jahren 1910 bis 1914 besaß, hat oft genug in den verflossenen zehn wirtschaftlich bösen Jahren in mir die Sehnsucht nach einer neuen Vogelstube wachgerufen. In diesem Sommer endlich, als ich von Mitte Juli bis Mitte August meinen Urlaub hatte und mir zu einer Reise die nötigen Barmittel fehlten, da benutzte ich die freie Zeit dazu, eine kleine, niedrige Dachkammer mit schräger Decke als Vogelstube für den freien Flug fremdländischer Körnerfresser einzurichten. Frisch ging es an die Arbeit als Maurer, Schreiner und Anstreicher, damit mein Schmuckkästchen entstünde, wie es mir im Geiste vorschwebte.

Vor dem gen Südwesten gehenden Fenster ist am Außenrande des Fenstersimses ein Drahtgitterrahmen befestigt, so daß die Breite des äußeren Fenstersimses gewissermaßen einen schmalen Außenkäfig darbietet. Von der Anbringung eines geräumigen Fenstervorbaues, wie ich einen solchen in meiner ehemaligen Vogelstube vor das Fenster hinausgebaut hatte, dessen Bild sich in meiner obenerwähnten Abhandlung 1911 in der „Gefiederten Welt" Seite 309 befindet und das auch in Neunzigs Einheimischen Stubenvögeln, 5. Aufl., Seite 501 abgedruckt ist, mußte ich diesmal in Hinsicht auf die örtlichen Verhältnisse (Dienstwohnung innerhalb des Fabrikhofes) absehen, was mir um der lieben Vöglein willen recht leid getan hat.

Nachdem durch eine Gitterwand mit Eingangstür der eigentliche, etwa 15 cbm haltende Flugraum und ein Vorraum für die Aufstellung eines Dauerbrandofens und für die im Flugraume notwendigen Verrichtungen abgegrenzt waren, wurde die Ausstattung in der üblichen Weise mit Ästen und Zweigen vorgenommen; auch eine niedrige grüne Tanne in feuchtem Sande stehend und ein in Erde eingepflanzter Wacholderstrauch sowie ein dürrer Schlehenbusch wurden aufgestellt. Efeuranken und Zweige einer Trauerweide hängen aus einem mit Wasser gefüllten Tongefäße an der Gitterwand herab. An den Wänden sind in verschiedenen Höhen mannigfache Nistgelegenheiten, vor allem Flemmingsche Nistkästchen mit und ohne Körbchen, aufgehängt. Bastfasern, Agave- und Kokosfasern, kurz geschnittene weiße Putzwolle, Strohhalme und Holzwolle liegen zusammengehäuft auf der dicken Sandschicht des Fußbodens. Mitten auf diesem stehen die Futter- und Wassergefäße. Als Sparfuttergefäß für das Prachtfinken-Futtergemisch verwende ich wiederum das seinerzeit von mir entworfene und von einem hiesigen Töpfermeister angefertigte zusammensetzbare Tongefäß, wie ich es 1914 in der „Gefiederten Welt" Seite 140 ausführlich beschrieben und in seinen Teilen abgebildet habe. Auch habe ich an der einen Längswand eine kleine Grotte mit flachem Wasserbecken aus Kalksteinen und Portlandzement aufgebaut. Wasser rieselt an den Steinen in dünnem Strahle in das Becken mit Abfluß. Auch stand ein großer Blumenuntersetzer mit Erde und gekeimten Hirsekörnern bereit, an die sich die angekommenen Vögel zuerst heranmachten. (Schluß folgt.)

Dompfaffenzucht.

Von Amtmann Max Krumm.

(Nachdruck verboten.)

F. Schlag, der Altmeister der Dompfaffenpflege, schreibt in seinem Buch „Der Dompfaff, auf Grund 54 jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert", daß er nach vielen Versuchen, Dompfaffen in der Gefangenschaft zu züchten, vor 8 Jahren erst als erstes Resultat Eier und Junge erzielt habe, die aber nach 3 bis 6 Tagen starben. Er brachte es nie zu erwachsenen Jungen; die Jungen, die er später länger am Leben hielt, starben 4 bis 6 Wochen alt sämtlich an Kalkdurchfall. Er glaubt, die Schwierigkeiten darin suchen zu müssen, „daß man im ersten Stadium die Jungen (d. h. die ersten 3 bis 4 Tage) das Naturfutter nicht genau kennt und dessen auch nicht leicht habhaft werden kann". Er kommt als Ergebnis aller seiner Bemühungen mit dem Hofrat Professor Dr. Liebe in Gera zu dem Schlusse: „Wartet es nur ab, bis die Jungen ausgeflogen und die erste Mauser überstanden haben, und dann erst verkündet triumphierend: Gimpel gezüchtet!"

Auch ich habe lange Zeit Versuche mit der Dompfaffenzucht gemacht. Das Bild war erst genau so, wie Schlag angibt. Auch ich hatte, wie Schlag, stets das Gefühl, es liegt am Futter. Meine Versuche kamen nicht vorwärts. Immer wieder dieselben Erscheinungen des Mißerfolgs, entweder unbefruchtete Eier, oder das Sterben der Jungen nach kurzer Zeit.

Die Naturbeobachtung und das Verhalten der Vögel in der Gefangenschaft, insbesondere meine vielen Erfahrungen bei der Finken-Bastardzucht, brachten mich auf den Weg. Die Leidenschaft der Finken, namentlich der Zeisige, Distelfinken und Kanarien, besonders aber der Dompfaffen für frische Ameiseneier, sobald man sie daran gewöhnt hat, gab mir zu denken. Ich beobachtete, wie der alte Dompfaff, der sonst Fliegen und Mücken mit keinem Auge ansieht, zur Zeit, als er Jungvögel im Nest hatte, eine Stubenfliege verfolgte. Durch weitere Naturbeobachtung kam ich zu der Erkenntnis, die viele Ornithologen mit mir teilen, daß für alle Finken, auch für die, von denen man es noch nicht bestimmt wußte, das Futter der jungen Brut sich zum Teil aus eiweißreicher tierischer Nahrung zusammensetzt (Mücken, Insekten, Larven usw.). Damit stimmen auch meine Erfahrungen in der Kanarienzucht überein. Die Abneigung, die viele Kanarienzüchter gegen die Fütterung mit animalischen Stoffen, als Ameiseneier usw., hegen,

habe ich nie verstanden; ich habe sie, so gern ich Autoritäten glaube, durch jahrzehntelange Praxis als unrichtig feststellen müssen. Auch der Kanarienvogel braucht zur Brut unbedingt Eiweiß; wenn ihm hartgekochtes Ei verabreicht wird, so ist das selbstverständlich Ersatz für tierische Nahrung. Man beobachte den Gesundheitszustand und die Konstitution von Kanarien, die ohne Eifutter großgezogen sind. Ich führe schon immer den Niedergang der Kanarienvogelzucht, der sich darin zeigt, das die Körperkonstitution immer schwächer wird, daß viele Junge bei der Mauser eingehen und vor allem die Fortpflanzungsfähigkeit sich verschlechtert und bei der Brut alle mögliche Unnatur auftritt (z. B. Ausrupfen der Federn der Jungtiere durch die Alten, vorzeitiges Verlassen der Brut), auf den Mangel an animalischer Kost zurück, unter dem viele dieser Tiere aufgezogen werden.

Ich bin überzeugt und komme weiter unten in der Wiedergabe meiner Erfahrungen eingehender darauf, daß zum Aufbau des Körpers und des Federkleides die Vitamine hauptsächlich in dieser Form aufgenommen wird. Vielleicht ergibt sich daraus eine ganz neue Folgerung für die Aufzucht der Körnerfresser überhaupt, und werden daraus Erfolge erzielt, die man bisher vergeblich suchte. Die Erscheinungen sind zwar bekannt, aber werden meines Wissens nicht genug beachtet. Einen Gedankenaustausch hinsichtlich der Vitamine für Körnerfresser in der gefiederten Welt möchte ich bei dieser Gelegenheit anregen. Es wäre sehr interessant und förderlich.

Ich machte eine verblüffende Erfahrung, die mich ganz besonders auf den Vitaminbedarf hinlenkte. Ich fütterte früher die Dompfaffen zur Zucht genau wie Schlag, d. h. mit allerlei gereiften Sämereien, hauptsächlich Rübsen und Hanf, außerdem gab ich

Gimpel.

Noch etwas anderes brauchen die Finken, und ich habe festgestellt, besonders die Dompfaffen. Es ist Vitamine, Ergänzungsnährstoffe, akzessorische Nährstoffe, Nutramine, zur Ernährung notwendige, noch wenig bekannte, verschiedenartige Stoffe, die in den Pflanzen, besonders in den grünen Teilen, frischen Früchten und Samen enthalten sind. Neben dem Eiweißmangel besteht bei den Dompfaffen, die in der Freiheit in der Hauptsache von Grünem leben, gerade für die Brut ganz besonderer Vitaminbedarf. Trockener Samen, der bisher gefüttert wird, hat ja auch Vitamine, aber weniger. Hartgekochtes Ei hat keine Vitamine, weil die Vitamine ihre Natur sehr leicht ändern und zerfallen, besonders bei Erhitzung. Ich bin nach meiner Naturbeobachtung dazu gekommen — und es ist eigentlich selbstverständlich und klar — daß die Körnerfresser im Frühjahr gerade den Samen recht ungereift und frisch nehmen und verfüttern. Man denke doch, in der Natur gibt es zu der Zeit ja gar keinen ausgereiften Samen. Ei. Mehlwürmer und Ameiseneier (auch Vitamine) gab ich weniger. Ich sah, daß das Weibchen mit Flügelzittern zur Begattung lockte, der Hahn sie auch umschwärmte. Doch waren die Handlungen des Hahns meist matt, wenig begeistert, und stets blieben sie im Versuch stecken. Von dem sonst guten Zuchtpaare hatte ich im selben Jahre zweimal ein unbefruchtetes Gelege von je 6 Eiern. Ich gab die Zucht auf und fütterte nur noch trockene Sämereien. Anfang September setzte ich andere Wildlinge schon zum Winterquartier in den Flugkäfig, der sonst nur dem Eheleben des einzigen Dompfaffenpaares diente. Einem Distelfinken zuliebe warf ich frischen, weichen Distelsamen in der Staude ein, der auch von dem Dompfaffen gern und reichlich genommen wurde. Darauf schritten die Dompfaffen sehr verspätet zu einer dritten Brut. Das Weibchen legte 6 Eier, und es schlüpften 4 Junge aus. Nach 3 Tagen starben sie jedoch. Ihr Tod ist höchstwahrscheinlich auf die große Kälte zurückzuführen, die in der dritten Nacht

eintrat. Das Nest war sehr liederlich gebaut, von mir nicht ausgepolstert (s. unten), weil ich nicht herankonnte, und in jener Nacht hatte es schon gefroren; der Heckkäfig hing draußen auf dem Balkon. Es war ganz natürlich und eigentlich nicht anders zu erwarten, daß die Jungen starben, obschon das Weibchen sie von oben her erwärmte.

Ich habe die durch den frischen Distelsamen mir gewiesene Spur weiter verfolgt und den Vitaminen in frischem Samen die Hauptbedeutung beigelegt. Ei, Ameiseneier und Mehlwürmer fütterte ich schon immer.

(Fortsetzung folgt.)

Spitzschwanzamadinenzucht.

Von Adolf Voigt, Jena-Ost.

(Nachdruck verboten.)

Das war eine gelungene Überraschung, die mir mein Sohn bereitete: Eines Augusttages, am Mittag aus dem Dienst heimkehrend, höre ich schon im Erdgeschoß unseres Häuschens einen sonderbaren melodischen Pfiff vom Vogelzimmer im ersten Stock her. Ehe ich irgend etwas anderes begann, war ich oben, und als ich die Tür zur Vogelstube öffnete, saßen da zwei prächtige Vögel im Sande — Spitzschwanzamadinen, die mein Filius erstanden hatte und heimlich morgens in die Vogelstube gesetzt hatte. Uns allen gefielen sie gleich durch ihr behäbiges, drolliges Wesen, das oft zum Lachen reizt, besonders wenn sie sich unter allerlei quakenden Tönen Liebenswürdigkeiten erweisen. Die Farben unseres Paares stimmen mit der Tafel im „Neunzig" überein, nur die Füße sind kräftig korallenrot, nicht, wie Bild und Beschreibung angeben, fleischfarben. Es mag vielerlei Arten davon in Australien geben.

Das Paar hält treu zusammen, und das Männchen ist sehr liebenswürdig gegen seine Gattin, begleitet sie stets und trägt sein Liedchen in schönen, weichen Tönen vor. Schon am nächsten Tage begann die Untersuchung der vorhandenen Nistgelegenheiten, und ein verlassenes Astrildennest in einem Kieferngebüsch wurde als Schlafnest gewählt. Dem Futter (gelber, großkörniger Hirse, weißer Hirse, besonders dem Glanz) wurde fleißig zugesprochen, flüssiges Eiweiß, Eierbrotgemisch und Ameisenpuppen wurden angenommen, und schon nach 14 Tagen schleppte das Männchen eifrig Grashalme, Agavefasern und Wollgras in ein hoch neben dem Fenster angebrachtes Kieferngebüsch. Bald konnten wir mehrfach Begattungen beobachten, die meistens auf der Erde stattfanden und am 24. August brütete das Weibchen. Eine Sorge bereitete uns der Umstand, daß die frischen Ameisenpuppen zu Ende gegangen waren. Werden die Alten die zu erwartenden Jungen mit gebrühten Ameisenpuppen aufziehen? Wie oft gelingt eine Brut so weit, daß die Jungen ausfallen, oft werden sie auch noch acht Tage gefüttert und dann plötzlich liegen sie tot im Sande.

13 Tage waren um, im Verhalten der Spitzschwänze änderte sich nichts. Das Männchen löste das Weibchen hin und wieder ab — Stimmen wurden nicht gehört. Es wäre dies auch nicht leicht gewesen, denn den ganzen Spätsommer und Herbst hindurch schrieen ständig junge Prachtfinken nach Futter, und die können einen Mordsspektakel vollführen. Aber beide Alten fraßen öfter als sonst, gingen auch an das mit gebrühten Ameisenpuppen gemischte hartgekochte Ei — Weiß und Gelb gewiegt —, nahmen gern Mehlwürmer, die ausgekaut wurden, und waren vor allem begierig auf angekeimte Hirse, die soweit gequellt wird, daß die Keime eben hervorzubrechen beginnen. Naß wird die Hirse in Sandkästen gereicht und bildet das Hauptaufzuchtfutter für Orangebäckchen, Grauastrilde, Tigerfinken, Kubafinken, Mövchen, Silberschnäbel, Edelsänger (!), Amaranten und auch für unsere Spitzschwänze. Und alle die genannten Vögel brachten die Jungen damit flügge!

Am 16. Oktober hörten wir Stimmen in dem Neste, immer noch saß stets eines der Eltern im Neste, die Jungen zu wärmen, obgleich letztere schon 14 Tage alt sein mochten. Und der Lärm wurde immer toller — haben die Kerlchen gute Lungen! Und so ging es noch eine Woche lang. Endlich, am 2. November, saßen drei runde, possierliche Vögel, glatt und wohlgenährt, in der Vogelstube. Sie waren gleich flugfähig. An der Größe des Brustlatzes waren die Geschlechter sofort zu erkennen: zwei Männchen und ein Weibchen. Die Jungen entwickelten einen sehr guten Appetit, unermüdlich fütterten die Alten. Am 20. November, also 18 Tage nach dem Ausfliegen, begannen sie zum ersten Male selbständig zu fressen. Die Alten hatten inzwischen die zweite Brut vorbereitet, das Weibchen begann wieder zu legen und beteiligte sich nicht mehr am Füttern. Der Herr Papa hatte keine gute Zeit, er mußte das neue Nest bauen, die ewig bettelnden Jungen füttern und kam den ganzen Tag nicht zum Stillesitzen. Soviel er auch abwehrte, immer wieder saßen die drei Jungen vor ihm und schrieen mit lauter Stimme nach Futter. Das ging so bis zum 30. November. Da machte er energisch endgültig Schluß mit der Futterei, und die Jungen mußten endlich daran denken, selbständig zu fressen. Zwei taten es auch, aber das dritte, ein großes, stattliches Männchen, ging doch noch ein — mit leerem Kropfe lag es am 2. Dezember im Sande der Vogelstube. Es scheint, die Spitzschwanzamadinenzucht bis zum völligen Selbständigwerden der Jungen ist doch nicht so leicht. Es vergingen vom Legen des ersten Eies bis zum Selbständigwerden der Jungen rund elf Wochen!

Erst am 6. Dezember wurden die Jungen herausgefangen und in einen großen Käfig zu jungen Mövchen gesetzt. Hier benahmen sie sich wie toll: Tobten im Käfig umher, gingen nicht ans Futter, sondern hingen stets am Drahtgitter. Wir mußten den Flugkäfig ins Wohnzimmer bringen. Hier lebten sie verträglich mit den Mövchen und einem Schmetterlingsfinkweibchen, fressen Glanz und Hirse sowie Eifuttergemisch und machen uns durch ihr hübsches Äußere sowie ihr drolliges Benehmen viel Freude. Von der Verfärbung ist noch nichts zu sehen, sie wird wohl viel länger dauern als bei kleineren Prachtfinken. Das Jugendkleid der Jungen ist dem der Alten ähnlich. Der Schnabel ist schwarz, die Füße sind hellfleischfarben, nach zirka elf Wochen beginnen sie

sich korallenrot zu färben, auch der Schnabel wird allmählich heller. Der Kopf ist wie bei den Alten blaugrau, der Gürtel und der weiße Bürzel sind gleich vorhanden, ebenso auch die spitzen Schwanzfedern, wenn auch nicht so ausgezogen wie bei den Alten. Der Brustlatz war, wie schon erwähnt, sogleich bei dem Ausfliegen beim Männchen bedeutend breiter als beim Weibchen. Auch die Locktöne der jungen Männchen unterscheiden sich von denen der Weibchen. Das junge Männchen wurde vom Vater länger gefüttert als die jungen Weibchen.

Das Verhältnis der Spitzschwanzamadinen zu den anderen Vögeln war stets ein gutes. Während der ersten Brutzeit, als das Männchen noch nach Nistgelegenheiten umhersuchte, befürchtete ich oft Störung der anderen Bruten. Aber so kräftig der Vogel auch ist und so keck er am Futternapf Weber und Gouldamadinen vertreibt, kommt er mal dem Kubafinkennest zu nahe, so muß er doch den blitzschnellen, wütenden Angriffen dieser winzigen, schneidigen Kerlchen weichen.

Brütet das Weibchen, so hält das Männchen sich viel in der Nähe des Nestes auf und vertreibt alle Vögel aus dessen unmittelbarer Nähe. Besonders auf die Zebrafinken ist es schlecht zu sprechen, bösartig jedoch ist es nie, auch sind ja alle kleineren Vögel viel schneller, als die dicken, behäbigen Spitzschwanzamadinen. Ich halte sie auch im großen Gesellschaftskäfig für verträglich und glaube auch, daß hierin ihre Züchtung gelingen würde. Zusammenfassend möchte ich sagen, daß wir selten an einem Vogelpaare so viel Freude gehabt haben, als gerade an den Spitzschwanzamadinen. Als harte, verträgliche, hübsche und leicht zu züchtende Vögel können sie jedermann empfohlen werden. Am 14. Februar waren wiederum 2 Junge selbständig, und das Weibchen sitzt schon wieder auf Eiern. Das ist doch eine nette Leistung!

Spekes Webervogel (s. S. 98).

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Das unvergleichlich schöne lichte Metallblau des schuppenartigen Gefieders des Schuppenglanzstars strahlt bei gewissem Lichteinfall wunderbar veilchenfarben, unter schräg zurückgeworfenem Licht kupferrötlich. Diese schillernden Metallfarben, im Gegensatz zu dem reinen Weiß der Unterseite, geben diesem Glanzstar ein ganz eigenartiges Äußere von besonderem Reiz. Hartlaub im Journal für Ornithol. und Heuglin (Orn. Nordostafrika) bemerken, daß der Schuppenglanzstar nicht nur im Gefieder und durch das gänzlich verschiedene Jugendkleid von allen anderen Glanzstaren abweiche, sondern auch im Wesen viel Abweichendes habe. Er gehört nicht zu jenen Glanzstaren, welche in großen Scharen leben. „Zur Zeit der Fortpflanzung gewahrt man diese prachtvollen Geschöpfe meist nur paarweise und mehr im Gebüsch als auf Hochbäumen. Männchen und Weibchen locken einander mit sanftem Pfeifen. Sind sie einmal mit ihren Jungen im Fluge zusammengerottet, so schweifen die Schuppenglanzstare auf Viehweiden und im Hochwalde starenähnlich umher; sie sind dann lebhaft und lärmend, gemeiniglich wenig schüchtern, halten sich aber nicht in dichtgeschlossener Gesellschaft." Was in Vorstehendem Heuglin über die nördliche, in West- und Nordostafrika lebende Form mitteilt, wird voraussichtlich auch auf die südliche Form zutreffen, deren Verbreitungsgebiet sich auf Süd- und Ostafrika vom Orangefluß nördlich bis zum Kongo und bis Uganda erstreckt.

Den Flug vergleicht Heuglin mit dem des Rosenstars, der sich nach Naumann kaum von dem des gemeinen Stares unterscheidet, also reißend schnell ist unter schnurrendem Schlage der spitzen Flügel. Sie laufen und hüpfen viel auf der Erde und im Gezweig, wo sie Würmer, Insekten und deren Larven nachstellen. Im Magen Erlegter fand man auch Reste von Früchten. Sie haben ein ausgesprochenes Badebedürfnis, das sie an den Tränkplätzen sehr ausgiebig befriedigen. Des Nachts pflegen sie familienweise auf einzelnstehenden Bäumen der Ruhe. Über das Brutgeschäft berichtet Stark, daß sie wie andere Glanzstare ihre Nester in Baumhöhlen oder alten

Nisthöhlen der Bartvögel bauen. In die Höhlen tragen sie Wolle und Federn ein, die sie mit grünen Blättern, die häufiger erneuert werden, bedecken. In Transvaal beginnt die Brutzeit im Dezember. Das Gelege besteht gewöhnlich aus vier Eiern von blaßblauer Farbe, welche am stumpfen Ende sparsam blaßbraun gefleckt sind (23 × 17 mm). Der von Fockelmann eingeführte Vogel befand sich noch im Jugendkleid, zurzeit wird er, wie die Vögel des letzten indischen Imports Fockelmanns, von W. Lenger-Berlin in den Handel gebracht.

Gefiederbeschreibung: ♂♀ Oberkörper, Kopf, Vorderhals metallischblau, unter gewissem Licht veilchen- und kupferrot glänzend; Zügel schwarz; übrige Unterseite weiß; Schwingen, Schwanzfedern schwarzbraun bis schwarz; Schwanzfedern, Armschwingen und die dunkelgrauen Unterflügeldecken mit veilchenrot glänzenden Säumen; Schnabel, Füße schwarzgrau; Auge zitronengelb; Lg. 165—180, Fl. 95—110, Schw. 60—70, Schn. 14—16, Lf. 20—21 mm. Am Wurzelteil der äußersten Schwanzfeder ein schwacher, weißer Saum auf der Außenfahne.

Jugendkleid: Oberseits schwärzlich braun mit bräunlichgelben bis rostbraunen Säumen; Kopf hell rostbraun, schwarz gestrichelt; Unterseite weiß mit schwarzbraunen bis schwarzen Strichen; Kropfgegend rostbraun verwaschen; Flügeldecken, innere Schwingen wie Oberseite; übrige Schwingen, Schwanzfedern schwarzbraun; Auge schwarzbraun; Schnabel schwärzlich; Füße bleigrau.

Unter den Webervögeln, welche mit den Importen des vorigen Jahres aus Afrika zu uns gelangten, befanden sich einige Arten, welche das erstemal nach Deutschland kamen oder doch so selten eingeführt sind, daß sie hier Aufnahme finden mußten. Auch sollen sie in Bild und Wort dargestellt werden, weil sie, gleichfalls selten eingeführt, zu allerlei Verwechselungen in den Kreisen der Vogelpfleger, welche sich mit der Haltung von Webern beschäftigen, Anlaß gegeben haben.

Von den Arten, welche noch nie im Berliner Zoolog. Garten gezeigt wurden und wohl auch noch nie nach Europa gelangten, ist in erster Reihe zu nennen

Spekes Webervogel — Ploceus spekei *(Heugl.)*,

welcher einem der vom Berl. Zool. Garten unternommenen Importe aus Nordostafrika entstammt. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich über Somaliland und einen Teil von Schoa. Der Vogel wurde von Kapitän Speke auf dem Plateau des nördlichen Somalilandes häufig angetroffen, wo er „gesellschaftlich im Hochgras leben soll". Unter den wenigen Mitteilungen, welche über diese Art vorliegen, ist noch die Hindes über den Nestbau dieser Art zu erwähnen. „Auch diese Weber bauen ihr Nest an einem Tage, aber ein Paar der Vögel baut oft 4 oder 5 Nester, bevor sie die Behausung für geeignet zur Brut halten. Wo 20 oder 30 dieser Weber auf einem Baume nisten, ist der Boden darunter immer übersät mit heruntergefallenen Nestern in jedem Zustande der Vollendung. Ich habe bis 243 Nester gezählt, die unter einem einzigen Baume lagen".

Gefiederbeschreibung: ♂ Kopfseiten, Kehle in eine kurze Spitze bis auf die Kopfgegend verlängert schwarz; Oberkopf, Nacken, Halsseite, Kropfgegend, in der Mitte ins Goldbraune ziehend, goldgelb; übrige Oberseite grüngelb, die Rückenfedern mit dreieckigem schwarzbraunem Mittelfleck; Unterseite hellgelb; Flügelfedern schwarzbraun mit grünlichgelben Säumen, welche bei den mittleren Deckfedern breiter und gelber sind; Unterflügeldecken bräunlich weiß; Schwanzfedern braun, olivengelblich verwaschen mit schmalen grüngelben Säumen; Auge rotgelb; Schnabel schwarz; Füße rötlichgelb; Lg. 140, Fl. 85, Schw. 50—55 mm. (Abb. S. 97).

Demselben Import entstammt

Rüppels Weber — Ploceus intermedius *Rüpp.*,

der Nordostafrika südwärts bis zum Viktoriasee bewohnt. Er war im Jahre 1887 in einem Stück im Besitz von Dr. Karl Ruß. Über sein Freileben ist nichts Wesentliches berichtet. Er gleicht im allgemeinen dem bekannten Kabanisweber, unterscheidet sich aber hauptsächlich von ihm durch die goldbraune Farbe des Hinterkopfes und des Genickes (s. Abb. S. 101).

Aus Südafrika importierte Aug. Fockelmann unter andern drei Weberarten, welche auf S. 102 in schematischer Darstellung wiedergegeben sind. Der obere Vogel ist der selten eingeführte und unter den importierten Vögeln auch nur in 3 oder 4 Stücke vorhanden.

Gelbscheitelweber — Ploceus spilonotus *Vig.*

aus Südostafrika, der, abgesehen von der Kopfzeichnung, hauptsächlich kenntlich ist durch die Färbung der Nacken-, Rücken- und Schulterfedern, sowie den kleineren Flügeldecken, welche schwarz sind und gelbe Spitzen haben*), während der etwa gleichgroße und mit ihm zuweilen verwechselte

Schwarzstirnweber — Ploceus velatus *Vieill.*

stets an der gelbgrünen Oberseite und den dunkleren Schaftstrichen des Rückengefieders kenntlich ist (s. Abb. S. 102 mittlerer Vogel).

Erwähnenswert ist, was über den Nestbau dieses Webers und sein Benehmen während des Bauens berichtet wird. Nach Stark hat das Nest die Form einer Retorte ohne Hals. Es steht fast immer über dem Wasser oder wenigstens in sumpfigem Gelände. Zuweilen wird es an Zweigspitzen von Büschen und Bäumen angeheftet, meist aber scheint das Nest gebaut zu werden zwischen und an den Stengeln des hohen Riedgrases, das in Sümpfen und seichten Gewässern aufschießt. Beim Bauen haben sie die Gewohnheit, an den Nestern mit den Füßen angeklammert zu hängen und mit ausgebreiteten Flügeln flatternd sich hin und her zu schwenken und zu wiegen, was einen prachtvollen Anblick gewährt, wenn die Vögel in größerer Anzahl in dieser Weise an ihren Nistkolonien beschäftigt sind" (Ayres). Zum Nestbau verwenden sie die roten Randfasern der dicken stark gerippten und geaderten Blätter einer zwerghaften Sansevirenart, „es sind für ein einziges Nest viele Hunderte von Blätter erforderlich". Man findet daher in der Umgebung der Nester dieser Vögel, wie Barber angibt, kein unverletztes Blatt der genannten Pflanze.

Mit dem Schwarzstirnweber wird häufig der

Goldkopfweber — Ploceus auricapillus *Sw.*

verwechselt (s. Abb. S. 102 unterer Vogel). Der Goldkopfweber ist eine Neueinführung. Er unterscheidet

*) Es kommen auch Schwarzstirnweber vor, deren Gefieder am Nacken, Rücken, Schultern vorherrschend gelb ist. Der Schwanz ist dann an diesen Gefiederteilen nur in kleinen meist scharf abgesetzten Flecken vorhanden. *N.*

sich von dem ähnlichen Schwarzstirnweber durch geringere Größe (Lg. 130—150 mm, Schwarzstirnweber 160—170 mm), schmaleres schwarzes Stirnband, lebhaft goldbraunen Scheitel, der bei jenem gelb ist, und überhaupt lebhaftere Färbung. Über das Freileben finde ich keine Mitteilungen.

Gefiederbeschreibung: ♂ Oberkopf goldbraun, Hinterkopf, Nacken, Halsseiten und Unterseite, Oberschwanzdecken lebhaft goldgelb, besonders stark an der Kropfgegend; Rücken, Schulterfedern grünlich goldgelb z. T. mit schwarzen braunen Schaftstrichen; schmaler Stirnstreif, Kopfseiten, Kehle bis auf die Kropfmitte in einer Spitze verlaufend schwarz; Flügelfedern schwarzbraun mit gelben Säumen, Unterflügeldecken mattgelb; Schwanzfedern braun olivverwaschen mit schmalen gelben Außensäumen, Schnabel schwarz, Füße hellhornfarben. Lg. 130—140, Fl. 68—75, Schw. 45—50 mm. (Fortsetzung folgt.)

Rotschwänze — Phoenicurus *(Forst.)*.

Eine Monographie von John Kuntzendorff.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der algerische Gartenrotschwanz — Erithacus algeriensis *Kl.*

Dieser Rotschwanz hat seine Heimat in Algier und kommt vermutlich auch anderorts im nordwestlichen Afrika vor, unterscheidet sich von seinem europäischen Verwandten in seiner Lebensweise und seinem Wesen in keiner Weise, hingegen gestaltlich aber durch etwas stumpferen Flügel, wobei der Abstand zwischen der 5. und 6. Handschwinge kleiner, die 3. bis 5. fast gleich lang sind und die 2. beinahe stets merklich kürzer oder doch nicht länger als die 6. ist. Die Färbung ist dunkler und durchweg lebhaft, die Außensäume der Armschwingen nicht so braun, mehr rahmfarbig. Ein unausgefärbtes junges ♂ hat das Schwarz des Vorderhalses, Brust mit Grau vermischt, das Weiß der Stirn ist noch versteckt. Oberseits graubräunlicholiv verwaschen, große Flügeldecken und Schwingen mit fahlen Säumen. ♀ ad: Oberseits graubräunlicholiv verwaschen, Kinn weißlich, Kropf und Vorderbrust rostgelblich, desgleichen Flanken; Unterseite hell weißlichgrau, fahler Flügelspiegel erkennbar angedeutet. Die Färbung der Oberseite variiert, ebenso das Rostgelbliche der Unterseite; der Flügelspiegel ist öfters kaum oder gar nicht wahrnehmbar. Die bei Kleinschmidt angeführten Maße sind: Fl. ♂ 79—81, ♀ 76 mm. Drei Museumsbälge wurden untersucht. Die Einführung lebender Exemplare ist sehr fraglich und dürfte nicht stattgefunden haben.



Weißflügelrotschwanz.

Der weißflügelige Gartenrotschwanz — Erithacus mesoleucus *(Hempr. & Ehr.)*.

Das Verbreitungsgebiet des Erithacus mesoleucus ist die Krim, der Kaukasus, Transkaukasien, Kleinasien, Persien und Nordafrika. Er überwintert in Abessinien, Arabien und am Senegal. Während der Besetzung der Ukraine im Weltkrieg habe ich ihn im südrussischen Kohlengebiet nördlich der Krim und im Gebiet der Donkosaken östlich Kamienskaja nach Zarizin zu des öfteren beobachtet. Im großen wie im kleinen Kaukasus ist er gemein, besonders in den wärmeren Gebirgsgegenden in tieferer und mittlerer Höhenlage, im Hochgebirge aber ist er seltener. Frühere kaukasische Auslandsdeutsche haben ihn noch hoch ins Gebirge hinauf brütend angetroffen. Er durchwandert auf dem Zuge Syrien, Ägypten und Arabien. Zweimal ist je ein Exemplar auf Helgoland festgestellt worden. In seiner Lebensweise ähnelt mesoleucus mehr dem Hausrotschwanz, während er in seiner Gefiederfärbung dem phoenicurus äußerst gleicht und seine Eier ebenso gefärbt sind, wie die seines europäischen Verwandten.

Er unterscheidet sich von phoenicurus durch folgende Merkmale: reineres, leuchtenderes Weiß an der Stirn, das aber nicht so ausgedehnt ist, wie bei jenem; die ganze Oberseite ist dunkler, reiner, bläulichgrau bis zum Bürzel; dieser, Oberschwanzdecken, Schwanzfedern dunkelbräunlich rostfarben, Mittelfedern dunkelbraun; das Schwarz reicht tiefer auf die Brust herab, die Brust leuchtend hellkastanienbraun, goldig schimmernd; Körperseiten bräunlich rostfarben, Bauchmitte sandfarben. Die ♂ haben dunklere Flügelfedern, von welchen der weiße Flügelspiegel lebhaft absticht. Dieser wird durch breite weiße Säume an der Außenfahne der Arm- und schmale der Handschwingen gebildet; bei den Armschwingen verbreitet sich das Weiß auch als Randlinie auf die Innenfahne; der Schnabel ist größer als bei phoenicurus, ♀♀ sind nach Hartert nicht sicher von denen des phoenicurus zu unterscheiden, mitunter aber besitzen sie Andeutung des Flügelspiegels und Kopfseiten, und Oberseite sind mehr grau. Der Balg meiner Sammlung zeigt folgende Gefiederfärbung: Oberseits bräunlichgrau, vorderer Teil der Kopfseiten, Kinn Kehle hellgrau; Kropf schwach bräunlichgrau, goldig schimmernd, Flanken rostfarbengrau, Bauchmitte hellgrau; Unterschwanzdecken sandfarben, Oberschwanz-

decken, Schwanzfedern rostrot, beide mittelsten braun; Flügelfedern dunkelbraun, an Außenfahne der Hand- und Armschwingen schmal fahl gesäumt; Schnabel und Füße schwarz. Beim einjährigen Vogel ist der ganze Flügel grauer und dunkler, als bei phoenicurus; ein dunkles Rückenband ist bisweilen, auch schon im Jugendkleide, angedeutet. Die Flügelform schwankt; oft ist sie so stumpf, wie man es bei phoenicurus nie beobachtet, oft aber ebenso spitz wie bei letzterem. Kleinschmidt unterscheidet die Vögel vom Nordkaukasus von denen aus den südlich des Kaukasus gelegenen Landstrichen durch spitzere Flügelform. Von einer Lebendeinführung dieses Rotschwanzes nach Deutschland ist mir nichts bekannt, dürfte aber, die Käfighaltung betreffend, an den Pfleger dieselben Anforderungen stellen, wie der Gartenrotschwanz.

Der abessinische Gartenrotschwanz — Erithacus bonapartei *(von Müll.)*.

Ein dem E. mesoleucus äußerst ähnlicher Vogel ist der Erithacus bonapartei. Er unterscheidet sich von diesem nur dadurch, daß bei ihm die Bauchmitte hell kastanienbraun ist und nicht nur Brust und Körperseiten. Außerdem wird bei ihm der große Flügelspiegel durch die breiten Außensäume der Arm- und Handschwingen gebildet, also auch durch breite Säume der Handschwingen, mit Ausnahme der äußeren, während die Handschwingen bei mesoleucus nur schmal gesäumt sind. Die Oberseite ist rein grau. Beheimatet ist der Rotschwanz in Abessinien. Die Lebensweise und das Wesen des abessinischen Rotschwanzes dürfte, ebenso wie seine Wohnstätten, mit denen des mesoleucus übereinstimmen.

Der Formenkreis Erithacus titys.

Die Verbreitung dieses Formenkreises dehnt sich über Europa, Asien und Afrika aus und besteht aus E. titys, E. ochruros, E. ochr. semirufa, E. phoenicuroides und E. rufiventris. Ausgenommen titys, die eine weißliche Unterseite haben, ist diese bei allen übrigen braun und sind sie in ihrer Färbung und Farbenverteilung einander sehr ähnlich. Die Färbung und Nuancierung der einzelnen Arten variieren sehr stark, so daß man, ausgenommen ochruros und semirufa, bei ihnen von Lokalvariationen sprechen kann.

Der Hausrotschwanz — Erithacus titys (*L.*).

♂ ad. Stirn-, Kopf-, Halsseiten, Vorderhals, Brust schwarz, Bürzel, Oberschwanzdecken rostrot; übrige Oberseite bläulichgrau, an dem Scheitel und Nacken heller; übrige Unterseite weißlichgrau. Bauchmitte, Unterschwanzdecken hell rostfarben; Flügeldecken schwarz, heller grau gesäumt, Schwingen schwarzbraun, Handschwingen schmal grau gesäumt, innere Armschwingen breit weiß, einen weißen Flügelspiegel bildend, Unterflügeldecken schwarz, größere weiß gesäumt; Schwanzfedern rostrot, mittelstes Paar braun; Augen dunkelbraun, Schnabel und Füße schwarz. ♀ ad. düster aschgrau; Unterseite heller; Bürzel, Oberschwanzdecken heller rostfarben, Bauch weißlichgrau; Flügel dunkelbraun, fahl gesäumt; Schnabel, Füße schwärzlichbraun. Jugendkleid ähnelt dem des ♀. Lg. 155, Fl. 85—91, Schw. 62—68, Schn. 11—12; Lf. 20—23 mm.

Abgetrennt von Erithacus titys wurde wegen der weit ausgedehnten schwarzen Färbung Erithacus aterrimus *Jerd.* Bei diesen dehnt sich das Schwarz über Kopfseiten, Hals, Rücken, Brust, Flügeldecken aus; Oberkopf, Bauch schwärzlichgrau, Bauchmitte weißlichhellgrau; Bürzel dunkelgrau; Ober- und Unterschwanzdecken rostfarben, letztere heller; Flügel schwärzlichbraun; weißer Spiegel; Schwanzfedern gelblich

Hausrotschwanz.

rostrot, mittelstes Paar schwärzlichbraun. Spanien, Portugal, Mazedonien.

Auch das Verbreitungsgebiet des Hausrotschwanzes ist ein sehr großes, wenngleich es sich nicht so weit nordwärts erstreckt, wie dasjenige des Gartenrotschwanzes. In Europa geht er im Norden bis zum südlichen Schweden, nach Osten zu sind die Grenzen in Polen, südwestlichen Rußland, Rumänien und Bulgarien zu suchen, südlich reicht er bis ans Mittelländische Meer. Auch Kleinasien und Persien sollen zu seinem Verbreitungsgebiet gehören, jedoch scheinen die im nördlichen Asien vorkommenden Hausrotschwänze zu den asiatischen Hausrotschwänzen zu gehören. Ursprünglich Gebirgsvogel hat er sich dem Charakter der betreffenden Teile seines Gebietes gänzlich angepaßt. So kommt er im Gebirge in Höhen bis 2000 und 3000 m vor — in Süddeutschland ist er ausgesprochener Gebirgsvogel —, während er in den Ebenen sich mehr den menschlichen Siede-

lungen angepaßt hat. Er überwintert in den südlichen Teilen Europas und im nördlichen Afrika bis zum südlichen Nubien. Ob es den Tatsachen entspricht, daß er auch in Algier brütet, bedarf noch der näheren Klärung, da oftmals ♀♀ des Erithacus moussieri dem des titys so sehr gleichen, daß eine Verwechselung sehr wohl möglich ist. In Sizilien ist er jedoch brütend angetroffen worden, Sardinien und Korsika dagegen berührt er nur auf dem Zuge. In dem letzten Jahrzehnt hat er sein Gebiet weiter nach Norden ausgedehnt und sich in Schweden mehr nördlich ausgebreitet. In England ist er brütend noch nicht sicher festgestellt worden, jedoch ist er hier Zug- und stellenweise auch Wintervogel. Seinem ausgedehnten Verbreitungsgebiet gemäß ist es erklärlich, daß der Erithacus titys in der Gefiederfärbung je nach den Gegenden vielfach variiert und er verschiedene Lokalrassen in sich vereinigt.

Der Hausrotschwanz ist ursprünglich Gebirgsvogel und bewohnt die Gebirge — bewaldete zieht er kahlen vor — bis zur Vegetationsgrenze und nistet dort in Felsenspalten, Baumhöhlen Sennhütten. Im Flachland sucht er dagegen mit Vorliebe altes Gemäuer, Steinhaufen auf und siedelt sich sogar in Städten und Dörfern für ihn passenden Gebäuden an. Das Nest besteht aus Halmen und Wurzeln und ist mit Haaren und Federn gepolstert. Das Gelege besteht aus 5—6 reinweißen, zuweilen hellbläulichen Eiern. Es finden jährlich 2 Bruten statt von Ende April bis Juli. Die Brutdauer ist 14 Tage. Mit Vorliebe sucht er sich hohe Felsen und vorspringende Stellen an Gebäuden zu Sitzgelegenheiten aus. Er ist ein scheuer, noch weniger zutraulicher Vogel, als der Gartenrotschwanz, aber äußerst lebhaft und gewandt. Unter ständigen, zittrigen Schwanzbewegungen und Verbeugungen hüpft er aufrecht hin und her. Sein Flug ist äußerst gewandt und wird rückartig und wellenförmig ausgeführt. Meisterhaft versteht er es, sich in seinen Flugkünsten zu produzieren, indem er sich in kühnen Schwenkungen, oftmals sich überschlagend, umhertummelt oder sich schier halsbrecherisch aus der Höhe hinabstürzt. Der Gesang ist noch unbedeutender, als der des phoenicurus. Gegen seinesgleichen und auch anderen Vögeln verteidigt er sein Nistgebiet mutig. Seine Nahrung besteht aus kriechenden und fliegenden Insekten, welch letztere er gewandt im Fluge erbeutet, Beeren frißt er nur im Notfall.

In der Gefangenschaft ist er noch weichlicher als der Gartenrotschwanz. Über seine Käfigung gilt dasselbe wie das für jenen Gesagte. Ich habe ein ♂ dieser Art im Käfig gehalten und mußte bei ihm viel mehr Sorgfalt, nicht nur das Futter betreffend, anwenden, ihm das Beste zureichen, dazu viel Mehlwürmer oder sonst in der warmen Jahreszeit gefangene Insekten und frische Ameiseneier. Alt eingefangen sind sie scheu und stürmisch und gehen auch schwer an Futter. An dieses gewöhnt man sie am leichtesten, indem man in dasselbe frische Ameiseneier und zerschnitttene Mehlwürmer mengt. Über sein Benehmen und seine Verträglichkeit resp. seine Unverträglichkeit im Flugraum kann ich aus eigenen Beobachtungen kein Urteil fällen, da ich zu seiner Zeit meine Vögel noch in Käfigen untergebracht hatte, doch sollen sie unverträglich gegen ihresgleichen und andere Vögel sein. In ungeheizten Räumen und auch im Freien sind sie schon überwintert worden. Der Gesang besteht aus mit vielen krächzenden Tönen vermischten Pfeiflauten.

(Fortsetzung folgt.)

Rüppels Webervogel (s. S. 98).

Aufzeichnungen aus dem Jahre 1922.

Von Adolf Günther, Lommatzsch.

(Nachdruck verboten.)

Mitte Januar bringt mir ein Kind eine anscheinend schwerkranke Bachstelze. Sie ist klitschnaß und keucht schwer. In kurzer Zeit ist ihr Gefieder trocken und sie gesund. In eleganten Bogenlinien entschwindet sie unsern Augen.

In derselben Zeit kommt ein Pferdejunge mit einem lebenden Steinkäuzchen. Es hätte Tauben gefressen. Ich fasse es an und Wehgefühl durchzieht mich. Federleicht, entsetzlich mager ist der kleine Bursche. Viel Taubenfleisch hat der sich nicht einverleibt, wahrscheinlich gar keins. Ich lasse ihn fliegen.

Von Ende Januar bis Mitte Februar strenge Kälte. Sie soll die Vögel nicht anfechten, liest man. Aber die Meisen ziehen die Füßchen abwechselnd ins Gefieder, und die Amseln umhüllen sie ganz damit. 2 Rotkehlchen kommen an unsere Fenster. Eins ist so ermattet, daß es von meiner Mieterin ergriffen werden kann. Am andern Tage stirbt es. Das

andere verschwindet für immer. Ein abgebalgter Iltis wird von den Meisen fast ganz verzehrt.

Am 21. Februar singende Feldlerche, in den letzten Februartagen pfeifende Stare, am 1. März ruft die Singdrossel, am 12. März ruckst die Ringeltaube. Am 23. März schickt mir ein Gärtner eine Heckenbraunelle, die sich in sein Arbeitshaus verflogen hatte. Am 27. März sehe ich eine im Freien. Bei flüchtigem Hinsehen könnte man auf einen berußten Spatz raten. Die Gefangene lasse ich später fliegen.

Am 5. April fange ich einen Steinmarder. Ich schütte ihn in einen Sack und gebe auf das deutlich sichtbare und schnuppernde Näschen einen tüchtigen Schlag. Dann schütte ich ihn auf den Hof, stecke ihn aber in einer Anwandlung von übertriebener — wie ich glaubte! — Besorgnis wieder in den Sack und gehe ins Haus. Dort schütte ich das bewußtlose Tier wieder aus und erstarre beinahe zur Salzsäule. Mit einigen Sätzen ist der eben noch Bewußtlose auf der Gardinenstange. Auf dem Hofe wäre er höchstwahrscheinlich für immer entflohen. Vor ein paar Tagen erzählt mir ein Landwirt, daß ihm ein Marder 50 Tauben umgebracht hat.

Am 16. April Wendehals. Am 3. Mai erhalte ich eine kleine Nachtigall ohne Schwanz. Was mag sie erlebt haben? Frische Puppen der Waldameise habe ich nicht, aber solche von der Gartenameise und allerlei Insekten. Nach etwa 14 Tagen singt der Vogel. Ich habe bessere gehört. Anfang Dezember beginnt er wieder und schlägt fort bis nach Mitte Mai. Der Gesang vervollkommnet sich zuletzt so, daß ich nichts mehr an ihm auszusetzen finde. Wahrscheinlich war's ein junges Tier. Ich habe es noch.

Am 30. April Kuckucksruf. Am 5. Mai Gartenammer und braunkehliger Wiesenschmätzer. Sie sind sicher schon früher eingetroffen. Infolge zu vieler Arbeit komme ich nicht mehr oft zum Spazierengehen.

Gelbscheitelweber
Schwarzstirnweber
Goldkopfweber
(s. S. 98).

Am 7. Mai Girlitz, 9. Mai Turmsegler, 11. Mai grauer Fliegenschnäpper, 13. Mai Gelbspötter, 15. Mai Gartengrasmücke, Sumpfrohrsänger, Wiesenschnarre, rote Würger.

In der 1. Juliwoche großer Aufruhr im Garten. Rotschwänzchen, Sperlinge, Finken zetern und locken. Wie so oft schon, ertappe ich den rotrückigen Würger auf einem flüggen Gartenrotschwänzchen, dessen Hinterkopf zerhackt ist. Unterm Flügel blutet der Leib. Der Vogel ist natürlich tot. Die meisten Opfer des Würgers, die ich feststellen konnte, waren Rotschwänzchen. Hat er für sie eine Vorliebe, oder kann er sie nur leichter erbeuten, da die Eltern gern baufällige Nistkasten benutzen, oder wars nur Zufall? Die alten Rotschwänzchen sind es auch, die mir des Würgers Ankunft am ersten anzeigen. Sobald sie etwa von der 2. Maiwoche an nachhaltig locken, braucht man nicht erst lange nach vierfüßigen Räubern zu suchen. Sie melden den Würger, und bald hört man auch sein täk, täk.

Am 22. Juli überrasche ich ein Igelpärchen bei der Begattung. Sie ist mir ganz anders beschrieben worden. Ein Tier sitzt auf dem andern. Die Vorderfüße des oberen liegen auf dem Rücken des unteren. Die Tiere bleiben regungslos, vielleicht, weil sie mein Kommen bemerkt haben. Bedauerlicherweise kann ich das Ende nicht abwarten, da ich abgerufen werde.

Am 22. Juli erhalte ich einen schönen jungen Pirol. Leider fehlen mir frische Puppen. Kirschenstückchen nimmt er mir aus der Hand. Bald frißt er allein. Doch wird er scheuer. Bringe ich ihm aber einen Schmetterling (Kohlweißling), dann kommt er ans Gitter und reißt ihn mir gierig aus der Hand. Ich verschenke das Tier und eine Feldlerche nach Leipzig.

Am 26. Juli erhalte ich einen jungen Stieglitz mit blutendem Flügel. Er stirbt.

Im Weizenfelde neben meinem Garten wüten Sperlinge. Da sieht es schließlich böse aus trotz der geschickt angekleideten und aufgestellten Popanze. Das ist kein Spaß mehr. Hier will ich etwas aus dem folgenden Jahre vorausnehmen.

Am 22. Januar 1923 brachte mir ein Bahnbeamter einen sehr schönen Sperber, der in der Hitze des Gefechts hinter einem Sperling her in den Güterschuppen geraten und da ergriffen worden war. Ich muß gestehen, daß ich für Raubvögel, diesen Rittern ohne Furcht und Tadel, immer etwas ganz besonderes übrig habe. Immer fertig zur Abwehr! Und ihr prachtvoller Flug! Ich habe also den Sperber mit den kühnen Augen unseren Schulkindern

gezeigt und dann — lieber Leser fasse dich! — zum Fenster hinausgelassen. In diesem Augenblick dachte ich, leider eben zu spät, an meine Fußringe zu Hause.

Ich töte keinen Sperber mehr, schon lange nicht mehr. Alles schimpft auf die anschwellende Sperlingsseuche und verlangt gleichzeitig den Abschuß des gewandtesten und erfolgreichsten Sperlingsjägers. Wie geschickt er es versteht, selbst die unter die stehenden Eisenbahnwagen flüchtenden Vogelproletarier noch zu greifen. Ist es wirklich richtig, die Sperber so nachhaltig zu verfolgen? Natürlich fallen ihnen auch andere Vögel zum Opfer, aber wo ich bisher den Sperber jagen sah, da handelte es sich ausnahmslos um Spatzen. Was haben die behördlichen Maßnahmen zu deren Verminderung eigentlich genützt? Einige Sperber werden möglicherweise mehr Erfolg haben. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, daß ihnen unser Spatzenvolk, ganz besonders in Abwesenheit der Zugvögel, den größten Teil ihrer Nahrung liefert, wenigstens hier.

Ein ausgezeichnetes Anlockungsmittel für die Meisen ist der Anbau von Mohn. Die reifenden Kapseln reizen sie ungemein. Der Feldmohn ist sicher vor ihnen, weil ihnen das Feld nicht liegt.

Am 13. August beginnt der Rotkehlchenzug.

Kleine Mitteilungen.

Einiges über meine Winterfutterplätze! Jeder Vogelpfleger, welcher über ein Stückchen Garten oder Land verfügt, wird für unsere gefiederten Lieblinge, welche bei uns überwintern, einen Winterfutterplatz errichtet haben. Für den heurigen Winter habe ich im ganzen 4 Futterstellen errichtet, welche von den Vögeln teils gut besucht werden. Da der heurige Winter sehr milde ist, wir hatten bis dato fast keinen Schnee, so ist auch der Besuch der Futterstellen kein allzu großer, da die Mutter Natur noch immer imstande ist, den Vögeln dieses und jenes als Nahrung zu bieten. Wir hatten im Dezember—Januar zirka 3 bis 4 Wochen, wo alle Bäume mit starkem Raubreif bedeckt waren und gerade während eines solchen Raubreifs leiden unsere Meisen sehr an Nahrungsmangel. Der Vogelfreund, namentlich der Liebhaber, welcher das Wohl und Wehe der Vögel kennt, ist in der Lage solche Situationen zu erkennen und wird mit der Winterfütterung eingreifen. Wenn man so spazieren geht, während die Bäume längere Zeit mit Raubreif bedeckt sind, kann man bei verschiedenen Futterplätzen eine Fütterung nicht wahrnehmen, da sich die Leute sagen, es hat keinen Schnee, die Vögel haben keinen Hunger. Ganz gewiß nicht alle, aber unsere Meisen sind während einer solchen Zeit an Nahrungsmangel sehr betroffen und derjenige, der für wirklich praktischen Vogelschutz ist, wird ohne weiteres die Sachlage erkennen und mit der Fütterung eingreifen. Es geschieht dieses von mir stets und es ist eine Freude mitanzusehen, was da auf den Futterplätzen für ein Leben herrscht unter Kohl-, Blau- und Sumpfmeisen, nebst Kleibern und Buchfinken, welche sich an den gestreuten Hanfkörnern und Sonnenblumenkernen gütlich tun. Auch dem Speck wird fleißig zugesprochen.

Während des vorjährigen strengen Winters waren meine Futterstellen stets überaus stark besucht und ich hatte gerade immer Arbeit, das nötige Futter zu beschaffen, dessen die Vögel bedurften. Ich verfüttere meistens nur ölige Sämereien, da nasses Futter den Vögeln schädlich ist. Es war da ein großer Betrieb auf den Futterplätzen; es waren in großer Anzahl vertreten: Kohl-, Blau- und Sumpfmeisen, Kleiber, Buch-, Berg- und Grünfinken, Goldammern, Kernbeißer, Gimpel und Amseln und selbst Eichelhäher zeigten sich, welche auf der Lauer waren, den Meisen ein aufgehängtes Stück Speck wegzuschnappen. Es herrschte Kälte von 20 Grad bei fast meterhohem Schnee und man kann sich vorstellen, wie sehr die Vögel in Not geraten waren. Es tat einem das Herz im Leibe weh, wenn man am Morgen die Vögel an die Futterstellen kommen sah; vor Hunger und Kälte konnten diese kaum mehr auf ihren Füßen hüpfen; sozusagen auf dem Bauche hüpften die armen Vögel dahin. Fast täglich fand ich mehrere Vögel während der Kälteperiode auf meinen Spaziergängen, welche während der Nacht erfroren sind, da eben der Körper nicht mehr in der Lage war, infolge mangelhafter oder ungeeigneter Nahrung die nötige Wärme zu erzeugen. Ich habe mein Möglichstes getan bei meiner hungrigen bunten Schar, welche auf meinen Winterfutterplätzen erschien, um diese der Natur zu erhalten.

Im Frühjahr dann, nach Entfernung der Futterplätze, habe ich daheim in unserem Garten, welcher nur etwa 10 Meter breit und 40 Meter lang und mit Bäumen und Buschwerk bepflanzt ist, 8 Stück Nisthöhlen für Höhlenbrüter angebracht, welche von 4 Paar Staren, 1 Paar Gartenrotschwänzchen, 1 Paar Blaumeisen und einem Paar Kohlmeisen bezogen wurden. Ein Nistkasten blieb unbewohnt. Im Stachelbeergestrüpp nisteten 1 Paar Dornasmücken. Hinter unserm Garten in hohlen Bäumen noch 1 Paar Stare und 1 Paar Grünspechte, während Schwalben ihr Heim in unserer Wohnung aufschlugen. Es herrscht also da auch im Sommer reges Leben und Treiben, was ein Zeichen für einen vernünftig betriebenen praktischen Vogelschutz sein soll. Anton Luginger, Pfarrkirchen.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 7. Wodurch erklärt sich das nächtliche Toben von Körnerfressern, wenn man eine Anzahl dieser in einem Gesellschaftskäfig zusammen hält?

In Heft 32 vom 25. September 1924 (Frage 14 resp. 15) stellte ich schon einmal eine diesbezügliche Frage zur Erörterung in der „Gefiederten Welt". Nur eine einzige Antwort von Herrn W. Jacobs erfolgte in Heft 34 vom 9. Oktober 1924. Er meinte, daß dieser Vorgang jedem Vogelliebhaber bekannt sei, was ich in Abrede stelle. So oft ich einem Liebhaber diese Frage vorlegte, wurde mir stets die Antwort erteilt, daß ihm dieser Vorgang bei seinen Vögeln noch nie vorgekommen sei, und daß er von anderer Seite nie davon gehört habe. Die einschlägige Liebhaberliteratur (Ruß, Brehm, Neunzig usw.), die ich genau kenne, erwähnt an keiner Stelle diesen Fall. Er vermutet, daß eine veränderte Umgebung die Ursache sein könnte, mir scheint dies aber nicht glaublich. Ich erleuchtete in früheren Jahren der ziehenden Weichfresser wegen das Zimmer; die letzteren bewegten sich wie am Tage; die ersteren verließen nie den gewählten Schlafplatz, bis eines Nachts ein unsinniges Toben ausbrach. Dann vergingen wieder Wochen, ehe ein neuer Anfall eintrat. Wenn es sich um ein plötzliches Erschrecken handeln würde, so müßte man annehmen, daß die Vögel sich sofort wieder beruhigt hätten, da das Zimmer genügend hell war. Daß Milben die Ursache sein könnten, ist vollständig ausgeschlossen.

C. Voigt.

Frage 8: 1. Welche Kanarienweibchen, mit Stieglitz gepaart, ergeben schönere (helle!) Bastarde, die gelben oder grünen Weibchen? In den Büchern liest man vielfach sich widersprechende Angaben. Wer kann aus Erfahrung berichten? 2. Sind Stieglitzbastarde unfruchtbar oder ist Weiterzüchtung doch schon gelungen? 3. Muß der Heckkäfig unbedingt Morgensonne haben? Genügt Sonne von 10 Uhr morgens ab? 4. Was wäre bei St.-K.-zucht besonders zu beachten? Man findet verhältnismäßig wenig darüber in den Vogelbüchern. 5. Bitte um Literaturangaben über Bastardzucht (außer Barth!).

Lehrer P. Hudowski.

Frage 9: Wer kann mir Auskunft geben über das Zusammenhalten von je 1,1 Goldstirn-, Nymphen-, Kaktussittichen und tarant. Unzertrennlichen? Kann das Zusammenhalten in einem Flugkäfig unbedenklich erfolgen? Evtl. welche Sitticharten kämen für das Zusammenhalten mit Goldstirnsittichen in Frage? Gg. Becker.

Antworten.

Auf Frage 6. Habe 1923 Mozambikzeisigbastarde gezogen. Das Pärchen hat nur eine Brut gemacht, da das Männchen im April in die Mauser kam. Möchte Ihnen raten, die Vögel sofort zusammenzuwerfen. Das Männchen kann in der Hecke gelassen werden, es füttert das Weibchen während des Brütens die Jungen jedoch nicht

K. Rinke A. Z. 56n.

Beringung von Wellensittichen. Auch ich habe Aluminium- und verschiedene andere Ringe bei Wellensittichen ausprobiert und die gleichen Mißerfolge damit wie die Herren Schwarzkopf und Krabbe gehabt, so daß ich mich schließlich auf eine Kennzeichnung der Tiere durch Beschneiden bestimmter Federn und ähnliches beschränkte. Da aber dies nun schwer auf die Dauer durchzuführen und auch nicht absolut sicher ist, zudem nur für verhältnismäßig wenige Vögel ausreicht, machte ich voriges Jahr noch mal einen neuen Versuch, der, um es vorweg zu sagen, vollkommen glückte. Und zwar verwandte ich dazu die von H. Fockelmann, Hamburg 8, Catharinenstr. 25 unter dem Katalog Nr. 7004 angebotenen „Zelluloidringe in verschiedenen Farben". Es sind dies einfache, ziemlich starke Ringe von etwa 4 mm Durchmesser mit Lasche, genau wie die bekannten offenen Aluminiumringe für Kanarien. Sie werden in gleicher Weise wie diese mühelos angelegt bezw. abgenommen. Sie bieten aber gegenüber den Aluminiumringen den großen Vorteil, daß der daran knabbernde Vogel sie infolge ihrer Elastizität weder verbiegen, noch abmachen kann; sie nehmen stets wieder ihre ursprüngliche Form an. Infolgedessen sind Verletzungen der Beine nicht gut möglich. Ich habe diese Ringe verschiedenen Wellensittichen, jungen und alten angelegt, aber nicht ein einziger hat ihn sich wieder abzustreifen vermocht, bezw. sich beim Knabbern daran beschädigt, wie es bei Aluminiumringen die Regel war. Nachdem sie das Vergebliche ihrer Bemühungen begriffen hatten, nahmen sie keine Notiz mehr von dem Ringe; manche beruhigten sich schon nach einigen Stunden.

Da diese Ringe in verschiedenen Farben, 6 oder sogar 10, geliefert werden und man sie abwechselnd auf das rechte oder linke Bein, bezw. auf beide ziehen kann, außerdem in letzterem Fall verschiedene Farben, also z. B. links rot, rechts grün und umgekehrt, kombinieren kann, lassen sich damit schon eine ziemliche Anzahl von Tieren kennzeichnen. Außerdem lassen sich aber auch ganz gut Zeichen oder Zahlen auf die Ringe ritzen. Vielleicht könnte man auch die Fabrikanten veranlassen, sie schon mit Zahlen zu liefern. Technisch würde das sicher möglich sein. Ebenso wäre es gut, wenn sie auch etwas größer hergestellt würden, da sie so wohl für Wellensittiche recht gut passen, kaum aber mehr für größere Vögel, wie Unzertrennliche und andere.

Über den Zeitpunkt des Anlegens ist wenig zu sagen. Je jünger die Wellensittiche sind, desto eher gewöhnen sie sich im allgemeinen daran. Doch dürfte ein Anlegen im Nest kaum möglich sein, da die Alten mit großer Beharrlichkeit solche Fremdkörper zu entfernen trachten und dabei leicht die Jungen zu Schaden kommen könnten.

Daß durch die Lasche die Eier beschädigt werden, glaube ich kaum. Bei Kanarien wenigstens habe ich nie etwas derartiges beobachtet und auch noch nie davon gehört. Alles in allem erfüllen diese Ringe wirklich ihren Zweck, jedenfalls sind sie von allen mir bekannten die einzigen, die für Wellensittiche in Betracht kommen.

Helmuth Hampe, Braunschweig.

Nachschrift: Nachdem ich nach Absendung vorstehenden Artikels noch einige Wellensittiche mit genannten Ringen versehen hatte, fand ich nach einigen Tagen 2 davon in der Mitte durchgebrochen am Boden der Voliere vor. Entweder haben die betreffenden Vögel — ältere Tiere — besonders hartnäckig an ihren Ringen geknabbert und sie so schließlich durchgebissen, oder es handelte sich um Ringe, die beim Anlegen durch zu starkes Auseinanderbiegen einen Knick bekommen hatten und daher natürlich leicht abbrechen konnten. Letzteres halte ich für das Wahrscheinlichere, da es mir beim Anlegen wiederholt passiert ist, daß Ringe, die vielleicht auch einen Materialfehler hatten, abgebrochen sind.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf dem Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Math. Lefebre, Merzig (Saargebiet), Handelsmann, Postfach 115. Dayaldrossel, Somalibülbül, Graysdrossel, mexikanischer Karmingimpel.

E. W. Lenger, Berlin N 58, Stönhauser Allee 70a. Schamadrosseln, -weibchen, Damadrosseln, Goldstirn-, Blaubartblattvögel, Dayaldrosseln, -weibchen, Bergrötel, Schwarzschwanzschmätzer, graublauer Fliegenschnäpper, braunbrüstige Blauschnäpper, Braunrückenstrauchschmätzer, Schwarzkappen-, Meisen-, Braunkopf-, Braunscheitel-, Rotaugen-, rotbraune Timalie, Borstenhäherling, indischer Grauwürger, indische Maskenweber, rostbäuchige Flötenwürger, Würgerschnäpper, Weißschulterdrosselschmätzer, Rostbauchdrosselschmätzer, rote Kardinäle, Weibchen, Kapi ötel, Papstfinken, Paare, Indigofinken, Paare, Organisten, Kaptäubchen, Pflaumenkopfsittiche, Topfsittiche, weiße Reisfinken.

Ado Meetes, Mainz, Wallaustr. 62 Singsittich.

Fritz Sterling, Berlin NW 5, Zoologische Handlung, Perlebergerstr 35, Fernruf Moabit 4733. Uferläufer, Rohrsänger.

Paul Tzornack, Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189. Rote Kardinäle, Schamadrosseln, Kapp- und Palmtäubchen, kl. Kubafinken.

A. G. v. Zitzewitz, Berlin W 50, Kurfürstendamm 243, A. Z.-Mtgl. 308. 1,0 weißbunte Kanarie.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender Joh. Birk in Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnitz, Merveldstr. 39; Kaufsvermittelung: Franz Nyncke, Berlin O, Königsberger Str. 17.

An unsere Mitglieder!

Die Verhandlungen mit dem Landesverbande Preußen über die Einrichtung einer Kaufgelegenheit für Vögel sind nunmehr zu einem günstigen Abschluß gelangt. Wir beziehen uns auf unsere Veröffentlichung über die bestehende Tauschvermittlung in Nr. 25 der „Gef. Welt", nach deren Grundsätzen auch die neue Kaufseinrichtung organisiert worden ist. Unter peinlicher Beachtung der notwendigen Erfordernisse wollen sich unsere Liebhaber bei Bedarf an den Vorsitzenden des Preuß. Landesverbands, Herrn Franz Nyncke in Berlin O, Königsberger Str. 17, wenden. Genannter Herr wird für Erfüllung der Wünsche unserer Liebhaber besorgt sein.

I. A.: Rudolf Petters, 1. Schriftführer.

Herrn A. C., Berlin. Der Vogel ist einer Lungenentzündung erlegen. Es ist wahrscheinlich, daß auch die andern Krankheitsverdächtigen an einer Erkrankung der Luftwege leiden. Eine etwa eingeschleppte Seuche würde schon reichlichere Opfer gefordert haben.

Herrn A. D., Berlin SO. Ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn Dr. R. O., Charlottenburg; Frl. B. S., Berlin; Herrn A. H., Biberach; Herrn A. M., Mainz; Herrn G. B, Nassau; Herrn A. W., Jena; Herrn Dr. L., Brüssel: Beiträge dankend erhalten.

Herrn H. L., Köln. Erscheint gegen Ende des Frühjahrs. ♂, ♀♀ = 1 Männchen und 2 Weibchen ♂♂, ♀♀ = 2 Männchen und 2 Weibchen (in Verkaufsanzeigen). Im Text von Büchern würde ♂ bedeuten „das Männchen", ♂♂ „die Männchen".

Herrn X., Neukölln. Eine Anfrage Ihrerseits war bisher hier nicht eingegangen. 1. Alle Vögel gedeihen in einem zeitweise auch von der Sonne beschienenen Raum besser als in einem solchen ohne Sonne. Unbedingt notwendig ist Sonne für die Züchtung von Wellensittichen nicht. 2. In dem Käfig von angegebener Größe könnten 3 Paare W. gehalten und gezüchtet werden. 3. Erledigt sich durch die Antwort auf 1. 4. Die vier genannten Vögel können in einem Käfig zusammengehalten werden.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

hrgang 54 26. Februar 1925 Heft 9

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Wieder eine Vogelstube! Von Dr. A. Schramm, Karlstadt am Main.
Dompfaffenzucht. Von Amtmann Max Krumm.
Spitzschwanzamandinenzucht. Von Adolf Voigt, Jena-Ost.
Neueinführungen und Seltenheiten. Von K. Neunzig. (Forts.)
Rotschwänze — Phoenicurus (*Forst.*). Eine Monographie von John Kuntzendorff. (Forts.)
Aufzeichnungen aus dem Jahre 1922. Von Adolf Günther, Lommatzsch.
Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Vom Vogelmarkt - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig - Redaktionsbriefkasten - Ausstellung - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

reutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellung.

Der Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Zwickau beabsichtigt in der Zeit vom 17.—21. Mai d. J. eine Vogel-ausstellung zu veranstalten.

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen. Alle Vereine und Liebhaber, die unserem Verbande bereits angeschlossen sind, bitten wir an dieser Stelle nochmals, die restlichen Mitgliedsbeiträge unserem Kassierer Herrn Erich Merz, Berlin-Friedenau, Wilhelm-Hanff-Str. 14 II, umgehend einzusenden. Vereine und Liebhaber, tretet unserem Verbande bei und unterstützt unsere gute Sache. J. A.: Erich Merz.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden. J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

Angemeldet ist Herr Gerhard Baumann, Bankbeamter, Oldenburg i. O., Meinardusstr. 16. — Aufgenommen sind die Mtgl. Nr. 108 n G. Beyer, Liegnitz, Schützenstraße 14; Nr. 115 n A. Knoll, Studienrat, Groß-Umstadt in Hessen; Nr. 121 n Ludwig Wolf, Obersäger, München, Hirschenbergstr. 2/4. — Für die „Nothilfe" gingen ferner ein von Mtgl. 25 1,70 M.; Mtgl. 90 3,15 M.; Mtgl. 282 3,00 M.; zusammen mit den Eingängen laut Quittung in Heft 5 28,55 M. Den freundlichen Spendern herzlichen Dank. A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen. J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37 a. Gäste stets willkommen. J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Bericht über die Generalversammlung vom 15. Januar 1925. Die sehr gut besuchte Versammlung eröffnet der Vorsitzende um 9 Uhr mit den besten Wünschen für das neue Jahr. Die Tagesordnung enthält folgende Punkte: 1. Verlesen des Protokolls, 2. Bericht des Schriftführers, 3. des Kassierers, 4. des Bibliothekars, 5. Neuwahl des Vorstandes, 6. Anträge, 7. Geschäftliches 8. Verschiedenes. Das Protokoll wird verlesen und angenommen. Aus dem Bericht des Schriftführers ist folgendes zu entnehmen. Die Vereinigung besteht am Schluß des Jahres 1924 aus 56 Mitgliedern; neu aufgenommen wurden im Laufe des Jahres 3 Mitglieder, ausgeschieden ist keiner. Im Laufe des Jahres fanden an Sitzungen statt: 1 Generalversammlung, 21 ordentliche Sitzungen. Ferner fanden statt: 1 Vorfrühlingspartie nach Strausberg und das 29. Stiftungsfest. In den Sitzungen wurden folgende Vorträge gehalten resp. Themen behandelt: Die Not der Vögel infolge des schneereichen Winters, Herr Böhme; Gedenket der hungernden Vögel, Herr Dennert; Die Gewöllbildung bei Raubvögeln und insektenfressenden Singvögeln, Herr Böhme; Winterfütterung der Vögel, Herr Rückert; Trinkbedürfnis der Vögel im Winter, Herr Lohwinkel; Das Einwecken frischer Ameiseneier, Herr Schauer; Die Vogelfauna Schlesiens, Herr Merz; Unsere einheimischen Pieper, Herr Merz; Die Großtrappe, Herr Böhme; Unsere Schmätzer, Herr Merz; Aussetzen von Sonnenvögeln und Wellensittichen in die Freiheit, Ankunft der Zugvögel, Die Rohrdommel, Herr Böhme; Ausbrüten von Schwalbeneiern durch Kanarienvögel, Herr Dennert; Die graue Bachstelze, Herr Schauer; Nesterzerstörungen durch Feinde der Singvögel, Herr Böhme; Der Ortolan, Herr Böhme; Der Star und seine Umfärbung, Herr Kanthack; Vogelfang in Thüringen, Herr Müller I; Die Vogelwelt in Bayern und den bayerischen Alpen, Herr Nyncke; Das Meckern der Bekassine, Herr Nyncke; Vogelvernichtung durch Raubzeug, Herr Böhme; Frei-, ein- und ausfliegender rotrückiger Würger, Herr Kanthack; Hühneraugen bei Singvögeln, Herr Rückert; Über das Töten von Singvögeln durch rotrückige Würger, Herr Kanthack; Der Kernbeißer, Herr Scholz; Die Schwirle, eine Unterfamilie der Rohrsänger, Herr Böhme; Der Nachtigallrohrsänger oder Rohrschwirl, Herr Böhme; Überwinternde Möwen in Berlin, Herr Scholz; Der Kampf ums Dasein in der Vogelwelt, Herr Böhme; Der Raubwürger und Sperber, Herr Böhme.

Aus dem Bericht des Kassierers geht hervor, daß eine Einnahme von Mk. 291.38 und an Ausgaben Mk 204.01 zu verzeichnen sind: mithin ist ein Kassenbestand von Mk. 87.37 vorhanden Es folgt der Bericht des Bibliothekars. Das Inventar ist in Ordnung und zur Stelle. Die Bibliothek wurde 27 mal in Anspruch genommen. Es folgt die Neuwahl des Vorstandes. Der alte Vorstand wurde wiedergewählt; an Stelle des fehlenden 2. Vorsitzenden wurde Herr Wulf gewählt. Der Vorstand setzt sich aus folgenden Herren zusammen: Herr Erich Merz: 1. Vorsitzender; Herr Wulf: 2. Vorsitzender; Herr Böhme: Schriftführer; Herr Kahl: Kassierer; Herr Scholz: Bibliothekar; Vergnügungsleiter: Herren Schulz, Giebe und Krüger; Kassenrevisoren: Herren Kanthack und Beutel. Es folgt Punkt 6: Anträge. Ein Antrag Kanthack ist durch Statut erledigt. Antrag Schulz: Einladen der Mitglieder zu den Sitzungen per Karte wird angenommen. Antrag Dennert: die Beiträge zum Landesverband gleichzeitig mit den Vereinsbeiträgen einzuziehen, wird angenommen. Punkt 7: Geschäftliches. Hierzu wird Herrn Dennert für die künstlerische Ausführung der Anwesenheitsliste der beste Dank ausgesprochen. Ferner wird beschlossen, am 14. Februar einen Maskenball zu veranstalten. Zu Punkt Verschiedenes ist zu erwähnen, daß die Vereinigung gelegentlich der Ausstellung die Ornis-Plakette erhielt. Die Tagesordnung ist erschöpft. Der Vorsitzende schließt die Sitzung mit Dankesworten an die Mitglieder für die arbeitsreiche Tätigkeit des abgelaufenen Jahres. P. Böhme, Schriftführer.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurter Str. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. V.: Emil Ivo, Schriftführer.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Die Vereinssitzungen finden jeden 4. Sonntag im Monat, abends 6 Uhr beginnend, in unserem Lokal „Thüringerhof", Mallinkrodtstr. 180, statt. Liebhaber jederzeit herzlich willkommen. Der Vorstand.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Rietschelhof", Rietschelstr. 19. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftführer.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 3. März 1925. Gäste, auch Exotenliebhaber, stets willkommen. J. A.: Arnold Weber, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden, Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Versammlung am Sonnabend, 14. Febr., war von 10 Mitgliedern und 2 Gästen besucht. Die eingegangenen Offerten der Zool.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Hdlg. W. Hiltmann, Berlin, und W. Einicke, Hamburg, werden empfehlend bekanntgegeben. Auf eine Anfrage beim Züchter des Mehlwurmersatzes ist gegen Nachnahme von 5,20 Mk. eine kleine Probe des Wurmes eingegangen. Eine Verteilung lohnt sich wegen der geringen Zahl der kleinen Würmer nicht. Der Schriftführer wird versuchen, den Käfer zu züchten und wird später Proben verteilen. Der Betrag, der reichlich hoch erscheint, wird aus der Vereinskasse bewilligt. Die Entgegnung des Verbandsvorsitzenden auf einen in der Jenaischen Zeitung erschienenen recht oberflächlichen Vogelschutzartikel wird verlesen. Da unter den Gästen ein Gegner der Käfighaltung war, entspinnt sich eine sehr umfangreiche Aussprache über die Berechtigung der Käfighaltung. Herr Bickerich fährt in seinem Vortrag: „Das Fliegen" fort. Schließlich wird noch unsere Eiersammlung wieder einmal vorgeführt und von Herrn Uhlmann erläutert. Zur Vereinsabzeichenfrage nimmt die Versammlung einmütig eine ablehnende Stellung ein. A. Voigt.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst., Boppel, 1. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.

J. V.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Unsere nächste Sitzung am 5. März kann wegen der Leipziger Frühjahrsmesse nicht in unserem Vereinslokale abgehalten werden. Dieselbe findet deshalb im Restaurant „Roland", Albertstraße 6, abends 8 Uhr, statt. Sämtliche meßfremde Liebhaber sind herzlich willkommen und bitten wir um recht zahlreiches Erscheinen.

J. A.: M. Roth, Schriftführer.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung bei unserem Mitgliede Herrn Normast im Gasthof „Kaiser Friedrich", Breslauer Str. 50. Liebhaber sind als Gäste willkommen. J. A.: Friedrich.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am zweiten Mittwoch eines jeden Monats Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Straße. Beginn 8 Uhr. Gäste sind willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Magdeburg-Wst., Schenkendorfstr. 14.

Zusammenkunft! Alle Liebhaber exotischer Vögel aus Magdeburg und Umgebung werden gebeten, sich an einem Sonntag in einem noch zu bestimmenden Lokal in Magdeburg zu treffen. Zuschriften mit Vorschlägen an den Verlag (Telefon 1323).

Der **Verein der Vogelliebhaber Mannheim** hält aller 14 Tage im Restaurant zum Goldenen Falken seine Mitgliederversammlung ab. Nächste Versammlung am Freitag, dem 20. Februar 1925 und so fort. Freunde und Gönner stets willkommen.

Der Vorstand. J. V.: Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). An jedem zweiten Mittwoch im Monat findet in unserem Vereinslokal „Parkhotel", Epinaystraße 1, unsere Versammlung statt. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an.

Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegründet 1. Mai 1923. Vereinsabende aller vier Wochen, in der ersten Woche des Monats verbunden mit Vortrag, in der dritten Woche jeden Monats nur gesellige Zusammenkunft. Vereinslokal „Sächsischer Hof". Gäste stets willkommen.

Studienrat Professor Jahn, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vorsitzender, Zwickau i. S., Bosenstr. 44.

Die Vereinigung hannov. Vogelliebhaber will dem Vogelpfleger Ratgeber und Helfer sein, will die Liebe zum Tier und zur Natur wecken und stärken, will beitragen zum Kennenlernen der Vögel in Wald und Flur. Monatlich einmal kommen die Mitglieder zusammen, tauschen die Erfahrungen aus, hören Vorträge aus allen Gebieten der Vogelkunde, -schutz und -pflege an. Ein- oder zweimal im Jahre veranstalten wir große Lichtbilder- und Film-Abende. Im Frühjahr finden Beobachtungsausflüge unter Führung statt. Den Mitgliedern stehen zahlreiche Fachzeitschriften und Bücher kostenlos zur Verfügung. Regelmäßig berichtet die Zeitschrift nieders. Vereine über unsere Veranstaltungen. An den Vereinsabenden ist Rat und Auskunft, Kauf- und Tauschgelegenheit geboten. Jahresbeitrag Mk. 2,—, für Auswärtige und Schüler Mk. 1,—. Anmeldungen an Heinz Appel, Nienburgerstr. 7A I. Auskunft: Buchhändler A. Troschütz, i. Fa. Cruses Buchhandlung, Gr. Aegidienstr. 4.

Der Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde, gegründet 1920, hielt am Sonntag, den 11. Januar 1925, im Vereinslokal Ungewitter, Bruchstraße, seine Generalversammlung ab. Selbige wurde um 4,50 Uhr durch den 1. Vorsitzenden, Kollegen Reyer, eröffnet, womit er die Erschienenen willkommen hieß und ihnen für den zahlreichen Besuch herzlichst dankte. Anwesend waren 30 Mitglieder. Der Verein hatte bei Jahresschluß einen Bestand von 38 aktiven Mitgliedern. Kollege Reyer setzte das Vertrauen in den Mitgliedern, daß sich die Tagesordnung ohne jegliche Reibung vollziehen möge und erteilte den 1. Schriftführer, Kollege Jäger, das Wort zur Verlesung des Protokolls von der vorigen Versammlung nebst Jahresbericht. Kollege Jäger streifte in diesem die kritische Lage, welcher der Verein während der Inflationsperiode ausgesetzt war. Für die Arbeit, welche Kollege Jäger im verflossenen Jahre als Schriftführer gehabt hat, ehrten ihn die Mitglieder durch Erheben von ihren Sitzen. Desgleichen gab Kollege Siebert als 1. Kassierer seinen bis ins kleinste ausgearbeiteten Kassenbericht. Nachdem Kollege Henk und Sandrok als Kassenrevisoren sich für die Richtigkeit desselben verbürgten, beantragte Kollege Henk Entlastung. In Anbetracht, daß Kollege Siebert seine Person als Kassierer voll und ganz dem Verein zur Verfügung gestellt hat, ehrten ihn die Mitglieder durch Erheben von ihren Sitzen. Hierauf wurde Neuwahl des gesamten Vorstandes vorgenommen. Als 1. Vorsitzender wurde Kollege Reyer wiedergewählt, als 2. Vorsitzender Kollege Hellmann, 1. Schriftführer Kollege Lohs, 2. Schriftführer Kollege Behnke, 1. Kassierer Kollege Siebert, 2 Kassierer Kollege Lauber, als Kassenrevisoren die Kollegen Henk und Wegener, als Beisitzer die Kollegen Koch, Lechleitner, Schröder, Sandrok und Kramer und als Vereinsboten den Kollegen Rosiek, als Mitglieder der Vergnügungskommission die Kollegen Sanetti, Haase, Waldburg, Otto, Döring und Rosiek. Als Vereinslokal wurde das alte wiedergewählt. Ferner wurde das Eintrittsgeld von 2 Mark beibehalten, desgleichen den Monatsbeitrag von 30 Pfennig. Passive Karten kosten wie bisher 3 Mark. Verschiedene Kollegen wollten Namensänderung des Vereins, jedoch bei der Abstimmung entschied man sich für Beibehaltung des bisherigen. Ferner wollte unser 1. Vorsitzender bei verschiedenen Druckereien Nachfrage halten, wie teuer Statuten-Bücher inklusive Beitragsseiten für so und soviel Jahre sind und in der nächsten Versammlung Bericht erstatten. Vereinsversammlungen finden wie bisher aller 14 Tage statt. Als Fachzeitschrift bestimmte man die „Gefiederte Welt" als unser in Betracht kommendes Organ, womit die Kollegen einverstanden waren. Der Verein beschloß ferner am 22. Februar eine närrische Sitzung abzuhalten. Ferner bewilligte der Verein die Mittel für ein neues Protokoll- und Kassabuch. Vogelhandlung Sengstok-Dortmund machte dem Verein ein Anerbieten in Weichfutter. Da nun genanntes Geschäft sich bei unserer im November stattgefundenen Herbstausstellung durch Belieferung lebender und präparierter Tiere so wohlwollend hervorgetan hat, wurden die Kollegen ersucht, ihren Bedarf in Tieren und Futter dort zu decken. Kollege Leking vom Aplerbeker Bruderverein bot auch Körnerfutter an und ladet den Hörder Verein ein, geschlossen an der Weihe des Aplerbeker Vereins teilzunehmen. Diesem Ansinnen wurde bereitwilligst zugestimmt. Die Weihe fand am Sonntag, den 25. Januar, statt. Da nun unter Punkt Verschiedenes nichts mehr vorlag, schloß der 1. Vorsitzende um 8,15 Uhr unsere so gut verlaufene Generalversammlung. Bei der nun in die Rechte eintretenden Fidelitas blieben unsere Mitglieder nebst Angehörigen bei Unterhaltung, Tanz und Gesang noch etliche Stunden beisammen, bis die eintretende Polizeistunde zum Nachhausegehen mahnte. Paul Lohs, 1. Schriftführer.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld p
Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweck

Käfige u. Gerätschaften

Voliere
1.50 brt., 70 tief, 90—1.10 hoch, 70—80 ℳ
Verzinnte u. lackierte Drahtkäfige,
mit u. ohne Glaswände, Stck. 6—10 ℳ
Käfigständer und Tische 9—15 ℳ
Harz. Roller 9-15, **Vorsäng.** 15-30 ℳ
Zuchtweibchen 4 ℳ [313
Eigene Großzüchterei
J. Stenger, München, Türkenstr. 53/2

Vogel-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50.
Schlagnetze f. kl. schädl. Vögel M. 2,30,
f. gr. M. 2,50 u. 2,80. **Katalog gratis.**
J. Tannen, Gronau 58, Westf. [314

Das Wichtel

ist eine einmalige Anschaffung, ein brauchbares Instrument. Die geringe Ausgabe lohnt sich. Voreinsendung 2 M.
Johann Fischer, Waldsassen
315] (Bayern), Mitterteicherstr. 54.

Heckeinrichtung für Kanarienzüchter

1 Flugbauer, 1 Doppelheckkäfig, 6 Einsatzbauer mit Gesangskasten verkauft od. tauscht gegen Exoten aller Art [316
Julius Sauer, Leipzig, Neumarkt 16.

Futtermittel

Mehlwürmer

à Pfund 5 ℳ, bei 6 Pfund Porto und Verpackung frei.
Ia Ameiseneier . . . à Pfd. 8 ℳ
Ia Weißwurm . . . à „ 6 ℳ
Ia Muska-Zecken . . à „ 3 ℳ
Ia Seidenraupenpuppen,
gemahlen . . . . à Pfd. 1 ℳ
Ia Garnelen, gem. à Pfd. 0.40 ℳ

Ia Universalfutter.

Alecwa I für Nachtigallen 2.— ℳ
„ **II für Grasmücken** 1.80 ℳ
„ **III für Drosseln** . 1.50 ℳ
Proben und Analysen zur Verfügung. Vertreter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [317

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser

A. Eckrich II., Waldsee (Pfalz).

Getrocknete Ameiseneier

à Kilo ℳ 14 gibt ab [318
R. Seyfert, Magdeburg

Zoologische Handlung. Löbtschehofstr. 3.

Ornis-Haus

Halle-Saale

Gegründet 1912
Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)
Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall., Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspött., Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [319
Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1
Preisliste auf Wunsch!

Heidelberger Vogelfutter

nach Angaben von **Prof. Dr. Otto Fehringer.**

1.	**Braune Packung**	(Erdsänger)	1½	Pfd. R.-M.	5.25
2.	**Graue** „	(Grasmücken)	2	„ „	6.00
3.	**Blaue** „	(Drosseln)	2	„ „	3.00
4.	**Rote** „	(Stieglitze)	1½	„ „	0.90
5.	**Grüne** „	(Hänflinge)	1½	„ „	0.90
6.	**Gelbe** „	(Kanarien)	2	„ „	1.00

Alle Anfragen über Pflege unserer heimischen Käfigvögel werden sachgemäß gern ausführlich beantwortet. Rückporto erbeten. [320

Fabrik für Heidelberger Vogelkäfige und Vogelfutter
A. Böcher & Co., Heidelberg-Kirchheim.

Züchterwaren

L. K.-Nahrung	½-Kilo-Paket	R.-M.	1,20
„	Postkolli inkl.	„	11,—
„	Probebeutel	„	0,80
Rübsen, Ia	½-Kilo-Paket	„	0,45
Glanz, Marokko, Ia	„	„	0,50
Hanf, Ia	„	„	0,35
Ital. Silberhirse, Ia	„	„	0,45
Mrk. Hirse, gelb, Ia	„	„	0,30
Leinsaat, Ia	„	„	0,45
Mischfutter, Ia	„	„	0,50
Negersaat, Ia	„	„	0,45
Salatsamen, weiß, Ia	„	„	1,50
Sonnenrosenkerne, gestr., Ia	„	„	0,35
Mohn, blau, Ia	„	„	0,70
Hafer, geschl., Ia	„	„	0,35
Finnisch. Ameiseneier, Ia	„	„	8,—
Holzwolle, Nr. 1, weiß, für 50 Nester ausreichend	„	„	0,50
Nr. 3	„	„	0,30
Piep	½-Packung	„	1,50
„	⅓ „	„	0,80
Piep Extra	½ „	„	1,—
„ „	½ „	„	0,50

Ein Posten **Futter-** und **Eiernäpfchen** aus Glas billigst.
Ein Posten **Drahtnester** und **Vorsatzgitter,** verzinkt, billigst.
Sepiaschalen billigst.
Vereinsbezug und Wiederverkäufer verlangen Spezialofferte. [321

Lorenz, Dresden, Drehgasse 5.

Schamadrosseln, abgehörte erstklassige Gesangskünstler, fehlerfrei, Stück 60.— M.
Schamadrosseln, mit defekten Füßen, Stück 25.— bis 30.— M.
Schamazuchtweibchen Stück 60.— M.
Damadrosseln, Ia Sänger, Stck. 60.— M.
Goldstirnblattvögel Stück 40.— M.
Blaubartblattvögel Stück 60.— M.
Dayaldrosseln, gute Säng., Stck. 40.— M.
Dayaldrosselweibchen Stück 30.— M.
Bergrötel, im Gesang, Stück 60.— M.
Schwarzschwanzsteinschmätzer Stück 3 .— M.
Braunbrüstige Blauschnäpper, liebliche Sänger, Stück 40.— M.
Braunrückenstrauchschmätzer, Weibchen, Stück 25.— M
Schwarzkappentimalie Stück 45.— M.
Meisentimalie Stück 45.— M.
Braunkopftimalie Stück 35.— M.
Rotbraune Zwergtimalie Stck. 35.— M.
Braunscheiteltimalie Stück 35.— M.
Goldaugentimalie Stück 25.— M.
Borstenhäherling Stück 30.— M.
Indische Grauwürger Stück 35.— M.
Indische Maskenwürger, junge, St. 25 M.
dto. ausgefärbte, Stück 30.— M.
Rostbäuchiger Flötenwürger Stück 55 M.
Würgerschnäpper Stück 45.— M.
Weißschulterdrosselschmätzer Stck. 60.— M.
Rostbauchdrosselschmätzer Stück 28.— M.
Rote Kardinäle (Virginische Nachtigallen), Stück 25.— M.
Kaprötel Stück 75.— M.
Papstfinken, ausgefärbte Paare, Paar 25.— M.
Papstfinken, unausgefärbte junge Männchen, Stück 6.— M.
Indigofinken, ausgefärbte Paare, Paar 18.— M.
Indigofinken, ausgefärbte Männchen, Stück 8.— M.
Organisten Stück 10.— M.
Kaptäubchen Paar 8.— M.
Graupapageien (v. Congo), Stck. 110.— M.
Blaustirn-Amazonen, junge, sehr gelehrige, Stück 60.— M.
Pflaumenkopfsittiche, nur Männchen, Schwanz gezogen, Stück 13.— M.
Tovisittiche Stück 13.— M.
Grüne Wellensittiche Paar 16.— M.
Weiße Reisfinken, Männch., Stck. 30.— M.
Grau-Kardinäle mit roter Haube, Stück 10.— M.
Schmetterlingsfinken Paar 5.— M.
Atlasfinken Paar 4.— M.
Tahaweber, Männchen, Stück 5.— M.
Mangabeo-Affen, ganz zahm, Stück 70.— M.

Versand per Nachnahme oder Voreinsendung.
Porto und Verpackung 3.50 M., dringend 6.50 M. [322

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70 a.

Ia Ameiseneier, 1 Pfund M. 7.-
Ia Weisswurm, 1 Pfund M. 5.-
Bestes Weichfutter [3
1 kl. Paket 40 Pf., 1 gr. 80 Pf.
Versand per Nachnahme. Bei Anfrage Rückporto. Bestellungen zu richten unt
Weichfutter an den Gefied. We
Verlag, Magdeburg, Postschließfach 14

Vogelfutter [3

für **Kanarien, Waldvögel, Exoten Papageien, Weichfresser.** Anerkan bewährteste Mischungen auf Grund lan jähriger Erfahrung. Liste 13 über Voge futter umsonst.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 95
Bei Anfragen bitte auf die „Gefieder Welt" Bezug zu nehmen.

Mehlwürmer Pfd. 5 ℳ, 6 Pf 30 ℳ frc. Nachn
325] **Jeltner, Breslau,** Weinstr. 1

Mehlwürmer

pro ¼ Pfund ℳ 2.— liefert franko [3
Reichard, Berlin N, Böttgerstr. 2

327] **Mehlwürmer,** rein War
gegen Eins. von 1.75 ℳ ¼ Pfd. frank
Th. Witte, Niederndodeleben b. Mag

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark ¼ Pf
franko versend. **D. Waschinski & Co**
Biesenthal I (Mark). [3

Mehlwürmer rein vegetabili ernährt, à Lit (ca. 600 g) R.-M. 8.—, ¼ Liter (ca. 150 R.-M. 2.— **franko** bei Voreinsendu des Betrages. [3
Bonitas-Versand, Rostock i. M. 11

Vögel

Schönfelders Kanarien feinzucht, Dresden-Trachau 37,

gold. Med. präm. Urstamm Seifert-Wo
empfiehlt tiefe Hohlroller, Knorre Schockel, schöne tiefe Flöten, Zuchthäh und ff. Tag- und Lichtsänger à 12, 18 M., 3 Stück zus. 40 M., erstklass Vorsänger und Ausstellungshähne à 25, 30 M., 3 Stück zus. 60 M., prä Zuchtweibchen à 4 M. Machen bitte einen Versuch und Sie werden frieden sein. Hunderte von Dankschreib im Besitz. [3

Hochedle Gesangs-Kanarie

tourenreiche, fleißige Sänger (Edelrolle
Rein gelbe Gesangs-Kanarie
Hähne sowie Zuchtweibchen, auch geeig für Bastardzucht. **Garantie:** Vers nur kerngesunder Vögel, streng re Bedienung. Zuchtpärchen 20 ℳ.
J. Franke, Dresden
Lortzingstraße 3. [
Prämiiert: Vogel-Ausstellung Dres 1924 „Goldene Medaille".

Harzer-Edelkanarien

von 15 M. an, Weibchen 3 M. Fl und Heckkäfige, Nistkästchen mit Dr 332] durchzogen per Dtzd. 6 M.
Adolf Janson, Barbi

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 5. März 1925 | Heft 10

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Wieder eine Vogelstube!

Von Dr. A. Schramm, Karlstadt am Main.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Zur Erlangung von Vögeln wandte ich mich an das allbekannte Geschäft von Johann Götz in Neu-Ulm, von dem ich 1910—1914 die meisten Vögel für meine damalige Vogelstube bezogen hatte und von der ich stets in sehr zufriedenstellender Weise bedient worden war. Von den mir angebotenen Vögeln bestellte ich 8 Zuchtpaare, erhielt aber am 19. August nur 5 Paare fremdländische Körnerfresser; denn von den angebotenen und von mir bestellten Vögeln waren einige Arten schon ausverkauft, ein Zeichen dafür, wie groß der Bedarf der Vogelliebhaber von neuem eingesetzt hat! Die folgenden 5 Paare hielten schließlich ihren Einzug in meine neue Vogelstube: Braunrücken-Goldsperlinge, die ich noch nicht kannte, Schmetterlingsfinken, Schönbürzelchen (Grisbleus), Orangebäckchen und Silberschnäbelchen, die sämtlich munter ankamen und sich anscheinend ganz wohl in dem Flugraume fühlten. Gleich am Tage nach der Ankunft fingen die Silberschnäbelchen an, in ein Körbchen mit überwölbtem Drahtgeflecht ein Nest aus Bastfasern zu bauen. Eine Woche später waren zwei Eier darinnen und am 9. Oktober sind zwei nette, völlig glatt befiederte Junge ausgeflogen, die beinahe ebenso groß wie die Alten waren. Da diese während des Brütens jedesmal bei meinem Betreten der Vogelstube ihrer angeborenen Schüchternheit entsprechend vom Neste abflogen, so hatte ich gar nicht erwartet, daß sie die Brut zum glücklichen Ende brächten. Aber es geschah dennoch. Die Jungen wurden ausschließlich nur mit Sämereien aufgefüttert. Weichfutter und gekochtes Ei wurden scheinbar nicht genommen. Nie habe ich eine Fütterung der Jungen wahrgenommen, auch später nicht, als die Jungen flügge waren. Was mich an ihnen wundert, ist ihre große Scheu. Sobald man die Vogelstube betritt, flattern sie ängstlich hin und her und erweisen sich dadurch viel scheuer als die alten Vögel, die ja zwar auch auf einen hohen Zweig fliegen, dort aber ruhig sitzen bleiben, bis ich die Vogelstube wieder verlassen habe. Selbst heute noch nach drei Wochen sind die beiden jungen Silberschnäbelchen sehr unruhig.

Als die Alten ihr Nest gebaut hatten, machten es ihnen die Schönbürzelchen am Abend als Übernachtungsraum streitig, wobei es kleine Beißereien gab. Die rechtmäßigen Eigentümer des Nestes verschafften sich aber ihr Hausrecht; die Schönbürzelchen suchten sich ein anderes Ruheplätzchen für die Nacht und waren bis heute zu bequem, sich ein Schlafnest zu bauen. Mit Vorliebe fressen sie die für die Braunrücken-Goldsperlinge bestimmten Mehlwürmer mit und sind die ersten, wenn dieser Leckerbissen im Porzellannapfe unter dem darin befindlichen Weichfutter herumkrabbelt. Dann erst kommen vorsichtig die Goldsperlinge herangehüpft, von denen das Weibchen dreister als das Männchen ist. Dieses weicht sogar dem Weibchen am Futternapfe aus. Zänkereien mit den anderen Vögeln habe ich bisher noch nie bemerkt. Die beiden Goldsperlinge zeigen sich durchaus friedlich, haben sich anfangs Oktober gemausert, so daß das Männchen wie das Weibchen in schönem glattem Gefieder prangt. Prachtvoll leuchtet das Goldgelb am Vorderkörper des Männchens. Beide Tierchen baden sich sehr häufig im Sande, namentlich wenn nachmittags die Sonne ins Zimmer scheint, und hinterlassen dabei ziemlich tiefe Mulden im Sande. Sie baden sich auch oft im Wasser und durchnässen sich dabei stark. Mir gefällt diese Art Goldsperlinge recht gut und ich habe, wie gesagt, noch keine Ursache, mich über ihre verschriene Unverträglichkeit zu beklagen. Allerdings ist es ja möglich, daß sich ihr friedliches Gebaren ändert, sobald sie brütlustig werden. Vorläufig machen sie noch keine Anstalten dazu. Sie haben zwar ein geräumiges Holzkästchen ganz oben unter der Decke als Schlafraum für die Nacht vom ersten Tage ihres Hierseins an erkoren, Niststoffe sind noch nicht hineingeschleppt worden.

Nun zu den Orangebäckchen! Es sind ein paar liebe, kleine, gewandte und schmucke Kerlchen; ob zweierlei Geschlechtes, weiß ich noch nicht. Denn aus wessen Kehlchen die namentlich während des Fluges kurz ausgestoßenen Töne, die nur wie Locktöne klingen, herauskommen, habe ich noch nicht feststellen können. Die beiden Tierchen fliegen abwechselnd sehr häufig längs der 4 m langen Wandfläche von einem Zweig am Fenster auf einen Zweig hinten an der Gitterwand hin und her; dann sitzen wieder beide nach Prachtfinkenweise traulich neben-

einander und krabbeln sich gegenseitig mit den Schnäbelchen im Gefieder. Auch sie sind erpicht darauf, einen Mehlwurm zu erwischen. Beinahe hätte ich das eine der zwei Vögelchen kurze Zeit nach ihrem Besitze eingebüßt. Es hatte eines Sonntags um die Mittagszeit durch irgendeine sechseckige Masche des vor das Fenster gespannten Drahtgeflechtes mit 15 mm Maschenweite einen Ausweg gefunden und flog zunächst auf die vor dem Fenster in kurzer Entfernung gezogenen elektrischen Leitungsdrähte, kam wieder an das Gitter geflogen, fand aber durch die Maschen hindurch keinen Eingang. Es flog wieder von dannen auf einige nicht weit entfernte Bäume, so daß ich nun das Vögelchen verloren gab. Als ich gegen Abend mit meiner Familie von einem Spaziergange zurückkehrte, gewahrten wir das Vögelchen wiederum außen am Drahtgitter der Vogelstube, Einlaß begehrend. Durch unser Vorbeigehen unten auf dem Wege des Fabrikhofes flog das Tierchen weg und — welches Glück — nebenan zum offenen Fenster hinein in ein bewohntes Zimmer, worin ein Hausgenosse zugegen war, der das Fenster rasch schloß. So gelangte ich glücklich wieder in den Besitz des Orangebäckchens. Seit diesem Tage aber habe ich das Fenster der Vogelstube geschlossen gelassen. Sobald ich Drahtgeflecht mit 12 oder 13 mm Maschenweite bekomme, wird dieses auf den Rahmen vor dem Fenster aufgespannt und dann, hoffe ich, wird kein Entweichen der zierlichen Vögelchen mehr möglich sein, die ich ebenso wenig in der Vogelstube missen möchte wie die hübschen mausgrauen Rotschwänzchen, die Schönbürzelchen.

Von dem fünften Paare, den Schmetterlingsfinken, kann ich leider nichts Erfreuliches melden. Munter und schmuck im Gefieder hatte ich sie erhalten. Mit ihren reizenden sattblauen Brüstchen dienen sie jeder Vogelstube unbedingt zur Zierde. Eines Tages früh, es war am 9. September, lag das Männchen tot am Boden. Als Todesursache hat ein mir bekannter Arzt und Vogelfreund Schlaganfall infolge Herzverfettung festgestellt. Wenige Tage darauf lag auch das Weibchen eines Morgens tot im Sande; wahrscheinlich aus derselben Ursache wie beim Männchen. Vielleicht ist es auch aus Gram eingegangen, obgleich es sich den Schönbürzelchen traulich angeschlossen hatte.

Dompfaffenzucht.

Von Amtmann Max Krumm.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Ich komme damit zu folgenden Futterregeln und beginne mit der Winterfütterung. Ist es doch nicht gleichgültig, vielmehr sehr wesentlich, mit welcher stofflichen Zusammensetzung die Alten sich fortpflanzen; kommt es deshalb doch nicht nur allein auf die Fütterung während der Brut selbst, sondern auf die Ernährung vor und nach der Herbstmauser und für den ganzen Winter an.

Schlag hat erst Junge erzielt, nachdem er in den letzten drei Monaten vor der Brut ausschließlich Hanf fütterte. Die Erfahrungen, die Schlag gemacht hat, daß Hanffutter zur Paarung sehr anregt, sind unbedingt richtig. Es ist übrigens eine Erfahrung, die man auch bei anderen Vögeln macht. Das im Hanf enthaltene Öl ist sehr nahrhaft, und Dompfaffen brauchen anscheinend viel ölhaltige Sämereien. Ausschließlich Hanf gilt allgemein als Futtermittel für zu „scharf", die Vögel werden davon leicht zu fett, der Samen bildet kein gutes Blut, die Tiere bekommen schlimme Füße usw. Für Dompfaffen ist das nicht so ängstlich, wenn sie gute Bewegung (geräumigen Käfig) dabei haben. Ich würde aber nach meinen Erfahrungen trotzdem nicht empfehlen, ausschließlich mit Hanf zu füttern.

Ich gebe im Winter bis zum Frühjahr an Sämereien alles, was an Geeignetem zu haben ist: Negersamen, Hanf, Mohn, Sommerrübsen, Spitz-(Kanarien)-samen, geschälten Hafer, Hirse, Leinsamen, Heidekrautsamen und was immer an Gemüse-, Feld- und Waldsamen die Tiere nur fressen mögen. (Gute Erfahrungen mache ich namentlich mit Negersamen; er ist ölig und nahrhaft und doch nicht so „scharf" wie Hanf.) Reicht man alles dieses — damit es nicht verschleudert wird, tue ich jede Samenart in einen besonderen Futternapf —, so wird man auch feststellen, daß die Vögel gar nicht allzu viel von dem Hanf fressen, sondern bald hier, bald dort nippen. Reichhaltigkeit der Speisekarte ist die Hauptsache, weil je mehr Futterarten um so mehr verbürgt ist, daß der Körper alle notwendigen Substanzen erhält. Für den Winter kommt als Vitamine hinzu frische Apfel- und Birnenstückchen, täglich zwischen das Gitter gesteckt, vor allem, solange der Vorrat reicht, Vogelbeeren und schwarze Holunderbeeren, frisch oder an der frischen Luft getrocknet und nachher in kaltem Wasser aufgeweicht, und im Zimmer getrocknete Vogelmiere. Auch in Weckgläsern ohne Zucker eingemachte Waldbeeren verfüttere ich gelegentlich: Wenn ich Tannensamen habe, so ist das ein ganz vorzügliches und mit wahrer Gier genommenes Futter. Der Gehalt an Harz oder ätherischen Ölen scheint erforderlich zu sein. So häufig ich kann, stecke ich auch im Winter frische Tannenzweige ein. Nicht nur der Dompfaff, sondern auch alle Finken picken die schon im Winter an der Spitze jedes Zweigleins vorhandenen Knöspchen eifrig heraus. Ich meine, daß die Frühjahrspracht des Gefieders meiner Vögel gerade von dem winterlich gereichten Tannensamen und Tannenzweigen herrührt. Ich habe gefunden, daß, wenn ich alles Futter biete, ich im Flugbauer kaum den richtigen Ernährungszustand zu regulieren brauche. Nur bei auftretender Schwäche in der Mauser helfe ich mit Eifutter nach. Gelegentlich gebe ich auch als Leckerbissen einen Mehlwurm.

So bereite ich auf die Zucht vor. Frischer Sand, Badewasser und Sauberkeit, vor allem täglich frisches Trinkwasser sind im Winter ebenso vonnöten, wie zweckmäßiges Futter.

Kommt der Frühling, so ändert sich das Futter insoweit, als ich es dem Naturzustande im Frühjahr angleiche. Draußen im Grünen gibt es Insekten (Eiweiß) und frische Pflanzenvitamine. Dementsprechend gebe ich Eiweiß in Gestalt von hartgekochtem Ei. Ich schneide das Ei nur halb durch und werfe nur eine Tagesportion ein, nicht mehr, und möglichst in der Schale. Den Rest entferne ich jedesmal sorgfältig. Das Ei reiben, wiegen oder

sonst zerkleinern, tue ich nicht, dadurch verdirbt es nur leichter und wird weniger gern genommen. Die Alten fressen, solange sie noch nicht brüten, lieber Eigelb, später ausschließlich das Weiße; auch deshalb empfiehlt sich eine Untermischung nicht. Alle Eierpräparate, die man im Handel bekommt, halte ich demgegenüber für weniger geeignet, sie strecken den Vorrat, beschweren aber mit dem Zusatz von Zwieback und ähnlichem Gebäck m. E. nur die Verdauung (wie auch bei Säuglingen der Zusatz von Kindermehl zur Milch). Wenn ich frische Ameiseneier habe, gebe ich diese. Sie sind das beste Frischfutter. Man muß sich aber hüten, daß sie nicht angesäuert sind oder den leisesten Fäulnisgrad haben. Lieber verfüttere ich deshalb lebendige Mehlwürmer. Der Dompfaff, der schon kräftige, schwer verdauliche Kost verträgt, wird jedenfalls in der Brut nicht zu fett davon. Er nimmt sie anfangs nicht an; ich habe das bei vielen Dompfaffen erfahren. Hat er aber erst mal davon geschleckt, so ist er darauf förmlich erpicht. Sind die Gimpel ziemlich zahm, so lassen sie sich leicht reizen und beißen in den vorgehaltenen Wurm, den man den Kopf eingedrückt und dessen Eingeweide man herausgedrückt hat, im Ärger hinein. Auf diese Weise habe ich ihnen den ersten Geschmack davon gegeben und hatte dann mit der weiteren Annahme dieses Futters keine Last. Frißt erst mal der eine, so geht der andere ohne weiteres auch heran, und von da an kann man den Tieren keinen größeren Genuß als frische Mehlwürmer bieten. Die meisten Dompfaffen pflegen die ganzen Würmer, nachdem sie ihnen den Kopf abgebissen haben, quer durch den Schnabel zu ziehen und den Saft und die Eingeweide herauszupressen; andere beißen immer kleine Stückchen ab, daß es knackt, und pressen aus den Teilchen den Inhalt in derselben Weise heraus. Die leeren Schläuche werden nicht genossen, sondern zur Seite geworfen.

Mit der Mehlwurmfütterung kann die Brutlust nach Belieben gesteigert werden.

Hinzu kommt aber vor allem Grünfutter. Zuerst gebe ich frische Zweige von Waldbäumen mit zarten Knospen und Schößlingen, Kirsch- und andere Obstblüten sowie grüne Vogelmiere oder Salat. Junge sind dann noch nicht vorhanden. Solange die Vögel nach langer Entbehrung auf Grünzeug noch gierig und sofern sie nicht täglich daran gewöhnt sind, achte man darauf, daß das Grünzeug, besonders die Vogelmiere und der Salat, nicht naß oder feucht ist oder gar welk, wenn auch nur in geringem Grade; wenn sie es nehmen, ist Durchfall und Tod die Folge. Der Einwurf von Grünzeug ist für jeden Tag gut. Hat sich erst frischer Samen gebildet, so gebe ich ihm den Vorzug. Frischer Löwenzahnsamen ist schon früh vorhanden; ich nehme die abgeblühten Köpfchen, bevor sich die Samenfädchen zu einer Rundung ausgebreitet haben und schneide die Samenfädchen kurz über dem Samen mit der Scheere ab, damit sie später nicht im Käfig oder im Zimmer herumfliegen. Der auf dem Fruchtboden der Köpfchen stehende halbreife Samen wird leidenschaftlich gern genommen. Ich habe wahrgenommen, daß die Dompfaffen auch in der Freiheit hauptsächlich damit füttern (Aufpassen, daß der grüne Samen, länger als einen Tag aufbewahrt, nicht gärend und muffig wird!). Frischer Löwenzahn ist wohl überall in Mengen zu haben. Schon bevor die Zeit der Löwenzahnernte vorbei ist, bietet die Vogelmiere ihre zwar winzigen, aber recht zahlreichen Früchtchen, später das Hirtentäschchen und der Knöterich. Vor allem Grassamen wird gern genommen, später sehr gern Wegerich (mittlerer Wegerich), und ganz später Disteln, deren Samenfädchen ich ebenso entferne wie beim Löwenzahn. Ich werfe, abgesehen von Löwenzahn und

Schwarzkopfbülbül.

Distel, die ganzen Pflanzen in den Käfig, auch wenn es später regnet und die Pflanzen ganz naß sind. Hat man zur trockenen Zeit nämlich immer besamte Pflanzen eingeworfen, so haben die Alten und auch die ausgeflogenen Jungen keinen unnatürlichen Heißhunger auf die grünen Blätter und rühren sie nicht an, wenn sie naß oder welk sind. Für ein einziges Dompfaffenpaar gebe ich täglich 3 mal und mehr eine Hand voll dieses besamten Grüns. Die Tiere fressen nur den Samen aus. Die Beschaffung der Pflanzen mit unreifem Samen ist gar nicht schwierig und mühevoll. Ich habe mir im Garten ein Unkrautbeet angelegt mit Miere, Hirtentäschel, Kreuzkraut usw. und komme, obschon ich in der Stadt wohne, um unreifen Unkrautsamen nicht mehr in Verlegenheit.

Obst gebe ich namentlich in der Zuchtzeit stets: Äpfel, Birnen, Feigen, süße Apfelsinen, Kirschen und Erdbeeren, süße Weintrauben, später frische Waldbeeren (Heidelbeeren) in Menge. (Forts. folgt.)

Mein Liebling — der Jako.

Von S. Lichtenstaedt.

(Nachdruck verboten.)

Lange Zeit hat man vom Graupapagei wenig in unserer „Gefiederten" gelesen. Der Jako war auf dem Vogelmarkt eine Seltenheit geworden, und die wenigen guten Vögel, welche vom Ausland hereinkamen, wurden teuer bezahlt.

Seit den letzten Monaten ist es anders geworden. Große Transporte grauer Papageien kamen nach Deutschland, und nach vielen mir zugegangenen Zuschriften ist es der sehnlichste Wunsch vieler Papageienliebhaber, in den Besitz eines guten gelehrigen Vogels zu kommen.

Zu meinem Bedauern bin ich, was ich an dieser Stelle wiederholen muß, nicht in der Lage, „gute", „prima" oder „hervorragende" Vögel zu besorgen.

So gerne ich anderen Vogelpflegern gefällig sein möchte, so unmöglich ist es mir, gute Graupapageien geradezu aus den Ärmeln zu schütteln, trotz der sehr schmeichelhaften Bemerkungen, daß alle zu mir „unbedingtes Vertrauen in der Besorgung hätten".

„Junge Graue möchte ich auf keinen Fall". „Mir starben alle Vögel nach kurzer Zeit." „Alle Jakos, die ich bis jetzt erhielt, waren Todeskandidaten." So oder ähnlich lauteten eine Menge Zuschriften, welche ich früher und jetzt erhielt.

Allen diesen Liebhabern kann ich antworten, daß mir weit weniger Jakos eingingen als irgendwelche andere Exoten, und daß ich in früheren Jahren zeitweise 4—5 junge schwarzäugige Vögel hielt, ohne auch nur einen Verlust zu haben. Eine übergroße Liebe zur Vogelwelt gehört allerdings dazu, um die in der ersten Zeit immerhin empfindlichen Vögel zu akklimatisieren.

Gern will ich den verschiedenen an mich ergangenen Aufforderungen nachkommen, um hier über meine jahrzehntelangen Erfahrungen in der Pflege des Jako zu berichten. Würde ich allerdings meine Erlebnisse ausführlich niederschreiben wollen, so würden wohl kaum drei bis vier Nummern der „Gefiederten Welt" ausreichen.

Vor allen Dingen muß man den Jako, gleich ob jung oder alt, gesund erhalten, d. h. man muß die Gewißheit haben, keinen kranken Vogel zu bekommen. Das ist aber leichter gesagt, wie getan. Selbst der gewiegteste Papageienkenner ist außerstande, nach kurzer Beobachtung festzustellen, ob der vor ihm stehende Vogel gesund ist oder nicht. Manche ältere Vögel sind Epileptiker. Diese Krankheit kann man dem Vogel nicht ansehen. Erst wenn zu Hause, vielleicht nach Wochen, der erste Krampfanfall ganz plötzlich eintritt, merkt man erst die Krankheit. Beginnende Tuberkulose und viele gerade beim Jako auftretende Leiden sind im Anfangsstadium nicht erkennbar. Bei einem mageren Vogel kann man Krankheit vermuten, während gerade er kerngesund sein kann, während ein zu fetter Vogel nach kurzer Zeit am Schlagfluß endet.

Auf die allgemeinen Gesundheits- resp. Krankheitszeichen eines Jakos einzugehen erübrigt sich, da diese bei allen Vögeln die gleichen sind.

Mein Rat ist, selbst aussuchen und nicht schicken lassen. Den Vogel nicht bei der ersten Beobachtung kaufen, sondern mehrere Tage ansehen, keinen Vogel kaufen, der längere Zeit nur mit ölhaltigen Sämereien (Hanf, Sonnenblumen, Erd-, Zirbelnüssen) gefüttert ist. Keinen schwarzäugigen Jako sofort nach Eintreffen beim Händler kaufen, sondern erst wenn er mindestens 14 Tage im Hause ist. Nach Möglichkeit muntere, lebhafte Vögel kaufen mit intelligentem Auge. Keine nervösen Vögel nehmen. Diese zucken entsetzt bei jedem ungewöhnlichen Anblick zusammen, fallen gar von der Stange und können sich selbst von der kleinsten Aufregung stundenlang nicht erholen. Solche Tiere leiden später fast immer an epileptischen Krämpfen. Ein Vogel, welcher ruhig außergewöhnliche Erscheinungen betrachtet, ohne unsinnig zu erschrecken, klug und aufmerksam seine Umgebung mustert, sich mit einem Wort nicht aus der Ruhe bringen läß, ohne den Eindruck einer Schlafmütze zu machen, ist in der Regel gut. Mit dieser Nervosität mancher Vögel darf man natürlich nicht die natürliche Angst der frischen Vögel verwechseln, welche kreischend vor jedem Besucher zurückschrecken und sich erst allmählich beruhigen lassen.

Alles übrige beim Kaufe eines Jakos ist Glücksache, doch sind wirklich hervorragende Tiere sehr selten. Aus diesem Grunde weiß so mancher Liebhaber überhaupt nicht, was ein wirklich intelligentes Tier leisten kann.

Ich möchte an dieser Stelle etwas näher auf die schon viel erörterte Frage eingehen: Weiß ein Papagei, was er spricht, d. h. ist er fähig, in menschlichem Sinne seinen Gefühlen durch die Sprache Ausdruck zu geben?

Ich möchte diese Frage mit Ja und Nein beantworten. Kein Papagei „spricht" in menschlichem Sinne. D. h. er weiß niemals, wenn er z. B. sagt: „Jako hat Hunger", daß der Hunger jenes unangenehme Gefühl nach längerer Fastenzeit ist. Er wird deshalb diese Worte genau so gerne bei gefülltem wie auch bei leerem Futtergefäß sagen. Das aber geradezu fabelhafte Gedächtnis und die bewundernswerte Eigenschaft, mehrere Vorgänge automatisch in sich aufzunehmen, verbunden mit angemessenem Anlernen seitens des Pflegers, ferner die Eigenschaft, diese Vorgänge im Hirn, vermöge seiner Intelligenz, selbständig zu verbinden, wenn sie ihm in passender Reihenfolge gezeigt resp. angelernt werden, kann in dem Zuhörer unwillkürlich die Ansicht auslösen, daß der Vogel „menschlich" spricht.

Gebe ich einem Jako z. B. ein Stück Apfel und sage ihm, nachdem er es genommen: „Das schmeckt gut", so wird er schon nach kurzer Zeit beim Abnehmen des Apfels diese Worte wiederholen. Er weiß nun etwa nicht, daß der Apfel gut schmeckt, sondern er bringt folgerichtig den ganzen gelernten Vorgang zusammen.

Sage ich ihm nur morgens: „Guten Morgen" und abends: „Gute Nacht", so wird er die Tageszeiten selten verwechseln, gewiß ein Zeichen hoher Intelligenz, niemals aber ein Zeichen menschlichen logischen Sprechens. Nehme ich z. B. einen meiner Grauen in den Arm, streichle ihn und sage ihm

Koseworte, so wird er bei genau dem gleichen Vorgang die vorgesprochenen Worte wiederholen.

Sache des Erziehers ist es, nun seinen Vogel so abzurichten, daß der Anschein dieses menschlichen Sprechens nach Möglichkeit gewahrt bleibt.

Man erziehe also seinen Grauen zu einem „Menschen" und nicht zu einer gedankenlos plappernden Maschine, man wird erstaunt sein, wenn man sich in die Erziehung des Vogels vertieft, was ein solches Tier an anscheinend überlegtem Sprechen leisten kann.

Folgende Beispiele an meinen drei Grauen. Trete ich morgens an die Käfige und hole die Futtergefäße, so ertönt es: „Jakochen hat Hunger, bitte, bitte, so Hunger". Schiebe ich die Gefäße ein, so ertönt es: „Danke". Zerschneide ich einen Apfel in ihrer Gegenwart, so ertönt es: „Ei, das schmeckt". Gebe ich den Apfel, spricht der Vogel: „Danke". Schreit oder lärmt ein Vogel einmal, so ertönt es aus dem Nebenkäfig: Ruhe, unnützes Tier, Ruhe". Bellt mein Hund, verweist ihn der Jako zur Ruhe, usw., alles „menschliches" sprechen und doch — Dressur.

Ziehe ich den Überzieher an, so imitiert ein Vogel mit den Flügeln genau das Anziehen, setze ich den Hut auf, ertönt es „Adjö", alles einstudiert, aber bewundernswert angewandt. Würde ich dem Vogel abends beim Zudecken „Adjö" sagen, so würde er natürlich an Stelle von „Gute Nacht" ebenfalls dieses Wort gebrauchen.

Nach meinen zwanzigjährigen Erfahrungen trifft die „Überkreuz-Theorie" beim Jako unbedingt zu. Weibliche Graupapageien sind zu Männern und Männchen zu Frauen bedeutend zutraulicher und anhänglicher.

Ich besitze zwei Weibchen und ein Männchen. Die ersteren sind von rührender Anhänglichkeit zu mir, das Männchen beißt mich, wo es kann, hängt dagegen mit inniger Liebe an meiner Frau. Nimmt diese den Vogel auf den Arm, so schmiegt er sich innig an und beginnt sie als Zeichen höchster Liebe zu — füttern. Komme ich dann in die Nähe, so gerät der Vogel außer sich. Die Pupillen weiten und engen sich krampfhaft, die Kopffedern werden gesträubt und das Tier nimmt Kampfstellung ein. Die Pupillen des Vogels sind überhaupt stets das Barometer seines Gemüts. Meint ein Vogel es gut, so verkleinern sich diese, in der Erregung weiten sie sich. Folgt diese Veränderung schnell aufeinander, so ist der höchste Grad der Erregung vorhanden.

Um Mißverständnissen vorzubeugen, möchte ich bemerken, daß ich diese Anhänglichkeit des entgegengesetzten Geschlechtes zum Menschen, beispw. für Hunde nicht gelten lassen möchte. Rüden sind selbstverständlich zu ihrem Herrn genau so anhänglich wie Hündinnen, doch ist der Hund im Laufe der Jahrhunderte so zum Haustier geworden, daß ihm die „Überkreuztheorie" wohl völlig fortgezüchtet ist.

Heute einen praktischen Käfig für einen Jako zu bekommen, ist nicht so leicht, wie es dem Liebhaber scheinen mag.

Ich habe selten einen wirklich praktischen Käfig in den einschlägigen Handlungen gefunden. Alle Käfige sind viel zu klein, gestatten dem Vogel nicht, sich auszuflattern, verengen sich nach oben im Geflecht, so daß der Vogel nicht einmal durchklettern kann, und sind mehr fürs Auge als für den Vogel geschaffen. Die Futtergefäße sind vielfach neben der Sitzstange angebracht, so daß der Innenraum noch mehr beengt ist, und der Vogel beim Fressen gezwungen ist, mit verdrehtem Hals sein Futter aufzunehmen.

Ich habe nunmehr durch Herrn Nadlermeister Manecke, Berlin, nach meinen Angaben einen Papageienkäfig bauen lassen, welcher alle Anforderungen erfüllt, welche ein praktischer Käfig haben muß.

Bengalenpitta
(s. S. 49)

Der Käfig ist 48 cm breit, ebenso tief und zirka 85 cm hoch. Vorn unten besitzt der Vogel 3 (nicht 2) Futtergefäße, die zweite parallele Sitzstange steckt tiefer als gewöhnlich, und der obere, große Teil des Käfigs ist nur zum Klettern und Flügelschlagen bestimmt.

Der obere Teil ist bogenförmig gearbeitet und gestattet dem Vogel glatt durchzuklettern, da das Geflecht gleichmäßig weit ohne Zusammengehen gearbeitet ist.

Auf dem Käfig ist auf einem Drahtständer eine große Sitzstange befestigt.

Drei Futtergefäße sind unbedingt vorzuziehen, und zwar für Wasser, Körner und Weichfutter (nassen Mais, Obst). Der Käfig ist rings mit weißen Glasscheiben versehen. Im Boden ist ein starkes Holzbrett verarbeitet, durch welches der Käfig auch auf eine schmalere Unterlage gestellt werden kann, ohne daß der Boden verbeult.

Der Käfig ist aus starkem verzinnten Draht, mit großer Tür gearbeitet und wird für größere Papageien (Molukken, Aras) 55 cm groß geliefert.

In solchem Käfig kann der Jako sich auslüften und ausschlagen, ohne daß er beim Flattern die Flügel zerschlägt.

Über die richtige Fütterung der Jakos sind schon ganze Bücher geschrieben, trotzdem ist dieselbe so einfach, daß sie sich in wenig Worte zusammenfassen läßt.

Gebt keinem Jako Hanf. Gebt ihm wenig ölige Sämereien, viel mehlhaltige, häufig Obst, frische Weiden oder noch besser Holunderruten.

Ich habe mit folgender Fütterung die besten Erfolge gehabt. Spitzsamen, so viel der Vogel fressen will. Spitzsamen ist das beste und gesundeste Futter für alle Grauen. Dann Mais, 24 Stunden (nicht nur eine Nacht) in kaltem Wasser erweicht, noch naß. Etwas Sonnenblumen, geschälten Hafer, Hirse (wird selten gefressen), ab und zu Walnüsse, Erdnüsse.

Dann Obst. Äpfel, Bananen, Kirschen, Apfelsinen, Weintrauben, alles mit Maß und Ziel, doch darf Obst nie fehlen.

Mit frischen Maiskolben sei man vorsichtig, nicht alle Vögel vertragen sie, viele bekommen Durchfall danach. (Schluß folgt.)

Einiges über die Gartengrasmücke.

Von Anton Luginger.

(Nachdruck verboten.)

Jedem Vogelliebhaber wird die Gartengrasmücke wohl bekannt sein. Über ihren Gesang und ihre Verpflegung möchte ich einiges berichten. Vorausschicken will ich jedoch, daß ich besonders auf die Gartengrasmücke in der Vogelliebhaberei eingestellt bin, schon ihrer Anspruchslosigkeit in der Pflege und ihres fleißigen Gesanges wegen. Während meiner langen Kriegsgefangenschaft in den einsamen schottischen Bergen habe ich den Gesang unserer edlen Sänger ganz vermissen müssen, was mich besonders schmerzte. Außer wenigen Finkenvögeln, Staren und einigen Rotkehlchen habe ich nur Möwengeschrei und Krähengeplärre gehört. Als es aber eines schönen Tages im Monat Mai wieder heimwärts ging, hörte ich auf der Fahrt an der Seine entlang, als wir über Paris gegen die Schweiz fuhren, wieder das erste Orgeln der Gartengrasmücken, nach langer Zeit. Es war ein köstlicher Genuß, in der reizvollen Landschaft wieder edle Sänger der Heimat zu hören. — Wenn gegen Ende April die frischerwachende Natur ihre Sänger erhalten hat, so hört man unter ihnen auch die Gartengrasmücke in Hainen und Gärten, Laub- und Feldhölzern, mit ihren fleißigen unermüdlichen Gesang. Wenngleich gerade diese Grasmücke in ihrem Äußern von der Natur in ihrem einfachen grauen Gefieder stiefmütterlich bedacht ist, ist sie doch ein anmutiger Vogel, welcher dem Liebhaber Freude bereitet. Sie zählt als Sänger zu den Mischern, aber ihr Gesang ist sehr melodisch, flötenartig und reich an angenehmen Tönen. Wenngleich man gewöhnlich meint, der Gesang der Gartengrasmücke ist überall gleich, so findet doch das Ohr des Kenners Verschiedenheiten im Gesang; das heißt, die Grundstrophen bleiben dieselben, aber die eine hat kurze oder längere Strophen, die eine singt tiefer, die andere heller und wieder andere, welche man seltener zu hören bekommt, haben einzelne Teile aus Strophen anderer Vögel aufgenommen. Ich habe in der freien Natur wiederholt Grasmückenstrophen gehört, welche Rufe der Singdrossel, des Pirols oder den Endlaut des Schwarzplättchenschlages in ihrem Liede aufwiesen. Unter meinen Pfleglingen befindet sich ebenfals eine Grasmücke, deren Gesang sich durch ganz tiefgurgelnde Touren auszeichnete und sich mit ihrem lauten Endlaut wie „David, David“ oder „Huidioh, Huidioh“ ganz besonders hervorhebt. Dieser Vogel ist auch etwas größer und heller gefärbt als die übrigen. Vor zirka 14 Jahren besaß ich ebenfalls einen Vogel dieser Art, welcher seine Strophen stets mit dem Ruf des Pirols begann.

Die Gartengrasmücke erweist sich als ein sehr dankbarer Stubengenosse, dessen Gesang bei normaler Körperbeschaffenheit anfangs Januar beginnt und während der Mauser oft nur kurze Zeit unterbrochen wird, die aber dann um so vollendeter hervortritt und fortdauert bis Ende Juli, selbst bis in den August hinein.

Meine Grasmücken sind bei normaler Körperbeschaffenheit und fingen Weihnachten—Neujahr zu singen an und sind bis jetzt (Ende Januar) bereits halblaut im Gesang, und zwar vom frühen Morgen bis zum späten Abend unter Einhaltung einstündiger Ruhepause. Selbst bei Lampenlicht singen sie bis 10 Uhr abends, wenn das Zimmer warm und gut beleuchtet ist, zumal wenn etwas „Leben in der Bude“ herrscht. Es handelt sich nicht um junge Vögel, sondern bis auf eine Ausnahme um langjährige Pfleglinge. Allerdings verliert sich der abendliche Lichtgesang allmählich wieder, aber dafür singen diese schon am frühen Morgen noch bei Licht, gleich nach der Fütterung. Bei durchbrechenden Gesang habe ich diese Beobachtung bezüglich des Singens bei Lampenlicht alljährlich gemacht, es verliert sich aber wieder wie gesagt bei stark einsetzendem Gesang und sie singen dafür untertags noch unermüdlicher. Jetzt nun genug betreffs des Gesanges, ich wünsche nur, daß viele Liebhaber sich im Winter an dem Gesang der Gartengrasmücken erfreuen können. Meine Lieblinge sind stets in einem gleichmäßig erwärmten Zimmer, welches abends gut beleuchtet ist und dann sind die Vögel individuell veranlagt.

Selbstverständlich muß man alles daran setzen, wenn man Vögel käfigt, diese auch richtig und gewissenhaft zu verpflegen. Man muß stets auf das Wohl der Vögel bedacht sein; wer das nicht kann, der lasse die Vögel in der freien Natur.

Die Gartengrasmücke ist in ihrer Fütterungsweise gar nicht anspruchsvoll; aber doch muß man Sorge tragen, daß sie stets bei normaler Körperbeschaffenheit bleibt; denn gerade diese Grasmücke ist die gefräßigste unter allen und neigt deshalb am meisten zur Fettsucht. Wie schon bemerkt, ist jeder Vogel individuell veranlagt und so muß auch die Fütterung eine individuelle sein, wie Herr Birk, Leipzig, dies erst kürzlich hier so vortrefflich behandelt hat. Mein Freund verfügt über eine 40jährige Praxis in der Vogelpflege und dieser sagt immer zu mir, wenn in unserer „Ges. Welt“ Herr Birk, Leipzig, ein Thema behandelt, wie schön und richtig schreibt dieser Mann. Ich

möchte Liebhaber, namentlich Anfänger, nur auf den schönen Artikel verweisen, in welchen Herr Birk über „Liebhabersorgen“ in der „Ges. Welt“ vor kurzem so eingehend berichtet hat.

Bei verfetteten Grasmücken muß man Sorge tragen, daß diese bei entsprechender Fütterungsweise langsam wieder zu normaler Körperbeschaffenheit kommen, was am besten bei Verabreichung trockener Ameisenpuppen vermischt mit etwas geriebener, gelber Möhre und aufgequellten roten und schwarzen Holunderbeeren, am besten gemahlen, zu einer recht flaumigen Masse verarbeitet geschieht, ohne weitere Zusätze. Die Beigabe eines Stückchen Apfels täglich gerieben, oder in Schnitten an den Käfig gesteckt, ist nicht zu unterlassen. Man muß jedoch sehen, daß die Abmagerung langsam vor sich geht; man muß den Vogel, wenn das Auge allein nicht die Übung hat, alle 8—14 Tage herausnehmen und sich über die Körperbeschaffenheit unterrichten. Ein kleines Fettbäuchlein schadet nichts, nur die Brust soll von der Fettschicht freibleiben, sie soll rund und rötlich sein. Ein so beschaffener Vogel kommt auch dann rechtzeitig in die Mauser, welche dann gut vonstatten geht. Mir ist es im vorigen Jahre leichsinnigerweise selbst passiert, daß sich eine Grasmücke arg verfettete. Da ich diese Verfettung erst zu spät entdeckte, es war schon Ende Januar und die Mauser bevorstand, wollte ich zu einer Schnellentfettung greifen, was ich leider auch tat. So geschah es, daß der Vogel zu rasch abmagerte. Trotz einsetzender kräftiger Fütterung wurde dann der Vogel immer magerer und schwächer. Das Brüstlein trat scharf hervor, die Augen waren matt und auf einmal fraß er immer weniger, zuletzt dann gar nichts mehr. Allerdings half ich mit einigen Mehlwürmern noch immer nach. Der Vogel fing dann an, planlos im Käfig herumzutoben, flog stets ans Gitter, die Augen waren ganz trübe als wenn es nichts mehr sehen würde, hockte dann wieder im Käfig vollständig erschöpft umher und begann nach einiger Weile sein planloses Flattern von neuem. Der Vogel atmete schwer; kurzum, ich gab ihn als verloren auf. Da kam ein Freund zu mir und nahm den schwerkranken in Kur; er stopfte den Vogel allstündlich mit 3 Mehlwürmern und am nächsten Tage wurde er schon etwas frischer; nach 3 Tagen nahm er selbst wieder Mehlwürmer an, von welchen er täglich 30 Stück bekam; nach 10 Tagen, er nahm auch schon wieder etwas Mischfutter, begann der Vogel mit dem Gesang, welcher sich nach 4 Wochen zur vollen Höhe steigerte. Während der Kur stand die Grasmücke auf einem warmen, sonnigen Platz. Der Vogel war jetzt auffallend frisch; die Zahl der Mehlwürmer wurde dann wieder bis auf 10 Stück pro Tag verringert und zum Mischfutter auch etwas feingehacktes Hühnerei gegeben, bis frische Ameiseneier zu erhalten waren, die dann bis zum Herbst blank gefüttert wurden. Die Mauser fand dann nicht im Frühjahr, sondern im August statt, wo sich der Federwechsel glatt vollzog. Auf diese Weise wurde der Vogel gerettet und ich bin meinem Freunde hierfür recht dankbar, denn gerade dieser Vogel ist einer meiner besten Sänger. Ich möchte hiermit vor einer zu schnellen Entfettung eindringlich warnen.



Mamulastelze
(s. S. 49.

Im Frühjahr füttere ich meine Pfleglinge mit frischen Ameisenpuppen ein und reiche diese blank bis zum September, solange sie zu bekommen sind. Durch die Fütterung mit blanken Ameisenpuppen werden die Vögel dann auch viel widerstandsfähiger. Im Spätsommer und Herbst gibt es dann roten und später den schwarzen Holunder, in Trauben gereicht. Den schwarzen Holunder füttert man, wenn möglich, sehr lange frisch bis Ende Oktober. Ehe die frischen Ameisenpuppen zu Ende gehen, wird wieder allmählich zum Mischfutter übergegangen, und zwar trockene Ameisenpuppen, gelbe Möhre, etwas geriebene Semmel, klein wenig gut zerdrückten Hanf, gut vermischt zu einer recht leichten, lockeren Masse, etwas Obst und frische schwarze Holunderbeeren, später ersetzt durch trockene. Mehlwürmer gibts bei mir während der Fütterung mit frischen Ameisenpuppen und während des Herbstes wenig oder gar nicht, nur ab und zu

mal als Leckerbissen. Während der Monate November und Dezember muß man sehen, daß sich die Vögel nicht zu arg verfetten. Kommt dann der Januar und sind die Vögel normal, so wird auch der Gesang rechtzeitig einsetzen und dann auch die Mauser. Sobald die Grasmücke mit dem Gesang durchbricht, bedarf sie auch wieder einer kräftigeren Nahrung, da wieder ein größerer Kräfteverbrauch vorhanden ist. Je nach der individuellen Veranlagung des Vogels lege ich auf das Mischfutter etwas feingehacktes Hühnerei, einige Mehlwürmer, aufgequellte zerschnittene Weinbeeren; überhaupt ist darauf zu sehen, daß die Beigaben, welche eigentlich den Wert als Leckerbissen nicht verlieren sollen, recht abwechslungsreich sind. Ein Stückchen Biskuit, eine poröse flaumige Masse, in Wasser getaucht und wieder ausgedrückt oben aufs Futter gelegt, wird von den Grasmücken außerordentlich gern genommen und ist ihnen als Leckerbissen stets willkommen. Im Herbst läßt man es besser weg, da die Tiere dann leicht zu fett werden. Mageren Vögeln kann es stets gereicht werden. Mein Mischfutter wird abends schon hergerichtet vor dem Schlafengehen; alles wird gut vermischt, zusammengedrückt und an einen kühlen Ort gestellt. Am Morgen gibt es dann eine recht flaumige Masse. Ein Sauerwerden des Futters ist im Winter nicht zu befürchten. Die Holunderbeeren weiche ich alle Abende in heißem Wasser auf, presse diese nach einiger Zeit fest aus und lege sie dann lose an einen kühlen Ort bis zum Morgen, wo sie dann unters Mischfutter gemengt werden. Auf diese Weise trocknen die Beeren etwas ab, das Futter wird nicht naß. Sind die Beeren gerieben, so menge ich diese gleich abends bei der Futterzubereitung unter das Mischfutter in trockenem Zustande, vorausgesetzt, daß sie fein gemahlen sind. Bei der Auflockerung am Morgen entsteht eine tadellose flockige Masse; verwende dieses gern an fette Vögel. Die Fütterung geschieht am besten zeitig am Morgen; es ist dieses meine allererste Arbeit. Wenn ich von der Beschäftigung zu Mittag oder am Abend zurückkomme, verabfolge ich einige Mehlwürmer oder sonstige Leckerbissen, je nach Bedarf, und sehe, ob alles in Ordnung ist. Trink- und Badewasser ist stets überschlagen zu reichen. Die Temperatur soll nicht zu sehr schwanken, auf gleichmäßige Stubenwärme ist zu achten und bei besonders kalten Nächten, hauptsächlich während der Mauser, verhänge man den Käfig mit einem wollenen Tuch. Zugluft ist zu vermeiden. Während des Sommers und Herbstes kann man auch einige Heuschrecken ab und zu zerschnitten zum Futter geben. Überhaupt bringe man im Sommer ab und zu verschiedene Leckerbissen von draußen mit. Ein Liebhaber sollte bei seinen Spaziergängen in Feld und Wald stets ein kleines Insektenbüchschen bei sich führen. Man findet dieses oder jenes, was dem Vogel eine Abwechslung bietet.

Der Liebhaber soll auch die Vögel in ihrem Treiben in der Natur beobachten und sehen, ob er ihnen im Käfigleben nicht diese oder jene Freude bereiten kann.

Abseits von meinem Thema möchte ich noch ein Beispiel erwähnen. Meine Gattin, auch eine Freundin unserer edlen Liebhaberei, verpflegt ein Goldhähnchen, welches sie von meinem teuren Freund zum Geschenk erhalten hat. Da es sich im Winter nicht gern badete, so gab ich dem kleinen Vögelchen einen Fichtenzweig, welcher mit Rauhreif bedeckt war, in den Käfig auf die Sitzstange. Der Rauhreif wurde natürlich im Zimmer zu Wasser und man sollte das drollige

Weißkehlhäherling
(s. S. 49).

Vögelchen gesehen haben, wie es sich auf diesem Zweige badete. Es ist dieses köstlich anzusehen, wie es sich freute und sozusagen schwimmt und dahinrutscht auf diesem nassen Zweig; diese Stellungen. Alle Tage jetzt im Winter bekommt unser Hähnchen zu Mittag sein Bad mit einem Fichtenzweig. Durch Schmelzen des Schnees entstehen schwere Tropfen am Zweige; an ein Erkälten denke ich nicht, da das Vögelchen etwa nach 5 Minuten das Bad erst annimmt. Dieser Vogel liebt frisches Wasser. Dem Goldhähnchen ist dieses tägliche Bad wirklich eine Erquickung und ich möchte Liebhaber von solchen Vögelchen raten, einmal einen Versuch damit anzustellen. Ich habe in der Freiheit Goldhähnchen auf nassen Fichtenzweigen baden gesehen und diesen Versuch hierauf gemacht.

Den Gartengrasmücken soll man im Mai, wenn der Gesang in hoher Blüte steht, täglich einige trockene Grashalme in den Käfig stecken. Man hat wirklich Freude, wie der Vogel die Halme da drinnen

im Käfig herumzieht. Gleich mit 5—6 Halmen im Schnabel springt er umher und singt erst recht, oft auch mit einem Grashalm im Schnabel.

In der freien Natur bauen sich die Männchen ja auch sogenannte Singnester.

Möge das Geschilderte für manchen Liebhaber, der vielleicht Mißerfolge aufzuweisen hat, ein kleiner Beitrag sein über die Verpflegung unserer Gartengrasmücke. Es soll damit nicht gesagt sein, daß dieser Weg der einzig richtige ist, denn es führen mehrere Wege zum gleichen Ziele, wenngleich die Art und Weise eine verschiedene ist.

Auf der letzten großen Vogelschau in München im Dezember vorigen Jahres war auch neben den edelsten Weichfressern, welche durchweg alle in guter Verfassung waren, die Gartengrasmücke schlank und aalglatt im Gefieder vertreten. Ein gutes Zeugnis für eine verständnisvolle Pflege.

Läßt man ihr diese angedeihen, so hält sie viele Jahre im Käfig aus und ich möchte fast sagen, es gibt keinen dankbareren Sänger bis an sein Lebensende als unsere Gartengrasmücke.

Haltung und Züchtungsversuche mit fremdländischen Tauben.

Von E. Spille, Mtgl 83 der A. Z.

(Nachdruck verboten.)

Leider kann ich darüber nur wenig berichten, da die Züchtung derselben ganz einfach und glatt vor sich ging. Ich erhielt vor drei Jahren ein Paar Täubchen durch einen Freund, der sie aus Hamburg mitbrachte. Glücklicherweise war es ein Zuchtpaar, welches ich im warmen Frühjahr in die große Gartenvoliere zu den Prachtfinken und Webern setzte, mit denen sie sich gut vertrugen, das heißt, sie kümmerten sich gar nicht um die anderen Vögel. Nach etwa 14 Tagen bemerkte ich, daß sich die Täubchen mit dünnen Zweigen herumtrugen. Ich baute ihnen mehrere flache Holzkästchen, von denen sie eins, welches eigentlich nach meiner Ansicht am unglücklichsten hing, bevorzugten. Nachdem sie sich einige Tage mit dem Nestbau beschäftigt hatten, indem sie etwa 12—15 fingerlange Zweige kreuz und quer im Nest durcheinander geschoben hatten, ließen sie das Nest im Stich und bauten auf einem Ast weiter, doch fielen die Zweige stets zur Erde, trotz aller Mühe. Um ihnen zu helfen, befestigte ich in den Zweigen eine Unterlage aus Drahtgeflecht, welche sie mit lebhafter Freude begrüßten und in zwei Tagen das Nest fertig machten. Dann kümmerten sie sich über 8 Tage gar nicht mehr um das Nest, so daß ich alle Hoffnung schon aufgab, bis ich doch noch am nächsten Tage ein Ei vorfand, das 2. wurde am Tage darauf gelegt, doch ans Brüten dachten die Täubchen nicht. Am 6. Tage nach dem ersten Ei begann doch endlich das Brüten, und 16 Tage später, Pfingsten, schlüpften die Jungen aus, welche bei Hirse, Glanz, Rübsen, kleinen Regenwürmern und Schnecken gut gediehen und rasch wuchsen; nach drei Wochen flogen beide Jungen aus und wurden noch etwa 8 Tage gefüttert, dann waren sie selbständig. Dieser ganze Brutverlauf geschah im verdeckten Raum. Alsdann bemerkte ich, daß die Alten wieder bauen wollten, aber unschlüssig waren, wo sie sich einrichten wollten, jeder Nistkasten und jedes Harzer Bauer, welche nicht von anderen Vögeln benutzt wurden, untersuchten sie, ließen dann aber davon ab. Nun hatte ich im Außenraume ein Schutzhäuschen in Gestalt

Zebratäubchen.

der bekannten Tellskapelle gebaut, etwa 1 Quadratmeter Grundfläche und 1 Meter Höhe; auf dem Dach einen 1 Meter hohen Turm. Dieser Turm wurde von den Täubchen immer wieder aufgesucht. Ich klemmte eine halbe Kokosnußschale hinein, und das Nest fand Beifall, so daß die Tiere es stets wieder benutzen, trotzdem sie dort Wind und Wetter ausgesetzt sind. Hier brachten sie 1923 4 Junge auf in 3 Bruten, 1924 6 in 5 Bruten, und jetzt wollen sie das Geschäft dem Anschein nach wieder beginnen. Das wäre wohl alles, was ich von meinen Sperbertäubchen berichten kann. Ein Pärchen Zenaidataubchen wollte im späten Herbst ebenfalls mit dem Nestbau beginnen, hat sich aber wohl wieder besonnen und macht hoffentlich dieses Jahr Ernst. Ich habe mir nun je ein Paar Kap-, Senegal- und Bronzeflecktäubchen zugelegt und hoffe, auch mit diesen Tieren Erfolg zu haben. Früher habe ich einmal Kaptäubchen gehabt, welche die

dumme Gewohnheit hatten, ihr Nest auf den Türgriff zu bauen, jedes Mal fiel beim Öffnen der Tür das Nest fort. Ich habe schließlich den Griff entfernt. Nun bauten die Tiere einen Haufen Reisig auf einen Wellensittichkasten und haben dort zweimal mit vollem Erfolg gebrütet. Ebenso hatte ich mehrere Jahre die herrlichen Fächertauben, welche sich leider als zwei Weibchen erwiesen. Auch sie beschäftigten sich gern mit Zweigen und kleinen Knüppeln, die sie zusammenlegten. Meine Absicht, das eine Weibchen umzutauschen, wurde durch den Krieg vereitelt. Als ich eingezogen wurde 1915, war kein Futter mehr zu beschaffen, und ich mußte die Pflege meinen kleinen Kindern überlassen. Daß nichts daraus wurde, war ja voraus zu sehen, aber ich konnte keinen Ersatz schaffen. An Unkrautsamen ist mir alles mit der Zeit eingegangen. Ich war eine Last vom Halse los, denn durch die Haltung vieler Vögel, wenn sie auch Körnerfresser sind, ist man doch sehr gebunden. Wie ich aber 1919 wieder einmal ein Paar Wellensittiche sah, war ich wieder Feuer und Flamme, und so bin ich in der Liebhaberei mitten darin, wenn auch nicht in dem Umfang wie vor dem Kriege. So ganz ohne Tiere geht es doch nicht. Betreffs der Täubchen möchte ich noch bemerken, daß ich im Jahrbuch so wenige Liebhaber dafür gefunden habe. Das ist eigentlich unrecht, denn diese Art ist ebenso fest wie viele andere Exoten und kann unbedenklich in freier Voliere gehalten werden, wenn sie vorsichtig eingewöhnt ist. Dann sind sie sogar zutraulich wie ein Zebrafink. Deshalb möchte ich sie den Liebhabern wohl empfehlen. Das wäre wohl alles, was ich heute berichten kann.

Rotschwänze — Phoenicurus *(Forst.)*.

Eine Monographie von John Kuntzendorff.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der kaukasische Hausrotschwanz — Erithacus ochruros (*Gm.*)

bildet den Übergang von den europäischen Hausrotschwänzen zu den asiatischen und ist das erste Glied der rotbäuchigen Vögel. In seiner Gestalt und Haltung gleicht er vollständig titys. ♂ ad.: Stirn, Oberkopf dunkel mausgrau, schmales Band oberhalb des Schnabels, Kopfseiten, Hals, Brust, Rücken tief schwarz; Bürzel mausgrau; Bauch gelblich rostbraun; Flanken schwarz, mehr oder weniger grau gefleckt; Unterschwanzdecken etwas heller gelblich rostbraun; Oberschwanzdecken, Schwanzfedern rötlich rostbraun, beide mittelsten Schwanzfedern schwärzlich braun; Flügelfedern dunkelbraun, Flügeldecken mit breiten hellbräunlich sandfarbenen Armschwingen mit schmalen, weißlich sandfarbenen Handschwingen mit schmalen, hellbräunlich sandfarbenen Säumen, Arm- und Handschwingen außerdem mit schmalen hellbräunlich sandfarbenen Spitzensäumen — die hellen Säume bilden einen undeutlichen Spiegel —; Unterflügeldecken schwarz mit grauen Achselfedern, rostfarben mit grauen oder schwärzlichen Säumen und Innenfahne; seitliche Steuerfedern ohne dunkle Endbinde. Der Schwanz ist relativ etwas länger als bei titys.

♀ meist etwas bräunlicher als die von titys. Jugendkleid: dunkelolivbraun, jede Feder heller gespitzt; unterseits heller olivbraun, gräulichhellrostfarben gespitzt, daher gefleckt erscheinend; Bauchmitte gräulichhellrostfarben; Schwanz wie beim ♂ ad.: Flügel braun, an der Außenfahne breit gräulich hellrostfarben gesäumt. Im allgemeinen ist die Färbung konstant, in der Regel ist die Unterseite $^1/_3$—$^1/_2$ derselben rostfarben, Radde hat jedoch bei einem

Fahnendrongo.

Exemplar das Schwarz so weit nach unten verbreitet gefunden, daß für die rostbraune Färbung nur ein ganz kleiner Raum übrigblieb. Weitere Untersuchungen müssen es klarstellen, ob es bei dieser Art mit einem relativ viel kleineren Verbreitungsgebiet als das seines europäischen Vetters ebenfalls Variationen gibt. Hartert verzeichnet als Flügellänge 82—87 mm.

Von einer Einführung des kaukasischen Hausrotschwanzes nach Deutschland ist mir nichts bekannt.

Sein Verbreitungsgebiet ist Kaukasien, das nördliche Kleinasien (hiervon hauptsächlich Armenien) und Nordwestpersien. Kleinschmidt trennt die Vögel des Nordkaukasus von denen aus Transkaukasien, bei denen die Achselfedern mehr Rostrot aufweisen, die weißlichen Säume der Armschwingen schmäler sind; diese sollen phoenicuroides näher stehen, als die Kaukasier. Erithacus ochruros vertritt in seiner

Heimat unseren Hausrotschwanz und begleitet den Menschen bei seinen Siedelungsversuchen hoch hinauf ins Gebirge. Gemein ist er im Kaukasus bis zum Kasbeck. Er ist hier Brutvogel, während er sich in den Tiefländern nur auf dem Zuge aufhält. Er nistet in Spalten, an Felswänden, Baumlöchern, an Gebäuden, in Spalten und Löchern der Mauern der sich hoch ins Gebirge hinaufziehenden Burgen, ebenso wie er gerne zwischen den Schieferplatten in den Turmwänden derselben sein Nest baut. Die Eier sind blaugrün wie die des Gartenrotschwanzes oder weiß mit blauem Schimmer.

Der syrische Hausrotschwanz, — Erithacus ochruros semirufa *(Hemp. & Ehr.)* ist dem vorigen sehr ähnlich und vertritt ihn in seiner Heimat, welche sich über Syrien, Palästina und die Euphrat- und Tigrisebene erstreckt. Hier bewohnt er hauptsächlich die Gebirge. Vier Museumsstücke lagen mir vor. In Ägypten ist er nur auf dem Zuge beobachtet worden. Kleinschmidt erwähnt in einer Bemerkung bei Naumann, Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas, beim Hausrotschwanz, graubäuchige Vögel Palästinas; eine diesbezügliche Bemerkung vermisse ich jedoch bei ihm in Berajah, zoographia infinita, Erithacus Domesticus, die von diesen Vögeln handelt. Er scheint sie hier vielmehr mit titys zusammengetan zu haben.

Auch dieser Hausrotschwanz dürfte lebend noch nicht nach Deutschland gekommen sein.

Die beiden letzterwähnten Rotschwänze bilden die Übergangsstufe zu Erithacus phoenicuroides und Erithacus rufiventris. Im allgemeinen werden sie unter dem Namen „Pagodenrotschwanz" zusammengefaßt, obgleich sie sich ebenso unterscheiden, wie wiederum phoenicuroides von ochruros. Es sollte mich sehr wundern, wenn unter den bisher eingeführten „Pagodenrotschwänzen" nicht des öfteren auch beide Formen vertreten wären. Belegt man den östlichen Vertreter mit dem Namen „Pagodenrotschwanz", so müßte der westliche, phoenicuroides, unbedingt anders benannt werden, da er sich von rufiventris ungefähr so unterscheidet, wie, wie gesagt, von ochruros, da sonst unter der deutschen Nomenklatur, besonders für die Liebhaber, nie Klarheit herrschen wird. Behält man aber für beide den Namen „Pagodenrotschwanz" bei, so muß man sie durch klar verständliche Beiworte trennen, ihren Unterschieden gemäß, und dieses ist um so mehr notwendig, als beide Formen in mindestens zwei Unterformen sich teilen. Ich nenne daher Erithacus phoenicuroides den „weißstirnigen Pagodenrotschwanz" und Erithacus rufiventris den „graustirnigen Pagodenrotschwanz". Beide Formen sind schon eingeführt worden, denn von beiden habe ich Exemplare gekäfigt*). (Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Windgeschwulst (?) beim Grünling. Die Mitteilung des Herrn A. Mertes-Mainz über „Windgeschwulst" bei einem jungen Wellensittich (Heft 6 der „Gefiederten Welt" 1925, Seite 67) hat mich sehr interessiert. Einen ähnlichen (oder gleichen (?)) Fall beobachtete ich Anfang August 1924 an einem jungen Grünling, welchen ich nahe Hohe Mark im Taunus fand. Der Vogel flatterte dicht vor mir von einem Baume herab zu Boden. Er hatte den Schnabel weit geöffnet und schien große Schmerzen zu empfinden. Das Tier zeigte an der Unterseite des Leibes und am Rücken blasenartige Auftreibungen der Körperhaut. Am Bauch erstreckte sich diese Erscheinung vom Halse bis zum After und reichte bis unter die Flügel. Sie hatte eine Höhe von etwa 1—1½ cm. Am Rücken hatte die „Blase" eine Höhe von zirka 1 cm; sie begann im Genick des Vogels und erstreckte sich bis 1 cm vor dem Bürzel. Das rechte Bein des Grünlings stand infolge der Hautauftreibung schrägseitlich vom Körper ab (etwa in einen Winkel von 60°). Vermittels einer Nadel stach ich die Blasen am Leib des Vogels auf, worauf sich aus diesen eine wässerige, grünlichgelbe Flüssigkeit entleerte, welche jedoch im Verhältnis zur Größe der Blasen eine viel zu geringe Menge darstellte, die erst dann zum Vorschein kam, nachdem sich die Haut fast an den Körper angelegt hatte. Anscheinend war wohl außer der Flüssigkeit auch Luft in den Blasen. Ich nahm seinerzeit an, daß diese Auftreibungen der Haut eine Folge von Insektenstichen oder dergleichen seien, doch scheint es sich auch in diesem Falle ebenfalls um „Windgeschwulst" — wie bei den von Herrn Mertes erwähnten Wellensittich — gehandelt zu haben. — Oder gibt es vielleicht noch andere, ähnliche Erscheinungen, welche evtl. durch Insektenstiche oder andere Schmarotzer hervorgerufen werden? Wilh. Schreitmüller.

Aus der Gartenvoliere. Mein Grundstücksnachbar, der Vorsitzende unseres Jenaer Vereins für Vogelschutz und -pflege, hielt im vorigen Sommer in seiner großen, zweiteiligen, gut bepflanzten Gartenvoliere eine ganze Anzahl einheimischer Vögel, darunter auch 2 Amseln. Von früh bis Abends nach Einbruch der Dunkelheit ertönte deren herrlicher Gesang monatelang. Im Herbst wurden beide beringt und in Freiheit gesetzt. Lange Zeit waren sie noch im Garten zu sehen, endlich verschwanden sie. Jetzt, Anfang Februar, sind beide wieder da und noch so zahm, daß man sich ihnen bis auf einen Meter nähern kann, erst dann hüpfen sie beiseite. Die Tür zur Voliere stand auf, da alle Vögel im Herbst ins Zimmer gebracht wurden. Vor einigen Tagen, Anfang Februar, tönte Amselgesang aus der Voliere, der eine beringte Amselhahn hatte es sich drin bequem gemacht und dachte nicht daran, wieder fortzufliegen. Dargebotenes Badewasser wurde sofort angenommen, ebenso der Futternapf, und bald ging das Singen wieder los. Da soll nun mal einer was von „Freiheitsberaubung" reden! Freiwillig geht ein Vogel, der monatelang die Freiheit genoß, ins „Gefängnis zurück!" Interessant war das Verhalten einer anderen, etwa ein Dutzend Jahre gekäfigten Amsel, die zur Sommerfrische mal in die Voliere gesetzt wurde. Dieser Vogel, einst künstlich „aufgepäppelt", fühlte sich sofort in der Voliere heimisch, flog auf den Boden und suchte und fand unter dem Laube sofort Würmer. Eine Nachtigall, die fußleidend war, wurde im Spätsommer in die Voliere gebracht, und schon nach kurzer Zeit waren die Füße gesund, der Vogel sang mit Schwarzplättchen und Gartengrasmücke um die Wette bis in den Spätherbst hinein draußen in der Voliere.

Jena, 14. Februar 1925. Adolf Voigt.

Frühjahrsbeobachtungen Biberach/Riß: 12. Febr. 1 weiße Bachstelze an der Bahn; 13. Febr. 1 weiße Bachstelze an der Riß; 14. Febr. Buchfinken in lautem Schlag am Rotzengraben, viele Dompfaffen auf dem Gigelberg; 15. Febr. zirka 50 Grünfinken auf Birnbaum und 5 Stare, singend, auf Apfelbaum an der Burrewstraße, 1 Amsel, laut singend, im Garten des Finanzamts, 1 Feldlerche, ebenfalls im Gesang. A. Jena.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Fußringe bei Farbenwellensittichzucht. Auch ich hatte bei der Beringung von Wellensittichen, deren unbedingte Notwendigkeit für jeden ernsten Züchter außer Zweifel steht, lange Zeit meine liebe Not. Spiralförmige Ringe sind kaum auf den Fuß zu bringen, andere Ringe werden durch die Krummschnäbel meist in kürzerer Zeit entfernt,

*) Es wäre interessant zu erfahren, ob Erithacus phoenicuroides gemeinsam mit Erithacus rufiventris eingeführt worden ist. Deshalb bittet der Verfasser um Angabe der Art, des Verkäufers, sowie des Datums des Kaufes und Beobachtungen der Käufer dieser Vögel. Berlin SW 29, Mittenwalderstr. 32,

als der Liebhaber brauchte, um sie anzubringen. Numerierte Metallringe haben, wenn sie wirklich so derb und widerstandsfähig sind, daß der Vogel sie nicht entfernen kann, den Nachteil, daß sie sich kalt anfühlen. Ferner kann die Nummer am Ring erst dann wahrgenommen werden, wenn man den Vogel in der Hand hält. Wenn mehrere Sittiche aber einen gemeinsamen Flugraum teilen, und dies ist bei Wellensittichzüchtern doch immer der Fall, können sie nur durch farbige Fußringe, auch auf den ersten Blick, sofort unterschieden werden.

Über freundliche Anregung des Herrn Rechnungsdirektor Preyer beringe ich meine sämtliche Vögel, auch Prachtfinken und größere Sittiche (Nymphen- und Pennantsittiche) mit farbigen Zelluloidringen, die mit Azeton geklebt werden.

Der Vogel wird in die linke Faust genommen, Kopf nach unten, Daumen und Zeigefinger strecken den zu beringenden Fuß. Die rechte Hand steckt den offenen Ring an den Fuß, betupft mittels eines Pinsels die beiden Ringenden und drückt dann diese mittels einer Flachzange fest aufeinander und hält sie so etwa eine halbe Minute fest. Das Azeton löst das Zelluloid und verdunstet aber sehr rasch, so daß die gelöste Masse erhärtet. Der Ring kann dann nur durch Abzwicken mittels Zwickzange vom Fuß entfernt werden.

Geeignete, offene Ringe liefert meines Wissens Frank-München, Gabelsbergerstraße, doch können solche auch selbst leicht hergestellt werden, besonders wenn es sich um größere Ringe (die, weil wenig verlangt, auch kaum im Handel) für Nymphen-Singsittich, Lori usw. handelt. Zelluloidfabriken liefern zu billigen Preisen farbige Musterplätchen (kartonstark) oder Abfälle von solchen. Im heißem Wasser erweicht, lassen sie sich mit der Schere in entsprechende Streifen schneiden, die, solange sie weich sind, über einen Nagel oder Holzstäbchen leicht so umbiegen lassen, daß sie, wenn trocken und erkaltet, die Ringform beibehalten.

Allerdings will ich nicht verschweigen, daß Nymphen- und Pennantsittiche mitunter auch solche Ringe, wenn sie nicht aus entsprechend starkem Zelluloid sind, durchbeißen. Am sichersten werden bei den größeren Sittichen die Ringe noch vor dem Ausfliegen oder unmittelbar darnach, angebracht. In diesem Alter sind die Vögel noch zu unbeholfen, sich ihrer Ringe zu entledigen und später, wenn sie dieselben erst gewohnt sind, machen sie auch keine Anstrengung mehr, die Ringe loszuwerden.

Auf einige wichtige Gesichtspunkte sei jedoch noch besonders aufmerksam gemacht: Azeton ist äußerst feuergefährlich! Ferner darf der Ring durch das Zusammenpressen mit der Flachzange nicht so enge werden, daß der Fuß eingeschnürt wird. Anschwellen des Fußes und Bildung von Geschwüren müßte sonst die Folge sein. Zum Schluß sei noch auf die narkotische Wirkung des Azetons hingewiesen. Diese Flüssigkeit verdunstet sehr rasch und wirkt ähnlich wie Chloroform. Daher nimmt man die Beringung der Vögel am besten im Freien vor. Gar zu ängstlich braucht man diesbezüglich wohl nicht zu sein. Mir ist es ein einziges Mal passiert, daß ein junges Wellensittichweibchen aus Anlaß der Beringung einige Tropfen Azeton aufs Gefieder gespritzt bekam und freigelassen, eine Zeitlang auf der Sitzstange wie ein Betrunkener hin- und hertorkelte. Jedenfalls halte man das Fläschchen mit Azeton, besonders dann, wenn man die Beringung im geschlossenem Raum, etwa im Vogelzimmer selbst vornimmt, gut verkorkt und öffne nur solange als unbedingt notwendig.

Norbert Grafl A. Z. 41.

Bücher und Zeitschriften.

Th. Zell (Leopold Bauke). **Werkzeuge der Tiere.** 84 Seiten mit 2 Abbildungen. 8° (Band 3 der Bios-Bücherei) geh. M. 1.30, geb. M. 1,60. R. Voigtländer's Verlag, Leipzig.

Die immer weitere Kreise ziehende und für den deutschen Wiederaufbau im Vordergrund des Interesses stehende Frage der Biotechnik findet in diesem Buche, welches als dritter Band der von Raoul H. Francé herausgegebenen „Bios-Bücherei für erfolgreiches Leben" erschienen ist, eine Fundgrube von Anregungen und wertvollsten Tatsachen.

Biotechnik bedeutet bekanntlich die Anwendung von technischen Grundsätzen, die in dem natürlichen Geschehen ihre Vorbilder haben. Zell zeigt uns nun das Naturgesetz in seinen technischen Leistungen im Tierleibe. Wir lernen die Vögel als Töpfer, Flechter, Maurer kennen, den Vogelschnabel als vollendetes Werkzeug, das Rad in der Tierwelt, die vollkommenen Lauforgane, das Tier als Beleuchtungstechniker, die Wurfgeschosse, Brutöfen, Trommeln und Lärmapparate, die merkwürdigen Einrichtungen der Tierwohnung, die Korbmacher, die Belustigungshütten gewisser Tiere, kurz eine ganze technische und kulturelle Wunderwelt.

Jeder Naturfreund wird dieses Buch gern lesen.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender Joh. Birk in Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnitz, Merveldstr. 39; Kaufsvermittlung: Franz Nyncke, Berlin O, Königsberger Str. 17.

An unsere Mitglieder!

Aufgenommen wurden in der Vorstandssitzung am 12. Januar 1925: 1. Herr Obertelegr.-Sekr. G. Varsbotter in Schlawe i. Pomm.; 2. Herr Kaufmann Bertram Kränzner in Freital-Deuben i. Sa.; 3. Herr Kaufmann P. Hermanspann in Essen a. R.; 4. Herr Siegfried Hill in Rostock i. M.; 5. Herr Eisenbahninsp. Buttler in Grevenbrück i. W. und 6. Herr Werkführer Schade in Grevenbrück i. W.

J. A.: Rudolf Petters, 1. Schriftf.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

G. Behnke, Berlin O 34, Petersburger Str. 29: Gelbnackenamazonen, Blaukehlchen, Bachstelzen, Pieper, Sumpfrohrsänger, Sprosser, Orpheus-, Sperbergrasmücke.

Friedrich Frank, München, Gabelsbergerstraße 9: Hellr. Arara, Doppelgelbkopfamazone, Peru-, Kanarienflügel-, Guatemalasittiche, 1,2 mexik. Baumwachteln, Einfarbdrosseln, Ganzkäfertauben.

J. Herzog, Ravensburg (Württbg.): Stieglitzbastard, Unterseite schneeweiß.

W. Hiltmann, Berlin S 14, Dresdener Str. 24: Klarinettenvogel, Orangetrupial.

Max Kleinert, Berlin NO 18, Strausberger Str. 13: Weißbaubenhäher, Gilbweber, tarant. Unzertrennliche, rote Araras.

Kracht, Duisburg, Bechemstr. 10: Kaprötel, Klarino, Braunrückenstrauchschmätzer, Rotkehlfliegenschnäpper, Sprosser.

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a: Damadrosseln, Goldstirnblattvögel, Blaubartblattvögel, Dayaldrosseln, -weibchen, Bergrötel, Schwarzschwanzsteinschmätzer, braunbrüstige Blauschnäpper, Braunrückenstrauchschmätzer, Schwarzkappen-, Meisen-, Braunkopf-, Braunscheitel-, Goldaugen-, rotbraune Zwergtimalie, Borstenhäherling, indische Grauwürger, indische Maskenwürger, rostbäuchiger Flötenwürger, Würgerschnäpper, Weißschulter-, Rostbauchdrosselschmätzer, Kaprötel, Organisten, weiße Reisfinken.

Friedr. Gustav Müller, Berlin SW 61, Blücherstr. 61: Sprosser, Sperber-, Dorn-, Müllergrasmücke, Gelbspötter, Laub-, Sumpf-, Schilf-, Teichrohrsänger, Blaukehlchen, Braunkehlchen, Haus- und Gartenrotschwanz, Baumpieper, Grau- und Trauerfliegenschnäpper, Würger.

E. Schöndube, Berlin, Elisabethkirchstr. 1: Kalif. Schopfwachteln, Goldhähnchen.

Fritz Sterling, Berlin NW 5, Perleberger Str. 35: Uferläufer, Rohr-, Laubsänger, Schleiereule.

A. Troschütz, Hannover, Große Aegidienstr. 4: Kalanderlerche, grünen Kardinal, Zedernvogel.

B. Wieses Vogel Export, Steyr, Ober-Österreich: Sprosser, Steinrötel, Blaudrossel, Sperber, Orpheusgrasmücken.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

rgang 54 5. März 1925 Heft 10

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Wieder eine Vogelstube! Von Dr. A. Schramm, Karlstadt am Main. (Schluß.)
Dompfaffenzucht. Von Amtmann Max Krumm. (Forts.)
Mein Liebling — der Jako. Von S. Lichtenstaedt.
Einiges über die Gartengrasmücke. Von Anton Luginger.
Haltung und Züchtungsversuche mit fremdländischen Tauben. Von E. Spille, Mtgl. 83 der A. Z.
Rotschwänze — Phoenicurus (*Forst.*). Eine Monographie von John Kuntzendorff. (Forts.)
Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Bücher und Zeitschriften - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Ausstellung - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

utz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellung.

Der Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Zwickau beabsichtigt in der Zeit vom 17.—21. Mai d. J. eine Vogelausstellung zu veranstalten.

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. 1. Vors.: Hermann Höhne, Leipzig-Vo., Eisenbahnstraße 84 VI. 1. Schriftführer: Max Hunger, Leipzig, Inselstraße 17 II. — Wir geben hiermit bekannt, daß unsere Jahresversammlung am 26. April 1925 stattfinden wird. Am Sonnabend, den 25. April, veranstaltet der Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig einen Begrüßungsabend für die Teilnehmer. Außerdem ist an beiden Tagen noch Gelegenheit, die Ausstellung desselben Vereins zu besichtigen, die im naturkundlichen Heimatmuseum zu Leipzig, Fleischerplatz, vom 18.—26. April 1925 stattfindet. Anträge zur Jahresversammlung sind bis spätestens 4 Wochen vorher (lt. Statut) an den Vorstand einzureichen. Indem wir alles dieses unseren Freunden und Mitgliedern zur Kenntnis bringen, bitten wir dringend, recht, recht zahlreich an den Veranstaltungen teilzunehmen. Der höchsterfreuliche Fortschritt, den wir für das vergangene Geschäftsjahr buchen konnten, möchte auch in der diesjährigen Jahresversammlung zum Ausdruck kommen. Es harrt unserer viel Arbeit und voraussichtlich werden auch die Anträge neue Aufgaben vorschreiben. Im gemeinsamen Schaffen werden wir aber das Werk meistern. In diesem Sinne: Auf Wiedersehen in Leipzig am 25. und 26. April. Weitere Mitteilungen folgen. Der Vorstand: J. A. Hunger, Schriftf.

Bezirksversammlung in Aue im Erzgebirge am 15. Februar 1925. In Erwartung belangreicher Erlebnisse fuhren wir am Sonntagmorgen von Leipzig ab. Unser bewährter Reichsverbandsvorsitzender und sein unermüdlicher Schriftführer mit weiteren sieben Getreuen erreichten nach froher Fahrt, während der uns unser Otto Winkler mit seinem nie versagenden Humor aufs beste zu unterhalten wußte, die sächsischen Industriestadt Zwickau. Hier empfing uns der dortige Vorsitzende Herr Schmidt mit seinem Freund. Nach kurzem Rundgang durch die Stadt mit ihrer rußgeschwängerten Morgenluft konnten wir den Vogelbestand des Herrn Schmidt in Augenschein nehmen. Angesichts bevorstehender Ausstellung war eine reiche Artenzahl vertreten, die den besten Eindruck hinterließ. Anschließend an die kurze Vogelschau vereinigte uns ein Frühtrunk mit dem Zwickauer Verein. Zu schnell verrannen dabei die kostbaren Stunden der Freundschaft, die ja immer mit Liebhabern sich so schnell zu entwickeln vermag, und die durch die überaus liebenswürdige Gastfreundschaft der Zwickauer dankenswerten Ausdruck fand. Kurz nach 1 Uhr setzte sich der Zug nach Aue in Bewegung. Auch dort aufs freundlichste empfangen, gelangten wir in kurzer Zeit zum „Feldschlößchen", wo die Bezirksversammlung gastliche Stätte gefunden hatte. Die Tür schmückten zwei Fichten und ein „Herzlich willkommen!". Die Tische waren geziert mit Tannengrün: alles ein Bild, das sofort dem freundschaftlichen Verstehen die beste Einleitung gab. Dank auch an dieser Stelle für den schönen Empfang. Zahlreich waren die Liebhaber herbeigeeilt, elf Vereine aus zehn verschiedenen Orten waren neben einigen Gästen vertreten, zusammen etwa 100 Personen, eine stattliche Zahl, die wohl geeignet war, jedem, der berufen ist, für unseren großen Reichsverband zu schaffen, das Herz höher schlagen zu lassen. Gegen 3 Uhr eröffnete der Bezirksobmann Herr Schmidt die Versammlung mit den üblichen Begrüßungsworten. Nachdem diesen der Landesverbandsvorsitzende einiges hinzugefügt, erhielt das Wort Herr Birk. Klar und eindeutig legte dieser den Anwesenden die Gründe der Organisation dar und vermochte in fesselnder Weise vor Augen zu führen, wie selbstverständlich uns doch alle die gleiche Liebe zum gefiederten Geschöpf, draußen und im Käfig, verbindet, aber auch wie notwendig die Geschlossenheit sei in Anbetracht der bevorstehenden Neuregelung des sächsischen Vogelschutzgesetzes. Eine so tief eingewurzelte Volkssitte, wie sie die Vogelliebhaberei darstellt, muß mit allen Mitteln verteidigt werden, wenn man versuchen sollte, die ohnehin scharf beschränkte Freiheit auf unserm Gebiet weiter zu fesseln. Wir sind uns keines Frevels bewußt, noch weniger kann uns irgendein Rückgang einer Vogelart zugeschrieben werden. Und sollte darum das Verständnis für unsere Liebhaberei nicht ausreichen in den gesetzgebenden Kreisen, dann möchte man Vergleiche ziehen mit dem als Volkssitte betriebenen Vogelmord in Italien: eine Entscheidung für uns wird dann nicht schwerfallen. Gewiß müssen wir auch zu verbessern suchen, was unschön ist, daß wir uns frei und offen betätigen können. Im sächsischen Erzgebirge, wo die Vogelhaltung außerordentlich verbreitet ist wie wohl kaum in einem anderen deutschen Winkel, sind noch Gewohnheiten zu finden, die nicht anerkannt werden können, aber die Zeit wird hier helfen, das Althergebrachte zu überwinden. Reicher Beifall belohnte Herrn Birk für seine trefflichen Ausführungen. Daß manche Anregung auf fruchtbaren Boden gefallen war, ließ die Aussprache erkennen. Mit Genugtuung hörte man, daß der Kampf gegen die kleinen Marterkäfige bereits begonnen hat. Auch die Forderung eines Redners, den Ausstellungen mehr belehrende Form für die Öffentlichkeit zu geben, muß anerkennend festgestellt werden. Soweit das Für und Wider des Vereins- und Verbandstätigkeit betraf, war mancher Mißton zu hören. Unsere Freunde im Gebirge mögen aber beruhigt sein, die Jahresversammlung wird auch ihren Wünschen entgegen kommen. Für jeden gewiesenen Weg zum Fortschritt sind wir dankbar und freuen uns, so begeisterte Mitglieder in unseren Reihen zu wissen. Die Versammlung klang aus in dem herzlichen „Auf Wiedersehen" zur Hauptversammlung in Leipzig am 25. und 26. April! Leider war es uns nicht vergönnt, den geschlossenen großen Freundschaftskreis beim Abendschoppen zu genießen. Recht gern hätten wir noch manche Gedanken ausgetauscht über unsere schöne Liebhaberei, Erfahrungen ausgeplaudert und Fragen gelöst, was uns alles letzten Endes viel reizvoller erscheint als endlose Reden über Verwaltungsangelegenheiten. Ein anderm davon. — Als sichtbarer Erfolg der Bezirksversammlung ist zu melden, daß der Verein in Schneeberg (bereits 55 Jahre bestehend!) und der Verein Schönheide den Anschluß an uns gefunden haben. H.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen. Alle Vereine und Liebhaber, die unserem Verbande bereits angeschlossen sind, bitten wir an dieser Stelle nochmals, die restlichen Mitgliedsbeiträge unserem Kassierer Herrn Erich Merz, Berlin-Friedenau, Wilhelm-Hanff-Str. 14 II, umgehend einzusenden. Vereine und Liebhaber, tretet unserem Verbande bei und unterstützt unsere gute Sache. J. A.: Erich Merz

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden. J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/

Aus den Vereinen.

Angemeldet ist Frau I. Alice Fahrenhor, Ludwigshafen a. Rh., Wilerstr. 25. — Aufgenommen ist unter Mitgl.-Nr. 12 Gerhard Bauman, Bankbeamter, Oldenburg i. O., Meinardusstr. 16. A. Krabbe

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berl. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen. J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 3.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite)

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurter Str. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. V.: Emil Ivo, Schriftführer.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Die Vereinssitzungen finden jeden 4. Sonntag im Monat, abends 6 Uhr beginnend, in unserem Lokal „Thüringerhof", Mallinkrodtstr. 180, statt. Liebhaber jederzeit herzlich willkommen.
Der Vorstand.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Rietschelhof", Rietschelstr. 19. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftführer.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 17. März 1925. Gäste, auch Exotenliebhaber, stets willkommen.
J. A.: Arnold Weber, 1. Vors.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögeln Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstraße.
Paul Lohs, 1. Schriftführer.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden, Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst., Boppel, 1. Schriftf.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe i. B. Gegr. 1888. Die kürzlich im Vereinslokal abgehaltene ordentliche Generalversammlung war gut besucht. Der 1. Vorsitzende gedachte zunächst der im verflossenen Vereinsjahre 1924 verstorbenen Mitglieder. Dem Jahresbericht des Schriftführers, des Bibliothekars und des Kassiers war nichts hinzuzufügen. Aus den Ausführungen des letzteren konnte man entnehmen, daß die Vereinsleitung im Vereinsjahr 1924 prompt gearbeitet hat. Die Kasse zeigt heute einen erheblichen Überschuß. Im übrigen bewegt sich der Verein auf guter, zielbewußter Bahn weiter vorwärts. Bei der Wahl wurden von 7 ausscheidenden Vorstandsmitgliedern 5 wiedergewählt. Zwei ausscheidende Mitglieder konnten das Amt infolge anderweitiger Inanspruchnahme nicht mehr annehmen. An ihrer Stelle wurden die Herren Erwin Muckle und Wilhelm Scharpf mit großer Stimmenmehrheit gewählt. Der Vorstand setzt sich zusammen aus den Herren W. Bang, 1. Vorsitzender; Georg Fesenmeier, 2. Vorsitzender; W. Boppel, Schriftführer; J. Friesel, Kassier; Adolf Böhler, Bibliothekar und aus den Herren Beisitzern Erwin Muckle, Wilhelm Scharpf, St. Lehmann, V. Reinhart, G. Hanser, W. Dietich, J. Müll, F. Stemmle und R. Belz. Der sonstige Verlauf der Generalversammlung war gut. Ebenso kann der am 7. ds. Mts. im Restaurant „Ziegler", hier, abgehaltene Kostümball als wohlgelungen bezeichnet werden. Jedem Teilnehmer wird daher auch dieser Abend in angenehme Erinnerung bleiben. Den Mitwirkenden, insbesondere Herrn Sonntag, sein nochmals gedankt.
Boppel, Schriftführer.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen.
Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz und Umgegend. Dem Aufruf zur Gründung eines Vogelliebhabervereins hatten eine ganz stattliche Anzahl Liebhaber Folge geleistet. Nach einer Vorbesprechung wurde in der 2. Versammlung obengenannter Verein gegründet. Alle 11 anwesenden Herren meldeten ihren Beitritt zum Verein. Der Vorstand setzt sich aus folgenden Herren zusammen: 1. Vorsitzender Bruno Zacher, Kamenz i. Sa., Kaserne M. H. II; 2. Vorsitzender Alfred Großmann, Kamenz i. Sa., Burgstr. 2; Kassierer Camillo Lehmann, Kamenz i. Sa., Anger 58; 1. Schriftführer Erich Mieth, Kamenz i. Sa., Weststr. 8; 2. Schriftführer Fritz Lehmann, Kamenz i. Sa., Herrental 20. Festgelegt wurde als Vereinslokal „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1, als Vereinsabend jeder Sonnabend nach dem 15. jeden Monats, als Vereinszeitungen „Gefiederte Welt" und „Kanaria". Vogelliebhaber und Gäste sind stets willkommen.
J. A.: Zacher, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Unsere nächste Sitzung am 5. März kann wegen der Leipziger Frühjahrsmesse nicht in unserem Vereinslokale abgehalten werden. Dieselbe findet deshalb im Restaurant „Roland", Albertstraße 6, abends 8 Uhr, statt. Sämtliche meßfremde Liebhaber sind herzlich willkommen und bitten wir um recht zahlreiches Erscheinen..
J. A.: M. Roth, Schriftführer.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde sind stets willkommen.
J. A.: Karl Scholtissek, 1. Vorsitzender, Leipzig-Plagwitz, Lauchstädter Straße 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung bei unserem Mitgliede Herrn Normast im Gasthof „Kaiser Friedrich", Breslauer Str. 50. Liebhaber sind als Gäste willkommen.
J. A.: Friedrich.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am zweiten Mittwoch eines jeden Monats Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Straße. Beginn 8 Uhr. Gäste sind willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Magdeburg-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Der Verein der Vogelliebhaber Mannheim hält aller 14 Tage im Restaurant zum Goldenen Falken seine Mitgliederversammlung ab. Nächste Versammlung am Freitag, dem 6. März 1925 und so fort. Freunde und Gönner stets willkommen.

Am 6. Februar 1925 hielt unser Verein die erste Freitagssitzung ab, die von jetzt ab immer aller 14 Tage Freitags statt wie bisher Samstags erfolgen. Wir hatten das Vergnügen, Herrn Prof. Dr. Otto Fehringer aus Heidelberg als Gast begrüßen zu können, der auch den Abend durch eine Plauderei aus seiner Vogelstube verschönerte. Prof. Dr. Fehringer führte aus, daß bei ihm seit Mitte Dezember Gelbspötter, Sumpfrohrsänger und verschiedene Würger in Gesang sind. Jetzt ist fast alles in lautem Schlag. Zwei Sprosser ließen sich durch eine überlaute Singdrossel stören, nahmen den Gesang aber sogleich wieder auf, als die Singdrossel ins Nebenzimmer verbannt wurde. Alle anderen Drosseln samt Amsel wirken nicht so stark, wie gerade die Singdrossel. Sehr anziehend schilderte er den Gesang seiner Rotkopfwürger und das Benehmen eines balzenden Raubwürgers. Seit nun noch Pirol und Zaunkönig laut singen und eine Wachtel dazu schlägt, fehlt an dem Konzert nichts mehr. Es ist doch etwas Schönes, mitten im Winter unter einer singenden Vogelschar sein zu können. Allerdings habe man erst den rechten Genuß, wenn man sich auch mitten unter seinen Vögeln aufhält, so daß man Arbeitszimmer und Vogelzimmer möglichst vereinigt. Dieses Ideal ist bei Prof. Dr. Fehringer erreicht. Das Hauptgeheimnis seiner Erfolge ist seine Fütterung, über die er ausführlich berichtet. Ein Vertreter der Firma Böcher & Co., Heidelberg-Kirchheim zeigt Proben des Heidelberger Vogelfutters herum, dem Prof. Fehringer seine Haupterfolge und die großartigen Gesangserfolge zu verdanken hat. Das Futter fand allgemeinen Anklang, und unser Verein beschloß den losen Bezug von diesem Futter, um dann an die Einzelmitglieder jedes beliebige Quantum abgeben zu können. Nach herzlichen Dankesworten an Prof. Dr. Fehringer durch unseren ersten Vorsitzenden wurde der genußreiche Abend geschlossen. Wir hoffen noch mehr solcher Abende zu Nutz und Frommen

(Fortsetzung auf der 4. Umschlagseite.)

unserer Liebhaberei zu haben, um dann wieder den Liebhabern Mannheims das bieten zu können, was wir vor dem Kriege zu bieten vermochten. Nach einer Debatte über eine Ausstellung wurde für dieses Jahr von einer solchen abgesehen. J. V.: Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Bei der Heidelberger Ausstellung für Vogelschutz und Vogelpflege am 1. Nov. 1924 wurde der Landesverband Süd-West ins Leben gerufen. Dieser ist dem Reichsverband der deutschen Vogelliebhaber (Sitz Leipzig) angegliedert. Alle Vereinigungen von Vogelliebhabern sowie Einzelliebhaber werden gebeten, sich diesem Landesverband anzuschließen, soweit sie nicht schon dem Reichsverband angehören. Der Jahresbeitrag beträgt 50 Pfennig pro Mitglied. Anmeldungen sind am besten gleich mit Jahresbeitrag an August Sommer, Mannheim, Laurenziusstraße 20, einzusenden.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). An jedem zweiten Mittwoch im Monat findet in unserem Vereinslokal „Parkhotel", Epinaystraße 1, unsere Versammlung statt. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an. Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebendort. Rudolf Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegründet 1. Mai 1923. Vereinsabende aller vier Wochen, in der ersten Woche des Monats verbunden mit Vortrag, in der dritten Woche jeden Monats nur gesellige Zusammenkunft. Vereinslokal „Sächsischer Hof". Gäste stets willkommen.
Studienrat Professor Jahn, 1. Vorsitzender.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vorsitzender, Zwickau i. S., Bosenstr. 44.

Die Vereinigung hannov. Vogelliebhaber will dem Vogelpfleger Ratgeber und Helfer sein, will die Liebe zum Tier und zur Natur wecken und stärken, will beitragen zum Kennenlernen der Vögel in Wald und Flur. Monatlich einmal kommen die Mitglieder zusammen, tauschen die Erfahrungen aus, hören Vorträge aus allen Gebieten der Vogelkunde, -schutz und -pflege an. Ein- oder zweimal im Jahre veranstalten wir große Lichtbilder- und Film-Abende. Im Frühjahr finden Beobachtungsausflüge unter Führung statt. Den Mitgliedern stehen zahlreiche Fachzeitschriften und Bücher kostenlos zur Verfügung. Regelmäßig berichtet die Zeitschrift nieders. Vereine über unsere Veranstaltungen. An den Vereinsabenden ist Rat und Auskunft, Kauf- und Tauschgelegenheit geboten. Jahresbeitrag Mk. 2,—, für Auswärtige und Schüler Mk. 1,—. Anmeldungen an Heinz Appel, Nienburgerstr. 7A I. Auskunft: Buchhändler A. Troschütz, i. Fa. Cruses Buchhandlung, Gr. Agidienstr. 4.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Käfige u. Gerätschaften

Vogel-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50. **Schlagnetze** f. kl. schädl. Vögel M. 2,30, f. gr. M. 2,50 u. 2,80. **Katalog gratis.** **J. Tannen, Gronau 58,** Westf. [361

Zimmer-Voliere

für Körnerfresser, prakt. u. gut erhalten, zu kaufen gesucht. [362
H. Beißner, Düsseldorf, Bilkerallee 129.

Futtermittel

Ia Ameiseneier, 1 Pfund M. 7.—
Ia Weisswurm, 1 Pfund M. 5.—
Bestes Weichfutter [363
1 kl. Paket 40 Pf., 1 gr. 80 Pf.
Versand per Nachnahme. Bei Anfragen Rückporto. Bestellungen zu richten unter **Weichfutter** an den Gefied. Welt-Verlag, Magdeburg, Postschließfach 148.

Abzugeben:

Schöne Ameiseneier,

Pfund 4 und 5 *M*. Tausche auch auf exotische Vögel. [364
Ant. Schäfer, Karlsruhe i. B., Gartenstraße 57.

Werte Züchterkollegen!

Es war mir möglich, einen größeren Posten garantiert geruchfreien echten

Sommerrübsen

selten schöne Ware, zu erwerben. Ich gebe, solange Vorrat reicht, ab, und zwar 1/2 Kilo 0,50 *M*, Zentner 48 *M* zuzügl. Porto und Verpackung, ab Dresden. Andere Sämereien zu billigsten Tagespreisen stets am Lager. [365
H. Lorenz, Dresden, Drehgasse 5.

Mehlwürmer

veget. gez., 1/4 Liter franko gegen Vor- 366] einsendung von Mark 2.—.
Bonitas-Versand, Rostock i. M. 3.

Heidelberger Vogelfutter

nach Angaben von **Prof. Dr. Otto Fehringer.**

1. Braune Packung	(Erdsänger)	. . .	1 1/2	Pfd.	M. 5.25
2. Graue „	(Grasmücken)	. . .	2	„	„ 6.00
3. Blaue „	(Drosseln)	. . .	2	„	„ 3.00
4. Rote „	(Stieglitze)	. . .	1 1/2	„	„ 0.90
5. Grüne „	(Hänflinge)	. . .	1 1/2	„	„ 0.90
6. Gelbe „	(Kanarien)	. . .	2	„	„ 1.00

Alle Anfragen über Pflege unserer heimischen Käfigvögel werden sachgemäß gern ausführlich beantwortet. Rückporto erbeten. [367

Fabrik für Heidelberger Vogelkäfige und Vogelfutter
A. Böcher & Co., Heidelberg-Kirchheim.

Züchterwaren

L. K.-Nahrung	1/2-Kilo-Paket	M. 1,20
„	Postkolli inkl.	„ 11,—
„	Probebeutel	„ 0,80
Rübsen, Ia	1/2-Kilo-Paket	„ 0,45
Glanz, Marokko, Ia	„	„ 0,50
Hanf, Ia	„	„ 0,35
Ital. Silberhirse, Ia	„	„ 0,45
Mrk. Hirse, gelb, Ia	„	„ 0,30
Leinsaat, Ia	„	„ 0,45
Mischfutter, Ia	„	„ 0,50
Negersaat, Ia	„	„ 0,45
Salatsamen, weiß, Ia	„	„ 1,50
Sonnenrosenkerne, gestr., Ia	„	„ 0,35
Mohn, blau, Ia	„	„ 0,70
Hafer, geschl., Ia	„	„ 0,35
Finnisch. Ameiseneier, Ia	„	„ 8,—
Holzwolle, Nr. 1, weiß, für 50 Nester ausreichend	„	„ 0,50
„ Nr. 3	„	„ 0,30
Piep	1/1-Packung	„ 1,50
„	1/2 „	„ 0,80
Piep Extra	1/1 „	„ 1,—
„	1/2 „	„ 0,50

Ein Posten **Futter-** und **Eiernäpfchen** aus Glas billigst.
Ein Posten **Drahtnester** und **Vorsatzgitter,** verzinkt, billigst.
Sepiaschalen billigst.
Vereinsbezug und Wiederverkäufer verlangen Spezialofferte. [368

Lorenz, Dresden, Drehgasse 5.

Analyse.

Lozenz' Kanarien-Nahrung

liefert folgendes Ergebnis:

100 g der Probe enthielten 5,170 g Wasser

in 100 g der Trockenmasse waren enthalten:

Mineralstoffe	4,02 g
Eiweiß	27,46 g
Fett	1,80 g
Kohlehydrate	66,72 g

100 g der Mineralstoffe enthielten:

Kali (K_2O)	11,96 g
Kalk (CaO)	33,25 g
Magnesia (MgO)	5,05 g
Phosphorsäure (P_2O_5)	24,47 g
Schwefel (5 O_3)	4,70 g
Kieselsäure (ScO_2)	5,68 g
Eisen (Fe_2O_3)	0,045 g
Mangan	0,174 g

Die Mineralstoffe enthalten 48,8% Basenüberschuß im Sinne von Ragnar Berg.

Aus diesem Befund ergibt sich nicht nur, daß die wesentlichen Bestandteile eines guten Nahrungsmittels: Eiweiß, Fett, Kohlehydrate und Mineralstoffe (Nährsalze) in Lorenz' Kanarien-Nahrung in sehr günstigem Verhältnis enthalten sind sondern auch, daß die Mineralsalze aus solchen Stoffen bestehen, welche (Kali-, Eisen-, Mangansalze) für die Ernährung junger Vögel sowohl, wie auch für die Entwicklung des Knochengerüstes und der Befiederung (Kalk Phosphorsäure, Kieselsäure) von großer Wichtigkeit sind.

Als weiterer Vorzug muß der Basenüberschuß der Mineralstoffe im Sinne von Ragnar Berg bezeichnet werden, dem seitens der modernen Ernährungsphysiologen erhebliche Wert beigemessen wird. Für die Aufzucht junger Vö, el stellt dem nach Lorenz' Kanarien-Nahrung ei sehr geeignetes Präparat dar. [36

gez.: **R. Weber,**
Vereid. chem. Sachverständiger de Amtsgerichts Dresden u. der Handelskammer Dresden.

Vom 1. März kostet **L. K** Paket 1/2 kg 1.40 M. „L. K. ist überall erhältlich.

Lorenz, Dresden
Drehgasse 5.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdeburg

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 12. März 1925 | Heft 11

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Die Nachtigall.

Von J. Birk, Leipzig.

(Nachdruck verboten.)

Wenn sich auch bis jetzt nur ein schwacher Hauch des nahenden Frühlings bemerkbar macht, Amseln lassen ihre flötenden Weisen feierlich ertönen, Kohlmeisen ihren Paarungsruf und Buchfinken beginnen ihren Schlag zu studieren, Feldlerchen kehren aus dem Winterquartier zurück und zur nachtstillen Zeit heult liebestoll der Waldkauz, alles ein freudiges Zeichen, daß nur noch geraume Zeit vergeht und die Natur breitet wiederum ihr grünes Kleid über Welt und Flur. Dann beginnt ein Sprießen, Blühen und Duften, und wenn erst der Wonnemonat Mai seinen Einzug hält, prangt alles in üppigster Pracht, begleitet von einem vielstimmigen Konzert aus sangesfrohen Vogelkehlen, dann ist sie da, die schönste Zeit des Jahres für den Natur- und Vogelfreund. Mag im März die Drossel mit ihren herrlichen Rufen den noch kahlen Wald beleben, mag das Rotkehlchen sein feierliches Liedchen dem scheidenden Tagesgestirn zum Abschied vom höchsten Wipfel erschallen lassen, mag der Schwarzkopf seinen von Frohsinn und keckem Übermut sprudelnden feurigen Überschlag durch den grünen Waldesdom erschallen lassen, mag der Gauch mit seinem neckenden „Kuckuck" noch so unermüdlich im Gewirr der Baumkronen „Versteckens" spielen, mag der „Fitis" sein lieblich anmutendes, bescheidenes Liedchen noch so eifrig zu Gehör bringen, mag es in Wald und Flur noch so widerhallen von der Kunst unermüdlicher Vogelkehlen, der Frühling hat seinen mit großem Prunk und unbeschreiblicher Pracht begleiteten Einzug nicht vollendet, bis sie nicht alle zurück sind, die gefiederten Wanderer von ihrer Südlandreise. Mag es noch so rufen, zwitschern und singen im grünen Hain, der Vogelfreund lauscht zu gegebener Zeit, er weiß, eines fehlt noch, um all der blühenden, duftenden Pracht und Herrlichkeit des Frühlings die Krone aufzusetzen, sie fehlt noch, die Königin der beschwingten Sängerschar, unsere Nachtigall. Sehnsuchtsvollen Herzens zieht es den Natur- und Vogelfreund hinaus in stiller Mondscheinnacht und mit unbezwingbarer Zaubermacht lauscht er klopfenden Herzens, bis endlich das Langersehnte zur Wirklichkeit wird. Die Sängerin der Nacht, sie hebt an zu schlagen in wehmutsvoll klagenden, schluchzenden, sich in Liebeslust und Freude überstürzenden Tönen, das herzlichste Vogellied des deutschen Waldes. Es hemmt die Schritte des einsamen Wanderers. Die Macht und Schönheit des Nachtigallenschlages läßt für den Augenblick den Herzschlag stocken. Es ist auf einmal der Freude zuviel nach dem „Einerlei" des rauhen Alltags. Nicht jeder Sterbliche hat das Glück, ein solches für die Naturschönheiten empfängliches Herz im Busen zu tragen, leider, und wer nicht ein solches sein eigen nennen kann, wird den Zauber des deutschen Waldes niemals in sich aufnehmen, wird niemals verstehen lernen, wenn sich der Frühling in all seiner Pracht zeigt, wird niemals den befriedigenden Genuß einer im Silberlicht des Mondes prangenden Maiennacht, umrahmt vom Schlage der Nachtigall, kennen lernen, wird auch niemals ihr herrliches Lied so schön finden, wie es ist, wird nie fühlen die Seligkeit, die den schluchzenden, klagenden, jauchzenden, jubilierenden, himmlischen Tönen innewohnte, sein Ohr wird niemals hören, was für Freude, Liebeslust, Hoffnung, Schmerz, Entsagung und Wehmut aus dem Nachtigallenlied spricht. Trotzdem unsere Dichter das Lied der Nachtigall in ihren Schöpfungen stets verherrlicht haben, bleiben diese geschriebenen Worte doch nur eine schwache Andeutung von all der Pracht und Herrlichkeit des Nachtigallenschlages in duftgeschwängerter Maiennacht.

Der Vogelliebhaber wartet mit Sehnsucht auf die Rückkehr der gefiederten Sängerfürsten seines ihm so lieb und traut gewordenen deutschen Waldes. Er weiß genau die Reihenfolge ihres Eintreffens, er kennt ihre Gewohnheiten und ihren Aufenthaltsort während ihres Durchzugs, er ist sich klar, daß die Männchen zuerst kommen und befriedigt seine längst gehegten Wunsche, ehe die Weibchen eintreffen, kurz gesagt, er trägt die Naturgeschichte der Vogelwelt seiner engbegrenzten Heimat im Gedächtnis mit sich. So soll es wenigstens sein beim richtigen Vogelliebhaber. Kein Nest, kein Vogelei darf ihn der Unkenntnis bezichtigen. Er muß, soll seine Liebhaberei ein förderndes Glied seines Lebensinhalts bedeuten, nicht nur in der Vogelpflege, sondern auch ornithologisch geschult sein, dann erst bringt er seine Liebhaberei befruchtend in Verbindung mit der heimischen Natur und ihren Wundern und Geheimnissen. Die Nachti-

gall, fast nur ein europäischer Brutvogel, ist in manchen Gegenden Deutschlands häufig anzutreffen, wenn die Vorbedingungen ihres Aufenthalts gegeben sind; wiederum fehlt sie in manchen Teilen Deutschlands ganz, trotzdem sie Örtlichkeiten aufweisen, die (aber nur scheinbar) den Anforderungen ihrer sonstigen Aufenthaltsorte entsprechen. Der beste Beweis dafür ist wohl ihr Vorkommen während der Zugzeit an diesen scheinbar günstigen Orten, aber seßhaft werden sie daselbst nicht. Auch die Besiedlung derartiger Orte mit Nachtigallen wird einen Mißerfolg bedeuten, wenn dabei nicht etwa Versuche mit in großen Freivolieren erbrüteten und nachher freigelassenen Jungvögeln eventuell günstige Resultate zeitigen würden. Wie gerne hätte diese oder jene Gegend brütende Nachtigallen, und wo sie spärlich auftreten, ist es unverantwortlich, durch Wegfangen den Zauberreiz, den sie der Gegend verleiht, zu zerstören. Jeder rechtlich denkende Mensch wird diese Naturberaubung als einen Frevel an der Allgemeinheit würdigen. Zum Glück gibt es aber auch Nachtigallenparadiese, wo ihre Zahl ganz gut und mit Recht eine kleine Lichtung vertragen kann. Das muß ich vorausschicken, wenn ich der Haltung und Pflege der Nachtigall das Wort reden will.

Wer einmal Gelegenheit hatte, in einem solchen Nachtigallendorado Studien zu machen, wird mir zustimmen. Ist es doch öfters der Fall gewesen, daß in einem Umkreis von einigen Stunden bis zu hundert Nachtigallen schlugen. Unvergeßlich wird mir jener Nachtigallenausflug bleiben, wo in Hörweite nicht weniger als 11 Nachtigallen auf einmal schlugen. In der Bitterfelder, Dessauer und Wörlitzer Gegend, ein Nachtigallendorado sondergleichen, ist es nicht selten, daß in den in diesem Waldgebiet eingestreut liegenden Dörfern sich die Nachtigallen, wie anderswo die Sperlinge, auf der Dorfstraße umhertreiben. Ganz eigentümlich berührt es, wenn sich eine Nachtigall vom Wege auf den Zaun eines Hausgärtchens schwingt und unbeachtet des Verkehrs ihre weichen Strophen aus voller Brust ertönen läßt. Wer solche von Nachtigallen dicht bevölkerte Gegenden kennt, und deren gibt es in Deutschland viele, wird die Käfighaltung der Nachtigall von einer anderen Seite beurteilen, als die, denen es vergönnt ist, nur einige Brutpärchen in der Umgebung ihres Wohnortes als unersetzliche Naturdenkmäler zu besitzen. Da heißt es „Handwerg", wenn nicht ein Verbrechen an der Natur begangen werden soll. (Fortsetzung folgt.)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Bülbüls sind in ungefähr 260 Arten über Afrika, Madagaskar, die tropischen Striche Asiens, die Sundainseln, Philippinen, Molukken, im Osten bis Japan verbreitet. Einige Arten kommen in Nordchina und in Kleinasien vor. Der letzte Fockelmannsche Import brachte einige indische Arten, darunter den bekannten Weißwangen- oder Kangdarabülbül — Otocompsa leucogenys (*Gray*) und den sehr selten eingeführten

Schwarzwangenbülbül — Otocompsa flaviventris *Tickell*, dessen Verbreitung sich über das östliche Himalajagebiet bis Assam, Vorderindien, Indochina und die Mulukken erstreckt Wie alle Bülbüls ist auch er ein Waldvogel, der sich hauptsächlich in den Kronen der Bäume aufhält und nur selten niedrigeres Gebüschaufsucht. Auf dem Erdboden sieht man ihn kaum einmal. Jerdon fand ihn in den sonnendurchwärmten Tälern in Höhen von 300—750 m. Am meisten bevorzugt er die niedrigen Erhebungen und bewaldeten Flußufer. Diese lebhaften und immer beweglichen Vögel leben in kleinen Flügen und lassen die üblichen zwitschernden und immerhin wohllautenden Töne, die den Angehörigen der Gattung eigen sind, fleißig hören. In ihrem Wesen vereinigen sie das der Drosseln mit dem der Grasmücken, deren Nahrung, Insekten, Beeren, und Früchte auch die ihrige ist; den letzteren soll der Schwarzwangenbülbül am meisten zusprechen. Ein Nest dieses Bülbüls stand in einem Dickicht an einem Flußufer. Es hatte die übliche napfartige Form und war aus Fasern und Blättern gebaut. Drei Eier, welche es enthielt, waren von trüb rötlichweißer Farbe und sehr dicht mit kleinen Flecken und Fleckchen von braunroter Farbe bedeckt.

In der Gefangenschaft sind die Bülbüls ausdauernde und sehr lebhafte Vögel, die größeren Raumes bedürfen, um ihrem Bewegungstrieb Geltung zu verschaffen. Für kleine Käfige sind sie nicht geeignet. Sie verkümmern in ihnen. Sind sie in bezug auf die Ernährung anspruchslos, so muß das Futter doch recht abwechslungsreich geboten werden. Darin besteht aber für den Pfleger keine große Schwierigkeit. Wie der treffliche Birk in einem früheren Aufsatz schon ausgeführt hat, stehen uns so reichlich verschiedene Futtermittel zu Gebote, daß es wirklich ein leichtes ist, abwechslungsreiches Futter zu bieten. Hinzu kommt noch, daß uns für diese Fruchtfresser die Mannigfaltigkeit der Früchte, welche uns das ganze Jahr hindurch zur Verfügung stehen, die Aufgabe, welche bei der Haltung der Bülbüls zu lösen ist, sehr erleichtert. Das Hauptfutter muß immer ein Insektenfresserfutter, wie wir es der Schamadrossel bieten, bleiben. Daß manche Bülbüls auch Samen wie Hirse, Spitzsamen, Hafer verzehren, ist bekannt. Notwendig sind diese Beigaben aber wohl nicht, trotzdem kann man ja ein Gefäß mit diesen Sämereien reichen. Über die Verträglichkeit mit anderen Vögeln läßt sich kein sicheres Urteil fällen. Paarweise gehalten vertragen sie sich untereinander. Das ist auch der Fall, wenn zwei verschiedene Arten zusammengehalten werden. Sie dürfen dann aber nicht dem gleichen Geschlecht angehören. Mit anderen Vögeln sind manche durchaus verträglich, andere, derselben Art angehörig, verfolgen jeden anderen Vogel. Der Gesang, nicht sehr laut, etwas an das Lerchenlied und Grasmückengewelsch erinnernd, ist ganz angenehm und frei von häßlichen Tönen. Neben diesem schlichten Lied, das sie fleißig hören lassen, verfügen sie aber auch über recht laute, klangvolle, ungemein fröhlich klingende drosselartige Rufe, die sie bei den verschiedensten Gelegenheiten hören lassen. Von allen Bülbüls zeigten sich die der Gattung Schopfbülbüls — Otocompsa *Cab.* angehörenden Arten am ehesten zu

Züchtungsversuchen geneigt. So nistete ein ♀ Schwarzwangenbülbül mit einem ♂ Rotohrbülbül in der Voliere des Herrn Kuntzendorff, der auch Junge von Weißwangen- und Rotohrbülbül erzielte.

Gefiederbeschreibung: Kopf mit langer aufrichtbarer Haube, Kehle glänzend schwarz; übrige Oberseite olivgrün; Unterseite gelb mit grünlichem Schein; Flügelfedern wie Oberseite; Schwanzfedern braun, Außenfahne grün gerandet; Auge gelb; Schnabel schwarz; Füße dunkelhornfarben; Lg. 200, Fl. 93, Schw. 88 mm (s. Abb. 107).

Ein anderer, bisher nur in wenigen Stücken eingeführter Bülbül des Fockelmannschen Importes ist der über das östlich von Simla gelegene Himalajagebiet verbreitet, auf S. 89 abgebildete

Braunohrbülbül — Hemixus flavala *Hodgs.*

gleichfalls ein außerordentlich munterer, beweglicher Vogel, der sich hauptsächlich von fleischigen Beeren ernährt und von Insekten, die weichhäutigen oder noch unentwickelten bevorzugt. Im Magen eines im Winter erlegten fand man neben obengenannter Nahrung auch einige wenige harte und völlig ausgebildete Kerfe. Nach Jerdon lebt er in Höhen von 750 bis 1500 m in kleineren Flügen, und Hodgson ist der Ansicht, daß er auf die Höhen beschränkt zu sein scheint, da er in den Tälern unbekannt sei. „Er singt nicht und wird nicht in Käfigen gehalten", sagt derselbe Forscher, während er nach Jerdon einen lauten zwitschernden Gesang hat.

Gefiederbeschreibung: ♂♀ Oberkopf mit verlängerten lanzettförmigen Federn düster grau; Ohrdecken seidenglänzend braun; Zügel, breiter Bartstreif schwarz; übrige Oberseite aschgrau; Kehle, Bauchmitte, Unterschwanzdecken weiß; übrige Unterseite aschgrau; Flügeldecken grau, Schwingen, Schwanzfedern dunkler, große Flügeldecken, Außenfahne der Armschwingen lebhaft olivgrün gesäumt; Auge dunkelbraun; Schnabel schwarz; Füße dunkelbleigrau; Lg. 213, Fl. 98, Schw. 88 mm.

Unter den Vögeln Indiens, welche Fockelmann einführte, befanden sich eine Anzahl, welche wir gemeinhin „Timalien" nennen. Was ist eine Timalie? — der Begriff ist schwer zu definieren, und die Gelehrten sind sich darüber nicht einig. Sie gehören zu den „Sängern", sind eine Unterfamilie dieser Familie, die etwa 2500 Arten umfaßt. „Die Einteilung der großen Zahl von Arten in Untergruppen und Gattungen ist wegen der Einförmigkeit der Körperformen im allgemeinen und der mannigfachen Übergänge ungemein schwierig und eine unter allen Umständen stichhaltige Kennzeichnung der Gruppen noch nicht gelungen", sagt Reichenow in „Die Vögel", II. Bd., S. 513 f., und fährt dann fort: „Man kann sich nur in der Weise helfen, daß man für die einzelnen Unterfamilien . . . eine bestimmte Art oder Gattung als Typ bezeichnet, dem andere ihm am nächsten kommende Formen angeschlossen werden —". Reichenow teilt die Sänger in neun Unterfamilien, deren erste die „Timalien — Timaliinae" ist, und als Typ wird die auf Java heimische Form der

Braunkopftimalie — Timalia pileata *Horsf.*

angegeben. Auch Jerdon ist der Ansicht, daß ihr mit Recht der Gattungsname Timalia beigelegt sei, da sie die am meisten typische Form von allen Angehörigen der Gruppe sei. Auch diese wunderbar schönen Vögel befanden sich in größerer Anzahl in dem Fockelmannschen Import. Ihre Verbreitung erstreckt sich über die niederen Vorberge und Ebenen des Grenzgebietes des Himalajagebirges, Nepal, Sikkim usw., östlich bis Assam, häufig ist sie in Bengalen und fast allen Ländern Hinterindiens. Die Vögel von Java sollen sich durch längeren Schnabel auszeichnen.

Die Braunkopftimalie wählt zum Aufenthalt die große Grasebene, wird aber auch nicht selten im Buschdickicht und in kleinen Gehölzen gefunden. Oft



Braunkopftimalie.

nähert sie sich Ortschaften und Pflanzungen. In größeren Wäldern lebt sie nicht. Die Timalie ist wie die meisten Angehörigen der Gruppe ein außerordentlich beweglicher und temperamentvoller Vogel, der sich viel im Gras, dicht am Boden aufhält und selten zu sehen ist, aber sehr häufig seine angenehme Stimme hören läßt, die man wegen ihres Wohllautes gern hört. Der Gesang besteht, wie Horsfield mitteilt, aus einer langsamen Wiederholung von fünf Tönen der Tonleiter (c, d, e, f, g), welche sie mit auffallender Regelmäßigkeit und kleinen Pausen mehrmals hintereinander hören läßt. Ein sechster Ton, der oft hinzugefügt wird, scheint nur unter besonderen Umständen und mit besonderem Kraftaufwand hervorgebracht zu werden. Er ist einem musikalischen Ohr keineswegs so angenehm wie die einfache Wiederholung der fünf Noten, welche mehr dem Umfang der Stimme des kleinen Vogels angepaßt zu sein scheinen. Ihr ruckweiser Flug ist niedrig über dem Boden.

Das aus Gras hergestellte Nest ist überbaut und steht entweder auf dem Boden im Grase oder in einer Astgabel nahe dem Boden. Oates fand ein

Nest am Boden, mitten unter einem niedrigen dichten Dornbusch. Auf Java soll das Nest auch häufig in Hecken gefunden werden. Die Brutzeit fällt in die Monate Mai und Juni. Man hat Gelege von drei weißen, braungesprenkelten Eiern gefunden.

Im Käfig ist diese Timalie außerordentlich lebhaft. Die Bewegungen dieses schönen Vogels sind so schnell, daß man ihnen kaum mit den Augen folgen kann. Außerordentlich gewandt ist sie im Verbergen. Einen dem Käfig entflogenen Vogel dieser Art wieder einzufangen, ist ein gar mühseliges Werk und stellt an die Geduld des Pflegers harte Anforderungen. Als Futter reicht man ein gutes Nachtigallenfutter, viel lebende Insekten und die üblichen Beigaben. Ob sie auch Beeren und Obst verzehrt, muß erprobt werden.

Gefiederbeschreibung: Oberkopf leuchtend kastanienbraun; schmales Stirnband, Augenbrauenstreif weiß, durch ein schmales, schwarzes Band von dem Rotbraun des Oberkopfes getrennt; Zügel, Federn zwischen Schnabelwurzel und Auge schwarz; Wangen, Kopfseiten, Ohrdecken weiß, letztere hinten grau überlaufen; oberseits braun; Halsseiten schön perlgrau; Vorderhals, Brust weiß, Seiten grau; mit Ausnahme des Kinns mit sehr schmalen, schwärzlichen Schaftstrichen; Bauchmitte ockergelblich; Bauchseiten, Schenkel, Unterschwanzdecken rostbraun; Flügeldecken wie Oberseite; Schwingen hellbraun, außen rostbraun; Achselfedern hell rostbraun; Unterflügeldecken fahl ockergelb; Schwanzfedern hellbraun, in gewissem Licht dunkler quergebändert; Schnabel schwarz; Auge dunkelrot, Lidrand graublau; Lauf dunkel fleischbraun; Lg. 145, Fl. 57—62, Schw. 68 mm.

(Fortsetzung folgt.)

Dompfaffenzucht.

Von Amtmann Max Krumm.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Die Grundlage des Brutfutters bildet doch noch reifer Vogelsamen, aber nur gequellt. Man bedenke, auch draußen ist der reife Samen bis August keineswegs im getrockneten Zustande. Gerade die Dompfaffen füttern sehr stark und reichlich. Sie würden das mühsame Enthülsen von hartem Samen auf die Dauer für vier und mehr hungrige Schnäbel gar nicht schaffen können. Außerdem müßten viel zu lange Fütterungspausen eintreten, bis das harte Futter im Kropfe weich und der Speisebrei bereitet wäre. Vielleicht würden auch die Körner in zu hartem Zustande verfüttert werden. Den gequellten Samen bereite ich auf bekannte Art derart, daß ich die Körner auf ein Haarsieb schütte und dieses Sieb in Wasser stelle, bis der Samen weich ist, was etwa 6 Stunden dauert. Abbrühen mit heißem Wasser halte ich für ungünstig, weil der Vitamingehalt dadurch vermindert wird. Vor Verwendung spüle ich den Samen im Sieb noch einmal mit frischem Wasser gründlich durch, um den dem Samen anhaftenden Unrat zu entfernen. Über diesen Unrat wird man sich manchmal wundern, wenn man das schmutzige Spülwasser sieht. Ich lasse das Wasser aus dem Sieb gut ablaufen und den Samen leicht abtrocknen, um ihn dann — auf ein flaches Futtergefäß ausgebreitet — auf den Boden des Käfigs zu stellen. Es ist darauf zu achten, daß der Samen nicht keimt, und die Keime welken, oder, was schlimmer ist, der Samen sauer wird. Deshalb setze ich täglich zweimal frisch gequellten Samen vor. Sauberkeit ist auch hier alles. Ist der Same nicht gut abgespült und gesäubert, so bekommt er in der Sommerhitze leicht einen faulen oder sauren Geruch. Ich habe gefunden, daß viele Züchter auf die Beschaffenheit des geweichten Samens nicht achten, weil sie glauben, dieser halte sich besser wie Ei. Bei unsauberem Samen ist dies ganz und gar nicht der Fall. Gerade die feuchte Beimischung, wenn nicht gehörig gespült ist, verursacht Fäulnis, ekelt die Tiere und bringt Kalkdurchfall und Tod. Als geweichten Futtersamen nehmen meine Dompfaffen meist nur Neger- und Rübsamen, auch etwas Spitzsamen. Leinsammen muß man abgesondert weichen, weil er zu klebrig wird. Hanf habe ich nicht gequellt, oder aus Vorsicht erst, nachdem die Jungen fast ganz befiedert waren. Doch stand trockener Samen von Hanf, Mohn, Lein, Neger, Hafer, Hirse und Sommerrübsen im Käfig in einzelnen Futternäpfen stets neben dem geweichten und war also den fütternden Vögeln zugänglich. Sie nahmen davon nur Mohn. Trockenen Hanf, sonst ihre Lieblingsspeise, nehmen sie für die Jungen sehr selten. Ich bin aber davon ohne Probe überzeugt, daß Hanf auch mehr verfüttert worden wäre, wenn ich geweichten gereicht hätte. Ich mochte es nur nicht tun und habe über die Wirkung noch keine Erfahrung.

Von allgemeiner Gültigkeit sind wohl meine Erfahrungen mit dem Nestbau. Ich habe sie mir gesammelt an mehr als 20 Dompfaffenpaaren in ebenso vielen Jahren. Mit dem Nestbau hatte ich schon immer mehr Glück als Schlag. Er sagt, daß die Vögel bei ihm in den Zweigen eingesetzter Fichtenbüsche genistet haben. Wie ich die Dompfaffen kenne, ist es sehr schwer, so ein Nest, das für die Brut brauchbar ist, zu erzielen, wohl weil die Vögel nicht die geeignete Nistgabel finden, und weil sie namentlich in der Gefangenschaft zu liederlich bauen. Ich will nicht lange damit aufhalten, wie sich meine Erfahrungen allmählich entwickelten. Ich bekomme seit langen Jahren jedes Pärchen, sofern es sich nur eignet, zum Nisten, und zwar unter Benutzung von harzer Bauern als Nistkasten. Den harzer Bauer (diese kleinen weißen Versandkasten aus Tannenstäbchen) von der größeren Sorte (Preis etwa 1,10 M.) öffne ich an der einen von den schmaleren Seiten, indem ich an der oberen Hälfte dieser Seite die Stäbe ausbreche. 2 oder 3 dieser Bauerchen bringe ich für ein Pärchen an der Breitseite unter dem Dache so an, daß sie nicht schaukeln, die Öffnung natürlich nach vorn. Die dem Beschauer zugewandte Seite des Nistkastens verkleide ich mit grauem Pappdeckel, und über das Gitter des Käfigs, also über das Dach des Nistkastens, lege ich einen breitblättrigen Efeuzweig, alles so, daß das Nistbauerchen den Vögeln zwar geschützt vorkommt, es aber auch nicht allzu sehr verdunkelt wird. Quer vor den Nistkasten her kommt in Entfernung von etwa 3 cm ein Sitzstab.

In die Nistkasten lege ich schon feinen Tannen-, Birken- oder anderen Reisig als Nistunterlage; es ist dieses nicht unbedingt nötig. Auf den Boden des Flugbauers kommt aber dieser Reisig in Auswahl, sowie vor allem feine Würzelchen in Menge. Diese Würzelchen gewinne ich in der Weise, daß ich

Grasplaggen mit den Wurzeln ausreiße, die anhaftende Erde, nachdem sie trocken geworden ist, ausklopfe, und die Würzelchen, die mehr als fingerlang sein dürfen, mit dem Messer abtrenne. Die Würzelchen sind ungefähr die, welche die Dompfaffen auch in freier Natur außer dem Reisig ausschließlich verwenden. Sehr geeignet ist eine gewisse Waldgrassorte, die hierzulande überall den Waldboden bedeckt und ziemlich lange Wurzelfasern hat. Man kann auch die weichen, feinen Saugwürzelchen der Waldbeerensträucher verwenden (schwarze Beere) und anderer Stauden, sowie die der Quecken. Andere Niststoffe brauchen die Dompfaffen nicht, nach meiner Beobachtung auch nicht in der Freiheit. Ich habe noch kein Dompfaffennest gesehen, das mit Haaren, Schafwolle oder dgl. ausgepolstert war. In der Gefangenschaft nahmen sie bei mir auch nie diese Stoffe an, auch niemals Charpie oder dgl.

Die Dompfaffen, zusammengesetzt in der Zeit, wo das erste Grün sprießt, empfinden meist sofort innige Zuneigung. Bald schnäbeln sie sich. Wird die Zuneigung größer, so füttert der Hahn das Weibchen; das ist ein untrügliches Zeichen der Paarung. Ist das Weibchen aber spröde, so verfolgt er das Weibchen, das nicht gleiche Empfindungen hegt, mit größter Grobheit und Zudringlichkeit. Daß er sie vergewaltigt, habe ich noch nicht gesehen. Die Charaktere sind bei den Dompfaffen sehr verschieden. Manchmal ist er der gutmütige, sanftmütige Teil und ist schüchtern oder durchaus gleichgültig. Letzteres ist für die Aussicht auf Erfolg allein bedenklich. Ich habe gefunden, daß junge Dompfaffenhähne im ersten Jahr sich oft schüchtern verhalten.

Meistens ist der Friede und das eheliche Einvernehmen bald hergestellt. Sie sucht nach dem Nistplatz, und er zeigt dafür erhebliches Interesse. Sie benimmt sich dabei ähnlich wie das Kanarienweibchen in gleichem Zustand; es ist dieses charakteristische Hin- und Herfliegen mit eng angelegtem Gefieder, fast ein Schlüpfen, mit möglichst horizontal gehaltenem Körper und das ständige Durcheilen immer wieder derselben Strecke mit häufiger Wiederkehr zu dem gewünschten Nistplatz. Der Hahn und die Henne finden die Anregung zum Nisten in dem umherliegenden Niststoff und der Nistgelegenheit bei passendem Futter. Man helfe kräftig mit Mehlwürmern oder frischen Ameisenpuppen, Grünzeug und aufgeweichtem Samen nach.

Sehr bald wird der Hahn mit dem Niststoff im Schnabel das Weibchen umschwärmen. Er nimmt Stücke davon in den Schnabel und nähert sich dem Weibchen. Den Schwanz dabei in eigenartiger Weise seitwärts gestellt, gibt er zwitschernde, tiefe Gesangstöne seines „Karrenschieberstückchens" von sich, bewegt den Oberkörper dabei hin und her, macht sich schön und tänzelt so um sie her. Das Weibchen muß ein Herz wie Stein im Leibe haben, wenn es nicht darauf eingeht. Bei solchem Spiel findet die Begattung statt. Das Weibchen fängt meistens sofort an zu bauen. Das Nisten ist nun niemals so ordentlich wie etwa bei Kanarienvögeln und wie man es sich eigentlich wünschen möchte. Es hängt die Sorgfalt des Nestbaues auch natürlich von der Eignung beider Vögel und von dem Grade der Erregung des Weibchens ab, dieses wiederum von der Pflege, die die Tiere vorher gehabt haben. Fast stets ist das Weibchen sich zuerst nicht recht klar, wo es eigentlich nisten will. Daß es im Anfang bald hierhin, bald dorthin Niststoff schleppt, das Eingetragene wieder entfernt, wieder auf den Boden wirft und anderswo hinschleppt, störe einen nicht. Das Männchen regt immer wieder an, indem es auch den Niststoff aufnimmt, meist gleich wieder fallen läßt, auch selbst wohl irgendwie einträgt, doch niemals ernstlich mit bauen hilft. Sind beide nur brutlustig, so kommt das Weibchen auf den Boden des Nistkastens (harzer Bauer) wohl stets zum Nestbau. Eine feste, geflochtene Nestmulde, wie sie für Kanarienvögel verwandt wird, wird meistens nicht angenommen und stört die Vögel nur. Die Begattung findet am frühen Morgen oder am späten Nachmittag statt, man nimmt sie nicht häufig oder selten wahr, auch wenn die Vögel sonst nicht scheu sind. Je erregter das Weibchen ist, um so schneller wird das Nest fertig, meist in 2 oder 3 Tagen, nachdem die ersten Anfänge gemacht sind und das Weibchen zielbewußt trägt. Das Nest ist, wie schon gesagt, stets liederlich gebaut. Auf den Boden des Nistkastens kommt Reisig, manchmal dieser auch nicht. In der Hauptsache werden Würzelchen eingetragen, und man sieht Weibchen und Männchen durch eifriges Drehen im Nest die Mulde schaffen. Die Eiablage erfolgt in frühester Morgenstunde, bei Sonnenaufgang, häufig in ein unfertiges Nest. Daß das Weibchen am andern Morgen legen wird, merkt man an der eifrigen Aufnahme von Kalkstoffen vor seinem Schlafengehen am späten Nachmittag des Vortages. Im Käfig muß Eierschale vom Huhn, alter Kalk und Sepiaschale vorhanden sein. Man hört und sieht das Weibchen deutlich die Eier- oder

Meisentimalie.

Sepiaschale zerbeißen und in reichlicher Menge aufnehmen. Schon vorher oder spätestens dann helfe ich nach, wenn das Nest nicht in Ordnung ist, indem ich mit Würzelchen nachfülle und so eine Mulde mit Nesträndern anfertige. Das Weibchen läßt sich, erst in die richtige Legelust hineingekommen, dadurch keineswegs stören und nimmt das fertiggestellte Nest ohne weiteres an. Manchmal muß man auch zwei- oder dreimal nachhelfen. Ich habe niemals Brutpaare gefunden, die sich so wenig durch vorsichtige Eingriffe stören lassen wie die Dompfaffen. Im Brutgeschäft waren alle meine Weibchen überhaupt für Störungen nicht sehr empfindlich. Daß ein Nest der Störung wegen verlassen wurde, ist nie vorgekommen. Ich habe sogar, wenn frühzeitig das erste Ei schon in das unfertige Nest gelegt wurde, das Ei herausgenommen, das Nest fertiggemacht und das Ei wieder hineingelegt, scheinbar durchaus unter Anerkennung des Weibchens, das an dem Nest dann nichts mehr veränderte, es vielmehr noch nach seinem Geschmack anders ausrundete. Man sorge sich nicht so sehr, daß die Eier auf zu rauhem Boden liegen oder nicht warm genug. In der Natur ist schon das Nest ziemlich liederlich — wenn auch bei weitem nicht so sehr wie in der Gefangenschaft — und dem Luftdurchzug ausgesetzt. Das Weibchen entwickelt eine große Bruthitze, und die auskommenden Jungen brauchen durchaus keine dichte und weiche Unterlage.

In der oben angeführten Weise vollzog sich der Nestbau bei mir regelmäßig. Männchen und Weibchen verhielten sich im allgemeinen stets gleich.

(Fortsetzung folgt.)

Mein Liebling — der Jako.

Von S. Lichtenstaedt.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Ganz jungen Graupapageien gab ich tagelang weich gekochten Reis, wenn ich merkte, daß die Verdauung nicht ganz in Ordnung war, und habe glänzende Erfolge damit erzielt. Auch bei Magen- und Darmkatarrh tut dieser vorzügliche Dienste.

Nun höre ich in Gedanken schon manchen Liebhaber sagen: „Mein Vogel frißt aber nur Hanf und Sonnenblumen!"

Diesen möchte ich antworten, daß bei mir jeder Vogel binnen 4 Wochen das Futter fraß, daß ich wollte, und nicht er.

Ein paar Stunden gelindes Fasten bringt jeden Vogel zur Annahme der ihm zuträglichen Sämereien.

Selbstverständlich wird ein Vogel einmal energisch dieses oder jenes Futter verschmähen. Das schadet aber gar nichts. Einer meiner Jakos frißt nie Mais, dagegen einen ganzen Napf mit Spitzsamen leer. Auch wird einmal wochenlang ein Futter verschmäht, und dann gierig gefressen.

In der warmen Jahreszeit gebe man regelmäßig frische Holunder- oder Weidenruten, welche vorher sauber abgerieben werden, ehe sie der Vogel erhält.

Im Sommer soll ein Jako so viel wie möglich ins Freie. An einem windstillen, zugfreien Platz kann er stundenlang draußen stehen. Kann man ihm hier einen großen Kletterbaum bieten, so ist es um so besser. Ein lauer Regen schadet ihm gar nichts, ist ihm im Gegenteil sehr zuträglich.

Es ist eine häufig anzutreffende irrige Meinung, daß der Jako in hoher Wärme gehalten werden muß. Gewöhnliche Zimmertemperatur von 18 Grad Celsius genügt auch für junge, schwarzäugige Vögel vollkommen. Hohe, besonders trockene Wärme, wie sie Zentralheizungen ergeben, ist für den Jako direkt schädlich. In solcher Temperatur gehaltene Vögel bekommen leicht Krämpfe, und ist trockene Wärme nach meinen Erfahrungen direkt lebensgefährlich. Durch feucht zu haltende Blattpflanzen, Wassernäpfe oder ein kleines Aquarium ist leicht Abhilfe zu schaffen.

Sehr vorsichtig muß man mit den oft empfohlenen Dampfbädern bei Graupapageien sein. Schwerkranken Vögeln sind solche nie zu geben, denn ein Dampfbad schwächt die Tiere ungemein und kann, besonders wenn es nicht richtig gegeben wird, den Tod des Vogels zur Folge haben.

Gegen viele Erkältungskrankheiten sind Dampfbäder gut, doch müssen diese sehr milde und vorsichtig gereicht werden. Der Käfig ist oben stets offen zu halten, und muß das Tier in milder, feuchter, lauer Luft sitzen, nicht etwa in heißen Dämpfen. Richtig angewandte Dampfbäder sind gut, falsch gegebene, wie gesagt, gefährlich.

So gern sich Amazonenpapageien abspritzen lassen, so wenig angenehm ist diese Prozedur den meisten Grauen. Man versuche das Abspritzen mit lauem Wasser zuerst sehr vorsichtig und gehe erst nach und nach zu einem energischen Durchnässen des Vogels über. Kann der Vogel die Wasserscheuheit nicht ablegen, so unterlasse man das Abspritzen lieber ganz, denn ein nervöses Tier kann durch die Angst vor dem Wasser Schaden nehmen.

Kann man äußerlich beim Jako die Geschlechter unterscheiden? Bei jahrelangem Umgang mit den Tieren unbedingt. Ich lasse hier die von Dr. Otto aufgestellten Unterscheidungsmerkmale der Geschlechter folgen und bemerke, daß sich diese mit meinen Beobachtungen voll und ganz decken.

Männchen: a) dicker breiter Kopf; b) Gestalt plumper und dicker; c) der nackte Augenkreis ist kleiner und stets mit Runzeln und Warzen versehen; d) der nackte Augenkreis sieht düster grauweiß aus; e) Füße und Oberschenkel stehen näher zusammen, weil das Becken schmäler ist. Weibchen: a) länglicher und schmaler Kopf; b) Gestalt zarter und schlanker; c) der nackte Augenkreis ist größer und glatt ohne Falten und Runzeln; d) Der nackte Augenkreis ist von reinweißer Farbe; e) Füße und Oberschenkel stehen weiter auseinander, weil das Becken zum Durchgang des Eies breiter ist.

Vielfach ist die Meinung verbreitet, daß die großen, hellsilbergrauen, sog. Kongovögel die gelehrigsten und intelligentesten sind. Ich kann auf Grund meiner Erfahrungen sagen, daß diese Meinung völlig irrig ist.

Ob dunkel, ob hellgrau, ob groß oder klein, die Färbung und Größe hat absolut nichts mit der Begabung zu tun. Mein bester Sprecher ist unscheinbar klein, ganz dunkelaschgrau, große helle Silbervögel, die ich besaß, waren die Dummheit in Person. Ich habe nie gefunden, daß besonders hell gefärbte

Vögel klüger waren als ihre kleinen Kollegen. Man braucht sich beim Kaufe eines Jakos also niemals an seine mehr oder weniger helle Färbung zu stoßen, allerdings sind die großen hellsilbergrauen Vögel schöner im Aussehen als ihre kleinen, dunkleren Genossen.

Eine der unangenehmsten Angewohnheiten oder Krankheiten des Jakos ist das Federrupfen. Meines Wissens ist bis heute noch niemand sicher in der Lage, positiv zu sagen, woher das Rupfen kommt.

Es gibt „Gelegenheitsrupfer" und „Dauerrupfer". Erstere rupfen ganz plötzlich los, bekümmern sich um die neuen Federn nicht mehr. Die letzteren lassen keine Feder aufkommen und vertilgen alles, was sie mit dem Schnabel erreichen können.

Dr. Otto schreibt das Rupfen der Hanffütterung zu. Das mag z. T. richtig sein, denn falsche Fütterung und eine Fütterung mit vorwiegend Hanf ist falsch, erzeugt Blutschärfe und damit Juckreiz.

Ich habe aber Vögel besessen, die nie ein Körnchen Hanf erhielten, jahrelang in meinem Besitze waren und aus Leibeskräften rupften.

Alle Rupfer, die ich und befreundete Familien besaßen, waren ganz außergewöhnlich intelligente Tiere, eine Tatsache, die mir von vielen Seiten bestätigt wird. Ein träges, schlafmütziges Tier rupft fast nie, ein lebhaftes, intelligentes häufig.

Alle in der einschlägigen Literatur empfohlenen Mittel habe ich versucht, ohne zu einem Erfolge zu gelangen. Richtige Fütterung, viel Beschäftigung mit dem Vogel, viel Bewegungsfreiheit — alles vergebens.

Mit dem spielenden Ausrupfen einiger Federn fängt es an, mit einem — wie sich Herr Kaforke so schön ausdrückt — bratfertig gerupften Vogel endet es. Daß der Vogel die ausgerupften Kiele weiter bearbeitet, ist selten der Fall, die Feder wird meist, wie sie ausgerupft wird, fallen gelassen.

Hat ein Liebhaber unseres Jako hier schon Erfahrungen gesammelt? Verdauungsstörungen kommen hauptsächlich bei jüngeren Vögeln häufig vor. Im Anfang sind sie meist harmlos, bei Vernachlässigung können sie zum Tode führen.

Ein geübter Papageienpfleger wird bei seinem Tiere auf den ersten Blick sehen, ob etwas nicht in Ordnung ist. Läßt der Appetit nach, wird der Kot flüssig, das Auge trüber, so muß er sofort eingreifen.

Er entziehe dem Vogel sofort das Körnerfutter und gebe weich gekochten, flüssigen Reis. Am ersten Tage wird der Vogel das ungewohnte Futter wohl verweigern, am nächsten Tage treibt es der Hunger herein.

Frißt er tüchtig, so wird er bei leichteren Darmerkrankungen in ein paar Tagen wieder auf dem Posten sein.

Zuletzt noch einen Rat. Gebt einem kranken Vogel nichts aus der Apotheke. Keine Salzsäure und andere „Arzneien". Wenn Hausmittel, wie Haferschleim, Reis u. a. nichts hilft, helfen andere Dinge erst recht nichts, im Gegenteil.

Auch mit homöopathischen Arzneien habe ich beim Jako nicht die geringsten Erfolge erzielt.

Von meinen Prachtfinken.

Von B. Schuster.

(Nachdruck verboten.)

Seit der Stabilisierung der deutschen Währung ist es auch den bescheidenen Liebhabern wieder möglich in den Käfigen sich ein oder mehrere Paare Westafrikaner zu halten. Zwar sind die Preise heute noch bedeutend höher als in Vorkriegszeiten, doch ist es wieder möglich, in den Besitz dieser Kinder des „schwarzen" Kontinentes zu gelangen.

So zog nun auch in meine Käfige allmählich eine lustige Schar dieser Vögelchen ein. Lustig waren sie allerdings anfangs nicht, denn die lange Seereise vom Senegal bis Marseille, und dann der Aufenthalt und die lange Bahnfahrt nach Berlin hatten sie etwas mitgenommen. Ihr Gefieder war

Silberschnäbelchen.

gut erhalten, und schon nach wenigen Wochen schienen sie sich ganz wohl in ihrer Behausung, die ich schon vor ihrer Ankunft eingerichtet hatte, zu fühlen. Ich hatte sie zunächst in einem Kistenkäfig untergebracht. Da fühlen sie sich sicher und geschützt. Kleine dünne Zweige und Stangen von verschiedener Stärke dienten ihnen als Sitzgelegenheiten. Dicht gedrängt in einer Reihe saßen sie alle, Grauastrilde, Amaranten Silberschnäbelchen, Orangebäckchen, Schmetterlingsfinken und Kleinelsterchen beisammen und erwärmten sich gegenseitig. Sie gewöhnten sich bald an ihrem Pfleger, was sie durch ihre Zutraulichkeit bewiesen. Die Hauptsorge legte ich auf eine richtige Eingewöhnung meiner Pfleglinge. Neben den üblichen Sämereien, wie Senegal-, Algier-, Silberhirse und Spitzsaat reichte ich ihnen ab und zu kleingeschnittene Mehlwürmer und ein wenig Eierbrot und gehacktes Ei. Hieran taten sie sich mit Behagen gütlich. Mehlwurmstückchen und gehacktes Ei waren bald verschwunden, auch von der dargereichten abgekochten Kuhmilch

naschten sie gern. Nachdem sie nun vier Wochen lang ohne besonderen Zwischenfall den gemeinsamen Käfig bewohnten und allem Anschein nach gesund und munter waren, richtete ich eine größere Schindler-Voliere ein. Dünnzweigiges Gesträuch, Sitzstangen, einige harzer Bauer wurden angebracht und recht nett gruppiert. Nachdem nun die Schubladen noch mit Sand angefüllt und Futter- und Wassergefäße aufgestellt waren, ließ ich die kleine Schar in die neue Wohnung fliegen. Neugierig, warnend, rufend flogen sie in ihrem neuen Heim umher. Nachdem sich ihre Erregung gelegt hatte, saßen sie bald wieder dicht zusammen, ein Bild, wie wir es ja so oft bei unseren Pfleglingen, den Prachtfinken, finden. Nach kurzer Zeit fühlten sie sich wieder heimisch. Die hineingeworfenen Graßhalme, Federn und anderen Stoffe zum Nestbau wurden einer eingehenden Untersuchung unterzogen, und der Bau der Schlafnester begonnen. Zunächst hatte ich mich sehr gefreut und glaubte schon in jedem Nest eine Anzahl junger Vögel zu sehen. Es war zunächst eine Enttäuschung, als meine Vögel die Nester nur zur Nachtzeit zum Schlafen benutzten. Doch sollte ich später, dank einiger Zuchterfolge, wider Erwarten belohnt werden, doch hierauf möchte ich bei der Beschreibung der einzelnen Arten eingehen. Meine Zeilen bringen ja den Liebhabern nichts Neues. Mancher wird mit einem Lächeln darüber hinweggehen. Entweder pflegt er nur heimische Sänger oder nur bessere Prachtfinken. Das soll mich aber nicht abhalten, meine wenigen Erfahrungen bei der Pflege der so häufig gehaltenen kleinen Afrikaner mitzuteilen. Zunächst möchte ich noch erwähnen, daß nach einigen Wochen meine Pfleglinge auch Vogelmiere, angekeimte Sämereien und auch ausgesäte entwickelte Rübs- und Spitzsaat erhielten. Sie knabberten sehr gern an den frischen Keimlingen herum.

Nun will ich dem Leser meine kleinen Lieblinge vorführen, wie sie sich in ihrem Behälter benehmen. Zu meinen besonderen Freunden gehören stets die kleinen Grauastrilde. So einfach und schlicht diese Vögel gefärbt sind, so hübsch und zierlich sind sie. Es ist nur schwer, ein richtiges Paar von ihnen zu erhalten, da die Geschlechter gar so schwer zu unterscheiden sind. Doch scheint mein Weibchen weniger lebhaft gefärbt zu sein. Sie sind stets munter und durch ihre hurtigen eleganten Bewegungen zeichnen sie sich gegenüber vielen anderen Prachtfinken aus. Das Pärchen hält, wie auch die anderen Paare, treu zusammen. Ihre Lockrufe sind deutlich zu hören, besonders wenn sie über irgendetwas ihnen Fremdes in Erregung geraten. Das Männchen umwirbt häufig sein Weibchen, es auf einem Zweige umtänzelnd und dabei läßt es häufig eine längere laute Strophe hören. Das Balzen der kleinen Prachtfinken macht überhaupt einen merkwürdigen, häufig lächerlichen Eindruck auf den beobachtenden Menschen. Zur Fortpflanzung sind sie noch nicht geschritten. Sie bauen oft Nester, die dann von ihnen oder anderen Insassen des Flugkäfigs zum Schlafen benutzt werden.

Farbenprächtiger und durch längere Schwanzfedern, die von unten gesehen stufenförmig angeordnet sind, ausgezeichnet ist der südlichere Vetter unseres Freundes, der Wellenastrild oder das Helenafasänchen. Von ihnen gesellte ich ein Pärchen später hinzu. Die beiden verwandten Arten vertragen sich bisher ganz gut und halten sich stets gesondert auf. Die Helenafasänchen scheinen mir ebenso lebhaft und flink zu sein wie die Grauastrilde. Beide Arten scheinen gegenüber den Menschen vorsichtig und zurückhaltend zu sein, während Orangebäckchen, Goldbrüstchen und Silberschnäbelchen weit zutraulicher erscheinen. Besonders letztere Art läßt sich beim Vortrag des



Amaranten.

Gesanges durch meine Anwesenheit kaum stören. Der Gesang des Silberschnäbelchens, der häufig erklingt, ist recht nett und anheimelnd. Beide Gatten halten zärtlich zusammen. Auch hier ist es schwer, ein richtiges Paar zu erhalten. Äußere Geschlechtsunterschiede sind kaum vorhanden. Meine Vögel sind sehr ruhig, sitzen meist zusammen auf einem Zweige oder harzer Bauer, oder sind mit dem Nestbau beschäftigt. Frische und trockene Graßhalme, Haare, Federn und allerlei Fasern tragen sie eifrig zusammen in ein Nistkästchen und erbauen darin ein kugliges kunstloses Nest mit engem Eingangsloch. Eines Tages fand ich drei weiße Eier im Nest und nach Verlauf weniger Tage zwei junge nackte Vögelchen. Die Alten fütterten ihre Kinder nur mit Sämereien auf. Die jungen ausgeflogenen Silberschnäbelchen sehen fast wie ihre Eltern aus. Bald ging es von neuem zum Nestbau, und es lagen dieses Mal fünf Eier im Nest, das keineswegs fertiggestellt war. Sie scheinen auch während der Brutzeit den Nestbau weiter zu betreiben. Das Brutgeschäft besorgen sie ab-

wechselnd. Ich sah meist immer eines der Gatten im Nest.

Ebenfalls einen Zuchterfolg hatte ich mit den westafrikanischen Goldbrüstchen, die ich im Frühjahr vorigen Jahres erwarb. Diese kleinen Vögel, die durch ihr hübsches Federkleid auffallen, erwählten sich zum Nestbau einen kleinen Nistkasten, wie er in der Kanarienzucht üblich ist. Ihr Nest war auch ein kunstloser Bau mit seitlichem Schlupfloch aus Grashalmen, Fasern und Federn. Drei kleine Eier wurden hineingelegt und zwei Junge erbrütet, von denen eines nach einigen Tagen verschwand. Das zweite liegt noch im Nest und wird hoffentlich dieses bald flugfähig verlassen. Die Alten sind sehr besorgt um ihre Kleinen und füttern eifrig und regelmäßig. Auch sie scheinen nur Sämereien zu füttern, trotzdem ihnen Ameisenpuppen, gehacktes hartgekochtes Ei und zerschnittene Mehlwürmer zur Verfügung stehen. Außerhalb der Brutzeit sind meine Goldbrüstchen lange nicht so lebhaft wie die Grauastrilde, Helenafasänchen und Orangebäckchen.

Meine Orangebäckchen zeichnen sich besonders durch ihre Zutraulichkeit aus. Ein Weibchen kommt stets bei meiner Annäherung an das Gitter geflogen und sieht neugierig meinen Hantierungen zu. Diese niedlichen Kerle sind stets munter und zutraulich, sie halten stets zusammen, sitzen auf einem Zweige und krauen sich gegenseitig am Kopf. Zeitweilig beschäftigen sie sich auch mit dem Nestbau, bringen aber nichts zustande. Ein weites Weibchen, zu dem ich kein gleichartiges Männchen besitze, hat sich mit einem Schönbürzelchen angefreundet. Sie sind zueinander sehr zärtlich. Besonders putzig sieht es aus, wenn das größere Schönbürzelchen dicht neben dem kleinen Orangebäckchen sitzt und ihm die Federn auf dem Kopfe und Nacken ordnet. Bisher halten beide treu zusammen, denken aber nicht an den Nestbau. Ein weiteres Paar Schönbürzelchen bewohnt die Voliere. Sie scheinen ein richtiges Paar zu sein. Auch diese Vögel sind äußerst lebhaft und munter und sitzen selten still. Ihr Gefieder ist stets saalglatt und schmuck. Trotz ihrer einfachen blauen Färbung, von der der rote Bürzel, die roten Schwanzfedern und der dunkle Hinterleib abstechen, sind es schön gefärbte Vögel. Viele Liebhaber klagen über Weichlichkeit und Hinfälligkeit. Dieses scheint mir häufig an unrichtiger Fütterung zu liegen. Meine Schönbürzelchen fressen ebenso wie die Schmetterlingsfinken viel Weichfutter: Ameisenpuppen, Ei und Mehlwürmer. Ich halte die Zugabe dieses Futters zur Gesunderhaltung vieler Prachtfinken für notwendig. Auch die Amaranten, die häufig sehr hinfällig sind, machen vom Weichfutter stets Gebrauch.

Bei der Ankunft der Transporte aus dem Senegal sind häufig von besonderer Hinfälligkeit Amaranten und Schmetterlingsfinken. Ich bin jetzt dazu gekommen, nach Erwerb eines Paares dieser Vögel sie längere Zeit für sich zu halten und regelrecht einzugewöhnen. Sie erhalten dann Körner-, Weichfutter und Mehlwürmer. Ich habe auf diese Weise ganz gute Erfolge erzielt und geringe Verluste erlitten. Gesunde und gut befiederte Schmetterlingsfinken sind schöne Vögel, die stets das Auge des Pflegers erfreuen. Sie sind dann auch lebhaft, munter und beweglich. Über meine Schmetterlingsfinken läßt sich wenig berichten. Bisher scheinen sie sich keine Nester zu bauen, sondern die verlassenen Nester anderer zum Schlafen aufzusuchen. Das brütlustige Schmetterlingsmännchen ist ein wahrer Raufbold, das sowohl sein Weibchen als auch andere größere Prachtfinken unermüdlich jagt und zu treten versucht. Ich hatte diesem kleinen Kerl gar nicht soviel Mut zugetraut. Wenn er brütlustig ist, beherrscht er sozusagen sämtliche Insassen des Flugkäfigs, dann darf ihm niemand zu nahe kommen. Eine ähnliche Beobachtung machte ich bei den schönen südlicheren Verwandten, den Blauastrilden. Ein einzelnes Männchen der Art, das mit dem Schmetterlingsmännchen sehr befreundet ist, bewohnt mit den anderen Prachtfinken den Flugraum, als ich eines Tages ein Weibchen Blauastrild hinzusetzte, wurde es von dem Männchen arg verfolgt, es suchte es zu treten. Sein Freund, der Schmetterlingsfink, beteiligte sich gleichfalls an der Verfolgung. Ich glaubte schon, daß die Raserei der Verfolger sich gelegt hatte, als ich zwei Tage später das Weibchen in einer Ecke mit zerbissenem Schädel tot auffand. Als dann später auch das Schmetterlingsweibchen

Schönbürzelchen.

einging, waren die beiden Freunde unzertrennlich. Sie bebrüteten dann lange Zeit abwechselnd ein verlassenes Gelege der Amaranten. Nach Wochen gesellte ich zunächst versuchsweise zwei Schmetterlingsweibchen hinzu, die von ihnen unbehelligt blieben.

Ebenso weichlich sind häufig zunächst die Amaranten. Diese lieblichen kleinen Vögel sterben häufig recht bald im Käfig der Liebhaber. Sie sind, insbesondere die Männchen, eine Zierde für jede Prachtfinkenvoliere, besonders wenn man mehrere Paare von ihnen hält. Sie scheinen sich lieber in geringerer Höhe über oder auf dem Erdboden aufzuhalten, und sind besonders nach allerlei Grünkraut und halbreifen Sämereien begierig. Ihre Nester errichten sie ebenfalls in nicht zu großem Abstande von der Erde und suchen sich zum Nestbau die niedrig hängenden Nistkästen auf.

Unermüdlich im Nestbau sind die kleinen Elsterchen. Die beiden Männchen sind häufig balzend anzutreffen. Tänzelnd hüpfen sie auf einem Zweige hin und her, die Kopffedern gesträubt, mit lang gestrecktem Hals und nach unten gerichteten Schnabel, der dabei geöffnet ist und in dem die Zunge dauernd bewegt wird. Die Elsterchen halten stets zusammen. Ob es wirklich zwei Paare sind, ließ sich bisher nicht entscheiden. Irgend welche Anstalten zu Brutversuchen konnte ich nicht feststellen.

Mexikanischer Karmingimpel.

Zum Schluß möchte ich noch meiner Bandfinken gedenken. Sie bauen oft Nester, legen auch manchmal Eier und vergessen sie dann zu bebrüten. Von vielen anderen Weberfinken unterscheiden sich die Bandfinken durch die Art des Balzens. Sie haben nicht die eigentümliche Balzstellung der Elsterchen. In der Gesellschaft mit den kleinen Prachtfinken haben sie sich bisher als friedlich und harmlos erwiesen.

So bietet die Pflege der Prachtfinken dem Pfleger viele Reize und angenehme Stunden. Aber auch die Schattenseiten, die häufigen Mißerfolge bei Zuchtversuchen, die erst die Vogelpflege so anziehend machen, und die Hinfälligkeit mancher Arten bleiben nicht aus. Auch der Pflichten müssen wir dabei gedenken, die uns durch die Pflege der Vögel auferlegt sind.

Rotschwänze — Phoenicurus *(Forst.)*.

Eine Monographie von John Kuntzendorff.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der weißstirnige Pagodenrotschwanz — Erithacus phoenicuroides *(Moore)*.

Wie schon in vorstehendem erwähnt, sind bei Erithacus phoenicuroides Unterformen, und zwar zwei, deutlich erkennbar. Der Beschreibung der ersten lasse ich die der zweiten folgen; man unterscheidet eine westliche und eine östliche Unterform. Die Beschreibung der westlichen Vögel ist folgende: ♂ ad.: Stirn, Oberkopf grau; bei Beginn dieser Färbung an der Stirn ein schwach angedeuteter, schmaler, weißer Stirnfleck; zwischen diesem und dem Schnabel ein weißes Band, Kopfseiten, Kinn, Kehle, ein mehr oder weniger breites Rückenband schwarz; übriger Rücken dunkelgrau; Bürzel schwärzlich rostfarbenbraun; Brust, Bauch, übrige Unterseite, Oberschwanzdecken, Schwanzfedern leuchtend bräunlich rostfarben, letztere ohne Endbinde, beide mittelsten Schwanzfedern braun; Unterflügeldecken, Axelarien gelblich rostfarben; Schnabel und Füße schwarz.

Die östliche Unterform. ♂ ad.: Stirn weiß, allmählich in das Grau des Oberkopfes übergehend; Hinterhals, Rücken, Bürzel grau, beide letzteren mit rostfarbenem Anflug; Oberschwanzdecken, Schwanzfedern rötlich rostfarben, beide mittelsten Federn braun; schmaler Stirnstreif, Kopfseiten, Kinn, Kehle, Kropf, Halsseiten schwarz; Flügelfedern heller braun mit fahlen schmalen Außensäumen; Unterflügeldecken, Axelarien hellgelblich rostfarben; Schnabel und Füße schwarz.

In nachstehendem gebe ich eine Allgemeinbeschreibung Kleinschmidts aus „Berajah, Zoographia infinita, Erithacus Domesticus" zur lückenlosen Unterscheidungsmöglichkeit von Erithacus rufiventris an: „$^2/_3$ der Unterseite von der Farbe des Schwanzes, scharf von der schwarzen Brust abgegrenzt, grauer Flügelspiegel (der ganze Flügel auch im Alter matt und bräunlich gefärbt, also an E. Arboreus phoenicurus erinnernd), Schwanz stets ohne schwarze Binde, Oberseite grau, zuweilen mit schwarzer Rückenzone, Schwanz im Vergleich zu den Flügeln meist viel länger als bei titys. Stirn häufig weißlich (im Paradoxkleid zuweilen so weiß, daß der Vogel E. Arb. phoenicurus sehr ähnlich wird), Unterflügel rot, zuweilen von der Kante her mehr oder weniger schwarz (im Paradoxkleid schwarz), Achselfedern rot. Die kleinste Form. 1. Transkaspien, Ostpersien. 2. Turkestan."

Das Verbreitungsgebiet des Erithacus phoenicuroides ist das südiranische Randgebirge, Nordost-

und Ostpersien, persisch Belutschistan, Afghanistan, südliches Transkaspien, Turkestan nordwärts bis zum südlichen Altai und Sajan, südlich bis zum westlichen Himalaja (in Kaschmir kommt er in Höhen bis über 4000 m vor). Er überwintert im westlichen Indien, Südarabien und Somaliland. Die Eier gleichen denen von ochruros. Er ist Erithacus phoenicurus außerordentlich ähnlich unterscheidet sich aber von diesem hauptsächlich durch das fast gänzliche Fehlen oder doch durch die viel geringere Ausdehnung der weißen Färbung an der Stirn; durch längere erste und kürzere zweite Handschwinge, wie dadurch, daß bei ihm die sechste nahezu die Größe der fünften hat, während sie bei phoenicurus bedeutend kürzer ist als diese. In seinem Wesen und in seinen Lebensgewohnheiten gleicht phoenicuroides gänzlich titys. Wie dieser, siedelt er sich in der Nähe menschlicher Wohnstätten an, wie dieser nistet auch er in öden felsigen Gebirgen. Als echter Rotschwanz ist seine Ernährungsweise dieselbe wie die seiner Verwandten.

Seine Lebendeinführung nach Deutschland hat schon stattgefunden. Über das Gefangenleben gilt dasselbe, was über Erithacus rufiventris zu sagen ist, und gehe ich, um eine Wiederholung zu vermeiden, nach Erwähnung dieses näher darauf ein. 2. Schwinge mehr als doppelt so groß wie 1.; 3. kleiner als 4. und größer als 2.; 4. gleich 5. und am größten; 6. kaum kleiner als 4. und gleich 3.; 7. größer als 2.

Der graustirnige Pagodenrotschwanz — Erithacus rufiventris (*Vieill.*).

Auch bei diesem Rotschwanz kann man leicht zwei Unterarten unterscheiden, wobei bemerkt werden muß, daß auch hier Übergangsstufen zwischen beiden vorhanden sind. Von phoenicuroides unterscheidet sich rufiventris auf den ersten Blick durch ausgedehnteres Schwarz auf der Oberseite, so daß diese im abgetragenen Kleide tief schwarz erscheint. Indem ich die Übergangsstufen außer acht lasse, gehe ich auf die beiden extremen Hauptrichtungen ein:

Die graustirnige Unterform: ♂ ad. Oberkopf dunkel aschgrau; Wangen, Ohrgegend, Nacken, Kehle, Brust, Oberrücken, Oberflügeldecken schwarz, Unterrücken schwärzlichgrau, zum Bürzel hin ins Dunkelgraue übergehend, Oberflügeldecken mit dunkelgrauen Federrändern; Flügel schwärzlichbraun, Armschwingen mit breiten, fahl gelbbraunen Außen- und Innensäumen, Handschwingen mit schmalen Außensäumen; Unterflügeldecken, Flanken, Bauch, Bürzel, Ober- und Unterschwanzdecken heller gelblich rostfarbenbraun, beide mittelsten Schwanzfedern zur Hälfte an der Innenfahne und an der Spitze der Außenfahne schwärzlichbraun; Schnabel schwarz, Füße braunschwarz, Auge braun.

Die schwarzstirnige Unterform: Oberkopf schwarz oder doch entweder nur die Stirn mit dunkelgrauem Anflug oder Oberkopf schwärzlich dunkelgrau; Wangen, Ohrgegend, Nacken, Kehle, Brust, Rücken, Oberflügeldecken tiefschwarz; Flügel schwärzlichbraun, Armschwingen mit fahlem Innensaum, Handschwingen mit kaum wahrnehmbarem Außensaum; Unterflügeldecken, Flanken, Bauch, Bürzel, Ober- und Unterschwanzdecken, Schwanz dunkler gelblich rostbraun, beide mittelsten Federn kaum wahrnehmbar schwärzlich überflogen; Augen braun, Schnabel und Füße schwarz.

Die ♀♀ sind oberseits braun, Flügelrand, Unterleib, Unterschwanzdecken matt rötlichgelb; an Kehle, Brust düster in der Färbung des Unterleibs übergehend; Unterflügeldecken, Bürzel, Oberschwanzdecken, Schwanz wie beim ♂.

Zur genügenden Unterscheidungsmöglichkeit von phoenicuroides gebe ich die Beschreibung Kleinschmidts aus „Berajah, Zoographia infinita, Erithacus Domesticus“ an: Nan-Schan-Gebiet. $^2/_3$ der Unterseite von der Farbe des Schwanzes, scharf von der schwarzen Brust abgesetzt, Schwingen schwarz gerändert, ganz am Rande im Herbst und bei helleren Vögeln noch ein schmaler, dunkelgrauer, hinten rötlicher Saum. Schwanz ohne Endbinde, ganze Oberseite tiefschwarz, zuweilen Scheitelrand oder ganzer Scheitel grau (im Herbst graue Säume, Schwanz relativ kürzer als bei phoenicuroides). Stirn oft mit grauem Anflug (besonders im Paradoxkleid), Unterflügel rot (selten schwarze Kante). Die größte Form Himalaja bis Nan-Schan. Fl. ♂ 8,5 bis 9,2 cm; ♀ 8,3—8,6 cm. Jerdon gibt für rufiventris folgende Maße an: Lg. 150, Fl. 87, Schw. 67,5, Schn. 17, Lf. fast 25 mm und Hartert als Flügellänge 84—91 mm.

Die Gliederfärbung variiert bei diesen Stücken: Nr. 1 Oberkopf, Oberseite schwarz, die Federn dunkelgrau gespitzt, daher verwaschen gefleckt erscheinend; das Schwarz an der Unterseite ist nicht so ausgedehnt wie bei phoenicuroides, Oberschwanzdecken, übrige Unterseite gelblich rostbraun, Schwanz von der Färbung der Oberschwanzdecken, mittelstes Paar braun, außen gelblich rostbraun gesäumt; Flügel braun, Armschwingen außen breit dunkelgrau gesäumt. Nr. 2 Oberseite reiner und dunkler, an den mittelsten Schwanzfedern ist die helle Färbung weniger sichtbar. Nr. 3 ober- wie unterseits rußigschwarz, Oberkopf schwärzlichgrau; Bauchmitte heller, Schwingen braun, breit hell bräunlichsandfarben gesäumt; Oberschwanzdecken, Schwanz satter rostbraun. Nr. 4 ober- und unterseits wie 1, Armschwingen außen an der Wurzelhälfte grau, an der Spitzenhälfte röstlich gesäumt und mit röstlichem Spitzensaum, mittelste Schwanzfedern nur an Innenfahne braun und Außenfahne mit braunem Endfleck. Nr. 5 wie 4, jedoch dunkler, Rücken reiner schwarz, mittelste Schwanzfedern kaum merklicher dunkler braun.

Sie ist am ganzen Körper tief und glänzend schwarz gefärbt, Bauch, Ober- und Unterschwanzdecken satter gelblich rostbraun, mittelste Schwanzfedern an Außenfahne und nur an der Spitze braun, Flügel dunkelbraun, Schwingen an Außenfahne schwärzlich. (Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Näheres über die Zucht von Fliegenmaden. Auf dieses Futter wurde ich durch Herrn Cassebohm aufmerksam gemacht. Herr Cassebohm füttert die Fliegenmaden schon längere Jahre mit bestem Erfolge auch bei den zartesten Weichfressern, wie Gelbspötter und Sumpfrohrsänger. Die Zucht der Maden ist sehr einfach und sehr ergiebig, so daß man sich für den Winter genügend eindecken kann und die Fütterung von Ameisenpuppen und Mehlwürmern fort-

fallen lassen kann. An den letzten sonnigen warmen Tagen im Herbste legt man Fischköpfe oder Fischabfall von gesunden Fischen ins Freie. Die großen Fliegen haben diese Plätze bald gefunden und legen ihre Eier auf diese Fische. In kurzer Zeit entwickeln sich die Maden, welche nun weiter gefüttert werden, bis sie ausgewachsen sind oder reif sind. Dieser Zeitpunkt ist da, wenn die Maden das Futter nicht mehr annehmen und sich verpuppen wollen. Sie suchen dann den Behälter, in welchem sie gefüttert wurden, zu verlassen. Der Behälter kann irgend ein offenes Gefäß sein. Man bringt nun die Maden in ein Gefäß, aus dem sie nicht entweichen können. Durch die feinsten Löcher und Ritzen können die Maden sich hindurchzwängen und entkommen dann. Am besten ist ein großer Blumentopf, dessen Loch im Boden man gut verkitten muß. Diesen Topf füllt man zur Hälfte mit Kleie, oder Sand oder Sägespäne, dann bringt man die Maden, die man vorher auf einem feinen Sieb mit Wasser abgespült hat, in den Topf hinein. Hier werden sie versuchen zu entkommen, aber der Inhalt des Topfes und die Wände saugen die an den Maden haftende Feuchtigkeit auf, so daß die Tiere immer wieder zurückfallen. Den Topf stellt man nun an einen kalten Ort, einige Grad Kälte schaden nichts. Die Maden verkriechen sich in der Kleie oder Sand, womit man den Topf angefüllt hat. Einige werden sich auch verpuppen, besonders, wenn noch warme Tage kommen, auch Fliegen werden sich noch entwickeln. Aber die Puppen wie die Fliegen fressen die Vögel sehr gern. Die Maden schrumpfen immer mehr zusammen und ihre Beweglichkeit hört bald ganz auf; sie haben dann das Aussehen und Größe von großen Ameisenpuppen (frischen). So sind sie ein vorzügliches Futter, sie riechen nicht und man kann dieselben, wenn man den Behälter etwas schüttelt, bequem oben abschaufeln. Den Behälter kann man mit einem Leinentuche der Sicherheit halber verschließen. Ich habe die Maden in einem zylinderförmigen Behälter aus starkem Karton. Ich füttere zur Zeit meine Nachtigall, Schama, Spottdrossel mit Maden. Alle Vögel sehen gut aus und sind im Gesang, bis auf die Nachtigall, welche auch bald anfangen wird. Mehlwürmer und Ameisenpuppen füttere ich nicht. Ich habe Ihnen nun kurz die ganze Zucht geschildert. Das einzige Unangenehme ist, die Tiere von dem einen Behälter in den anderen zu bringen; die Arbeit ist etwas schmierig, man darf eben nicht zu empfindlich sein.

W. Menrath, Hamburg 6.

Sprechsaal.

Antworten.

Auf Frage 6. Auch ich habe vor Jahren versucht, Mischlinge Mozambikzeisig×Kanarie zu züchten, jedoch ohne Erfolg. Das Mozambikzeisigmännchen zeigte sich übermäßig feurig; es jagte das Weibchen unter wildem Singen tagsein tagaus im Käfig umher, bis die Kanarie schließlich nach einigen Wochen infolge der dauernden Aufregung an Entkräftung einging. In diesem Jahre will ich den Versuch wiederholen. Es sieht mir aber nicht so aus, als wenn viel Erfolg zu erwarten wäre. Während das Mozambikzeisigmännchen nämlich im Herbst und Winter sehr lebhaft war, ist es jetzt recht schweigsam geworden, trotz anscheinender Gesundheit, und reagiert gar nicht auf das Locken der paarungslustigen Kanarie. Vielleicht steht es kurz vor der Mauser. Für den Herrn Fragesteller von Interesse dürften die nachstehend wiederholten Ausführungen des Dr. Franke in Heft 16 Jahrgang 1904 dieser Zeitschrift sein. „Was mir aber, dem hauptsächlich an der Bastardzucht von Kanarienvögeln mit einheimischen und besonders fremden Finken gelegen war und noch ist, den Mozambikzeisig lieb und wert gemacht hat, ist der Umstand, daß er unbekümmert um das eigene Weibchen sich regelmäßig noch mit paarungslustigen Kanarienweibchen begattet. Bei mir wenigstens sind dann jedes Jahr einige dieser Blendlinge ausgeflogen. Interessant war mir bei der Zucht von Mozambikzeisigen, daß sie jedes Jahr einen Monat eher zur Brut schritten. Im Jahre 1902 entflog das erste Junge am 22. März dem Neste, 1903 schon am 1. Februar. Vom Jahre 1901 kann ich das Datum leider nicht mehr genau angeben, April war es aber sicherlich. Schon früher ist mir die große Akklimatisationsfähigkeit dieser Afrikaner aufgefallen.

M. Garling.

Kleine Papageien. Zu den Ausführungen über Beringung in der Ges. Welt Nr. 43 1924 möchte ich folgendes mitteilen. Ich habe mit den Aluminiumringen der Vogelwarte Rossitten, bezogen von Joh. Hoff & Co., Lüdenscheid, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe Wellensittiche, die diese Ringe über 3 Jahre tragen. Selbst losgemacht hat sie noch keiner. Daß andere Liebhaber mit diesen Ringen schlechte Erfahrungen gemacht haben, liegt wahrscheinlich an der Beschaffenheit des Aluminiums. Dieses Metall ist je nach Reinheit und Verarbeitung in seinen Eigenschaften sehr verschieden. Geringe Beimengungen setzen seine Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einflüsse sehr herab, so daß in der Küche der eine Aluminiumtopf beim Kochen von Kartoffeln schwarz wird, während der andere unverändert bleibt, wenn man Sauerkraut oder Früchte darin kocht. Ähnlich verhält es sich mit seinen physikalischen Eigenschaften. Geschmolzenes Aluminium vom spez. Gew. 2,56 wird durch Hämmern oder Walzen härter und erhält dann ein spez. Gew. von 2,67. Gute Erfahrungen habe ich auch mit Ringen aus Zinkdraht gemacht, die mir Herr Mässelhäuser (Koburg) freundlichst überlassen hatte. Herr M. benutzt auch vergoldete Ringe. Beringt man z. B. eine Gruppe am rechten Fuß mit einem Zinkring, eine andere am linken mit dem gleichen, die dritte rechts mit 2, die vierte links mit 2 Zinkringen, die fünfte rechts mit 2, links mit 1, die sechste rechts mit einem Zink- und einem vergoldeten Ring usw., so kann man sehr viele Variationen erzielen, die den Vogel schon aus einiger Entfernung kenntlich machen.

Dr. Wagner.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender Joh. Birk in Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnitz, Merveldstr. 39; Kaufsvermittlung: Franz Nyncke, Berlin O, Königsberger Str. 17.

Unser Aufruf zur Stärkung unserer Verbandsfinanzen ist auch weiterhin erfolgreich gewesen. An freiwilligen Beiträgen gingen ein 5.— M. vom Verein für Vogelschutz und Liebhaberei in Zwickau i. Sa., 8.85 M. durch eine Sammlung bei einem zu Ehren Leipziger Liebhaber veranstalteten Frühschoppen in Zwickau i. Sa., 18.54 M. durch die am 15. Februar 1925 in Aue i. Erzgeb. abgehaltene Bezirkskonferenz der dem Landesverband Sachsen und Großthür. angeschlossenen Vereine Zusammen 32.39 M. Allen Gebern sei recht vielmals herzlich gedankt. Es steht hoffentlich zu erwarten, daß auch andere Vereine ein Scherflein der guten Sache opfern.

J. A.: Rudolf Petters, 1. Schriftf.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

R. Aumüller, Fabrikbesitzer, Delitzsch: Nymphensittiche.

Chr. Undernhorst, Gutsbesitzer, Bornholte Bezirk Minden: 1 Paar einjährige Pfauen.

Arthur Schiebe, Zschopau i. Sa., Marienstr. 17, A. Z.-Mtgl. 282: 2 Elsenastrilde.



Herrn M. S., Innsbruck. Sämtliche nach von Berlepschschem System hergestellten Gegenstände für praktischen Vogelschutz werden hergestellt von der Firma: Fabrik von Berlepsch'scher Nisthöhlen, Hermann Scheid, Büren in Westfalen". An diese Firma sowie an Freiherrn Hans von Berlepsch, Dr. phil. h. c., Burg Seebach bei Mühlhausen (Thür.) müßte sich Fragesteller wenden.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

Ornis-Haus
Halle-Saale

Gegründet 1912

Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)

Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall., Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspött., Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [398

Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1

Preisliste auf Wunsch!

Ia Ameiseneier, 1 Pfund M. 7.—
Ia Weisswurm, 1 Pfund M. 5.—
Bestes Weichfutter [399
1 kl. Paket 40 Pf., 1 gr. 80 Pf.
Versand per Nachnahme. Bei Anfragen Rückporto. Bestellungen zu richten unter **Weichfutter** an den Gefied. Welt-Verlag, Magdeburg, Postschließfach 148.

Mehlwürmer

1 Pfund 5 *M*, bei 6 Pfund Porto und Verpackung frei.

Ia Ameiseneier . . . à Pfd. 8 *M*
Ia Weißwurm . . . à „ 6 *M*
Ia Muska-Zecken . . à „ 3 *M*
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen . . . . à Pfd. 1 *M*
Ia Garnelen, gem. à Pfd. 0.40 *M*

Ia Universalfutter.

Mischung I für Nachtigallen 2.— *M*
„ **II für Grasmücken** 1.80 *M*
„ **III für Drosseln** 1.50 *M*
Proben und Analysen zur Verfügung. Vertreter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [400

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser

L. Eckrich II., Waldsee (Pfalz).

Mehlwürmer

roo 1/4 Pfund *M* 2.— liefert franko [401
Reichard, Berlin N, Böttgerstr. 23.

Wer in Deutschland oder dessen deutschsprechenden Nachbarländern wäre bereit, einem Schweden, anfangs dreißig, arbeitsfreudig und pflichtgetreu, Arbeit zu geben oder zu verschaffen? Kenntnisse in Geflügel- u. Vogelzucht, auch mit Landwirtschaft u. Gartenbau etwas vertraut. Gefällige Antwort sehe ich freundl. entgegen unt.: „Frühling 1925" c. d. Exped. d. Zeitschrift. [402

Beschwerden wegen Nichtzustellung der „Gefiederten Welt" sind beim zuständigen Postamt anzubringen.

Züchterwaren

L. K.-Nahrung	1/2-Kilo-Paket R.-M.	1,20
„	Postkolli inkl. „	11,—
„	Probebeutel „	0,80
Rübsen, Ia	1/2-Kilo-Paket „	0,45
Glanz, Marokko, Ia	„ „	0,50
Hanf, Ia	„ „	0,35
Ital. Silberhirse, Ia	„ „	0,45
Mrk. Hirse, gelb, Ia	„ „	0,30
Leinsaat, Ia	„ „	0,45
Mischfutter, Ia	„ „	0,50
Negersaat, Ia	„ „	0,45
Salatsamen, weiß, Ia	„ „	1,50
Sonnenrosenkerne, gestr., Ia	„ „	0,35
Mohn, blau, Ia	„ „	0,70
Hafer, geschl., Ia	„ „	0,35
Finnisch. Ameiseneier, Ia	„ „	8,—
Holzwolle, Nr. 1, **weiß**, für 50 Nester ausreichend	„ „	0,50
Nr. 3	„ „	0,30
Piep	1/1-Packung „	1,50
„	1/2 „ „	0,80
Piep Extra	1/1 „ „	1,—
„ „	1/2 „ „	0,50

Ein Posten **Futter-** und **Eiernäpfchen** aus Glas billigst.
Ein Posten **Drahtnester** und **Vorsatzgitter**, verzinkt, billigst.
Sepiaschalen billigst.
Vereinsbezug und Wiederverkäufer verlangen Spezialofferte. [403

Lorenz, Dresden, Drehgasse 5.

Wer
in der „Gefiederten Welt" inseriert,
hat Erfolg!

Zusammenkunft

der Magdeburger Liebhaber exotischer Vögel am Sonntag, den 22. März 1925 vorm. 10 Uhr 30 im Lokal „Alter Fritz", Berlinerstraße.

404]

Zur gefälligen Beachtung!

§ 3 des am 1. September 1908 in Kraft getretenen „Vogelschutzgesetzes" lautet:

In **der Zeit vom ersten März bis zum ersten Oktober** ist das Fangen und die Erlegung von Vögeln sowie der Ankauf, der Verkauf und das **Feilbieten**, die **Vermittlung** eines hiernach verbotenen An- und Verkaufs, die Ein-, Aus- und Durchfuhr von lebenden sowie toten Vögeln der **in Europa einheimischen** Arten überhaupt, ebenso der Transport solcher Vögel zu Handelszwecken untersagt.

Wir machen darauf aufmerksam, daß der **Tausch** von einheimischen Vögeln wie auch der nicht zu Handelszwecken dienende Transport **nicht verboten** ist, wir bitten, dies bei Aufgabe von Inseraten berücksichtigen zu wollen.

Die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt"
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Vögel

Schönfelders Kanarienfeinzucht, Dresden-Trachau 37,

gold. Med. präm., Urstamm Seifert-Wolf, empfiehlt tiefe Hohlroller, Knorren, Schockel, schöne tiefe Flöten, Zuchthähne und ff. Tag- und Lichtsänger à 12, 15, 18 M., 3 Stück zus. 40 M., erstklassige Vorsänger und Ausstellungshähne à 20, 25, 30 M., 3 Stück zus. 60 M., prima Zuchtweibchen à 4 M. Machen Sie bitte einen Versuch und Sie werden zufrieden sein. Hunderte von Dankschreiben im Besitz. [405

Hochedle Gesangs-Kanarien

tourenreiche, fleißige Sänger (Edelroller). **Rein gelbe Gesangs-Kanarien**, Hähne sowie Zuchtweibchen, auch geeignet für Bastardzucht. Garantie: Versand nur kerngesunder Vögel, streng reelle Bedienung. Zuchtpärchen 20 *M*.

J. Franke, Dresden A
Lortzingstraße 3. [406

Prämiiert: Vogel-Ausstellung Dresden 1924 „Goldene Medaille".

Harzer-Edeltanarien

von 15 M. an, Weibchen 3 M. Flug- und Heckkäfige, Nistkästchen mit Draht 407] durchzogen per Dtzd. 6 M.
Adolf Janson, Barbis

Empfehle:

Gesangs-Edelkanarien,

tourenreiche fleißige Tag- und Lichtsänger, **Hähne** von 15 M. an, **Zuchtweibchen** 3 M. [408
Garantiere Wert und lebende Ankunft.
Carl Müßig, Berlin-Lichtenberg, Wilhelmstr. 23. Fernruf Lichtenbg. 453.

1,1 **blaubürzl. Sperlingspapag.**
1,1 **Rotkopfamadinen,**
1,1 **unausgef. Papstfinken,**
1,0 **unausgef. Indigofink**
gegen kleine Exoten zu vertauschen oder zu verkaufen. [409
W. Ludwig, Dentist, **Elsterberg** i. V.

Graupapageien

zahm, kerngesund, sprechend, nur 100 *M*. **Gelbkopfamazonen**, pr. Vögel, spr., nur 45 *M*. **Blaustirnamazonen**, herrl. Vögel, sprech., nur 45 *M*.

Kronenäffchen,

zahm, poss., kerngei., nur 65 *M*. **Javaneräffchen**, zahm, kerngei., nur 65 *M*. Vers. per Nachn.
Willer, Altona a. d. E.,
410] Kirchenstr. 34.

Verkaufe:

2 Schamakäfige, 70×46×35, Flemming, samt 2 90 cm hoh. Tischchen hierzu; **1 Patent Universal-Kanarien-Gesangs- und Transportkäfig**, 28×80×31, Flemming, kompl., neu; **65 verschied. Farbentafeln von Exoten** a. d. Gef. Welt, vollk. neu, darunt. viele, d. d. Verleger nicht mehr liefern kann. **In Tausch nehme**: Kompl., mögl. ungeb. Jahrg. d. Gef. Welt 1917 bis 1899; tab. Farbentafeln **a. d. Gef. Welt** (Nr. 2—4, 7, 10—13, 15, 20, 22, 25, 32, 36 d. neuen Neunzig). Rückporto. [3—
Louis Sztachovics, Privatbeamter, **Wien XVI,** Seeböckgasse 36, III./47.
411] A. Z.-Mtgl. 26.

Sprechenden Graupapagei

gesundes Tier, gibt Pfötchen u. Küßchen, ist fingerzahm, talentvolles Tier, verkaufe komplett mit schönem Käfig, Größe 42×42, Höhe 82 cm, für 168 Mark.
412] **Egon Kebekus,** Photograph, **Schwerte** (Ruhr), Markt 6.

Reizende
Kapuzineräffchen

sehr drollig und lieb, à ℳ 100.—.
Prachtvoller
Hahnschweifwidafink

vor der Verfärbung. [413
Pichler, Wien IV, Karolinengasse 25.

Roter Kardinal

zahm und schön befiedert, in vollem Gesang, 30 ℳ franko, tausche auch.
R. Diwersy, Merzig (Saar).
A. Z.-Mitgl. 183. [414

1,0 **Goldfasan, Ia,** 2¼er, 30 Mark. **Hänfling, Ia,** mit fleißigem chin. Nachtigallschlag. [415
Tausche prima Hohlroller.
Schlößchen Allersberg b. Nürnberg.

Zu vertauschen!

Steinrötel, 2 J. gekäfigt, **1 Sprosser,** Frühjahrsfang 1924, halblaut im Gesang.
416] **J. Schafheitle, Tübingen.**

Tausche roten Dompfaff

zahm, gesund, gegen Stieglitz oder Rothänfling, Männchen. [417
Heisig,
Hiondslas p. Lubie, Kr. Gletwitz.

Vertausche:

garant. ganz lautes **Ia Wipfel-Rotkehlchen,** in voll. Gesang, gegen ebens. nur erstkl. Sgr chin Nachtigall, Mossambik-Zeisig, Edelsänger oder Nützliches. Ferner: **schön pfeif. Star,** unermüdl. Sgr. u. Unikum I. Rang., gegen Tausch-Meistgebot. [418
J. Decker, Oslebshausen,
Finkenau 125.

---

2 jährige deutsche Nachtigall

419] **tauscht**
Werner Biel, Gera-Reuß,
Steinstraße 14.

Gebe ab:

1 Mövchen ♂ 6 ℳ, 3 Zebrafink ♀ à 8 ℳ, 2¼er Zucht, wenn möglich abholen, nach Hamburg bringe Anfang April selbst. Nehme in Tausch ♀ von Tigerfink, Schönbürzel u. a. ♀♀. [420
F. Brock, Osnabrück, Schloßstr. 49.

Vertausche 2 **Ia Schwarzplättchen,** Gebirgsvögel mit lautem Überschlag, schön befiedert und zahm, gegen Kanarien oder andere Sänger.
R. Diwersy, Merzig (Saar).
A.Z.-Mitglied 183. [421

1,2 Kanarien gelb, 0,1 roter Kardinal Mark 55 franko. Tausche mit **Ia Schama.**
E. Hoffmann, Ludwigslust,
422] Letztestraße.

Suche in zuchtfäh. Tieren:

0,1 Zebrafink
0,1 grüner Wellensittich
0,2 gelber Wellensittich
1,2 jap. Mövchen. [423
Edwin Pangritz, Zittau i. Sa.,
A. Z.-Mitgl. 383.

Bitte!

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß

a) **alle für die Redaktion** der „Gefiederten Welt" bestimmten **Zuschriften (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten, Vereinsnachrichten usw.)** und **Sendungen** (tote Vögel, Manuskripte) nur an **Herrn Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf,** Neue Bismarckstr.,

b) **alle Bestellungen** auf **Abonnements, auch vom Ausland, nur durch die Post,**

c) **Inserate** und dergl. Geschäftliches nur an die **Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,** Postschließfach 148,

zu richten sind.

Bei Anfragen und Bestellungen bitten wir, sich auf die „Gef. Welt" zu berufen

---

Gartenbau-Bücherei

Herausgegeben von
Prof. **Dr. Udo Dammer,**
Kustos des Botanischen Gartens Berlin-Dahlem.

Jeder Band 1.20 M.

Bd. 1. **Monatskalender des Pflanzen- und Gartenfreundes.**
Von Prof. Dr. Dammer. 2. Aufl.

Bd. 2. **Zimmerblattpflanzen.**
Von Prof. Dr. Dammer. 2. Aufl. Mit 48 Abbildungen.

Bd. 3 **Gewürzkräuter.**
Von Obergärtner Bode. Mit 6 Abb.

Bd. 4. **Balkonpflanzen.**
Von Prof. Dr. Dammer. 2. Aufl. Mit 41 Abbildungen.

Bd. 5. **Zimmerblütenpflanzen.**
Von Prof. Dr. Dammer. 2. Aufl. Mit 23 Abbildungen.

Bd. 6. **Die ein- und zweijährigen Gartenpflanzen.**
Von Gartenbaudirektor Goeschke. Zurzeit nicht lieferbar!

Bd. 7. **Der Gartenrasen.**
Von Obergärt. Bode. Mit 14 Abb.

Bd. 8. **Die Farnpflanzen unserer Gärten.**
Von Inspektor Mönkemeyer. Mit 15 Abbildungen.

Bd. 9. **Der Zwergobstbau.**
Von Gartenbaudirekt. Koopmann. Mit 9 Abbildungen. Zurzeit nicht lieferbar!

Bd. 10. **Die Staudengewächse.**
Von Gartenbaudirektor Goeschke. Mit 35 Abbildungen.

Bd. 11. **Gemüsebau auf Gartenbeeten.**
III. Teil Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 20 Abbildungen. Vergriffen.

Bd. 12. **Pfirsiche und Aprikosen.**
Von Obergärtn. Kotelmann. Mit 13 Abbildungen.

Bd. 13. **Schönblühende Zwiebelgewächse.**
Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 30 Abbildungen.

Bd. 14. **Blütensträucher.**
Von Gartenbaudirektor Goeschke. Mit 28 Abbildungen.

Bd. 15. **Gemüsebau auf Gartenbeeten.**
I. Teil. Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 22 Abbildungen.

Bd. 16. **Die Beerensträucher.**
Von Gartenbauinspektor Maurer. 2. Aufl. Mit 14 Abbildungen.

Bd. 17. **Bunte Gehölze.**
Von Gartenbaudirektor Goeschke. Mit 1 Tafel.

Die Tabakpflanze.
Ein Handbuch zu ihrer Anzucht und Verwertung für jedermann. Von A. Oertel. 2. Aufl. 0,60 M.

Bd. 18. **Gemüsebau auf Gartenbeeten.**
II. Teil. Von Gartenbauinspektor Lindemuth. Mit 22 Abbildungen.

Bd. 19. **Gurke, Melone, Kürbis.**
Von Inspektor Lange. Mit 15 Abb.

Bd. 20. **Der kleine Villengarten.**
Von Gartenarchitekt Pfyffer von Altishofen. Mit 20 Abbildungen und 3 Tafeln.

Bd. 21. **Das Mistbeet.**
Von Obergärtner Bode. Mit 5 Abbildungen.

Bd. 22. **Die Gartenlaube.**
Von Landschaftsgärtner Klawun. Mit 14 Abbildungen.

Bd. 23. **Das Weinspalier.**
Von Gartenbaudirekt. Koopmann. Mit 17 Abbildungen.

Bd. 24. **Die Kultur der schönblühenden Orchideen.**
Von Inspektor Ledien. Mit 7 Abb.

Bd. 25. **Zimmer- und Freiland-Aquarienpflanzen.**
Von Inspektor Mönkemeyer. Mit 26 Abbildungen.

Bd. 26. **Rosen.**
Von Gartenbaudirekt. Koopmann. 2. durchgesehene und ergänzte Aufl. Mit 17 Abbildungen.

Bd. 27. **Einfassungspflanzen.**
Von Gartenbaudirektor Goeschke. Mit 44 Abbildungen.

Bd. 28. **Nadelhölzer.**
Von Prof. Dr. Dammer.

Bd. 29. **Schönblühende Knollengewächse.**
Von Gartenbauinsp. Lindemuth. Mit 20 Abbildungen.

Bd. 30. **Der Spargel.**
Von Inspektor Dreßler. Mit 10 Abbildungen.

Bd. 31. **Die Erdbeere.**
Von Dozent Dr. Zürn. Mit 13 Abb.

Bd. 32. **Palmen.**
Von Prof. Dr. Dammer. Mit 29 Abbildungen.

Bd. 33. **Gewächshaus des Privatmannes.**
Von Inspektor Ledien. Mit 8 Abbildungen. Zurzeit nicht lieferbar.

Bd. 34/36. **Gartenfeinde und Gartenfreunde.**
Die dem Gartenbau schädlichen und nützlichen Lebewesen. Von Prof. H. Kolbe. Mit 75 Abb. 3.60 M.

Bd. 37/39. **Theorie der Gartenarbeiten.**
Ein Katechismus des Pflanzenbaues. Von Prof. Dr. Udo Dammer. Mit 23 Abbildungen. Preis 4.60 M.

In Vorbereitung:

Champignon-Zucht. — Kakteen.

Die besten Speiseschwämme
von Gotth. Hahn. Mit naturgetreuen kolorierten Abbildungen auf 12 Tafeln. 1.20 M.

Zu beziehen durch:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg
Postschließfach 148.

Tausche

edlen **Kanariensänger** gegen irgend anderen guten Sänger.
W. Siegert, Dresden-Strehlen,
424] Wasastraße 8.

Meine geehrten Kunden

werden höfl. gebeten, Bestellungen für **„Abteilung Muster Rausch"** schon jetzt einzusenden. Anfragen Rückporto.
Josef Pichler, [425
Wien IV, Karolinengasse 25.

Für junges sehr aussichtsreiches Unternehmen in **Vogelliebhaberbedarf** (schon gut eingeführt) wird tätiger Teilhaber mit 10—12 000 ℳ Kapital gesucht. Tüchtigem Fachmann (Vogelliebhab.) wäre hier Gelegenheit geboten, sich eine gute Existenz zu gründen. Angebote von nur ernsten Liebhabern an **F H 26** an die „Gefiederte Welt". [426

„Die fremdl. Stubenvögel", Prachtwerk von Karl Neunzig, 400 Abbildungen, noch ganz neu, kostet 35 ℳ, vertausche geg. Exoten jeder Art u. bitte um Angebot. Suche ebenso 1,0 blauen Wellensittich, bei letzterem zahle zu. [427
Carl Blüm, Mainz, Bebelring 46.

Gibt es vielleicht unter den Lesern dieses Blattes ein Menschenkind, das mit einem tief veranlagten schwedischen Liebhaber, der Arbeiterklasse angehörend und der, trotz der Liebe zur Natur, sich ein bißchen vereinsamt fühlt, einen Briefwechsel führen möchte? Sollte einer, ungeachtet obengenanntem, dazu gewillt sein, wird um Antwort freundlichst gebeten unter: „Schwede 34" a. d. Exped. d. Zeitschrift. [428

Inserate

für das am **19. März 1925** zur Ausgabe gelangende **Heft 12** der **Gefiederten Welt erbitten bis 14. März 1925** früh

---

Für Liebhaber fremdländischer Vögel

Die fremdländischen Stubenvögel,
ihre Naturgeschichte, Pflege u. Zucht. Von Karl Neunzig. (Zugleich Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs für Vogelliebhaber Band I. Mit 42 Fabentafeln und 400 Textab. Geh. 30.— M., geb. 35.— M.

Die fremdländischen Weichfutterfresser
(Insekten- oder Kerbtierfresser, auch Wurmvögel genannt, Frucht- oder Beerenfresser und Fleischfresser). Mit Anhang: Tauben- und Hühnervögel. Von Dr. Karl Ruß. (Die fremdländischen Stubenvögel Band II.) Mit 10 Farbentafeln. Geh. 30.—

Gefiederte Hausfreunde II.
Von Karl Neunzig. Kurze Anweisung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbildungen. Kart. 1.—

Dr. Karl Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel,
ihre Naturgeschichte Pflege und Zucht. Band I—IV. Geh. 150 M., in Halbleder geb. 175.— M. Band I. Körnerfresser ist einzeln nicht käuflich. Band II. Weichfresser. Geh. 30.— M. Band III. Papageien. Geh. 30.— M. Band VI. Lehrbuch der Stubenvogelpflege.

Webervögel u. Widafinke,
ihre Naturgeschichte, Pflege u. Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Kart. 3.—

Zu beziehen durch:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg
Postschließfach 148.

hrgang 54 12. März 1925 Heft 11

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Die Nachtigall. Von J. Birk, Leipzig.
Neueinführungen und Seltenheiten. Von K. Neunzig. (Forts.)
Dompfaffenzucht. Von Amtmann Max Krumm. (Forts.)
Mein Liebling — der Jako. Von S. Lichtenstaedt. (Schluß.)
Von meinen Prachtfinken. Von B. Schuster.
Rotschwänze — Phoenicurus (*Forst.*). Eine Monographie von John Kuntzendorff. (Forts.)
Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Ausstellung - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

reutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellung.

Der Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig veranstaltet im Zusammengehen mit dem Naturkundlichen Heimatmuseum in Leipzig in den Tagen vom 19. bis zum 26. April 1925 eine Ausstellung einheimischer Vögel. Wie alle vom genannten Verein bisher veranstalteten Ausstellungen hat sie den Zweck, allen Natur- und Vogelfreunden ein Bild zu bieten, in welcher Weise der Liebhaber und Vogelwirt die gefiederten Geschöpfe der Heimat hegt und pflegt und ferner der Allgemeinheit, insbesondere der Jugend, das Interesse an der Vogelwelt zu wecken. Es ergeht hierdurch an Alle, ob groß oder klein, jung oder alt und arm oder reich, insbesondere auch an alle Liebhabervereine und die der Wissenschaft die herzliche Einladung, die Ausstellung zu besuchen.

Der Presseausschuß. J. A.: Vorwerk.

Der Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Zwickau beabsichtigt in der Zeit vom 17.—21. Mai d. J. eine Vogelausstellung zu veranstalten.

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. 1. Vors.: Hermann Höhne, Leipzig-Vo., Eisenbahnstraße 84 VI. 1. Schriftführer: Max Hunger, Leipzig, Inselstraße 17 II. — Im Interesse eines ordnungsgemäßen Kassenabschlusses zur Jahresversammlung bitten wir alle Vereine und Einzelmitglieder, soweit sie mit ihren Beiträgen noch im Rückstande sind, diese umgehend, jedoch bis spätestens 14 Tage vor der Generalversammlung, an den Kassierer des Landesverbandes, Herrn Ludwig Böttcher, Leipzig, Inselstr. 17 II, abzuführen. Öftere Anfragen in bezug auf Höhe der Beiträge geben uns Veranlassung, diese nochmals in Erinnerung zu bringen. Vereinsmitglieder haben 0,50 M. und Einzelmitglieder 3,— M. für das ganze Jahr zu entrichten. Mehrere Einzelmitglieder haben nur 2,— M. eingesandt, hätten also noch eine 1,— M. nachzuzahlen. Ferner stehen trotz mehrfacher Aufforderung noch von einigen Vereinen die Mitgliederlisten aus. Es sind dies der „Kanarien-, Zier- und Singvögel-Züchterverein" zu Wilkau i. Sa., und die „Alte Vereinigung der Vogelliebhaber" zu Dresden. Sie werden hierdurch nochmals höflichst um Einsendung der Listen ersucht. Die Jahresversammlung, welche am 26. April in Verbindung mit einer Vogelschau des Vereins für Vogelkunde-, schutz- und -liebhaberei zu Leipzig stattfindet, bedingt einen gewissenhaften Geschäfts- und Kassenbericht. Pflichtgemäß werden wir unter Möglichstes tun, verlangen aber von allen Vereinen und Einzelmitgliedern, soweit sie an vorstehenden Ausführungen interessiert sind, daß auch Sie ihren Verpflichtungen pünktlich nachkommen.

Der Vorstand: J. A. Hunger, Schriftf.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen. Alle Vereine und Liebhaber, die unserem Verbande bereits angeschlossen sind, bitten wir an dieser Stelle nochmals, die restlichen Mitgliedsbeiträge unserem Kassierer Herrn Erich Merz, Berlin-Friedenau, Wilhelm-Hanff-Str. 14 II, umgehend einzusenden. Vereine und Liebhaber, tretet unserem Verbande bei und unterstützt unsere gute Sache. J. A.: Erich Merz.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden.
J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen.
J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurter Str. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. V.: Emil Ivo, Schriftführer.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jeden 4. Sonntag im Monat, abends 5 Uhr, bei Herrn Karl Röhr, Gastwirtschaft, Heiligerweg 28. Liebhaber jederzeit herzlich willkommen. — Protokoll der Mitgliederversammlung vom 22. Februar 1925. Punkt 1: Aufnahme neuer Mitglieder; Punkt 2: Bezahlung der rückständigen Beiträge; Punkt 3: Es wurde beschlossen, je 100 Stück Statuten und Mitgliedskarten neu für unseren Verein in Druck zu geben; Punkt 4: Vorlesung eines Aufsatzes „Warum käfigen wir Vögel"; Punkt 5: Unser Ehrenmitglied Kollege Lappe aus Mengede erhielt für seine Verdienste im Verein ein schönes Diplom, welches ihm der Vorstand in feierlicher Weise überreichte. Gleichzeitig wird Kollege Lappe von der Zahlung der monatlichen Vereinsbeiträge entbunden; Punkt 6: Der Kollege Stawitzki wird einstimmig zum neuen Schriftführer gewählt; Punkt 7: Zum zweiten Male haben wir für unseren Verein hier in der Tageszeitung ein Inserat aufgegeben und konnten wir zur größten Freude wiederum 4 neue Liebhaber als Mitglieder in unseren Verein aufnehmen; Punkt 8: Verschiedenes. Es wurde von Kollege Lappe angeregt, daß sich die Kollegen im Verein im Monat zweimal zusammenfinden möchten, und zwar soll die Zusammenkunft aller 14 Tage Sonntags in unserem Lokal zwanglos sein, während aller 4 Wochen d. h. jeden 4. Sonntag im Monat unsere Monatsversammlung stattfindet. Auch unsere Damenwelt ist herzlichst zu unseren Sitzungen eingeladen. Dieser Vorschlag fand die Annahme der Kollegen, und werden sich die Kollegen mit ihren Damen jetzt aller 14 Tage in unserem Vereinslokal treffen können ab nachmittags 5 Uhr. Des ferneren berichtete Kollege Spauke noch über seine Drossel, Kollege Mauke wünschte gemeinsame Futterbestellungen. Der Antrag von Kollege Stawitzki, den Vogelhändler Sengstock in unseren Verein aufzunehmen, wurde nach langer Debatte abgelehnt. Kollege Bentruß erzählte ferner noch von seinen zahmen Hänflingen. Das Schlußreferat bildete in dieser Versammlung „Der Erlenzeisig", seine Behandlung, Pflege und Haltung in der Gefangenschaft, mit zahlreicher Aussprache, über dieses schöne Vögelchen. Der Vorstand.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinslokal „Parkhotel", Espanyastr. 1, Versammlung. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an. Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Rietschelhof", Rietschelstr. 19. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 17. März 1925. Gäste, auch Exotenliebhaber, stets willkommen. J. A.: Arnold Weber, 1. Vors.

Die Vereinigung hannov. Vogelliebhaber will dem Vogelpfleger Ratgeber und Helfer sein, will die Liebe zum Tier und zur Natur wecken und stärken, will beitragen zum Kennenlernen der Vögel in Wald und Flur. Monatlich einmal kommen die Mitglieder zusammen, tauschen die Erfahrungen aus, hören Vorträge aus allen Gebieten der Vogelkunde, -schutz und -pflege an. Ein- oder zweimal im

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Jahre veranstalten wir große Lichtbilder- und Film-Abende. Im Frühjahr finden Beobachtungsausflüge unter Führung statt. Den Mitgliedern stehen zahlreiche Fachzeitschriften und Bücher kostenlos zur Verfügung. Regelmäßig berichtet die Zeitschrift niederf. Vereine über unsere Veranstaltungen. An den Vereinsabenden ist Rat und Auskunft, Kauf- und Tauschgelegenheit geboten. Jahresbeitrag Mk. 2,—, für Auswärtige und Schüler Mk. 1,—. Anmeldungen an Heinz Appel, Nienburgerstr. 7 A I. Auskunft: Buchhändler A. Troschütz, i. Fa. Cruses Buchhandlung, Gr. Agidienstr. 4.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögeln Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstraße. Paul Lohs, 1. Schriftführer.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden, Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. — Am Sonnabend, den 28. Februar hielt der Verein seine zweite Februarversammlung ab. Sie trug den Charakter einer zwanglosen Aussprache. Vorgetragen wurde ein Artikel von Dr. Curt Flöricke aus den ornithol. Monatsheften der süddeutschen Vogelwarte über die Beringungsversuche zur Erforschung des Vogelzuges. Die Aussprache erstreckte sich auf die Beringung von Stubenvögeln, besonders von Prachtfinken, Kanarien und Sittichen. — Die Nistkästen sind noch nicht eingetroffen, sie sollen auf dem alten Friedhof aufgehängt werden. A. Voigt.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz und Umgegend. Vereinslokal „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jeden Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" und „Kanaria". Vogelliebhaber und Gäste sind stets willkommen. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst., Boppel, 1. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 19. März 1925. Gäste stets willkommen. — Generalversammlung am 5. Februar 1925. Anwesend waren 38 Mitgieder. Nach Eröffnung der Sitzung gab der 1. Vorsitzende Herr Birk, folgende Tagesordnung bekannt: 1. Protokoll; 2. Eingänge; 3. Jahresbericht; 4. Kassenbericht und Entlastung des Kassiers nach dem Bericht der Revisoren; 5. Bericht des Bibliothekars; 6. Bericht des Archivars; 7. Neuwahl des Gesamtvorstandes; 8. Anträge; 9. Verschiedenes. Das Protokoll der 23. Sitzung wird vorgelesen und ohne Widerspruch angenommen. Die verschiedenen Eingänge werden vorgelesen und zur Erledigung weitergegeben. Anschließend gibt Herr Birk den Jahresbericht, und sei hieraus folgendes angeführt: Der Verein zählte am Schluß des Geschäftsjahres 76 Mitglieder und 3 Ehrenmitglieder, eingetreten sind 10, ausgetreten bzw. ausgeschlossen sind 22. Ein Mitglied, unseren Herbert Otto, haben wir durch den Tod verloren. Die Mitgliedschaft auf Gegenseitigkeit bestand und besteht noch mit folgenden Vereinen: Verein der Liebhaber einheimischer Vögel, Leipzig-West; Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel, Berlin; Vereinigung für Vogelschutz und -liebhaberei, Frankfurt a. Main; Verein edler Sänger, Wien; Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei, Kassel; Vereinigung der Vogelliebhaber, Hannover; Bayerischer Vogelliebhaberverein, München; ferner war der Verein Mitglied bei folgenden naturwissenschaftlichen und Vogelschutz treibenden Vereinen und Unternehmungen: Deutscher Verein zum Schutze der Vogelwelt; Bund für Vogelschutz, Stuttgart; Verein Jordsand; Süddeutsche Vogelwarte; Sächsischer Verein für Natur- und Heimatschutz; Verein sächsischer Ornithologen. Unterstützt wurde die Vogelwarte Rossitten. Außerdem gehört der Verein der Arbeitsgemeinschaft zur Pflege des Naturschutzgeheges bei Gundorf an. An Fachzeitschriften wurden ausgelegt: Gefiederte Welt, Wochenschrift der Liebhaber fremdländischer und einheimischer Vögel, Zeitschrift „Der Vogelliebhaber", Mitteilungen des sächs. Vereins für Natur- und Heimatschutz, Ornithologische Monatsschrift, Mitteilungen der süddeutschen Vogelwarte und des Vereins sächs. Ornithologen. Folgende Bücher wurden für unsere Bibliothek angeschafft: Lukanus, „Rätsel des Vogelzuges". Vom Werke Heinroths „Die Vögel Mitteleuropas" Heft 1 bis 6. „Das Leben der Vögel" von Brehm. „Mit den Zugvögeln in Afrika" von Bengt Berg. Weiter wurden folgende Bücher dem Verein geschenkt: von Herrn Vorwerk „Liebesleben der Vögel" von Zimmermann und von Herrn Hetzschold „Unsere Raubvögel" von Brehm. Den Spendern sei hier nochmals gedankt. Unserer Bälgesammlung wurden von Herrn Hetzschold verschiedene Bälge und von Herrn Vorwerk eine Saatgans geschenkt. Auch für diese Geschenke sei hier nochmals der Dank des Vereins ausgesprochen. Der Wunsch unseres Vereins, die Anschaffung einer Spiegel-Reflex-Kamera, ist dank der Opferwilligkeit unserer Mitglieder gelungen. Durch Zeichnungen von Anteilscheinen haben wir den Betrag zum Teil aufgebracht. Ein großer Teil der Mitglieder hat die gezeichneten Beträge dem Verein gestiftet. Auch diesen Herren sei hier nochmals der Dank des Vereins ausgesprochen In diesem Vereinsjahre wurden 23 Sitzungen, 2 Vorstands- und 4 Vergnügungsausschußsitzungen abgehalten Zu den 23 Sitzungen waren zusammen 720 Mitglieder und 48 Gäste anwesend. Unser Mitglied Hesse ist nun 25 Jahre im Verein. Herr Birk hielt einen Vortrag „Unsere Raubvögel" und Herr Goldberg veranstaltete einen „Hermann-Löns-Abend". Weiter wurden folgende Festlichkeiten abgehalten: 1 Familienabend, 1 Weihnachtsfeier und 1 Stiftungsfest. Folgende Ausflüge wurden im vergangenen Jahre gemacht: 1 Vormittagsausflug nach Schkeuditz—Oberthau, 1 Tagesausflug Wurzen—Eilenburg, 1 Tagesausflug Eschefeld, 1 Nachtausflug Wolfen und 1 Familienausflug nach Großzschocher, verbunden mit Kinderfest und Preiskegeln. Weiter ist zu berichten, daß im vergangenen Jahre folgende lebende Vögel zur Ansicht bzw. zur Geschlechtsbestimmung vorgezeigt worden sind: 1 Haubenlerche, 1 Sprosserweibchen, 2 Gartengrasmücken, 1 junge Schleiereule, 1 Schwarzhalstaucher, 1 get. Sumpfhuhn, 1 Steinrötel, 1 Blaukehlchenweibchen. Ferner wurden folgende Vögel verlost: 4 Rotkehlchen, 1 Gelbspötter, 2 Gartenrotschwänze, 1 Feldlerche, 1 Dorngrasmücke, 1 Schwarzplatte. In unserer letzten Sitzung wurden die Vereinsbälge zur Schau ausgelegt. In den Protokollen sind 25 eingegangene und 43 ausgegangene Schriftstücke vermerkt. Folgende Ereignisse seien hier nochmals aufgeführt: Gründung des Reichsverbandes in Berlin am 21. April. Jahresversammlung des Landesverbandes Sachsen in Leipzig am 17. und 18. Mai 1924, verbunden mit einer Ausstellung in unserem Vereinslokal. Der 6. sächs. Ornithologentag in Chemnitz vom 27.—29. Sept. 1924. Bezirksversammlung der Erzgebirgischen Vereine am 7. Okt. 1924 in Aue i. E. Heidelberger Ausstellung am 1. und 2. Nov. 1924. Bei dieser Gelegenheit wurde der Landesverband der Vogelliebhaber Südwestdeutschlands gegründet. Vortrag von Prof. Dr. Flöricke in der Loge „Zu den drei Ringen" am 12. Nov. 1924. Berliner Ausstellung am 19.—23. Nov. 1924. Dresdener Ausstellung vom 20.—22. Dez. 1924. Bei sämtlichen auswärtigen Veranstaltungen war der Verein vertreten. Es liegt wieder ein arbeitsreiches Vereinsjahr hinter uns. Möge dem Verein ein weiteres Blühen und Gedeihen beschieden sein zu Nutz und Frommen unserer edlen Liebhaberei. Aus dem Bericht unseres Kassierers ist folgendes zu erwähnen. 476,73 Mk. an Einnahmen stehen 289,14 Mk. an Ausgaben gegenüber. Es verbleibt ein Überschuß 187,59 Mk., zuzüglich Bestand vom 7. Febr. 1924 in Höhe von 24,71 Mk., verbleibt ein Bestand von 212,30 Mk. Also auch pekuniär sind wir ein schönes Stück vorwärts gekommen und haben uns von der traurigen Inflationszeit wieder erholt. Aus den Berichten des Bibliothekars und Archivars ist folgendes anzuführen: Unsere Vereinsbücherei besteht aus 185 Büchern außer den ungebundenen Heften. In unserer Bälgesammlung haben wir 263 Exemplare in 28 Arten. Bevor zur Wahl des neuen Vorstandes geschritten wurde, erhielt Herr Birk für seine aufopfernde Tätigkeit im Interesse unseres Vereines den Dank aus-

(Fortsetzung auf der 4. Umschlagseite.)

gesprochen. Die Wahlen verliefen wie folgt: 1. Vorsitzender Herr Birk; 2. Vorsitzender Herr Höhne; 1. Schriftführer Herr Roth; 2. Schriftführer und Bibliothekar Herr Vorwerk; 1. Kassierer Herr Ludwig Böttcher; 2. Kassierer Herr Max Chlodek; Archivar Herr Otto; Beisitzer die Herren Petters, Geßler, Waack, Paul Schwarz und Hunger. Als Kassenrevisoren wurden die Herren Petters, Neumann und Hirschfeld bestellt. Dem Vergnügungsausschusse gehören außer dem Gesamtvorstand die Herren Winkler, Kegel, Böttcher, Rob. und Ungebauer an. Die eingereichten Anträge wurden angenommen und zum Teil zurückgestellt. Von den übrigen geschäftlichen Angelegenheiten sei noch unsere Ausstellung erwähnt, welche wir in der Zeit vom 19.—26. April d. Js. in den Räumen des Leipziger Heimatmuseums veranstalten werden. Wir wollen hier einmal ein Bild geben von dem Stande der einheimischen Stubenvogelliebhaberei unseres Vereins und hoffen auf einen recht zahlreichen Besuch der auswärtigen Liebhaber. M. Roth, Schriftf., L.-Plagwitz.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen.
Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung bei unserem Mitgliede Herrn Normast im Gasthof „Kaiser Friedrich", Breslauer Str. 50. Liebhaber sind als Gäste willkommen. J. A.: Friedrich.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Tage im Restaurant zum Goldenen Falken Mitgliederversammlung. Nächste Versammlung am Freitag, dem 20. März 1925 und so fort. Freunde und Gönner stets willkommen.
J. V.: Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebendort. — Bericht über die Generalversammlung vom 31. Januar 1925. Tagesordnung: 1. Neuaufnahmen; 2. Verlesen des Protokolls der letzten Versammlung; 3. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden; 4. Kassenbericht des 1. Kassiers; 5. Bericht der Revisoren; 6. Neuwahl des Vorstandes; 7. Ehrung von Mitgliedern; 8. Anträge und Verschiedenes. Der 1. Vorsitzende Herr Flierl stellte zu Beginn der Versammlung fest, daß satzungsgemäß die Mitglieder 14 Tage vorher schriftlich eingeladen waren und die Einladung auch in der „Gef. Welt" bekannt gegeben wurde. Neuaufgenommen wurden die Herren Daubner und Götz in Augsburg, sowie Georg Ruppert, Josef Karl und Rudolf Kaiser in München. Nach Verlesen des Protokolls der letzten Versammlung erstattete unser 1. Vorsitzende, Herr Fritz Flierl, den Bericht über die Vereinstätigkeit im abgelaufenen 16. Vereinsjahr. Es fanden 10 Monatsversammlungen, 1 Generalversammlung und 1 Ehrenabend für die Wiener Gäste statt, ferner 3 Ausschußsitzungen, das Stiftungsfest und die Ausstellung (im Verein mit der Weltbundesgruppe „Oberbayern" und dem deutschem Verbande). Am 23. Februar 1924 hielt Herr Zierer einen Vortrag über die Ammern. Mitgliederstand am 31. Januar 1925 219 (einschließlich 2 Ehrenmitgliedern). Nach dem Kassenbericht unseres 1. Kassiers, Herrn Josef Rosenberger, betrugen im abgelaufenen Vereinsjahr die Einnahmen 762.57 M., die Ausgaben 531.87 M., sohin Kassenbestand 230.70 M. Durch die Revisoren, den Herrn Zipper und Mader, wurde unserem tüchtigen Kassier Rosenberger vollste Entlastung erteilt. Die Bibliothek, in den bewährten Händen des Herrn Max Zierer, enthält zurzeit 104 Werke und Zeitschriften, gebunden oder geheftet, 24 Kosmosbüchlein und 26 Jahrgänge von ungebundenen Zeitschriften. Die Neuwahl des Vorstands fand unter Leitung des Herrn Max Schimang statt, und zwar wurden gewählt zum 1. Vorsitzenden Herr Fritz Flierl, Tangstraße 41; zum 1. Kassier Herr Josef Rosenberger, Hirschbergstraße 1; zum 1. Schriftführer Herr Rudolf Engel, Baaderstraße 3; zum 2. Vorsitzenden Herr Architekt Kaiser; zum 2. Kassier Herr Peter Egger; zum 2. Schriftführer Herr Hermann John; als Beisitzer die Herrn Seb. Engel und Bruno Ziegler; als Bücherwart Max Zierer. Der wiedergewählte 1. Vorsitzende Herr Flierl übernimmt wieder den Vorsitz und dankt für seine Wiederwahl. In erster Linie dankt er auch dem ausscheidenden bisherigen 2. Vorsitzenden, Herr Leopold Keibel, für seine außerordentlichen Verdienste, die er sich um den Verein, besonders anläßlich der letzten Ausstellung, erworben hat. Herr Keibel begründet seinen Rücktritt mit Arbeitsüberhäufung im Privatberuf, ist aber jederzeit bereit, hilfreich beizustehen. Ebenfalls dankt Herr Flierl Herrn Pfaller für seine geleistete Arbeit als 2. Schriftführer und bedauert nochmals das Ausscheiden der beiden Herren aus dem Ausschuß. — Hierauf wurde Herr Kunstmaler A. Viggelmann in Anerkennung seiner großen Verdienste um den Verein einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt. — Der Jahresbeitrag wurde auf 4,30 M. festgesetzt, wovon 30 Pf. an den Reichsverband abgeführt werden. — Wegen den mit dem Beitrage noch rückständigen Mitgliedern wurde nach längerer Aussprache ein Antrag Seb. Engel angenommen, dahingehend, daß unser Vereinsdiener, Herr Rieger, nochmals die säumigen Mitglieder aufsucht, um den Beitrag einzuheben, andernfalls deren Streichung erfolgen müßte. — Herr Lange, Vorsitzender der Weltbundesgruppe „Oberbayern", begrüßt die Wiederwahl unseres 1. Vorsitzenden, Herrn Flierl, und zollt dem Herrn Keibel volle Anerkennung für seine mühevolle Arbeit anläßlich der letzten Ausstellung und wünscht, daß auch in diesem Jahre wieder eine Ausstellung zustande kommen möge. — Herr Rud. Engel wurde als Delegierter zur Generalversammlung der Ortsgruppe Augsburg abgeordnet. — Unser 1. Vorsitzender, Herr Flierl, erinnert schließlich noch an unsere reichhaltige Bibliothek und bittet die Mitglieder, fleißig davon Gebrauch zu machen, und mahnt die Mitglieder, den für dieses Jahr fälligen Betrag baldigst einzahlen zu wollen. — Zum Schluß tritt Herr Flierl noch für wirklichen Vogelschutz ein, und es soll Aufgabe unsers Vereins sein, bei maßgebenden Stellen Schritte hierzu zu unternehmen.
Rudolf Engel, 1. Schriftführer.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1923. Vereinsabende aller vier Wochen, in der ersten Woche des Monats verbunden mit Vortrag, in der dritten Woche jeden Monats nur gesellige Zusammenkunft. Vereinslokal „Sächsischer Hof". Gäste stets willkommen. Studienrat Professor Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgelt o
Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zw

Käfige u. Gerätschaften

Vogel-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50. **Schlagnetze** f. kl. schädl. Vögel M. 2,30, f. gr. M. 2,50 u. 2,80. **Katalog gratis.** **J. Tannen, Gronau 58,** Westf. [390

2 Nachtigall-Käfige

(Schindler) 45 und 50 lg., zu verkaufen. **1 Schindler-Drosselkäfig** 60 lg., [391 **1 Kanarien-Heckkäfig,** mögl. Draht, 2 teilig, za. 70 lg., gut erhalten, auch neu, kauft **Völker, Stettin,** Schnellstr. 7.

Futtermittel

Mehlwurmhecke

(ohne Kiste), za. 6000 Würmer enth., gegen getr. Ameisenpuppen oder Weißwurm zu vertauschen. **Ernst Nagel,** 392] **Seelow** i. Mark, Markt Nr. 291.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [393

Mehlwürmer

Pfd. 5 M, 6 Pfd. 30 M frc. Nachn. 394] **Jeltner, Breslau,** Weinstr. 12.

395] **Mehlwürmer,** reine Ware, gegen Einf. von 1.75 M 1/4 Pfd. franko. **Th. Witte,** Niederndodeleben b. Magd.

Mehlwürmer

veget. gez., 1/4 Liter franko gegen Vor- 396] einsendung von Mark 2.—. **Bonitas-Versand, Rostock i. M. 3.**

Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Ex- Papageien, Weichfresser. Anerk bewährteste Mischungen auf Grund jähriger Erfahrung. Liste 13 über Vo futter umsonst.

W. Göpel, Leipzig
Tröndlinring 1. Telephon 1-58
Bei Anfragen bitte auf die „Gefied Welt" Bezug zu nehmen.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Spornammer — Calcarius lapponicus (L.)

Goldammer — Emberiza citrinella (L.)

Grauammer — Emberiza calandra (L.)

Schneeammer — Plectrophenax nivalis (L.)

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 19. März 1925 | Heft 12

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Die Nachtigall.

Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Die Nachtigall kehrt bereits von Mitte bis Ende April in ihr Brutgebiet zurück, meistens läßt sie sich, wenn ungünstige Witterung herrscht, nicht im Schlage hören. Tritt dann warme, trockene Witterung ein, so macht sie sich durch ihren Schlag sofort bemerkbar. Nach meinen langjährigen Beobachtungen betreffs der Ankunft der Nachtigallen kann ich sagen, daß sich der Zuzug von Nachtigallen auf 2—3 Wochen erstreckt. Erst kommen einzelne Vorboten, dann das Gros, und wiederum einzelne Nachzügler. Am besten läßt sich dieses feststellen, wenn man während der Ankunftszeit ein Nachtigallenrevier öfters begeht und scharf beobachtet. Heute steht eine hier in diesem Busche, morgen dort in jenem Dickicht, einige Tage später wieder einige in einem anderen Revier, bis eines Tages alle Brutvögel ihren Stand eingenommen haben. Scharf auseinander muß man Durchzugsvögel und Standvögel halten. Durchzugsvögel erkennt man sofort, denn sie haben keinen festen Stand. Sie streichen planlos von Gebüsch zu Gebüsch, bald hier, bald dort ihren Schlag hören lassend. Will man feststellen, ob es sich bei einem Schläger um einen Standvogel handelt, so muß man ihn von seinem augenblicklichen Stand forttreiben, indem man ihn von Gebüsch zu Gebüsch treibt; ist es ein bodenständiger Vogel, so macht er diese Treiberei nur eine kurze Zeit mit und fliegt, an der Grenze seines Reviers angelangt, in einem Bogen zurück zu seinem vorher innegehabten Standplatz. Standvögel lassen sich auch mit Sicherheit leicht fangen, bei Durchzüglern ist es meistens Zufall, wenn sie futtersuchend zur Stelle des mit Mehlwürmern geköderten Schlagnetzes gelangen. Leider muß ich sagen, ist der Fang der Nachtigall ein zu leichter. Es wäre zu wünschen, daß das Gegenteil der Fall wäre, denn der wirkliche Nachtigallenliebhaber würde zu seiner „Auserkorenen" auch gelangen, wenn der Fang das größte Maß von Geduld und List erfordern würde. Bedauerlicherweise gelangen durch gewerbsmäßige Fänger viel mehr Nachtigallen in unberufene, jeglicher Erfahrung in der sachgemäßen Pflege entbehrende Hände. Für den gewissenhaften, wirklich wahren Vogelliebhaber äußerst bedauerlich.

Die Nachtigall hält mit Zähigkeit an ihrem Brutort fest. Dies einwandfrei festzustellen, hatte ich Gelegenheit durch meinerseits vorgenommene Beringungen mit „Rossittenringen". Auch als Jungvögel beringte wurden in späteren Jahren in der Nähe ihres Geburtsortes wieder gefangen. Ein Fall ist mir bekannt, daß ein von mir beringtes Nachtigallweibchen seit drei Jahren immer wieder in derselben Buschreihe gefangen wurde. Würden die gewerbsmäßigen Fänger in wohlweislicher Vorsicht nicht alle mit Fußringen gefangenen Vögel, gleich welcher Art, verheimlichen, so ergäben alle diesbezüglichen Mitteilungen einen wertvollen Beitrag zur Erforschung des Vogelzuges.

Der Fang der Nachtigall geschieht am besten gleich nach ihrer Ankunft, je eher, desto aussichtsreicher zeitiger Schlag im verhüllten Käfig. Für jeden Fall ist anzuraten, den Fang vorzunehmen, bevor die nachkommenden Weibchen da sind, deren Eintreffen, wenigstens der Hauptmasse, in der ersten Woche im Mai vor sich geht. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß nicht etwa einzelne Weibchen schon zeitiger eingetroffen sind. Mir sind Fälle bekannt, wo schon mit den ersten sich im Schlage bemerkbar machenden Männchen auch schon Weibchen gefangen wurden. Dies tut ja für den Kenner der Geschlechter der Nachtigallen weiter keinen Schaden, nur vermeide man noch Nachtigallen zu fangen und zu käfigen nach bereits erfolgter Paarung, die meistens kurz nach Ankunft der Weibchen erfolgt. Vielfach bleiben bereits gepaarte, daher zu spät gefangene Nachtigallen trotz Blankfütterung mit Mehlwürmern und Ablösung derselben mit frischen Puppen stumm. Die Nachteile einer derartigen späten Käfigung werde ich später noch eingehender beleuchten. Die hinreichend bekannte Neugier der Nachtigall wird derselben bei der Nachstellung zum Verhängnis. Sie kann auch dem zappelnden Mehlwurm nicht widerstehen. Mir sind Fälle bekannt, daß beringte Nachtigallen mehrmals hintereinander, wenn freigelassen, wieder ins Netz gingen, ja, ein Fall ist bekannt, wo eine Nachtigall in einem Zeitraum von einer halben Stunde zweimal von einem schlecht funktionierenden Schlaggarn beiseite geschleudert wurde und

gleich wieder ein drittes Mal den Wurm anging und sich fing. Bei der Zunft der gewerbsmäßigen Fänger wird diese unliebsame Erscheinung beim Fange, besonders wenn der Vogel von hinten an den Köder kommt, mit der Bezeichnung „die ist geprellt" abgetan, und nach ihrer „unantastbaren" Weisheit soll ein solcher geprellter Vogel niemals wieder in ein Netz gehen. Daß es Ausnahmen gibt, bezeichnet der vorstehend geschilderte, von einwandfreien Augenzeugen beobachtete Fall zur Genüge.

Die Geschlechter der Nachtigallen sind sehr schwer zu unterscheiden und wohl mancher Nichtkenner der Unterscheidungsmerkmale hat ein Weibchen mit seiner Pflege betreut. Das bescheiden gefärbte, schlichte Gefieder läßt keinerlei stichhaltige Kennzeichen zu, ebenso ist auch die vielfach zutreffende aufrechtere, stolze Haltung, der schlankere Hals und die längeren Füße des Männchens nicht jederzeit ein unfehlbares Zeichen, einzig und allein die im Frühjahr als „Steißzapfen" oder „Steiß" stark hervortretende Verlängerung des Afters gibt die Gewähr einer sicheren Geschlechtsbestimmung. Meistens trifft es ja zu, daß das Weibchen in allem gedrungener ist, weniger aufrecht steht, den Hals mehr eingezogen trägt, überhaupt erscheint das Gesamtbild der Form kürzer und gedrängter. Aber alles dies kann der Fänger nicht feststellen, wenn er den gefangenen Vogel aus dem Garne holt. Da bleibt ihm einzig und allein nur der „Zapfen" des Männchens, der im Frühjahr keinerlei Zweifel zuläßt, so stark entwickelt sind die Geschlechtsorgane zu dieser Zeit. Derjenige Liebhaber, der von der Bevorzugung Gebrauch machen und dies in Anbetracht des gesetzlichen Verbotes mit seinem Gewissen vereinbaren kann, sich die für seinen leeren Käfig so sehnsüchtig gewünschte Nachtigall selbst zu holen, wird gut tun, ehe er seine Auswahl trifft, die in die engere Wahl gezogenen Schläger eingehend abzuhören, um das „Ideal" unter den vielen begabten Künstlern ausfindig zu machen. „Verbotene Früchte schmecken bekanntlich immer am süßesten", und wer es nicht glauben oder verstehen will, lasse es sich von einem, der bereits auf dem „Vogelherd" gesessen hat, schildern, welche Reize dieses sonst harmlose Vergnügen birgt. Diese Zeilen sind nicht etwa geschrieben, um eine Anregung zur Gesetzesübertretung zu geben. Aber wehe dem, der einmal der Versuchung unterlag, sich selbst für seinen Käfig einen gefiederten Liebling zu fangen, er kommt nicht wieder los von dieser süßen Leidenschaft, denn der mit Zittern und klopfendem Herzen aus dem „Netzchen" genommene erste Gefangene brennt in seiner Hand und hinterläßt ein „Mal" in derselben, was immer wieder anfängt zu brennen, wenn ein Käfig an der Wand ihm verlassen, leer und öde entgegengrinst. „Fischefangen und Vogelstellen verdirbt so manchen Junggesellen", dieses volkstümliche Sprichwort wird nur zu oft Lügen gestraft. Denn hätte dieses Sprichwort in allen Fällen eine solche Auswirkung, dann wäre wohl der größte Teil, aber ich will ja keinem der verehrten Leser damit zu nahe treten, unter uns Vogelliebhabern verdorbene Menschen. Wie sieht es aber in Wirklichkeit aus mit allen diesen „Gelegenheitssündern". Ich habe sie alle, mit denen ich in nähere Berührung kam, und diese sind nicht wenige im lieben deutschen Vaterlande, mit als die aufrichtigsten, gemütvollsten, naturbegeistertsten Menschen kennen gelernt. Hoffentlich gelingt es, und der Wunsch aller wirklichen Vogelliebhaber geht in Erfüllung, daß derjenige, der sich für seine Liebhaberei einen Vogel fängt, dazu die gesetzliche Genehmigung erhält, damit es nicht jedermann gestattet ist, auf diese harmlosen Naturliebhaber mit Fingern zu zeigen.

Den Frischfang bringe man auf schnellstem Wege in den vorher bereits umhüllten, mit Futter resp. Mehlwürmern und Wasser versehenen Käfig, der selbstverständlich an seinen weiteren Standort schon vor Einsetzen des Wildlings placiert sein muß und während der Gesangszeit niemals eine Platzveränderung erhalten darf. Sehr zu empfehlen ist, dem Wildfang vor Einsetzen in den Käfig mit der Fingerspitze ein paar Tropfen Wasser auf die Schnabelspitze zu träufeln, denn ist der Durst gelöscht, wird der Frischfang leichter an die Mehlwürmer gehen. Sollte die bereits seit längerer Zeit gefangene Nachtigall mehrere Stunden gehungert haben und wird dieselbe erst gegen Abend vor dem Dunkelwerden nach Hause gebracht, so ist es, da der Vogel an diesem Tage nicht mehr fressen kann, unbedingt nötig, um den Vogel nicht hinfällig zu machen, daß er mit 6—10 Mehlwürmern gestopft wird, selbstverständlich dabei auch das „Tränken", wie vorstehend angeführt, nicht vergessen. Ferner ist bei frisch gefangenen Vögeln und speziell solchen, die in Säckchen nach Hause transportiert werden, darauf zu achten, daß durch den ausgeschiedenen Kot die Afterfedern nicht verkleben, ist dies der Fall, so reinige man mit Wasser die betr. Stelle. So unscheinbar dieser Hinweis ist, so sind mir doch manche Fälle bekannt, wo Liebhaber damit trübe Erfahrungen gemacht haben. Verkleben die Afterfedern, so sammelt sich der Kot im Mastdarm an, weil keine Entleerung erfolgen kann, der Vogel frißt nicht mehr, wird traurig und geht, wenn nicht Luft gemacht wird durch Abschneiden der verklebten Federn, nach einigen Tagen ein. Meiner Meinung nach wird wohl mancher Liebhaber bereits durch Unkenntnis dieses Übels Frischfänge eingebüßt haben, ohne daß er die wirkliche Ursache erkannt hatte. (Fortsetzung folgt.)

Meine Gebirgsloris.

Von Max Beyer, Berlin-Niederschönhausen.

(Nachdruck verboten.)

Eine interessante Gruppe in der großen Papageienfamilie bilden die Loris oder Pinselzüngler. Von diesen wurde früher der Lori von den blauen Bergen, kurz Gebirgslori genannt, am häufigsten eingeführt. Kräftig, ausdauernd und leicht zahm werdend, ist er in seiner grellbunten Farbenpracht und seinem drolligen Wesen ein rechter Volierenvogel. In seinem vielfarbigen glänzenden Gefieder läßt er uns die Wunder der tropischen Heimat ahnen. Eins hat er allerdings mit allen Loris gemeinsam ein schrilles Rufen und krächzendes Geschrei, wodurch er, wenn man ihn im kleinen Käfig im Zimmer hält, zart besaiteten Naturen lästig werden kann. Doch

ist sein Geschrei nicht so schlimm wie das einiger amerikanischer Sittiche. Den echten Papageienfreund ficht dies natürlich nicht an. Wenn meine Sittiche und Loris mal tüchtig „loslegten", daß es durch den ganzen Garten schallte, habe ich meine Freude daran, da ich in ihrem Lärmen den Ausdruck ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens erblicke.

Über die Zucht des Gebirgslori schreibt Dr. Ruß: „Nisten zu jeder Jahreszeit, zwei bis drei Bruten hintereinander. Gelege zwei Eier, einen Tag um den anderen. Brutdauer 23—26 Tage. Nach 50 bis 60 Tagen verlassen die Jungen das Nest." Das liest sich sehr schön, und ich sah schon in Gedanken . . . ach, was sah ich alles. Doch ich will nicht vorgreifen.

Mein erstes Paar Gebirgslori kaufte ich im Herbst 1905 bei Gustav Reiß, Berlin, für 35 Mk. Es waren damals große Transporte seltener Vögel aus Australien angekommen. Den Gebirgslori, sonst immer nur vereinzelt eingeführt, konnte man zu Dutzenden haben. Auch Gelbmantel- und Kapuzinerlori waren da. Als der Verkäufer mein Pärchen herausfing, machten sie einen Höllenlärm und bissen wütend um sich. Ich war froh, als ich dieselben erst in der Kiste hatte. Unterwegs immer wieder die bange Frage, wie die beiden Blauköpfe herausbekommen? Anfassen wollte ich sie auf keinen Fall, dazu hatten sie mir in der kurzen Zeit unserer Bekanntschaft zuviel Respekt eingeflößt. Es ging besser als ich dachte. Zu Hause kletterten beide ohne zögern in den für sie bereitgestellten Käfig. Ohne Scheu sitzen sie auf der Stange, dreist und selbstbewußt die Umgebung mit ihren lebhaften sprechenden Augen musternd und von einem bewundernden „Ah" meiner Angehörigen empfangen. Rä rä rä — rääääh erklang da die liebliche Stimme der Australier, „Oh" hieß es nun bei den Antipoden. Auch unser Dackel kam angewackelt und begrüßte die neuen Hausgenossen in seiner Muttersprache. Die blieben ihm die Antwort nicht schuldig, so entstand schließlich ein Terzett, welches an Kraft und Ausdruck nichts zu wünschen ließ, doch mit den Grundregeln der Harmonielehre nicht in Einklang zu bringen war. Ich hatte meine helle Freude an den rassigen Tieren. Doch als ich mich umwandte, um einige anerkennende Worte über meine Neuerwerbung zu hören, da waren wir allein im Zimmer, die Loris, der Dackel und ich.

Bald hatten sich die beiden eingewöhnt. Kein ängstliches Flattern und Toben im Käfig, wodurch oft größere Sittiche so lästig werden. Immer waren sie glatt, sauber und fidel und wurden von Tag zu Tag zahmer. Namentlich das Weibchen wurde schnell zutraulich. Am liebsten spielte es mit meiner Hand, die ich in den Käfig steckte. Dann kletterte es an den Fingern herum, oder legte sich auf den Rücken, ließ sich im Sande herumwälzen und begleitete alles mit leisem, angenehm klingendem Geplauder. Das Männchen war zurückhaltender, der Dreistigkeit seiner besseren Hälfte sah es mit großen Augen und offenem Schnabel zu und vergaß vor Staunen sogar das Schreien. Dem Spielen der Loris muß man immer wieder zuschauen. Wie ein Paar Straßenjungen balgen und wälzen sie sich im Sande herum. Allerliebst sah es aus, wenn beide mit einem Fuß an der Käfigdecke hingen, mit dem andern sich anfaßten und unter leisem Geplauder schaukelten. Ein andermal sitzen sie eng aneinander geschmiegt und krauen sich das Gefieder. Plötzlich richten sich beide kerzengerade auf und hauen mit den großen roten Schnäbeln unter mächtigem Geschrei aufeinander los — um im nächsten Augenblick in schönster Eintracht beieinander zu sitzen. Die Ernährung des Gebirgsloris ist nicht schwierig. Während

Gebirgslori.

sie in der Freiheit wohl hauptsächlich von Früchten und Blütensaft leben, gewöhnen sie sich in der Gefangenschaft leicht an Körnerfutter. Vom Händler waren meine Tiere schon an Spitzsaat gewöhnt, diese blieb auch bei mir ihre Hauptnahrung. Hierzu gab ich noch in kleinen Mengen Hanf, geschälten Hafer und Sonnenblumenkerne. Kolbenhirse wurde gern genommen. Täglich gab's noch eine kleine Portion Eierbrot und Sultaninen, aber nur so viel, daß es ein Leckerbissen blieb, sonst schmutzen die Loris stark. Die Sultaninen zogen sie jeder anderen Frucht vor, sie steckten die kleinen Rosinen mit dem Schnabel ins Wasser und schlürften den sich bildenden süßen Saft. Je nach der Jahreszeit wurde Vogelmiere, Gras- und Haferrispen, ganze Sonnenblumen-

köpfe, Weiden- und Obstzweige gereicht. Daß sie auch frische Ameisenpuppen gern nahmen, wurde mir erst bekannt, als ich diese den Zebrafinken, welche dieselbe Voliere bewohnten, als Aufzuchtfutter gab (Ges. Welt 1924, S. 300).

Schon im März kamen meine Loris in eine sechs Raummeter große Gartenvoliere. Diese war mit verschiedenem Gezweig, einem hohlen Baumstamme und Nistkasten ausgestattet. Die Loris waren über ihre Sommerwohnung sichtlich erfreut. Mit kurzem, knatterndem Flügelschlage durchflogen sie den Raum. Ruckartig klommen sie mit den kräftigen Füßen an den Zweigen empor, alles war Kraft und Leben an ihnen. Der Nistkasten erweckte gleich ihr Interesse und wurde bald des Abends als Schlafraum aufgesucht. Anfangs, wenn die Tauben vorüberflogen, oder wenn eine Drossel mit Gezeter die Voliere streifte, flogen die Loris erschreckt auf. Bald lernten sie ihre Umgebung kennen und unterscheiden. Wenn zum Beispiel der Haushahn sein bekanntes Warnen vor einem Raubvogel ertönen ließ, sausten die Loris wie ein geölter Blitz in ihren Kasten hinein. Dem Badewasser sprechen sie fast täglich zu. Mit hohen grotesken Sprüngen umtanzen beide den Badenapf, bis sie endlich hineinspringen. Wieder, immer wieder geht's hinein, sie wälzen sich förmlich in dem Wasser, bis sie unfähig zum Fliegen am Gitter emporklettern. Das prächtige bunte Gefieder hat dann eine schmutzig braune Farbe bekommen. Aber die Sonne trocknet schnell, und bald strahlt es wieder in neuer Pracht. Oft setzen sich die Loris, am Gitter hängend, dem tollsten Gewitterregen aus, flügelschlagend und kreischend vor Übermut und Lebenslust. Komme ich dann an die Voliere, drängen sich beide dicht ans Gitter, haben es furchtbar wichtig und erzählen mir in allen möglichen Tönen, was sie inzwischen erlebt haben. Natürlich wartete ich schon darauf, daß die Loris mit dem Nisten beginnen würden. Aber sie dachten nicht daran, obgleich ihnen ihre Landsleute das beste Beispiel gaben. Die Singsittiche in der Nachbarvoliere fütterten, bei Rosellas waren vier prächtige Jungen ausgeflogen, aber die Loris machten nicht mit, sie streikten. Jedenfalls waren sie noch zu jung. Im nächsten Jahre wurde es anders, da begann der Eiersegen. Es wurden in diesem und den folgenden Jahren viele Eier, teils mit, teils ohne Legenot produziert, gleich wieder aufgefressen, oder nach kurzer Bebrütung verlassen. Wenn das Weibchen brütete, übernachtete das Männchen in einem anderen Kasten. Obgleich ich bald einsah, daß ich von diesem Paare keine Nachzucht zu erwarten hatte, mochte ich sie nicht fortgeben, waren sie mir doch im Laufe der Jahre durch ihre rührende Anhänglichkeit liebe Freunde geworden. Sie kannten meinen Schritt. Ging ich abends im Dunkeln durch den Garten, dann meldeten sie sich in dem Schlafkasten, ich mußte ihnen dann erst ein freundliches Wort zurufen. Nachdem die Loris über sechs Jahre, Sommer und Winter in der Gartenvoliere gelebt hatten, ging das Weibchen an Legenot ein. Ich hatte schon öfter bei Legenoterkrankung nachhelfen müssen, indem ich eine in erwärmtes Olivenöl getauchte Federpose in die Legeröhre führte und das Ei aufstach. Da ich außer der Vogelhaltung noch eine kleine Nebenbeschäftigung habe, wurde die Krankheit übersehen und das Unglück war da.

Inzwischen war die Ausfuhr aus Australien verboten und die Loris seltener geworden. Durch Zufall entdeckte ich in einem Berliner Geschäft ein Pärchen Gebirgslori, die der Händler aber nur zusammen abgeben wollte. So gab ich denn mein Männchen ab, es ging schon am nächsten Tage mit einem Vogelfreunde nach Rußland. Später bedauerte ich, daß ich das Tier so schnell fortgegeben hatte, denn die beiden neuerworbenen Loris waren Weibchen. Das Geschlecht des Gebirgsloris ist am Gefieder nicht mit Sicherheit zu erkennen. Wohl ist bei manchen Weibchen das Rot an der Brust nicht weit ausgedehnt und die Brustseiten gelb, doch trifft dies nicht immer zu. Ein sicheres Unterscheidungsmerkmal fand ich bei meinen Tieren im Augenring. Dieser war beim Männchen rot bis dunkelrot, beim Weibchen orangerot. Bei den allerdings nur wenigen Exemplaren, die ich beobachten konnte, stimmte es stets.

Mein Vogelhaus.

Von Eduard Schütze.

(Nachdruck verboten.)

Von jeher ist es mein Bestreben gewesen, meinen Vögeln möglichst große, naturgemäß ausgestattete Räumlichkeiten zu bieten. Nachdem ich seit 1921 ein eigenes Haus mit einem großen Garten besitze, baute ich mir Freivolieren. Diese Freivolieren aus Holzgerüst, mit engmaschigem Drahtgeflecht bespannt, ein Drittel überdacht und ein Drittel offen, erfüllten ihren Zweck, doch gefiel mir das lästige, die Vögel ungemein störende Herausfangen im Herbst und Wiedereinwerfen im Frühjahr nicht. Astrilde und Amadinen im Winter im Freien zu lassen, ist hier nicht gut möglich, und so hatte ich mich seit längerer Zeit mit dem Gedanken befreundet, mir ein Vogelhaus zu bauen.

Im September v. J. wurde der Plan verwirklicht. Ursprünglich hatte ich vor, ein freistehendes Vogelhaus mit Spitzdach zu bauen, kam aber aus Billigkeitsgründen wieder davon ab, und baute das Haus nunmehr mit der Rückwand an das Wohnhaus resp. Stallgebäude mit schrägem Dach. Lage nach Osten, Eingangstür (2 : 1 m) von Süden. Die Außenwände sind 25 cm starke Hohlwände, und zwar ist ein halber Stein nach außen und ein hochkantiger Stein nach innen gemauert, so daß eine Luftschicht von 6 cm verbleibt. Diesem Hohlmauerwerk habe ich nach reiflichem Überlegen, und nachdem ich Erkundigungen eingezogen hatte, gegenüber dem vollsteinigen Mauerwerk den Vorzug gegeben, weil der Raum, infolge der Luftschicht, sich nicht so leicht abkühlt. Außerdem wird dadurch Material, spez. Ziegelsteine, gespart. Das Dach besteht aus Ziegelpfannen.

Das Haus zerfällt in zwei Teile, das eigentliche Vogelhaus mit dem Winterflugraum und den Sommerflugraum. Die Größe des Innenraumes ist 3,63 : 5,00 m, und ist dieser Raum, wie aus beigefügter Skizze (s. S. 135) ersichtlich ist, in vier Teile

geteilt, und zwar: zwei Volieren 2 : 2,50 m, eine Voliere 1,71 : 1,63 m und den Aufenthaltsraum von 3,30 : 1,63 m. In letzterem ist der Ofen, ein kleiner runder Tisch, zwei Korbsessel und ein Bort mit den Futtermitteln untergebracht. An der Rückwand haben einige Käfige für Vögel, die zur Beobachtung oder aus sonstigen Gründen vorübergehend einzeln gekäfigt werden müssen, Platz gefunden. Die Decke des Vogelhauses ist eine Holzbalkendecke, mit Torfoleum-Platten zur Wärmehaltung benagelt und verputzt. Die Seitenwände sind mit Kalkmörtel, dem etwas Portland-Zement zugesetzt ist, verputzt. Der Fußboden des Aufenthaltsraumes besteht aus Holzdielen auf Lagerhölzern, der wegen der besseren Übersichtlichkeit 30 cm höher liegende der Innenvolieren aus mit Zement ausgegossenem Backsteinpflaster. Die innere Höhe beträgt vom Fußboden des Aufenthaltsraumes bis zur Decke 2,62 m, vom Fußboden der Voliere bis zur Decke 30 cm weniger.

Die Trennwände der Winter- und Sommervolieren sind aus 7 : 7 cm starken gehobelten Kanthölzern mit dazwischen gespanntem, engmaschigem Drahtgeflecht gefertigt. Die 2,20 : 0,60 m großen Türen sind ebenfalls mit Draht bespannte Holzrahmen. Zur Fütterung ist in den Türen eine nach unten aufklappbare 30 : 48 cm große Klappe eingeordnet. Des genügenden Lichteinfalls wegen sind die zwei zu den Sommervolieren führenden zweiflügeligen Türen von je 1,20 : 2,00 m verglast. Diese Türen können im Sommer herausgehängt werden. Ferner befindet sich in der kleinen Voliere ein nach außen aufschlagbares, 1,90 : 0,95 m großes Blendrahmenfenster, und schließlich befindet sich in der Mitte über den zwei großen Volieren je ein zwölfpfanniges Dachfenster. Licht ist also in ausreichendem Maße vorhanden. Um ein Anfliegen der Vögel an die Scheiben zu verhüten, sind sämtliche Fenster, auch die zu dem Sommerflugraum führenden Glastüren, mit abnehmbarem, drahtbespanntem Holzrahmen gesichert.

Die Sommervoliere, 5,50 : 1,50 m, ist in zwei gleiche Teile von je 2,75 : 1,50 m eingeteilt. Jede Abteilung hat von außen eine besondere Tür, Größe 1,78 : 0,40 m. Die Trennwand besteht aus Drahtgeflecht. Die Außenwände der Sommervoliere sind, außer der mit Holz verhaltenen und mit Dachpappe benagelten Nordseite, mit starkem, verzinntem Drahtgeflecht und außen rundherum mit bequem abnehmbaren Glasrahmen versehen. Das Dach ist zu ein Drittel verschalt und mit Dachpappe benagelt, ein Drittel mit ebenfalls abnehmbaren Glasrahmen und ein Drittel offen. Um gegen Mäuse und sonstiges Ungeziefer genügend geschützt zu sein, sind die Fundamente der Außenvoliere 60 cm tief angelegt und mit Zement gemauert. In halber Höhe außerdem mit Backsteinen ausgepflastert und mit Zement ausgegossen. Darauf befindet sich eine etwa 30 cm hohe Sandschicht.

Vogelhaus des Herrn Schütze, Ehstrup.

Sämtliche Holzteile innen sind zweimal geölt, außen außerdem noch mit einem farblosen Lacküberzug versehen. Die Wände und die Decke des Vogelhauses sind zweimal mit Kalk gestrichen, dem eine Idee „Gelb" zugesetzt ist. Die Vögel heben sich bei dem Anstrich sehr gut ab. Die Heizung erfolgt mittels eines kleinen irischen Dauerbrenners. Verfeuert wird eine Mischung von Hüttenkoks und Anthrazit-Eiformbriketts. Das Feuer lasse ich abends ausgehen und morgens wieder anmachen und halte eine Durchschnittstemperatur von etwa 22° Celsius, die nachts um einige Grad fällt. Wegen des täglichen Feueranmachens gefällt mir diese Heizung allerdings nicht, und ich werde mir im nächsten Winter einen Anthrazit-Dauerbrandofen mit Füllkorb anschaffen.

Die zwei großen Volieren sind, wenn im Sommer die Verbindungstüren zu den Sommerflugräumen geöffnet sind, je 3,50 : 2,50 m groß. Sie sind, in den Ecken ziemlich dicht, mit Gesträuch (Birken, Eichen, Tannen) ausgestattet, natürlich ist reichlich Platz gelassen, damit die Vögel sich gehörig ausfliegen können. Das Futter wird auf 90 cm hohen, 40 : 40 cm großen Tischen verabreicht, und beim Füttern haben sich die schon erwähnten Futterklappen in den Volierentüren, die nach unten aufklappbar sind, als sehr praktisch erwiesen. Auf dem Volierenboden befindet sich eine etwa 3 cm hohe Sandschicht. Das Vogelhaus ist seit Ende Oktober v. J. besetzt, und zwar Voliere I mit je 1,1 tarantinischen Unzertrennlichen und grünbürzeligen Sperlingspapageien, ferner, meistens in Paaren, Spitzschwänze, Gouldsamadinen, Zebrafinken, Malabarfasänchen, Weißkopfnonnen, dottergelbe Zwergmasken- und Taha-Weber, Schnurrbärtchen, Königswitwen, Goldbrüstchen, Schmetterlingsfinken, Tigerfinken, Braunkopf- und Jamesons Amaranten, Granat-, Bunt-, Elfen- und Blau-Astrilde, Gays Ammerfinken, weinrote Kronfinken, 1,1 afrikanische Wachteln. Demnächst kommen noch hinzu 1,0 blauer, 0,1 blaublütiger Wellensittich.

Voliere II ist bevölkert mit je 1,1 orangeköpfige Unzertrennliche und mexikanische Sperlingspapageien, ferner, meistens in Paaren, Weißwangenamadinen, Rotrückenelsterchen, Bronzemännchen, Braunkopf-, Jamesons und kleine Amaranten, Bunt-, Granat-, Elfen-, Blau-, Zügel-, Grau-Astrilde, Helenafasänchen, Orangebäckchen, Tigerfinken, Clarksche Goldbrüstchen, Schönbürzel, Wachtelastrilde und 1,1 Orangepfäffchen. — Die kleine Voliere, die mit dem Sommerflugraum keine Verbinduug hat, ist besetzt mit: 2,2 Rußköpfchen, Zebrafinken, Elsterchen, Mossambikzeisigen, einigen Kanarien und einem Stieglitzhahn. Diese Voliere ist eigentlich für Rosenpapageien bestimmt, die man bekanntlich wegen ihrer Bissigkeit nicht mit anderen Vögeln zusammenhalten kann, doch werfe ich dieselben erst im Mai ein, nachdem ich die Rußköpfchen zu den Orangeköpfchen und mexikanischen Sperlingspapageien und die anderen Vögel auf den übrigen Volieren verteilt habe.

Von der Überwinterung der Astrilde und Amadinen im Freien bin ich ein entschiedener Gegner. Blauastrilde auf einer beschneiten Tanne ist ein Bild, für das ich mich nicht begeistern kann und meiner Ansicht nach direkt naturwidrig. Ich weiß sehr wohl, daß es wiederholt gelungen ist, selbst die empfindlichsten Arten in geschützten Freivolieren zu überwintern, doch bin ich für solche Versuche, die häufig mit dem Tode der Vögel enden, nicht zu haben. Irgendwelche Vorrichtungen, die den Vögeln einen Flug in den Außenflugraum auch im Winter gestatten, sind deshalb an meinem Vogelhause nicht angebracht.

Beim Entwurf des Vogelhauses machte sich ein Mangel an Zeichnungen und Beschreibungen derartiger Anlagen bemerkbar. Ich war somit ganz auf mich selbst angewiesen. Irgendwelche Mängel betr. der Einteilung, Einrichtung usw. haben sich bis jetzt nicht herausgestellt.

Dompfaffenzucht.

Von Amtmann Max Krumm.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Fast immer legt das Weibchen 6 Eier in unmittelbarer Folge, jeden Morgen eins; seltener wurden 4 oder 5 gelegt, nur einmal habe ich erlebt, daß im Legen ein Tag überschlagen wurde. Je mehr sich das Gelege der Vollständigkeit nähert, desto häufiger sitzt das Weibchen auf dem Nest. Nach Vollständigkeit des Geleges beginnt die eigentliche Brut. Nun sitzt das Weibchen fest und verläßt nur höchstens zweimal täglich das Nest, um Kot abzulegen und hastig irgend etwas zu genießen. Im übrigen füttert das Männchen das brütende Weibchen immer fleißig auf dem Nest. Ist der Ehemann nachlässig, so wird er mit einem eigenartig krächzenden Laut zum Füttern aufgefordert und gehorcht dann augenblicklich. Die Dompfaffenweibchen sitzen fester wie die Kanarienvögel. Das Weibchen läßt sich auf dem Nest ergreifen und setzt sich, wenn man es vom Nest jagen will, sogar heftig zur Wehr. Die Jungen kommen nach 12 bis 14 Tagen aus. Schon am 6. bis 8. Tage nach der letzten Eiablage kann man deutlich sehen, ob die Eier befruchtet sind, indem man sie gegen das Licht hält. Ist das durchscheinende Eidotter darin beweglich, so daß es nach oben steigt, so ist keine Befruchtung eingetreten. Ist das Ei aber nicht durchscheinend und durchziehen es dunkle Fäden, so ist es befruchtet. Zur Feststellung gehört aber Übung, man geht dann nicht fehl. Besser läßt man das Weibchen die Brutzeit über ungestört.

Bis hierhin werden alle Vogelliebhaber, die sich mit Dompfaffen befaßten, zu meinen Erfahrungen auch Stellung nehmen können, und ich möchte sogar sehr darum bitten.

Aber nun kommt mein seit langen Jahren angestrebter und endlich erzielter Erfolg, auf den ich darum besonders stolz bin, weil ich ihn mir systematisch, im allmählichen Aufbau eigener Beobachtungen errungen habe. Ich will, anschließend an das vorherige, meine Erlebnisse und Beobachtungen bei der letzten Dompfaffenzucht schildern. Den Nestbau und die Fütterungsweise, für die das vorher angegebene gilt, will ich dabei übergehen. Ich glaube, daß ich das Problem durch die Fütterung gerade der Lösung nahe gebracht habe und daß jeder es mir nachmachen kann. Auslernen tut man zwar nie. Manches meiner Beobachtungen mag nicht so allgemein Geltung haben, wie ich jetzt schon annehme. Es gibt vielleicht Dompfaffenpaare und Junge, die sich anders verhalten, als ich letztmalig erfuhr. Es wäre ja verfehlt, von Einzelerscheinungen, die namentlich die Aufzucht der Jungen aufweist, gleich feste Regeln abzuleiten. Der Austausch der Erlebnisse dient aber zum Ausgangspunkt weiterer Forschungen. So möchte ich meine Ausführungen aufgefaßt sehen.

Ich kann wirklich triumphierend dem Altmeister Schlag, wenn er noch lebt, zurufen: „Gimpel gezüchtet", mehr als ein Dutzend von einem Paar, wovon jetzt noch 7 leben. Zwar mag ein gleicher Erfolg schon häufig eingetreten sein. Soviel ich weiß, hat ihn aber niemand eingehend beschrieben.

Was ich hier schildere, vollzog sich in einem Käfig, der 1,40 m lang, 0,70 m breit und 1,05 m hoch ist

und auf einem Tische im Flur meiner Wohnung vor dem Fenster stand.

Der Dompfaffenhahn, der in diesem Jahre mehrfach glücklicher Vater geworden ist, war der einzige, den ich besaß. Er stammt aus einer Vogelhandlung und ist von der größten Spielart, die es gibt, ein sogenannter nordischer Gimpel — Pyrrhula pyrrhula *L.* (major) nach Brehm. Ob er jung aus dem Nest genommen ist, weiß ich nicht. Da er bei der Ankunft im Herbst schon ziemlich zahm war, ist wohl anzunehmen, daß er schon längere Zeit sich in Gefangenschaft befand. In der Herbstmauser vor der Brut war er einmal recht krank, so daß ich ihn aus dem kleinen Einzelkäfig herausnahm und ihn in der ersten Minute den Versuch, das pudelnasse Weibchen zu treten. Jedoch kam es zu keiner Begattung, weil das Weibchen, so naß, natürlich nicht mitmachte. Später änderte sich das Bild. Nach 3 Tagen trug das Kanarienweibchen eifrig zum Nestbau, baute ein Nest und lockte, wenn der Dompfaff in die Nähe kam, flehentlich zur Begattung, indem es die Begattungsstellung einnahm. Der Dompfaff aber kümmerte sich nicht darum, wich vielmehr dem Kanarienweibchen aus, wenn es ihm zu nahe kam. Gerade als ob er Abscheu vor ihr habe. Nur wenn ich mit dem Mund singend leise pfiff wie ein Kanarienvogel und das Weibchen sich darauf in Begattungsstellung begab, kam er träge



Grundriß- und Durchschnittszeichnungen zum Vogelhaus.

allein in den großen Heckkäfig setzte. Dort erholte er sich mit Ei und Mehlwürmern schnell und bildete, umsorgt mit allen Zutaten der Fütterung, ein prächtiges Gefieder.

Ich beabsichtigte zuerst, mit ihm Bastardzucht zu betreiben. Deren Verlauf möchte ich einfügen, wenn es auch nicht zum Thema gehört, weil der Gang der Dinge zusammenhängt. Zur rechten Zeit setzte ich zu ihm ein Kanarienweibchen das, von einem kleinen Züchter erworben, sehr schwächlich und wenig gut imstande war. Die beiden Tiere hatten sich, noch ehe ich die Kanarie einwarf, gelockt. Ich erwartete deshalb etwas Besonderes. Weil die Kanarie Ungeziefer hatte und nicht selbst badete, tauchte ich sie in's Wasser und setzte sie noch ziemlich naß zu dem Dompfaff. Dieser suchte sofort mit dem den Dompfaffen eigenen Liebesspiel sie zu umgarnen und machte, als das Weibchen schreckhaft auswich, schon herbei und machte dabei einigemal einen matten Versuch. Die Abneigung konnte ich ihm aber auch dann deutlich anmerken. Er war zu langsam. Das Weibchen harrte in seiner Stellung so lange aus, als ich pfiff; ich konnte so lange gar nicht pfeifen, als daß es was Ordentliches geworden wäre. Das Kanarienweibchen legte 5 Eier. Ich hoffte immer noch, daß die Eier befruchtet waren. Sie erwiesen sich jedoch, sobald die Zeit zur Feststellung herangekommen war, als taub. Ich gab die Hoffnung auf Bastardzucht mit dem Dompfaffen auf und setzte nun einen Zeisighahn hinzu. Das Kanarienweibchen baute gleich ein neues Nest. Ich schenkte diesem keine Beachtung, da ich glaubte, daß das Weibchen mit dem noch scheuen Zeisig (Frischfang vom letzten Winter) keine Gemeinschaft habe. Das Kanarienweibchen legte aber. Da erhielt ich, frisch zugesandt, ein Dompfaffenweibchen und tat es gleich zu den andern.

Es war eins von der kleinsten Spielart, wie sie hier in den Wäldern brütet, Pyrrhula pyrrhula europaea *Vieill.* (minor) nach Brehm. Das scheinbar noch junge Tier war fast schwarz im Gefieder. In gutem Ernährungszustand kam es aus Böhmen. Es schien auch ziemlich zahm, was es dadurch bewies, daß es, wenn ich den Finger durch die Stäbe steckte, darauf zuflog und hineinbiß. Sofort begann zwischen beiden Dompfaffen das Liebesspiel. Weil der Dompfaff in der Paarung und Brut keine anderen Vögel neben sich duldet, mußte ich das Zeisigmännchen herausnehmen. Dem brütenden Kanarienweibchen teilte ich zur Vorsicht mit Glasscheiben einen kleinen Raum ab, wo es mit dem Nest so eben noch Platz zur Futteraufnahme fand. Als ich kurze Zeit darauf nachsah, flog der inzwischen bösartig gewordene Dompfaffhahn immer gegen die abtrennende Scheibe, um das brütende Kanarienweibchen zu beißen. Ich verhüllte ihm nun die Aussicht durch übergeklebtes Papier. Trotzdem hat der Dompfaffhahn sich am nächsten Tage Zugang verschafft, und ich fand die Kanarie so zerbissen, daß sie kurz darauf starb. Die Eier des Kanarienweibchens nahm ich fort. Nun ging der Nestbau des Dompfaffenweibchens in Eile vor sich. Das Nest war schlecht, ich half nach. Jeden Tag wurde ein Ei gelegt, sehr große und kräftige. Ich war von vornherein nicht im Zweifel, daß die Eier befruchtet waren, da ich die Begattung mehrmals sah. Der Hahn fütterte das Weibchen auch schon während des Nestbaues mit wahrer Hingabe. Zu den 6 Dompfaffeneiern legte ich — mehr aus Spielerei — eins von den Eiern, die das tote Kanarienweibchen hinterlassen hatte. Am 13. Tage, nachdem sich das Gimpelweibchen gesetzt hatte, kam ein Junges aus dem Ei, nicht von den Dompfaffen, sondern wie sich auf den ersten Blick erwies, ein Kreuzungsprodukt, Zeisig×Kanarie. Am nächsten Tage schlüpfte ein Dompfaff aus dem Ei, an jedem Tage ein weiterer, so daß schließlich alle 7 Eier ausgekommen waren. Das Weibchen deckte die Brut und ging nur täglich einmal vom Nest. Der alte Dompfaff hat sich während dieser und der nachfolgenden Bruten als ein Muster von Ehegatte erwiesen. Er fütterte an den ersten Tagen nur das Weibchen, und dieses fütterte weiter an die Jungen, die dabei fast gar keine oder nur ganz leise Töne von sich gaben. Die jungen Dompfaffen waren kräftig. Mit ihren dicken Köpfen und nackt wirken sie bekanntlich unschön. Putzig nahm sich daneben der kleine Zeisigsprößling aus, der der krägelste von allen war, aber mit dem kleinen Köpfchen von den andern immer untergeduckt wurde. Ich konnte genau beobachten. Von der Fütterung des Weibchens durch das Männchen dauerte es immer erst einige Minuten, bis das Weibchen den Speisebrei weitergab. In der Auswahl der Nahrung verhielt sich der alte Dompfaff immer gleich. Er nahm mit Vorliebe Löwenzahn und reichlich frischen Samen von Vogelmiere, die ich in ein Wassergefäß stellte, um sie frisch zu erhalten. Dann nahm er aufgeweichten Negersamen und aufgeweichten Rübsen, etwas Weißes vom Ei, Mehlwürmer oder Ameisenpuppen reichlich und auch wohl trockenen Mohn. Das Eiweiß knabberte er immer rings unmittelbar an der Schale ab. Je mehr die Jungen heranwuchsen und sich befiederten, desto kürzer wurden selbstverständlich die Futterpausen. Der alte Herr hatte schließlich durchaus anstrengenden Dienst und war unermüdlich, so daß ich ihn bewundern mußte. Er war vom Morgengrauen bis zum Sonnenniedergang mit Futteraufnehmen beschäftigt und fütterte schließlich fast alle Viertelstunden und in noch kürzeren Pausen. Man konnte wahrnehmen, wie sich unter dem Schnabel seine Kehle von dem Futter aufblähte. Die Sorge für die Familie lag ihm allmählich immer mehr ob.

Innenansicht des Vogelhauses des Herrn Schütze, Eystrup.

(Fortsetzung folgt.)

Die Käfigung von Vögeln zum Zwecke der Vogelzugsforschung.

Von Dr. Rudolf Drost.
Vogelwarte der Staatl. Biolog. Anstalt Helgoland.

Beobachtungen an gekäfigten Vögeln sind, wie bekannt, bei der Behandlung des Themas „Ursachen des Vogelzugs" schon öfter herangezogen worden. Aus dem unruhigen Verhalten mancher Zugvögel

im Bauer zu der Zeit, in der ihre Artgenossen sich auf der Wanderung befinden, wird von vielen geschlossen, daß nicht äußere Einflüsse, wie Nahrungsmangel, Kälte usw., die Vögel zum Aufbruch bewegen, sondern daß allein der ihnen innewohnende Zugtrieb der Anlaß und die Ursache des Fortziehens seien. Diese Annahme wird aber von anderen Forschern bestritten, wie überhaupt noch manche Fragen der Vogelzugsforschung ihrer Klärung harren.

Doch nicht hiervon soll die Rede sein. Seit dem Sommer 1924 wird die Käfigung von Vögeln von der Vogelwarte Helgoland auf zwei andere Weisen der Zugforschung dienstbar gemacht.

Den Vogelzug kann man ja, kurz gesagt, auf zweierlei Art studieren, durch Beobachtung und durch das Experiment; oder auch durch Verknüpfung beider Methoden. Das gebräuchlichste Experiment ist die Beringung, die darin besteht, daß man Ringe aus leichtem Metall, meist Aluminium, auf denen der Name der Vogelwarte und eine laufende Nummer eingestanzt sind, den Vögeln um den Lauf legt. Wer diesen Versuch selbst machen und die Wissenschaft unterstützen will, kann auf Wunsch solche Ringe in beliebiger Anzahl, unter Umständen kostenlos, von der Vogelwarte Helgoland beziehen. Wie aber bekommt man die Vögel, die man markieren möchte, in die Hände? Die meisten Beringer suchen Nester auf und zeichnen die Jungen. Anders auf Helgoland. Die vielen Vögel, die zeitweilig die Insel bevölkern, sind alle erwachsene, die sich auf dem Zug befinden; es brüten hier in der Regel ja nur Star und Sperling, Lumme und Tordalk. Die Durchzügler müssen alle gefangen werden, entweder, wenn sie nachts gegen den Leuchtturm fliegen und wie Insekten an der Scheibe flattern oder bei Tage in der Sapskuhle, dem einzigarten Beobachtungs- und Fanggarten der Vogelwarte. Hier befinden sich verschiedene Fangvorrichtungeu Netze, usw., vor allem aber die von Weigold erbaute Trichterreuse, die in geradezu verblüffender Weise eine große Menge zu fangen gestattet. Besonders die Erdsänger, wie alle am Boden und im Gebüsch schlüpfenden Formen, lassen sich gut in die Reuse hineintreiben. Nicht aber die Finkenarten. Nähert man sich einem Finkenschwarm, so sucht er keine Deckung und bewegt sich nicht vor einem her von Strauch zu Strauch, sondern steigt sofort hoch in die Luft und fliegt davon. Will man Finken fangen, braucht man Lockvögel. — Wir haben jetzt eine ganze Vogelstube voll der verschiedensten Finkenarten. Je nach der Zugzeit der einzelnen Arten und ihrem Erscheinen auf Helgoland, wird bald der eine, bald der andere aus der Vogelstube herausgeholt. Ist z. B. an einem Tage starker Zug von Buchfinken, dann wird ein solcher in ein Lockbauer getan und in die Reuse hineingestellt; daneben wird Futter gestreut.

Innere Teilansicht des Vogelhauses des Herrn Schütze, Eystrup.

Auf diese Weise haben wir sehr guten Erfolg mit dem Finkenfang. Sind doch 1924 z. B. viel mehr Buchfinken auf Helgoland gefangen als sonst in ganzen zehn Jahren. Durch Lockvögel läßt sich auch die Zahl der gefangenen Drosseln sehr erhöhen. Ich konnte sogar beobachten, daß hoch über Helgoland hinziehende Amseln auf den Ruf unseres Käfigvogels hin ihren Zug unterbrachen, sofort in den Fanggarten und direkt in den Drosselbusch, wo der Käfig stand, hineinflogen.

In unserer Vogelstube befinden sich aber noch eine ganze Reihe anderer Arten. Da trippeln zwei Strandläufer — der isländische und der Alpenstrandläufer — seit Monaten umher; hier huscht ein Wachtelkönig, dort hinter dem Grasbüschel sitzt eine Wasserralle, und weiter hinten rennt, schwanzwippend, ein grünfüßiges Teichhuhn. Weshalb sind solche Arten gekäfigt? Welchem Zweck dienen sie? Die meisten sollen in erster Linie die andere Zugforschungsweise, die Beobachtung unterstützen. Vogelzug muß nicht nur tags mit dem Auge, nein, auch nachts, und dann besonders mit dem Ohr beob-

achtet werden. Wenn die nachts ziehenden Vögel aus der Dunkelheit in den Bereich heller Lichter kommen, lassen sehr viele von ihnen bekanntlich ihre Wanderrufe erschallen. So kann man sich auch in der Nacht ein Bild über den „Zug" machen, selbst wenn die Wanderer bei Mondschein oder Sternklarheit rasch und in großer Entfernung vorüberziehen. Vorbedingung ist natürlich, daß man die nächtlichen Stimmen kennt und weiß, wer das Rufen, Schreien, Flöten, Piepen, Krächzen usw. hervorbringt. Wenn auch der Vogelwart auf Helgoland die meisten Stimmen kennt, so gibt es doch noch den einen oder anderen unbekannten Ruf, und manche Deutung einer nächtlichen Vogelstimme, die nur einen Grad von Wahrscheinlichkeit besitzt, muß als richtig noch bewiesen werden. Der berühmte Gätke, der von 1837 bis 1897 auf Helgoland lebte und mit größtem Eifer ornithologischen Studien oblag, schreibt nach 50jähriger Beobachtung des Vogelzugs auf Helgoland: „Wie viel schnarrende, pfeifende und quäkende Stimmen hört man während solcher Nächte (in finsteren Herbstnächten) aus dem allgemeinen Wanderstrom herunterschallen, die jedem Jäger und Vogelfänger hier völlig unbekannt sind."

Daß die nächtlichen Rufe manchmal so schwer zu deuten sind, liegt mit daran, daß diese vielfach nur bei dieser Gelegenheit ausgestoßen werden. So kann es geschehen, daß man das Leben und Treiben, die Balz-, Lock- und Warnrufe eines Vogels gut kennt und doch nicht weiß, wie er auf dem Zuge ruft oder ob er stumm bleibt. Erschwerend wirkt es bei dem Versuch, unklare Rufe zu erkennen, daß einige Arten eine sehr ähnliche Stimme haben oder in der Lage sind, denselben Ton von sich geben zu können. Hier soll die Käfigung helfen. Von seinen Zöglingen hört man gelegentlich einen Laut, der einem bisher entgangen und der bisher geeignet ist, zur Klärung der Frage beizutragen. Zur Zugzeit muß man sie nachts und vor allen Dingen bei Vogelzug beobachten. Den isländischen Strandläufer habe ich nachts mit auf den Leuchtturm genommen, wo er auch als Lockvogel tätig war; denn andere kamen auf seinen Ruf herbei, einer sogar zu ihm auf die Galerie. Mehrmals habe ich ihn nachts in mein Schlafzimmer genommen. Das war außerordentlich praktisch für mich. Wenn ich sonst bei günstigem Wetter in Erwartung von Vogelzug öfters in der Nacht meine Weckuhr rufen lassen mußte, um gegebenenfalls nichts zu verpassen und starken Vogelzug zu verschlafen, so war das jetzt nicht mehr nötig. Bei Einsetzen des Zuges, wenn die Wanderrufe erschallten, fing auch der Strandläufer zu rufen an und weckte mich so jedesmal rechtzeitig. Das Interessante hierbei ist, daß er nicht nur rief, wenn Artgenossen zu hören waren; auch wenn andere Strandvögel, mit denen er sonst am Meeresstrand vergesellschaftet ist, vorbeizogen, machte er sich bemerkbar.

Daß unsere Vogelstube noch manche andere hübsche Beobachtung biologischer Art ermöglicht, ist klar, wie es auch keiner Erwähnung bedarf, daß sie nicht nur wissenschaftliche Ergebnisse bringt, sondern auch viel Freude macht.

Rotschwänze — Phoenicurus *(Forst.)*.

Eine Monographie von John Kuntzendorff.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der schwarzen Unterform äußerst nahe verwandt ist

Erithacus rufiventris pleskei *Schal.*

des Nan-Schan-Gebietes. An Gestalt und Färbung jenem gleich, unterscheidet er sich in den Größenausmaßen stark von ihm.

Das Verbreitungsgebiet des Erithacus rufiventris sind die Gebirge der südlichen Mongolei und Nordchinas sowie Kuku-Nor, Tibet und vermutlich der östliche Himalaja, von Sikkim ostwärts. Er überwintert im nordöstlichen Indien (Assam, Manipur). Der Vogel bezieht seine Winterquartiere regelmäßig Ende September bis zur ersten Woche des Oktobers. Er ist im ganzen Lande bis zum äußersten Süden der Halbinsel angetroffen worden, dagegen kommt er in Ceylon nicht vor. Vorzugsweise hält er sich in Laubwäldern, Obstgärten, Parks auf und ist in der Nachbarschaft alter Gebäude, Mauern und Häuser anzutreffen und oft auf Dächern beobachtet worden. Andererseits ist er ebensooft im Gebirge, sogar auch im Hochgebirge zu finden. Er führt mithin ganz die Lebensweise unseres Hausrotschwanzes. Seine Nahrung besteht aus Insekten, Würmern und dergleichen, die er, ebenso wie seine europäischen Verwandten, teils vom Boden oder von dem Laubwerk aufnimmt, teils gewandt im Fluge erhascht. In ihrer Bruttätigkeit gleichen sie den anderen Hausrotschänzen, die Eier sind weißlichblau ohne jede Zeichnung oder von derselben Farbe und fein braun gepunktet.

Von mir verpflegt wurde die dunkle Unterform phoenicuroides in einem Exemplar und beide Unterformen rufiventris auch in je einem Exemplar, und da phoenicuroides und rufiventris sich in ihrer Lebensweise, Wesen und Benehmen völlig gleichen, kann ich die an beiden gemachten Beobachtungen zusammenfassen und gemeinsam wiedergeben. Besondere Schwierigkeit bereitet die Eingewöhnung dieser Arten nicht, doch muß man sie immerhin sorgsam — wenn erhältlich — mit frischen Ameiseneiern, Mehlwürmern oder anderen Insekten an ein Ersatzfutter gewöhnen. Eine gute, von ihnen gern genommene Mischung ist zwei Teile Ameiseneier, ein Teil Muskа, je ein Drittel Teil Weißwurm, Garnelenschrot und geriebenes Eierbiskuit; dieses Futter wird mit geriebener, ausgepreßter Möhre vermengt und angefeuchtet. Bei diesem Futter, mit einer Zugabe von Mehlwürmern und — im Sommer — von frischen Ameiseneiern, gedeihen beide Arten Pagodenrotschwänze gut und überstehen auch gesund die Mauser, falls sonst die Pflege einwandfrei ist. Als Käfigvögel sind beide, trotzdem sie in gewisser Hinsicht etwas weichlich sind, zu empfehlen, da sie Munterkeit, Beweglichkeit besitzen und ihres interessanten Wesens halber sich die Zuneigung der Pfleger bald erwerben. Im Käfig ist er ein lebhafter, jedoch wiederum keineswegs übermäßig lebhafter und stürmischer Vogel, der nach Art der europäischen Rotschwänze eine Zeitlang ruhig auf seinem Platze sitzt und sich dann auch wieder gewandt in seinem Gebauer zu bewegen weiß. Aufrecht in Haltung und mit eleganten und geschmeidigen Be-

wegungen, weiß er selbst in wenn auch etwas geräumigeren Käfigen seine kleinen Flugübungen stets so auszuführen, daß nicht eine Feder lediert wird. Und was sie besonders wertvoll macht, ist, daß sie, auch frisch eingetroffen, nicht besonders scheu und stürmisch sind, Vorbedingungen zum schnellen gänzlich Zahmwerden. So dauert es in der Regel auch nicht lange, so legen sie ihr Mißtrauen dem Pfleger gegenüber ab, und bald hat man sie soweit zutraulich gemacht, daß sie diesem die Leckerbissen aus der Hand nehmen. Der Gesang ist, wenn er auch nichts Hervorragendes darstellt, doch in einzelnen Teilen ansprechend und erinnert an den des Gartenrotschwanzes. Das Badebedürfnis ist ein großes, meist wird dabei das Gefieder völlig durchnäßt. Die Schwanzbewegungen gleichen denen unserer einheimischen Rotschwänze und werden folgendermaßen ausgeführt: der Schwanz wird zuerst abwärts geschlagen, sodann aufwärts, worauf nach abermaligem Abwärtsbewegen das von den europäischen Rotschwänzen bekannte Schwanzzittern eintritt. Die Entfernungen der äußersten Bewegungspunkte nach unten wie oben sind gleich weit von der Normalstellung des Schwanzes entfernt. Meist werden diese Bewegungen mit geschlossenen Schwanzfedern ausgeführt, jedoch kommt es auch vor, daß diese gespreizt werden, aber stets nur bei den drei ersten Bewegungen; das Zittern wird immer mit geschlossenen Federn bewerkstelligt. Die Verbeugungen werden in gleicher Weise ausgeführt wie bei den einheimischen Rotschwänzen.

Besonders für eine Voliere eignen sich phoenicuroides und rufiventris, denn als Hauptvorzug bei dieser Haltung ist zu nennen, daß sie durchaus verträglich gegen andere Vögel sind; ob sie sich auch mit ihresgleichen vertragen, will ich dahingestellt sein lassen, da ich stets nur ein Exemplar der einen oder der anderen Art auf einmal im Flugraum hatte. Hier zeigten beide sich in ihrem Benehmen als echte Rotschwänze. Der Flug ist leicht, gewandt und schnell, längere Strecken — bei mir konnten sie bis zu 14 m mit nur einer Wendung durchfliegen — legt er wellenförmig zurück. Die Insektenjagd, der er besonders des Morgens und des Abends mit großem Eifer obliegt, vollführt er in der Art seiner hiesigen Verwandten, wobei er zu seinen Standorten stets Aussicht gewährende Plätze wählt und Mauervorsprünge und Felspartien bei weitem freistehenden Ästen und Zweigen vorzieht. Gebüsch und dichtes Gezweige meidet er. Auf den Boden kommt er fast nur zur Nahrungsaufnahme, hier bewegt er sich in kleinen Sprüngen vorwärts, niemals aber laufend. Morgens ist er einer der ersten, die den erwachenden

Mäusebussard und Ringeltaube (Text s. S. 140). Aufnahme des Zoologischen Gartens Berlin.

Tag begrüßen, abends einer der letzten, die bis in die Dämmerung hinein der Insektenjagd obliegen. Schnell und geräuschlos durcheilt er den Raum, unermüdlich seine Flugkünste beweisend. Seine Schlafstelle war in meinem Vogelhause stets in der Außenvoliere, gleichviel ob es stürmte und regnete oder es lind und warm war.

Vorstehende Ausführungen dürften sich auf alle bisher angeführten Rotschwänze beziehen lassen. Denn wenn bei phoenicuroides und rufiventris sich derartig ihre Wesensgleichheit beweisen lassen, so ist anzunehmen, daß dasselbe auch für ochruros und semirufa gilt, die von phoenicuroides gleich unterschiedlich sind, wie rufiventris von den letzteren und titys von ochruros. Und wie sich phoenicurus titys ähnelt, so dürfte sich auch Gesagtes bei der großen Ähnlichkeit, die alle zu phoenicurus gehörenden Arten aufweisen, gleichfalls auf diese ausdehnen lassen.

Nahe verwandt mit den Formenkreisen der europäischen Rotschwänze und der zu ihnen zu zählenden

asiatischen und afrikanischen Formen sind die Formen der kurzflügeligen Rotschwänze. Zwei Formenkreise sind diesen zuzuzählen, der des Erithacus auroreus und der des Erithacus diplootocus. (Forts. folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Freundschaft zwischen Mäusebussard und Ringeltaube. Ein merkwürdiges Vogelpaar erregt die Verwunderung der Besucher des Zoologischen Gartens, wenn ihr Weg sie an den Raubvogelkäfigen vorbeiführt. In dem Eckkäfig der Voliere für kleine Raubvögel sieht man einen Mäusebussard in friedlichem Einvernehmen mit einem Ringeltauber beieinander sitzen. Es geht über das Begriffsvermögen der meisten Menschen, daß die harmlose Taube nicht von dem gefährlichen Raubvogel, der unbedingt als schädlicher Hühnerhabicht bezeichnet würde, wenn der Name auf dem Schilde nicht eines anderen belehrte. Das Erstaunen wird noch größer, wenn die Ringeltaube nach lebhaftem Ruckfen den Bussard mit zärtlichen Anträgen verfolgt, bis er schließlich ängstlich an der Decke flattert und der Tauber siegreich das Feld behauptet. Der Ringeltauber hat durchaus die Oberhand in dem Käfig, ja er überläßt sogar dem Bussard nicht einmal neidlos sein Futter, sondern hat es sich auch angewöhnt, Fleischstückchen von der Bussardmahlzeit zu stehlen. Weil der Zoologische Garten zurzeit dem paarungslustigen Tauber keine passende Ringeltaube beigesellen kann, ist ihm eine Brieftaube als Gefährtin gegeben worden, die auch von dem Bussard nicht behelligt wird. Der Tauber wacht streng darüber, daß der Bussard seiner Gefährtin nicht zu nahe kommt, und treibt ihn mit Flügelschlägen und Schnabelhieben aus ihrer Nähe. Seit er begonnen hat, ein Nest zu bauen, muß der Bussard streng darauf bedacht sein, sein Revier einzuhalten. Der Mäusebussard und der Ringeltauber sind im vorigen Jahre auf einem Gutshof zusammen aufgezogen worden. Seit dem November vorigen Jahres gehören sie dem Tierbestand des Berliner Zoologischen Gartens an. Dr. F. Hauchecorne, Zoolog. Gart. Berlin.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 10. Ich möchte die in Bastardzucht erfahrenen Liebhaber bitten, mir auf nachstehende Fragen ihre Erfahrungen mitzuteilen. 1. Kann man 2 Hänflinge und 2 Kanarienweibchen in einem Käfig 60×40×80 cm hecken lassen. 2. Müssen die Hänflinge aufgezogene Tiere sein und wann ist die beste Zeit zum Zusammensetzen? 3. Wie groß soll der Käfig für einen Stieglitz und ein Kanarienweibchen sein und muß er unbedingt in der Sonne hängen? 4. Ist ein dreijähriger Stieglitz auch noch zur Zucht verwendbar oder muß es ein junger sein?

Jos. Wiener, Bärn (Mähren).

Auf Frage 7: Als alter Liebhaber ist mir das nächtliche Toben der Finkenvögel nicht recht klar. Vermutlich ist unter den Vögeln ein Frischfang, welcher nachts anfängt, unruhig zu werden und die anderen dann auch zum Toben veranlaßt oder es sind doch Milben vorhanden. Wahrscheinlich ist das erstere der Fall, daß eben noch nicht gut eingewöhnte Vögel darunter sind. Ich habe seit einem Menschenalter einen stets mit 10—12 Finkenvögeln bevölkerten Gesellschaftskäfig besetzt. Da ist es mir auch schon so gegangen. Wenn ich mal einen noch nicht gut eingewöhnten Vogel einsetzte, fing die ganze Gesellschaft zuweilen nachts zu Toben an, und es dauerte geraume Zeit, bis sie sich wieder beruhigten. K. K., Eiche.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender Joh. Birk in Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnitz, Merveldstr. 39; Kaufsvermittlung: Franz Nyncke, Berlin O, Königsberger Str. 17.

An unsere Mitglieder!

Zur Werbung der noch außerhalb unseres Verbandes stehenden Liebhaber ist beschlossen worden, Werbeplakate herstellen zu lassen, die in den Vogel- und Vogelfutterhandlungen zum Aushang kommen sollen. Wir ersuchen die Vorsitzenden der uns angeschlossenen Vereine und unsere Einzelmitglieder, bei den Vogelhändlern Umfrage zu halten, ob sie bereit sind, uns entgegenzukommen. Den sich hieraus ergebenden Bedarf an Plakaten bitten wir uns anzuzeigen.

J. A.: Rudolf Petters, 1. Schriftf.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

W. Ludwig, Dentist, Elsterberg i. V.: 1,1 Rotkopfamadinen. Pichler, Wien IV, Karolinengasse 25: Hahnschweifwidafink vor der Verfärbung.



Herrn St., Glogau; Herrn J. B., Leipzig; Herrn K. R., Bremen; Herrn M. G., Bln.-Karlshorst; Herrn F., Berlin S; Herrn K. B., Neukölln; Herrn M. Sch., Karlsruhe; Herrn K. K., Eiche; Herrn P. Sch., Leipzig; Herrn J. B., Leipzig-Mockau: Beiträge dankend erhalten.

Herrn E. M., Küllstedt, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn Reg.-Baumeister Sch., Stettin; Herrn P., Düsseldorf. Für Ihre freundliche Zusage besten Dank.

Herrn A. C., Berlin. An den Darmwänden waren Entzündungsherde vorhanden. Es ist wohl möglich, daß in dem Futter schädliche Stoffe vorhanden waren.

Herrn E. W., Gablonz. Die Schamadrossel erhält Nachtigallenfutter mit reichlich trockenen Ameisenpuppen, im Sommer dazu auch frische Ameisenpuppen, und da sie fast das ganze Jahr singt, täglich etwa 10—12 Mehlwürmer in drei Gaben; mit lebenden Insekten, etwas gemahlenem Hanf, magerem rohem kleingewiegtem Fleisch, kleingehacktem Hühnerei usw. wird die nötige Abwechslung im Futter herbeigeführt. Obst wird nicht gern genommen, wohl aber ab und zu Korinthen, Holunderbeeren und Stücke Sultaninen. Badebedürfnis ist groß. Mauser Juli—September meist August. Sonst im Drosselkäfig untergebracht, bedarf sie zur Züchtung weiteren Raumes von etwa 2 cbm Größe. Gewöhnlich erst heftige Befehdung des ♀, manchmal auch umgekehrt. Zum Schutz der Verfolgten kleine Versteckplätze aus Reisig u. dgl. Wenn ♂ das ♀ zu feurig verfolgt, wird ersteres zeitweise herausgenommen und im kleinen Käfig neben den Zuchtkäfig gesetzt. Ab und zu kommt es zum ♀, wird mit Mehlwurm in den kleinen Käfig gelockt. Nach erfolgter Paarung meist verträglich. Nest in flachen Kistchen, Nestkörbchen, offenen Harzer Bauern aus allerlei Halmen, Federn, Moos, Fäden usw. Gelege 4—6 Eier, vom ♀ in etwa 14 Tagen erbrütet. Junge verlassen 12 Tage alt das Nest, noch 3—4 Wochen von den Alten gefüttert. Wenn Junge verfolgt werden, sind sie herauszunehmen. Brutzeit Frühjahr und Sommer. Zur Aufzucht viel Insekten, frische Ameisenpuppen, kleine Regenwürmer, in einer mit feuchter Gartenerde gefüllten Schale zu reichen.

Herrn M. R., Forst. Wird versucht in einem der nächsten Hefte zu erledigen.

Herrn G. Z., Eisenwerk Pfeilhammer. Der geäußerte Wunsch ist kaum in der Allgemeinheit, wie geäußert, ausführbar. Wenn mir Vogelarten genannt werden, bin ich in jedem Fall gern bereit, gewünschte Auskunft zu geben. In den beiden kleinen Heften „Gefiederte Stubengenossen (I. heimische, II. fremdländische Vögel), die für wenige Pfennige erhältlich sind, finden Sie die gewünschte Auskunft gerade über die am häufigsten eingeführten und gehaltenen Arten.

Berichtigung.

In der Arbeit „Dampfaffenzucht" muß es auf Seite 106, rechte Spalte, Zeile 33 von oben heißen „gezogen" statt „getrocknete".

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

Jahrgang 54 19. März 1925 Heft 12

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Die Nachtigall. Von J. Birk, Leipzig. (Forts.)
Meine Gebirgsloris. Von Max Beyer, Berlin-Niederschönhausen.
Mein Vogelhaus. Von Eduard Schütze.
Dompfaffenzucht. Von Amtmann Max Krumm. (Forts.)
Die Käfigung von Vögeln zum Zwecke der Vogelzugsforschung. Von Dr. Rudolf Drost.
Rotschwänze — Phoenicurus (*Forst.*). Eine Monographie von John Kuntzendorff. (Forts.)
Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Ausstellung - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellung.

Die von dem **Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig** im Zusammengehen mit dem Naturkundlichen Heimatmuseum in Leipzig in den Tagen vom 19. bis einschl. 26. April 1925 zu veranstaltende Ausstellung einheimischer Vögel findet in den Räumen des genannten Museums, Fleischerplatz, statt. Der Weg zu den Ausstellungsräumen ist vom Hauptbahnhof in fünf Minuten zurückzulegen. Die Ausstellung bietet nicht nur Gelegenheit, sich vom derzeitigen Stande der Liebhaberei in Leipzig zu orientieren, sondern auch dem Laien und Wissenschaftler wertvolle Gelegenheit, sich an den reichen Schätzen unseres Heimatmuseums zu ergötzen. Eine Fülle von Sehenswürdigkeiten, die von Vergangenem und Gegenwärtigem sprechen, wird sich vor den Augen der Besucher auftun wie selten wo und in dieser glücklichen Zusammenstellung. Der Eintritt ist jedermann gestattet. Die Vormittagsstunden von 8 bis 12 Uhr in der Zeit vom 20. bis 24. April sind ausschließlich den Schulen und von auswärts kommenden Besuchern vorbehalten. In den Nachmittagsstunden von 12 bis 7 Uhr und an dem Sonnabend und den Sonntagen von 8 Uhr vormittags bis 7 Uhr abends hat jedermann Zutritt. Zur Deckung der Unkosten wird ein Eintrittsgeld von 20 Pf. pro erwachsene Person erhoben. Weitere Unkosten entstehen den Besuchern nicht.

Der Presseausschuß. J. A.: Vorwerk.

Der **Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Zwickau** beabsichtigt in der Zeit vom 17.—21. Mai d. J. eine Vogelausstellung zu veranstalten.

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. 1. Vors.: Hermann Höhne, Leipzig-Vo., Eisenbahnstraße 84 VI. 1. Schriftführer: Max Hunger, Leipzig, Inselstraße 17 II. — Tagesordnung zu der am 26. April 1925, vorm. 10 Uhr, stattfindenden Jahresversammlung des Landesverbandes der Vogelliebhaber. 1. Begrüßung; 2. Feststellung der Vertreter; 3. Verlesen des Protokolls; 4. Jahresbericht des Vorstandes; 5. Bericht des Kassierers und der Revisoren und Entlastung des Gesamtvorstandes; 6. Neuwahl des Gesamtvorstandes; 7. Haushaltsplan, Anträge hierzu und Festsetzung der Mitgliedsbeiträge; 8. Weitere Anträge; 9. Verschiedenes. Eventl. Anträge sind rechtzeitig einzureichen, damit dieselben zur Orientierung und Stellungnahme der Mitglieder an dieser Stelle veröffentlicht werden können. Der Begrüßungsabend, dessen Beginn auf 7 Uhr nachmittag festgesetzt worden ist, und die Jahresversammlung finden in dem 2 Minuten von der Vogelschau entfernten „Mathäser", einem bekannt guten Bier- und Speiselokale bayerischer Art, statt. Die als vorzüglich und preiswert bekannten Speisen und Getränke sowie mehrere bayerische Oberländlerkapellen werden für das leibliche und geistige Wohl unserer Gäste besorgt sein. Wir werden es uns angelegen sein lassen, unseren Gästen den Aufenthalt in Leipzig so angenehm wie möglich zu machen. Darum, Mitglieder, Freunde und Gönner, erscheint recht, recht zahlreich und helft uns, diesen Tag zu einem Markstein in der Geschichte der deutschen Vogelliebhaber zu gestalten.

Der Vorstand: J. A. Hunger, Schriftf.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen. Alle Vereine und Liebhaber, die unserem Verbande bereits angeschlossen sind, bitten wir an dieser Stelle nochmals, die restlichen Mitgliedsbeiträge unserem Kassierer Herrn Erich Merz, Berlin-Friedenau, Wilhelm-Hanff-Str. 14 II, umgehend einzusenden. Vereine und Liebhaber, tretet unserem Verbande bei und unterstützt unsere gute Sache. J. A.: Erich Merz.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden. J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

Angemeldet sind die Herren Heinrich Witte, Grohn-Vegesack, Friedrichsdorfer Str. 7; Dr. Karl Meyer, Würzburg, Leistenstr. 21; Frau Major Nikolay, Potsdam, Spandauer Str. 26 II. — Aufgenommen ist unter Mitgl.-Nr. 127n Frau Dr. Alice Fahrenhorst, Ludwigshafen a. Rh., Woehlerstr. 25. — Die Aufnahme unter Mtgl.-Nr. 102n aus Heft 7 ist rückgängig gemacht worden und die Nummer gestrichen. Der im Jahrbuch unter Nr. 399 aufgeführte Bestand gehört zu Nr. 398, was ich zu ändern bitte. — Ich möchte nochmals darauf hinweisen, daß dem Vorstand, insbesondere dem Schatzmeister, viel zeitraubende Arbeit erspart werden könnte, wenn bei allen Zuschriften, Zahlungen usw. die Mitgliednummer angeführt wird. Ich bitte die verehrl. Mitglieder, diese kleine Mühe nicht zu scheuen. A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen. J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal zum „Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.

J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurter Str. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

J. V.: Emil Ivo, Schriftführer.

Verein der Vogellieber Dortmund und Umgegend. Bericht vom 1. März 1925. Am 1. März 1925 morgens 8 Uhr begab sich unser Verein auf einen Beobachtungsspaziergang durch die städtischen Anlagen. Wider Erwartens ließ uns ein lachender Sonnenschein ein reiches Vogelleben erkennen. Aus dem nahen Garten grüßte uns eine Schwarzdrossel mit ihrem ersten Lockruf. Dazwischen wetteiferte der anmutige Schlag der Buchfinken. In einem Tannengebüsch machte uns Herr Sternkamp auf einige Blaumeisen aufmerksam, die in demselben munter herumturnten und ihre lustigen Weisen sangen. Durch einen in der Luft schwebenden Sperber wurden wir auf einen Flug Lerchen aufmerksam, die eiligst das Weite suchten. Herr Hornig zählte die Nistkästchen und entdeckte, das leider nur elf in diesem großen Stadtpark vorhanden sind. Bei dieser Gelegenheit sahen wir mehrere Feldsperlinge, die sich in den Baumkronen sonnten. Auf den Zwischenfeldern sammelten sich die Saatkrähen und rüsten sich zum Abzug. In ihrem glänzenden, tiefschwarzen Gefieder spiegelte sich die Sonne. Zu diesem gesellte sich ein Schwarm ebenso blitzender Stare. Über diesem hoch in der Luft krächzten mehrere Elstern. Auf dem Heimwege begleiteten uns mehrere Kohlmeisen mit ihrem Gesang, als wollten sie uns ein Lebwohl sagen. Sämtliche Mitglieder unseres Vereins waren sehr erfreut, ihre gefiederten Lieblinge so zahlreich wieder zu sehen. Hierauf gingen wir zu unserm neuen Vereinslokal, das sich ab 1. März bei Karl Röhr, Heiligerweg 28, befindet. Hier finden unsere Versammlungen zweimal im Monat, jeden 2. und 4. Sonntag nachmittags 5 Uhr, statt. — Liebhaber jederzeit herzlich willkommen. J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

(Fortsetzung auf der 8. Umschlagseite.)

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Rietschelhof", Rietschelstr. 19. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinslokal „Parkhotel", Epinaystr. 1, Versammlung. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an. Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 17. März 1925. Gäste, auch Exotenliebhaber, stets willkommen. J. A.: Arnold Weber, 1. Vors.

Die Vereinigung hannov. Vogelliebhaber will dem Vogelpfleger Ratgeber und Helfer sein, will die Liebe zum Tier und zur Natur wecken und stärken, will beitragen zum Kennenlernen der Vögel in Wald und Flur. Monatlich einmal kommen die Mitglieder zusammen, tauschen die Erfahrungen aus, hören Vorträge aus allen Gebieten der Vogelkunde, -schutz und -pflege an. Ein- oder zweimal im Jahre veranstalten wir große Lichtbilder- und Film-Abende. Im Frühjahr finden Beobachtungsausflüge unter Führung statt. Den Mitgliedern stehen zahlreiche Fachzeitschriften und Bücher kostenlos zur Verfügung. Regelmäßig berichtet die Zeitschrift nieders. Vereine über unsere Veranstaltungen. An den Vereinsabenden ist Rat und Auskunft, Kauf- und Tauschgelegenheit geboten. Jahresbeitrag Mk. 2,—, für Auswärtige und Schüler Mk. 1,—. Anmeldungen an Heinz Appel, Nienburgerstr. 7 A I. Auskunft: Buchhändler A. Troschütz, i. Fa. Cruses Buchhandlung, Gr. Agidienstr. 4. — 50. Mitgliederversammlung am 19. Febr. 1925. Anwesend waren 33 Personen. Neu aufgenommen wurden: Nr. 149 Grenacher, H., Dr. med.; Nr. 150 Behnke, W., Reisender; Nr 151 Krabbe, A., Fabrikbes.; Nr. 152 Harms, K., Konrektor; Nr. 153 Gervais, Kaufmann. Die Bearbeitung einer ganzen Reihe von Eingängen eröffnete den Abend. Wir freuen uns, den rührigen Leiter der A. Z., Herrn Krabbe, als neues Mitglied begrüßen zu können. Unsere, vom Mitglied Troschütz gestifteten, schönen Weigoldschen Werbekarten sind an viele Anschriften verschickt und werden auch unseren Mitgliedern zur Werbung zur Verfügung gestellt. — Alle Mitglieder werden gebeten, die noch fehlenden Angaben für die Vogelbestands- und Mitgliederliste schleunigst abzuliefern. — Es wird über die hohen Preise von Futter, vor allem von Ameisenpuppen, mit Recht geklagt. Eine Sammelvogelbestellung wird aufgegeben. — Als neues Mitglied tritt der Geschäftsführer des Vereins zur Erhaltung des Zoologischen Gartens, Herr Gervais, ein, der das Zusammenarbeiten seines Vereins mit unserem begrüßt, und der mit warmen Worten für unseren schönen Zoo und die Arbeit des Erhaltungsvereins für diesen wirbt, den die Firma Ruhe, Alfeld, zum schönsten und reichhaltigsten Deutschlands machen will. Er schildert, in welch vielseitiger Weise der Verein zur Erhaltung des Zoo die Leitung des Gartens unterstützt, welche Schenkungen er gemacht hat und welche Pläne der Ausführung harren. Eine Reihe unserer Mitglieder treten dem genannten Verein bei. — Der neuartige Heidelberger Vogelkäfig, der eine Reihe von Vorzügen aufweist, wird herumgezeigt und Musterkäfige werden bestellt. Dann hält unser Mitglied, Lehrer Ottens aus Eilvese, der beste Kenner der niedersächsischen Vogelwelt, einen gründlichen, fesselnden, fachkundigen Vortrag über „Aussterbende Vogelarten in Niedersachsen". Er schildert, wie durch die zunehmende Ödlandkultur, die Verwandlung der Bauernwälder in Forsten, durch unsere Siedlungen, Drahtzäune, Hochspannungsleitungen, Verbesserung der Fanggeräte und durch Sonntagsjäger die unberührte Natur ihre Urwüchsigkeit immer mehr verliert, und wie dadurch alles Getier, das im Menschen seinen natürlichen Feind sieht, zurückgedrängt, ausgerottet und in Unverstand abgeschossen wird. Er erwähnt dabei besonders, daß z. B. auf das Geheiß der Stadt Einbeck die dortigen Sonntagsjäger in wenigen Tagen sieben schöne Eulen abgeschossen haben, die angeblich durch unheimliches Rufen die Spaziergänger stören sollten. Am Schluß seines Vortrages empfiehlt er allen Naturfreunden, dringend dafür einzutreten, daß neben dem Naturschutzpark noch weitere Schutzgebiete in verschiedenen Teilen unserer Heimat geschaffen werden. Der Vorstand wird sich mit dieser Frage noch eingehend beschäftigen. Im Hauptteil seines Vortrages spricht er dann über alle die Vogelarten, die in Niedersachsen in den letzten Jahrzehnten als Brutvögel ganz oder fast völlig ausgerottet sind, oder deren baldiges Verschwinden zu befürchten ist. Es werden von ihm da aufgeführt: weißsterniges Blaukehlchen, schwarzköpfiger Wiesenschmätzer, Sperbergrasmücke, Kolkrabe, schwarzstirniger und rotköpfiger Würger, Wiedehopf, Blauracke, Eisvogel, Gabelweihe, Schrei-, Fisch- und Schlangenadler, Wander- und Baumfalke, Habicht, Wiesenweihe, Uhu, Sumpfohreule, Wachtel, die drei Wildhühnerarten, Kranich, Goldregenpfeifer, Waldwasserläufer, großer Brachvogel, Fischreiher, die beiden Rohrdommeln, die beiden Sorten Störche, Kormoran, die meisten Entenarten, bis auf Stock-, Krick- und Knäkente, Haubensteißfuß, Rothalstaucher. Appel.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Da die Heidelberger keinen Liebhaberverein haben, die wenigen wirklichen Liebhaber aber doch den Wunsch haben, zusammenzukommen, so haben sich die Liebhaber der Ortsgruppe Heidelberg, die alle dem Bund für Vogelschutz angehören, zu einer Sonderabteilung zusammengeschlossen und kamen auf Einladung von Professor Fehringer am Donnerstag, den 5. März, erstmals im Holländer Hof zusammen. Zwar war es nur ein kleines Häuflein Getreuer, das kam, aber es waren alles nur wirkliche Liebhaber und Vogelpfleger mit zum Teil recht guten Beständen. Da die Zahl der Heidelberger Liebhaber sich auf zirka 15 belaufen dürfte, wäre es angebracht, hierfür einen eigenen Verein ins Leben rufen zu wollen. Da ja Vogelschutz und -pflege unbedingt zusammengehören, ist die Zusammenkunft im Rahmen des bestehenden Bundes das einzig Gegebene. Der Abend war ausgefüllt mit einer zwanglosen Unterhaltung über das Wohl und Wehe unserer Stubenvögel. Wir brauchen kein Programm, keinen eigentlichen Vortrag, keine Statuten usw. Wir wollen uns gegenseitig aussprechen im gemütlichen Kreis und uns dabei wohl und behaglich fühlen. Möge jeder Heidelberger Vogelliebhaber es nicht versäumen, an jedem 1. Donnerstag im Monat im Holländer Hof zu erscheinen. Die sonstige Tätigkeit der Ortsgruppe ist eine äußerst rührige und ersprießliche. Von Zeit zu Zeit finden Vogelwanderungen statt, die im Frühjahr zu einer vielbesuchten Einrichtung geworden sind. Außerdem werden im Zusammenschluß mit anderen naturwissenschaftlichen Vereinigungen Vorträge, Filmdarbietungen und ähnliche Veranstaltungen abgehalten, in deren Mittelpunkt stets unser einheimisches Vogelleben steht. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögeln Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstraße. Paul Lohs, 1. Schriftführer.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden, Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. A. Voigt.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz und Umgegend. Vereinslokal „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jeden Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" und „Kanaria". Vogelliebhaber und Gäste sind stets willkommen. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst., Boppel, 1. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 19. März 1925. Gäste willkommen. M. Roth, Schriftf., L.-Plagwitz.

(Fortsetzung auf der 4. Umschlagseite.)

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinslokal: „Gosenschlößchen", Leipzig-Plagwitz. Sitzungen an jedem 1. und 3. Montag des Monats, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen.
Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung bei unserem Mitgliede Herrn Normast im Gasthof „Kaiser Friedrich", Breslauer Str. 50. Liebhaber sind als Gäste willkommen. J. A.: Friedrich.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wsl., Schenkendorfstr. 14.

Zusammenkunft der Magdeburger Liebhaber exotischer Vögel am Sonntag, den 22. März 1925, vorm. 10½ Uhr im Lokal „Alter Fritz", Berliner Str.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Tage im Restaurant zum Goldenen Falken Mitgliederversammlung. Nächste Versammlung am Freitag, dem 20. März 1925 und so fort. Freunde und Gönner stets willkommen.
J. V.: Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebendort. Rudolf Engel, 1. Schriftführer.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabende aller vier Wochen, in der ersten Woche des Monats verbunden mit Vortrag, in der dritten Woche jeden Monats nur gesellige Zusammenkunft. Vereinslokal „Sächsischer Hof". Gäste stets willkommen. — Einen Glanzpunkt der Vereinstätigkeit bildete die am 28. Februar im Sächs. Hof veranstaltete Mitgliederversammlung; weniger wegen des verhältnismäßig schwachen Besuches, als vielmehr wegen des Redners, den der erste Vorsitzende zu gewinnen sich mühte. Einen großer Liebe und tiefes Verständnis für die Natur besonders für die gefiederte Welt, bezeugenden Vortrag hielt der sicher nicht unbekannte Herr Lehrer Dörfel-Calbitz (Bezirk Leipzig), der schon manch schönen literarischen Beitrag geliefert hat, über: „Die Großtrappe, ein aussterbendes Naturdenkmal". Über alles, vom Federkleid bis zu den Schutzmaßnahmen, wußte geschätzter Naturfreund zu sprechen und die Hörer zu fesseln. Ein Genuß war es, ihm zu lauschen, immer wieder zu fühlen, welchen tiefen Sinn er für unsere Vogelwelt besitzt. Vielseitige Beziehungen zu Jägern, Großgrundbesitzern gaben dem Redner reiches und wertvolles Material an die Hand. Reicher Beifall wurde ihm zuteil, und herzlich dankte der Unterzeichnete seinem ehemaligen Seminaristen. Möchte dieser oder jener Verein, der gern mal einen Fremden hört, sich an diesen Herrn wenden! Hat er Zeit, so kommt er und bringt Freude in jedes Vogelliebhaberherz. Studienrat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zw

Käfige u. Gerätschaften

Vogel-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50. **Schlagnetze** f. kl. schädl. Vögel M. 2,30, f. gr. M. 2,50 u. 2,80. **Katalog gratis.** **J. Tannen, Gronau 58,** Westf. [429

Vertausche ein weißlack. Gestell-Aquarium, ca. 40 cm lg., 25 cm br., 30 cm hoch, mit Springbrunnen u. Abflußrohr, geg. ein Zuchtpaar gr. Wellensittiche mit Käfig, evtl. Singvögel. [430
E. Jugert, Stettin, Wallstr. 20.

Futtermittel

Züchter-Urteile:

Bin sehr zufrieden mit Ihrer „L. K.-Nahrung. Meine Vögel fressen dieselbe sehr gern und sind viel lebhafter bei dieser Fütterung. Die Hähne singen viel anhaltender, es herrscht ein regeres Leben in der ganzen Kolonne. Bitte höflich, mir weitere 6 Pfund „Lorenz' Kanarien-Nahrung" umgehend gegen Nachnahme zu senden."
Locherhof, 7. 3. 1925. J. Storz.

Ersuche um Zusendung von einem Postkolli „L. K.-Nahrung per Nachnahme. Es wollen nämlich auch Kollegen von mir Ihr Präparat ausprobieren, denen ich dasselbe bestens empfohlen habe. War mit Ihrem Futter immer sehr zufrieden und hoffe auch diesmal wieder gut bedient zu werden.
Ottmuth, 7. 3. 1925. Valentin Malorny.

Die Sendung Vögel, 4 Hähne und 6 Weibchen, sind am 3. d. Mts. tadellos munter hier angekommen und sangen die Hähne am gleichen Abend noch. Ich habe dieselben von einem alten Züchter abhören lassen und bezeichnet derselbe den Gesang als tadellos, auch mir gefallen dieselben gut. Doch dieses ist ein fachmännisches Urteil. Auch die Weibchen sind sehr kräftig. [431
Olsberg, Westf., 9. 3. 1925. Carl Schlüter.

Lorenz, Dresden
Drehgasse 5.

Die Originale obiger Zuschriften haben uns vorgelegen.
Die Schriftleitung der „Kanaria".

Züchterwaren

L. K.-Nahrung	½-Kilo-Paket	R.-M.	1,20
„	Postkolli inkl.	„	11,—
„	Probebeutel	„	0,80
Rübsen, Ia	½-Kilo-Paket	„	0,45
Glanz, Marokko, Ia	„	„	0,50
Hanf, Ia	„	„	0,35
Ital. Silberhirse, Ia	„	„	0,45
Mkl. Hirse, gelb, Ia	„	„	0,30
Leinsaat, Ia	„	„	0,45
Mischfutter, Ia	„	„	0,50
Negersaat, Ia	„	„	0,45
Salatsamen, weiß, Ia	„	„	1,50
Sonnenrosenkerne, gestr., Ia	„	„	0,35
Mohn, blau, Ia	„	„	0,70
Hafer, geschl., Ia	„	„	0,35
Finnisch. Ameiseneier, Ia	„	„	8,—
Holzwolle, Nr. 1, **weiß,** für 50 Nester ausreichend	„	„	0,50
„ Nr. 3	„	„	0,30
Piep	½/1-Packung	„	1,50
„	½ „	„	0,80
Piep Extra	1/1 „	„	1,—
„ „	½ „	„	0,50

Ein Posten **Futter-** und **Eiernäpfchen** aus Glas billigst.
Ein Posten **Drahtnester** und **Vorsatzgitter,** verzinkt, billigst.
Sepiaschalen billigst.
Vereinsbezug und Wiederverkäufer verlangen Spezialofferte. [432

Lorenz, Dresden, Drehgasse 5.

Vogelfutter [433

für **Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser.** Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Mehlwürmer Pfd. 5 ℳ, 6 Pfd. 30 ℳ frc. Nachn.
434] **Jeitner, Breslau,** Weinstr. 12.

435] **Mehlwürmer,** reine Ware, gegen Eins. von 1.75 ℳ ¼ Pfd. franko.
Th. Witte, Niederndodeleben b. Magd.

Mehlwurmkästen

leer, ca. 70 Stück, einzeln od. im ganzen zu verkaufen, auch gegen Futter oder Vögel zu vertauschen.
Kaulhack, Berlin-Friedenau,
436] Albestraße 15.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark ¼ Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co., Biesenthal I (Mark).** [437

Mehlwürmer

veget. gez., ¼ Liter franko gegen Vor-
438] einsendung von Mark 2.—.
Bonitas-Versand, Rostock i. M. 3.

Alfred Troschi

Buchhändler und Antiquar
Hannover, Große Aegidienstraße
Postscheck-Konto: Hannover 2
(Cruse's Buchhandlung).

Ein neues Meisterw der Ornithologie

erscheint in etwa 8 Woche

Brehms klassisches „Das Leben der Vö

das 1868 erschien und noch imme vielen Vogelfreunden gern gelesen ist heute naturgemäß in vielen P überholt.

Friedrich von Luca

der besonders durch seine Erfor des Vogelzuges weiten Kreisen b gewordene Ornithologe, schuf al gebnis jahrzehntelanger Untersuch über die Entwicklung der Vögel Gewohnheiten, ihre Flugkunst, Sprache und ihr Seelenleben unt rücksichtigung der umfangreichen S literatur eine neue Gesamtbiolog
Vogelwelt in seinem glänzen
geschriebenen Werke

Das Leben der Vö

Umfang ca. 30 Bogen Großoktav 139 Textillustrationen, meist Na nahmen, und 19 vielfarbigen T davon 10 in Farbenlichtdruck, 3 in druck, 6 in Vierfarbenbuchdruck. farbenprächtigem Schutzumschlag. a leinen gebunden im Schutzkar etwa 20 Mark. [

Bestellungen schon jetzt erbeten. zahlungen auf Wunsch nach Vereinb

Beschwerden wg Nichtzustellung der „ fiederten Welt" sind i zuständigen Postamt u zubringen.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Reunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 14
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 26. März 1925 | Heft 13

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Die Nachtigall.

Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Hat man den Frischfang in dem mit einem dünnen, noch genügend Licht durchlassenden Stoff verhängten Käfig untergebracht, lasse man ihm Ruhe und prüfe erst nach einigen Stunden, ob er bereits gefressen hat. Dieses zeigt sich sofort an, wenn sich die Nachtigall bereits öfters entleert hat. Viel sicherer geht man, wenn der Liebhaber, so wie ich, in den auf den Käfigboden zu stellenden Futternapf die lebenden Würmer vielleicht gegen 30 Stück, zählt. Ist die Gewähr vorhanden, daß die Beschaffenheit des Futternapfes kein Entkommen der Würmer zuläßt, so merkt man sofort, wenn Würmer fehlen. Hat der Frischfang auch nur einige genommen, so ist er gerettet. Bei Nachtigallen ist mir nur ein Fall bekannt, daß ich trotz Stopfens mit Mehlwürmern den Frischfang nicht zur Futterannahme bewegen konnte, und da er auch nach einigen Tagen immer noch nicht freiwillig an die Mehlwürmer ging, blieb mir nur noch die Freilassung dieses Widerspenstigen übrig. Für sehr empfehlenswert halte ich, wenn man zur Eingewöhnung die Mehlwürmer in einem hellen, am besten in einem weißen Porzellannapf reicht, denn der Vogel wird die Würmer dann im verhängten Käfig eher gewahr. Bei Glasnäpfen habe ich bei der Eingewöhnung von Frischfängen auch schon beobachtet, daß die Vögel sich auch bemühten, den Würmern durch die seitliche Glaswand beizukommen. Doch sind dies alles Nebensächlichkeiten bei der Eingewöhnung, gesagt soll nur sein, daß in der Hauptsache die Eingewöhnung des Nachtigallenfrischfanges keine allzu großen Schwierigkeiten bereitet, vorausgesetzt, daß man dabei sachgemäß verfährt.

Den Nachtigallenfrischfang füttere man die ersten Tage blank mit Mehlwürmern; täglich 80—100 Stück genügen. Vor kurzem las ich in einer Liebhaberzeitung eine Arbeit über „Eingewöhnung der Frischfänge" von einem ernst zu nehmenden, sehr bekannten Vogelliebhaber, daß er einem Nachtigallenfrischfang 200—250 Mehlwürmer reicht, aber fressen nun er sie nach meinen Beobachtungen und deren vieler hiesiger Liebhaber nie. Man hat in seiner Praxis schon manche Nachtigall eingewöhnt und mußte dabei feststellen, daß man dabei mit 80—100 Mehlwürmern genügend auskam, ja im Gegenteil, diese Menge haben meine Nachtigallen nur in den ersten Tagen bei der den Frischfängen eigenen Freßgier gebraucht, und die Verbrauchsmenge fiel dann von Tag zu Tag bis auf gegen 50 Stück. Mir war also eine Zahl von täglich einem viertel tausend Mehlwürmern für einen Nachtigallenfrischfang etwas Unbekanntes in meiner Praxis, trotzdem ich bei der Eingewöhnung stets auf dem Standpunkt stehe, daß ein Frischfang nicht die Würmer vorgezählt erhält, sondern soviel fressen kann, wie er will, und trotzdem ist bei mir noch keine Nachtigall über die von mir angegebene Menge hinausgekommen. Dieser Angelegenheit widme ich nicht etwa aus diesem Grunde, um Zweifel zu hegen an den Ausführungen des betreffenden Liebhabers, soviel Ausführlichkeit, sondern um bei Neulingen auf dem Gebiete der Eingewöhnung und Pflege der Nachtigall nicht falsche Meinungen aufkommen zu lassen. Würde dieses als stets maßgebend und nötig bei der Eingewöhnung der Nachtigall hingenommen, so wirkte es gewissermaßen abschreckend bei der Kostspieligkeit der großen Menge der täglich zu verbrauchenden Mehlwürmer, und mancher Vogelliebhaber müßte den Besitz einer Nachtigall als frommen Wunsch weiter bestehen lassen.

Nach einigen Tagen, nach stetiger Blankfütterung von Mehlwürmern, gehe man dazu über, den Frischfang an ein anderes Ersatzfutter zu gewöhnen, denn für die Dauer blank gefüttert, würden Mehlwürmer den Frischfängen nicht zusagen. Sind noch keine frischen Ameisenpuppen erhältlich, so kann man ruhig warten, bis welche kommen, denn meistens ist dies nur noch eine kurze Zeit, mit der Blankfütterung von Mehlwürmern fortzufahren. Schlägt die Nachtigall bereits, so bestehen gleich gar keine Bedenken. Sind frische Ameisenpuppen zur Hand, und dies ist meistens zur Zeit des Nachtigallenfanges der Fall, so zerschneide man einen Teil Mehlwürmer und mische dieselben nebst einer Anzahl lebender unter die Ameisenpuppen, und meistens dauert es nicht lange, geht der Frischfang von den lebenden auf die zerschnittenen Würmer und mit letzteren auch auf die diesen anhaftenden frischen Puppen über. Kann es ein Liebhaber ermöglichen, und dies ist von sehr

großem Vorteil, so füttere er seinen Nachtigallenfrischfang, indem er nach und nach die Mehlwürmer immer mehr verringert, letzten Endes nur noch blank mit frischen Ameisenpuppen. Dies ist eigentlich die einzig richtige sachgemäße Fütterung eines Nachtigallenfrischfanges. Doch muß gesagt werden, daß es, je nach der individuellen Veranlagung des Vogels, manchmal auch anders geht, indem man den Frischfang an ein Weichfuttergemisch gewöhnt, natürlich nur unter Hinzusetzung von einem reichlichen Teil frischer Ameisenpuppen und etwa 15—20 Mehlwürmern. Diese Fütterungsmethode führt aber nicht bei jedem Frischfang zum Erfolg, das heißt, der Vogel kommt nicht in den Schlag und wird dadurch ein Sorgenkind seines Pflegers, ebenso wie falsch gefütterte Frischfänge. Manche Liebhaber denken bei der Nachtigall als Frischfang nur mit Mischfutter und Mehlwürmern Erfolge zu erreichen, ist auch eine zu spät gefangene, bereits gepaarte, durch die geschlechtliche Befriedigung abgekühlte Nachtigall kaum noch zu bewegen zur Weiterentfaltung des Schlages im Käfig. Stumm gebliebene Nachtigallenfrischfänge erfordern viel Aufmerksamkeit des Pflegers, und das ganze Bestreben muß darauf konzentriert werden, einen solchen Vogel durch Blankfütterung mit frischen Puppen zu einem normalen Verlauf der ersten Käfigmauser zu bringen. Öfters kommt es vor, daß Nachtigallen, die sich als Frischfänge aus irgendeinem Grunde im Schweigen übten, gar nicht oder nur unvollkommen mausern, gewissermaßen in der Mauser stecken bleiben. Der unterbliebene Ausbruch des Schlages zeitigt im Organismus des Vogels Nachteile, die manchmal verderbenbringend auf das Wohlbefinden und Gedeihen sein können und sich verschiedenartig auswirken. Ebenso falsch ist die Meinung mancher Liebhaber, daß der Nachtigallenfrischfang, wenn er abgeschlagen hat, keine Blankfütterung mit frischen Puppen mehr benötigt, oder ein Frischfang, der gar nicht in den Schlag kommt, eben aus diesem Grunde nur mit Mischfutter gefüttert zu werden braucht. Nun gerade das Gegenteil ist der Fall, denn braucht ein schlagender Frischfang frische Puppen, um so dringender nötig hat sie ein schweigender Frischfang, wenn möglich, bis zur Vollendung der Mauser. Die gefährlichste Zeit für stumm gebliebene, daher nicht oder nur unvollkommen vermauserte Frischfänge ist die Zeit der kurzen Tage von November bis gegen Weihnachten hin, da zeigt es sich, daß ihr Organismus keine Widerstandsfähigkeit besitzt. Ist der Pfleger nicht mit einem Kennerblick gewappnet, der eine Oberflächlichkeit in der Pflege nicht zuläßt, so ist es meistens zu spät, wenn die Auszehrung auftritt, eine vorwiegend bei Nachtigallen in Erscheinung tretende Krankheit. Die Enthüllung des Frischfangkäfigs darf erst nach Absolvierung der Schlagzeit nach und nach vorgenommen werden, erst dann beginnt für den Liebhaber die Aufgabe, sich viel mit seinem Liebling zu beschäftigen, um eine möglichst weitgehende Zahmheit zu erreichen, denn zahme, vor dem Pfleger keinerlei Furcht zeigende Vögel sind erst das Ideal eines Stubenvogels. Die Nachtigall legt in ganz kurzer Zeit jegliche Scheu ab, abgesehen von einigen vorkommenden Individuen, die auch hierin unverbesserlich sind, versteht sie es, sich mit in die Reihe der auserkorenen Lieblinge des Pflegers einzufügen.

Der Gesang oder richtiger Schlag der Nachtigall findet, abgesehen vom Schlag eines guten Sprossers, in den Reihen der gefiederten Sänger keinen ebenbürtigen Konkurrenten, trotzdem unser deutscher Wald widerhallt von guten Vogelgesängen. Mögen sie alle, die hervorragendsten Vertreter unter den gefiederten Sängerfürsten, wie Mönchs-, Garten- und Sperbergrasmücke, Gelbspötter, Sumpfrohrsänger, Singdrossel, Feld- und Heidelerche, Rot- und Blaukehlchen, mit der nicht mehr übertrefflichen Vollkommenheit des Gesanges ihrer Art sich zum Sängerwettstreit im Heim des verwöhnten Gesangsliebhabers zusammenfinden, Siegerin wird sie stets und allezeit bleiben, die Sängerin der Nacht, unsere Nachtigall im schlichten Federkleide.

Fehlt dem Nachtigallenschlag auch die kräftige, tiefschallige, metallene Fülle der Stimme des Sprossers, ist ihr Schlag daher niemals, vom gleichen Gesichtspunkte betrachtet, mit dem des Sprossers abzuwägen, welchen von beiden die Siegespalme gebührt, so steht doch das eine fest für den Gesangskenner, daß beide Schläge gleich schön, aber jeder auch nach seiner Art zu bewerten ist. Sprosserschlag ist kein Nachtigallenschlag und umgekehrt dasselbe. Darum fort mit dem Streit um den Vorrang, jeder Gesang der beiden Arten hat seine markanten Eigentümlichkeiten in der Tonlage, Art und Weise des Vortrages, Vielseitigkeit und Abwechslung in den Touren, daß man von zwei scharf getrennten Vogelgesängen reden muß, die, jeder nach seiner Art, bezaubernd auf den mit Verständnis und Urteilsvermögen begabten, begeisterten Lauscher ihre Wirkung niemals verfehlen werden. Missen wollen wir keinen der beiden Vogelgesänge, denn einer kann den andern, und sei es auch der größte Künstler seiner Sippe, niemals ersetzen, weil es ebenso ist wie mit dem Kunstgesang im Konzertsaal. Die vollendetste Altstimme des Weibes wird sich niemals messen können mit dem tiefen Baß des Mannes, aber schön sind sie trotzdem beide und haben ihre begeisterten Verehrer und Anhänger. Ebenso verhält es sich mit Sprosser und Nachtigall, hier die tiefe, kräftige, dort die weiche, wehmutsvoll stimmende Stimme. (Fortsetzung folgt.)

Meine Gebirgsloris.

Von Max Beyer, Berlin-Niederschönhausen.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Die neuen Loris hatten beide orangerote Augenringe. Der Händler aber schwur hoch und heilig, es wäre ein richtiges Paar, er wüßte es von dem früheren Besitzer, der die Tiere selbst aus Indien mitgebracht hatte. So ließ ich mich überreden. Der eine Vogel war stärker, mit roter Brust, ohne eine Spur von Gelb an den Seiten und konnte als Männchen angesehen werden. Ich sollte mit meiner Augendiagnose doch recht behalten, es waren zwei Weibchen. Die Vögel waren nicht scheu, aber sehr bissig. Ich hatte dies nach den Erfahrungen mit dem ersten Paare nicht für möglich gehalten In meinen Volieren befindet sich das Futterbrett an

einer Seite, durch eine von außen zu öffnende Klappe stelle ich das Futter u. a. auf den Tisch. Hierdurch wird Zeit gespart und die Vögel werden nicht gestört. Machte ich nun die Klappe auf, so stürzten beide Loris unter Gezeter auf meine Hände, so daß ich oft von der Fütterung mit blutenden Fingern zurückkam. Ich gab den beiden Wüterichen Leckerbissen, redete stets ruhig und freundlich zu ihnen, es nützte alles nichts. Schließlich zog ich beim Futtern dicke Lederhandschuhe an, was die Tiere augenscheinlich noch mehr reizte. Sie waren dann oft mit Schnabel und Krallen so fest in dem Handschuh „verankert", daß ich sie förmlich abschütteln mußte, wobei sie manchmal etwas unsanft gegen das Drahtgitter prallten. Das machte den beiden aber nichts aus. Mit einem wahren Wutgeheul gingen sie wieder auf die Hände los. Der Klugere gibt nach, sagte ich mir dann, machte schleunigst die Klappe zu und suchte volle Deckung.

War das Gelege des ersten Paares mit zwei Eiern vollständig, so gab es jetzt immer eine doppelte Auflage. Der größere Vogel legte einen Tag um den anderen, das schwächere Weibchen legte sein zweites Ei erst am vierten Tage. Die Eier des ersteren waren etwas größer. Das stärkere Weibchen hatte vollständig die Rolle des Männchens übernommen, es fütterte das andere und häufig konnte ich Begattungen beobachten, kurz, man konnte glauben, ein richtiges Paar vor sich haben. Beide legten und brüteten gemeinsam in einem Kasten.

Endlich hatten meine Bemühungen, ein Männchen Gebirgslori zu erhalten, Erfolg. Herr Frank, München, hatte nicht zuviel versprochen. Ein schöner großer Vogel, ganz zahm, er ließ sich Köpfchen kraulen, gab Pfötchen und war früher an einer Kette gehalten. Einen Ring in S-Form trug er noch um den Fuß. Um den Vogel nicht zu ängstigen, ließ ich ihm vorläufig den Ring. Papageien haben oft für die erste Behandlung beim neuen Besitzer ein gutes Gedächtnis. Lange hatte ich überlegt, welches Weibchen ich dem Männchen geben sollte, und entschloß mich schließlich für den kleineren Vogel, da das größere Tier der Anführer und Oberbeißer war. Diesen gab ich an den Berliner Zoo ab. Wo es leider nicht lange lebte, es war in einem der bekannten Glaskäfige untergebracht und lag eines Morgens tot im Sande. Schade um den prächtigen Vogel. Ich hatte mich nicht getäuscht, der zurückbleibende Vogel dachte nicht mehr ans beißen, er ließ sich anfassen, spielte mit meiner Hand, kurz, er war so zahm und liebenswürdig wie seine Vorgänger. Diese Wandlung war so schnell vor sich gegangen, daß man kaum glaubte, denselben Vogel vor sich zu haben. Dem Männchen gegenüber aber war es eine richtige Xantippe. Der arme Kerl tat mir leid. Er durfte nicht in die Nähe des Weibchens kommen, nicht oben auf den Zweigen sitzen und nicht an den Futternapf, überall wurde er fortgebissen. Nur unten auf dem Volierenboden sitzen wurde ihm gnädigst gestattet. Ich war froh, als wieder mal eine Eiablage fällig war und das Weibchen auf einige Zeit im Kasten verschwand. Da das Männchen durch die dauernden Beißereien ganz verschüchtert war, erwartete ich noch keinen Zuchterfolg. Nachdem das Weibchen acht Tage gebrütet hatte, warf ich die Eier fort. Da sehe ich zu meinem Schrecken, daß ein Ei befruchtet ist. Das hatte ich nicht erwartet. Es waren keine Schmeicheleien, die ich mir da sagte, doch nun war es zu spät. Ich hoffte auf die folgende Brut, es sollte bei der Hoffnung bleiben. Die späteren Bruten gestalteten sich genau wie beim ersten Paare, die Gelege wurden nach kurzer Brutdauer verlassen, trotzdem die beiden sich nun einig waren und öfter eine Begattung stattfand.

Rotkopftimalie (s. S. 144).

Eines Tages höre ich ängstliches Schreien aus der Lorivoliere und sehe das Männchen mit dem Ringe im Maschendraht hängen. Kurz entschlossen schnitt ich mit der Schere den Draht durch, um dann den Ring vom Fuße zu lösen. Inzwischen versuchte das geängstigte Tier mit sichtlichem Erfolge meine in der Eile nicht geschützten Hände in „Hackepeter" zu verarbeiten. Beide Teile waren froh, als die Prozedur beendet war. — Dieses Paar war acht Jahre in meinem Besitz, ohne daß ich einen Zuchterfolg hatte. Die Zucht des Gebirgsloris ist durchaus nicht schwierig, es kommt nur darauf an, ein Paar zusammen zu stellen, das sich zur Zucht eignet. All unsere Mühe und Pflege ist sonst vergebens. So ist es auch mit anderen Vögeln. Oft hat ein Anfänger in der Liebhaberei, der zufällig ein gutes

Zuchtpaar erhält, Erfolge, auf die der erfahrene Züchter jahrelang wartet.

Sehr spaßig sieht es aus, wenn sich die Loris anfauchen. Sie stecken dabei die Zunge heraus, der vordere pinselartige Teil derselben wird ausgespreizt und die Luft kräftig durchgeblasen. Hierdurch wird jedenfalls die Zunge von anhaftenden Frucht- und Futterresten gesäubert. Wenn die Loris guter Laune sind, fauchen sie oft. Auch der Balztanz wird durch gegenseitiges Anfauchen und Hin- und Herwiegen des Körpers eingeleitet. Wie ich schon anführte, sind die Loris oft arge Schreihälse. Zwar schreibt Dr. Ruß: „Mit einem Stückchen süßer Frucht leicht zu beruhigen", doch kommt es ganz auf die Loris an. Meine dachten jedenfalls anders, sie nahmen wohl den Leckerbissen, warfen ihn fort und krakeelten lustig weiter. Unser alter Dackel war inzwischen in die ewigen Karnickeljagdgründe hinübergewechselt. Sein Nachfolger nun, ein kleines nervöses Kerlchen, bekam jedesmal, wenn die Loris loslegten, Schreikrämpfe. Es gab dann allemal eine Aufregung. Einer eilte zur Voliere, um mit einem Stückchen süßer Frucht ... (natürlich erfolglos), ein anderer in den Garten, wo der Zwergdackel auf dem Bauche lag und herzzerbrechend jaulte.

Während des Krieges hatte ich Gelegenheit, aus Rußland Hanf und Sonnenblumenkerne für meine Loris nach Hause zu senden, so daß sie diese Jahre gut überstanden. Durch das nicht immer einwandfreie Futter der Nachkriegszeit hatte sich beim Weibchen ein Darmleiden eingestellt, dem es nach einiger Zeit erlag. Die Unmöglichkeit einsehend, jetzt einen Ersatz zu beschaffen, gab ich das Männchen schweren Herzens einem Liebhaber, wo es noch heute mit einem Rotnackenlori zusammen lebt. Von der vielköpfigen Exotenschar, meist australischen Sittichen, die ich über 25 Jahre in Gartenvolieren pflegte, war der Gebirgslori mein besonderer Liebling, er gehörte mit zur Familie. Während aus Amerika und Afrika schon wieder bedeutende Mengen gefiedertes Volk hereinkommen, ist die Einfuhr aus Australien noch gering. Und was an Loris und Prachtsittichen (meine eigentliche Liebhaberei) zu uns kommt, hat Preise, die sich ein gewöhnlich Sterblicher nicht leisten kann. Für die amerikanischen Sittiche kann ich mich nicht begeistern. So bin ich denn dort wieder angelangt, wo ich vor einem Vierteljahrhundert anfing: bei den Wellensittichen.

Sie ist etwas Eigenartiges, unsere Liebe zu den schönen Tropenkindern. Wieviel Freude bringen sie uns, wieviel Wünsche wecken sie in uns und wieviel Hoffnungen lassen sie uns oft begraben. —

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Im Jahre 1904 gelangte in den Berliner Zoologischen Garten in drei Exemplaren die hübsche kleine

Meisentimalie — Yuhina nigrimentum *Hodgs.*,

welche auf S. 121 abgebildet ist. In einzelnen Stücken gelangte sie dann noch in der Vorkriegszeit auf den Vogelmarkt, und im letzten indischen Transport Aug. Fockelmanns war sie wieder in einigen wenigen Stücken vertreten. Der kleine gewandte Vogel lebt in dem niedrigen schattigen Baumwuchs in den wilden Hochlandsgebieten des Himalaja. Kahle und wenig dicht belaubte Bäume meidet er. In kleinen Flügen streifen sie umher, wobei sie ihren schwachen einförmigen Gesang hören lassen. Ihre Nahrung bildet das weiche Fleisch von Beeren und Früchten und kleine Insekten. Vom Boden scheinen sie keinerlei Nahrung aufzunehmen. Von Insekten bevorzugen sie solche, welche in großen tiefen Blütenkelchen leben. Mit ihren starken Füßen hängen sie sich meisenartig an die Blüten und tauchen mit dem Kopf in die Kelche, um die darin hausenden Insekten zu erbeuten. Bei dieser Jagd bleibt häufig Blütenstaub an den Kopffedern haften, mit dem sie andere Blüten befruchten, wenn sie an diesen der Insektenjagd nachgehen. Diese Jagd wird ihnen erleichtert durch die tief gespaltene, pinselartig zerfaserte und mit kleinen Borsten besetzte Zunge, die ähnlich gebaut ist wie die der Honigfresser. Die Verdauungsorgane der Meisentimalie deuten darauf hin, daß sie sich von leichtverdaulichen Stoffen nährt, die naturgemäß dann auch in größeren Mengen aufgenommen werden müssen. „Ihre Därme", so berichtet Hodgson, „sind ungefähr gleich der Länge des Vogels, von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze gemessen. Sie sind an ihrem unteren Ende mit körnigen Gebilden bedeckt, und der Durchmesser der Därme ist ungefähr überall der gleiche. Die Wände des Muskelmagens sind von geringer gleichmäßiger Dicke. Die innere Magenhaut ist wenig gefurcht."

In der Gefangenschaft werden sie hauptsächlich Beeren und Früchte, wie sie die Jahreszeit bietet, verzehren, daneben aber auch ein gutes Futtergemisch, wie man es zarten Insektenfressern reicht. Gaben von rohem Eigelb mit Honig gemischt werden gern von ihnen genommen, auch allerlei kleine Insekten und Würmer.

Verbreitung: Östliches Himalajagebiet, Nayaberge, Manipur bis ins westliche China.

Gefiederbeschreibung: Die Federn der häufig aufgerichteten und niedergelegten Spitzhaube schwarz mit schmalen weißlichen Säumen; Hinterkopf, Nacken, Obrgegend aschgrau, Wangen, Kehle weiß; Zügel, kleiner Fleck am Grunde des Unterschnabels, Kinn schwarz; oberseits dunkel olivbraun, am Oberrücken ins Aschgraue gehend; übrige Unterseite hellgelblich braun, Brustseiten aschgrau verwaschen; kleine Flügeldecken wie oberseits, übrige Flügelfedern düster braun, etwas heller gerandet, ebenso Schwanz, olivbraun gerandet. Schnabel dunkel hornfarben, unten rot; Auge braun; Fuß rötlichgelb. Lg. 102 mm.

Eine andere kleine Timalie, die im Jahre 191[illegible] schon einmal in einem Stück eingeführt wurde, ist die auf S. 143 abgebildete

Braunscheiteltimalie — Stachyridopsis ruficeps (*Blyth*)

deren Verbreitungsgebiet sich über das östliche Himalajagebiet durch China bis nach Formosa und Hainan erstreckt. Das 1914 eingeführte Stück gelangte in den Besitz des Herrn Kuntzendorff. Es war ein ungemein lebhafter neugieriger Vogel, der bei seinen häherlingartigen Umherspringen unablässig den Beschauer, der vor seinem Käfig steht, beobachtete. Des Nachts ruhte er am Käfiggitter hängend. Als Futter wurde ein Gemisch gereicht, wie es für zarte Insektenfresser (Goldhähnchen) üblich ist. In den erste

Tagen nahm er dieses Gemisch nicht an, sondern verzehrte nur Ameisenpuppen und Mehlwürmer. Der Gesang war wohlklingend, hatte oft wiederholte klare volle Töne, die mit piepsenden Tönen, welche an die Rufe eines Haushuhnkükens erinnerten, wechselten.

Eine größere Anzahl dieser interessanten Vögel brachte der letzte Import Aug. Fockelmanns. In den indischen Transportkäfigen war merkwürdigerweise immer eine Braunscheiteltimalie mit einer rostbäuchigen Zwergtimalie untergebracht, die weiter unten besprochen wird. Anscheinend hielt man sie für Männchen und Weibchen derselben Art.

Nach Jerdon lebt der Vogel in kleinen Flügen auf hohen Bäumen, auf denen er die Blätter nach kleinen Kerfen absucht. Er lebt in hochgelegenen Gebieten wie auch in tiefer liegenden nach Brookes nur, wenn sie mit Pflanzenwuchs dicht bestanden sind. Sein Gesang wird, von demselben Beobachter, als ein angenehmes Geflüster in tiefer Tonlage bezeichnet. Das Nest, ein großer umfangreicher Bau, steht im Bambusdschungel. Es ist zwischen sechs oder mehr Schößlingen oder Zweigen von Schlingpflanzen fast ausschließlich aus trockenen Bambusblättern erbaut, die ziemlich lose ineinander verflochten sind. Auch die innere Mulde ist mit Bambusblättern ausgelegt. Die Form des Nestes ist napfförmig, aber der obere Rand ist etwas eingezogen, der obere Durchmesser also geringer als der Durchmesser der Höhlung, zuweilen ist es auch überbaut. Es steht ungefähr 1,50—2 m über dem Boden. Die Brutzeit fällt in die Monate April bis Juni. Das Gelege besteht aus vier bräunlichweißen braun und rötlichbraun gefleckten Eiern (17,5 × 13 mm).

Gefiederbeschreibung: Oberseits olivbraun, bald mehr ins Olivfarbene, bald mehr ins Braune gehend; Oberkopf leuchtend rotbraun, Nacken rotbraun verwaschen; Stirnfedern mit schwachen schwärzlichen Schaftstrichen; Zügel, Augenbrauenstrich hellgelblich; Kopfseiten, Unterseite hellgelb; Ohrdecken leicht olivbräunlich verwaschen; im Vorderhals schwache Andeutungen von schwärzlichen Schaftstrichen; kleine Flügeldecken wie Oberseite, übrige Schwingen braun mit gelblichen Säumen, ebenso Schwanzfedern; Unterflügel weiß, gelblich überhaucht; Schnabel horngrau, unten rötlich; Auge bräunlichgelb; Füße gelbbräunlich; Lg. 111,7 mm.

Eine Neueinführung Fockelmanns ist die oben abgebildete

Rostbäuchige Zwergtimalie — Dumetia hyperythra (*Frankl.*),

ein außerordentlich lebhafter Vogel, der mit fächerartig gebreitetem Schwanz hurtig im Käfig von Zweig zu Zweig schwebt. Er erinnert auch in der Farbe wie in der ganzen Erscheinung an die Augenbrauenhäherdrossel, von der er als eine allerdings sehr kleine Miniaturausgabe erscheint. Auch Oates, der den Vogel in der Freiheit beobachtete, ist der Ansicht, daß sein Wesen an das mancher Häherdrosseln erinnere. Seine Stimme ist nicht laut, der Gesang ein ziemlich leises zwitscherndes Geplauder in tiefer Tonlage. Er lebt in tieferen Lagen im Dschungel wie im Buschwald, auch in Hecken und Pflanzungen. Da er möglichst dichtes Gebusch bevorzugt, ist es schwierig, ihn zu beobachten. Im Magen erlegter Stücke fand man Reste von allerlei Insekten, die er sowohl vom Boden aufnimmt wie auch vom Gebüsch, das er in kleinen Flügen von 4—6 Vögeln emsig durchstreift. Das kugelförmige Nest steht zuweilen auf dem Boden in trockenen Blättern, von denen einige, zuweilen auch sehr viele, so daß diese fast den Hauptbestandteil des Nistmaterials bilden, mit eingebaut werden, zuweilen steht es im trockenen Gras oder in einem kleinen Gebüsch, etwa 25—50 cm über dem Boden. Gern wird es in das Wurzelwerk der Bambusstauden gebaut, es wird auch zwischen Bambusstauden in angegebener Höhe gefunden. Als Nistmaterial dienen breite Gras- und Bambusblätter. Das Nest ist ein ziemlich fester Bau, das Baumaterial gut miteinander verbunden. Der Eingang zum Nest befindet sich

Rostbäuchige Zwergtimalie (s. unten).

an der Seite. Das Innere wird mit zarten Wurzeln, zuweilen auch einigen Haaren ausgelegt. Das Gelege besteht aus 3—4 weißen, fein rotbraun gesprenkelten Eiern. Die wenig scharf begrenzten Sprenkel häufen sich am dickeren Ende (16,7 × 13,25 mm). Die Brutzeit sind die Monate Juni bis September. Die Verbreitung erstreckt sich über den Westen der indischen Halbinsel und Ceylon.

Gefiederbeschreibung: Oberseits ein ins Aschgraue gehendes Olivbraun; auf dem Bürzel etwas ins Rostfarbene ziehend; Rücken und Schulter mit dunkleren Schaftstrichen; die ziemlich starren Federn am vorderen Teil des Oberkopfes rostfarben mit schwärzlichen Schaftstrichen; Zügel, Umgebung des Auges weißlich; Kopfseiten, Ohrdecken, Unterseite gelblichrostfarben; an Wangen und Kehle lebhafter und mit hellen Schaftstrichen, ebenso die Ohrdecken; Flügeldecken wie Oberseite, größere und Schwingen heller braun; Unterflügeldecken wie Brust; Schwanzfedern graubraun mit dunklen Querbändern unter gewissem Lichteinfall; Auge hellbraun; Schnabel gelblich hornfarben, ebenso die Füße. Lg. 140, Fl. 55, Schw. 60 mm.

Diese kleinen Timalien, etwa von der Größe eines Laubsängers, bedürfen sorgsamster Pflege und eines guten Insektenfresserfutters, wie auch die vor-

hergehenden Arten. Es sind sehr dauerhafte Vögel, die auch mit den verwandten Arten anscheinend verträglich sind. Beigaben von allerlei lebenden Insekten sind notwendig. (Fortsetzung folgt.)

Dompfaffenzucht.

Von Amtmann Max Krumm.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Vom 6. Tage ab bekamen die Dompfaffen eine laute Stimme und schrieen bei der Fütterung immer lauter. Wenn ich allein bei dem Käfig stand, genierte sich der Alte nicht. Wenn aber jemand Fremdes zugegen war, war der Alte stutzig. Beide Alten liebten ihre Brut außerordentlich und verteidigten sie. Setzte ich Futter ein, so biß der Hahn, auch aus größerer Entfernung mit einem Satz herzufliegend, mich in die Finger und hing sich sogar daran fest, so daß ich ihn hätte daran herausziehen können. Ebenso machte es das Weibchen, wenn es gerade nicht auf dem Neste war. Ich brauchte nur den Finger ins Gitter zu halten, so flogen manchmal beide Alten fauchend herzu, um zu beißen. Diejenigen Jungen, die den Kopf am höchsten hoben und am meisten schrieen, wurden zuerst gefüttert. Ich sah genau, wie der Speisebrei beim Füttern der Jungen einfloß. War es zuviel, so nahm der Alte wieder etwas aus dem offenstehenden Schnäbelchen heraus. Am Schnabel der Jungen hängende Speisereste wurden vorsichtig weggepickt. Nach einigen Tagen begann der alte Dompfaff (Männchen) die Jungen unmittelbar zu füttern. Das Weibchen rückte auf dem Nest zur Seite und bekam vorweg von dem Futter etwas ab. Dann fütterten beide gleichzeitig, die Alte noch über den Jungen hockend, der Alte in höherer Lage vom Nestrand aus. Das Füttern wurde manchmal vom Alten plötzlich unterbrochen; während ein Junges eine rückwärtige Bewegung ausführte, griff das Männchen blitzschnell zu. Ich konnte erst nicht genau beobachten, was eigentlich vorging, weil die Bewegungen sehr schnell waren. Dann erkannte ich aber bei dem gleich abfliegenden Männchen, daß es den weiß umhüllten Kot der Jungen im Kehlsack oder Schnabel trug. Nach mehrmaligem Hin- und Herfliegen spie es den Kotballen im Fliegen aus oder legte ihn vorsichtig auf einer Sitzstange ab, so daß auf dem Ende der Sitzstange nachher reihenweise dieser Kot lag.

Schon vom sechsten Tage ab, als bei drei jungen Dompfaffen und bei der Zeisig×Kanarie die Kiele hervorbrachen, die andern aber noch recht kahl waren, saß das Weibchen nach meiner Meinung viel zu kurze Zeit auf dem Nest. Es hielt sich immer weniger dort auf. Ich glaube, es war der siebente oder achte Tag, als das Nest sogar in der Nacht von dem Weibchen nicht mehr besetzt war. Ich bekam einen Schreck und glaubte, daß die Jungen sterben würden. Aber sie ertrugen die Wärmeentziehung gut, und nun entwickelten sich die Federn schnell. Mit dem Füttern trat dann auch eine Änderung insofern ein, als sich das Weibchen mehr und mehr entfremdete. Nur das Männchen fütterte hauptsächlich. Das Weibchen ließ sich, mit Flügelschlagen danach begehrend, von dem Männchen füttern, und wenn dann das Männchen zu den Jungen ins Nest flog, kam es nach, gleich als ob es dadurch an seine Pflicht erinnert werde, und fütterte mit dem Männchen gleichzeitig. Beide standen fütternd vor dem Nest, eng nebeneinander, ein liebliches Bild. Die Fütterung ging von einem Jungen zum andern. Der Zeisigbastard war der Vorwitzigste und wurde nicht vergessen. Manchmal fütterte der Alte im Nest zwischen zwei Jungen auch schon sein danebenstehendes Weibchen. Nach zehn oder zwölf Tagen, nachdem die Jungen ausgekommen waren, bemerkte ich eine immer geringere Anteilnahme des Weibchens. Es sah, beim Füttern herzufliegend und neben dem Männchen stehend, fast nur noch zu. Daß es nach dem sechsten Tage allein zu den Jungen geflogen ist, habe ich überhaupt nicht mehr gesehen. Statt dessen äußerte es Nistlust. Ich glaubte, dasselbe erfahren zu müssen, wie es z. B. bei Kanarienvögeln vorkommt, daß allmählich die Brut verlassen werde, ehe die Jungen selbständig geworden seien. Doch hatte ich mich in dem Dompfaffenhahn verrechnet. Er fütterte unentwegt, eifriger als sonst, nachdem ich ihm allerdings Anregung durch frische Ameisenpuppen gegeben hatte, die er mehrere Tage entbehrt hatte. Ich hatte dem Weibchen den Niststoff der noch von der ersten Brut am Boden lag, weggenommen. Da es aber alles andere herantrug, gab ich den Niststoff zurück. Das Weibchen baute im anderen Nistkasten nebenan, als die Jungen noch nicht ausgeflogen waren, ein Nest. Der alte Hahn fütterte sowohl das Weibchen als die Jungen, gewann auch noch als galanter Gatte Zeit, sich daneben seinen Liebespflichten zu widmen. Ich staunte. Als die ersten Jungen der ersten Brut ausgeflogen, und zwar drei Wochen nach dem Ausschlüpfen aus dem Ei — der Zeisigbastard gleichzeitig mit einem jungen Dompfaff —, legte das alte Weibchen sein erstes Ei in das neue, zweite Nest. Der Alte fütterte nun nach drei Seiten, die ausgeflogenen Jungen, die Nestlinge und das Weibchen auf dem Nest. Jeden weiteren Tag flog ein weiterer Nestling der ersten Brut aus. Eins von den Jungen wollte sich nicht recht befiedern, Sehr klein und splitternackt, aber sonst kregel, flog es zuletzt aus. Ein sonderbarer Anblick! Im Verlauf von weiteren 14 Tagen kamen bei ihm erst die Federn vollständig. Das Tier lebt heute noch und ist von den andern nicht zu unterscheiden. Neue Not erlebte ich mit dem Zeisigbastard. Schon am ersten Tage, nachdem er das Nest verlassen hatte, bemerkte ich, daß das Tierchen, das schon auffallend weit entwickelt war — offenbar hätte es viel früher das Nest verlassen können und wartete nur auf Gesellschaft eines jungen Dompfaffen — beim Füttern vernachlässigt wurde. Das futterbettelnde Geschrei des Kleinen war fortwährend zu vernehmen. Er verfolgte unablässig den Pflegevater und dieser gab ihm nur selten etwas und ungern. Am zweiten Tage nach dem Verlassen des Nestes war die Gefahr vorhanden, daß der Kleine verhungerte. Der alte Dompfaff biß nach ihm, statt Futter zu geben. Ich nahm den kleinen Bastard nun heraus und fütterte ihn mehrmals am Tage mit gekautem Eigelb aus dem Munde. Er griff selbst zu, wenn ich ihn durch Lippenbewegungen dazu er-

munterte. Und nun nahm er — am dritten Tage nach dem Ausfliegen schon — selbständig hartgekochtes Eigelb und blieb dem Leben erhalten.

Die zweite Brut der Dompfaffen ging ebenso vonstatten und die Anfänge sogar einer dritten Brut.

Besonders bermerkenswert ist, daß die jungen Dompfaffen sehr lange unselbständig blieben. Sie wurden nach dem Ausschlüpfen aus dem Ei mehr als sechs Wochen alt, bis der Alte sie nicht mehr fütterte. Erst als Junge der zweiten Brut auskamen, wurden die der ersten vom Alten allmählich entwöhnt. Zwischendurch hatten sie sich freilich eifrig an das Schnabulieren von frischen Waldbeeren gemacht. Und zwar ist als Merkwürdigkeit hier anzuführen, daß sie nicht die Körner, sondern das Fleisch der Waldbeeren (Heidelbeeren) fraßen. Es gingen die von dem Alten noch geatzten Jungen auch wohl an das Weiße und Gelbe vom Ei, auch an den gequellten Samen; die Aufnahme förderte aber nicht recht. Sie wären offenbar, sich selbst überlassen, dabei verhungert. Unverkennbar war, daß sie ganz erheblich länger unselbständig blieben als beispielsweise Kanarienvögel. (Fortsetzung folgt.)

Von meinen Vögeln.

Von Fritz Braun.

(Nachdruck verboten.)

Gar mancher wird sich schon darüber wundern, daß ich bei meinen Aufsätzen immer wieder die Form wähle, kurzerhand die letzten Erfahrungen an meinen Vögeln mitzuteilen. Nicht wenige sagen vielleicht: „Der Kerl macht sich das Leben aber bequem; derlei kurze Berichte sind bald geschrieben; es ist die einfachste Art, etwas Neues von sich zu geben"!

Ob ich nicht aber trotz alledem im Recht bin, wenn ich immer wieder denselben Weg gehe? Die einzelne Beobachtung ist schließlich doch das Stück Wirklichkeit, das Stück des grünen Tages, an das wir uns halten müssen. In der Regel gewinnt sie allerdings erst dadurch rechte Bedeutung, daß wir sie mit früheren ähnlicher Art vergleichend zusammenhalten, um zu allgemeinerem Urteil zu gelangen. Das dürfte dann um so wertvoller sein, je reicher dieser Erfahrungsschatz ist.

Zu Beginn des November sind meine Vögel von dem hohen, fast kapellenartigen Bodenraum, wo sie im Sommer hausen, in mein Arbeitszimmer übergesiedelt. Ihnen zuliebe muß ich im Winter auf diesen Raum verzichten, aber ich tue das gern, da ich Gott sei dank auf dem Waschtisch oder im Kinderzimmer genau so gut schaffen kann, ob mir auch einmal der Gummiball über das Papier rollt. Sah ich im Leben doch schon so manchen imponierenden Schreibtisch, an dem noch nie eine neue Idee geboren wurde.

Dieses Zimmer wird den Winter über nicht geheizt. Nur wenn die Kälte es einmal gar zu gut meint, so daß die Temperatur darin unter Null zu sinken droht, lasse ich ganz leicht anheizen, um ein paar Grad Wärme zu erhalten. Ist es doch auch für mich nicht sonderlich genußreich, täglich gut anderthalb Stunden in solcher Mordskälte zu hantieren.

Nur ein frisch erstandener Karmingimpel steht zurzeit noch im Schlafzimmer der Kinder; alle übrigen müssen sich wohl oder übel mit der Kälte abfinden. Dabei zeigt sich immer wieder, daß die Kälteempfindlichkeit bei solchen Stücken, die schon längere Zeit in unserer Zone leben, sehr viel geringer ist als bei neu eingeführten Vögeln.

— Meine Blaustirnamazone, die schon ein halbes Menschenalter bei mir haust, macht sich aus der Kälte augenscheinlich nicht das Geringste. Sie ist so bewegungslustig, wie man es nur verlangen kann, und, was doch eigentlich befremden müßte, badelustiger denn je. Ganz unwillkürlich sage ich mir, wenn ich ihren tropfnassen Oberkörper sehe: „Na, wird das auch gut gehen?" Aber es geht gut, und wenn sie kaum

Girlitz.

trocken ist, planscht sie von neuem, so daß ich ihr oft für den Rest des Tages das Wasser entziehe.

Nun soll mir aber beileibe niemand seiner Amazone, die erst jüngst nach Deutschland kam, ähnliches zumuten. Die Folgen wären kaum zweifelhaft: Schnupfen, Lungenentzündung, Tod. Erst wenn diese Papageien vier, fünf Jahre bei uns sind, haben sie die anfängliche Anfälligkeit überwunden. Daß sich die Kakadus aus der Kälte nichts machen, ist erklärlicher, da diese Steppenvögel auch in ihrer Heimat zu Zeiten mit gehöriger Strahlungskälte rechnen müssen und vor allem an große Temperaturschwankungen gewöhnt sind.

Ganz Unglaubliches wurde den Vögeln vor dem Weltkriege in der Hinsicht von den Besitzern solcher Jahrmarktsbuden zugemutet, in denen Vögel ausgewürfelt und verlost wurden. Da mußten sie auch bei Frost und Schneewetter in dem luftigen Gezelt aushalten. Leider vermochte ich von den Budenbesitzern niemals klare Auskunft zu erzielen, wie lange sich die Muskatfinken und Sonnenvögel, graukörpfigen Zwergpapageien und Nonnen mit dieser Lebenslage abzufinden hätten.

Mein alter Grauedelsänger hat auch schon manchen, manchen Winter in ungeheizten Räumen ausgehalten. Dennoch möchte ich nicht behaupten, daß er unbedingt kältefest sei. Wird es zu kalt, so lüftet er die Flügel und wird etwas zitterig, was sich bei steigender Temperatur gleich verliert.

Von einem neu erworbenen Pärchen dieser Art kränkelte das Weibchen längere Zeit, flog mit gelüfteten Flügeln unstet umher, an dem Freßnapf jene zwecklose Hast zeigend, die für solche Vögel bezeichnend zu sein pflegt, welche an Auszehrung erkrankt sind. Als ich den Vögeln neben ihren Hirsearten auch reichlich Mohn gab, verschwanden allmählich diese Erscheinungen, und heute habe ich an dem Kot, den ich in dem betreffenden Behälter finde, nicht mehr das Mindeste auszusetzen.

Wenn der Liebhaber die afrikanischen Verwandten unseres Girlitzes, die Mozambiquezeisige, Edelsänger u. a. m. zumeist ausschließlich mit Hirsearten und Glanz füttert, so hat das wohl nur den Grund, daß jene Arten in der Regel zusammen mit allerlei Astrilden hinübergebracht werden, denen solche Kost verabfolgt wird. Bei mir pflegten sie alle das Mischfutter der Zeisige und Stieglitze, vor allem Mohn, recht gern anzunehmen, und der Erfolg zeigte, daß es ihnen auch vorzüglich bekam.

Woran es liegt, daß gerade Grauedelsänger so oft mit gelüfteten, zitternden Flügeln umherhüpfen, ist mir nicht klar. Auf geschlechtliche Überreizung, hysterische Zustände und ähnliches möchte ich es um so weniger zurückführen, als wir diese Erscheinungen bei frisch eingeführten Vögeln ebenso gut finden wie bei solchen, die schon Jahr und Tag in Gefangenschaft gelebt haben. Jedenfalls ist mir dies Benehmen schon aus ästhetischen Gründen wenig angenehm, und ich freue mich immer, wenn ich einen Grauedelsänger bekomme, der sich so schlank und rank trägt, daß sein eleganter Körper recht zur Geltung kommt.

Mossambikzeisig.

Gilt es für einen Liebhaber, bei dem Herannahen des Winters seinen Vogelbestand in der Weise zu teilen, daß die einen Vögel ins geheizte Zimmer, die anderen in den Kaltraum kommen, so wird er gut tun, die auszusondern, welche eben erst eingeführt sind oder die aus irgendeinem Grunde nicht als vollkommen gesund gelten können. Auch solche Stücke, deren Verdauung nicht ganz in Ordnung ist, gehören nicht in ein kaltes Zimmer. Derlei Patienten läßt man am besten den ganzen Winter über in der Wärme, denn wenn man sie für genesen hält und in die Kälte bringt, ist in der Regel im Handumdrehen alles wieder beim schlechten Alten. Daß Sumpfrohrsänger, Rotrückenwürger, Laubvögel u. a. m. nicht in ein kaltes Zimmer gehören, versteht sich von selber. An solche Arten denke ich bei diesen Erörterungen überhaupt nicht.

Bei allerlei Neuanschaffungen der allerletzten Zeit hatte ich, wie das ja selbstverständlich ist, auch diesen und jenen Ärger. Ein diesjähriger Rothänfling, der hinsichtlich fleischiger Brust und straffer Haltung als das rechte Urbild eines gesunden Vogels erschien, war doch schon mit den Bazillen des nur allzu häufigen Magen- und Darmkatarrhs der Frischfänge behaftet und mußte, trotzdem er sogleich in Einzelpflege genommen wurde, doch daran glauben. Natürlich hatte er schon ein Zeisigweibchen angesteckt, das seitdem schon mehrmals aus dem Flugkäfig ins Einzelbauer und aus dem wieder in das Flugbauer zurückwanderte. Sitzt es im Einzelkäfig, so sind alle Symptome der Krankheit in ein paar Tagen beseitigt, haust es wieder im Flug, so wird seine Haltung in kurzer Zeit wieder matt und unlustig. Wer weiß, ob das nicht so weiter geht, bis auch das Zeislein dahin muß. Beruhen nun die Neuerkrankungen auf frischer Infektion oder ist der Vogel immer noch krank gewesen? —

Ein neuerworbenes Gimpelweibchen war an seinem Tode selbst schuld. Als ich es in einen Flugkäfig hineingeworfen hatte, ging es sogleich unter erregten Rufen auf die darin hausenden Feldsperlinge los, obgleich die ihrerseits von dem Ankömmling doch keinerlei Notiz nahmen. Diese Fehde setzte das Weibchen den ganzen Tag über so eifrig fort, daß es kaum zum Essen und Trinken kam. Schließlich müssen sich die Spatzen aber dennoch zur Wehr gesetzt haben, denn am anderen Morgen lagen viel Gimpelfedern auf dem Fußboden. An diesem Tage war das Benehmen des Vogels unverändert. Tags darauf lag es tot auf dem Käfigboden. Ob es dem Widerstand der Feldspatzen erlegen ist oder dem unerklärlichen Erregungszustande, aus dem seine Angriffe hervorgingen, kann ich nicht entscheiden. Am nächsten Morgen mußte ich auch sein Männchen aus dem Flug herausfangen und in ein Einzelbauer setzen, weil auch das mit den sonst völlig harmlosen Feldsperlingen nicht Frieden halten konnte.

Mit der letzten Mauser meiner Vögel bin ich sehr zufrieden. Mein Goldammer ist wieder aalglatt und frisch und zeigt, obschon er dreimal in dem Käfig vermauserte, doch noch völlig normalen Kot. Wer viele Ammern zieht, wird wissen, daß diese Tatsache schon besonderer Erwähnung wert ist. Seltsam sieht nur mein Star aus. Gerade bei diesen Vögeln pflegen die neuen Federn im Zimmer viel zu lang zu werden. So sieht denn auch das

Brustgefieder meines Stares aus wie der Haarschopf eines Buben, über den schon vor Monaten die Schere des Friseurs hätte kommen sollen. Manche Federbüschel sind wohl einen Zoll zu lang. Auf sein Wohlbefinden hat das aber offenbar keinen Einfluß, singt er doch so fleißig, wie man das nur verlangen kann. Fast so fleißig, wie einer von meinen Berghänflingen, der tatsächlich die reine Gesangsmaschine ist. Als ich im Naumann von dieser Art las, sie tue in der Gefangenschaft nichts weiter als singen und fressen, hielt ich das für eine Redensart, die dem Schriftsteller untergelaufen sein mochte. Es ist aber doch mehr; sind mir doch schon wiederholt die Berghänflinge durch ihren außerordentlichen Sangeseifer aufgefallen, hinsichtlich dessen ihnen der so viel begabtere Rothänfling leider weit nachsteht.

einen schmalen Hohlraum, bildet. Es war dann immer eine üble Aufgabe, die herausgezogene Schublade wieder einzuschieben, ohne den Vogel zu zerdrücken, so daß ich mich schließlich dazu bequemte, den Boden durch die offene Käfigtür zu reinigen.

Leider haben wir Vogelliebhaber in dem Freistaat Danzig mit manchen Schwierigkeiten zu kämpfen. Mancher Händler sendet uns keine Vögel, weil es ihm zu umständlich ist, die Sendung aufs Zollamt zu schicken, und außerdem sind auch fast alle Futterarten bei uns fabelhaft teuer, da die Danziger Kleinhändler sich daran gewöhnt haben, mit überaus hohem Nutzen zu arbeiten. Lese ich die Inserate der deutschen Händler, so ist es mir schlechterdings unerklärlich, warum ich hier für das Pfund Spitzsamen mehr als eine deutsche Reichsmark erlegen muß.

Schwarzschwanzsteinschmätzer.

Jedenfalls kann ich jedem, der auf einem fleißig singenden und zugleich anspruchslosen Stubenvogel aus ist, gerade den Berghänfling nur bestens empfehlen. So kunstlos sein Gesang auch sein mag, die fröhliche Art, mit der er zum besten gegeben wird, und das glückliche Temperament des Vogels müssen selbst einen Griesgram für ihn einnehmen.

Mein mexikanischer Karminvogel — es ist der zweite, den ich bezog; der erste ging an Magen- und Darmkatarrh zugrunde — ist ein zwar munteres, aber doch wenig temperamentvolles Geschöpf, das in dieser Hinsicht etwa einem ruhigen Rothänfling gleicht. Da der Vogel schon vollkommen verfärbt ist und alle bei dem freien Vogel karminroten Körperstellen matt gelbgrau erscheinen, muß er schon eine ganze Weile im Käfig zugebracht haben. Er ist denn auch nicht mehr wild, jedoch durchaus nicht zutunlich. Ziehe ich das Schubfach seines Behälters heraus, so verkriecht er sich sicherlich in den hintersten Winkel, dorthin, wo die Käfigwand, nach außen gebauscht, Weichfutter, Senegalhirse und ähnliche Dinge gibts überhaupt nicht, weil es den Kleinhändlern nicht lohnt, sich diese seltener verlangten Waren senden zu lassen. Aber man wird ja auch darüber hinwegkommen.

Rotschwänze — Phoenicurus *(Forst.)*.

Eine Monographie von John Kunzendorff.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der Formenkreis Erithacus auroreus.

Der Formenkreis Erithacus auroreus umfaßt drei Arten, die des Erithacus auroreus auroreus *(Pall.)*, des E. auroreus filchneri und des E. auroreus leucopterus *Blyth*. Er zeichnet sich durch kürzere Flügel — was er mit dem Formenkreis E. diplootocus gemeinsam hat — und seidenweiches Gefieder aus. Die Unterseite ist leuchtend gefärbt. Er ist über ganz Nordasien, Nord- und Südchina und das östliche Indien verbreitet.

Der Seidenrotschwanz Erithacus auroreus auroreus *(Pall.)*.

Es sind prächtig gefärbte Vögel, die mit ihren satten Farben und mit ihrem seidenartigen weichen Gefieder das Auge des Beschauers entzücken. ♂ ad. Oberkopf, Hinterhals, Nacken dunkel aschgrau, im Frühling durch Abnutzung der dunklen Federspitzen heller werdend; Rücken, Schulterfedern, Oberflügeldecken, Schwingen schwarz, Armschwingen an Außen- und Innenfahne in der Mitte weiß, so daß ein großer weißer Flügelspiegel entsteht; schmales Stirnband, Zügel, Kopf- und Halsseiten und Kehle dunkel bis schwärzlich schiefer farben; Bürzel, Oberschwanzdecken, Unterseite vom Kropf bis zu den Unterschwanzdecken, Unterflügeldecken und Achselfedern tief rostrot; Schwanzfedern rostrot, das mittelste Paar schwarz, die äußersten an den Spitzen und an der Außenfahne mehr oder minder braun gesäumt; Schnabel und Füße schwarz, Auge braun. ♀ ad. Oberseite rötlich graubraun, Flügel dunkelbraun mit weißem Flügelspiegel, der nicht so ausgedehnt ist wie beim ♂, Unterseite fahlbraun, Mitte des Unterkörpers und Kehle heller; Weichen blaß gelblichrostrot verwaschen, Unterschwanzdecken blaß gelblich rostrot; Bürzel, Schwanz wie beim ♂. Einige ♀♀ sind unten vom Kropf an stark gelbrot verwaschen. Die den rein weißen Flügelspiegel bildenden weißen Federteile der Armschwingen haben nicht nur auf der Oberseite der Federn diese Färbung, sondern diese geht durch die ganze Feder, das heißt, sie ist auch auf der Unterseite sichtbar. Wenn auch auroreus mit phoenicurus viel Ähnlichkeit besitzt, so entfernt er sich wiederum von diesem durch sein seidenweiches Gefieder, den kürzeren Flügel und die schwarzgraue Kehle, sowie dadurch, daß er mit ihm in manchen Gegenden gemeinsam brütend vorkommt, z. B. Baikalsee, mit dem er daher nicht näher verwandt ist. Nach Hartert sind die Maße: ♂ Fl. 70—72, Schw. 63 bis 66, Lf. 22—23 mm; ♀ Fl. 70—72 mm und nach Jerdon ♂ Lg. 145, Fl. 72, Schw. 62,5, Lf. 20 mm. Die von Kleinschmidt gemessenen Vögel aus Tsingtau ergaben ♂ ad. Lg. 142, Fl. 74 mm, ♀ ad. Fl. reichlich 74 mm, ♂ juv. Fl. 71 mm.

Durch die Anmerkung Kleinschmidts in Berajah 1918, die fremden Formenkreise des Subgenus Phoenicurus auf die japanischen Vögel aufmerksam gemacht, habe ich bei der Untersuchung der elf Bälge des Museums, sechs japanische, drei sibirische und zwei chinesische, mein Hauptaugenmerk auf die Kollektion japanischer Bälge gerichtet und will vorwegnehmen, daß diese sich im Größenverhältnis mit denen aus den anderen Gebieten kaum unterscheiden, da die geringeren Maße der japanischen Vögel auch bei den sibirischen, die größeren auch bei den chinesischen Bälgen vorkommen. In der Gefiederfärbung allerdings habe ich Unterschiede gefunden, die aber wahrscheinlich daher herrühren, daß die japanischen Bälge im frisch vermauserten Herbstkleide, die anderen im abgetragenen erlegt worden sind; Bestimmtes hierüber läßt sich jedoch nicht sagen, da bei den Japanern das Datum des Fangtages nicht angegeben ist. Während bei den sibirischen und chinesischen Stücken der Oberkopf hell bis dunkel mausgrau ist, zeigt der Japaner eine mittel mausgraue Färbung, die jedoch durch die olivbräunlichen Federrandsäume überdeckt wird, so daß der Oberkopf olivbräunlich erscheint. Auch die schwarze Rückenfärbung ist bei letzteren nicht rein, da auch hier die Federn olivbraun gespitzt sind, wohingegen besonders die Chinesen sich durch tiefschwarzen Rücken auszeichnen. Diesen Unterschied möchte ich aber, wie gesagt, mit der Mauser in Zusammenhang bringen — die chinesischen und sibirischen Bälge sind Juli und August gesammelt.

Während in den Flügelmaßen die Japaner die Mitte der beiden anderen halten, so daß deren größte auch bei den Chinesen und deren kleinste bei den Sibiriern vorkommen, haben sie in den Schwanzmaßen die größte Länge zu verzeichnen, andererseits ergibt sich aus dem Verhältnis vom Schwanz zum

Muskatfink.

Flügel, daß bei den Japanern ersterer auch im Verhältnis zum Flügel der längste ist, mithin sie im Verhältnis die kürzesten Flügel haben. Die Längenunterschiede sind jedoch, ebenso wie die Unterschiede in den Verhältnissen von Schwanz zu Flügel, zu gering und ist die Anzahl der untersuchten Bälge eine zu kleine, als daß man definitive Schlüsse daraus folgern könnte, daß man nach vorliegendem Material keine gravierende Unterschiede feststellen kann, auf Grund deren man sie von den andern trennen könnte.

Das Verbreitungsgebiet des Erithacus auroreus auroreus ist Südostsibirien, die östliche Mongolei, Nordjapan und Korea; im Winter ist er in Südchina, auf Hainan und den Riu-Kiu-Inseln nachgewiesen worden. In Südchina ist er gewöhnlicher Wintergast, er erscheint hier Mitte Oktober und bleibt bis Ende März. Besonders häufig tritt er in den Küstengebieten auf, jedoch ändert sich sein Vorkommen betreffs der Anzahl in den verschiedenen Jahren beträchtlich. Er hält sich in buschreichen Gehölzen und Gärten auf — nach Pleske ist er ausschließlich an Wald oder doch an Buschwerk gebunden — und baut sein Nest in Felsspalten, unter überhängenden Felsstücken der Felswände und in Erdlöchern oder Baumhöhlen, unter umgestürzten

Bäumen, in Steinhaufen und an Gebäuden aus Moos, Rinde und Halmen und polstert es mit Haaren und Federn aus. Das Nest hat eine kugelige Gestalt. Das Gelege besteht aus fünf bis sechs lichtblauen bis blaß grünlichen oder weißen Eiern, die bisweilen rot gefleckt oder verwaschen braunrot gezeichnet sind, wie auch aus dunkelblauen Eiern. Während der Brutperiode sitzt das ♂ in der Nähe des Nistplatzes auf einem hohen Baum eifrig singend, um jedoch beim Nahen eines Feindes sofort das ♀ zu warnen, worauf beide jenen mutig angreifen und ihn, über die Sträucher fliegend und ängstlich rufend, begleiten. Während der Kämpfe der ♂♂ geben diese zischende Töne von sich. Bemerkenswert ist es, daß der Seidenrotschwanz zugleich Stand- und Zugvogel ist. Im Mai trifft er in seiner Brutheimat ein und bleibt dort bis Ende September. Der Gesang wird als nicht melodiös und wohlklingend bezeichnet.

Es ist sehr zu bedauern, daß dieser farbenprächtige und schöne Rotschwanz seinen Einzug in unsere Vogelstuben noch nicht gehalten hat. Wunderbar ist es, daß er noch nicht über Rußland den Weg zu uns gefunden hat, wo er doch, meines Erachtens, auf dem Moskauer oder Petersburger Vogelmarkt sicher zu finden gewesen sein wird. (Forts. folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Radio und Brieftauben. In letzter Zeit hat man in Spanien die merkwürdige Beobachtung gemacht, daß Brieftauben, sobald sie auf ihrem Fluge in die Nähe von Luftleitern gelangten, anscheinend alsbald die Flugrichtung verloren und unsicher flatternd ihren Weg suchten. Sie fanden, wie die „Sendung" mitteilt, ihre Richtung erst dann wieder, wenn sie aus dem Bereiche der Antennen kamen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß auch die anderen Vögel durch die Nähe von Funkensendestellen in der Sicherheit ihres Orts- und Richtungssinnes beeinträchtigt werden, und es wäre sehr zu wünschen, wenn auch hierüber Beobachtungen angestellt werden könnten.

Wurzen. (Ein Vogelfriedhof.) Bei der Durchforstung des Rittergutsparkes zu Kühnitzsch wurde ein Ahornbaum gefällt, der bis auf den Wurzelstock hohl war. In der Höhlung fand man eine große Menge Köpfe vollständig verwester Vögel, besonders von Spechten. Einige Grünspechte waren noch erhalten. Gezählt wurden über hundert Köpfe. Jedoch ist deren Zahl bedeutend höher zu schätzen, denn in einem festgefrorenen Klumpen Baumerde, der aus dem hohlen Baum stammt, stecken noch viele deutlich erkennbare Köpfe und Knochen verendeter Vögel.

Die Vogelbewegungen nach Norden. Es ist eine schon öfters beobachtete Tatsache, daß manche Vögel sich immer mehr nach Norden ausbreiten. Vor einigen Jahren zog der erste Storch nach Norwegen, die Nachtigall ist in den letzten Jahren bis Aarhus in Jütland, der Ortolan bis Skandinavien, das Rebhuhn bis zum 64. Breitegrad gewandert. Auch die Schwalbe erweitert ihr Wohngebiet stetig nach Norden. Der Berglaubvogel rückt rechts und links vom Schwarzwald nordwärts vor. Zu uns aber kommen südliche Formen, der Bienenfresser, der Girlitz, ja selbst Pelikane und Flamingos. Man glaubt, das heute darauf hin, daß wir einer langsamen Erwärmung des Klimas zuschreiten, die die Vögel gewissermaßen schon vorher ahnen. (Hann. Tagebl.)

Nachstehend möchte ich den verehrten Lesern der „Gef. Welt" einen kurzen Bericht über die **Aufzucht von Mauerseglern** geben. Im Mai 1924 bekam ich drei Mauersegler, und zwar in Abständen von drei bis vier Tagen. Es waren Vögel, die schon aus dem Nest ausgeflogen waren. Sie müssen sicherlich in Berlin irgendwo gegen geflogen sein, denn sonst hätte man sie hier nicht gefunden. Ich versuchte nun, als ich den ersten Mauersegler bekam, ihn zu füttern. Das war aber nicht so einfach, denn er sperrte nicht den Schnabel auf, sondern ich mußte ihm gewaltsam mit der Pinzette die frischen Ameiseneier zuführen. Dies tat ich eine Woche lang. Am siebenten Tage sah ich zu meiner Freude, daß der Vogel die Ameiseneier selbst aus der Pinzette nahm. Inzwischen hatte ich den zweiten Mauersegler bekommen. Es gelang mir leider nicht, ihn groß zu ziehen. Wenn ich ihm nämlich die Ameiseneier mit einer Pinzette in den Schnabel steckte, so brachte er sie immer wieder heraus, und schließlich starb er am fünften Tage. Bei dem dritten Mauersegler machte ich dieselben Bemühungen wie beim ersten. Auch dieser nahm nach ungefähr acht Tagen die Ameiseneier schon selbst von der Pinzette ab. Nun hatte ich meine Freude an den Vögeln, denn jedesmal, wenn ich den Bauer öffnete, kamen sie an und sperrten ihre Schnäbel allein auf. Auf diese Weise fütterte ich sie vier Wochen lang. Mein Bestreben war es vor allen Dingen, daß die Mauersegler von selbst aus den Futternäpfen fressen lernen sollten. Dies kostete natürlich zuerst viel Arbeit und Geduld. Nach etwa sechs Wochen hatte ich den ersten Vogel so weit, daß er an den Futternapf kam und auch schon von selbst etwas Futter daraus nahm. Der zweite Mauersegler tat dies acht Tage später ebenfalls; allerdings mußte ich ihnen zu Anfang immer noch etwas Futter mit der Pinzette reichen. Ich hatte es nun also erreicht, daß die Vögel vollständig selbständig aus ihren Futternäpfen fraßen. Ich brauchte mich nicht mehr um sie kümmern, sondern stellte ihnen nur zwei- bis dreimal am Tage frisches Futter in den Bauer. Ebenso lernten sie auch selbst das Trinken. Da Mauersegler auf der Stange nicht sitzen können, hatte ich ihnen in dem Bauer ein Stück Gardine angebracht. An diesem Stoff hingen sie ständig. Ich habe oftmals beobachtet, daß sie ihre Flügel ausspannten, jedoch ernste Versuche zum Fliegen haben sie nie gemacht. Nachdem die frischen Ameiseneier zu Ende gingen, kam eine schwierige Zeit für die Vögel. Ich hatte sie aber schon vorher an anderes Futter gewöhnt, und zwar mischte ich trockene Ameiseneier mit rohem Fleisch zusammen, woran sie sich auch bald gewöhnten, so daß ich sie mit dieser Nahrung gut durchhalten konnte. Natürlich durften die Mehlwürmer und Schaben nicht fehlen. Jedenfalls ist es nicht schwer, Mauersegler aufzuziehen, wie mancher Vogelliebhaber es sich denkt. Man muß nur Geduld und Zeit haben. An und für sich hat man nicht sehr viel Freude an den Vögeln, da es ziemlich langweilige Tiere sind. Wilhelm Dähne.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 11. Kann einer der geehrten Leser über die Erlaubnis bzw. Verbot des Vogelfanges in den Vereinigten Staaten von Nordamerika Aufschluß geben, insbesondere über die diesbezüglichen Bestimmungen im Staate New Jersey. Franz Stürzer.

Antworten.

Auf die Frage 8 in Heft 9 gestatte ich mir Ihnen meine Erfahrungen in der Bastardzucht mitzuteilen. Nach meinen fast dreißigjährigen Erfahrungen nimmt jeder Wildling ein buntes oder grünes Kanarienweibchen leichter an. Die schönsten Bastarde erzielte ich, wenn auch sehr selten, mit Stieglitz und gelbem Kanarienweibchen. Hänflinge habe ich immer nur mit möglichst dunklen Kanarienweibchen gepaart, da es ja hier nur auf den Gesang ankommt, welcher der beste von allen Bastarden ist. Der Sicherheit halber nimmt man das Männchen heraus, wenn das zweite Ei gelegt ist, sonst gilt alles wie bei der Kanarienzucht. Ein sonniges Zimmer ist immer vorzuziehen, doch habe ich auch schon Dompfaffen- als auch Stieglitzbastarde gezüchtet in einem nach Norden gelegenen Zimmer.

Ernst Blankenburg, Kolberg.

Beringung von Wellen- und ähnlichen Sittichen. Auf meine Anregung in Nr. 43 des vorjährigen Jahrganges habe ich von Herrn Krabbe und Herrn Dr. Bilfinger Zuschriften und Muster ihrer zu diesem Zwecke verwandten

Ringe erhalten, außerdem haben in der „Gef. Welt" mehrere Züchter sich über Ringe verschiedener Art geäußert. Ich danke zunächst allen Kollegen bestens, namentlich den Herren Krabbe und Dr. Bilfinger für ihre Zuschriften und Musterringe. Es ist zu unterscheiden, ob man nur die Nachzucht einiger weniger Paare, die in einigen Käfigen oder Volieren gehalten werden, zeichnen will oder die Nachzucht einer größeren Anzahl Paare in Gartenvolieren. Für den ersten Fall genügen die verschiedenen Zeichnungsarten durch mehrfarbige Draht- und Zelluloidringe vollkommen, wobei ich zwar anfügen will, daß es mir nicht gelang, den Zelluloidspiralring, ohne daß es Blut gab, anzulegen. Für den zweiten Fall aber genügt diese Beringungsweise nicht. Ich habe z. B in diesem Jahr in meiner Gartenvoliere zirka 20 Stück Wellensittiche — blau, oliv und gelb sowie grüne verschiedener Schattierungen, die aus Farbenzucht stammen — in freier Zuchtwahl fliegen. Ich bin also darauf angewiesen, die Jungen vor dem Ausfliegen nach Feststellung der Eltern, die alle beringt sind (bis jetzt mit Rossittener Ring), zu beringen, und zwar mit fortlaufender Nummer. Denn ich erwarte doch über 100 Junge und will die Abstammung und Farbenspiel derselben durch mehrere Generationen feststellen, d. h. also Stammbäume für dieselben führen. Dazu ist unbedingt nötig ein unzerstörbarer und unverlierbarer Ring mit fortlaufender Nummer. Einen solchen Ring glaube ich von Herrn Krabbe als Muster erhalten zu haben und werde denselben beim Fabrikanten bestellen und dieses Jahr ausprobieren. Dieser Ring ist ein starker, geschlossener Aluminiumring von 5 mm Höhe und 4 mm lichtem Durchmesser, der mit laufender Nummer, vielleicht auch Jahreszahl und Züchterzeichen versehen ist. Es bleibt nun noch festzustellen, in welchem Nestalter die Ringe angelegt werden müssen, daß sie nicht wieder abgestreift werden, aber auch ohne Zwang und Beschädigung der Füße angebracht werden können. Nachdem schon einige Weibchen fest auf ihren Gelegen sitzen, mußte ich zu einer Entscheidung kommen und habe beschlossen, oben beschriebenen Versuch zu machen.

Rich. Schwarzkopf, Ingelfingen, Mitgl. 216 A. Z.

Weshalb gibt es im Handel immer noch nicht Freßnäpfe für Vögel, die sich leicht reinigen lassen! Wer seinen Vogel lieb hat, befaßt sich selbst mit dem Sauberhalten der Freß- und Saufnäpfe; hängt doch die Gesundheit des Vogels viel von der Sauberkeit dieser Gefäße ab. Ich ärgere mich immer von neuem darüber, daß die im Handel befindlichen Vogelnäpfe so ganz unsachgemäß hergestellt sind; sie haben so scharfe Ecken, daß das reinigende Tuch darüber hinweggleitet und den Schmutz in der Ecke sitzen läßt. Erst durch Zuhilfenahme eines zugeschärften harten Gegenstandes, den man in das Tuch steckt, kann man mühsam die Ecken reinigen. Es finden sich im Handel sogar Näpfe, deren Ecken tiefer als die Flächen liegen. Der Fabrikant von Vogelnäpfen hat also ohne jede Überlegnng gearbeitet. Abhilfe kann nur geschaffen werden, wenn Vereine oder andere maßgebende Stellen den Fabrikanten klar machen, daß sie die Näpfe mit schön abgerundeten Ecken — etwa 5 mm Radius — anfertigen müssen, damit sie leicht zu reinigen sind. Eine solche Abänderung erfordert weiter nichts als das Abrunden des Modells, nach welchem geformt wird. Jedenfalls wird es nur eines Hinweises bedürfen, damit die Fabrikanten in Zukunft richtig geformte Näpfe liefern. (Was hier über Vogelnäpfe gesagt ist, gilt übrigens auch für Kochgeschirre. Weil diese häufig im Boden scharfe Ecken haben statt abgerundete, so bleibt der Schmutz dort sitzen, ebenso das Wasser; daher das häufige Durchrosten in den Ecken.)

Steffens.

Bücher und Zeitschriften.

Vögel der Heimat, 66 Naturaufnahmen heimischer Brutvögel nebst kurzer Schilderung ihrer Lebensweise auf Grund eigener Beobachtung von Gustav Wolff. Verlag von Georg Schade, Bad Salzuflen. Preis Mk. 4,— stark kartoniert. 8°. 132 S.

Der Verfasser und Hersteller der Naturaufnahmen ist den älteren Lesern der „Gef. Welt" aus früherer Mitarbeit gut bekannt. Wir hatten häufig Gelegenheit, seine hübschen und scharfen Naturaufnahmen, z. B. sehr gute Aufnahmen von Kohlmeisen in den verschiedensten Betätigungen unseren Lesern zu zeigen. Der begleitende Text war stets anziehend geschrieben, zumal alles das, was uns Wolff sagte, selbst Geschautes und Beobachtetes war. In dem vorliegenden Buch hat nun der Verfasser vieles von dem was er bisher mit liebevollem Auge gesehen niedergeschrieben und uns durch Beigabe von selbst hergestellten z. T. bisher noch nicht veröffentlichten Naturaufnahmen näher gebracht. Entstanden aus dem Studium der Natur und aus der Beobachtung und dadurch erwachsenen Liebe und Zuneigung zur Vogelwelt, möchte das Büchlein seinerseits anregen zu liebevoller Betrachtung, zu ernster Beobachtung und damit zugleich zum Schutze der heimatlichen Vogelwelt. Möge der Wunsch des Verfassers, dem er in dem Vorwort Ausdruck gibt, durch eine recht weite Verbreitung des Buches erfüllt werden.

N.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnitz, Merveldstr. 39; Kaufsvermittlung: Franz Nyncke, Berlin O, Königsberger Str. 17. Verbandsorgan: die „Gef. Welt".

Unter bezug auf unsere früheren Bitten ersuchen wir wiederholt die uns angeschlossenen preuß. Vereine um Einsendung ihrer Mitgliederlisten, soweit das noch nicht geschehen ist. Anfang April soll der erste Jahresbericht erscheinen. Hierzu fehlt uns der Mitgliederbestand von sämtlichen preuß. Vereinen. Ebenso notwendig ist die Regelung der Beitragsangelegenheiten. Es stehen noch erschreckend viel Posten zur Begleichung offen, die bis Anfang April ihre Erledigung gefunden haben müssen. Vorher ist es unmöglich, einen Jahresbericht zu geben.

J. A.: Rudolf Petters, 1. Schriftf.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

R. Bicknäse, Hotel Seeluft, Schönberger Strand (Holstein): 1,0 Schopfsäger, gr. Silbermöwe, Steinkauz.

Bruno Matern, Lötzen, Ostpr.: 1,0 weinroter Haubenfink.

Johann Rohracher, Lienz, Tirol, Österreich: 2 Tannenhäher, 1 Rauhfußkauz.

Paul Tzornack, Berlin, Prenzlauer Allee 189: Graubauch-Drongo, Jamaika-Trupial, Dominikaner-Kardinäle, Weißbauchpapageien, Kaptäubchen, Palmtäubchen.



Herrn W. Sch., Berlin. 1. Weide, Obstbäume, Linde, Birke, auch Nadelholzbäume. 2. Stieglitz, Zeisig, Birkenzeisig, Bluthänfling, Steinhänfling, Girlitz, nicht bissige Grünlinge, Kreuzschnabel, Gimpel, Buchfink.

Herrn J. K., Dresden; Herrn R. N., Berlin; Herrn E. B., Kolberg; Herrn A. D., Berlin; Herrn Direktor A. J., Biberach; Herrn A. L., Pfarrkirchen; Herrn H. G., Koblenz; Herrn Th. O. M., Berlin: Beiträge dankend erhalten.

Herrn Dr. St., Zürich. Besten Dank für freundliche Auskunft; die Rotastrilde werden auch Zügelastrilde (Estrilda rhodopyga *Sund)* genannt.

Herrn K. B., Eisenach, ♀ Schmetterlingsfink ist infolge von Legenot eingegangen. Es konnte ein weichschaliges Ei nicht legen.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

rgang 54 26. März 1925 Heft 13

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Die Nachtigall. Von J. Birk, Leipzig. (Forts.)
Meine Gebirgsloris. Von Max Beyer, Berlin-Niederschönhausen. (Schluß.)
Neueinführungen und Seltenheiten. Von K. Neunzig. (Forts.)
Dompfaffenzucht. Von Amtmann Max Krumm. (Forts.)
Von meinen Vögeln. Von Fritz Braun.
Rotschwänze — Phoenicurus (*Forst.*). Eine Monographie von John Kuntzendorff. (Forts.)
Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Bücher und Zeitschriften - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Ausstellungen - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellungen.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Die in den Tagen vom 19. bis mit 26. April 1925 stattfindende Ausstellung einheimischer Vögel und heimatkundlicher Sehenswürdigkeiten, zu der ein zahlreicher Besuch Interessierender erwartet werden darf, bietet die günstigsten Gelegenheiten zu Aussprachen der Liebhaber untereinander und mit den Vertretern der bestehenden Liebhaberorganisationen. Es bietet sich Gelegenheit zur Besichtigung der Ausstellung lebender Vögel, der Bälge- und Eiersammlung, der Vogelschutzabteilung, der Museumsschätze und zur Teilnahme an täglich stattfindenden Führungen und Lichtbildervorträgen. Die Versäumnis einer derartigen reichen Darbietung bedeutet einen großen Verlust an Genüssen seltenster Art. Der Landesverband Sachsen und Großthüringen hält am 26. April 1925 seine Generalversammlung ab, nicht weniger ist Vorsorge getroffen, daß ein Vertreter des Reichsverbandes täglich anzutreffen und zu sprechen ist. Der Presseausschuß. J. A.: Vorwerk.

Der Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Zwickau beabsichtigt in der Zeit vom 17.—21. Mai d. J. eine Vogelausstellung zu veranstalten.

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Sitz Leipzig. 1. Vors.: Hermann Höhne, Leipzig-Volkmarsdorf, Eisenbahnstr. 84, IV. 1. Schriftf.: Max Hunger, Leipzig-Gohlis, Polizeigebäude, Zimmer 196. Kassierer: Ludwig Böttcher, Leipzig, Inselstr. 17 II. — Achtung! Freiquartiere betr.! Der Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig hat in anerkennenswerter Weise dem Landesverband zu seiner am 26. April 1925 stattfindenden Jahresversammlung mehrere Freiquartiere zur Verfügung gestellt. Wir fordern deshalb alle auswärtigen Teilnehmer, soweit sie ein freies Nachtquartier beanspruchen, auf, sich bis spätestens 14 Tage vor der Jahresversammlung (12. April 1925) bei dem Unterzeichneten vormerken zu lassen. Um alle Anmeldungen berücksichtigen zu können, wird es jedem der Beteiligten zur Pflicht gemacht, für Einhaltung der festgesetzten Frist besorgt zu sein. Der Vorstand. J. A.: Hunger, Schriftf.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel Landesverband Preußen. Am Sonnabend, dem 18. April, findet im Lokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstr. 37a in Berlin, unsere diesjährige Jahresversammlung abends 8 Uhr statt. Alle dem Verbande angeschlossenen Mitglieder sind dazu herzlichst eingeladen. Fahrverbindung Hochbahn Prinzenstraße, Untergrundbahn Spittelmarkt sowie alle Straßenbahnen, welche den Moritzplatz und die Oranienstraße berühren. Vertreter auswärtiger Vereine werden gebeten, sich mit Vollmacht zu versehen. Die Tagesordnung für diesen Abend enthält folgende Punkte: 1. Begrüßung; 2. Verlesen des Protokolls; 3. Jahresbericht; 4. Bericht des Kassiers; 5. Bericht der Revisoren. Entlastung des Vorstandes; 6. Neuwahl des Vorstandes; 7. Anträge; 8. Geschäftliches. In Anbetracht der kurzen Zeit wird gebeten, pünktlich zu erscheinen.

Der Vorstand. J. A.: P. Böhme, Schriftf.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden. J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.



Angemeldet ist Herr Direktor Kurzius vom Kgl. Zoolog. Garten in Sofia (Bulgarien). — Aufgenommen ist Mtgl. Nr. 128n Heinrich Witte, Grohn-Vegesack, Friedrichsdorfer Str. 7; Mtgl. Nr. 129n Dr. Karl Meyer, Kitzingen a. M., Königsplatz 5; Mtgl. Nr. 131n Frau Major Nikolay, Potsdam, Spandauer Str. 26 II. — Da am 1. April die Mitgliederliste für die Zugehörigkeit zum Reichsverband aufgestellt werden muß und gleichzeitig der Beitrag dafür fällig wird, so fordere ich hiermit nochmals die mit der Beitragszahlung rückständigen Mitglieder auf, ihren Verpflichtungen nachzukommen resp. Stundung zu beantragen — soweit noch nicht geschehen — oder den Austritt zu erklären.

A. Krabbe.

Aus den Vereinen.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen. J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen. J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurter Str. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. V.: Emil Ivo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Vereinslokal Karl Röhr, Heiligerweg 28. Versammlungen zweimal im Monat, jeden 2. und 4. Sonntag nachmittags 5 Uhr. — Liebhaber jederzeit herzlich willkommen. J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Rietschelhof", Rietschelstr. 19. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinslokal „Parkhotel", Epinaystr. 1, Versammlung. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an. Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Poolstr. 22, abends 8¼ Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 7. April 1925. Gäste, auch Exotenliebhaber, stets willkommen. J. A.: Arnold Weber, 1. Vors.

Die Vereinigung hannov. Vogelliebhaber will dem Vogelpfleger Ratgeber und Helfer sein, will die Liebe zum Tier und zur Natur wecken und stärken, will beitragen zum Kennenlernen der Vögel in Wald und Flur. Monatlich einmal kommen die Mitglieder zusammen, tauschen die Erfahrungen aus, hören Vorträge aus allen Gebieten der Vogelkunde, -schutz und -pflege an. Ein- oder zweimal im Jahre veranstalten wir große Lichtbilder- und Film-Abende. Im Frühjahr finden Beobachtungsausflüge unter Führung statt. Den Mitgliedern stehen zahlreiche Fachzeitschriften und Bücher kostenlos zur Verfügung. Regelmäßig berichtet die Zeitschrift nieders. Vereine über unsere Veranstaltungen. An den Vereinsabenden ist Rat und Auskunft, Kauf- und Tauschgelegenheit geboten. Jahresbeitrag Mk. 2,—, für Auswärtige und Schüler Mk. 1,—. Anmeldungen an Heinz Appel, Nienburgerstr. 7A I. Auskunft: Buchhändler A. Troschütz, i. Fa. Cruses Buchhandlung, Gr. Aegidienstr. 4.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Da die Heidelberger keinen Liebhaberverein haben, die wenigen wirklichen Liebhaber aber doch den Wunsch haben, zusammenzukommen, so haben sich die Liebhaber der Ortsgruppe Heidelberg, die alle dem Bund für Vogelschutz angehören, zu einer Sonderabteilung zusammengeschlossen und kamen auf Einladung von Professor Febringer am Donnerstag, den 5. März, erstmals im Holländer Hof zusammen. Zwar war es nur ein kleines Häuflein Getreuer, das kam, aber es waren alles nur wirkliche Liebhaber und Vogelpfleger

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

mit zum Teil recht guten Beständen. Da die Zahl der Heidelberger Liebhaber sich auf zirka 15 belaufen dürfte, wäre es angebracht, hierfür einen eigenen Verein ins Leben rufen zu wollen. Da ja Vogelschutz und -pflege unbedingt zusammengehören, ist die Zusammenkunft im Rahmen des bestehenden Bundes das einzig Gegebene. Der Abend war ausgefüllt mit einer zwanglosen Unterhaltung über das Wohl und Wehe unserer Stubenvögel. Wir brauchen kein Programm, keinen eigentlichen Vortrag, keine Statuten usw. Wir wollen uns gegenseitig aussprechen im gemütlichen Kreis und uns dabei wohl und behaglich fühlen. Möge jeder Heidelberger Vogelliebhaber es nicht versäumen, an jedem 1. Donnerstag im Monat im Holländer Hof zu erscheinen. Die sonstige Tätigkeit der Ortsgruppe ist eine äußerst rührige und ersprießliche. Von Zeit zu Zeit finden Vogelwanderungen statt, die im Frühjahr zu einer vielbesuchten Einrichtung geworden sind. Außerdem werden im Zusammenschluß mit anderen naturwissenschaftlichen Vereinigungen Vorträge, Filmdarbietungen und ähnliche Veranstaltungen abgehalten, in deren Mittelpunkt stets unser einheimisches Vogelleben steht. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögeln Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstraße. Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden, Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. — In der am Mittwoch, den 14. März 1925, abgehaltenen Versammlung berichtete der Vorsitzende über seinen Besuch beim Verein der Erfurter Vogelliebhaber und überbrachte deren Grüße. Aufgenommen wurde Herr stud. Biekerich. Ein Artikel aus dem „Hubertus" über Grausamkeiten beim Vogelfang wurde verlesen und besprochen, ebenso eine Notiz der Tageszeitungen, wonach die schwedische Regierung erneute Verhandlungen über internationalen Vogelschutz anstreben will. Über zwei alte Bücher, über den Vogelfang aus dem Jahre 1825, berichtet der Vorsitzende und bespricht besonders den darin erwähnten Lerchenspiegel. In einer späteren Versammlung soll noch speziell auf diese Bücher eingegangen werden. A. Voigt.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz und Umgegend. Vereinslokal „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" und „Kanaria". Vogelliebhaber und Gäste sind stets willkommen. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vors., Boppel, 1. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 2. April 1925. Gäste willkommen. M. Roth, Schriftf., L.-Plagwitz.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung bei unserem Mitgliede Herrn Normast im Gasthof „Kaiser Friedrich", Breslauer Str. 50. Liebhaber sind als Gäste willkommen. J. A.: Friedrich.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wst., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Tage im „Goldenen Falken" Versammlung. Nächste Versammlung Freitag, den 3. April 1925. Freunde und Gönner stets willkommen. Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Samstag, den 28. März 1925, abends 8 Uhr, Monatsversammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstraße. Vortrag von Herrn Dr. Laubmann, Generalsekretär der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern, über „Umfärbung". Um zahlreichen Besuch bittet

Der Ausschuß. Rudolf Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabende aller vier Wochen, in der ersten Woche des Monats verbunden mit Vortrag, in der dritten Woche jedes Monats nur gesellige Zusammenkunft. Vereinslokal „Sächsischer Hof". Gäste stets willkommen. Studienrat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jedes Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Nachnahme od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Käfige u. Gerätschaften

Vogel-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50. Vogelnetze f. all. schädl. Vögel M. 2,30, 3 M. 2,50 u. 2,80. Katalog gratis. Kanuen, Gronau 58, Westf. [457

Ia Vogelleim,

die Klebkraft, 1 Dose 75 Pfennig, 6 Dosen 3,— Mark franko.

Taubenwitterung

Dose 75 Pfg., 6 Dosen 3 M franko. Fasanhühner, Tauben, Küken, Bruteier.

M. J. Breuer, Elmpt 75 bei Brüggen (Rhld.). [458

Futtermittel

Mehlwürmer Pfd. 5 M, 6 Pfd. 30 M frc. Nachn. Jeltner, Breslau, Weinstr. 12.

Mehlwürmer, reine Ware, n Einf. von 1.75 M ¼ Pfd. franko. Witte, Niederndodeleben b. Magd.

Bei Anfragen und Bestellungen bitten wir, sich auf die „Gef. Welt" zu berufen

Telegramm

Vogelliebhaber, wenn ihr gelegentlich nach München kommt, vergeßt nicht den Besuch der sehenswerten neu eröffneten

Vogel-, Käfig- und Samenhandlung

von Max Schimang, München

vorläufig Landsberger Str. 167—69 (bei Geschäftsverlegung folgt Bekanntgabe).

Langjähr. Mitglied d. Bayr. Vogelliebh.-Vereins, d. Verbandes deutscher Farben-, Gestalts-, Bastard- und Exotenzüchter, beide E. V. in München, desgl. Mitglied i. d. A.-Z. Nr. 73. [461

Reelle Bedienung! Besichtigung ohne Kaufzwang!

Großfirmen sowie Züchter und Liebhaber, auch Zeitungsverlage usw. bitte ich um Offerten und Preisangabe ihrer Handels- und Zuchtprodukte.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark ¼ Pfd. franko versend. D. Waschinski & Co., Bienenthal I (Mark). [462

Mehlwürmer

veget. gez., ¼ Liter franko gegen Vor- [463 einsendung von Mark 2.—. Bonitas-Versand, Rostock i. M. 3.

Mehlwürmer

pro ½ Pfund M 2.— liefert franko [464 Reichardt, Berlin N, Böttgerstr. 23.

Vogelfutter [465

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,

Tröndlinring 1. Telephon 14 958.

Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Mehlwürmer

à Pfund 5 ℳ, bei 6 Pfund Porto und Verpackung frei.

Ia Ameiseneier . . . à Pfd. 8 ℳ
Ia Weißwurm . . . à „ 6 ℳ
Ia Muska-Zecken . . à „ 3 ℳ
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen . . . . à Pfd. 1 ℳ
Ia Garnelen, gem. à Pfd. 0.40 ℳ

Ia Universalfutter.

Alleckwa I für Nachtigallen 2.— ℳ
„ **II für Grasmücken** 1.80 ℳ
„ **III für Drosseln** . 1.50 ℳ

Proben und Analysen zur Verfügung. Vertreter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [466

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser

A. Eckrich II., Waldsee (Pfalz).

Ornis-Haus
Halle-Saale

Gegründet 1912

Spezialität:

Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)

Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall., Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspött., Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [467

Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) **Mk. 1**

Preisliste auf Wunsch!

Vögel

Schönfelders Kanarienfeinzucht, Dresden-Trachau 37,

gold. Med. präm. Urstamm Seifert-Wolf, empfiehlt tiefe Hohlroller, Knorren, Schockel, schöne tiefe Flöten, Zuchthähne und ff. Tag- und Lichtsänger à 12, 15, 18 M., 3 Stück zus. 40 M., erstklassige Vorsänger und Ausstellungshähne à 20, 25, 30 M., 3 Stück zus. 60 M., prima Zuchtweibchen à 4 M. Machen Sie bitte einen Versuch und Sie werden zufrieden sein. Hunderte von Dankschreiben im Besitz. [468

Hochedle Gesangs-Kanarien

tourenreiche, fleißige Sänger (Edelroller). **Rein gelbe Gesangs-Kanarien,** Hähne sowie Zuchtweibchen, auch geeignet für Bastardzucht. **Garantie:** Versand nur kerngesunder Vögel, streng reelle Bedienung. Zuchtpärchen 20 ℳ.

J. Franke, Dresden A

Lortzingstraße 3. [469

Prämiert: Vogel-Ausstellung Dresden 1924 „Goldene Medaille".

Harzer-Edeltanarien

von 15 M. an, Weibchen 3 M. Flug- und Heckkäfige, Nistkästchen mit Draht
470] durchzogen per Dtzd. 6 M.

Adolf Janson, Barbis

Beschwerden wegen Nichtzustellung der „Gefiederten Welt" sind beim zuständigen Postamt anzubringen.

Um allen Liebhabern die Möglichkeit zu geben, sich von der Güte des

Heidelberger Vogelfutters

(nach Prof. Dr. Fehringer) zu überzeugen, haben wir einem vielfach geäußerten Wunsche entsprochen und auch vom Weichfutter kleine Packungen (½ Pfd.) hergestellt. Das Futter kann also nunmehr in jeder beliebigen Menge bezogen werden.

½ Pfd. Braun (Erdsänger, Gelbspötter usw.) . . ℳ 1,75
½ Pfd. Grau (Grasmücken usw.) . . . . . ℳ 1,50
½ Pfd. Blau (Drosseln, Stare usw.) . . . . . ℳ 0,75

Die Packungen für Körnerfresser bleiben wie bisher:

1½ Pfd. Rot (Stieglitze, Zeisige usw.) . . . . ℳ 0,90
1½ Pfd. Grün (Hänflinge, Gimpel usw.) . . . . ℳ 0,90
2 Pfd. Gelb (Kanarien, Bastarde usw.) . . . . ℳ 1,—
1½ Pfd. Insektenmehl . . . . . ℳ 2,—

Alle Bestellungen von Probesendungen, die bis Ende dieses Monats hier eingehen, werden gegen Voreinsendung des Betrages **franko** ausgeführt. — Nach vielen uns zugegangenen Zuschriften ist das Heidelberger Vogelfutter das beste, das bisher auf den Markt gekommen ist. — [471

Händler und Wiederverkäufer an allen Plätzen gesucht.

A. Böcher & Co., Heidelberg Kirchheim,

Fabrik für Heidelberger Vogelkäfige u. Heidelberger Vogelfutter.

Wer

in der „Gefiederten Welt" inseriert,

hat Erfolg!

---

1 Gelbspötter, 1 Schwarzplättchen, [472
1 Buchfink, 1 Graudrossel

für eine Ausstellung zu wissenschaftlichen Zwecken in hervorragend gut singenden Exemplaren gesucht.

Angebot erbittet

Karl Reich, Bremen, am Wall 171 II.

Wellensittiche, grüne Paar 14 Mark
„ gelbe „ 15 „
475] **ab Braunschweig.**

H. Behrke, Braunschweig, Sophienstr. 35.

Wellensittiche,

import., schöne, gesunde Vögel, Paar 15 Mark.

Graue Kardinäle
476] **Stück 9 Mark.**
Sperlingspapageien
Paar 20 Mark.
Goldstirnsittiche
Paar 25 Mark.
Safranfinken Paar 8 Mark.

Liste und Anfrage nur geg. Freimarke.

Beck, Tier-import, **Stuttgart.**

Zu kaufen gesucht:

fingerzahmer und möglichst etwas sprechender

kleiner

Gelbhauben-Kakadu

der kein zu großer Schreier ist, aus Privathand od. von Händler. Angebote unter **S H** an die Exp. dieser Zeitschrift. [477

Kleinen **Gelbhaubenkakadu,** schönes lebhaftes Tier, verkauft für 50 Mark.
Fr. Loose, Hamburg,
Neumünsterstraße 40. [478

Verkaufe oder tausche

je ein Zuchtpaar gr. u. gelbe **Wellsittiche** sowie einen fast neuen **Zuchtkäfig,** 40×55 cm. Tausche gegen **Papagei** oder **Spieläffchen** (andere größere Sittiche), zahle evtl. Gefl. Angebote an

Guido Zeeh, Buchhalter,
Pöhla i. Erzgeb.

Gebe ab:

Bastard Zeisig-Kanarien, tadellos, auch gegen **Nachtigall,** zahle zu. andere Vögel in Tausch.
Karl Krüger, Eiche b. Wildpark.

Verkaufe: „Gef. Welt" Jahrg. 19, 20 geb., 1921 u. 22 ungeb. mit Kunstbeil., ferner Der Vogelfänger Vogelwärter von D. J. Ischeiner, Hartlebens Verlag, 1820.
R. Edel, Würzburg,
Augustinerstr. 13.

Großer Gelbnacke

ganz junges kerngesundes **Prachtexemplar,** zahm, sprechend, intelligent, spielend leicht, umständeh. für 80.— zu verkaufen. Offerten unter **H H** die Expedition der Gef. Welt.

Vert.: 1 Zuchtp. Bandfink., 1 Zuchtp. Silberfasänch., 1 Zuchtp. Schmetterlinge Pr., 1 P. Tigerfink., Pr., 1 Amaranth weibch., sämtl. Tiere sind Ia i. Gefied. 2 Zuchtp. gr. od. rote Wellensittiche. **Störr, Zschopau,** an den Anlagen

---

2 Seidenschwänze

hat lebend à Stck. 20 Mark abzug. **Zollikofer,** Präparator, **St. Ga** (Schweiz). Kaufe oder eintausche 2 P. **Kirschkernbeißer.**

Tausche fingende

Feld-, sowie Heidelerchen

gegen bessere Exoten.
Weißenfels Schlf. 2

1,2 Eichhörnchen

zahme, niedliche, gesunde Tierchen, g. Gebot zu verkaufen.
W. Riese, Guben, Alt-Sprucke

Rote Kardinäle

1,1 Mark 55,—, 1,0 Mark 30
in tadellosem Gefieder, Verpackung
Menrath, Hamburg, Weidenallee

Anbiete:

Prächtige Sammlung ausgestopfter Vögel

meist seltene Exoten.
Anfragen Rückporto.

C. Balser, Fulda.

Für Bienenzüchter

Dzierzon's rationelle Bienenzucht.
Von Pfarrer Dr. Dzierzon
Auflage. Mit vielen Texta
Kart. 3.-

Leben u. Zucht der Honigbi
Ein gemeinverständliches Le über Behandlung der Bienen über Tätigkeit, Nutzen und Ana d. Biene v. Prof. Dr. O. Kran 2. verbesserte Aufl. Mit einer 82 Abbildungen u. 7 Kopfl Kart. 3.-

Zu beziehen durch:

Creutz'sche Verlagsbu handlung, Magdebur
Postschließfach 148.

Inserate

für das am 2. April 1925 zur Au gelangende 14. Heft der Gef W bitten bis 28. März 1925 fr

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 14
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdeb.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 2. April 1925 | Heft 14

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Die Nachtigall.

Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der Gesang der Nachtigall ist betreffs seiner Güte und Vollendung großen Schwankungen unterworfen, und es gehören jahrelange Studien dazu, will man ihn erfassen mit allen seinen Variationen, will man ein Bild gewinnen, was für ein Trennungsstrich zwischen einem Nachtigallenschlag in höchster Vollendung und dem eines erbärmlichen Stümpers gezogen werden muß. Ein Urteil über den Nachtigallenschlag soll man nicht so leichthin fällen, wenigstens nicht, wenn man nicht Gelegenheit hatte, ihn in allen seinen Schattierungen, sei es bis zur Stufe höchster Vollendung oder sei es bis zum tiefsten Niveau der Stümperhaftigkeit, zu studieren. Aus oberflächlicher Beurteilung entstehen falsche Schlüsse und würdigen einen Vogel herab und bringen ihn unberechtigterweise in Mißkredit. Dasselbe gilt auch vom Sprosserschlag, denn auch er verlangt ein gründliches Studium bis zum einwandfreien Urteil.

Die Güte des Nachtigallenschlages ist meiner Ansicht nach in Örtlichkeitsrassen begrenzt, nicht etwa, daß es nicht überall gute und schlechte Sänger gäbe, sondern was die Eigenart des Schlages anbetrifft in seiner Modulation und Tourenreichhaltigkeit. Das Nachtigallendorado der Umgebung von Leipzig ist ein ziemlich großes Gebiet und auch schon da kann man Arteigentümlichkeiten des Nachtigallenschlages feststellen. Eines ist sicher, daß wir im Leipziger Beobachtungsgebiet, das sich bis an die Saale erstreckt und nördlich in der Dessauer-Wörlitzer Gegend das stärkst besiedelte Gebiet findet, wirklich das Vollendetste im Nachtigallenschlag hören können. Eine verdiente Berühmtheit haben auch die rheinischen Nachtigallen erlangt, doch fehlt mir hierüber ein maßgebendes Urteil. Da ich nur wenige rheinische Nachtigallen im Schlage zu Gehör bekam, und nur im Käfig, so konnte ich auch keinen Vorrang gegenüber unseren hiesigen Nachtigallen feststellen. Es muß aber gesagt werden, daß diese wenigen Exemplare genügten, um von der Güte der rheinischen Nachtigallen eine Probe zu erhalten. Tief und vielseitig waren sie in ihren Touren, doch genügt dies nur kurz umrissene zu Gehör bekommene Bild des rheinischen Nachtigallenschlages nicht, um das Gesamtbild des dortigen Nachtigallenschlages einwandfrei zu charakterisieren. Die Güte des Nachtigallenschlages äußert sich 1. in einer möglichst tiefen Tonlage aller Touren, 2. in einer Reichlichkeit und einem Wohllaut derselben, 3. in einer weichen Modulation und in einer schmelzenden Verbindung derselben. Je zusammenhängender die einzelnen Touren sind und je ruhiger und getragener das Lied im Vortrag ist, umso wertvoller ist es. Einzelne Touren müssen in teils fallender, teils steigender Tonlage sich ab- oder aufwärts bewegen. Hohe, spitz erscheinende Touren entwerten den Schlag ebenso wie auch Touren in der tiefsten Tonlage beginnend und von Ton zu Ton steigend bis zum höchsten Ton den Schlag wertvoll machen. Geschätzte Touren im Liede der Nachtigall sind und müssen besonders tief vorgetragen werden. 1. Tü, tü, tü, tü, tü, tü, tü, tü, in tiefster Tonlage beginnend und in höchster endend. 2. Tor, tor, tor, tor, tor, tor, tor, tor, tief und hohl klingend. 3. Zui, zuie, zuie, zuie, zuie, zuie, zui, zuie, mit metallischem Klang. 4. Lü, lü, lü, lü, lü, lü, lück, in gleichmäßiger Tonlage und stets mit einem Schnapper, welcher in lück ausklingt, endigend. 4. Zok, zok, zok, zok, zok, zok, zok, zok, zok, hohl und gedehnt vorgetragen, ähnlich wie beim Sprosserschlag. 5. Eine ebenso beliebte sogenannte Wassertour, an den Sprosserschlag erinnernd, ist das Goll, goll, goll, goll, goll, goll, goll, golliß. Diese Tour ist sehr wertvoll und ebenso selten, muß auch stets in ein im Ton steigendes iß auslauten. 6. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, tief und in scharfer Betonung des u. 7. Zwur, zwur, zwur, zwur, zwur, zwur, zwur, zwur, metallisch klingend. 8. Twoi, twoi, heze, heze, tick, tick, tick. Weniger beliebt, weil meist in sehr hoher Tonlage vorgetragen, sind die Touren: 1. Zink, zink, zink, zink, zink, zink, zink, zink, doch wird es noch gerne gehört, wenn es nicht zu oft gebracht wird. 2. Ebenso ist es mit dem Zi, zi, zi, zi oder si, si, si, si, welches manchmal zum Überdruß vorgetragen wird. Selbstverständlich gibt es noch viele andere Touren, die seltener erscheinen, dabei sind wertvolle, aber auch ganz miserable „Schnitzer“. Damit ist aber nicht gesagt, daß eine Nachtigall, wie z. B. mit der von den Liebhabern als „Grätzschtour“ bezeichneten, richtiger aber

als „Presse“ bekannten Tour im Gesange minderwertig ist. Fast jede Nachtigall hat auch weniger beliebte, daher nicht gern gehörte Touren. Wiegen diese vor, das heißt, werden sie sehr oft gebracht, so verliert das Lied, gegenteilig ist ein Lied mit tiefen, hohlen, schon abgerundeten und in zusammenhängender Verschmelzung gebrachten Touren auch noch sehr wertvoll, wenn einige „Schnitzer“ selten gebracht werden. Nachtigallenschlag, ebenso jedes Vogellied läßt sich in menschlichen Stimmlauten sehr schwer wiedergeben, in Wirklichkeit ähneln die einzelnen Touren nur scheinbar den in Worten wiedergegebenen Tönen. Will man also ein Nachtigallenlied als Kenner beurteilen, so muß man es in der feierlichen Stille der Natur auf sich einwirken lassen. Nur da ist das Herz empfänglich für die unbeschreiblichen Feinheiten im Liede der Nachtigall. Wird eine Tour zu oft gebracht und stets ohne einen abwechselnden Übergang auf eine andere, so hebt dieses die Güte des Schlages nicht, im Gegenteil, je mehr die Nachtigall mit ihrem reichlichen Tourenschatze im Liede wechselt und ohne hörbare Pause von einer Tour in die andere in harmonische Verschmelzung übergeht, um so wertvoller ist der Schlag. Wenn ich bei dem Versuch, beliebte Touren in Worten wiederzugeben, jede Tour mit acht Silben anführte, so soll damit nicht gesagt sein, daß jede Tour in dieser Ausdehnung gebracht werden muß; ich höre es gerne in einer 6—8fachen Wiederholung, ja, manche Strophe, wie z. B. das Tü, tü, tü, veredelt den Schlag, wenn sie recht oft hintereinander in stets steigender Tonlage gebracht wird. Mit dieser mir ungemein ans Herz gewachsenen Tour muß sie klagen, muß sie schluchzen, wenn Wehmut einziehen soll ins Herz des andächtigen Lauschers, mit dieser Strophe muß mir die Sangeskönigin aufwarten, wenn sie das Prädikat „Gut“ erhalten soll. Der Geschmack spielt bei Beurteilung des Vogelliedes stets eine Rolle mit, ja selbst der sachlichste Kenner und unparteiischste Beurteiler hat in dieser Beziehung eine schwache Ader. Nun, warum soll ich nicht auch meine Lieblingstour haben im Nachtigallenlied! Man hört manchmal tourenarme Schläger, die trotz stundenlangem Abhören es kaum auf ein Dutzend Touren bringen, ebenso gibt es auch Ia Schläger, die es auf 25—30 Touren bringen. Im Nachtigallenlied unterscheide ich Haupttouren und Nebentouren, zu den Haupttouren zählen alle Touren, die in mehrmaliger Wiederholung ohne Einsprengung anderer Laute gebracht werden, während die sogenannten Nebentouren meistens nur als Übergänge resp. Verbindungen und Abschlüsse der Haupttouren auftreten. Zersplittert eine Nachtigall durch häufige Einmengung dieser Nebentouren oder kurzen Strophen die Haupttouren oder Hauptstrophen, so wird sie, mögen die Töne noch so rein und wohltuend sein, ihren Schlag herabwürdigen ebenso wie eine solche, die eine überstürzte, abgebrochene, jegliche Verschmelzung der einzelnen Touren entbehrende Vortragsweise hat, stark in der Wertschätzung verliert. Der Liebhaber bezeichnet diese häufige Erscheinung stets mit den Worten: „Die ist nicht im Feuer“, was ja zum Teil auch vielleicht meist zutrifft. Doch gibt es auch Nachtigallen, bei denen ein abgebrochener, aber trotzdem überstürzter Vortrag des Schlages individuell ist. Will das Lied vom Kenner die Belobigung „Sehr gut“ erhalten, so muß es alle Vorzüge und Feinheiten aufweisen, es muß weich, ohne harte Übergänge, vielseitig in der Anzahl der Touren und in denselben nicht kurz und spitz sein, ebenso dürfen dieselben nicht zu oft wiederkehren. Das Nachtigallenlied zu studieren, ist wirklich lohnenswert, man wird staunen, welche Differenzen sich in bezug auf Vielseitigkeit, Reinheit, Tiefe und Vortragsweise der Touren im Liede des einzelnen Individuums auffallend bemerkbar machen. Leider ist diese Möglichkeit nur demjenigen Glücklichen gegeben, der den Vorteil genießen kann, in einem stark besetzten Nachtigallengebiet seine Beobachtungsstudien zu machen. Mein Herzenswunsch wäre, gehörte ich zu dem hierzu genügend Begüterten, so wie das Nachtigallenlied, auch den Sprosserschlag in allen Örtlichkeitsrassen zu studieren, Gelegenheit zu haben. Sicher gibt es manchen Liebhaber, dem dies Glück beschieden wäre, aber leider ist der menschliche Sprachschatz, sind menschliche Laute, geschriebene Worte viel zu armselig, um auch nur einen Schein von dem Kunstgesang dieser beiden Sängerfürsten in der Schrift zu schildern. Für gar manchen weniger begüterten Liebhaber wird wohl der Besitz von prima Schlägern dieser beiden Virtuosen des Vogelgesanges ein nie endender schöner Traum des Lebens bleiben. Wäre doch jeder so glücklich, dem das Herz voll ist von Liebe und Sehnsucht für einen dieser beiden, den Sängerkönig Sprosser und die Sängerkönigin Nachtigall, den Schlag dieser im trauten Heim zu genießen, der Inhalt seines Lebens wäre um einem wertvollen Schatz bereichert.

(Fortsetzung folgt.)

Goldhähnchen, Baumläufer und Meisen.

Von W. R., Berlin.

(Nachdruck verboten.)

Wenn im Winter Schnee und Reif die Zweige der Kiefern bedecken, dann hören wir häufig den bekannten Ruf des Goldhähnchens in nächster Nähe. Dann suchen jene Kleinsten unserer Vogelwelt in niedrigen Kiefernschonungen jedes Zweigchen ab nach Nahrung: winzigen Insekten, deren Eier und Puppen. Da glückt es häufig, einen von ihnen mittels einer Leimrute zu erhaschen oder gar, wenn die Not groß ist, mit der Hand zu greifen. Dieses Glück hatte ich einmal und nahm mir zwei Vögelchen mit heim. Sie sahen schon recht schlecht aus, und ich glaubte kaum, daß ich diese zusammengekauerten Federbällchen noch einmal zum Leben erwecken kann. Bald war ich zu Hause angelangt und flößte ihnen die Eingeweide eines Mehlwurmes ein, dem noch mehrere folgten. Sie erholten sich und wurden munter. Ich hatte sie zur rechten Zeit ergriffen, sonst wären sie draußen elend zugrunde gegangen. In einem kleinen Kistenkäfig, der mit einigen Fichten- und Kiefernzweigen ausgestattet, wurden sie anfangs untergebracht. Zufällig hatte sich an einem meiner Blumentöpfe eine Anzahl Blattläuse den Winter über gehalten, diese gab ich den Zwergen, und sie pickten sie von den Zweigen ab. Nachdem ich sie mit noch

einigen Mehlwürmern, „zerdrückt", gestopft hatte, bequemten sie sich bald, zerschnittene oder kleine Würmer von der Pinzette abzunehmen. Welche Dienste hätten mir hier die Kornkäferlarven des Herrn Schwarz geleistet! Hoffentlich gelingt es vielen Liebhabern, diesen für unsere zarten Weichfresser so wertvollen Käfer erfolgreich zu züchten. Es dauerte gar nicht lange, so fraßen meine Goldhähnchen schon kleine und zerschnittene Mehlwürmer aus einem Futternapf. Da ich sie nicht allein mit Würmern ernähren wollte, so wurde ein gutes Futtergemisch zubereitet, daß aus gutem, gemahlenem Gebäck und vielen trockenen Ameisenpuppen bestand. Obenauf legte ich Mehlwürmer, ganz und zerschnitten, und ein wenig gehacktes Ei, welch letzteres von ihnen bald gern gefressen wurde. Die Eingewöhnung der Goldhähnchen machte mir nicht allzuviel Schwierigkeiten. Ich hatte anfangs mehr erwartet.

Ein Zusammhalten dieser zarten Vögel mit anderen kleinen Arten ist wohl möglich, wie mit Baumläufern und kleinen Meisen. Doch scheint es mir bei weitem besser zu sein, nur Goldhähnchen in mehreren Stücken zusammenzuhalten. Baumläufer und auch kleine Meisen fressen, da sie ja auch größer sind als Goldhähnchen, verhältnismäßig mehr und nehmen daher die besten Happen, Mehlwürmer und Eigelb bald weg, so daß den Goldhähnchen nicht viel übrigbleibt. Auch lassen sich letztere vom Futternapf verdrängen. Ich habe das Zusammenhalten der Vögel wiederholt versucht und bin davon abgekommen. Vielleicht geht es mit kleinen Laubsängern besser. Doch glaube ich, daß hierbei die Dinge nicht anders liegen.

Die Goldhähnchen bedürfen selbstverständlich einer sorgfältigen und guten Pflege. Es soll nicht durch meine Ausführungen der Anschein erweckt werden,



Goldhähnchen.

Einmal eingewöhnt, zeigten sie sich recht dauerhaft. Sie bezogen nun einen größeren Käfig, der mit einigen dünnen Sitzstangen, Kiefern- und Fichtenzweigen ausgestattet wurde. Hierin lebten beide, es war ein Paar, längere Zeit. In diesem großen Behälter kam so recht ihr ganzes Benehmen und ihre Bewegungen zum Vorschein. Ich glaube nach den Beobachtungen, die ich an den Goldhähnchen gemacht habe, daß sie nach anfänglicher Eingewöhnung im kleinen Kistenkäfig, später, um ausdauernd und gut sich zu halten, eines größeren Käfigs, der am besten ein Kistenkäfig ist oder eine hölzerne Rückwand hat, bedürfen. Sie sind sehr beweglich und fliegen auch gern umher. In einem kleinen Behälter sind sie träger und werden, da sie gern fressen, bald fett und krank. Sie eigentlich vom ersten Tage ihres Daseins in meinem Käfig recht zutraulich, was ja zunächst auf ihre Mattigkeit zurückzuführen ist. Sie blieben zahm und ließen sich durch meine Annäherung beim Trinken und Fressen nicht stören. Vom Badegefäß machten sie täglichen Gebrauch. Wiederholt sah ich beide auf einem Zweige völlig durchnäßt sitzen und sich das Gefieder trocknen.

als ob sie so leicht zu halten sind. Doch wiederum ist ihre Haltung, besonders wenn sie gut eingewöhnt sind, nicht so schwierig, wie es im allgemeinen geglaubt wird.

Im Sommer ersetzt man einen Teil der getrockneten durch frische Ameisenpuppen. Auch, wie schon erwähnt, sind Blattläuse und andere kleine Insekten ein nicht zu verachtendes Futter. Während der Sommermonate, in der Brutzeit, befestigte ich im Käfig einen harzer Bauer in der Annahme, daß sie vielleicht darin ihre Kinderwiege aufschlagen würden. Dieser Nistkasten wurde von einigen Fichtenzweigen umkleidet. Zwar benutzte ein und der andere ihn als Schlafplatz, aber es wurden keine Anstalten zum Nestbau und zur Brut gemacht. Doch ist die Züchtung des Goldhähnchens Herrn Soffel bereits gelungen. Allerdings wurde hier das Nest in eine lebende Fichte gebaut, die mit Drahtgitter umgeben war. So reizt immer wieder auch die Haltung unserer zarten Weichfresser zu neuen Hoffnungen, die, so glaube ich, auch ein und dem anderen Liebhaber in Erfüllung gehen werden. Da gibt es noch weit mehr zu beobachten und zu beachten. Mögen

nur recht viele Vogelfreunde Zuchtversuche nicht nur mit aus- und inländischen Körnerfressern, sondern auch mit unseren heimischen Insektenfressern anstellen. Mancher Erfolg und manche neue Beobachtung würde dann erzielt, und das Wissen aller etwas bereichert werden.

Baumläufer.

Der Baumläufer, den wir in unserer Heimat in zwei Arten kennen, die auch untereinander Mischlinge bilden, ist ein ebenso zarter Bewohner unserer Käfige wie das Goldhähnchen. Er bedarf derselben aufmerksamen und sorgfältigen Pflege wie diese. Auch die Eingewöhnung des Baumläufers macht dieselben Schwierigkeiten und erfolgt auf ähnliche Weise.

Mir haben diese zierlichen Vögel stets zugesagt. Ihr ganzes Benehmen fällt so ganz aus dem Rahmen der meisten Singvögel heraus. Stets beweglich, klettert er bald auf einen dicken, quer durch den Käfig angebrachten Kiefernast oder an der die Käfigrückwand bekleidenden Borke entlang. Dann wieder, besonders im Sommer zur Mittagszeit, sitzt er an irgendeinem Plätzchen, gleich einer Federkugel, und hält sein Schläfchen. Mit dem langen, leicht gebogenen Schnabel untersucht er jeden Winkel der rissigen Kiefernrinde nach winzigen Insekten und deren Eier. In den für Baumläufer bestimmten Käfigen hatte ich stets die Rückwand mit Kiefernrinde bekleidet und einen dickeren querliegenden Kiefernast schräg im Käfig angebracht. Die Rinde und der Stamm müssen einer häufigen Reinigung unterzogen werden, da sie von den Insassen, die sich meist auf und an ihnen aufhalten, beschmutzt werden. Häufig klettern leider die Baumläufer auch am Käfiggitter entlang und zerstoßen sich dadurch ihre zum Klettern, ähnlich wie bei den Spechten, eingerichteten Schwanzfedern. In einer Käfigecke brachte ich stets einige frische Kieferzweigchen an.

Längere Zeit bewohnten einen größeren Käfig vier Baumläufer, von denen je zwei verschiedenen Arten angehörten. In dem Benehmen der beiden Arten konnte ich nur geringe Unterschiede feststellen. Mir scheint der kleinere Hausbaumläufer der ruhigere zu sein, doch mag hierbei auch die individuelle Veranlagung eine Rolle spielen. Untereinander vertrugen sie sich gut. Nur am Futternapf entspann sich häufig ein Kampf um die so sehr begehrten Mehlwürmer, der meist damit endete, daß jeder der Partner ein Stückchen erhielt. Doch scheint es mir besser zu sein, die einzelnen Arten nur paarweise zu halten, oder, besser gesagt, überhaupt nur zwei Baumläufer in einem Käfig einzusperren. Die Regulierung des Futterzustandes ist auf die Art besser. Wenn mehrere zusammen gehalten werden, so kommt häufig der eine und der andere nicht zu seinem Recht. Die stärkeren und dreisteren fressen zunächst die Mehlwürmer weg, so daß die schwächeren wenige oder gar keine erhalten. Den Baumläufern nun wieder sehr viele Würmer zu reichen, daß alle dabei zufriedengestellt werden, ist sowohl für den Geldbeutel als auch für das Wohlbefinden der Vögel abträglich. Bei einer zu reichlichen Beigabe von Mehlwürmern fressen sie wenig von dem dargebotenen Weichfutter und wollen es schließlich nicht mehr annehmen. Ähnliche Erfahrungen kann man ja auch bei der Pflege der Meisen machen. Erwähnen möchte ich noch den niedlichen und melodischen Gesang der Baumläufermännchen. Dem Pfleger gegenüber werden sie bald zahm und zutraulich und zeigen keine Scheu vor ihm.

(Schluß folgt)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Eine den Timalien nahestehende Unterfamilie der „Sänger" sind die Drosslinge — Cratheropodinae, von denen der Hockelmannsche Import eine ganze Reihe indischer Vögel brachte, darunter in größerer Anzahl den schönen Weißhauben- und den Weißkehlhäherling, den großen, schön gezeichneten Strichelhäherling, den Borstenhäherling in einigen Stücken, etwa ein Dutzend Stelzenhäherlinge — trya malcolmi *(Lyhes)* und als Neueinführung den

gestrichelten Rohrdrosling — trgya earli.

Drosslinge sind drosselartige Vögel mit ziemlich kurzen stumpfen Flügeln, deren vierte, fünfte oder sechste Schwinge am längsten sind, der Schwanz ist zwölffedrig. Ihre Verbreitung erstreckt sich über die tropischen und subtropischen Gebiete der alten Welt. Der Schnabel ist ähnlich dem der Drosseln, ist leicht gekrümmt und hat unbedeckte schlitzförmige Nasenlöcher. Von den Keilschwanzdrosslingen — trgya *Less.* ist besonders hervorzuheben das weiche, schlicht gefärbte Gefieder, der lange starkstufige Schwanz, der länger ist als die Flügel, die gelbliche Farbe des Schnabels und die kräftigen hellfarbenen Füße. Von den 18 bekannten Arten, welche in Indien, Westasien, Nord- und Südafrika leben, sind bisher drei Arten eingeführt, die vierte Art ist der gestrichelte Braunrückendrosling. Der Stelzenhäherling (s. Abb. S. 78), welcher zuerst 1909 in den Zoologischen Garten gelangte, ist ein Bewohner Vorderindiens, der in manchen Gegenden seines weiten Verbreitungsgebiets im Dschungel und wilden Bergschluchten lebt, besonders im Süden, während er im Norden auf Feldern, in Hecken und Gärten, in und um menschliche Niederlassungen lebt „als unverletzlicher Hausfreund der Bewohner", wie ihn Ferdon bezeichnet. Er ist, wie alle Häherlinge und Drosslinge, ein lebhafter, lärmend umherstreichender geselliger Vogel, dessen klangvolle Rufe man gern hört. Sein Flug ist kraftlos und unsicher. Er hält sich viel am Boden auf, wo er eifrig nach Art der Drosseln im trockenen Laube scharrend, und mit Füßen und Schnabel die Blätter umwendend, Nahrung sucht, besonders Käfer und Heuschrecken, gelegentlich auch Samen.

Der Rohrdrosling ist ein Bewohner der Ebenen des nördlichen Vorderindiens. Hier lebt er in den ausgedehnten dichten Rohr- und Grasdschungeln besonders in der Nähe von Wasser, das er sehr liebt, in Flügen von sechs bis acht Vögeln, die eng zusammenhalten, häufig auch in noch größeren Flügen, die aus dem dichten Pflanzenwuchs herausflattern und bald wieder in ihm untertauchen. Selten sind sie am Boden beobachtet worden.

Wenn sie in großen Flügen umherstreichen, begibt sich einer von ihnen auf einen erhöhten Gegenstand, um freie Umschau zu halten und die übrigen vor Gefahren zu warnen. Ihre Nahrung besteht anscheinend ausschließlich in Kerfen.

Der Rohrdroßling ist in seinem Verbreitungsgebiet ein gemeiner Vogel, den man fast an allen Flußufern häufig antrifft, und dessen Stimme wohl bekannt ist, da man sie häufig als einzige Vogelstimme hört, solange man an den Flußufern entlang geht, ein klares, tiefes, ziemlich lautes schwatzendes Geplauder. Aber nicht nur an den Ufern der Flüsse

Gestrichelter Rohrdroßling.

ist er häufig, sondern auch an rohrumkränzten Seen und Kanälen, die dauernd Wasser führen, ist er zu finden. In diesen Gebieten, besonders wenn sie sumpfig und nicht zu kühl sind, baut er auch sein napfförmiges Nest ziemlich umfangreich und fest. Es steht zwischen dicht emporgeschossenen Rohrhalmen, an denen es angeheftet ist, oder in niederm Gebüsch und Gesträuch, welches mehr oder weniger dicht von Riedgras durchwachsen oder umgeben ist, gut in einer Astgabel befestigt. Die breiten Rohrblätter, Wurzeln dieser Pflanze, gewöhnliches Gras und seine Wurzeln verwendet er zum Bau des Nestes, dessen Gestalt und Größe von der Feinheit des verwendeten Materials abhängig ist. Die Nester, welche ganz aus Rohrblättern erbaut sind, sind wesentlich umfangreicher als die aus feinen Grasblättern erbauten, welche besonders fest sind, wenn sie den Rohrhalmen angeheftet sind. Die Nestmulde ist im Innern stets glatt, aber nur selten ist sie ausgepolstert, und dann nur mit wenigen feinen Grashalmen oder Graswurzeln. In einem auffallend dichten Grasdickicht fand Oats mehrere Nester unweit voneinander, und zwar waren diese nicht an den Halmen angeheftet, sondern lagen lose auf dem dichten grasigen Unterwuchs.

Die Brutzeit beginnt gegen Ende des Monats März und dehnt sich aus bis Mitte September. In dieser Zeit werden gewöhnlich zwei Bruten gezeitigt. Das Gelege besteht aus zwei bis vier hellgrünlichblauen Eiern von ziemlich länglicher Eiform (22—25 × 17,5—18,2).

Gefiederbeschreibung: ♂♀ oberseits trüb rostbraun, am Oberkopf, Hals, Schultern, Vorderrücken mit schwarzbraunen Schaftflecken; Grund der Stirnfedern über dem Auge aschgrau mit schwarzen Federmitten; Zügel weißlich; Ohrdecken graubraun, weinrötlich überlaufen und mit schwärzlichen Schaftlinien; unterseits hell rostbraun und den Flanken mehr graubraun; Kropfgegend weinrötlich verwaschen mit schwarzen Schaftstreifen; Flügeldecken hell erdbraun mit schwärzlichen Schaftlinien; Schwingen hellbraun, außen hell graubraun, innerste mit schwärzlichen Schaftstrichen; Unterflügeldecken hell ockergelblich; Schwanzfedern hellbraun, nach außen und an den Spitzen heller, unter gewissem Licht mit dunklerer Querbänderung; Auge leuchtend gelb; Schnabel hell grünlichgelb, Firste und Spitze dunkler; Füße trüb grünlichhorngelb; Lg. 217,5, Fl. 76, Schw. 107,5, Schn. 20,5, Lf. 32,5 mm.

Die farbenprächtigen Fliegenschnäpper Indiens waren stets begehrt von den Liebhabern farbenprächtiger fremdländischer Vögel. Der Bedarf dieser konnte wenigstens an einigen Arten reichlich befriedigt werden. Blaubrüstige Blauschnäpper und blaugraue Fliegenschnäpper waren zahlreich vorhanden, auch der schöne Niltawaschnäpper war mehrfach vorhanden, auch Weibchen dieser Art (s. Abb. S. 162). Sie kamen mit dem großen Transport indischer Vögel. Ab und zu gelangen aber auch seltene Arten in den Besitz von Liebhabern, die wohl in einzelnen Stücken von Seeleuten eingeführt werden, von denen daheim in Vogelstuben und Flugkäfigen man nur zufällig hört. So verhält es sich mit dem Zwergniltawaschnäpper und dem großen Niltawaschnäpper, die sowohl im Besitz englischer wie auch deutscher Vogelpfleger gelangten. Der

Zwergniltawaschnäpper — Niltava macgrigoriae *(Burt.)*

war im Besitz des Herrn Troschütz in Hannover (s. Abb. S. 161). Seine Verbreitung erstreckt sich über das östliche Himalajagebiet von Garhwal östlich bis ins nördliche Tinasserien. Er lebt in Höhen von 750—1250 m. Nach Art der Fliegenschnäpper jagt er fliegende Insekten, aber nimmt sie auch vom Erdboden, indem er sie von seiner Warte aus, einem fernstehenden, unbelaubten Zweig eines Gebüsches, zu erspähen sucht. Er scheint sich in seiner Lebensweise nicht wesentlich von unserem Fliegenschnäpper zu unterscheiden. Im Nestbau scheint er sich, wie unser Grauschnäpper, ganz den Verhältnissen anzupassen. Bald baut er ein freistehendes Nest, bald benutzt er zum Nestbau Höhlungen, Felsvorsprünge und dgl. Niemals scheint er auf Baumästen zu bauen. Das ziemlich große, sorgfältig gebaute Nest wurde sowohl freistehend auf dem Erdboden stehend gefunden, wie zwischen den Wurzeln eines Baumes. Andere standen in dem ausgefaulten Astloch eines umgestürzten toten Stammes oder auf einem Felsvorsprung. Innen waren sie aus einem sehr feinen, weichen, federartigen, grünen Moos gebaut und zuweilen im Innern mit sehr feinen schwarzbraunen Mooswurzeln gepolstert. Zuweilen fand man in dem Nestboden einige trockene Blätter. Das Gelege, das in den Monaten April bis Juni gefunden wird, besteht aus 3—4 rötlich- oder geblichweißen ungefleckten Eiern.

♂ Oberseits leuchtend purpurblau; Stirn, Augenbrauenstreif, Bürzel, Oberschwanzdecken, Fleck auf den Halsseiten leuchtend kobaltblau; Zügel, Federn am Grunde des Oberschnabels, vor und unter dem Auge, schwarz; Wangen, Ohrdecken, Kinn, Kehle, Brust purpurblau; übrige Unterseite, zuweilen auch Brust aschgrau; Bauchmitte, Unterschwanzdecken weißlich; kleine Flügeldecken braun mit blauen Spitzen; mittlere Flügeldecken blau; große und Schwingen schwarzbraun blau gesäumt; mittlere Schwanzfedern blau, die anderen innen schwarzbraun, außen blau; Unterflügeldecken grauweiß; Schnabel schwarz; Füße rötlich schwarz; Auge dunkelbraun; Lg. 125, Fl. 62, Schw. 52 mm.

♀ oberseits olivbraun, rostfarben überlaufen; Flügelfedern braun, rostfarben gerandet; Schwanz schwarzbraun; Kopfseite rostbräunlich mit braun gemischt; blauen Fleck an den Halsseiten; unterseits gelblich ockerfarben, nach hinten heller werdend; Unterflügeldecken weiß.

Erreicht dieser kleine Fliegenschnäpper an Farbenschönheit auch nicht den prächtigen Rotbauchfliegenschnäpper, so ist er doch ein ausnehmend schöner Vogel, dessen tiefblaue Farbentöne in scharfem Gegensatz zu dem leuchtenden Kobaltblau des Oberkopfes und der hellen Flecken an den Halsseiten in den verschiedensten Nuancen zur Geltung kommen. Ich hoffe, daß Herr Troschütz die Lücken in unserm Wissen betreffs Gesang, Verträglichkeit mit andern und seines Wesens und Benehmens in der Gefangenschaft ausfüllen wird. In der Ernährung wird er voraussichtlich mit dem Rotbauchfliegenschnäpper übereinstimmen, dem ein gutes Nachtigallenfutter, allerlei lebende Kerfe und frische Ameisenpuppen gereicht werden. Die Frage, ob er sich an die Annahme von Obst (Apfel-, Birnenschnitte) und Beeren (Ebereschen, Holunderbeeren) gewöhnen läßt wie der größere Verwandte, bedarf noch der Feststellung.

(Fortsetzung folgt.)

Dompfaffenzucht.

Von Amtmann Max Krumm.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Ich habe zu meinem großen Leidwesen die Jungen der zweiten Brut selbst nicht ausfliegen sehen. Kurz vor ihrem Ausfliegen und als das Weibchen mit der Eiablage der dritten Brut begann, mußte ich eine Badereise antreten. Ich gab meinem sonst tierverständigen Dienstmädchen für die Pflege genaue Anweisung. Sie teilte mir kurz darauf auf Postkarte mit, daß die Jungen der zweiten Brut, sechs Stück, ausgeflogen seien. Nach drei Wochen kehrte ich zurück. Die dritte Brut war verdorben, die Jungen im Nest gestorben. Offenbar war die Fütterung durchaus vernachlässigt worden; die Tiere müssen zuletzt Mangel an grünem Samen erlitten und statt dessen unzureichendes oder schlechtes Futter bekommen haben. Ich konnte nichts genaues feststellen; auf die Aussage des Mädchens konnte ich nichts geben. Daß die Tiere aber Futternot gelitten hatten, sah ich daraus, daß der im Käfig stehende trockene Samen fast ganz verbraucht war. Wenn die Tiere schon bloß geweichten Samen gehabt hätten, wären sie an den trockenen Samen nicht herangegangen. Von den 12 jungen Gimpeln (erste und zweite Brut) waren schon drei gestorben, drei waren krank, außerdem sogar das Brutweibchen; ich konstatierte sofort Kalkschiß (sogenannte Freßkrankheit). Es war zu spät, zwei der jungen Vögel, mit die ältesten, gingen mir noch ein. Das alte, bewährte Weibchen und den dritten kranken Jungvogel konnte ich noch retten. Ich steckte sie in einen geschlossenen und mit Luftlöchern versehenen kleinen Pappkasten, setzte ihn über eine Stoffunterlage auf den Heizkörper der Dampfheizung und gab ihnen, so warm als erträglich, mit kurzen Unterbrechungen, zwei Tage lang Heißluftbäder. Zwischendurch fütterte ich den Saft von frischen Ameiseneiern, nur ganz wenig, und gab Tröpfchen von verdünntem Rotwein zu trinken. Ich folgte dabei einem gewissen Instinkt. Meiner Überzeugung nach wären auch die beiden Tiere gestorben, wenn ich nicht das Hitzbad angewandt hätte; hauptsächlich wird die Heilung wohl darauf zurückzuführen sein. Es war für die Vögel allerdings eine sogenannte Pferdekur.

Hier möchte ich im allgemeinen einschalten, was ich über das von Schlag und von vielen anderen, z. B. von Lehrer Syré in diesen Blättern noch 1916 Seite 15 beklagte große Sterben der aufgezogenen

Dompfaffen überhaupt denke. Es scheint festzustehen, daß es nicht daher rührt, daß es, wie Schlag meint, wir ein unentbehrliches Naturfutter nicht kennen und daher nicht geben können. Doch denke auch ich, und es wird unbedingt richtig sein, daß die Krankheit eine Folge schlechter Säfte infolge unrichtiger Ernährung ist. Es dürfte eine Konstitutionskrankheit infolge allgemeinen Vitaminemangels sein (wie beim Menschen Skorbut). Die verheerenden Darmentzündungen des Kalkschisses mit Menschenkrankheit verglichen, sei hingewiesen zum Beispiel auf die auch als Folge einer Jauchevergiftung des Blutes sekundär auftretende Dysenterie der Menschen. Ich meine selbstverständlich nicht, daß die Bakterien des Kalkdurchfalles etwa aus der Blutverdorbenheit unmittelbar hervorgehen, meine aber, daß sie in den zersetzten Säften ihren Nährboden und leichte Lebensbedingungen finden. Die geringste Verdauungsstörung oder die Aufnahme des Störungsstoffes von anderen Vögeln löst dann die Darmentzündung, Sepsis und den Verfall aus. Spätestens tritt die Seuche bei der großen Belastungsprobe des Körpers durch die Mauser ein; in der Mauser bekommen wir ja stets die Quittung für alle vorhergehenden Fehler und Sünden. Ich möchte anführen: Nach meinem Versuch mit aufgepäppelten Dompfaffen ist die Krankheit jedesmal dann nicht aufgetreten, wenn die Jungen geringe Mengen gequetschten frischen und halbreifen Samens als Zugabe erhalten hatten. Die Zugabe von Menschenhand ist aber mühsam, und ich habe keine Zeit dazu. Meine Erfahrungen in der künstlichen Aufzucht sind nicht sehr groß und noch zu neu, auch immerhin zu wenig an einer hinreichenden Zahl von Wiederholungen erprobt, als daß ich sie als gültige Regeln unter allen Umständen verteidigen kann. Aufmerksam zu machen, um andere zu Versuchen anzuregen, halte ich mich jetzt schon für verpflichtet.

Baumläufer.

Doch nun zu dem Ergebnis meiner vorjährigen ersten Zucht zurück. Sieben junge Dompfaffen sind mir also geblieben. Die gesunden hatte ich natürlich sofort von den kranken abgesondert und den ganzen Käfig nebst Zubehör mit Kreolinlösung ausgewaschen.

Die Jungen überstanden die Mauser sämtlich, nicht zuletzt wohl dank reichlicher Fütterung mit frischen Distelsamen und Ei, und weil sie bis weit ins Jahr hinein noch immer geweichten Samen bekamen. Sie badeten sehr fleißig. Auch konnten sie sich stets an frischen Tannenzweigen erquicken. Gleichfalls gab ich frischen, noch weichen Tannensamen. — Ich spalte die Tannenzapfen mit Messer und Hammer längseits in zwei Hälften und kann dann die Schuppen der Zapfen besser abziehen, an denen der Samen hängt und die ich einwerfe. — Man bereitet damit den Tieren einen Hochgenuß.

4 Junge sind Männchen, 3 Weibchen. Die Körpergröße verhält sich ungefähr im umgekehrten Verhältnis zu den Alten, die jungen Weibchen haben die Stärke des alten Männchens, die jungen Männchen haben zarten Gliederbau wie das alte Weibchen. Die Entdeckung, wie sich beim Übergang aus dem Jugendkleid Männchen entpuppen, macht immer viel Freude. Die roten Federn kamen zuerst fleckenweise zum Vorschein, bis dann die ganze Brust allmählich rot wurde. So prächtiges Gefieder wie der Alte haben die Jungen nicht; das Rot der Hähne hat einen schwächeren Ton, ist flaumiger und zarter. Ich glaube aber, daß es noch intensiver wird. Die andere Färbung in der Schattierung des Rot kann aber auch Erbteil der Mutter sein. Bei einem jungen Männchen ist anzunehmen, daß es nicht gut sieht. Es rüttelt auffallend mit den Flügeln in der Luft, ehe es sich auf einen Zweig niederläßt. Auch kann es einen hingeworfenen Leckerbissen schwer finden, obgleich es doch deutlich wahrnimmt, daß er hingeworfen wird, und gleich darauf zufliegt. Es ist weder der Vogel, der sich schlecht befiederte, noch der, der an Kalkschiß schwer krank war. Ob es von der Hanffütterung kommt? Ich nehme es an. Auch diese Beobachtung, die ich bei weiteren Bruten verfolgen werde, gäbe unter Umständen Winke für zweckmäßige Fütterung.

Eine andere Beobachtung möchte ich hier noch anfügen. Von den Jungen hat keines die schwarzen Flecken, die das alte Weibchen im vorigen Federkleid aufwies. Das alte Weibchen hat in der neuen Mauser bei mir auch seine Schwarzfärbung vollkommen verloren und jetzt ein durchaus normales Gefieder. Schlag erwähnt diese Schwarzfärbung auch. Er ist der Ansicht, daß die Färbung der Tiere lebenslänglich bleibt, es also sich um eine gewisse Spielart handelt. Auch von anderen Leuten, alten Vogelkennern, habe ich ähnliche Meinungen gehört. Einer, der viel Dompfaffen selbst aufpäppelte, behauptete sogar steif und fest, daß das sechste Ei immer einen schwärzlich gefärbten Vogel ergebe.

Nach meinen Erfahrungen glaube ich nichts davon, sonst hätte sich mein altes Weibchen nicht normal umfärben können, und hätte irgend eins von meinen sieben Jungen die schwarze Farbe erben müssen. Brehms Tierleben neuester Auflage (das von andern fortgeführte Werk des größten deutschen und für mich unübertroffenen Tierkenners — die neuen Auflagen enthalten nebenbei unter Verwendung Brehm'scher Angaben von seinem Geiste immer weniger und stellen sich dafür desto öfter zu seiner Grundeinstellung in Gegensatz) sagt: „Füttert man die Gefangenen mit fetten Sämereien, besonders Hanf, so werden sie häufig schwarz". Nach meinen Beobachtungen halte ich auch das nicht für richtig. Meine Gimpel wenigstens sind im geräumigen Stubenkäfig bei der Fütterung ausschließlich mit Hanf oder nur ölhaltigen Sämereien noch niemals schwarz geworden. Meines Erachtens erklärt sich die schwärzere Färbung dadurch, daß die äußeren Spitzen der Deckfedern (Konturfedern) abgescheuert sind und die schwarzen Untergefiederdunen dann mehr hervortreten. Es mag sein, daß Hanffütterung die Federn spröde macht und dann in engen Käfigen die Spitzen sich eher abstoßen, das „Tierleben" also insofern recht hat. (Schluß folgt.)

Nächtliches Toben der Körnerfresser.

Zur Anfrage 7.

Von A. Jena, Biberach, Riß.

(Nachdruck verboten.)

Zur Frage 7 im Sprechsaal der „Ges. Welt" 1925 möchte ich kurz meine Beobachtungen als Antwort niederlegen. Aus der Erklärung des Herrn C. Voigt geht allerdings nicht hervor, welche Arten von Körnerfressern er in seinem Flugkäfig beisammen hält. Ich halte das zu wissen für sehr wichtig, weil es verschiedene einheimische Körnerfresser gibt, die nachts manchmal sehr unruhig werden können. Ich kann die Beobachtung oft alle vier Wochen, manchmal auch öfter machen, daß plötzlich nachts der ganze Stall rebellisch wird und einen recht störenden, trommelwirbelähnlichen Lärm verursacht. Gewöhnlich lasse ich sie ruhig im Finstern flattern, denn meistens sind sie bald wieder ruhig, manchmal aber will es gar nimmer aufhören, und wenn sich einige in die Anhängebadehäuser verflogen haben und darin poltern, dann muß ich wohl oder übel aus den Federn und in dem neben dem Schlafzimmer befindlichen Vogelzimmer das Licht andrehen für einige Minuten, bis die Herrschaften wieder alle oben auf den Stangen nicht zu dicht aneinander Platz genommen haben, dann rasch das Licht aus und wieder ins Bett. Manchmal kommt dann der Rummel in der gleichen Nacht noch einmal oder auch zweimal. Meistens sind es aber immer die gleichen Arten, welche die nächtlichen Ruhestörer stellen. Vor allem sind es unsere nordischen Wintergäste, die Bergfinken, Leinzeisige und Berghänflinge, dann der einheimische Dompfaff, der Feldsperling, manche nervösen Stieglitze, am Gitter hängende Erlenzeisige. Die Ausländer sind im allgemeinen sehr ruhig, ab und zu trifft man auch unter ihnen einen Nachtwandler.

Wie oft habe ich es schon mit dem herrlich gefärbten Bergfinken probiert, und wie hübsch hat er sich in der bunten Schar ausgenommen; aber nicht lange, dann bekam er die goldene Freiheit wieder. Er erwies sich fast durchweg als sehr bissig und unduldsam, und diese Eigenschaft kommt immer mehr an den Tag, je länger er im Flugkäfig ist. Nun aber auch bei Nacht ist er sehr unruhig; ist es helle Mondnacht, fängt er an zu springen, hackt unter Rätschen auf seinen Nachbarn, dieser erschrickt aus dem Schlaf, fällt flatternd von der Stange, und die ganze Kaffeemühle ist plötzlich im Gang. Der Bergfink erschrickt auch leicht, wenn im Nachbarhaus ein später Heimkehrer das elektrische Licht aufdreht und

Rosenmeise.

plötzlich ein Schein ins Vogelzimmer fällt. Kaum graut der Morgen, fängt er schon zu rätschen und zu springen an, dadurch scheucht er wieder die andern Schläfer auf. Trotzdem freue ich mich immer wieder über ihn. Ich blieb im Mai vorigen Jahres vor der kleinen lebenden Sammlung eines Vogelhändlers in einer malerisch engen Gasse Neapels lange stehen, weil er in einem kleinen Käfig einen prächtig ausgefärbten Bergfinken hatte, den er als sein Schmuckstück lobte.

Nun, die Leinzeisige sind ebenfalls manchmal recht unruhige Gesellen, besonders im Januar bis April. Ich habe zurzeit vier Stück davon, schon der geringste Lichtschein läßt sie erwachen, sie locken dann gegenseitig und beginnen unruhig zu werden, fangen wohl am Gitter, an das sie sich mit Vorliebe zum Schlafen hängen, zu kraxeln an, und de

Teufel ist los im ganzen Haus. Wenn sie jedoch älter werden, legen sie diese Untugend ab. Mein Großväterchen ist nun 12 Jahre alt, seine Brust scheint immer kleiner zu werden, die Flügel immer spitzer und länger, der Kopf immer mehr in den Achseln verschwindend. Dieser stört die Nachtruhe nicht mehr, er ist froh, wenn er am Gitter krazelnd in die Höhe auf seine gepachtete Sitzstange kommt, und ist zufrieden, wenn ihn keiner über diese hinunterwirft, denn dann plumpst er jedesmal auf den Boden wie ein Stein und liegt hilflos auf dem Rücken. Komme ich gerade dazu, dann stelle ich ihn auf die Füße, aber ich habe auch schon beobachtet, daß er sich wie ein Kreisel dreht mit Hilfe der Flügel, und eine Kante der Schubbodenwand zu erreichen sucht, an der er sich dann anklammert und in die Höhe zieht.

Zwergniltawaschnäpper (s. S. 158).

Hält man nur einen Berghänfling, so ist für gewöhnlich keine Ruhestörung zu befürchten, sind es aber mehrere, dann sitzen sie gerne, ähnlich wie manche Senegalfinken, dicht beieinander, plötzlich fährt einer auf und die ganze Bande ist lebendig, beißt sich gegenseitig, und der eine oder andere macht im Dunkeln einen Fehltritt, das Geflatter beginnt und der Aufruhr ist da.

Nun zu unsern Gimpeln. Frischgefangene sind im ersten Halbjahr überaus nervös, furchtsam, oft dummscheu im Flugkäfig, flattern manchmal bei der geringsten Bewegung eines Mitinsassen oder des Pflegers unsinnig im Käfig umher. Bei Nacht schrecken sie genau so leicht auf wie der Bergfink. Schon bei einem größeren Geräusch außerhalb der Vogelstube in dunkler Nacht hörte ich sie plötzlich locken; in hellen Nächten sind sie immer unruhig und ich habe sie dann in den verschiedensten Nachtstunden schon locken und auch gehen gehört. Wenn ich dann schnell lautlos die Tür öffnete und das Licht andrehte, dann standen die Gollen da, aufrecht, schwanzwippend wie bei Tag. Zurzeit habe ich nur noch einen Gimpel, aber dieser begrüßt den Schein des Lichts, der für seinen spätheimkehrenden Herrn bestimmt ist, sofort mit seinem Lockruf, auch war er in letzter Zeit öfters der Nachtruhestörer und der Karussselldirektor. Fast täglich beginnt er jetzt schon um 5 Uhr früh unaufhörlich zu locken, und da ist es noch ziemlich dunkel. Hat man dem Feldsperling in den Flugkäfig keinen Schlafkasten gehängt und muß er auf der Stange schlafen, dann rumort er bei Nacht auch viel, er ist sehr mißtrauisch, daher schläft er auch beim Fehlen des Kastens immer auf der höchsten Stange direkt unterm Dach, an die Wand dicht angeschmiegt. Die geringste Unruhe, ein plötzlicher Lichtstrahl, schreckt ihn auf, und dann fährt dieser Michel blindlings durch den ganzen Käfig, und der ganze Schwarm ist in hellem Durcheinander, er beruhigt sich dann lange nicht, während er bei Vorhandensein eines Kastens ruhig in den Tag hineinschläft.

Manche Stieglitze sind nervöse Individuen, besonders wenn sie sich am Hanf des Guten zu viel tun können, dann bekommen sie bei längerer Käfigung leichte Krampfanfälle, die mit einem plötzlichen Fahrenlassen der Schwungfedern verbunden sind. Meistens kommt der Anfall bei Nacht, man kann es daran merken, wenn ein nicht gut wiederzugebender Jammerschrei ertönt, dem gleich darauf ein Auffallen eines Körpers auf dem Käfigboden folgt, schaut man sofort nach, liegt hilflos mit etwas verdrehtem Kopfe sicher ein Stieglitz unten, dem beim Greifen dann viele Schwungfedern verloren gehen. Schon durch den Schrei wie auch durchs Herabplumpsen schreckt er die andern Insassen auf und alles ist in Bewegung. So einen Stieglitz setze ich dann nie mehr in den Flugkäfig, er braucht Ruhe schon allein für den Nachwuchs seiner Flügel und dann eine Spezialfütterung mit viel Grünzeug.

Unsere Erlenzeisige, besonders frisch gefangen, haben die Gewohnheit, sich zum Schlafen ans Gitter zu hängen, sie werden dabei müde, wechseln und fallen herab, so verursachen auch sie nächtliche Störungen. Mein Kurzschnabelgirlitz war im Anfang ebenfalls ein recht schreckhaftes Tier und polterte lustig mit, wenn es die andern vormachten, jetzt ist er besser geworden. Das nächtliche Poltern kann aber auch durch den Besuch von Mäusen, wie von Vogelmilben, verursacht werden und darauf ist besondere Vorsicht zu verwenden.

Rotschwänze — Phoenicurus *(Forst.)*.

Eine Monographie von John Kuntzendorff.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Filchners Seidenrotschwanz — Erithacus auroreus filchneri *(Parrot.)*.

In seiner Färbung unterscheidet sich Erithacus auroreus filchneri nicht von E. auroreus auroreus. Der einzige Unterschied liegt in seinen größeren Dimensionen. Nach Hartert messen sie: ♂ Fl. 74—77 und einmal 80 mm, ♀ 72 mm, nach Kleinschmidt ♂ 80—81, Schw. 73,5, Lf. 23 mm, ♀ 80, Schw. 71,5 mm, ♂ juv. Fl. 75—76 mm. „Das ♀ hat keine Spur von einem Flügelspiegel und unterscheidet sich vom weiblichen E. hodgsoni nur durch einige lebhaft gelbrötlichen Federn an der Vorderbrust." Die Füße sind heller als bei auroreus auroreus. Das Verbreitungsgebiet dieses Vogels sind die Gebirge Nordchinas; er überwintert scheinbar in Südchina. Fundort: Kin-tschou bei Port-Arthur.

Der indische Seidenrotschwanz — Erithacus auroreus leucopterus *Blyth*.

Von der Größe des E. auroreus auroreus ist Erithacus auroreus leucopterus von den beiden vorgenannten Arten dadurch unterschiedlich, daß der Oberkopf dunkler und mehr dunkel bräunlich aschgrau und die schwarze Färbung der Kehle satter und reiner ist und sich weiter abwärts nach dem Unterkörper zu ausbreitet. Seine Brutheimat ist nicht bekannt, dürfte jedoch im nordwestlichen China zu suchen sein. Er überwintert in den Gebirgen von Bhutan, Assam, in den Bergen südlich des Bramaputra, in den Schan-Staaten und auf der Malakka-Halbinsel.

Der Formenkreis Erithacus diplootocus.

Die einzige Form dieses in Nordafrika beheimateten Formenkreises ist

Der Diademrotschwanz — Erithacus diplootocus mussieri *(Olph.-Gall.)*.

Dieser äußerst interessante Vogel wurde früher Pratincola zugezählt, Hartert machte aus ihm ein besonderes Genus, während Kleinschmidt ihn zu den Rotschwänzen rechnet, wobei er überzeugend seine nahe Verwandtschaft mit E. auroreus dartut (Berajah 1908, Erithacus Diplootocus). Das weibliche Alterskleid, wie besonders das Jugendkleid, dessen Entdeckung Flückiger zu verdanken ist, stempeln ihn zu einem echten Rotschwanz, wenn auch seine Lebensweise in mancher Hinsicht der der Wiesenschmätzer ähnelt.

♂ ad. Oberseite, Zügel, Ohrgegend, kleiner schmaler Bartstreif rein schwarz — im Herbstkleide sind die Federn mehr oder weniger deutlich braun gesäumt —, quer über die Stirn, umgeben von der schwarzen Färbung ein mehr oder minder breites, diademartiges Band von weißer Farbe, welches beiderseitig mit einem schmalen, seidenglänzenden weißen Augenbrauenstreif in Verbindung steht, der seinerseits in einem großen, seitlich der Ohrdecken befindlichen Fleck von gleicher Färbung mündet. In der Regel sind diese Flecke durch das schwarze Nacken- resp. Hinterhalsband getrennt, jedoch haben sie ab und zu auch solche Ausdehnung, daß sie fast ineinander fließen. Untere Bürzel, Oberschwanzdecken, ganze Unterseite, Unterflügeldecken goldig rostgelblichbraun, zum Bauch hin heller werdend, hinterer Teil desselben am hellsten, oft nur dunkelrahmfarben. Schwingen rußschwarz, Armschwingen an der Wurzelhälfte der Außenfahne und Handschwingen von der 7. an an der Wurzelhälfte der Außenfahne weiß, einen großen Flügelspiegel bildend; Schwanzfedern rostgelblichbraun, mittelstes Paar schwarzbraun, die folgenden mit mehr oder weniger deutlichen Säumen an und nahe der Spitze; Auge dunkelbraun, Schnabel und Füße schwarz. ♀ in der Färbung veränderlich. Oberseite fahl gräulich braun, am unteren Bürzel ins Rostrote der Unterschwanzdecken übergehend. Schwingen dunkelbraun mit fahl gelbbraunen Säumen, entweder mit oder ohne angedeutetem rahmweißen Spiegel.



Rotbauchfliegenschnäpper ♀.

Unterseite fahl braun mit leichtem rostfarbenem Schimmer, der in der Stärke sehr variiert, Mitte des Unterkörpers rahmfarben bis rostrot. Das Nestkleid ist nicht scharf gefleckt, sondern oberseits rötlichbraun mit schwärzlichen Federsäumen ohne weiße oder gelbe Zeichnung, Unterseite fahl gelblichbräunlich mit schwärzlichen Federsäumen, Schwingen schwärzlich. Junge ♂ haben schon im Nestkleid weißen Flügelspiegel. Maße nach Hartert: ♂ Fl. 65—70, Schw. 46—50, Lf. 23—24 mm, ♀ Fl. etwa 3—67 mm; nach Kleinschmidt: Fl. ♂ 66—70 mm, ♀ 66 bis 67 mm, ♂ juv. 65—69 mm. Der weiße Flügelspiegel beschränkt sich, zum Unterschiede von E. auroreus bei E. diplootocus moussieri nur auf die Außenfahne. Kleinschmidt hat jedoch eine Ausnahme bei einem Exemplar gefunden, bei welchem der Spiegel sich auch etwas auf die Innenfahne ausdehnte. Wie bei E. auroreus hat E. diplootocus moussieri schon als ♂ Nestjunges schwarzen Flügel und weißen Spiegel.

Das Verbreitungsgebiet des Diademrotschwanzes ist Marokko, Algier, Tunis und das übrige nordwestliche Afrika. Gelegentlich ist er in Südspanien beobachtet worden. Gätke hat ein ausgefärbtes ♂ auf Helgoland erlegt. Er ist ein ausgeprägter Gebirgsvogel, der sein Brutgebiet in den Gebirgszügen des Atlas nahe der Küste bis zu den Südabhängen dieses Gebirges hat. Er geht bis in die Höhen von 3800 m. Im Winter sucht er die südlichen Täler und die Oasen der nördlichen Sahara auf. Als eigentliches Brutgebiet kommen buschreiche Gegenden in Betracht, die mit Steineichenbüschen, stacheligem Wacholder, Rosmarin, Lavendel und Aleppokiefern bestanden sind, jedoch nistet er auch in steinigen Höhen und Felsen mit vereinzelten Gebüschen. Das Nest wird am Boden unter schützenden Grasbüscheln, mitunter auch in Sträuchern, angelegt und ähnelt in seiner Bauweise und Polsterung dem des Hausrotschwanzes. Nistzeit ist April bis Mai. Das Gelege besteht aus vier bis fünf lichtblauen oder weißen, bläulichgrün schimmernden, oder weißen, rotgefleckten Eiern, aber stets nur gleichfarbig in ein und demselben Nest. Jährlich finden scheinbar zwei Bruten statt. Während König mitteilt, daß die ♀♀ zur Zeit der Brutperiode sehr scheu wären, erwähnt Flückiger in seinem Tagebuch, daß die alten Vögel am Nest gar nicht scheu waren. Der Gesang ist nicht schön und klingt etwas gepreßt. Nach Flückiger besteht er aus „trillerartigen (etwas wie knirschend klingenden) kurzen Tönen und höheren, mehr oder weniger heiseren Tönen . . . Das Ganze ist ein ziemlich eintöniges, mehr oder weniger langweiliges Geleier. Im allgemeinen hat es etwas Ähnlichkeit mit dem Gesang des Rotschwänzchens." Das ♀ lockt mit matt klingendem üüü und das ♂ ü iä, ü iä, ü iä.

Dieser schöne Vogel ist meines Wissens noch nicht lebend nach Deutschland gekommen, was sehr zu bedauern ist, da er zur Belebung der Vogelstuben und Volieren sehr viel beitragen würde. (Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Auslandsbericht. L'Oiseau bringt im Novemberheft 24 von M. Delacour die farbige Wiedergabe zweier Rotkardinäle mit auffallender Gefiederabweichung. Bei dem einen ist der Kopf vollkommen schwefelgelb bis hinab zur Brustgrenze; die schwarze Zügelzeichnung ist erhalten geblieben; im übrigen ist die Rotfärbung unverändert. Der andere zeigt diese gelbe Färbung, scharf begrenzt, an verschiedenen Stellen: schwefelgelb sind die Haube, ein runder Wangenfleck, ein breites Kehlband und ein schmaleres, querverlaufendes Gürtelband. Sind derartige Abweichungen bei Kardinälen in Deutschland schon beobachtet?*) In der gleichen Zeitschrift bespricht derselbe Autor drei neue Rakenvögel, die er aus dem Sudan erhalten hat und die wohl zum ersten Mal nach Europa gelangt sind, und zwar Coracias abyssinicus, C. lorti und C. naevius; alle drei prachtvolle Vögel. Bei C. a. sind Hals und Brust hellblau; bei C. l. Wangen und Kehle violett, während C. n. Braunfärbung mit weißer Streifung zeigt, mit wundervoller blauvioletter Tönung.**) Im selben Heft wird eine neue Erdtaube aus Cuba Geotrygon caniceps beschrieben, die durch ihre prachtvolle Färbung auffällt. Die Unterseite ist hellgrau und geht nach hinten in Zimtbraun über; Kopf hellgrau, auf der Stirn fast weiß; der Hals dunkelgrau mit grünlichem Schimmer; die Oberseite von herrlich violettem Metallglanz, die Füße rosafarben, der Schnabel rot an der Wurzel, weiß an der Spitze. Ein Zuchtversuch soll mit dieser seltenen Erdtaube unternommen werden. A. Fellay hatte Zuchterfolge mit der Zenaida auriculata, der seltenen Ohrflecktaube, von der er in einem Jahr 7 Junge großbrachte; ebenso mit der Columba araucana, die sehr selten eingeführt wird. In dem Avicultural Magazine 1924 finden sich Angaben des Major S. S. Flower, des Direktors des Zoologischen Gartens in Kairo, über die Lebensdauer von Raubvögeln in der Gefangenschaft nach seinen dort gemachten Beobachtungen in den Jahren 1898—1923. Es lebten dort: Sumpfeule etwa 2 Jahre; Zwergohreule einige Monate; Steppenweihe zirka 1 Jahr; Steppenbussard höchstens 2 Jahre; Adlerbussard maxim. 14 Jahre, andere 4 Jahre; Schlangenbussard weniger als 1 Jahr; Kaiseradler max. 19 Jahre, andere 7 Jahre; Groß. Schreiadler max. 5 Jahre; Schopfadler max. 12 Jahre; Gaukler 10 und 12 Jahre (in Amsterdam 55 Jahre!); Schrei-Seeadler 10 Jahre, noch am Leben; Baumfalke max. 6 Jahre; Wanderfalke 6 und 13 Jahre; Sperber 27 Tage (auch anderswo sehr kurzlebig, Brehm, Vögel Bd. 1); Singhabicht nur wenige Monate; Milan max. 22 Jahre; Gleitaar nur wenige Monate; Wespenbussard einige Monate; Fischadler 10 Jahre, noch am Leben! Sehr beachtenswert, da dieser Vogel sonst in Tiergärten sehr hinfällig ist und nur eine kurze Lebensdauer aufweist, Brehm, Vögel Bd. 1; Bartgeier max. 11 Jahre; Mönchgeier 21 Jahre, noch am Leben; Gänsegeier 22 Jahre, drei Junge im Garten erbrütet; Schmutzgeier 20 Jahre, noch am Leben; Sekretär max. 11 Jahre, andere viel weniger; Königsgeier 4 Jahre, noch am Leben. Dr. L.

Mein Buchfink-Albino. Vor etwa 6 Jahren bekam ich einen Buchfinken, welcher bis auf den ganz weißbefiederten Kopf sich von anderen Buchfinken nicht unterschied. Im Laufe der Jahre hat er allmählich sein Federkleid so verändert, daß er jetzt vollständig weiß ist, bis auf den Rücken, der gelb ist wie ein Kanarienvogel. Allzu häufig dürften wohl bei Buchfinken solche Abnormitäten nicht vorkommen. Bei Sperlingen und Drosseln habe ich sie häufiger beobachtet. Das Weiß des Gefieders nahm bei jedem Federwechsel zu. Die Gefiederveränderung ging in folgender Weise vor sich. Bei der ersten Käfigmauser blieb der Kopf weiß, der Schwanz wurde weiß. Im nächsten Jahre wurde die Unterseite weiß, der Kopf aber wieder bunt. Im folgenden Jahre wurde er oben gelblich, der Kopf wieder weiß und nur die Flügel haben noch die Naturfarbe. Später wurden auch die Flügel weiß, und jetzt zeigt sich der Vogel so, wie er anfangs beschrieben ist.

*) Die „gelbgezeichneten roten Kardinäle" sind in Deutschland den älteren Vogelliebhabern gut bekannt. Im Jahre 1889 erhielt L. Ruhe in Alfeld 50 Vögel dieser Färbung aus Mexiko. Es ist anzunehmen, daß es sich um eine künstlich herbeigeführte Färbung der Federn handelt, wie solche ja auch bei Papageien aus Mexiko und Brasilien nicht gar zu selten vorkommen. Die Firma Ruhe nahm damals die verkauften, „gelbgezeichneten Kardinäle" zurück und erstattete den Kaufpreis. Jedenfalls hatte sie erkannt, daß es sich um eine künstlich herbeigeführte Färbung handelte, in der die Eingebornen Mexikos und Südamerikas Meister sind. Neunzig.

**) Gelangte im Jahre 1924 durch die Importe des Zool. Gartens zu Berlin in das Vogelhaus des Zool. Gartens (s. „Ges. Welt" 1924). Neunzig.

Vielleicht wird er in diesem Jahre wieder naturfarben? Wer weiß es! Nach der Mauser werde ich über eine etwaige Veränderung berichten. K. K., Eiche.

Vogelschutz in Bayern. Mir wurden im Mai 1924 meine sämtlichen Weichfresser polizeilich beschlagnahmt und fliegen gelassen. Es waren Vögel dabei, welche 5 und 6 Jahre im Käfig lebten. Auch waren Vögel darunter, welche durch Flügelbruch, den sie sich durch Anfliegen an Telephon- oder Telegraphendrähte zugezogen hatten, dauernd flugunfähig waren. Diese Vögel wurden von Vorübergehenden wieder eingefangen. Die Beschlagnahme und Freilassung der Vögel erfolgte in meiner Abwesenheit. J. E., Würzburg.

Sprechsaal.

Antworten.

Auf Frage 7. Ich hielt lange Zeit Körnerfresser in einem großen Flugbauer zusammen. Die Unruhe oder nächtliches Toben kann auf verschiedene Art und Weise entstehen. Am ehesten kann die Ursache von Mäusen herrühren. Kommt eine Maus nachts in den Käfig, so ist ganz bestimmt ein Vogel darunter, der anfängt zu toben. Derselbe reißt dann alle anderen Vögel mit in die Unruhe hinein. Fällt von der Straße Licht in das Zimmer, so beunruhigt dies die Vögel. Dies braucht nicht von einer Straßenlaterne herzurühren. Wohnen nämlich gegenüber von dem Zimmer, in dem sich die Vögel befinden, Nachtbummler, die spät nachts nach Hause kommen und demgemäß Licht anzünden, so ruft dies eine Beunruhigung der Vögel hervor. Im Sommer entsteht die Unruhe auch durch nächtliche Gewitter. Besonders der Blitz beunruhigt die Vögel so, daß sie sich nur sehr schwer wieder beruhigen. Selbstverständlich rede ich nur von alteingewöhnten Vögeln. Bei Frischfängen läßt sich die nächtliche Unruhe doch von selbst erklären. Gewöhnlich sind dieselben aber von dem Toben am Tage abends so ermattet, daß sie nachts von selbst ruhig bleiben. Ebenfalls kann die Unruhe auch durch Krach oder Radau im Hause selbst herrühren. Ein anderer wichtiger Faktor ist auch die Katze. War einmal eine Katze an den Vögeln, so sind sie gewöhnlich für dauernd verdorben und man schenkt ihnen am besten die Freiheit. Versuchen Sie einmal ihr Glück mit Verhängen des Vogelbauers. Hilft dies nicht, so müssen Sie der Ursache nachgehen. Es führen eben viele Wege nach Rom.

Heinrich Groebel, Ornis-Mitglied Nr. 310.

Nachtrag: Genau so gut wie die Unruhe durch Mäuse entstehen kann, so kann dieselbe auch durch Schwaben oder Kakerlaken entstehen. Oder auch unser größter Feind, die Vogelmilbe, hat die Hand im Spiel. Fängt nämlich ein Vogel an, sich nachts zu kratzen oder zu beißen, so genügt dies schon, um die anderen Vögel zu beunruhigen. Also, wer sucht, der findet.

Zu der Arbeit über die **Fruchtbarkeit der Bastarde** möchte ich bemerken, daß die Männchen von Bluthänflingsbastarden bei meinen Züchtungsversuchen sich wiederholt als fruchtbar erwiesen haben, die Weibchen dagegen nicht. Stieglitzbastarde zeigten sich hier niemals als fortpflanzungsfähig. K. K., Eiche.

Maskenamadinen. Die in der letzten Zeit in den Handel gekommenen „Maskenamadinen" haben wohl fast alle den bernsteingelben Schnabel, wie ihn sonst die Weißwangenamadinen laut Abbildung und Gefiederbeschreibung in „Fremdländische Stubenvögel" besitzen. Ich habe deshalb schon von Liebhabern Briefe erhalten, und schreiben mir diese Herren, sie hätten Weißwangenamadinen, aber keine Maskenamadinen. Als Kennzeichen geben sie mir den bernsteingelben Schnabel an. Auch meine Maskenamadinen haben diese Schnabelfarbe und sicherlich auch die Maskenamadinen des Herrn Rudolf Neunzig. Doch ist bei meinen Amadinen von einem weißen Fleck am Ohr resp. Wange nichts zu sehen, auch habe ich dies bei keiner von den Maskenamadinen, welche die Firma Kleinert hatte (von welcher wohl fast alle zurzeit in Liebhaberhänden befindlichen Maskenamadinen stammen), bemerkt. Ich vermute nun, daß es sich hier verhält wie bei den Spitzschwanzamadinen, daß wir hier ähnlich wie bei Hecks Spitzschwanzamadine eine besondere Art von Maskenamadinen vor uns haben mit bernsteingelbem Schnabel. Horst Wagner.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnitz, Merveldstr. 39; Kaufsvermittlung: Franz Nyncke, Berlin O, Königsberger Str. 17. Verbandsorgan: die „Gef. Welt".

Im Reichsverband haben Aufnahme gefunden: 1. der Vogelliebhaberverein in Kettwig a. Ruhr; 2. die Herren Proffesor Miller in Elberfeld, Andr. Seitz in Windsheim und Kohlmeyer in Kaiserslautern. J. A.: Petters.

Herrn P. E., Ohlau. Die in dem Brief genannten Vögel erhalten die verschiedenen Hirsearten, neben Senegal- auch weiße Hirse, Spitzsamen, auch ab und zu etwas Rübsen und Mohn. Gekeimte Samen der obengenannten Arten sind gleichfalls zu reichen. Nistgelegenheiten sind harzer Bauerchen, kleine Käfige mit Schlupfloch, Zweige mit Astgabeln, herunterhängende Birkenzweige. Niststoffe sind Agave-, Kokosfasern etwa spannlang, Bast, Moos, Federn, Wundfäden und dergl. Am ehesten nisten von den Genannten Amaranten und Bandfinken. Die Weber sind in der Brutzeit sehr stürmisch und aufgeregt, würden aber in einem großen Raum die anderen beim Brüten nicht stören. Die genannten Samen und Niststoffe erhalten Sie bei den im Anzeigenteil ihre Ware anbietenden Händlern.

Herrn R. W., Ötzsch b. Leipzig. Vögel sind nicht zu verzollen, ob Affen, kann ich nicht sagen, glaube es aber nicht. Eine solche Zeitung gibt es nicht.

Frl. D. K., Osnabrück. Während des Federwechsels sind alle Vögel sehr empfindlich. Sie bedürfen dann höherer Wärme (+ 20° C).

Herrn E. Sch. Der Vogel war ein ♀ Maskenamadine, das an Legenot (weichschaliges Ei) eingegangen ist.

Herrn C., Berlin. ♀ Strauchschmätzer ist infolge einer mit Abzehrung verbundenen Ernährungsstörung eingegangen.

Herrn G. St., Reißig; Herrn J. N., Köln-Nippes; Frl. E. A., Berlin-Wilmersorf; Herrn Sch. u. K., Köln: ist schriftlich Bescheid zugegangen.

Herrn F. E. O. M.; Herrn F. Sch., Frankfurt/Main; Herrn B. Sch., Halle: Beiträge dankend erhalten.

Herrn F. P., Oberweiler. Bei dem Zusammenhalten von Wellensittichen mit Sperlingspapageien und Unzertrennlichen hat man die verschiedensten Erfahrungen gemacht. Wenn diese Vögel nicht brüten, sind sie meist verträglich miteinander. In vielen Fällen sind auch in der Zeit der Fortpflanzung Störungen nicht vorgekommen, in anderen gab es üble Beißereien, so daß die Störenfriede entfernt werden mußten. Da unsere Wachtel nach Alter, Geschlecht und Jahreszeit (Abnutzung des Gefieders) im Gefieder sehr variiert, ist die Geschlechtsbestimmung ausschließlich nach dem Federkleid unzuverlässig. Beim Weibchen ist das Gefieder besser. Nur die Männchen haben den bekannten Wachtelruf. Einige aber nicht immer zutreffende Unterscheidungsmerkmale der Geschlechter sind folgende: Augenbrauenstreif, Wangen Männchen weiß, Weibchen bräunlich Kehlmitte Männchen schwarz oder schwärzlich rotbraun, bei jungen hellrotbräunlich, weiß gesäumt, Kehle beim Weibchen weiß.

Herrn H. Sch., Essen. Es gibt keine sicheren äußerlichen Erkennungszeichen für die Geschlechter der Feld- und Heidelerchen. Die Weibchen sind meist kleiner. Die Weibchen sollen erkennbar sein dadurch, daß sie den Schwanz fächerartig ausbreiten, wenn man sie auf den Rücken legt

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

Jahrgang 54 2. April 1925 Heft 14

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Die Nachtigall. Von J. Birk, Leipzig. (Forts.)
Goldhähnchen, Baumläufer und Meisen. Von W. R., Berlin.
Neueinführungen und Seltenheiten. Von K. Neunzig. (Forts.)
Dompfaffenzucht. Von Amtmann Max Krumm. (Forts.)
Nächtliches Toben der Körnerfresser. Zur Anfrage 7. Von A. Jena, Biberach, Riß.
Rotschwänze — Phoenicurus (*Forst.*). Eine Monographie von John Kuntzendorff. (Forts.)
Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig - Redaktionsbriefkasten - Ausstellungen - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellungen.

In Würdigung des Wertes der vom **Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig** im Zusammengehen mit dem Naturkundlichen Heimatmuseum in den Tagen vom 19. bis einschl. 26. April 1925 zu veranstaltenden Ausstellung wollen wir nicht übersehen, zum Besuche nochmals recht herzlichst einzuladen. Sie findet in den Räumen des Museums, der Schule, Fleischerplatz, vom Hauptbahnhof in fünf Minuten erreichbar, statt. Auf, Naturfreunde, Freunde unserer edlen Liebhaberei und Liebhaber, kommt nach Leipzig. Alle sind uns herzlichst willkommen.

Der Vorstand: Der Presseausschuß:
J. A.: Joh. Birk. J. A.: Vorwerk.

Der **Zier- und Singvogelverein zu Bernsbach im Erzgebirge** hält am 2. und 3. Mai 1925 im Saale des Gasthofes „Zum grünen Baum" in Bernsbach seine vierte allgemeine Ausstellung ab. Auszustellende Vögel sind bis zum 25. April 1925 bei Herrn Walter Müller in Bernsbach Nr. 74 anzumelden. Um gütigen Zuspruch der Liebhaber wird gebeten. Das Ausstellungs-Komitee.

Der **Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Zwickau** beabsichtigt in der Zeit vom 17.—21. Mai d. J. eine Vogelausstellung zu veranstalten.

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Sitz Leipzig. 1. Vors.: Hermann Höhne, Leipzig-Volkmarsdorf, Eisenbahnstr. 84, IV. 1. Schriftf.: Max Hunger, Leipzig-Gohlis, Polizeigebäude, Zimmer 196. Kassierer: Ludwig Böttcher, Leipzig, Inselstr. 17 II. — Achtung! Freiquartiere betr.! Der Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig hat in anerkennenswerter Weise dem Landesverband zu seiner am 26 April 1925 stattfindenden Jahresversammlung mehrere Freiquartiere zur Verfügung gestellt. Wir fordern deshalb alle auswärtigen Teilnehmer, soweit sie ein freies Nachtquartier beanspruchen, auf, sich bis spätestens 14 Tage vor der Jahresversammlung (12. April 1925) bei dem Unterzeichneten vormerken zu lassen. Um alle Anmeldungen berücksichtigen zu können, wird es jedem der Beteiligten zur Pflicht gemacht, für Einhaltung der festgesetzten Frist besorgt zu sein. Der Vorstand. J. A.: Hunger, Schriftf.

Vereinigung der Liebhaber Landesverband Preußen. Am Sonnabend, dem 18. April, findet im Lokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a in Berlin, unsere diesjährige Jahresversammlung abends 8 Uhr statt. Alle dem Verbande angeschlossenen Mitglieder sind dazu herzlichst eingeladen. Fahrverbindung Hochbahn Prinzenstraße, Untergrundbahn Spittelmarkt sowie alle Straßenbahnen, welche den Moritzplatz und die Oranienstraße berühren. Vertreter auswärtiger Vereine werden gebeten, sich mit Vollmacht zu versehen. Die Tagesordnung für diesen Abend enthält folgende Punkte: 1. Begrüßung; 2. Verlesen des Protokolls; 3. Jahresbericht; 4. Bericht des Kassiers; 5. Bericht der Revisoren. Entlastung des Vorstandes; 6. Neuwahl des Vorstandes; 7. Anträge; 8. Geschäftliches. In Anbetracht der kurzen Zeit wird gebeten, pünktlich zu erscheinen.

Der Vorstand. J. A.: P. Böhme, Schriftf.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhaber-vereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden.

J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

Angemeldet ist Herr Dr. Ortfried Stehle, Köln-Mühlheim, Dreikönigen-Hospital. — Aufgenommen ist unter Mtgl.-Nr. 132n Herr Direktor Kurzius, Leiter des Kgl. zoolog. Gartens in Sofia (Bulgarien). Diejenigen Mitglieder, die im April, anläßlich des Einganges des abessinischen Transportes, dem Zoologischen Garten Berlin einen Besuch abstatten wollen, bitte ich um freundliche Benachrichtigung mit Rückantwortkarte. A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen.
J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurter Str. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. V.: Emil Ivo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Vereinslokal: Karl Röhr, Heiligerweg 28. Versammlungen zweimal im Monat, jeden 2. und 4. Sonntag nachmittags 5 Uhr. — Liebhaber jederzeit herzlich willkommen.
J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Rietschelhof", Rietschelstr. 19. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinslokal „Parkhotel", Epinayplatz 1, Versammlung. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an. Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Die Vereinigung hannov. Vogelliebhaber will dem Vogelpfleger Ratgeber und Helfer sein, will die Liebe zum Tier und zur Natur wecken und stärken, will beitragen zum Kennenlernen der Vögel in Wald und Flur. Monatlich einmal kommen die Mitglieder zusammen, tauschen die Erfahrungen aus, hören Vorträge aus allen Gebieten der Vogelkunde, -schutz und -pflege an. Ein- oder zweimal im Jahre veranstalten wir große Lichtbilder- und Film-Abende. Im Frühjahr finden Beobachtungsausflüge unter Führung statt. Den Mitgliedern stehen zahlreiche Fachzeitschriften und Bücher kostenlos zur Verfügung. Regelmäßig berichtet die Zeitschrift nieders. Vereine über unsere Veranstaltungen. An den Vereinsabenden ist Rat und Auskunft, Kauf- und Tauschgelegenheit geboten. Jahresbeitrag Mk. 2,—, für Auswärtige und Schüler Mk. 1,—. Anmeldungen an Heinz Appel, Nienburgerstr. 7 A I. Auskunft: Buchhändler A. Troschütz, i. Fa. Cruses Buchhandlung, Gr. Agidienstr. 4.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Da die Heidelberger keinen Liebhaberverein haben, die wenigen wirklichen Liebhaber aber doch den Wunsch haben, zusammenzukommen, so haben sich die Liebhaber der Ortsgruppe Heidelberg, die alle dem Bund für Vogelschutz angehören, zu einer Sonderabteilung zusammengeschlossen und kamen auf Einladung von Professor Fehringer am Donnerstag, den 5. März, erstmals im Holländer Hof zusammen. Zwar war es nur ein kleines Häuflein Getreuer, das kam, aber es waren alles nur wirkliche Liebhaber und Vogelpfleger mit zum Teil recht guten Beständen. Da die Zahl der

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Heidelberger Liebhaber sich auf zirka 15 belaufen dürfte, wäre es angebracht, hierfür einen eigenen Verein ins Leben rufen zu wollen. Da ja Vogelschutz und -pflege unbedingt zusammengehören, ist die Zusammenkunft im Rahmen des bestehenden Bundes das einzig Gegebene. Der Abend war ausgefüllt mit einer zwanglosen Unterhaltung über das Wohl und Wehe unserer Stubenvögel. Wir brauchen kein Programm, keinen eigentlichen Vortrag, keine Statuten usw. Wir wollen uns gegenseitig aussprechen im gemütlichen Kreis und uns dabei wohl und behaglich fühlen. Möge jeder Heidelberger Vogelliebhaber es nicht versäumen, an jedem 1. Donnerstag im Monat im Holländer Hof zu erscheinen. Die sonstige Tätigkeit der Ortsgruppe ist eine äußerst rührige und ersprießliche. Von Zeit zu Zeit finden Vogelwanderungen statt, die im Frühjahr zu einer vielbesuchten Einrichtung geworden sind. Außerdem werden im Zusammenschluß mit anderen naturwissenschaftlichen Vereinigungen Vorträge, Filmdarbietungen und ähnliche Veranstaltungen abgehalten, in deren Mittelpunkt stets unser einheimisches Vogelleben steht. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögeln Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstraße. Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden, Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. A. Voigt.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz und Umgegend. Vereinslokal „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" und „Kanaria". Vogelliebhaber und Gäste sind stets willkommen. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst., Boppel, 1. Schriftf.

Verein der Vogelfreunde Köln. Alle Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, die Interesse daran haben, unsere schöne Liebhaberei zu fördern und zu diesem Zweck dem Verein beitreten wollen, werden gebeten, ihre Adresse an den Unterzeichneten gelangen zu lassen. Der geringen Mitgliederzahl wegen tagt der Verein vorläufig noch privat. Sobald eine genügende Anzahl Mitglieder vorhanden ist, soll ein geeignetes Vereinslokal bezogen werden. Gute ornithologische Werke von Flöricke, Friderich, Kleinschmidt, Neunzig, Rausch usw. liegen teils an den Versammlungsabenden auf, teils können sie Interessenten zur Verfügung gestellt werden, desgleichen die Fachzeitschriften „Gefiederte Welt" und „Der Vogelliebhaber".
Joh. Neuen, Vorsitzender, Köln-Nippes, Sechzigstr. 121 II.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 2. April 1925. Gäste willkommen. M. Roth, Schriftf., L.-Plagwitz.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung bei unserem Mitgliede Herrn Normast im Gasthof „Kaiser Friedrich", Breslauer Str. 50. Liebhaber sind als Gäste willkommen. J. A.: Friedrich.

„A. Z." Magdeburg. Am 22. März 1925, vormittags 11 Uhr, fand die in Nr. 11 der „Gef. Welt" bekanntgegebene Zusammenkunft der Magdeburger Liebhaber exotischer Vögel statt. Von sämtlichen Anwesenden wurde folgende Auffassung vertreten: 1. Ablehnung jeglicher Vereinsbestrebungen; 2. regelmäßige zwanglose Zusammenkünfte; 3. Anregungen, Austausch von Gedanken und Erfahrungen; 4. jeden zweiten Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. Die nächste Zusammenkunft findet am Dienstag, den 14. April, statt. Alle Liebhaber sind hiermit von den Bestrebungen der Einberufer in Kenntnis gesetzt und zur regen Beteiligung freundlichst eingeladen.
gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wsl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Tage im „Goldenen Falken" Versammlung. Nächste Versammlung Freitag, den 3. April 1925. Freunde und Gönner stets willkommen. Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebendort. Rudolf Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabende aller vier Wochen, in der ersten Woche des Monats verbunden mit Vortrag, in der dritten Woche jedes Monats nur gesellige Zusammenkunft. Vereinslokal „Sächsischer Hof". Gäste stets willkommen. Studienrat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jedes Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Aufruf!

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Vogelliebhaber Hamburgs, schließt Euch dem Hamburger Verein für Vogelschutz und -liebhaberei an! Nehmt teil an den billigen Futterbestellungen und an allen anderen Vorteilen, welche Euch dadurch entstehen, daß Ihr in unserem Verein mit anderen wirklichen Vogelliebhabern Hamburgs bekannt werdet. Stärkt durch Euren Beitritt nicht nur unseren Verein, sondern dadurch auch den Reichsverband der deutschen Vogelliebhaber, Sitz Leipzig, e. V., so daß unsere gemeinsamen Interessen durch den Reichsverband genügend gewahrt werden können. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Der Verein bezweckt den Zusammenschluß allen wirklichen Liebhaber einheimischer und fremder Sing- und Ziervögel und bietet auf seinen Sitzungen viel des Vorteilhaften und Interessanten auf dem Gebiete der Stubenvogelliebhaberei. Gäste sind stets herzlich willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 7. April. Nähere Auskunft durch den Vorsitzenden Arnold Weber, Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Käfige u. Gerätschaften

Vogel-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50. Schlagnetze f. kl. schädl. Vögel M. 2,30, gr. M. 2,50 u. 2,80. Katalog gratis. H. Tannen, Gronau 58, Westf. [489

Bei Anfragen und Bestellungen bitten wir, sich auf die „Gef. Welt" zu berufen

Futtermittel

490] Mehlwürmer, reine Ware, gegen Einf. von 1.75 ℳ 1/4 Pfd. franko. Th. Witte, Niederndodeleben b. Magd.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [491

Mehlwürmer

veget. gez., 1/4 Liter franko gegen Vor-492] einsendung von Mark 2.—. **Bonitas-Versand, Rostock i. M. 3.**

Mehlwürmer

pro 1/4 Pfund ℳ 2.— liefert franko [493 **Reichardt, Berlin N,** Böttgerstr. 28.

Vogelfutter [494

für **Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser.** Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 18 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,

Tröndlinring 1. Telephon 14 958.

Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Mehlwürmer

à Pfund 5 ℳ, bei 6 Pfund Porto und Verpackung frei.

Ia Ameiseneier . . . à Pfd. 8 ℳ
Ia Weißwurm . . . à „ 6 ℳ
Ia Muska-Zecken . . à „ 3 ℳ
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen . . . . à Pfd. 1 ℳ
Ia Garnelen, gem. à Pfd. 0.40 ℳ

Ia Universalfutter.

Alleckwa I für Nachtigallen 2.— ℳ
„ **II für Grasmücken** 1.80 ℳ
„ **III für Drosseln** . 1.50 ℳ

Proben und Analysen zur Verfügung. Vertreter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [495

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser

A. Eckrich II., Waldsee (Pfalz).

Vögel

Großer Gelbhaubenkakadu, fingerzahm 120.—
Kleiner Gelbhaubenkakadu, fingerzahm 80.—
Kleine Gelbhaubenkakadus, Stck. 60.—
Rosakakadus, fingerzahm Stck. 85.—
Blaustirnamazonen Stck. 75.—
Surinamamazonen Stck. 75.—
Neuholländeramazonen Stck. 65.—
Guatemalaamazonen Stck. 75.—
Diademamazonen Stck. 75.—
Pennantsittiche in voller Pracht Stck. 175.—
Rosellasittiche in voller Pracht Stck. 130.—
Nandaysittiche in voller Pracht Stck. 35.—
Feuerflügelsittiche, vollständig fingerzahm Stck. 35.—
Feuerflügelsittiche, leicht zahm werdend Stck. 16.—
Pflaumenkopfsittiche, Männchen ausgefärbt Stck. 20.—
Larant. Unzertrennliche Paar 50.—
Kl. Alexandersittiche Stck. 14.—
Kattussittiche Stck. 9.—
Gelbe Wellensittiche Paar 15.—
Schamadrosseln, gut befiedert, flott im Gesang Stck. 60.—
Dahaldrosseln, gut befiedert, flott im Gesang Stck. 60.—
Papstfinken Stck. 20.—
Rotkopfamadinen Paar 16.—
Helenasafasänch. a. Südafrika P. 10.—
Braunkopfammern Stck. 6.—
Edelsänger Stück. 4.—
Dunkle Kapuzineraffen Stck. 110.—
Helle „ Stck. 100.—
Große Rhesusäffchen Stck. 50.—
Kleine „ Stck. 40.—

Gustav Reiß

Zoologische Großhandlung Berlin C 25, Gontardstraße 4

Gegründet 1877. [496

Jap. Möwchen à Paar 14 ℳ.
Dreifarbennonnen à Paar 18 ℳ.
Weißkopfnonnen à Paar 13 ℳ.
We ße Reisfinken ♂♂ à Stck. 25 ℳ.
Braunkopfammern ♂♂ à Stck. 6 ℳ.
Rotkopfamadinen à Paar 12 ℳ.
Schmetterlingsfinken à Paar 5 ℳ.
Atlasfinken à Paar 4 ℳ.
Orangeweber à Paar 4 ℳ.
Weinrote Turteltauben à Paar 20 ℳ.
Goldaugentimalien à Paar 45 ℳ
à Stck. 25 ℳ.
Braunscheiteltimalien à Stck. 35 ℳ.
Dahaldrosseln à Stck. 40 ℳ.
Borstenhäherlinge à Stck. 30 ℳ.
Würgerschnäpper à Stck. 40 ℳ.
Schwarzschwanzsteinschmätzer à Stck. 30 ℳ.
Blauwangenbartvögel à Stck. 60 ℳ.
Grün Wellensittiche, ausgesuchte Zuchtpaare, à Paar 16 ℳ.
Kaprötel à Stck. 75 ℳ.
Rostbäuchige Flötenwürger à Stck. 50 ℳ.
Indische Grauwürger à Stck. 30 ℳ.
Indische Maskenwürger à Stck. 25 ℳ.
Mahaliweber à Stck. 5 ℳ.
Tahaweber à Stck. 5 ℳ.
Sonnenvögelweibchen à Stck. 5 ℳ.
1 Paar Goldsperlinge 6 ℳ.
Graupapageien à Stck. 90 ℳ.
desgl. schon sprechend à Stck. 140 ℳ.
Grünpapageien à Stck. 40 ℳ.
1 Diademamazone 55 ℳ.
Blaustirnamazonen à Stck. 60 ℳ.
Rhesusaffen und goldene Rhesusaffen
Java-, Kronen- u. Kapuzineraffen billigst. [497

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70 a.

Wer
in der „Gefiederten Welt" inseriert,
hat Erfolg!

Zur gefälligen Beachtung!

§ 3 des am 1. September 1908 in Kraft getretenen „Vogelschutzgesetzes" lautet:

In **der Zeit vom ersten März bis zum ersten Oktober** ist das Fangen und die Erlegung von Vögeln sowie der Ankauf, der Verkauf und das **Feilbieten,** die **Vermittlung** eines hiernach verbotenen An- und Verkaufs, die Ein-, Aus- und Durchfuhr von lebenden sowie toten Vögeln der **in Europa einheimischen** Arten überhaupt, ebenso der Transport solcher Vögel zu Handelszwecken untersagt.

Wir machen darauf aufmerksam, daß der **Tausch** von einheimischen Vögeln wie auch der nicht zu Handelszwecken dienende Transport **nicht verboten** ist, wir bitten, dies bei Aufgabe von Inseraten berücksichtigen zu wollen.

Die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt"
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Enchyträen

(kleine Würmchen), das beste **lebende** Futter für alle kl. Weichfresser (speziell zum Eingewöhnen) versende in **Zuchtkisten** mit genauer Zuchtanweisung zu ℳ 8.— und 10.— bei Voreinsendung des Betrages franko. [498
H. v. d. Höh, Köln, Ulrichgasse 19.

Verkaufe 1,0 japan. Möwchen, braunbunt, 1 Jahr alt, für 8 Mark. [499
Frau **G. Birkner, Crimmitschau** (Sachsen), Annenstraße 38.

1,1 Spitzschwanzamadinen, sofort zur Brut schreitend. abzugeben.
A. Schiebe, Zschopau i. Sa.
A.Z.-Mtgl. 282. [500

Wellensittiche,

import., schöne, gesunde Vögel, Paar 15 Mark.

Graue Kardinäle
501] **Stück 9 Mark.**

Sperlingspapageien
Paar 20 Mark.

Goldstirnsittiche
Paar 25 Mark.

Safranfinken Paar 8 Mark.

Liste und Anfrage **nur** geg. Freimarke.

Beck, Tier-import, **Stuttgart.**

Schönfelders Kanarienfeinzucht, Dresden-Trachau 37,

gold. Med. präm., Urstamm Seifert-Wolf, empfiehlt tiefe Hohlroller, Knorren, Schockel, schöne tiefe Flöten, Zuchthähne und ff. Tag- und Lichtsänger à 12, 15, 18 M., 3 Stück zus. 40 M., erstklassige Vorsänger und Ausstellungshähne à 20, 25, 30 M., 3 Stück zus. 60 M., prima Zuchtweibchen à 4 M. Machen Sie bitte einen Versuch und Sie werden zufrieden sein. Hunderte von Dankschreiben im Besitz. [502

Tausch!

1,1 Goldstirnsittiche tausche gegen Gleiches, **gelbe** Wellensittiche, Blaubürzel. Sperlingspapageien oder **1,0 fingerzahmen** Sittich irgendwelcher Art.
Becker, Nassau (Lahn),
Steinstraße 2. [503

0,3 Goldisabell,

auf Farbe rein durchgezüchtet, große Vögel. Preis zusammen 25 ℳ mit Packung. [504
Martin Schöll, Garmisch (Bayern).

Suche

0,1 Sperlingspapagei (blau- oder grünbürzl.), 0,1 weißbr. Schilffink. **Gebe ab:** 1,1 Zwergmaskenweber 5 ℳ, 1,0 Zebrafink (jung, ausgef.) 6 ℳ, 2,0 Möwchen à 4 ℳ. [505
Walter Voigt, Jena, Feodorastr. 13.

Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber.

Für unsere Mitglieder haben w einen größeren Posten
getrocknetes Eigelb,
als Beigabe zum Weichfresser- u Aufzucht-Futter vorzüglich geeign erwerben können.

Wir geben, soweit der Vorrat reic das Kilo als Päckchen für 2,40 ℳ por frei bei Voreinsendung des Betrages Bei größerem Bedarf liefern wir d Pfund für 95 Pfg.

Bestellungen an
Werner & Determann, Hannover, Schillerstraße. [5

Suche zu kaufen: [5

0,1 Singsittich, 0,1 Pennantsittic Evtl. gebe für jeden Vogel 1 Zuchtpa **Nymphensittiche** in Tausch.
Fabrikdirekt. R. Aumüller, Delitzs

Großer Gelbhaubenkakadu,

jung, lebhaft, sanft, kein Schreie gegen Gebot evtl. Tausch. [5
L. Weitzel, Frankfurt a. Mai Neuenhainer Straße 24, III.

Reizende Äffchen,

zahm, sprechende Grau- und Amazone Papageien, Zuchtpaare Sing- u. Welle sittiche, Zebrafinken, alle Gattung exotischer Vögel reell und billig. P stellungen für Abt. Muster Rausch sch jetzt erbeten. [5
Pichler, Wien IV, Karolineng. 2

Vertausche

Schamadrossel, schön im Gesang u Gefieder, 1 Jahr gekäfigt, gegen ei Weichfresser, Nachtigall, Sprosser, lo singendes Rotkehlchen und Grasmück nur beste Sänger. [5
Theodor Berendt, Ostseebad Zinnowitz. Villa Berendt.

Tag- und Lichtsänger

prima Zucht- und Vorsänger, Häh 12 und 15 ℳ, Zuchtweibchen 3 . Wellensittich, tiefgr. Zuchtpaar 14 . gelbe Zuchtpaar 17 ℳ, Ameisene (steyrische) 1/2 kg 7 ℳ. [5
J. Herzog, Ravensburg.

Tausche

1,1 gr. Wellens.-Zuchtp. gegen gleich Kanarienzuchthahn. [5
F. Weise, E.Ö.S., **Meppen** a. Em

Verkaufe oder tausch

einen jährigen aufgezogenen Bussa sehr zahm, gegen **Exoten.** [5
Max Schlenker, Schwenningen a. Dauchingerstr. 21. A.Z.-Mtgl. 197

Vereinszeichen

Ia Emaille, Festzeichen, Fahnennäg Stempel usw., Fahnen und Tischbann Fahnenschleifen und Bänder, nur Kur handstickerei, Garantie, kunstvolle Diplo fertigt als Spezialität schnell und billi
Emil Schulze,
Weißer Hirsch (Sa.),
Alter Hirsch 1, I. [
Gegründet 1. Oktober 1881.

Inserate

für das am 9. April 1925 zur Ausga gelangende 15. Heft der Gef. Welt bitten bis 4. April 1925 früh.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 9. April 1925 | Heft 15

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Die Nachtigall.

Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Die Pflege der Nachtigall ist oberflächlich betrachtet eigentlich nicht schwieriger wie die eines anderen edlen Weichfressers, doch erfordert der Weg zum vollen Erfolg, was bedeutet, eine Nachtigall nicht nur lange am Leben, sondern auch zu gegebener Zeit stets gesangsfreudig zu erhalten, einige Kenntnis der bei ihr auftretenden Erscheinungen bei der Pflege als Stubenvogel. Für das Erste muß gleich im voraus betont werden, daß sich nur ein erfahrener, gewissenhaft arbeitender Vogelliebhaber mit edlen Sachen befassen soll, wie dies Nachtigall, Sprosser, Gelbspötter, Sumpfrohrsänger usw. sind. Wer in gewissenloser Oberflächlichkeit sich mit der Nachtigall als Stubengenosse befassen will, hüte sich, zu diesem Zwecke die Natur zu berauben, denn die Schamröte muß es derartigen „Auchvogelliebhabern", die es leider noch gibt, ins Gesicht treiben, wenn sie ein so wertvolles Stückchen Natur mit unentschuldbarer, gewissenloser Unkenntnis vorzeitig vernichten. Wer Rechte will, hat auch mit eiserner Disziplin durchzuführende Pflichten. Ein wahres Sprichwort sagt: „Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen", und so gilt dies auch in der Vogelpflege, zum guten Willen gehören Lust und Liebe, und wo ein Wille, findet sich auch ein Weg. Ein gelegentlich vorkommender Mißerfolg wird sich nie ganz vermeiden lassen, selbst dem erfahrensten Vogelwirt bleiben die Sorgen über nicht einschlagende Pfleglinge nicht erspart, auch er muß manchmal betrübten Herzens einen schmerzenden Verlust hinnehmen. Er fühlt einen solchen, trotzdem er sich frei fühlt von aller Schuld, viel empfindlicher als der Pfleger mit weniger fühlendem Herzen für solch ein singendes Juwel unserer heimischen Natur. Nicht jeder Wildling eignet sich zur Verpflegung im Zimmer, nicht jedes Individuum verträgt in seinem Organismus eine derartige revolutionäre Umstellung der angeborenen Lebensbedingungen; die Gewöhnung an andere Luft, andere Kost, die fehlende Bewegungsfreiheit, der unterdrückte, daher unbefriedigte Geschlechtstrieb und verschiedene andere Erscheinungen des Käfiglebens stellen starke Anforderungen an den im Kampf des Daseins sonst starken abgehärteten, aber für derlei plötzliche Veränderungen zu schwachen Organismus. Bei der Käfigung der Nachtigall ist bei der Einstellung als Käfigvogel, wie bereits erwähnt, der Zeitpunkt des Fanges, also noch ungepaart, ein Hauptfaktor; ebenso wichtig ist die Fütterung des Frischfanges mit frischen Ameisenpuppen, und diese zwei Hauptbedingungen müssen, soll nicht gleich als Wildfang der Keim der Hinfälligkeit in den Organismus gelegt werden, als Haupterfordernis den Schlag auslösen. Erfüllt ein derartig behandelter Frischfang diese dringende Notwendigkeit, indem er sich ordnungsgemäß „abschlägt", so ist schon der Grundstein gelegt auf die alle Hoffnungen erfüllende, erste Überwinterung. Hat der Frischfang seine erste Käfigmauser unter stetiger Verabreichung von frischen Puppen und infolge Zurneigegehens derselben auch durch Verabreichung von Mehlwürmern hinter sich, so stelle ich die tägliche Mehlwurmration immer tiefer, bis ich dieselbe ganz weglasse und einige Mehlwürmer nur ab und zu als Delikatesse reiche. Nachtigall und Sprosser sind zwar ausgesprochene Wurmvögel, denen vorwiegend animalische Kost am zuträglichsten ist, aber wiederum vertragen sie täglich ein größeres Quantum Mehlwürmer in der gesangslosen Zeit nicht ohne Schädigung ihrer Gesundheit. Hat man die Nachtigall, nachdem die frischen Puppen anfangen, zur Neige zu gehen, zeitig genug, damit man zur Einfütterung an ein Mischfutter noch einige mit verabreichen kann, nach und nach an ihr Winterfutter gewöhnt, so darf man ihr, ist sie nicht bei voller Brust, die Mehlwürmer nicht ganz entziehen, man reiche ihr gegen fünf Würmer täglich und sorge dafür, daß sie auch abends bei erleuchteter Stube noch Gelegenheit hat zum Fressen. Außerdem gestalte man ihr Futtergemisch recht nahrhaft durch reichliche Weißwurmgabe, etwas kleingehacktes, gekochtes Hühnerei, sehr dienlich ist auch zerkleinertes, gekochtes oder noch besser rohes Rinderherz. Bei der Nachtigallen- sowie auch Sprosserpflege achte man vor allem stets darauf, daß diese Vögel nicht abmagern, sonst sind sie unrettbar verloren. Ist ein Vogel gut bei Leibe oder hat er gar Fettansatz, bleiben Mehlwürmer sowie alle übrigen Extrazutaten weg. Manche Liebhaber begehen den Fehler, daß sie ihrer Nachtigall, wenn sie gegen Weihnachten zu wieder lebhafter wird und unter

lockendem „Tack, tack“ im Käfig hin und her geht, nun tüchtig mit Mehlwürmern zu Leibe rücken. Nichts ist falscher als dies, denn erstens ist das gedämpfte „Tack, tack“ nur ein Zeichen ihres Wohlbefindens und zweitens treibt er mit der unsinnigen Mehlwurmfütterung den Vogel in eine vorzeitige Brunst, zum Ausbrechen des Schlages ist er noch nicht reif, die Hitzigkeit der Brunst hat durch das Fehlen des Gesanges keine Ableitung und verschlägt auf andere Organe, und Krankheitserscheinungen sind die Folge dieses Fehlers. Alle Mühen der Überwinterung waren umsonst, denn entweder, wenn es noch gut geht, treibt er den Vogel in eine anormale Mauser und mit dem Schlag ist es für diese Gesangszeit vorbei, oder, was noch schlimmer ist, die Hitze geht in die Füße und zeitigt Fußkrankheiten, deren Heilung schwierig und langwierig ist. Häufig kommt es sogar vor, daß er die Nachtigall in den Tod treibt, denn Schlaganfälle sowie öfters auftretende Krämpfe bringen ihr gar bald ein zeitiges Ende. Darum muß man bei der Überwinterung der Nachtigall nur stets darauf achten, daß sie wohlgenährt ist, Mehlwürmer entweder in der gesangslosen Zeit ganz weglassen oder höchstens nur selten mal einen als abwechselnde Delikatesse reichen, handelt man so, dann wird man überrascht sein von den Erfolgen in der Nachtigallenpflege. Diejenigen Liebhaber, die meine Erfolge in der Haltung der Nachtigallen kennen, wissen auch, daß ich fast stets schon vor Weihnachten ohne vorherige Mehlwurmfütterung Nachtigallenschlag in meiner Vogelstube habe. Festgestellt muß auch werden, daß es nicht immer an einer falschen Pflege liegt, wenn eine Nachtigall etwas später in den Schlag kommt. Zu beachten ist dabei, daß bereits überwinterte Nachtigallen zeitiger in den Schlag kommen, als solche erster Überwinterung, ferner daß auch manche Nachtigall ein Jahr zeitig, das andere später kommt, außerdem dürfte auch das Alter des betr. Vogels, da jüngere Vögel bekanntlich zeitiger und auch fleißiger singen, ebenso wie auch die individuelle Veranlagung des Vogels eine Rolle mit spielen. Beginnt die Nachtigall fleißig zu „knarren“, womit der Lockruf des Männchens „Wit-karr“ gemeint ist, denn das Weibchen lockt nur „Wit, wit“, so ist es eventuell, aber nicht immer, ein Zeichen, daß baldiger Gesangsbeginn in Aussicht steht. Nun aber fest bleiben, mag die gefüllte Mehlwurmkiste und der Drang nach Nachtigallenschlag noch so reizen, keine 15—20 Stück Mehlwürmer als Henkersmahlzeit reichen, Geduld und immer wieder nur Geduld sei die Losung in der Vogelliebhaberei. Befinden wir uns im Januar, der Vogel ist vollkommen gesund und noch nicht im Schlag, dann versuche man, vorsichtig tastend, mit einer Gabe von täglich zwei Stück Mehlwürmern, welche nach und nach gesteigert werden, auf den Gesang reizend einzuwirken, und meistens bleibt der Erfolg nicht aus, falls alle Vorbedingungen eines gesunden Organismus vorhanden sind. Fördernd auf den Gesang ist auch feingehacktes hartgekochtes Hühnerei und ebenso Rinderherz. (Schluß folgt.)

Goldhähnchen, Baumläufer und Meisen.

Von W. R., Berlin.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Schwanzmeise. Ein häufiger Gast, den wir des öfteren in den Straßenbäumen der Vorstädte während der Winterszeit beobachten können, ist unsere Schwanzmeise. Schon ihre kleine Gestalt mit dem langen Schwänzchen gibt ihr ein merkwürdiges Aussehen. Sie gehört auch zu den zierlichsten Vertretern der heimischen Vogelwelt, die unsere Käfige bewohnen.

Vor zwei Jahren, im Juni, gelangte ich in den Besitz zweier junger Schwanzmeisen, die ein ungefähres Alter von zehn Tagen hatten. Sie machten sofort Anstalten zum Sperren und ließen sich mittels eines leicht angefeuchteten Pinsels frische Ameisenpuppen in den geöffneten Rachen schieben. Sie befiederten sich zusehends. In einem kleinen Käfig saßen sie anfangs auf einer Stange eng zusammengeschmiegt da. Am Abend bezogen sie, zur Nachtruhe, ein mit einem verlassenen Finkennest ausgefülltes Kästchen. Als Aufzuchtfutter erhielten sie neben frischen Ameisenpuppen etwas Hirn, feingeschnittene weichhäutige Mehlwürmer und andere kleine Insekten. Im Verlaufe weiterer zwei Wochen waren sie erwachsen und turnten lustig im Käfig umher. Sie blieben sehr zahm und kamen stets auf meine Hand geflogen, sobald ich die Käfigtür öffnete.

Die Aufzucht junger Meisen, insbesondere Angehöriger der Kohl-, Blau- und Sumpfmeisen, macht häufig Schwierigkeiten. Die jungen Vögel sperren gut und nehmen die Nahrung auf und scheinen auch im Wachstum gute Fortschritte zu machen. Doch sobald sie dann einige Zeit selbständig sind, gehen sie plötzlich zugrunde. Krampfanfälle sind die Ursache des Todes. Mir scheint die Käfigung in der Freiheit erwachsener, wildgefangener Meisen oft einfacher zu sein. Bei der Aufzucht werden wahrscheinlich irgendwelche Fehler unbewußt gemacht, welche häufig die schnelle Todesursache sind.

Nun zurück zu den Schwanzmeisen. Sie mauserten im Hochsommer das Jugendkleid, behielten aber den schwarzen Augenstrich, den häufig noch jüngere Schwanzmeisen haben. Sie bewohnten einen ähnlich wie für die Goldhähnchen eingerichteten Käfig. Später erhielt ich auch einmal frischgefangene Schwanzmeisen, die mit der Annahme von Mehlwürmern und frischen Ameisenpuppen wenig Schwierigkeiten machten. Allmählich gewöhnte ich sie an ein Futtergemisch, das hauptsächlich aus getrockneten Ameisenpuppen bestand. Nebenbei erhielten sie gehacktes Ei, feingehacktes frisches Fleisch und Mehlwürmer. Es ist recht unterhaltend, dem Treiben dieser kleinen Federbällchen zuzusehen. Sie turnen gern in dünnen Zweigen, wie die von Birken, umher und zeigen dabei ihre Behendigkeit und ihr flinkes Wesen.

Die Pflege all dieser zarten kleinen Insektenfresser ist recht lohnend und anziehend. Allerdings macht häufig ihre Eingewöhnung Schwierigkeiten. Doch sobald diese einmal überwunden sind, sind die Vögel bei verständnisvoller Pflege ausdauernd. Es ließe sich darüber noch sehr viel schreiben. Meine Ausführungen bringen nichts Neues dem Pfleger

dieser Vögel, doch sollen sie dazu anregen, daß wieder häufiger über sie Abhandlungen in der „Gef. Welt" erscheinen, und daß andere Vogelpfleger sich einmal mit der Haltung dieser zierlichen Geschöpfe beschäftigen. Das gleiche gilt von den flinken und zierlichen Waldmeisen, über die ich anschließend berichten werde.

Meisen. Wie häufig finden wir die Ansicht vertreten, daß Meisen, insbesondere Kohl-, Blau-, Sumpf-, Hauben- und Tannenmeisen, leicht einzugewöhnen sind. Doch das ist alles nur scheinbar,

Dominikanerwidafink (s. S. 168).

schon nach kurzer Zeit machen sich die Fehler der schnellen Eingewöhnung bemerkbar durch den Tod der Pfleglinge. Sämtliche Meisenarten bedürfen einer sorgfältigen und vorsichtigen Eingewöhnung. Meisen verzehren in der freien Natur überwiegend Insekten und deren Eier und Larven, daneben fressen sie, besonders im Herbst und Winter, pflanzliche Stoffe, Sonnenblumenkerne, Hanf usw. Dementsprechend sei auch ihre Eingewöhnung und Pflege. Es wird häufig der Fehler gemacht, daß sie vom ersten Tage ihres Gefangenschaftslebens an hauptsächlich mit Hanf usw. ernährt werden. Zunächst scheinen die Meisen sich dabei wohl zu fühlen, doch später treten, wie schon erwähnt, Todesfälle ein. Frischgefangene Meisen werden am besten mittels zerschnittener und ganzer Mehlwürmer an ein Weichfuttergemisch, das viele getrocknete Ameisenpuppen aufweist, gewöhnt. Daneben erhalten sie dann als Zugabe Hanfkörner und Sonnenblumen. Auf diese Weise wird eine gesunde, mehr den natürlichen Verhältnissen entsprechende Ernährung und dadurch bewirkte gute Eingewöhnung gewährleistet. Aufgeplusterten, als ein Federball dasitzenden Meisen gibt man am besten sofort die Freiheit, in der Gefangenschaft gehen sie nur zugrunde. Die Eingewöhnung der Meisen geschieht am besten in zunächst kleineren Kistenkäfigen, die mit nur wenigen Vögeln besetzt werden. Nachdem sie sich an die Aufnahme des Futtergemisches gewöhnt haben, kann man sie in ihre ihnen zugedachte Behausung unterbringen.

Bei der Besetzung eines Flugraumes oder Käfigs mit Meisen muß vorsichtig vorgegangen werden. Es lassen sich ja bekanntlich nicht alle zusammenhalten. Zur Einrichtung eines Meisenkäfigs gehören dicke Kiefernäste, grünes Kieferngestrüpp und auch dünne Zweige, wie die von der Birke. Sie lieben viel Abwechslung. Schlafkästen sind ihnen stets willkommen. Die kleineren Meisenarten, Hauben-, Tannen- und Sumpfmeisen, lassen sich meist gut zusammenhalten. Die Blaumeise ist auch häufig harmlos, doch hatte ich des öfteren erlebt, daß auch sie kleinere Artgenossen verfolgt. Kohlmeisen hält man am besten allein. Sie sind meist zänkisch und bissig, oft sogar untereinander. In einem meiner Käfige wohnte ein Kohlmeisenpaar anfangs recht friedlich beisammen. Eines Tages fand ich den weiblichen Vogel tot und zerbissen auf dem Käfigboden. Es mag vielleicht der Fall sein, daß die Meise plötzlich verstorben ist und erst nach dem Tode von der anderen angefressen wurde. Doch traue ich ihnen zu, daß sie sich unter Umständen auch gegenseitig töten.

Ein Flugkäfig mit Meisen bevölkert hat stets viel Anziehendes an sich. Die Vögel sind immer munter und lebendig. Sie zeigen so recht ihr eigenartiges Wesen. Die eine turnt an dünnen Birkenzweigen herum, die andere sucht die Rinde des Kiefernastes ab, wieder eine andere aber frißt einen ergatterten Mehlwurm, nachdem sie sich eine sichere Stelle gesucht hat, an der sie vor ihren Kameraden geschützt ist und ihn mit Ruhe verzehren kann. Die niedlichen Sumpfmeisen lassen oft ihre helltönende Strophe hören. Hauben- und Tannenmeisen tun das gleiche. Letztere hat einen recht angenehmen Gesang.

Eine besondere Vorliebe hatte ich stets für die beiden zuletzt genannten Arten. Die Tannen- und Haubenmeisen sind wohl die am schwierigsten einzugewöhnenden. Sie bedürfen einer sorgfältigen Pflege und müssen unbedingt, wie auch die anderen, an ein Insektenfuttergemisch gewöhnt werden. Sie werden stets die auf sie verwendete Mühe dem Pfleger lohnen. Als Beigabe zum Futtergemisch erhalten sie neben Mehlwürmern auch gelegentlich Hanf und ein wenig blauen Mohn. Meisen werden meist sehr zahm und zutraulich. Dies gilt besonders von der munteren Sumpfmeise, die im Herbst und Winter

mehr Sämereien zu sich nimmt als andere Arten. Diese kleinen Meisen sind, richtig eingewöhnt, ausdauernd und gar nicht weichlich in der Gefangenschaft. Im Gegensatz zu ihnen stehen Blau- und Kohlmeise. Besonders erstere ist häufig sehr weichlich und verendet bald. Sie bedarf einer ganz besonders sorgfältigen Pflege. Körnerfutter erhält sie in geringem Maße als Nebenfutter. Überhaupt kann nicht genug betont werden, Meisen wie andere zarte Insektenfresser richtig einzugewöhnen, um ihnen eine einigermaßen natürliche Ernährung zu sichern. Wer das nicht kann oder nicht will, läßt lieber die Meisen in der freien Natur. Sie sind sonst in kurzer Zeit sichere Todeskandidaten. Auch für die Kohlmeise ist eine sorgfältige Pflege nötig, sie ist nicht so hart, wie sie gewöhnlich hingestellt wird.

Die Pflege der Meisen ist nicht so einfach wie die vieler anderer Vögel. Mit ihr sollten sich nur geübtere Vogelpfleger befassen. Einem Anfänger werden die durch falsche Eingewöhnung verursachten Todesfälle die Vogelpflege verleiden. Junge Vögel, die nach einem Gewitterregen oder aus anderen Ursachen das Nest verlassen haben, werden häufig sehr zahm. Doch ist es mir wiederholt nicht gelungen, diese Vögel längere Zeit am Leben zu erhalten. Sie gingen dann an krampfartigen Erscheinungen zugrunde. Andere wieder blieben bei derselben Fütterung und Pflege gesund.

Für sauberes Trinkwasser ist stets im Meisenkäfig zu sorgen. Die Meisen baden sehr gern und gründlich.

Vogelbilder aus Transvaal.

Von F. E. O. Mörs.

(Nachdruck verboten.)

Mit Freude und Andacht gebrauche ich immer als ein vorzügliches Nachschlagewerk den großen Ruß, kann aber doch nicht umhin, auf einige Irrtümer hinzuweisen, die sich in das so großartig angelegte Werk des Altmeisters eingeschlichen haben. Mit Bezug auf die Dominikaner-, Paradies- und Königswitwen werde ich in diesem und folgenden Aufsätzen diese Irrtümer widerlegen.

Die Dominikanerwitwe ist kein selbst brütender Vogel und lebt auch stets in Vielweiberei. Letzteres habe ich dutzende Male beobachtet im Garten meines Landhauses am Krokodilflusse, in welchem sich die Vögel zu Hunderten herumtreiben, angelockt durch die Vögel in meinen Volieren und die Saat, die beim Reinigen der Volieren frei in den Garten gestreut wurde.

Stets waren auf dem Futterplatze viel mehr Weibchen als Männchen. Letztere waren in einem fortwährenden Zank und Kampf untereinander über die Weibchen. Die Brutzeit, oder besser gesagt Legezeit, fällt in die Regenperiode, das ist vom November bis Ende März. In den dreißig Jahren, die ich hier bin, habe ich niemals ein Nest der Dominikanerwitwe gefunden, und meine eingeborenen Wärter, darüber befragt, lachten über meine Unwissenheit und sagten mir, daß ein „Koning-Rooibekkie", so wird die Dominikanerwitwe auf holländisch von den Kaffern genannt, niemals selbst brüte, aber wohl ihre Eier in die Nester der Rooibekkies lege. Das Rooibekkie oder Helenafasänchen sei die Brut- und Aufzuchtmutter der Dominikanerwitwen, und ich bin dann selber hiervon überzeugt worden. Erstens dadurch, daß mir Kafferjungens Helenafasänchennester mit Jungen gebracht haben. Im ersten Augenblicke habe ich diese Jungen alle für Helenafasänchen angesehen, denn in Farbe und Größe waren alle gleich, doch bei näherer Untersuchung fiel mir auf, daß einige der Jungen viel dickere Köpfe hatten, und nach sorgfältiger Aufzucht entpuppten sich diese Dickköpfe dann stets als Dominikanerwitwen.

Um der Sache dann aber auf den Grund zu gehen, bin ich mit den Viehhütejungens dann selber auf die Suche gegangen nach den Nestern der Helenafasänchen. Zu Viehhütern werden Kafferjungens verwendet — und diese Luders wissen alles, was in der ausgedehnten Buschsteppe vorgeht und haben die Vögel lieb zum „Fressen".

Die Helenafasänchen bauen ihre Nester in ein bis zwei Fuß hohe Dornenbüsche, die dicht mit Gras durchwachsen sind. Das Nest ist stets in die Mitte des Dornenbusches in dem Grase, auf die Erde gebaut, und die natürlichen vorhandenen Gräser werden benutzt zur Wölbung des Nestdaches und dann weiter mit trockenen Fasern und Gräsern ausgepolstert. Zu diesem Bau führt eine Röhre vom Rande des Busches, etwa 12—14 Zoll lang. Diese Röhre ist aus den auf dem Platze, wo die Röhre angelegt ist, vorhandenen Gräsern geflochten und mit hinzugeschleppten Gräsern dicht und dauerhaft gemacht.

Wenn solches Nest gefunden war, habe ich stundenlang auf der Lauer gelegen, um zu sehen, ob wohl eine Dominikanerwitwe solches Nest aufsuchte. Nachdem ich etwa 20 oder 25 Nester so beobachtet hatte, ist es mir nur einmal geglückt, eine Dominikanerwitwe in solche Röhre verschwinden zu sehen und nach etwa einer halben Stunde kam sie wieder zum Vorschein und flog ab. Das Nest habe ich sofort untersucht und fand sieben weiße Eier darin, fünf waren länglichrund und zwei waren dickrund. Dieses Nest hat ein Hütejunge 14 Tage beobachten müssen, und in der dritten Woche habe ich dann selber das Nest geholt. Es waren acht beinah flügge Junge darin, darunter zwei Dickköpfe. Mithin mußte das Helenafasänchenweibchen noch ein Ei bei gelegt haben. Seit der Zeit habe ich mir viel Nester der Helenafasänchen durch die Hütejungen bringen lassen mit Jungen und mit Eiern. Es war bei der Untersuchung der Nester ganz selten, daß zwischen den Eiern keine dickrunden, oder daß zwischen den Helenafasänchen keine Dickköpfe waren. Die dickrunden Eier in den Nestern sind also ohne Zweifel von der Dominikanerwitwe, denn die dickköpfigen Jungen haben sich stets zu Dominikanerwitwen herausgewachsen.

Auffallend ist die große Eierzahl in einem Nest; neun und zehn waren keine Seltenheit, doch waren dabei nie mehr als zwei bis drei dickrunde Eier. Mit den Jungen war es ebenso, sechs bis sieben Helenafasänchen und zwei bis drei Dominikanerwitwen. Die Färbung der Jungen ist gleich, doch zeigt sich sehr bald bei den Dickköpfen die braune Streifenzeichnung auf den Köpfen.

Dompfaffenzucht.

Von Amtmann Max Krumm.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Indem ich zum Schluß meiner Ausführungen gelange, glaube ich, daß Herr Marz in Chemnitz damit eine ihn befriedigende Antwort auf seine Anfrage im Aufsatz: „Von einem Gimpelweibchen" (Heft 32 von 1924) erhalten hat. Er wird selbst am besten beurteilen können, ob sein Dompfaffenweibchen die meinen Erfahrungen entsprechende Fütterung hatte und die richtigen Nestunterlagen und Baustoffe. Ich bin überzeugt, daß er mit der Paarung der beiden Dompfaffen bei meiner Behandlung Erfolg erzielt hätte, da das Männchen das Weibchen fütterte. Bezüglich des Eierlegens bei seinem Kreuzungsversuch zwischen Zeisig und Gimpelweibchen bin ich derselben Ansicht wie Herr Sperling in dem Zusatz, den er der Anfrage gleich angefügt hat. Gerade Dompfaffenweibchen sind manchmal geschlechtlich sehr erregt, wie der Gimpel überhaupt ein leidenschaftlicher Vogel ist. Selbst ohne Reflexwirkung durch Männchen gleicher oder anderer Finkenart — mögen diese im gleichen Bauer oder nebenan sich aufhalten — können die Gimpelweibchen so liebestoll sein, daß sie den Nestbau versuchen oder ohnedem Eier ablegen. Die Analogie hat Herr Marz bei meinem eingangs geschilderten Mißerfolg hinsichtlich eines Kreuzungsversuchs Dompfaff × Kanarie. Der Nistversuch und Nestbau besagt noch nicht, daß eine Begattung stattgefunden hat oder stattfinden müßte. Eher wären von dem Verhalten des Zeisigs zum Gimpelweibchen Schlüsse zu ziehen. Herrn Marz' Frage: „Ist eine erfolgreiche Paarung zwischen Dompfaff und Zeisig möglich?", möchte ich nicht ohne weiteres verneinen. Der Zeisig ist dem Kanarienvogel, der sich mehrmals mit dem Dompfaff erfolgreich kreuzte, wohl noch näher verwandt als der Distelfink dem Kanarienvogel. Demnach sollte man, allein die Blutfrage gesehen, annehmen, daß der Dompfaff sich mindestens ebenso gut mit dem Zeisig wie mit dem Distelfink kreuzen ließe. Über erfolgreiche Kreuzungen zwischen Distelfink und Gimpel ist schon berichtet worden. Der Zeisig wird im Verhältnis zur Körpergröße des Dompfaffen wohl zu klein sein. Es wird sich in der Hauptsache um die mechanische Möglichkeit der Begattung handeln. Jedenfalls müßte man sehr starke Zeisigmännchen und besonders kleine Dompfaffenweibchen wählen. Ich will den Versuch auch mal machen. Erfahrungen zu Herrn Marz Frage im bejahenden Sinne hat man wohl noch nicht gemacht. Ich habe wenigstens noch nichts davon gelesen, obschon ich die Literatur über Bastardzucht ziemlich genau kenne.

Für den, der an dem gewöhnlichen Produkt meines von Dompfaffen erbrüteten und großgezogenen Bastards Zeisig × Kanarie noch Anteil nimmt, sei hinzugesetzt, daß das Pflegekind der Dompfaffen ein für die Verhältnisse seiner Art großer und starker Vogel geworden ist, wohl infolge starker Atzung. Er ist ein Männchen und singt, von einem Kanarienhahn als Vorsänger angeleitet, ganz gut. Etwas heller gefärbt als ein Zeisig und ohne schwarze Kopfplatte zeigt er im Gefieder, vor allem im Charakter, ganz ausgesprochen das Wesen der Zeisige, wie man überhaupt die Beobachtung macht, daß bei Kreuzung mit Kanarien sich die Art des Naturvogels in der Nachkommenschaft am kräftigsten vererbt. Im Gesellschaftskäfig ist er der frechste; selbst die Dompfaffen haben vor ihm Angst. Ich will mit ihm mal einen Kreuzungsversuch Zeisig-Kanarie × Gimpelweibchen machen, wenngleich das wohl nicht sehr aussichtsreich sein wird.

Braunkopfhabia (Text im nächsten Heft).

Hinsichtlich der Dompfaffenzucht bin ich für jede Mitteiluug der anderwärts gemachten Erfahrungen sehr dankbar, seien es auch nur die kleinsten Beobachtungen. Sie müssen gesammelt werden, um ein Gesamturteil zu ermöglichen.

Ganz sicher hat man vielfach mehr Gewicht auf der Dompfaffen Abrichtung zum Liederpfeifen als auf die biologischen Vorgänge gelegt. Mir kommt es mehr auf letztere an. Wohl werden Dompfaffen

jährlich in tausenden von Exemplaren aus dem Nest genommen und mühevoll aufgepäppelt, wenn sie nicht sterben. Wohl werden tausende von Dompfaffen als die nächst dem Kanarienvogel bekanntesten Stubenvögel gehalten. Ist es da nicht beschämend, daß allen Veröffentlichungen nach zu urteilen die Stubenvogelzucht der Dompfaffen immer noch zu den ungelösten Problemen gehört? Seitdem der Bahnbrecher für Vogelkunde und Vogelpflege, der Begründer dieser Zeitschrift, Dr. Karl Ruß, im Jahrgang 1885 Seite 414 ganz grundsätzlich darauf hinwies, wie wertvoll nach jeder Richtung ein Fortschritt in der Dompfaffenzucht sei, ist man meines Wissens darin nicht viel weiter gekommen. Die meisten Berichte beziehen sich auf Zufallserfolge in großen Freivolieren.

Oder sollte mehr Dompfaffenzucht getrieben werden, als man gemeiniglich weiß? Sollten manche das Geheimnis für sich behalten? Das wäre nicht recht. Ich möchte mit Herrn Marz darum bitten, daß alle einschlägigen Beobachtungen in der „Gef. Welt", dem einzig dafür maßgebenden Organ, mitgeteilt werden.

Es wäre schon eine schuldige Dankbarkeit für unseren Freund Dompfaff, wenn sich die berufenen Vogelliebhaber an die Zuchtversuche mehr heranmachten. Der Dompfaff ist für die Arbeit wirklich nicht zu gering, weil er heimisch und nicht selten ist! Ist er doch, wie allgemein bekannt, ein schöner, farbenprächtiger, leicht zähmbarer und vor allem anhänglicher, charaktervoller, herzhafter und gemütsreicher Kerl. Er ist ein Vogel, der jedenfalls innerlich seinem Pfleger ebenso nahe tritt, wie der Papagei, sobald er im Verkehr mit ihm von der Scheu sich freimacht und als jung aufgezogener Vogel ganz zahm geworden ist. Der sprichwörtlich „dumme" Gimpel, der „auf den Leim geht", steht an geistigen Anlagen und, ich möchte sagen, an „Gemüt" entschieden an der Spitze der schon hochstehenden Finkenvögel. Ich fühle stets zu meinen zahmen Dompfaffen höhere Freundschaft und größere Verpflichtungen als zu den anderen heimischen „Waldvögeln" und zu den Exoten, so leicht angefreundet, zutraulich und klug von den andern einzelne sein mögen. Wer den Dompfaffencharakter richtig kennt, wird mir ganz beipflichten.

Ich bin überzeugt, daß der Dompfaff ein vollkommenes Haustier werden könnte, viel verständiger und klüger als ein Kanarienvogel, wenn er nur erst mühelos in regelmäßiger Folge und in Generationen zu züchten wäre. Bei der Anpassungsfähigkeit seines Wesens an die Menschen würde dann gerade bei diesem Vogel von einer Gefangenschaft sicher nicht mehr die Rede sein können. Der endgültige Zuchterfolg von regelmäßiger Dauer müßte doch sehr lockend sein, für den bloßen Liebhaber, um dessen gewiß zu sein, daß wir für des Gimpels Wohlbefinden die Gesetze restlos kennen und erfüllen, für den Abrichter — selbst für den, der ausschließlich auf den klingenden Gewinn sieht — weil er des mühseligen Aufpäppelns enthoben wäre. Ehe wir das Liebesleben, Brutgeschäft und die Aufzucht der Jungen wissenschaftlich-praktisch nicht voll beherrschen, haben wir die Freundschaft des Vogels nicht ganz verdient, fehlt unbedingt noch etwas an seiner Pflege. Die Züchtung ist stets der edelste Teil und der Höhepunkt all unserer Liebhaberei; und gerade die Beobachtung der Brutpflege selbst bringt dem Vogelwirt selige Gemütsstunden.

Nicht einmal des Dompfaffen allein wegen sollten wir seiner Zucht besondere Bedeutung beimessen und Mühe schenken. Als Träger eines lebhaft gefärbten Gefieders, dessen Farbe in der Gefangenschaft auf die Fütterung leicht reagiert, kann der Dompfaff als Objekt des Studiums auf dem einschlägigen Gebiete dienen. Die Versuche gerade mit ihm können zur Lösung von Fragen führen, die für die Haltung wertvoller Exoten in ihrer Gefiederpracht im Vordergrund des Interesses stehen, weil sie nicht nur Schönheitsfragen, sondern die wichtigsten Fragen primitivster Gesunderhaltung sind. Die Schwierigkeiten der Dompfaffenzucht einerseits und die Schwierigkeiten, welche bei Haltung und Zucht lebhaft gefärbter anderer Vögel andererseits hervortreten, liegen bestimmt und ausschließlich auf demselben Gebiete. Nach dem Ergebnis neuer Forschungen (Adlersparre, Rudolf Neunzig, Birk und vieler anderer, die hier zu Worte gelangten), rückt man meiner Überzeugung nach der Überwindung der Schwierigkeiten merklich näher. — Vitamine! Ich brauche eigentlich nicht zu sagen, wie sehr in der Forschung die Frage der Gefiederbildung mit der Zuchtfrage eng verknüpft ist, weil Gefieder und Zucht (Mauser und Brut) der Prüfstein für die richtige Futterpflege und Behandlung ist.

Im ganzen ist der Dompfaff als leicht zu erlangender, ziemlich widerstandsfähiger Vogel mit allen hervorstechenden Eigenarten und guten aber auch empfindlichen Anlagen für physiologische als auch psychologische Studien so interessant und geeignet wie keiner. Angesichts vieler Probleme und ihrer Erforschung kann man gerade im Hinweis auf den Dompfaff sagen: „Warum denn in die Ferne schweifen, sieh, das Gute liegt so nah". Es brauchen sich jedenfalls über die Gimpelzucht auch Züchtergrößen nicht erhaben zu fühlen; daran werden noch viele Meister ihr Meisterstück machen können. Und — „in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister".

Jedenfalls ist, was den Kennern bekannt, am Gimpel verdienstvoll für die Vogelhaltung viel zu lernen, schon nach der alten Empfehlung von Dr. Karl Ruß, zumal wenn die von der Praxis ausgehende und an ihr erprobte Forschung wissenschaftlich betrieben wird.

Möge mein Aufsatz dazu beitragen, Interesse für die Dompfaffenzucht und für die Aufgaben, die hier noch ungelöst liegen, zu erwecken. Allen Freunden der Dompfaffen möchte ich zurufen „auf zur Dompfaffenzucht" und zum Bericht in diesen Blättern. Mögen die Versuche dazu dienen, den Dompfaffen zu den alten Freunden noch neue zu erwerben und vor allem uns in der Naturforschung weiter zu bringen. Das sind meine lebhaften Wünsche.

Der „Kärrekied".

Von A. Troschütz in Hannover.

(Nachdruck verboten.)

In Südhannover verbrachte Sommerferien geben Gelegenheit zu Wanderungen in die landschaftlich besonders reizvollen lippischen Berglande. Vor der langen, bis zur Höhe bewaldeten Kette des Teutoburger Waldes lagert sich da eine weite Hügellandschaft, aus deren Laub- und Nadelwäldern, Viehweiden und Ackerflächen zahlreiche Einzelhöfe hervorschauen. Hainbuchen- und Weißdornhecken umzäunen die Weideplätze, wilde Rosen wachsen an den Feldrändern, Brombeer- und Haselnußgebüsch grenzen Wald- und Wiesenränder ab. Durch Schluchten und Talsenkungen rinnen klare Bäche. Für ein reiches Vogelleben sind hier die günstigsten Lebensbedingungen vorhanden. Hier ist es, wo ich den Wiedehopf ganz flüchtig nur zum ersten und einzigsten Male sah, wo mir beim Streifen im raumen Stangenholze die abstreichende Eule beinahe den Hut vom Kopfe warf, wo in der Dämmerung der Sumpfrohrsänger, nur wenige Schritte entfernt, von den Spitzen schwankender Halme sein liebes Liedchen voller Ausdauer und Kraft in den stillen Abend klingen ließ.

So abwechslungsreich und schön die schmalen Fußwege an den Waldrändern, durch die Felder waren, so herrliche Fernsichten die Berge boten — es zog mich immer wieder zu der einzigen größeren Wasserfläche der weiteren Umgebung, zum „Norderteiche" hin. Nicht groß an Umfang, in einer halben Stunde bequem zu umwandern, aber wundervoll gelegen! Vielhundertjährige Eichen am Südrande, Tannen- und Buchenwälder zur Seite, im Norden eine Anhöhe mit Brombeergebüsch, Ginster und Heide bewachsen, mit herrlichen Blicken über diese große Waldeinsamkeit. Linker Hand dehnen sich üppige Felder bis zur Hochfläche des Biller Berges. Selten nur verirrt sich ein Wanderer hier her. Nur Ziegen hütende Kinder, Bauern, die einfahren, Weidejungen mit ihren Schafherden beleben die Landschaft.

Fast die Hälfte der Oberfläche des Sees ist mit riesigen Schilfbeständen bedeckt, die im Herbst der ganzen lippischen Starenwelt als Nachtherberge dienen. Undurchdringliches Dorngebüsch zwischen Ufer und Eichenhochwald verwehrt den Zugang von dieser Seite, und nur eine schmale Stelle bleibt frei, die einen Weitblick über die Wasserfläche zuläßt. Dieser Uferschutz durch Dorngestrüpp, Schilfwälder und eingezäunte Weideflächen verschafft einer an Zahl und Arten reichen Vogelwelt ein ungestörtes Dasein. Auf und am Wasser wimmelt es von Sing-, Sumpf- und Wasservögeln.

Da, wo die Aussicht bis zum anderen Ufer frei wird, verläßt ein klares Bächlein den See. Hier treten die Schilfwälder bis dicht ans Ufer heran, und es ist möglich, mit einem guten Glase das Leben auf dem Wasser und an den Schilfrändern in aller Deutlichkeit zu beobachten. So manchen schönen Sommernachmittag habe ich da zugebracht und mit dem Zeißglase zugeschaut, wie die schwarzen Wasserhühner tauchen und schwimmen, wie die Enten nach Futter suchen, wie die jungen Reiher im Neste am Schilfe nach den Alten ausschauen, wie die Alten schaukelnden Fluges an der Schilfwand entlang dem Horste zufliegen, wie der Bussard in der Luft seine Kreise zieht. Einige Meter vor mir biegen sich die Halme des Schilfes. Ein stärkeres Schwanken lenkt den Blick und das Glas nach einem im Wasser stehenden Weidenstrauch, an dessen schwachen Zweigen ein brauner Vogel auf- und abturnt. Im grellen Licht des Sommernachmittags entgeht mir keine Bewegung. Ich bewundere die Leichtigkeit, mit der der Vogel sich von Halm zu Halm, von Zweig zu Zweig bewegt, sehe und höre, wie er bald über dem Wasserspiegel, bald von der Spitze des Weidenbusches sein „kärre kied kied kied, kärre kied kied" ertönen läßt. Längst höre ich nicht mehr auf das Liedchen der Dorngrasmücke aus den Weißdornbüschen zur Linken. Nur noch den braunen Vogel habe ich im Auge, schaue, wie er dem Weidendickicht zufliegt, wieder erscheint, auf die Futtersuche geht, und höre, wie er singt, andauernd laut und mit Kraft.

Drosselrohrsänger.

Es war kein Zweifel möglich! Ich hatte dicht vor mir den Drosselrohrsänger in vollem Gesange beim Neste gehört und gesehen.

Die Freude war groß! Im nächsten Jahre galt mein erster größerer Ausflug wiederum dem „Norderteich", und wieder traf ich den Drosselrohrsänger im vollen Gesange. Das kräftige rauhe Lied in dieser schönen Landschaft hatte es mir immer mehr angetan, und der Wunsch entstand, diesen äußerlich schmucklosen, aber gewandten und scheinbar derben

Vogel in der Vogelstube zu pflegen. Als W. Hiltmann den Rohrsänger anbot, bestellte ich und erhielt ein gesundes Stück. Die Eingewöhnung bot keine Schwierigkeiten. Der Vogel wurde bald „fingerzahm", d. h. er holte sich die Mehlwürmer aus der Hand. Sein Appetit war äußerst rege. Aber nach einem Jahre war er noch nicht vermausert. Ich fütterte kräftig, viel Mehlwürmer. Der Vogel mästete sich ein Bäuchlein an und wurde trotzdem immer kahler. Nach einem weiteren halben Jahre sah er aus wie ein gerupfter Spatz, war rege und munter, aber mauserte immer noch nicht. Eines Tages fand ich ihn tot am Boden, wahrscheinlich am Herzschlag gestorben.

Nach jahrelangem Warten erhielt ich aus Berlin ein älteres Stück, das sich beim Eingewöhnen im Drahtkäfig die Schnabelwurzel kahl gescheuert hatte, aber sonst gesund und gut im Gefieder war. Das Eingewöhnen war wieder leicht. Auch dieser Vogel holte sich die Mehlwürmer bald vom Finger. Dagegen zeigte er bei der „Zukost" einige Absonderlichkeiten. Daß Biskuit und Kunsthonig Leckerbissen sind, weiß ich seit Jahren, daß Speck und Spinnen, Käfer und trockene Ameiseneier stets begehrt sind, beobachte ich jeden Tag, daß aber auch Weintrauben, Korinthen, süßes Obst vom Drosselrohrsänger, der in der Freiheit von Wasserinsekten lebte, mit Behagen verzehrt werden, war mir noch unbekannt. Dieser Vogel ist nun fast zwei Jahre in meiner Vogelstube, aber eine volle Mauser hat ebenfalls noch nicht stattgefunden. Vor einem Jahre war er in vollem Gesang, erneuerte das Gefieder im August nur wenig und sieht jetzt ziemlich „ruppig" aus. Die Flügelfedern sind an den Enden abgebrochen, von den Schwanzfedern ist nur eine neue vorhanden. Dabei frißt er gewaltig, badet gern und ist gut genährt. Es fehlt trotz dem Kraftfutter bester Mischung mit viel Ameiseneiern und Weißwurm, trotz der vielen Mehlwürmer an einem Futterbestandteil, der die Wasserinsekten des Freilebens einigermaßen ersetzt. Ich versuche es jetzt mit den kleinen Larven des Rosenkäfers. Mit diesem äußerst nahrhaften Futter halte ich meinen Wiedehopf in bester gesundheitlicher Verfassung. Dann will ich es mit Maikäferschrot versuchen. Kalkzusatz ist im Normalin, das ich regelmäßig messerspitzenweise zusetze, enthalten. Ob Kalzan nützt, wäre vielleicht eines Versuches wert. Auch V-Venecin wird gelobt, ist aber von mir noch nicht erprobt werden. Da der Drosselrohrsänger ganz zahm ist, jeden Bissen vom Finger holt, ist es nicht schwer, ihm auch in der Vogelstube unter 58 anderen Bewohnern eine besondere Pflege zuteil werden zu lassen. Er ist ein so unerschrockener, mutiger und gewandter Vogel, der eine besondere Mühewaltung schon lohnt. In den ersten Tagen seiner Anwesenheit machte es mir Freude zu beobachten, wie er dem Futterneide der Schama zu begegnen wußte. Zuerst schreiend und flüchtend, dann schreiend mit aufgerissenem Schnabel abwehrend und schließlich mit größeren Sätzen über die Schama weg die erbeuteten Leckerbissen in Sicherheit bringend. Sein Gesang ist mäßig, und sein rauhes Lied verliert im engen Raume der Vogelstube allen jenen Reiz, der in der Stille und Weite des Norderteiches so anziehend wirkte. Und doch macht es Spaß, ihm zuzusehen und zuzuhören, wenn er unermüdlich sein „kärre kärre kied kied kied" ertönen läßt, von Ast zu Ast schnellt und jeden anderen Vogel aus seiner Nähe vertreibt. Der Gesang ist es nicht allein, der mir einen Vogel lieb und wert macht.

Streifentrupial (Text im nächsten Heft).

Raſſe, Mut, Temperament, Verträglichkeit und Zutraulichkeit ſchätze ich mehr. Und die hat der Droſſelrohrſänger. Darum zählt er zu meinen Lieblingen, und ich hoffe, daß es mir gelingt, ihn durch die Mauſer zu bringen. Für den Käfig iſt er bei ſeiner Beweglichkeit kaum geeignet.

Zur Fütterungstechnik der Vogelhaltung.

Von A. Adlerſparre.

(Nachdruck verboten.)

Anläßlich meines Überſichtsartikels vom Sommer 1923 (Geſ. Welt 1924, H. 2 u. 3) habe ich aus verſchiedenen Ländern einige Anfragen über die Stellung der Vitamine im Verhältnis zu anderen Nahrungsbeſtandteilen und über anderes hierhergehörendes erhalten. Da alſo Intereſſe für die Sache unter fortſchrittsfreundlichen Vogelliebhabern vorzuliegen ſcheint, und da möglicherweiſe auch andere meiner verehrten Leſer ſich mit denſelben Fragen beſchäftigt haben, dürfte es nicht als ganz unbegründet angeſehen werden, wenn ich hier mit ein paar Worten auf das Thema zurückkomme.



Dreifarbennonnen.

Im Freien beſteht ja für die Vögel, beſonders die tropiſchen, die Möglichkeit einer ziemlich reichen Auswahl unter verſchiedenen Futterſtoffen. Von ihrem wunderbaren Inſtinkte geleitet, benutzen ſie dieſe auch und wählen von dem, was vorhanden iſt, immer das, was für den Organismus am beſten geeignet iſt. Die Gefangenſchaft beraubt die Vögel der Gelegenheit einer freien Auswahl. Was wir ihnen in unſeren Käfigen bieten können, das kann niemals etwas anderes als ein geringer Bruchteil von dem ſein, was ihnen früher zu Gebote ſtand. Deshalb iſt es um ſo wichtiger, daß wir uns mit ihren elementarſten ernährungsphyſiologiſchen Forderungen einigermaßen vertraut machen, damit wir wirklich verſtehen, was bedeutungsvoll und was Nebenſache iſt, ſo daß wir unſere Fütterungstechnik hiernach rationell modifizieren können und den Tierchen einen möglichſt vollgültigen Erſatz für das reichen, was ſie ſich unter anderen Umſtänden ſelbſt inſtinktiv gewählt hatten. Kümmern wir uns um dieſe Dinge nicht, dann verlohnt es ſich kaum, Vögel zu halten; man kommt nicht vorwärts und unleugbar verurſacht man infolge von Unterlaſſungen und Unkenntnis den Tierchen größere oder geringere Leiden und ſich ſelbſt viele unnötige Enttäuſchungen und Verluſte.

Die Nahrung, welche ein Geſchöpf aufnimmt, hat zwei Hauptaufgaben.

Einmal muß ſie den Energiebedarf decken, der für Arbeitsleiſtung und Wärmebilanz des Körpers erforderlich iſt. Sodann muß ſie auch einem heranwachſenden Organismus Aufbaumaterial, einem ſchon ausgewachſenen Erſatzmaterial für das, was von ihm tagtäglich verbraucht und abgenutzt wird, liefern.

Der Energiebedarf wird von den drei wohlbekannten Hauptbeſtandteilen des Futters: Eiweiß, Fett, Kohlehydraten geliefert. Aber hierbei iſt von untergeordneter Bedeutung, durch welche verdaulichen Eiweißſtoffe, Fette und Kohlehydrate die Energiezufuhr erledigt wird. Sie können einander alle drei bis zu einem gewiſſen Grade, wenn auch nicht vollſtändig, erſetzen. Über eine ängſtliche genaue Einhaltung beſtimmter Prozentſätze von Eiweiß-, Fett- und Kohlehydrat-Kalorien im Futter, wie dies einmal in Frage geſtellt wurde, brauchen wir uns alſo nicht den Kopf zu zerbrechen; ſondern für die praktiſche Vogelhaltung dürfte es vom energetiſchen Standpunkte ausreichend ſein, wenn man im Gedächtnis behält, daß die größte Energiezufuhr (evtl. Fettanſatz) durch Fette (Verbrennungswärme = 9,3 Kal.) geſchieht, daß Eiweiß und Kohlehydrate beide ſo ziemlich denſelben Kalorienwert (4,1) haben, daß aber eiweißreichere Koſt entfettend wirkt, kohlehydratreichere u. a. umgekehrt und daß ferner ſogar ein heranwachſender Jungvogel mit

einem verhältnismäßig geringen Prozentsatz von (vollständigem) Eiweiß im Futter auskommt, wenn sein Energiebedarf schon durch Kohlehydrat- und Fettzufuhr einigermaßen gut gedeckt wird. Nach diesen Hauptrichtlinien kann man seine Technik ziemlich leicht modifizieren und in normalen Fällen ohne allzuviele Gedankenarbeit eine sehr zweckmäßige Energiezufuhr herbeiführen.

Nun zur Materialzufuhr. Wie verhält es sich mit ihr? Erfordert sie eingehendere Aufmerksamkeit von unserer Seite? Ganz sicher. Ist die Materialzufuhr in irgend welcher Hinsicht unvollständig — und dies kann der Fall sehr wohl sein, auch wenn gleichzeitig die Energiezufuhr aus Eiweiß, Fett und Kohlehydraten vollkommen ausreichend, ja sogar überreich ist — so sind die Folgen, dies beweisen zahlreiche Versuche, Leiden und über kurz oder lang der Tod des Vogels. Hier ist es nicht nebensächlich, welche Art Eiweiß man reicht, sondern hier sind Eiweißstoffe von ganz besonderem chemischen Bau erforderlich, in welchen gewisse Aminosäuren enthalten sein müssen. Weniger belangvoll ist es aber, ob dieses spezialstofführende Eiweiß vom Tier- oder vom Pflanzenreich stammt. — Andere derartige Spezialstoffe sind beispielsweise gewisse anorganische Salze und Wasser. Schließlich auch verschiedene, ihrem chemischen Bau nach noch nicht genauer bekannte Vitamine. Aber hiermit sind wir auch über die Stellung der Vitamine im Verhältnis zu anderen Bestandteilen der Nahrung klar:

Futtersubstanzen

Energielieferanten (Nährstoffe im üblichen kalorischen Sinn)	Materiallieferanten (Spezialstoffe)
Generell gesehen alles verdaubare Eiweiß, Fett, Kohlehydrate.	Eine Anzahl Aminosäuren (aus Eiweiß), Wasser, gew. anorganische Salze, verschiedene Vitamine u. a.

Diskussionen des Fütterungsproblems in Vogelzeitschriften haben sich bisher mit Vorliebe an die Energieseite des Futters gehalten. Hieraus muß man leider den Schlußsatz ziehen, daß die wenn möglich noch wichtigere Materialdeckungsforderung unter den Vogelliebhabern noch nicht diejenige Beachtung gefunden, die sie für die Gesundheit und das Wohlergehen der Vögel so sehr verdient.

Wie unvollständig jedoch Eiweiß aus Samenkörnern sein kann, geht aus folgenden Eiweißanalysen einiger uns wohlbekannten Samensorten klar hervor.

Aminosäuren	Zein aus Mais %	Gliadin aus Weizen %	Edestin aus Hanfsam. %
Glykokoll	—	—	3,80
Alanin	13,39	2,00	3,60
Valin	1,88	3,34	6,20
Leucin	19,55	6,62	14,50
Prolin	9,04	13,22	4,10
Phenylalanin	6,55	2,35	3,09
Asparaginsäure	1,71	0,58	4,50
Glutaminsäure	26,17	43,66	18,74
Serin	1,02	0,13	0,33
Tyrosin	3,55	1,50	2,13
Cystin	?	0,45	1,00
Histidin	0,82	1,49	2,19
Arginin	1,55	3,16	14,17
Lysin	—	?	1,65
Tryptophan	—	1,00	+

+ = vorhanden. (Osborne und Mendel, 1914.)

In Maiseiweiß fehlt also Glykokoll (was jedoch von geringerer praktischer Bedeutung sein dürfte), möglicherweise auch Cystin, Histidin und Arginin sind schwach vertreten, und vollständig fehlen Lysin und Tryptophan. Diese letzteren Aminosäuren sind indessen, physiologisch gesehen, sehr bedeutungsvoll. Tryptophan z. B. ist ganz unentbehrlich, sowohl für Erwachsene, wie für Junge; Lysin, unentbehrlich wenigstens für Junge. Verfütterung von Zein als Eiweißbestandteil der Grundnahrung hat dies, sowohl für Säuger, wie für Vögel, bewiesen. Solange Lysin und Tryptophan in der im übrigen reichlichen und vollständigen Grundkost fehlten, sank die Zuwachs- und Gewichtskurve stetig, und längere Versuche führten zum Tod des Versuchstieres. Sobald aber die Grundkost mit diesen beiden Aminosäuren vervollständigt wurde, stieg wiederum die Zuwachs-(Gewichts-)Kurve und nahm den für die Art normalen Charakter an. Ausreichendes Material um festzustellen, wie oft ein derartiger, von unvollständigen Eiweißstoffen verursachter Spezialstoffhunger tatsächlich vorliegen kann, fehlt uns bis jetzt. Man kann aber schon ahnen, daß er eine recht bedeutsame Rolle als Krankheitsursache bei unseren Körnerfressern spielen kann. Um so mehr, als Eiweißstoffe verschiedener Getreidearten — zu welchen in diesem Zusammenhang auch Hirse, Spitz, Reis, Hafer, auch Grassämereien gerechnet werden dürfen — sämtlich mehr oder minder unvollständig sein sollen und bezüglich der wichtigsten Aminosäuren einander nicht in ausreichendem Grade ergänzen können.



Stellung eines an „Spezialstoffhunger" eingegangenen Vogels.

Im ersten Augenblick könnte das wohl überraschend erscheinen und irgendein Leser könnte vielleicht hier einwenden, daß die Körnerfutterdiät wohl doch kaum so unbefriedigend sein kann, weil es ja mehr als einmal vorgekommen, daß Vögel — allerdings bei weniger gewissenhaften Pflegern — jahrelang nur von Körnerfutter gelebt haben. So zu denken ist indessen ein logischer Fehler. Daß der Vogel jahrelang bei gewisser Kost zu leben vermag, beweist durchaus nicht, daß seine Gesundheit davon nicht nachteilig beeinflußt wird. Menschen, die uns in jeder Hinsicht unendlich viel näher stehen als die Tiere und die deshalb einigermaßen leichter zu beurteilen sind, können bekanntlich viele, viele Jahre mit sehr ernsten Leiden leben, ohne daß ein Laie imstande ist dies wahrzunehmen, ja bisweilen werden auch nicht die Leidenden selbst über ihren Zustand eher klar, als in späteren (und allzuspäten) Stadien. Wer garantiert uns nun, daß bei verschiedenen der

plötzlichen oder sonst rätselhaften Todesfälle und Krankheitserscheinungen, worüber unter Liebhabern so oft ehrlich geklagt wird, nicht ein langjähriger Spezialstoffhunger irgendwelcher Art, die Ursache ist, fehlt doch den meisten Vogelliebhabern diejenige fachwissenschaftliche Ausbildung und diagnostische Schulung, die erforderlich wären, um dies zu erkennen oder selbst um darin überhaupt etwas zu bemerken, ehe alles zu spät war? Steht die Durchschnittstechnik der Liebhaber vielleicht so auf der Höhe, daß sie alle Spezialstoffkrankheiten unmöglich macht? Oder verhält es sich nicht eher so, daß die allgemein geübte Technik infolge Nichtbeachtung der Gefahr das Aufkommen derartiger Krankheiten gerade begünstigt? — Soviel hierüber. Was nun wiederum die unerbittlichen Folgen einer Unvollständigkeit der Eiweißnahrung betrifft, so sind diejenigen Spezialuntersuchungen, auf welche wir uns hier stützen, mit einwandfreier Methodik von so vielen verschiedenen Fachmännern ausgeführt und vorbereitet (vgl. übrigens auch Adlersparre, G.W. 1924, S. 9 Einleitung) und nunmehr auch so zahlreich, daß wir uns getrost auf sie verlassen können und in eine Fütterungstechnik, die beansprucht, gewissenhaft und zeitgemäß zu sein, dieselben nicht länger unbeachtet lassen können. (Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Überwintert die Turteltaube im Senegalgebiet? In einem Import von Tauben aus dem Senegalgebiet der Firma E. W. Lenger, Berlin, befanden sich neben den schönen Senegaltauben, Stahlflecktäubchen, Kaptäubchen und der seltenen weinroten Turteltaube zwei weitere Turteltauben, anscheinend jüngere Tiere, die sich von unseren heimischen Turteltauben nicht unterscheiden. Eine Feststellung der Flügelmaße war nicht möglich, da die Schwingen zerstoßen sind. Es liegt die Vermutung nahe, daß es sich hier um zwei im Senegalgebiet überwinternde Turteltauben handelt. Hartert (Die Vögel der paläarktischen Fauna II, S. 1485) berichtet: „Rätselhaft ist, wo die zahlreichen Turteltauben überwintern. Alle Turteltauben verlassen im Winter Europa, sie durchziehen die Mittelmeerländer und Ägypten in Menge, und dann verschwindet jede Spur von ihnen ... vermutlich überwintern sie im allernördlichsten Sudan, vom unteren Senegal bis Sennaar." Falls es sich hier nicht um eine neue Form handelt, was unwahrscheinlich ist, würde die Annahme Harterts hiermit bestätigt werden. Die Kaptäubchen aus dem Senegalgebiet scheinen kleiner als die südafrikanischen zu sein, wenigstens fiel es mir bei der Besichtigung von lebenden Täubchen auf, die von beiden Gebieten in einem Käfig saßen. Das Balgmaterial des Berliner Museums aus dem Senegal und Südafrika ist sehr dürftig, so daß ich meine Annahme nicht nachprüfen konnte. Flügelmaße waren bei den lebenden Tauben nicht festzustellen, da auch bei ihnen die Schwingen zerstoßen sind.

Rudolf Neunzig.

Frühjahrsbeobachtungen Pfarrkirchen. 10. Februar auf einem Telegraphendraht den ersten Star; 11. Februar drei Stare bei den Nisthöhlen; 12. Februar bei warmer Witterung Buchfinkenschlag; 14. Februar lauter Amselgesang; 15. Februar Feldlerchen, Schwarm von etwa 50 Stück im Schneegestöber; 20. Februar weiße Bachstelze auf einem Gartenzaun; 21. Februar Singdrosseln etwa 10 Stück im Ackerland; 25. Februar drei weiße Bachstelzen in einem Graben und am 1. März eine Singdrossel singend im Walde beobachtet. Weitere Beobachtungen folgen.

Anton Luginger.

Frühjahrsbeobachtungen Biberach/Riß. 18. Februar zwei Turmfalken, zahlreiche Rabenkrähen und Dohlen auf dem Kirchtum; 19. Februar fünf Stare in der Fabrikstraße bei warmem sonnigem Wetter; 20. Febr. sechs Stare auf Bäumen in der Fabrikstraße, starker Schneefall; 21. Febr. lauter Amselgesang bei Nebel und Schnee morgens 8 Uhr am Ratzengraben; 23. Febr. starker Schneefall, ein Star in der Fabrikstraße, vier Amseln im Hausgarten, eine weiße Bachstelze in den Freiburger Wiesen; 24. Febr. eine Feldlerche über die Freiburger Wiesen fliegend, starker Schneefall; 27. Febr. weiße Bachstelze am Bahndamm, Gelände wieder schneefrei; 1. März Wetter regnerisch. Starker Flug Staren an der Burrenstraße, ebendort im Ausgang ein Bussard, zahlreiche Hänflinge und Grünfinken, in etwa 500 m Höhe zieht ein ungeheurer Krähenschwarm nordostwärts. Auf den Feldern bei Birkenhard ein starker Flug Lerchen.

A. Jena.

Sprechsaal.

Frage 12: Welcher freundliche Leser kann zum Nutzen vieler einen Lieferanten für die vor dem Kriege allbekannten automatischen Trinkgefäße mit Glaskugel und Porzellanuntersatz zum Aufhängen namhaft machen?

A. Krabbe, A. Z. 14.

Im Sprechsaal der „Gef. Welt" 1924 finde ich auf S. 346 eine Notiz von Ihnen, in der meine Veröffentlichungen über Poephila acuticauda-hecki erwähnt sind. In bezug auf die **Geschlechtsunterschiede** bei dieser Art hatte ich früher folgende Beobachtung gemacht, von der ich augenblicklich nicht nachprüfen kann, ob ich sie schon veröffentlicht habe. Das Männchen hat einen breiteren Kopf und größeren Kehlfleck, dann haben aber die jungen Männchen, namentlich im Jugendkleide, deutlich an den äußersten Schwanzfedern an der Spitze auf der Unterseite einen weißen Fleck, der den Weibchen fehlt oder nur angedeutet ist. Bei den alten Vögeln sind die Spitzen häufig schon abgestoßen. Ich konnte die vielen Jungen, die ich gezüchtet hatte, sehr gut unterscheiden und habe niemals eine Klage gehört, daß ich einen Vogel falschen Geschlechts abgegeben hätte. Seit Jahren habe ich aber keine mehr und kann nicht nachprüfen, ob dieses Merkmal immer konstant ist.

Dr. Lewek.

Zu den Ausführungen des Herrn Robert Thiele in Nr. 43 der „Gef. Welt" 1924 in bezug auf **Unkenntnis unserer heimischen Fauna** möchte ich folgendes Erlebnis berichten:

Durch unser Dörfchen fließt ein kleiner Fluß, an dessen Ufer es an geeigneten Nistplätzen für unsere Sängerkönigin, die Nachtigall, früher nicht fehlte, und so waren auch wirklich einige Nachtigallen hier ansässig. Wie größtenteils überall, so mußte auch hier Baum und Strauch der Axt zum Opfer fallen, worauf es zurückzuführen ist, daß keine der Nachtigallen zurückkehrte bzw. die früher hier waren, sich ein anderes Nistgebiet suchen mußten. Über das Verschwinden der Nachtigall drückte ich einem Herrn gegenüber mein Bedauern aus, welcher mir versicherte, in der Nähe seiner Wohnung sei Nachtigallenschlag noch vernehmbar. Obgleich ich darüber gar nicht im Zweifel war, daß die gemeinte Nachtigall mit einem anderen Sängerfürsten verwechselt war, leistete ich der Einladung des Herrn, mich selbst davon zu überzeugen, Folge. Wir hatten noch gar nicht lange auf die gesuchte Nachtigall gewartet, als mir der Herr sagt: „Hören Sie nicht den Schlag der „Nachtigall"?" Als ich ihm darauf mit lächelnder Miene erklärte, daß es sich um einen „Buchfink" handele, wußte mir Herr .... nichts zu erwidern. Derartige Fälle könnte ich verschiedene anführen, so z. B. wurde mir ein junger Kuckuck als Eule, eine junge Feldlerche als Singdrossel gebracht usw. Es wäre sehr wünschenswert, wenn die Schuljugend mehr mit der Vogelwelt bekanntgemacht würde, sei es auf den Schulausflügen oder durch Winterfütterung, damit nicht alles, was grau ist, als „Spatz" angesehen wird.

Georg Herrmann.

Bücher und Zeitschriften.

Das fünfte Jahrbuch der „A. Z." Wenn man beim Zusammenstellen geholfen, sollte man eigentlich anderen die Beurteilung dieser Tätigkeit überlassen. Da wir, Herr Krabbe und ich, aber den Ehrgeiz haben, das Jahrbuch immer besser und schöner zu gestalten, scheint es doch zweckmäßig, wenn hier geschildert wird, was wir erreicht, was wir erreichen wollen.

Das neue Jahrbuch ist doppelt so stark wie sein Vorgänger. Auf 44 der Unterhaltung gewidmeten Seiten folgen 29 mit Bestandslisten, 27 mit Jahres- und Kassenbericht, Übersichten und Bezugsquellen.

Eine technisch und künstlerisch vorzüglich geratene Farbentafel „Trupiale" von Karl Neunzig eröffnet den Jahrgang. Dann folgt ein Ausschnitt aus des Schweden Bengt Berg trefflichem Buche „Mit den Zugvögeln nach Afrika". Sind die Bilder auch nicht alle zur Zufriedenheit der Herausgeber gelungen, so hoffen wir später bessere zeigen zu können. Ich kann heute schon verraten, daß wir im nächsten Jahrbuch aus dem neuen Werke von Bengt Berg Kost- und Bildproben bringen wollen. — Dann kommt ein Abschnitt aus Professor Braun's Buche (Die wissenschaftlichen Grundlagen der Vogelhaltung), „Vom Kauf und Sprechenlernen der Papageien". Das frisch und lebendig geschriebene Werk halte ich für das wertvollste des Vorjahrs. Zwischen diesen beiden Buchproben steht eine ganz prächtige Arbeit von Stefani und Sohn über „Farben- und Wellensittiche". Über den „grünbürzeligen Sperlingspapagei" teilt A. Krabbe aus dem reichen Schatze seiner Erfahrungen Wissenswertes mit. Ed. Schütze erzählt vom „Silberschnäbelchen" und seiner Zucht, dabei auch wenig bekannte Literaturangaben berücksichtigend. Von A. Voigt ist eine Arbeit über den „Kleinen Kubafink", von Walther Voigt eine solche über die Zucht „Orangebäckchen×Grauastrild" vertreten. Von E. Haberlandt sind die fleißig ausgearbeiteten Aufsätze „Schmetterlingsfinken" und „die künstliche Beleuchtung der Vogelstuben". Sehr hübsch schildert F. Matz-Oslo die „Exotenzucht im hohen Norden". Neben der „Literatur-Übersicht für den Vogelfreund" für 1924 von dem Unterzeichneten sind noch einige recht nette Beiträge von Stefani und Sohn „Spitzmäuse in der Vogelstube" und „Der Gelbbürzelgirlitz" von E. Strünke, über „Aufzuchtfutter für Nymphensittiche" zu erwähnen. Einige hübsche Bilder zieren das Heft.

Außer den „Kostproben aus Büchern", die wir in jedem neuen Jahrgange bringen wollen, wird der Hauptinhalt des Jahrbuches wohl stets aus den Erfahrungs- und Erinnerungs-Schätzen unserer A. Z.-Mitglieder gestellt werden. Und das soll so bleiben. Jeder, der Wissenswertes mitzuteilen weiß, soll zu Worte kommen. Über das „Wie" richten wir nicht strenge. Nur das zu breit Geratene, das Langweilige, müssen wir kürzen oder ausscheiden. Um den Inhalt des Jahrbuchs aber immer wertvoller zu gestalten, sind wir bemüht, bedeutende Aufsätze zum Erstabdruck zu erhalten. Das ist natürlich kostspieliger, aber sicher jedem A. Z.-Mitglied willkommen. Wir werden sehr sorgsam aussuchen, werden Berichte aus fernen Ländern zu bringen suchen, werden Übersetzungen veranlassen, werden uns der Hilfe hervorragender Ornithologen versichern. Aus der Feder eines weitgereisten Forschers, des langjährigen Vogelwarts auf Helgoland, jetzigen Abteil.-Direktors am Provinzial-Museum zu Hannover, Dr. Hugo Weigold, bringen wir erstmals die noch nirgends veröffentlichte Arbeit „Vogelliebhaber in China" zum Abdruck. Dr. H. Weigold hat 1913/1914 an der Stötzner'schen Forschungsreise nach Tibet als Ornithologe teilgenommen und eine reiche wissenschaftliche Ausbeute nach Deutschland zurückgebracht. Aus diesen Ergebnissen dieser an Abenteuern reichen Reise (näheres in Dr. Stötzners Buch, Im unerforschten Tibet, Leipzig 1924, Mk. 15.—) ist jener Aufsatz eine Episode, aber so frisch und lebendig erzählt, daß auch die Leser der „Gef. Welt" sich darüber freuen werden. A. Troschütz.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnitz, Mervelbstr. 39; Kaufsvermittlung: Franz Nyncke, Berlin O, Königsberger Str. 17. Verbandsorgan: die „Gef. Welt".

An unsere Mitglieder!

Wie wir bereits in Nr. 9 der „Gef. Welt" zu Kenntnis gebracht haben, hat der Vorstand in der Erkenntnis der Notwendigkeit einer solchen eine Kaufvermittlung eingerichtet. Da aber nach dem bestehenden Reichsvogelschutzgesetze „das Feilbieten und die Vermittlung eines An- und Verkaufs" von Waldvögeln in der Zeit vom 1. März bis zum 1. Oktober untersagt ist, so kann die geschaffene Einrichtung erst nach dem 1. Oktober in Tätigkeit treten. Wir nehmen aus diesem Grunde Veranlassung, unsere Mitglieder erneut auf unsere Tauschvermittlung aufmerksam zu machen. Wie bereits bekannt ist die Benutzung unserer „T.-V." für Mitglieder bis auf das beizulegende Rückporto völlig kostenlos. Wir bitten wiederholt alle unsere Mitglieder, sich vorkommenden Falles der „T.-V." zu erinnern und zu bedienen, da wir nur dann hoffen können, alle an uns gelangenden Tauschgesuche und -angebote zu einem günstigen Abschluß zu verhelfen.

J. A.: Vorwerk

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a: Dreifarbennonnen, Weißkopfnonnen, weiße Reisfinken, Braunkopfammern, Rotkopfamadinen, weinrote Turteltauben, Goldaugentimalien, Braunscheiteltimalien, Dayaldrosseln, Borstenhäherlinge, Würgerschnäpper, Schwarzschwanzsteinschmätzer, Blauwangenbartvögel, Kaprötel, rostbäuchige Flötenwürger, indische Grauwürger, indische Maskenwürger, Mahaliweber, Goldsperlinge, Diademamazone.

Gustav Reiß, Zoologische Großhandlung, Berlin C 25, Gontardstraße 4: Surinam-, Neuholländer-, Guatemala-, Diademamazonen, Pennant-, Rosella-, Nandaya-, Feuerflügel-, Kaktussittiche, tarant. Unzertrennliche, Dayaldrosseln, Rotkopfamadinen, Braunkopfammern.

A. Schiebe, Zschopau i. Sa., A. Z.-Mtgl. 282: 1,1 Spitzschwanzamadinen.

Walter Voigt, Jena, Feodorastr. 13: 1,1 Zwergmaskenweber.



Herrn H., Sprottau. Scheurengesäme enthält neben guten gern gefressenen Samen auch schädliche und giftige Sämereien. Anscheinend verlieren längere Zeit in der Gefangenschaft gehaltene Vögel das Unterscheidungsvermögen für giftige und ungiftige Samen, das den freilebenden eigen ist. Sie können durch Genuß giftiger Samen zugrunde gehen. — Die Holzteile des Käfigs werden zuerst mit gutem Leinölfirnis gestrichen, sodann der ganze Käfig mit der für ihn bestimmten Oelfarbe, der ein wenig guter Lack zugesetzt wird. Sobald die Farbe alle Teile des Käfigs gut deckt und fest getrocknet ist, wird er mit einem hart trocknenden, nicht spröde werdenden Lack überstrichen.

Herrn G. R., Osnabrück. ♀ Zebrafink ist infolge von Legenot eingegangen. Es konnte ein weichschaliges Ei nicht legen.

Herrn W. E., Oschatz. Darmentzündung war die Todesursache des Schmetterlingsfinken.

Herrn K. L., Amberg. ♀ Grauastrild ist infolge einer Lungenentzündung eingegangen.

Herrn H. H., Neuß a. Rh.; Herrn A. L., Pfarrkirchen; Herrn K. N., Berlin; Herrn A. W., Jena; Herrn A. L., Berlin; Herrn F. F., Düsseldorf: Beiträge dankend erhalten.

Herrn J. W., Eberstadt. Mir sind Mischlinge von Stieglitz × weißer Kanarie nicht bekannt, aber es ist anzunehmen, daß auch hellgezeichnete Bastarde mit ihnen erzielt werden können. Stieglitze sind in diesem Jahre in beschränktem Maße im Handel gewesen, die größeren öfflichen Stieglitze habe ich nirgends gesehen. Ich sehe Ihrem Bericht mit Interesse entgegen.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite)

ahrgang 54 9. April 1925 Heft 15

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Die Nachtigall. Von J. Birk, Leipzig. (Forts.)
Goldhähnchen, Baumläufer und Meisen. Von W. R., Berlin. (Schluß.)
Vogelbilder aus Transvaal. Von F. E. O. Mörs.
Dompfaffenzucht. Von Amtmann Max Krumm. (Schluß.)
Der „Kärrekied". Von A. Troschütz in Hannover.
Zur Fütterungstechnik der Vogelhaltung. Von A. Adlersparre.
Kleine Mitteilungen – Sprechsaal – Bücher und Zeitschriften – Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig – Vom Vogelmarkt – Redaktionsbriefkasten – Ausstellungen – Aus den Verbänden – Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

reutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellungen.

In Würdigung des Wertes der vom **Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig** im Zusammengehen mit dem Naturkundlichen Heimatmuseum in den Tagen vom 19. bis einschl. 26. April 1925 zu veranstaltenden Ausstellung wollen wir nicht übersehen, zum Besuche nochmals recht herzlichst einzuladen. Sie findet in den Räumen des Museums, der Schule, Fleischerplatz, vom Hauptbahnhof in fünf Minuten erreichbar, statt. Auf, Naturfreunde, Freunde unserer edlen Liebhaberei und Liebhaber, kommt nach Leipzig. Alle sind uns herzlichst willkommen.

Der Vorstand: Der Presseausschuß:
J. A.: Joh. Birk. J. A.: Vorwerk.

Der **Zier- und Singvogelverein zu Bernsbach im Erzgebirge** hält am 2. und 3. Mai 1925 im Saale des Gasthofes „Zum grünen Baum" in Bernsbach seine vierte allgemeine Ausstellung ab. Auszustellende Vögel sind bis zum 25. April 1925 bei Herrn Walter Müller in Bernsbach Nr. 74 anzumelden. Um gütigen Zuspruch der Liebhaber wird gebeten. Das Ausstellungs-Komitee.

Der **Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Zwickau** beabsichtigt in der Zeit vom 17.—21. Mai d. J. eine Vogelausstellung zu veranstalten.

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Sitz Leipzig. 1. Vors.: Hermann Höhne, Leipzig-Volkmarsdorf, Eisenbahnstr. 84, IV. 1. Schriftf.: Max Hunger, Leipzig-Gohlis, Polizeigebäude, Zimmer 196. Kassierer: Ludwig Böttcher, Leipzig, Inselstr. 17 II. — Am 26. April findet der zweite Wahlgang zur Wahl des deutschen Reichspräsidenten statt. Damit allen auswärtigen Mitgliedern, soweit sie an diesem Tage in Leipzig zur Jahresversammlung des L. V. bzw. zur Vogelschau des Vereins für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei weilen, die Ausübung ihres Wahlrechts ermöglicht wird, bitten wir alle in Frage kommenden Herren, sich an ihrem Orte einen Wahlschein ausstellen zu lassen. Mit diesem können sie dann in Leipzig in jedem beliebigen Wahllokal ihrer Pflicht genügen. Irgendwelche besondere Formalitäten sind nicht erforderlich. Ferner haben sich die Vogelliebhaber-Vereinigungen zu Schneeberg, Schönheide und Kamenz dem Landesverband angeschlossen. Genannte Vereine haben damit bewiesen, daß sie das Hauptziel des L. V., Organisierung aller Liebhaber unseres engeren Vaterlandes, voll erfaßt haben. „Nur geeint sind wir mächtig genug, unseren zahlreichen Widersachern erfolgreich die Stirn zu bieten." Allen noch Fernstehenden sei dies zur Nachahmung empfohlen. Im nachstehenden bringen wir unsern verehrten Mitgliedern zwecks Stellungnahme die eingegangenen Anträge zur Kenntnis. 1. Antrag des Vereins für Vogelschutz und -pflege zu Dresden: Die „Gef. Welt" soll Verbandsorgan bleiben und demzufolge dies auch im Namenskopf tragen. 2. Antrag der Vereinigung der Singvögel und Aquarienfreunde zu Eibenstock: Der Verband möchte bei vorkommenden Ausstellungen angeschlossener Vereine einen oder mehrere Ehrenpreise stiften, und zwar in Form einer Medaille oder sonstigen Gegenstands. 3. Antrag der Bezirkskonferenz für Aue und Umgebung: Bei Konflikten mit Behörden — Polizeiorganen — ist ein Rechtsbeistand zur Verfügung zu stellen.

Der Vorstand. J. A.: Hunger, Schriftf.

Vereinigung der Liebhaber, Landesverband Preußen. Am Sonnabend, dem 18. April, findet im Lokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a in Berlin, unsere diesjährige Jahresversammlung abends 8 Uhr statt. Alle dem Verbande angeschlossenen Mitglieder sind dazu herzlichst eingeladen. Fahrverbindung Hochbahn Prinzenstraße, Untergrundbahn Spittelmarkt sowie alle Straßenbahnen, welche den Moritzplatz und die Oranienstraße berühren. Vertreter auswärtiger Vereine werden gebeten, sich mit Vollmacht zu versehen. Die Tagesordnung für diesen Abend enthält folgende Punkte: 1. Begrüßung; 2. Verlesen des Protokolls; 3. Jahresbericht; 4. Bericht des Kassiers; 5. Bericht der Revisoren. Entlastung des Vorstandes; 6. Neuwahl des Vorstandes; 7. Anträge; 8. Geschäftliches. In Anbetracht der kurzen Zeit wird gebeten, pünktlich zu erscheinen.

Der Vorstand. J. A.: P. Böhme, Schriftf.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden.
J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen.
J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurter Str. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. V.: Emil Ivo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Vereinslokal: Karl Röhr, Heiligerweg 28. Versammlungen zweimal im Monat, jeden 2. und 4. Sonntag nachmittags 5 Uhr. — Liebhaber jederzeit herzlich willkommen.
J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Rietschelhof", Rietschelstr. 19. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinslokal „Parkhotel", Espanyastr. 1, Versammlung. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an. Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Die Vereinigung hannov. Vogelliebhaber will dem Vogelpfleger Ratgeber und Helfer sein, will die Liebe zum Tier und zur Natur wecken und stärken, will beitragen zum Kennenlernen der Vögel in Wald und Flur. Monatlich einmal kommen die Mitglieder zusammen, tauschen die Erfahrungen aus, hören Vorträge aus allen Gebieten der Vogelkunde, -schutz und -pflege an. Ein- oder zweimal im Jahre veranstalten wir große Lichtbilder- und Film-Abende. Im Frühjahr finden Beobachtungsausflüge unter Führung statt. Den Mitgliedern stehen zahlreiche Fachzeitschriften und Bücher kostenlos zur Verfügung. Regelmäßig berichtet die Zeitschrift nieders. Vereine über unsere Veranstaltungen. An den Vereinsabenden ist Rat und Auskunft, Kauf- und Tauschgelegenheit geboten. Jahresbeitrag Mk. 2,—, für Auswärtige und Schüler Mk. 1,—. Anmeldungen an Heinz Appel, Nienburgerstr. 7 A I. Auskunft: Buchhändler A. Troschütz, i. Fa. Cruses Buchhandlung, Gr. Aegidienstr. 4.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Da die Heidelberger keinen Liebhaberverein haben, die wenigen wirklichen Liebhaber aber doch den Wunsch haben, zusammenzukommen, so haben sich die Liebhaber der Ortsgruppe Heidelberg, die alle dem Bund für Vogelschutz angehören, zu einer Sonderabteilung zusammengeschlossen und kamen auf Einladung von Professor Fehringer am Donnerstag, den 5. März, erstmals im Holländer Hof zusammen. Zwar war es nur ein kleines Häuflein Getreuer, das kam, aber es waren alles nur wirkliche Liebhaber und Vogelpfleger

(Fortsetzung auf der 8. Umschlagseite.)

rit zum Teil recht guten Beständen. Da die Zahl der Heidelberger Liebhaber sich auf zirka 15 belaufen dürfte, wäre es angebracht, hierfür einen eigenen Verein ins Leben rufen zu wollen. Da ja Vogelschutz und -pflege unbedingt zusammengehören, ist die Zusammenkunft im Rahmen des bestehenden Bundes das einzig Gegebene. Der Abend war ausgefüllt mit einer zwanglosen Unterhaltung über das Wohl und Wehe unserer Stubenvögel. Wir brauchen kein Programm, keinen eigentlichen Vortrag, keine Statuten usw. Wir wollen uns gegenseitig aussprechen im gemütlichen Kreis und uns dabei wohl und behaglich fühlen. Möge jeder Heidelberger Vogelliebhaber es nicht versäumen, an jedem 1. Donnerstag im Monat im Holländer Hof zu erscheinen. Die sonstige Tätigkeit der Ortsgruppe ist eine äußerst rührige und ersprießliche. Von Zeit zu Zeit finden Vogelwanderungen statt, die im Frühjahr zu einer vielbeachten Einrichtung geworden sind. Außerdem werden im Zusammenschluß mit anderen naturwissenschaftlichen Vereinigungen Vorträge, Filmdarbietungen und ähnliche Veranstaltungen abgehalten, in deren Mittelpunkt stets unser einheimisches Vogelleben steht. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Görde. Gegr. 1920. Versammlung vom 22. März 1925. Der 1. Vorsitzende, Kollege Reyer, eröffnete 6.45 Uhr im Vereinslokale Ungewitter die regelmäßig aller 14 Tage stattfindende Mitgliederversammlung, gleichzeitig gibt er seiner Freude Ausdruck über den guten Besuch und heißt die anwesenden Mitglieder nebst Damen herzlich willkommen. Anwesend waren 22 Kollegen. Anschließend machte Kollege Reyer die traurige Mitteilung, daß der Bezwinger Tod wieder eine Lücke in unsere Reihen gerissen habe, es ist dies ein alter Mitbegründer des Vereins, nämlich Kollege Ulrich. Da selbiger ein ausgezeichneter Liebhaber und Idealist auf dem Gebiete der gefiederten Sänger war, ersucht Kollege Reyer deshalb die anwesenden Mitglieder, daß sie sich zum Andenken des Verstorbenen von ihren Plätzen erheben, diesem Ansinnen wird bereitwilligst Folge geleistet, ferner ersucht Kollege Reyer diejenigen Kollegen, welche eben abkommen können, daß selbige an der Beerdigung des Kollegen Ulrich sich recht zahlreich beteiligen möchten. Da Kollege Ulrich ausgezeichnete Tiere sowie Käfige hatte, stellte Kollege Henk den Antrag, daß selbige auf Kosten der Vereinskasse angekauft werden sollen, wobei er bei allen anwesenden Kollegen allgemeine Zustimmung findet. Als 1. Punkt der Tagesordnung ersucht Kollege Reyer den 1. Schriftführer zur Verlesung des Protokolls von der vorherigen Mitgliederversammlung, selbiges wird umstandslos genehmigt. Punkt 2, Zahlung der Beiträge, wird im Laufe der Versammlung erledigt. Punkt 3: zur Neuaufnahme hatte sich Herr Conrad Huke gemeldet, welcher einstimmig in unseren Reihen als aktives Mitglied aufgenommen wurde. Unter Punkt 4, Verschiedenes, ging Kollege Reyer als erster zu den Naturereignissen des jetzigen und der kommenden Monate über. Er führte aus, nicht nur das Menschenherz frohlocke dem werdenden Frühling entgegen, sondern dieselbe Wahrnehmung könnten wir auch bei den gefiederten Sängern in unserem Heim sowie in der Natur machen, denn alle stellen sich nach und nach wieder bei uns ein, deshalb soll jeder Kollege sehen, daß er für die kommende Ausstellung in den Besitz von Tieren gelangt. Ferner wurde angeregt, im April sowie Anfang Mai mehrere Buchfinkenwettstreite zu veranstalten, woran jedes Mitglied, welches einen oder mehrere Buchfinken hat, teilnehmen kann bei einem entsprechenden Einsatzgeld, des weiteren soll für die Prämiierung der Buchfinken ein gewisser Betrag aus der Kasse genommen werden. Kollege Reyer stellt selbiges zur Diskussion. Als erster Diskussionsredner schlägt Kollege Henk vor, als 1. Preis 5 Mk., 2. Preis 4 Mk., 3. Preis 3 Mk., 4. Preis 2 Mk., 5. Preis 1 Mk. Kollege Reyer geht wesentlich höher, seine Meinung ist, den 1. Preis auf 10 Mk. festzusetzen, 2. Preis 8 Mk., 3. Preis 6 Mk., 4. Preis 4 Mk., 5. Preis 2 Mk. Unser 2. Vorsitzende, Kollege Hellmann, tritt dem entgegen, er macht geltend, man solle die Preise nicht zu hoch setzen, sondern mäßig halten. Kollege Koch äußert, man möge Anfang April an einem Sonntag mit den Buchfinken im Vereinslokal zusammenkommen zwecks Tränterung der Tiere für die geplanten Wettstreite. Kollege Rehtanz teilt mit, daß etliche Kollegen ihre Vögel unzugebunden dorthin bringen wollen, welches aber von Kennern derartiger Wettstreite zum Nachteil der Tiere festgestellt wird, weil allein für sich der Buchfink, in nächster Nähe gesehen ein sehr scheuer Vogel ist, doch soll jedem Kollegen in dieser Sache freie Hand gelassen werden. Da nun dieses Thema soweit erschöpft ist, läßt Kollege Reyer Vorschläge machen über die zu diesem Zwecke aus der Kasse zu bewilligende Summe. Kollege Koch schlägt 5 Mk. vor, Kollege Spilker 10 Mk. Bei der nun vorgenommenen Abstimmung entscheidet man sich für den letzteren Vorschlag von 10 Mk. für den ersten Buchfinkenwettstreit, zu diesem kommt noch das Einsatzgeld für jeden Vogel. Bei einer anschließend vorgenommenen Feststellung wurden von den anwesenden Kollegen bereits 24 Buchfinken angemeldet, woraus zu ersehen ist, daß man auf einen heißen und gespannten Kampf rechnen kann. Des weiteren wurde beschlossen, Mitte Mai eine Frühjahrsausstellung zu veranstalten, und soll vorher jeder Kollege angeben, wieviel Raum er für seine auszustellenden Tiere nebst Käfigen benötigt, damit die Stellage danach eingerichtet werden kann. Kollege Reyer richtete an sämtliche Mitglieder beherzigende Worte und hegt den Wunsch, daß jeder Kollege sein möglichstes zu unserer Frühjahrsausstellung beitragen möchte, damit selbige sich würdig den verflossenen anreihen kann. Darum frisch ans Werk. Kollege Hellmann regte an, man möchte schon dazu übergehen, ein Ausstellungskomitee zu wählen, womit er allgemeinen Anklang findet. Folgende Kollegen wurden hierfür in Vorschlag gebracht: Kollege Döring, Haase, Rehtanz, Jäger, Spilker, Rosiek, Waldburg, Stoltefuß und Wegener, sämtliche hiermit genannten Kollegen nehmen die Wahl an. Da nun unter Punkt Verschiedenes nichts mehr vorlag, schloß der 1. Vorsitzende um 9.10 Uhr die so interessante anregende Versammlung. Bei Gesang, Tanz und gegenseitigem Meinungsaustausch blieb man noch einige Stunden in heiterer Stimmung beisammen, bis jeder wieder seinem eigenen Heime zustrebte, im Bewußtsein, wieder genußreiche Stunden verlebt zu haben. — Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, in den Wintermonaten von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Freunde und Gönner herzlichst willkommen.

Fritz Reyer, 1. Vors. Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden, Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. — Zu der Versammlung am 29. März war schriftlich eingeladen worden. Eingegangen waren Preislisten von Lorenz, Dresden, über Vogelfutter und H. Bunnemann, Adelebsen (Prov. Han.), über Nisthöhlen. Besonders die künstlichen Schwalbennester fesselten die Aufmerksamkeit. Es sollen einige davon probeweise bezogen und bei den Vorstandsmitgliedern angebracht werden. Im „Jenaer Volksblatt" war ein Artikel über Vogelschutz erschienen, der auf den schon oft erwähnten Coburger für Vogelschutz Bund zurückzuführen ist. Er strotzt von Entstellungen. Der Schriftführer hat der Zeitung eine Entgegnung zugeschickt, die aber bis jetzt noch nicht veröffentlicht worden ist. Der Vorsitzende nahm dann das Wort zu seinem ausführlichen Vortrag über den Vogelfang vor 100 Jahren an der Hand eines Buches: Der Vogelfang und der Vogelwärter oder Naturgeschichte, Fang, Zähmung, Pflege und Wartung unserer beliebtesten Sing- und Zimmervögel (Pesth, Hartlebens Verlag 1820). Das mit vielen sehr guten Kupferstichen versehene Buch von D. J. Ischeiner wäre es wert, nachgedruckt zu werden. Vergleiche zwischen einst und jetzt zog der Vortragende und erntete lebhaften Beifall. Es wurden noch besprochen: Verbandsangelegenheiten, das Werbeplakat des Reichsverbandes, die Leipziger Versammlung und Ausstellung. Die Anschaffung eines Stempels wurde beschlossen. A. Voigt.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz und Umgegend. Vereinslokal „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" und „Kanaria". Vogelliebhaber und Gäste sind stets willkommen. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst., Boppel, 1. Schriftf.

(Fortsetzung auf der 4. Umschlagseite.)

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln. 1. Vorsitzender Hans Lohmar, Köln, Blumenstr. 1, Fernsprecher: Rheinland 1223 und Mosel 1646; 1. Schriftführer Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. Sonntag im Hotel Thüringer Hof, Klingelpütz 43. Nächste Versammlung Dienstag, den 21. April, ½9 Uhr. Gäste sind stets herzlich willkommen. — Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an. J. A.: H. Lohmar, 1. Vors.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 16. April 1925. Gäste willkommen. M. Roth, Schriftf., L.-Plagwitz.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek. 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung bei unserem Mitgliede Herrn Normast im Gasthof „Kaiser Friedrich", Breslauer Str. 50. Liebhaber sind als Gäste willkommen. J. A.: Friedrich.

„A. Z." Magdeburg. Am 22. März 1925, vormittags 11 Uhr, fand die in Nr. 11 der „Gef. Welt" bekanntgegebene Zusammenkunft der Magdeburger Liebhaber exotischer Vögel statt. Von sämtlichen Anwesenden wurde folgende Auffassung vertreten: 1. Ablehnung jeglicher Vereinsbestrebungen; 2. regelmäßige zwanglose Zusammenkünfte; 3. Anregungen, Austausch von Gedanken und Erfahrungen; 4. jeden zweiten Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. Die nächste Zusammenkunft findet am Dienstag, den 14. April, statt. Alle Liebhaber sind hiermit von den Bestrebungen der Einberufer in Kenntnis gesetzt und zur regen Beteiligung freundlichst eingeladen.
gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorfstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Ta im „Goldenen Falken" Versammlung. Nächste Versammlu Freitag, den 17. April 1925. Freunde und Gönner stets wi kommen. Friedr. Rütschle, 1. Schrif

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz Münche Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstraße. Vogelliebhab als Gäste stets willkommen. Jeden Samstag gesellige Z sammenkunft ebendort. Rudolf Engel, 1. Schrif

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Dsch und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabende all vier Wochen, in der ersten Woche des Monats verbund mit Vortrag, in der dritten Woche jedes Monats nur gesell Zusammenkunft. Vereinslokal „Sächsischer Hof". Gä stets willkommen. Studienrat Prof. Jahn, 1. Vo

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jed Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets wil kommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 4

Aufruf!

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg Vogelliebhaber Hamburgs, schließt Euch dem Hamburge Verein für Vogelschutz und -liebhaberei an! Nehmt te an den billigen Futterbestellungen und an allen andere Vorteilen, welche Euch dadurch entstehen, daß Ihr in unsere Verein mit anderen wirklichen Vogelliebhabern Hamburg bekannt werdet. Stärkt durch Euren Beitritt nicht nu unseren Verein, sondern dadurch auch den Reichsverban der deutschen Vogelliebhaber, Sitz Leipzig, e. V., so da unsere gemeinsamen Interessen durch den Reichsverban genügend gewahrt werden können. Sitzungen finden sta jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmann Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uh Der Verein bezweckt den Zusammenschluß aller wirkliche Liebhaber einheimischer und fremder Sing- und Ziervög und bietet auf seinen Sitzungen viel des Vorteilhaften un Interessanten auf dem Gebiete der Stubenvogelliebhabere Gäste sind stets herzlich willkommen. Nächste Sitzung a Dienstag, den 21. April. Nähere Auskunft durch den Vo sitzenden Arnold Weber, Hamburg 1, Raboisen 5 Hansa 9599.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsg Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des

Käfige u. Gerätschaften

Vogel-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50. **Schlagnetze** f. kl. schädl. Vögel M. 2,30, f. gr. M. 2,50 u. 2,80. **Katalog gratis.** **J. Tannen, Gronau 58,** Westf. [515

Suche

2 gebrauchte, aber gut erhaltene Drosselkäfige (Schindler oder ähnl.) Angeb. an **A. Westermayer, Spremberg i. L.,** Drebkauer Str. 12, I. [516

Futtermittel

Vogelfutter [517

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Um allen Liebhabern die Möglichkeit zu geben, sich von der Güte des

Heidelberger Vogelfutters

(nach Prof. Dr. Fehringer) zu überzeugen, haben wir einem vielfach geäußerten Wunsche entsprochen und vom Weichfutter auch kleine Packungen hergestellt. Das Futter kann nunmehr in jeder beliebigen Menge bezogen werden.

½ Pfd. Braun (Erdsänger, Gelbspötter usw.)	ℳ 1,75
½ Pfd. Grau (Grasmücken usw.)	ℳ 1,50
½ Pfd. Blau (Drosseln, Stare usw.)	ℳ 0,75

Die Packungen für Körnerfresser bleiben wie bisher:

1½ Pfd. Rot (Stieglitze, Zeisige, Kreuzschnäbel)	ℳ 0,90
1½ Pfd. Grün (Hänflinge, Gimpel, Buchfinken)	ℳ 0,90
2 Pfd. Gelb (Kanarien, Bastarde)	ℳ 1,—
1½ Pfd. Insektenmehl	ℳ 2,—

Nach vielen uns zugegangenen Zuschriften ist das Heidelberger Vogelfutter das beste, das bisher auf den Markt gekommen ist. Unser Weichfutter enthält keine für den Vogel schädlichen Bestandteile wie Fischmehl u. dgl., es ist für jede Vogelart peinlich genau zusammengestellt. [518

Händler und Wiederverkäufer an allen Plätzen gesucht.

A. Böcher & Co., Heidelberg-Kirchheim,
Fabrik für Heidelberger Vogelkäfige u. Heidelberger Vogelfutter.

Bei Anfragen und Bestellungen bitten wir, sich auf die „Gef. Welt" zu berufen

Nur solange Vorr
Ia Ameisene
Pfund 6.— ℳ.
Ia Muska
verlesen, Pfund 2.50
Empfehle mein bekanntes
Weichfutte
Pfund 0.80 ℳ, prima 1.
Paul Gruhn
Zoologische Handlun
Berlin 87, Ottostraße
Fernsprecher: Hansa 390.

Mehlwürme
pro ¼ Pfund ℳ 2.— liefert fran
Reichardt, Berlin N, Böttge

Mehlwürme
veget. gez., ¼ Liter franko geg
521] einsendung von Mark 2.—
Bonitas-Versand, Rostock i

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 1
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 16. April 1925 | Heft 16

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Die Nachtigall.

Von J. Birk, Leipzig.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Beginnt die Zeit der frischen Ameisenpuppen, so sei man mit der Verfütterung an überwinterte Vögel sehr vorsichtig und denke nicht, „viel hilft viel", denn wer die Menge der frischen Puppen zu übereilig steigert, erlebt ein Fiasko, anstatt daß das wohl gutgemeinte Quantum die höchste Entfaltung des Gesangs bringt, verstummt derselbe und die vorzeitige Mauser beginnt. Sehr empfänglich in dieser Hinsicht sind gerade Nachtigall und Sprosser, und diese Vögel müssen ebenso wie im Herbst an das Mischfutter erst nach und nach an die Wirkung der frischen Puppen gewöhnt werden. Man beginne mit einer frischen Ameisenpuppe und steigere nach und nach, indem entsprechend dem Wachsen des Quantums der frischen Puppen das des Mischfutters verringert wird und so fort, bis der Vogel blank eingefüttert ist, falls ein Solches beabsichtigt ist. So dienlich eine Blankfütterung mit frischen Puppen auch dem Organismus überwinterter Vögel ist, so ist es auch kein taktischer Fehler, wenn man dem überwinterten Vogel das Mischfutter unter einer kleinen Beigabe von frischen Puppen bis zur Beendigung der Schlagzeit weiter reicht und erst dann etwas plötzlich zur Blankfütterung übergeht, der Erfolg ist der Eintritt einer gründlichen Mauser, trotzdem wird der Vogel auch mausern, wenn mit der bisherigen Fütterungsmethode weitergefahren wird.

Die Gesangszeit der Nachtigall währt im Freien von ihrer Ankunft Ende April oder Anfang Mai bis höchstens Mitte Juni, wirklich keine lange Zeit, denn sowie sie Anfang Juni Junge im Neste haben, wird ihr Schlag merklich nachlässiger und verliert an Feuer und Fleiß. Trotzdem hört man öfters auch noch gegen Johanni Nachtigallen feurig schlagen wie einst im Mai. Dieses sind unbeweibt gebliebene Junggesellen, deren in der Vogelwelt und besonders auch bei der Nachtigall ist dies eine durch das in der Überzahlbefinden der Männchen hervorgerufene Tatsache. Im Käfig hingegen kann man, wenn der Erfolg ein voller genannt werden soll, gut mit einer Schlagzeit von 5—6 Monaten rechnen, ja selbst noch viel länger schlagende Nachtigallen sind bekannte Erscheinungen der Nachtigallenpflege. Junge Nachtigallen, die in der ersten Hälfte des Juni meistens flügge werden, aufzufüttern, ist für denjenigen, der der Stubenvogelpflege auch noch tiefere Momente abzugewinnen weiß als nur die Befriedigung durch den Gesang, sicherlich eine, wenn auch mühsame, so doch an Genüssen und Studien reiche Beschäftigung. Wer dadurch Erfolg in gesanglicher Hinsicht ernten will, lasse ab von derartigen Experimenten, denn die aufgezogenen Nachtigallen werden samt und sonders im Vergleich zum Wildfang armselige Stümper. Ein weiterer Umstand ist auch, daß von den jung aufgezogenen Nachtigallen die Geschlechter schwer zu unterscheiden sind, und man daher auf das im Herbst stattfindende leise Dichten der jungen Männchen achten muß, meistens ist es dann zu spät, die jungen Weibchen noch in Freiheit zu setzen, darum beraube man die Natur nicht gleich um die ganze Brut. Herbstfrischfänge von Nachtigallen sind kein begehrenswertes Objekt des Liebhabers, erstens Zweifel im Geschlecht und zweitens auf welcher Gesangsstufe steht der Herbstwildling. Diese beiden offen bleibenden Fragen sollten schon genügen, um stets nur Frühjahrswildfänge nicht nur von Nachtigallen, sondern von allen Sängern zu käfigen.

Als Stubenvögel dauern Nachtigallen, falls sie sachlich gepflegt werden, viele Jahre aus, bis zu 10 Jahren sehr häufig, ja noch länger, sogar bis gegen 20 Jahre sind Fälle bekannt. Erfordert die Nachtigall auch Sorgfalt und Pflegerkenntnisse, so ist doch ihre Haltung nicht schwierig für den Eingeweihten. Die Nachtigall fordert ein mehr animalisches als vegetabilisches Futtergemisch, und ein solches in verschiedener Zusammensetzung genügt ihr. Mein Nachtigallenfutter besteht aus zwei Teilen süßer Möhre, je einem Teil trockener Ameisenpuppen, gequetschten Hanfs, gemahlener Fleischgarnelen, vorher aufgeweichten Weißwurms, Quark (Weißkäse) und zur Regelung des Feuchtigkeitsgehaltes noch gemahlenen Zwiebacks oder weißer Semmel. Streng halte ich mich niemals an ein in Qualität festgesetztes Futtergemisch, denn in meiner Vogelpflege halte ich es mit einer individuellen Fütterung, bei der stets der Körperzustand der Pfleglinge bestimmend ist, für die Zusammensetzung des Futtergemisches in Hinsicht auf Güte und Menge. Daß ich meinen

Pfleglingen und besonders auch der Nachtigall mit Delikatessen aufwarte wie sie die Jahreszeit bietet, bedarf eigentlich keiner besonderen Erwähnung. Wer seiner Nachtigall Abwechslung und eine sichtliche Freude bereiten will, warte mit frischen Insekten auf, wie Spinnen, Käfern, unbehaarten kleinen Räupchen, Schmetterlingen, Nachtfaltern, Heuschrecken usw. Im Winter opfere ich für meine zarteren Weichfresser, speziell die „Wintermauserer", ebenso auch für die Nachtigall aus der Mehlwurmkiste eine zarte Mehlwurmpuppe, besonders gerne nimmt sie auch noch kaum geschlüpfte weiche Mehlwurmkäfer. Als sogenannte „Herbstmauserer" darf die Nachtigall nur einmal und nur in der Zeit von Juli bis August mausern, mehrmals überwinterte Nachtigallen mausern bereits im Juni. Eigentümlich ist, daß bei der Nachtigall Nachtschläger viel seltener sind als beim Sprosser, letztere machen sich in dieser Hinsicht manchmal für die anwohnenden „Nichtgesangsliebhaber" sehr auf die Nerven fallend bemerkbar. Häufig kommt es auch vor, daß mehrere Nachtigallen in einem Zimmer sich im Schlage stören und nur eine schlägt, hingegen die dem Schläger an Stimmmaterial unterlegenen Nachtigallen von diesem gedrückt werden und schweigen. Will man unbedingt zwei Nachtigallen in einem Zimmer halten, so hänge man die Käfige derselben niemals untereinander oder dicht nebeneinander, sondern so weit wie möglich voneinander entfernt auf. Zu ihrer Überwinterung bedarf sie keinen zu warmen Raum, doch hüte man sie vor hohen Temperaturschwankungen, die Folge ist meistens eine anormale Mauser und dementsprechend auch Ausbleiben des Gesanges. Bei längere Jahre gekäfigten Nachtigallen macht sich eine auffallend starke Hornbildung an den Füßen lästig bemerkbar, vom Vogelliebhaber wird diese Erscheinung als „Schienen" bezeichnet. Fürs erste sind derartige unnatürlich starke Füße kein ästhetischer Anblick und fürs zweite verursacht diese Hornwucherung dem Vogel, wenn sie weit fortgeschritten ist, am Fuß- und Kniegelenk schmerzhafte Verletzungen. Soweit darf es der praktische Vogelwirt gar nicht erst kommen lassen, denn die Entfernung dieser „Schienen" an den Füßen, die übrigens auch bei anderen Vogelarten, bei einer mehr, bei einer anderen weniger auftreten, ist keine allzu schwierige, nur etwas Geduld gehört, wie zu allem in der Liebhaberei, zu dieser schmerzlosen Operation. Man nimmt etwas erwärmtes Salatöl oder auch etwas Butter und massiert damit die Füße, um die Haut, welche die „Schienen" an den Füßen festhält, geschmeidig zu machen. Hat man die Prozedur längere Zeit verrichtet, so versuche man vorsichtig mit den Fingernägeln oder einem hierzu passenden nicht scharfen Instrument rechts und links der „Schienen" auf- und abzufahren. Manchmal geht es schnell, manchmal ist es auch eine „Tortur" für den Vogel sowie den Pfleger, besonders wenn es sich um langjährige Schienenbildung handelt. Merkt man, daß die Haut nachgibt, so lockere man vorsichtig, und es dauert meistens nicht mehr lange und die „Schiene" hebt sich gleich im ganzen ab, manchmal auch nur lagenweise, die Hauptsache ist, tüchtig massieren mit fettiger Substanz. Niemals darf man Gewalt anwenden, denn eine Blutung darf niemals eintreten, ist dies der Fall, so ist die Entfernung zu gewaltsam und daher falsch. Macht eine solche Schienenentfernung auch eine starke Anforderung an die Geduld des Pflegers, so entschädigen die in normaler Stärke prangenden Füße und die Erlösung des Vogels von diesem lästigen Übel vollauf für die pflichtschuldig aufgewandte Mühe.

Wenn einem ein Sängerfürst so ans Herz gewachsen ist, wenn einem ein gefiederter Sänger sich so ins Herz gesungen hat, wie es die Nachtigall bei mir getan hat mit ihren bezaubernden Strophen, so fällt es einem nicht schwer, ihr ein Loblied zu singen. Vergessen soll dabei aber nicht sein, sie so zu pflegen als Stubenvogel, daß man ihr auch aus tiefster Herzensüberzeugung, infolge der vielen geschenkten genußreichen Stunden, dies Loblied mit Freuden singen kann. Vieles ließe sich noch plaudern aus dem schier unerschöpflichen Quell einer ziemlich ein halbes Menschenalter lang betriebenen Nachtigallenliebhaberei. Doch genug für heute. Möge sie jedem, der Sinn für die Schönheiten der Natur und ein offenes Herz für das Jubel- und Klagelied unserer Sängerfürstin, der Nachtigall, hat, die Liebeslust und -wonne, die wehmutsvollen Seufzer und Klagen so in die Brust legen, daß er die Zaubermacht des herrlichsten aller Vogellieder des deutschen Waldes auf sich einwirken lassen kann in duftgeschwängerter, lauer Maiennacht als das schönste Erleben und Empfinden aus dem reichen Schatze der Natur.

Du aber, du Trösterin aller, der dich verstehenden, vom Alltagslast schwer beladenen Liebhaberherzen, sing deinen Verehrern und Freunden, wenn dich in Bälde der Drang nach Liebe zurückführt in den stillen Hain der Heimat, so ins Gemüt, wie du es mir getan hast im Frühling meines Lebens, als ich in voller Blüte stand, und hoffentlich noch lange im kühlen Herbst des Daseins, so innig und wonnig wie so oft im Wonnemonat Mai.

Beobachtungen an fremdländischen Vögeln.

Von Rudolf Neunzig.

(Nachdruck verboten.)

Unter vielen anderen unserer gefiederten Freunde, die für bestimmte Zwecke gehalten wurden, bewohnten die Versuchskäfige zwei abessinische Glanzstare. Diese prächtigen Gesellen, welche in freundlicher Weise, wie auch andere, vom Zoologischen Garten in Berlin überlassen wurden, zeichneten sich später durch besondere Zahmheit aus. Im Zoologischen Garten bewohnten sie in Gesellschaft von vielen Artgenossen eine größere Voliere im alten Vogelhause. Sie waren wenig zutraulich. Doch schon nach wenigen Tagen der Einzelkäfigung wurden sie zahm und vertraut, was besonders für den männlichen Vogel zutraf. Er nahm bald das vorgehaltene Futter aus der Hand und besonders gern, wenn es ein Mehlwurm war. Um ihm einige Freiheit zu geben, wurde er häufig aus dem Käfig herausgelassen und konnte nach Herzenslust herumfliegen und von der Freiheit Gebrauch machen. Sein Benehmen im Gegensatz zum heimischen Star ist auffallend. Letzterer ist stets neugierig und bereit, alles Umherstehende zu

untersuchen, ersterer dagegen ist ruhiger und nicht von der Neugierde geplagt wie sein europäischer Verwandter. Die Glanzstare, die zweifellos intelligente Vögel sind, haben nicht den Spieltrieb des deutschen Stares. Der Glanzstar wurde, wie schon erwähnt, sehr zahm und folgt seinem jetzigen Besitzer auf Anruf wie ein Hund, besonders wenn er glaubt einen Mehlwurm zu erhalten, mit welchem er in seinen Käfig gelockt wird. Ein seit Jahresfrist von mir gekäfigter Glanzstar zeigt dasselbe angenehme und liebenswürdige Benehmen. Der zweite Vogel, ein Weibchen, brauchte längere Zeit, um einigermaßen zahm zu werden. Jetzt nimmt er auch schon den Mehlwurm aus der Hand. Die Geschlechter des abessinischen Glanzstares scheinen sich in der Größe, der Färbung der Iris und auch des Metallglanzes zu unterscheiden. Das Weibchen ist kleiner, die Iris weniger leuchtend orangegelb, sondern mehr hellgelb gefärbt, der Metallglanz ist weniger prächtig schillernd.

Eine kleinere Voliere im Freien beherbergte den Sommer über eine Wanderelster. Sie blieb stets etwas scheu und vorsichtig. Häufig konnte ich aus weiterer Entfernung das Ausstoßen ihrer eigentümlichen Rufe hören, dazu reckt sie den Hals, den Schnabel etwas nach unten haltend, erklangen die vollen Töne, die sich wesentlich von denen unserer heimischen Elster unterscheiden. Ihre Ernährung erfolgte mit einem Weichfutter, wie es für Drosselvögel üblich ist, mit einem Zusatz von gekochtem und rohem Fleisch. Ab und zu erhielt sie einen geschossenen Sperling oder eine tote Maus.

Ein Perlbartvogel zeigte in seinem Benehmen etwas Ähnlichkeit mit unseren Spechten. Beim Transport hämmerte er fleißig gegen die Wandungen des Kastens. Das tat er auch ab und zu in seiner Behausung, einem Kistenkäfig, auch den angebrachten verzweigten Baumast behämmerte er, in Erregung geraten. Oft ließ er seine spechtartigen lauten Rufe hören. Er klettert nicht nach Art der Spechte am Baumstamm oder Käfiggitter umher. Die Bartvögel scheinen anfangs sehr wärmebedürftig zu sein. Im Zoologischen Garten halten sie sich häufig in der Nähe der Heizröhren auf. Der kurzen Zeit entsprechend, in der ich den Perlbartvogel beobachten konnte, zu urteilen scheint er, wie wohl alle Bartvögel, ein eigenartiger und der Käfigung werter Vogel zu sein. Als Nahrung erhält er ein Insektenfresserfuttergemisch, Ameisenpuppen, Fleisch und Obst. Mit dem Bartvogel teilte den Käfig ein Weibchen der Purpurtangare. Dieser Vogel war sehr lebendig und flog stets mit fächerartig ausgebreitetem Schwanz umher, was besonders auffallend im Zustande der Erregung war. Tangaren werden häufig und verhältnismäßig preiswert angeboten, da lohnt es sich wirklich, einige Paare zu Zuchtzwecken zu erwerben.

Durch das Nachahmen des Gebelles eines kleinen Hundes zeichnet sich ein Weißhaubenhäherling aus. An seinem rechten Lauf waren ihm versehentlich die Zehen abgequetscht worden. Die Wunde ist nun gut vernarbt. Er kann sich nur schwerlich auf einer Stange halten und lebt mehr auf dem Käfigboden. Dabei ist er stets munter, bellt, läßt allerlei flötende Töne hören, die er häufig zu einer langen Strophe verbunden laut vorträgt. Ich hoffe, daß er noch recht zahm wird und sich über ihn später mehr berichten läßt. Dieser schöne Vogel sollte weit mehr die Beachtung der Liebhaber finden. Er ist ein guter Spötter. In der Ausstellung des Landesverbandes Preußen in Berlin ließ der Weißhaubenhäherling des Herrn Kleinert seine flötenden Strophen hören. Eigentümlich ist, daß diese Vögel, sobald sie in größerer Anzahl beisammen sind, plötzlich alle zu gleicher Zeit die Stille mit ihren lauten Rufen unterbrechen und alle zu gleicher Zeit wieder schweigen. Diese Beobachtung konnte ich wiederholt in dem Fockelmannschen Hause machen.

Zwergtrauerschnäpper (s. S. 188).

Ein Mahaliweber erwies sich als recht bösartig. Im Vogelhause des Zoologischen Gartens vertrug er sich nicht mit seinen Artgenossen und anderen Webern. So belästigte er auch einen harmlosen Goldammer, der seinen Käfig mitbewohnte. Dieser schöne Weber soll häufig, besonders in der Brutperiode, bissig gegen andere sein. Sie bewältigen auch gleich große Weber anderer Art.

Beim Verpacken eines Paares der südafrikanischen Rotkopfamadinen zeigte das Weibchen, als ich in den Transportkäfig hineinsah, eine merkwürdige Abwehr- oder Schreckstellung, die mich lebhaft an die der Wendehälse erinnerte. Es bewegte, auf dem Boden sitzend, den Kopf „schlangenartig" hin und her, bald zu der einen, bald zu der anderen Seite, was zunächst einen krampfartigen Eindruck machte, der es aber keineswegs war. Dabei ließ es aus dem geöffneten Schnabel zischende Laute hören.

Ähnliches sah ich in weniger ausgeprägtem Maße beim Befehden der Männchen dieser Amadine untereinander. Sie zischten sich nach Art der Gänseriche unter ähnlichen Halsbewegungen an.

Zum Schluß möchte ich noch des lachenden Hanses, des Jägerlieſt, gedenken. Er war sehr zahm und nahm Stücke rohen Fleisches aus der Hand. Jedes Stück schlug er mehrere Male bald nach der einen, bald nach der anderen Seite, auf einem Baumstamm sitzend, gegen denselben. So tut er es stets in der freien Natur, so schlägt er die erhaschten Mäuse oder Eidechsen tot, bevor er sie verschlingt. Dabei läßt er allerlei schwatzende Töne hören.

Die Sterblichkeit der jungen Graupapageien.

Von S. Lichtenstaedt.

(Nachdruck verboten.)

Zu meinem Artikel, „Mein Liebling — der Jako", sind mir eine Anzahl Zuschriften zugegangen, in welchen immer wieder gesagt wird, daß die Sterblichkeit der jungen Jakos nach den Erfahrungen der Schreiber eine viel größere ist, als ich annehme, und es deshalb ein ziemliches Risiko ist, junge Schwarzaugen zu erwerben.

Ich möchte deshalb als Ergänzung meines Jakoartikels nachstehend noch einige Zeilen folgen lassen und in diesen einen Teil der an mich gerichteten Anfragen beantworten, in der Annahme, daß die Antwort vielleicht auch für andere Liebhaber Interesse hat und gleichzeitig eine Diskussion über die Sterblichkeit der jungen Graupapageien anregen wird.

Ich möchte vorausschicken, daß ich augenblicklich wieder einige junge Jakos erworben habe und verpflege und diese sich des besten Wohlseins erfreuen.

„Von solchen Vögeln (frisch eingeführter Jakos) ist fast regelmäßig ein großer Teil mit dem Keim der furchtbaren Sepsis behaftet" (Fritz Braun, Die wissenschaftlichen Grundlagen der Vogelhaltung).

„Man hat geglaubt, die große Sterblichkeit der jungen Graupapageien usw.", ferner: „Die „gut genährten und anscheinend ganz gesunden Vögel gehen vielfach schon in den ersten Wochen ihres Aufenthalts in unserem Klima ein" (Ruß-Neunzig: Der Graupapagei).

„Die Sepsis wütet furchtbar unter den jungen Jakos" (briefliche Mitteilung an mich).

Allen diesen Ansichten muß ich widersprechen resp. kann ihnen nur bedingt zustimmen.

Allerdings wütet die Sepsis furchtbar unter den jungen Jakos, wenn ein verseuchter Transport ankommt. Aber nicht nur unter den jungen Jakos, sondern unter allen Exoten, welche mit Seuchen behaftet hier ankommen.

Ich erinnere an die großen Gouldtransporte, an die Tarantiner und Elfenbeinsittichtransporte, welche hohe Verluste aufwiesen. Keiner wird nun behaupten wollen, daß beispielsweise der Elfenbeinsittich ein besonders empfindlicher Vogel ist. Wenn aber ein verseuchter Transport ankommt, fallen die Tiere wie die Fliegen.

Auf Grund meiner Erfahrungen behaupte ich hier nochmals: Der junge Jako ist nicht mehr empfindlich als irgend ein anderer eingeführter Exot. Wer ihn gesund vom Händler erhält, wird ihn bei richtiger Pflege gesund erhalten. Daß selbstverständlich ein mal Verluste eintreten, ist eine Tatsache mit welcher jeder Tierbesitzer rechnen muß.

Was ist Sepsis? Sepsis ist eine stark ansteckende Krankheit, unserer Cholera ähnlich, welche durch einen Pilz hervorgerufen und weiter verbreitet wird. Das Gift sitzt im Blute, verbreitet sich rasch weiter, so daß man von einer Blutvergiftung spreche kann. Die Krankheit rafft schwächliche Tiere in 3—4 Tagen, kräftigere in 8—12 Tagen dahin. Nicht jeder ankommende krank aussehende Jako ist nun etwa sepsiskrank.

In den meisten Fällen liegt nicht Sepsis, sondern starke Darmentzündung vor, entstanden durch mangelnde und falsche Verpflegung.

Meist sind aber solche Vögel schon so von der Krankheit geschwächt, daß sie selbst bei harmloseren Darmerkrankungen eingehen, da ein Händler ihnen natürlich nicht die richtige Pflege zuteil werden lassen kann, da er bei großen Transporten hierzu kaum genügend Zeit hat.

Wenn nun solche Vögel, besonders nach dem Genuß von Kaffee, eine leichte Besserung zeigen und dann an den Liebhaber verkauft werden, so ist, selbst wenn das Tier in beste Pflege kommt, mit seinem Eingehen zu rechnen.

Ein junger Graupapagei, welcher 2 bis 3 Wochen beim Händler steht und dann alle Anzeichen eines gesunden Vogels zeigt, ist nicht sepsiskrank. Geht er später dennoch ein, so ist verkehrte Pflege, unsachgemäße Haltung oder Erkältung (Lungenentzündung) schuld daran.

Ein mehrere Wochen beim Händler kerngesund gebliebener Jako hat keinen „Todeskeim" in sich. Er wird bei richtiger Pflege nicht eingehen. Stirbt er dennoch, so ist nicht die verrufene, aber völlig unzutreffende Empfindlichkeit schuld, sondern nur die verkehrte Haltung und Pflege beim Liebhaber.

Die gefürchtete Sepsis ist eine Krankheit, welche gewöhnlich 4—6 Tage nach erfolgter Ansteckung zum Ausbruch kommt. Ein mehrere Wochen hier befindlicher Vogel kann also nicht sepsiskrank sein.

Es ist mir in meiner 25jährigen Praxis noch nie passiert, daß z. B. ein längere Zeit hier befindlicher Vogel an Sepsis erkrankt ist.

Es wäre mir interessant, von anderen Liebhabern hierüber ihre Meinung zu hören, doch glaube ich, nie, daß später einmal eingegangene Vögel an Sepsis gestorben sind. In den meisten Fällen lag hier ein schwerer Darmkatarrh vor, welcher bei den jungen Vögeln leicht durch Überfressen an Leckereien entstehen kann.

Wie ich schon in meinem früheren Artikel bemerkte, soll man einen jungen Jako nur kaufen, wenn er einige Zeit beim Händler gewesen ist und dann ein kerngesundes Aussehen hat. Zu lange soll ihn der Händler aber auch nicht besitzen. Der Händler ist nämlich meines Erachtens gar nicht in der Lage, den Vögeln eine sachgemäße Pflege dauernd bieten zu können. Er hat häufig hundert und mehr Pap-

geien zu versorgen, und kann unmöglich jeden Vogel individuell behandeln. Auch von welchem Händler man den Grauen bezieht, ist wichtig. Wo die Tiere in sauberen Käfigen mit sauberem Futter versorgt werden, ist immer mehr Gewähr vorhanden, gesunde und keine darmkranken Vögel zu erhalten.

Wir können, so absurd es auch klingen mag, unserer Nachtigall kein absolut „naturgemäßes" Futter bieten und müssen zu Ersatzstoffen greifen. Den Jako können wir naturgemäß ernähren, und tun es in den meisten Fällen doch nicht.

Die Graupapageien richten nach Aussagen aller Reisenden in den Mais- und Bananenpflanzungen ungeheuren Schaden an.

Die Nationalspeisen der Jakos sind also Mais und Bananen. Trinkbedürfnis haben die Vögel wenig, da die saftigen Bananen genügend wasserhaltig sind.

Ich habe mehrere große Transporte junger Graupapageien in den letzten Monaten bei hiesigen Händlern wochenlang beobachtet. Ich kann sagen, daß die Sterblichkeit gleich Null war, ausgenommen die Tiere, welche schon in den ersten Tagen eingingen, also krank ankamen.

So erhielt Herr Paul Tzornack vor zirka 4 Wochen 20 Schwarzaugen, von denen einige in meinen Besitz übergingen. Bis zum heutigen Tage ist von dem ganzen Transport nichts eingegangen, alle Vögel werden allerdings sachgemäß gefüttert. Meine Schwarzaugen sind munter und fidel, reizend zutraulich und zahm, und beginnen schon heute fleißig zu sprechen, wobei ihnen meine alten Vögel vortreffliche Lehrmeister sind. Zu drollig hört es sich an, wenn so ein kleiner Kerl das erste Wort hervorzubringen versucht. Unaufhörlich druckst er und druckst, bis endlich das erste „Jako" ertönt.

Zusammenfassend wiederhole ich: Wenn möglich, 2 Jakos anschaffen und in einem geräumigen Käfig halten. Futter erweichter Mais, je eine drittel Banane pro Kopf und Tag in 3 Portionen, auch ab und zu anderes Obst. Spitzsamen, etwas geschälten Hafer, etwas Sonnenblumen. Weiden und Holunderruten. Temperatur 18—20 ° Celsius, wenn möglich nachts gleiche Temperatur. Flügelschlagen erledigen die Vögel im geräumigen Käfige allein, sonst die Tiere sobald als möglich herauslassen.

Getränk vorerst dünner Haferschleim, täglich 2mal gereicht. Wasser unserer Leitungen ist nicht immer einwandfrei. Später langsam an Wasser gewöhnen. Von vielen Liebhabern wird die Milchfütterung der jungen Jakos empfohlen. Milch ist den jungen Tieren sehr zuträglich und gesund, nur vertragen sie nicht alle Vögel.

Riesenprachtschmätzer (s. S. 188).

Wenn die jungen Tiere nach dem Genusse der Milch, welche natürlich nur 2—3 mal am Tage zu reichen ist, Durchfall bekommen, so gebe man die Milch nur einmal oder noch besser alle Übertage.

An den Milchtagen erhalten die Vögel dann keinerlei Obst. Ich warne dringend, Milch und Obst zusammen zu füttern, da die Tiere hiernach stark schwächende Durchfälle bekommen können.

Zu welcher Jahreszeit soll man einen jungen Jako kaufen? Es wird empfohlen, nur in den Sommermonaten junge Vögel einzugewöhnen, nach meiner Erfahrung kann man zu jeder Jahreszeit Vögel anschaffen. Daß Winter- oder Frühjahrstransporte häufiger verseucht sind, habe ich nie feststellen können, dagegen sind natürlich in der kalten Jahreszeit ankommende Jakos mehr Gefahren durch die Witterung ausgesetzt, und kann natürlich nasse oder kalte Witterung auf dem Transport den Grund zu einem späteren Leiden legen.

In dieser Beziehung sind also „Sommervögel" empfehlenswerter als „Wintervögel". Ersteren kann man natürlich auch mehr frische und sonnige Luft bieten als letzteren, ein Faktor, der nicht hoch genug einzuschätzen ist.

Also Licht, Luft, Bewegung, richtige Fütterung werden jeden jungen Jako am Leben erhalten, wenn das Tier gesund in unseren Besitz gelangt.

Es muß endlich einmal mit dem Märchen der überaus empfindlichen schwarzäugigen Jakos gebrochen werden. Ein Jako ist genau so hart wie jeder frisch eingeführte Exot, nicht mehr und nicht weniger.

Es gibt für den Liebhaber nichts Schöneres als eine Anzahl der jungen, schwarzäugigen Jakos mit Liebe und Verständnis einzugewöhnen. Die drolligen harmlosen Geschöpfe werden schon nach kurzer Zeit zutraulich und anhänglich, und bald hört der aufmerksame Liebhaber aus dem „Gequatsche" der kleinen Kerle die späteren „Kanonen" heraus.

In den nächsten Monaten werden wieder größere Transporte junger Graupapageien eintreffen. Es würde mich freuen, wenn recht viele Vögel, angeregt durch diese Zeilen, in richtige, sachgemäße Pflege kommen würden.

Brehm nennt mit vollem Recht den Jako den „König der Stubenvögel". Würde man ein Preisausschreiben veranstalten, welches der hervorragendste Stubenvogel ist, so würde der Jako unbedingt den ersten Preis erhalten müssen.

Die Haubenlerche.

Von Robert Thiele.

(Nachdruck verboten.)

In glühender Sonnenhitze liegt die stille Landstraße. Dicker, grauer Staub bedeckt die Blätter der Straßenbäume. Auf beiden Seiten der Straße ödes, verwahrlostes Land, eine Einöde mit flachen Erhebungen, auf denen allerlei Unkräuter ein freudloses Dasein fristen. Hier fühlt sich unsere liebe Schopflerche heimisch, der hübsche graue Vogel mit der netten Spitzhaube. Es ist hier ein Stück Erde so recht nach ihrem Herzen.

Rechts von der Landstraße liegt der große Rangierbahnhof von Eidelstadt bei Altona. Auch hier finden wir die Schopflerche. Das unendliche Meer von Geleisen der Bahn sagt ihr besonders zu. Trotz des dauernden Rangierens der Züge fühlt sie sich hier wohl. Sie hat sich an all das unruhige Treiben völlig gewöhnt und läßt vom Güterwagen herab ihr kleines Liedchen hören. Es wird auch gehört von dem Weibchen, das im Hohlraum der nahen Weiche des Schienenstranges auf Eiern sitzt und fleißig brütet. Auch sie läßt sich durch nichts stören. Selbst wenn ein Güterzug donnernd und fauchend über die Weiche fährt, brütet sie unbekümmert weiter. Der lebhafte Zugverkehr des Bahnhofs stört sie in keiner Weise. Wie schön klang ihr Lied, das den Reisenden während des kurzen Aufenthalts auf der Station in die Ohren klang. Wie geht das Lied der Schopflerche dem empfindsamen Menschen zu Herzen, besonders wenn es in der öden Heide ertönt oder auf der staubigen Landstraße.

Das Ödland am Bahnhof ist denn auch der Tummelplatz der in der Eisenbahnweiche erbrüteten Jungen, sobald sie den Eltern folgen können. Zuerst laufen sie mit den Eltern den Geleisen entlang. Da finden sie genug für ihren Schnabel. Dann aber fliegen sie auf die sandige Höhe, und wenn mittags die Sonne am höchsten steht, dann rastet die kleine Gesellschaft und nimmt gründliche Sonnenbäder. Hu, wie spritzt da der Sand, bald haben sie sich eine kleine Mulde gewühlt, und was gibt es da für ein Putzen und Ordnen des Gefieders. Dann verhalten sie sich eine Zeitlang ruhig, um sich zu sonnen. Bei diesem Gebaren eine Familie Haubenlerchen beobachten zu können, ist ein wunderbarer Genuß für den Naturfreund. Das alte Männchen scheint Wache zu halten über seine Familie, und wenn über dem nahen Teich ein Raubvogel kreist, warnt es, und alle ducken sich auf den Boden. Und da gilt es aufpassen, denn der Buschklepper unter den gefiederten Räubern, der Sperber, ist schnell und plötzlich da, und kürzlich wäre ihm bald eines von den Jungen zur Beute gefallen.

Die schlimmste Zeit für die alten Haubenlerchen ist überstanden, wenn die Jungen aller Bruten herangewachsen sind. Sie bleiben wie die Heidelerchen alle beisammen. Im Spätjahr, wenn der Herbst naht, werden gemeinsam kurze Flüge unternommen vom Bahnhof zum Sandberg, von Landstraße zu Landstraße. Bei diesem Umherfliegen beginnen die jungen Männchen zu studieren. Auch diesen Gesängen der jungen schlicht gefiederten Vögel zu lauschen, ist ein herrlicher Genuß.

Bald aber kommt der Winter mit Schneewehen, Eis und Kälte, eine schlimme Zeit für unsere Lerche. Wird es gar zu arg, so flüchtet sie in die Straßen der Städte, dann sieht man sie mitten in der Stadt mit Spatzen und Goldammern, um auf den Straßen und den Halteplätzen der Wagen ein heruntergefallenes oder ein halbverdautes Körnlein aufzulesen. Der Winter macht ihnen viel zu schaffen. In den sehr kalten Tagen des vorjährigen Winters sah man sie mit zersträubtem Gefieder umhertrippeln und eifrig Futter suchend, vielfach vergeblich.

Aber an klaren Wintertagen mit Sonnenschein scheint Not und Sorge vergessen. Da hört man wieder ihr heiteres, liebliches Lied.

Auf den Dörfern geht es ihnen besser. Da sieht man sie häufig vor den Scheunen, in denen Getreide gedroschen wird. Da fällt so manches Haferkorn über Bord, und da fühlt sich die Haubenlerche anscheinend ganz wohl.

Im Frühjahr geht es dann wieder hinaus ins Ödland, wo ihr Lied so herrlich klingt, so wunderbar in der weiten verlassenen Öde.

Hier um Altona und Hamburg ist sie bei weitem nicht so zahlreich wie in vielen Strichen Mitteldeutschlands. Man sieht sie meist nur vereinzelt in manchen Gegenden selten.

Für den Vogelwirt ist die Haubenlerche ein angenehmer Vogel, ein ganz guter Sänger, der bei richtiger Pflege recht lange in der Gefangenschaft lebt, länger als Feld- und Heidelerche. In ihrem Wesen ist sie recht anziehend und bei weitem nicht so stürmisch wie die Feldlerche. Drollig ist es, zu

beobachten, wie sie unter Auf- und Niederklappen der Haube im Käfig einherstolziert. Wenn sie dann in ihrem schlichten Kleid ihr Lied vorträgt, muß sie jeder Naturfreund lieb gewinnen. In recht geräumigem Bauer wird sie auch bald ebenso zahm und zutraulich wie die Heidelerche. Wichtig ist für ihr Wohlbefinden eine tiefe, dick mit häufig zu erneuerndem trockenem Sand gefüllte Schublade. Sandbäder sind durchaus nötig, damit sie sich von Ungeziefer, das alle Erdvögel reichlich heimsucht, befreien kann, und auch die Erhaltung und Reinhaltung der Füße wird durch eine hohe Sandeinlage gefördert. Aber diese tut's nicht allein. Auch der Pfleger hat für peinlichste Sauberkeit des Käfigs zu sorgen, sein Augenmerk stets den Füßen der Lerche zu widmen und auch der Bekämpfung des Ungeziefers.

Der Fang der Haubenlerche ist nicht ganz leicht. Anscheinend ist sie, die sich viel in der Nähe des Menschen aufhält, gewitzigt wie unsere Spatzen, die es verstehen, allen Fallen zu entgehen.

Haubenlerchen.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Ein dritter Vertreter der Gruppe der Prachtfliegenschnäpper gelangte in den Besitz englischer Liebhaber, ein Vogel von der Größe einer kleineren Singdrossel, der

Riesenprachtschnäpper — Niltava grandis (*Blyth*).

Er gleicht in allem den verwandten Arten, auch in der Anpassungsfähigkeit des Nestbaues an das Gelände. In dicht bewachsenen schattigen Schluchten, besonders wenn sie unweit von Gewässern liegen, führt er ein ziemlich zurückgezogenes Dasein. Anscheinend ernährt er sich hauptsächlich von Insekten, welche er vom Boden nimmt. Über seine Stimme ist wenig bekannt. Sein Nest ist aus Moos und Flechten ziemlich lose gebaut und an Größe, Dicke der Wände und Tiefe je nach der Örtlichkeit, an der es steht, verschieden. Jerdon fand ein Nest dieses Fliegenschnäppers, welches auf einen Felsvorsprung stand und fast die Form eines länglichen Vierecks hatte. Zuweilen steht es in Baumhöhlen oder auch frei auf einem Ast in geringer Höhe, zwischen 3 oder 4 jungen schlanken Schößlingen, wie wir es ja auch zuweilen bei unserem gefleckten Fliegenschnäpper finden. Innen wird es häufig mit feinen Mooswurzeln ausgelegt. Das Gelege besteht aus 4 gelblichweißen Eiern. Die Brutzeit erstreckt sich über die Monate Mai bis Juni. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich über die Himalajaländer östlich bis Manipur, Tenasserim und Malakka (Abb. s. S. 181).

Gefiederbeschreibung: ♂ Stirn, Scheitel Bürzel, Oberschwanzdecken, kleine und mittlere Flügeldecken und ein großer Fleck an jeder Halsseite leuchtend kobaltblau. Rücken, Schultern purpurblau; Federn am Grunde des Oberschnabels, Zügel, Kopfseiten, Kinn, Kehle, Oberbrust schwarz; Unterbrust trübblau; Bauch blaugrau; Unterschwanzdecken weiß gerandet; große Deckfedern, Schwingen schwarz, schmal blau gerandet; mittere Schwanzfedern purpurblau; übrige braun, außen blau. Auge tiefbraun; Schnabel schwarz; Füße schwarz oder dunkelbleifarben. Lg. 212, Fl. 110, Schw. 90 mm.

♀ braun, Kopfseiten rostfarben mit hellen Schaftstrichen; Scheitel, Nacken, aschgraubraun. Fleck auf jeder Halsseite leuchtend blau; Flügel, Schwanz dunkelbraun, an der Außenfahne tief rostbraun; Unterseits satt olivbraun, Federn der Kehle und Brust mit weißlichen Schaftstrichen; Kinn, Kehlmitte heller ockerfarben, Bauchmitte aschgrau; Schnabel bräunlich schwarz; Füße fleischrot.

Einen reizenden kleinen Fliegenschnäpper, eine Ersteinführung Auguſt Fockelmanns (Hamburg Groß-Borstel) zeigt die Abb. auf S. 179 den

Zwergtrauerschnäpper — Muscicapula maculata (*Tickell*).

Einen Bewohner des östlichen Himalajagebietes, Assams und Tenasserims, der im Winter in den Ebenen Mittel- und Nordostindiens lebt. Er gehört

jener etwa 10 Arten umfassenden Gattung Muscicapula *Blyth* an, welche sich von verwandten Gattungen (Cyornis) durch die kleinere Gestalt und den feineren Schnabel unterscheidet. Eine Art der Gattung der Zwergblauschnäpper (s. Fremdl. Stubenvögel von von K. Neunzig, S. 565) gelangte im Jahre 1909 und auch später einigemal über Triest in die Käfige deutscher Liebhaber. Seine Verbreitung ist keine gleichmäßige. Er tritt in manchen Gegenden recht häufig auf, in anderen ist er ein seltener Gast. Die eingeführten Stücke sind in ihren Winteraufenthalt in der Nähe Kalkuttas gefangen. Jerdon, der ihn in Höhe von 1000 m bis 1250 m am häufigsten fand, sah sie in Paaren, häufig auch in kleineren Flügen rastlos und außerordentlich lebhaft die Wohngebiete durchstreifen, dabei immer auf der Jagd nach Insekten, die er im Fluge fängt. Er hat einen angenehmen, kleinen, trillernden Gesang, der so charakteristisch ist, daß die Eingebornen ihn den Namen „Tuni-ti-ti" gegeben haben, der lediglich den Gesang des kleinen Vogels wiedergibt. Da einige Stücke dieser Art in den Besitz deutscher Vogelpfleger gelangt sind, ist zu erwarten, daß wir auch Näheres über das Gefangenleben dieses kleinen Schnäppers erfahren.

Gefiederbeschreibung: ♂ oberseits, Zügel, Wangen, Ohrdecken, Halsseiten schwarz; ein breiter Augenbrauenstreif bis zum Nacken und sich hinten etwas erweiternd weiß; Unterseite weiß; größere Deckfedern weiß, letzte Armschwingen außen weiß gesäumt, Flügel sonst schwarz; Schwanz schwarz, 2/3 mit Ausnahme der mittleren weiß; Schnabel, Füße schwarz; Auge tiefbraun. Lg. 112, Fl. 60, Schw. 42 mm.

In einer Berliner Vogelhandlung waren im Februar dieses Jahres zwei seltenere Arten, aus Mexiko eingeführt, in größerer Anzahl vorhanden, und zwar der

Streifentrupial — Icterus mesomelas (*Wagl.*)

der zuerst 1910 von Fockelmann eingeführt, in die Vogelstube des Herrn Kuntzendorff gelangt und sich dort als ein sehr verträglicher Vogel sowohl mit anderen Trupialarten wie auch allen andern Vögeln erwies. Das auf der Abb. S. 172 dunkle Gefieder ist tief schwarz, das hellere zitronengelb. Die innersten Armschwingen sind auf der Außenfahne weiß gerandet.

Gleichfalls in großer Anzahl ist der auf S. 169 abgebildete

Braunkopfhabia — Buarremon brunneinucha (*Lafr.*)

vorhanden, ein schöner Vertreter der den Tangaren nahestehenden Habias. Die Verbreitung des Vogels erstreckt sich über die hochgelegenen Waldgebiete Süd- und Südwestmexikos, durch Mittelamerika bis in das nördliche und nordwestliche Südamerika. Alle Habias sind Baumvögel, welche in den Zweigen gewandt hüpfen, auf dem Boden sich aber schwerfällig und ungeschickt bewegen. Sie sind schlechte Flieger. Ihre Stimme ist laut, die Nahrung bilden Früchte, Beeren, Blatt- und Blütenknospen, Insekten und gelegentlich auch Samen. Die wenigen eingeführten Arten haben sich in der Gefangenschaft als dauerhafte und, soweit bekannt, auch als verträgliche Vögel gezeigt, welche sich für größere Flugräume sehr wohl eignen. Drosselfutter, Obst, Beeren, Mehlwürmer, Ameisenpuppen werden ihnen gereicht und daneben Samen, wie Spitzsamen, Sonnenblumenkerne und etwas Hanf, welche mit den Hülsen durch Seitwärtsbewegen der Kiefer zerkleinert, durchkaut und heruntergeschluckt werden.

Kleiner Mennigvogel (Text im nächsten Heft).

Gefiederbeschreibung: ♂ ♀ Stirn, Kopfseiten schwarz, auf der Stirn 3 weiße Flecken, Oberkopf dunkelbraun; übrige Oberseite olivgrün; unterseits weiß; Kopfband schwarz; Körperseiten grau, Weichen, Aftergegend oliv überhaucht; Schwingen, Schwanzfedern, dunkelbraun meist oliv gerandet, Flügelrand gelb; Auge braun; Schnabel schwarz; Füße hellbraun; Lg. 187,5 mm.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Fütterungstechnik der Vogelhaltung.

Von A. Adlersparre.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Wie und wann soll der Vogelwirt die Eiweißnahrung vervollständigen? Eine gewisse Parallelität zwischen der Unvollständigkeit des Weichfresserfutters

und der des Körnerfresserfutters ist dem aufmerksamen Leser sicher schon in die Augen gefallen. Viele Hauptbestandteile des Ersatzfutters für Weichfresser leiden infolge der Herstellungsweise (Oxydation feinverteilter Stoffe, Auslaugung gekochter usw.) an ungenügendem Vitamingehalt. Das Hauptfutter der meisten Körnerfresser ist von Natur aus unvollständig hinsichtlich gewisser Aminosäuren. In beiden Fällen ist eine wenigstens teilweise Vervollständigung durch verabreichte Nebenfutter möglich. Deshalb ist es auch in beiden Fällen vor allem die in der Gefangenschaft aus natürlichen Gründen mehr einseitige, nebenfutterarme Winterkost, die verhängnisvoll werden kann und eine zielbewußte Verbesserung seitens des Pflegers erfordert. Tierisches Eiweiß ist in der Regel vollständiger als pflanzliches. Einen Teil des Aminosäurenmangels kann der Körnerfresser deshalb aus Insektenfutter, falls er solches frißt, aus Ei usw. decken. Einen Teil wahrscheinlich auch aus grünen Blättern. Und einen Teil aus anderen Samen und Früchten als denen der Grassämereien. Hanfsamen z. B. trägt dazu bei, ein paar im gewöhnlichen Körnerfutter schwach oder gar nicht vertretene Aminosäuren bis zu einem gewissen Grad zu ersetzen, wird aber aus anderen wohlbekannten Gründen nicht immer gern verabreicht. Ein sehr gutes Vervollständigungsfutter scheinen dagegen Erbsen zu sein. Die Amerikaner haben eben aus diesem Grunde mit trefflichem Erfolg Erbsenverfütterung bei gewissen Tieren der Landwirtschaft versucht. In unserer Fütterungstechnik dürfte dagegen Erbsen, bis auf einige seltene Ausnahmen*), bisher noch nicht zur Anwendung gekommen sein. Und dies mit vollem Recht, denn man soll ja nicht ohne schwerwiegende Gründe die Fütterungsweise durch allerlei Neuheiten komplizieren. Die Deckung eines Spezialstoffmangels ist indessen immer von größter Bedeutung. Als einen kleinen Beitrag in dieser Richtung hin erlaube ich mir hier die Ergänzung unserer Körnerfresserkost, besonders im Winter, mit dem neuen Komplettierungsmittel Erbsen in irgendwelcher Form vorzuschlagen. Ich habe in eigener Praxis eine solche Form ausprobiert.

Bei meinen vorbereitenden Versuchen probierte ich zurzeit zuerst Zusatz von Erbsenmehl an das früher beschriebene (Adlersparre a. a. O.) Vitaminweichfutter. Diese Verwendung fand ich indessen weniger angebracht, weil das Erbsenmehl allzuleicht von dem Möhrensaft ein klein wenig teigig wurde. Ein besserer Zusatz zum Futtergemisch wäre vielleicht nicht feinvermahlenes, sondern gröberes Mehl. Am praktischsten scheint mir jedoch schon die Herstellung und Verwendung von Brot aus erbsengemischtem Mehl (ein Gegenstück zum Eierbrot, welches es in gewissem Grade ersetzen kann). Die Zusammensetzung, welche ich für solches Vogelbrot aus mehreren Gründen für am zweckmäßigsten gefunden, ist die folgende:

	Gewichtsteile
Bestes Erbsenmehl	30
Grobes zusammengem. Weizenmehl (Grahamsmehl, nicht mit Kleie zu verwechseln!)	20
Feines Weizenmehl	50
Zucker	10
Margarine	10
Kochsalz	1
Hefe	5

Hierzu Milch nach Bedarf zwecks Herstellung eines Teiges.

Gitterflügelelsterchen.
Rotrückenelsterchen.

Im Ofen bei nicht allzu starker, aber langdauernder Wärme gebacken gibt dies ein auch für Menschen nicht unangenehm schmeckendes gelbliches Gebäck, an welches meine Vögel sich ohne größere Schwierigkeiten gewöhnten. Besonders gerne fressen es die Malabarfasänchen (beinahe lieber als Körnerfutter), aber ziemlich gerne beispielsweise auch Goulds, Granatastrilde, Jameson u. a. Amaranten, Heuglins und Braunrückenelsterchen, schwefelgelber Girlitz usw. — Bekommt man einmal Erbsenmehl von wenig guter Beschaffenheit (bitter), nehme man ein etwas geringeres Quantum davon; man reicht dennoch verhältnismäßig viel Erbseneiweiß, denn Erbsenmehl enthält annähernd doppelt soviel verdauliches Eiweiß wie andere Mehlsorten.

Im Vogelbrot, nach diesem meinem Rezepte hergestellt, tragen sowohl das Erbsenmehl als auch der Milchzusatz zur Komplettierung des Körnerfuttereiweißes bei. Grahamsmehl, Milch, Hefe und vor allem die im Weichfutter verwendete geriebene Möhre tragen zur Deckung des Vitaminbedarfs bei. Der Basenüberschuß der Möhre (+9) gleicht den

*) Deren Absicht es anscheinend nicht war, einen Aminosäurenmangel zu decken und die wir also in diesem Zusammenhang ohne weitere Erwähnung übergehen können.

Säurenüberschuß des Brotes (ungef. —6) so ziemlich aus. Der Kochsalzzusatz spielt u. a. eine geschmackverbessernde Rolle sowie auch der geringe Zuckerzusatz, der übrigens die Gärung erleichtert und dabei zum Teil verbraucht wird. Weichfutter mit diesem Vogelbrot zubereitet erfüllt also ziemlich hohe Anforderungen und kann, wie gesagt, zum Teil das im allgemeinen ziemlich kostspielige Eifutter ersetzen, macht aber dieses nicht überflüssig. Zum Weichfutter dürfte unter gewöhnlichen Umständen kaum nötig sein, Lebertran zuzusetzen — die Möhre in sich enthält (besonders die rote) ziemlich viel Vitamine der A-Gruppe. Wünscht man indessen aus irgend welchem besonderen Grund (beispielsweise beim Legen oder Aufzucht) einen solchen konzentrierten A-Zusatz, dürfte es technisch richtiger sein, daß man ein paar Tropfen Lebertran zum fertig zubereiteten Weichfutter zusetzt, als daß man, wie in jüngster Zeit unter englischen Liebhabern vorgekommen, Lebertran schon zum (Eierbrot-) Teig zusetzt.

Die Salze spielen auch eine sehr bedeutsame Rolle innerhalb des Organismus, was sich ja dadurch beweist, daß bei salzfreier, aber im übrigen vollständiger Versuchskost sehr auffallende Störungen des Wohlbefindens eintreten. Tag für Tag wird das Tier immer schwächer und elender und zuletzt treten, ebenso wie bei einigen anderen Formen von Spezialstoffhunger, Krampfanfälle und bisweilen Herzerscheinungen ein. Nichtsdestoweniger braucht der Vogelpfleger in der Regel nicht viel Zeit und Mühe an die Salzfrage zu verschwenden. Natürliche Futterstoffe enthalten nämlich die meisten erforderlichen Salzbestandteile in völlig ausreichender Menge und natürlichen Proportionen — von Zuschüssen dürfte nur natürlicher Kalk, wovon der Bedarf des Vogels verhältnismäßig größer als der anderer höherer Tiere ist, wünschenswert sein; für Körnerfresser möglicherweise ab und zu auch ein klein wenig Kochsalz. Störungen des Salzstoffwechsels beruhen im täglichen Leben weniger auf Salzmangel in der Nahrung als auf Unfähigkeit des Organismus, die Salzbestandteile der Nahrung aufzunehmen. Und diese Unfähigkeit wird von vermehrter Salzzufuhr kaum verbessert; sie hängt von ganz anderen Faktoren ab. Ein Beispiel: Knochenerweichung (Osteomalazie) führten gegen Ende vorigen Jahrhunderts manche auf unzureichende Kalkzufuhr in der Nahrung, Kalkbindung bei Sauergärung im Magen usw. zurück. Man setzte also mehr Kalk zum Futter, verminderte die Menge säurebildender Mehlfutter usw., und die Krankheit wurde gebessert. Das bewies, meinte man, daß die Krankheitsursache wirklich in ungenügendem Kalkgehalt der Nahrung lag. Und tatsächlich war es nicht so? Nunmehr weiß man, wie gesagt, daß die Kalkapposition in hohem Grade von anderen Faktoren als dem Kalkreichtum des Futters beeinflußt wird, u. a. vom fettlöslichen antirachitischen Vitamin*), bei dessen Anwesenheit auch sehr geringe Kalkmengen im Futter genügen, um die Krankheit zu verhindern. Als man nun die mehr mehlhaltigen (und notorisch sehr vitaminarmen) Bestandteile der Kost wegstrich, mußte man gleichzeitig die anderen, mehr vitaminreichen vermehren, damit die Kost nicht allzu unzureichend wurde. Und gerade hierin — in der besseren Aufnahme der Salze bei Anwesenheit des Vitamins, nicht in der gleichzeitigen Vermehrung der Kalkzufuhr — liegt die Ursache der Verbesserung.

Einen Grund, unsere Vogelhaltung durch Experimentieren mit Nährsalzfabrikaten zu komplizieren und zu verteuern, dürften wir, wie ich schon vor mehreren Jahren in dieser Zeitschrift dargehalten, also nicht haben. (Schluß folgt.)

Zwergelsterchen.

Rotschwänze — Phoenicurus *(Forst.)*.

Eine Monographie von John Kuntzendorff.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der Formenkreis Erithacus hodgsoni.

Als einzige Form dieses Formenkreises ist zu nennen der

Mittelrotschwanz — Erithacus hodgsoni *Moore.*

In diesem Rotschwanz sehen wir einen Vogel, der wegen seiner Ähnlichkeit mit fast allen anderen dieses Genus sozusagen in der Mitte aller steht. Da er neben E. rufiventris als Brutvogel in den Brutgebieten vorkommt, ist er mit dem Hausrotschwanz nicht näher verwandt, wenngleich er ihm ähnlich ist. Andererseits aber besitzt er wiederum Ähnlichkeit mit dem weißflügeligen Gartenrotschwanz, so daß man

*) Der Ansicht der meisten Forscher nach sind Osteomalazie und Rachitis ein und dieselbe Krankheit; Rachitis heißt man sie, wenn junger, zuwachsender Knochen, Osteomalazie, wenn alter, ausgewachsener betroffen wird. — Ein ähnlicher Unterschied (vgl. im Alter des Kranken) besteht zwischen Barlowscher Krankheit (infantiler Skorbut) und gewöhnlichem Skorbut (bei Erwachsenen).

ihn als eine Riesenausgabe dieses ansprechen könnte, ist aber auch mit diesem wegen seiner beträchtlicheren Größe, seiner grell abweichenden Flügelplastik, die er mit den Gebirgsrotschwänzen gemeinsam hat, und seines weichen Gefieders auch nicht verwandt. Nach Kleinschmidt könnte er vielleicht mit E. auroreus verwandt sein.

♂ ad. Breiter Stirnstreif schwarz, übrige Stirn, kurzer Augenbrauenstreif weißlich; übrige Oberseite hell mausgrau, im Herbstgefieder die Federn rostgelb verwaschen gespitzt; Zügel, Ohrgegend, Kopfseiten, Kinn, Kehle, Kropf, Vorderbrust matt schwarz; übrige Unterseite, Unterflügeldecken, Ober- und Unterschwanzdecken gelblich rostbraun; Schwingen schwärzlichbraun, Handschwingen an der Außenfahne sehr schmal grau gesäumt, letzte Handschwingen und Armschwingen an der Wurzelhälfte breit weiß gerandet, einen Flügelspiegel bildend; Schulterfedern grau, Flügeldecken schwärzlichgrau, außen grau gerandet; Schwanzfedern gelblich rostbraun, mittelstes Paar an Außenfahne und breiter Rand der Innenfahne braun, einen schmalen rostfarbenen Mittelstreif bildend; Auge braun, Schnabel und Füße schwarz. Das Schwarz des ♂ an der Unterseite ist in der Ausdehnung verschieden, gewöhnlich so weit reichend, wie etwa bei phoenicuroides. ♀ ad. Oberseits gräulichbraun, unterseits fahl graubraun, Mitte des Unterkörpers heller, fast weißlich, Weichen rostlich verwaschen; Schwanzfedern wie beim ♂, mittelstes Paar jedoch nicht so dunkelbraun und übrige heller, rostgelblicher. Sie sind grauer als die ♀ rufiventris und unterseits auch heller. Hartert gibt als Maße an: Fl. 83—87, Schw. 69—70, Lf. 25—26 mm, hingegen Kleinschmidt: ♂ 84—87, Schw. bei einem Exemplar 77,5 mm, ♀ 79—83, Schw. bei einem Exemplar 71 mm.

Die Heimat des Mittelrotschwanzes ist Westchina von Kansu bis Nord-Tsingling und Mupin, Tibet bis Gyantse und Kamba-Dschong und Afghanistan. Auf dem Zuge und im Winter ist er in Nepal, Sikkim, Bhutan und in den Bergen von Assam und Manipur festgestellt worden. Ins Gebirge geht er bis zu 3700 m hinauf. In Gyantse und Kamba-Dschong ist er gemein, er erscheint dort im April und bleibt bis Ende Oktober. Er nistet in Erdhöhlen oder Mauerlöchern und ist gleichfalls in der Nähe menschlicher Wohnungen brütend beobachtet worden. Pleske teilt mit, daß er ebenso im Gebüsch der Gebirge wie in Hainen an Flußufern niste. Das Nest wird aus Moos und Halmen hergestellt und mit Federn oder Haaren ausgepolstert. Die Eier sind einfarbig lichtblau. Die Lebensweise des Mittelrotschwanzes dürfte mit der der Hausrotschwänze übereinstimmen, doch liegen weitere Angaben nicht vor.

Nach Deutschland ist er noch nicht lebend eingeführt worden. (Fortsetzung folgt.)

Sprechsaal.

Frage 13. 1. Wie und aus was besteht die Vogelmilbe? 2. Wie wird selbige am besten und radikalsten bekämpft? 3. Welche Medikamente sind am wirksamsten zur Vertilgung der Brut und nicht schädlich für den Vogel?

In der Nr. 8 annoncierte der Handelsmann Matth. Lefèbre von Merzig (Saargebiet). Von den angebotenen Vögeln bestellte ich einen mexikanischen Karmingimpel. L. schrieb am 23. Februar folgendes: „Bezug auf Ihr Schreiben vom 21. 2. 25 teile ich Ihnen mit das Nachnahmesendungen aus dem Saargebiet nicht zulässig sind. Ich möcht Sie nun höfl. bitten mihr den Betrag von 12.— M. per Einschreibenbrief einzusenden sodann geht der Vogel sofort an Sie ab. Der Vogel erhält an Futter Hirse, Spitzsamen und Hanf und ist ein guter Sänger gut gesund voll im Gefieder." Ich sandte die 12.— M. ein. Am 26. Februar erhielt ich folgende Antwort: „Im besitze Ihres Einschreibebriefes vom 24. 2. 25 mit Betrag von 12.— M. teile ich Ihnen mit, das der Karmingimpel leider vergrifen ist, solten Sie jedoch Interesse haben an einem sehr schönen gut im Gesang: Dominikanerkardinal so möchte ich gärn Ihren diesbezüglichen Bescheid erwarten. Ich bitte um baldigen Nachricht." Ich erwiderte darauf sofort, daß er den Gimpel nicht habe anderweit verkaufen dürfen und bat um Rückgabe des eingesandten Geldes. Den Kardinal könnte ich nicht gebrauchen. Am 7. März mußte ich L. noch einmal erinnern. Am 9. März schrieb er dann folgendes: „teile Ihnen mit, das fals Sie noch auf den Karmingimpel reflecktieren mir Nachricht zukommen lassen. Werde Ihnen denselben dann zusenden." Ich schrieb wieder, daß er den Gimpel senden möge, doch erhielt ich weder den Gimpel, noch eine Antwort, noch mein Geld zurück. Eine weitere Erinnerung blieb ohne Antwort. Die Feststellung obiger Tatsachen dürfte für den Leser genügen, ohne daß ich weiteres hinzusetze. Als Mitglied der A. Z. Nr. 102 n ist L. gestrichen, aus welchem Grunde, ist mir unbekannt.

Amtmann Max Krumm in Lüdenscheid.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnitz, Merveldstr. 39; Kaufsvermittlung: Franz Nyncke, Berlin O, Königsberger Str. 17. Verbandsorgan: die „Gef. Welt".

Die Angriffe des Bundes für Vogelschutz im Herzogtum Coburg, die in der Thüringer Tagespresse gegen das Halten einheimischer Vögel in Käfigen kürzlich erfolgten, siehe „Gef. Welt" Nr. 3, Jahrgang 1925, sind vom Reichsverband durch folgende Entgegnung zurückgewiesen worden:

Der Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig, bittet uns unter Hinweis auf das in der Nummer vom 9. Dezember 1924 an gleicher Stelle zum Abdruck gebrachte Eingesandt des Bundes für Vogelschutz e. V. im Herzogtum Coburg nachstehende Entgegnung zu veröffentlichen:

In der unter der Überschrift: „Hat das Halten von Vögeln in Käfigen eine Berechtigung" erschienenen Notiz des Bundes für Vogelschutz e. V. im Herzogtum Coburg versucht die genannte Vereinigung die tatsächlich seit „Jahrhunderten im Volksleben wurzelnde Liebhaberei" Stubenvögel zu halten, als Grundursache des nicht wegzuleugnenden Abnehmens einzelner „Vogelarten hinzustellen und als Tierquälerei, mit wenigen Ausnahmen, zu verurteilen. Leider ist der gewiß mit viel Liebe zur Sache, aber wohl infolge persönlicher Einstellung viel zu einseitig gehaltene Artikel geeignet, im großen Publikum eine falsche Vorstellung von den Ursachen der zur Sprache gebrachten Erscheinung zu erwecken. Sind es doch ganz andere Gründe, auf welche das Abnehmen und Zurückweichen unserer Singvögel zurückzuführen ist. Wenn der Autor des in Frage kommenden Aufsatzes erwähnt, das heute nicht mehr, wie vor Jahrhunderten, Fluren und Felder mit breiten Hecken durchzogen sind, so hat er schon den Kernpunkt der leidigen Angelegenheit berührt,

ist es doch in erster Linie die Tatsache des völlig umgestalteten Charakters, des gänzlich veränderten Antlitzes unserer heimatlichen Fluren, welche einzelne Vogelarten zwingt, unsere heimatlichen Gefilde zu meiden, weil sie hier nicht mehr die für Fortkommen und Bestehen notwendigen Bedingungen vorfinden. Die sich immer mehr ausbreitende Industrie, der ständig sich mehrende Verkehr, und nicht zuletzt unsere auf äußerste Bodenausnützung eingestellte Landwirtschaft, wie auch die auf schnellen Ertrag angewiesene Forstwirtschaft mit ihren nach der Schablone gezogenen Reihenwäldern, die jedes Unterholz und damit jede Nistgelegenheit unserer Höhlen-, Busch- und Bodenbrüter vermissen lassen, sind Gründe, daß uns leider nicht mehr wie zu Zeiten unserer Vorfahren in Busch und Feld der fröhliche Gesang unserer gefiederten Lieblinge in dem Maße entgegenklingt. Erwähnt muß hier allerdings auch werden, daß einige Vogelarten, die es im Laufe der Jahrzehnte verstanden, sich den veränderten Verhältnissen anzupassen, ihren Bestand nicht nur gehalten, sondern sogar noch beträchtlich vermehrt haben, wir denken hier in erster Linie an Amseln, Singdrosseln, Feldlerchen, Stare und Buchfinken, alles Singvögel, welche auch als Stubenvögel gehalten werden. Insbesondere darf wohl der Buchfink, welcher doch gerade als Stubenvogel in den Käfigen der Liebhaber anzutreffen ist, und trotzdem in überreicher Anzahl beobachtet werden kann, geeignet sein, die Herren vom Bund für Vogelschutz eines Besseren zu belehren. Daß heute der Zeisig nicht mehr in unseren Kleingärten brütet, dürfte sicher eine natürliche Ursache darin haben, daß eben kein Zeisig Gärten als Brutplatz aufsucht, sollte das dem betreffenden Artikelschreiber nicht bekannt gewesen sein? Daß das Übel an der Wurzel gefaßt würde, wenn das Halten von Stubenvögeln das ganze Jahr verboten werden könnte, dürfte nach dem im vorhergehenden Angeführten demnach zu bezweifeln sein. Es sei hier gestattet, auf das erzieherische Moment, auf die ideale Seite der Stubenvogelliebhaberei hinzuweisen. Warum heute in unseren Klein- und Obstgärten Stieglitze und Hänflinge nicht mehr brüten? Nun geehrte Herren vom Vogelschutz, sie brüten schon noch dort, und es würden ihrer noch viel mehr sein, wenn nicht im deutschen Volke die Liebe zur Natur und zu ihren Geschöpfen verflacht und abgestorben, das Interesse an ihnen nicht verlorengegangen wäre. Viele Singvögelbruten würden hochkommen, wenn dieselben von den betreffenden Gartenbesitzern geschützt, wenn er aus Liebe zur Sache seine Kinder belehren und wildernde Katzen vom Neste fernhalten würde. Daß die Liebhaberei, Stubenvögel zu halten, geeignet ist, Liebe zu unserer Vogelwelt und Interesse auch an ihrem Leben und Treiben in der Natur zu wecken, daß weiter der Vogelliebhaber auch jederzeit Vogelschützer, wenn auch nur im kleinen in dem ihm gegebenen Rahmen sein wird, dürfte wohl auch von den gerecht denkenden Herren vom Bund für Vogelschutz anerkannt werden müssen. Eingeschaltet muß hier noch werden, daß für die Stubenvogelpflege ausschließlich nur männliche Tiere in Frage kommen, und daß gerade diese, wie von der Wissenschaft einwandfrei festgestellt, an Anzahl die weiblichen Vögel bei weitem übertreffen. Auffallend ist die in dem in der Nummer vom 9. Dezember erschienenen Artikel wiederholt hervorgehobene Frage der Nützlichkeit einzelner Vogelarten, sollen sich etwa nur jene Vogelarten des Schutzes erfreuen, die nach allzu menschlichem Empfinden nützlich sind? Gehören jene gewiß in ihrem Tun und Treiben den Interessen der Menschen in einzelnen Fällen entgegentretenden schädlichen Vogelarten nicht auch in unsere heimatlichen Fluren? Als eine Entgleisung darf es wohl bezeichnet werden, wenn empfohlen wird, den Sperling einzusperren. Wissen die Herren vom Bund für Vogelschutz nicht, daß gerade der Sperling jener Vogel ist, dessen Eingewöhnung sich infolge seines stürmischen Wesens mit am schwierigsten gestaltet? Wo bleibt da die Liebe zum Geschöpf? Soll hier die Käfigung gestattet sein, weil es vom Sperling leider mehr als genug gibt, weil es nur ein Spatz ist? Nein, verehrte Herren vom Bund für Vogelschutz, auf dem von ihnen vorgeschlagenen Weg wird man nicht zum Ziele kommen. Mehr unendlich viel praktische, auf tatsächlichem Wissen gestützte Arbeit wird getan werden müssen, wenn der Erfolg sicher sein soll. Sorgen sie für Aufklärung in den Schulen, wer die Jugend hat, hat den Erfolg. Sorgen sie dafür, daß nicht alle Hecken verschwinden, und seien es auch nur jene längs unserer Eisenbahnlinien, damit die dort jetzt üblichen, vielleicht praktischen Betonzäune nicht mehr länger das Auge beleidigen, und sie werden Tausenden von Vogelpärchen eine Brutstätte sichern! Sorgen sie dafür, daß mancher stille Winkel in unserem lieben Heimatlande in seiner schönen Urwüchsigkeit als Naturschutzstätte erhalten und der Spekulation vorenthalten wird. Wenden sie sich an die zuständigen Regierungsstellen, damit mehr wie bisher in den Staatsforstungen Nisthöhlen für unsere Höhlenbrüter als Ersatz für die ausgerotteten Waldbäume mit ihren natürlichen Brutgelegenheiten angebracht werden, dann werden sie es erleben, daß sich diese und jene Vogelart wieder einfindet und der Bestand, der jetzt noch vorhanden ist, vergrößern wird, auch wenn die Liebhaberei, Stubenvögel zu halten, nicht verboten und ihre Ausübung nicht unmöglich gemacht wird." Immer wieder wird in Zeitabschnitten von der Gegnerschaft der Liebhaberei versucht, unsere ideale Sache in Mißkredit zu bringen.

Da diese Angriffe durch nichts begründet sind, ist es um so mehr unsere Pflicht, den vielfach von unsachverständiger Seite ausgehenden Versuchen der Verleumdung zu begegnen.

Wir erbitten und erwarten von unseren Mitgliedern tatkräftige Unterstützung. Angriffe auf die Liebhaberschaft und deren Sache bitten wir uns sofort mitzuteilen, damit wir tätig sein können.

J. A. Petters.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Max Kleinert, Berlin NO 18, Strausbergerstr. 13, Fernruf Alexander 3313: Rote Kardinäle, Männchen und Weibchen, Gelbnackenamazonen, Gelbköpfe, Gelbstirnamazonen, Doppelgelbkopfamazonen.

Paul Tzornack, Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189: Rote Kardinäle (Männchen, Weibchen), Orangetrupial, 1,1 Blumenaufsittiche.



Herrn W. B., Gera. Gefangene Sprosser singen gewöhnlich von Februar bis Ende Juni oder Mitte Juli. Mehrere Jahre gekäfigte singen zuweilen schon um Weihnachten. Mit der Nachtigall verhält es sich ähnlich. Uralsprosser gehören zu den nordischen Sprossern, deren Stimme tiefer ist als die der südlichen Sprosser (Ungarn, Rumänien). Sie sollen sehr dunkel im Gefieder sein. Nachrichten über das Gefangenleben und den Gesang der Rubinnachtigall sind so spärlich und der Vogel so selten eingeführt, daß wir über die Gesangsdauer in der Gefangenschaft nichts wissen. — Klarinettenvögel sind mittelgroße drosselartige Vögel mit breitem, kurzem Schnabel, kurzen schwachen Füßen, mittellangen Flügeln und ziemlich langem Schwanz, das Gefieder ist sehr weich. Die Farbe ist grau, Lidrand weiß. Nach unserem Geschmack ist er kein besserer Sänger als die Nachtigall. Die Amerikaner schätzen ihn als Sänger allerdings höher. Ein Vogel im Besitz Dr. Heinroths brachte zuerst einen klingenden Vorgesang, wurde dann im Januar laut. Der Vogel verfügte über 5 Strophen. Die einzelnen wurden sehr oft wiederholt. Die einzelnen Strophen sind durch Pausen voneinander getrennt. Der Gesang wird fleißig bis zur Mauser, im vorliegenden Fall bis in der September vorgetragen.

Herrn A. G., Lommatzsch. Der Vogel war ein Männchen des braunkehligen Wiesenschmätzers. Er kam hier stark zerquetscht an.

Herrn P. G., Großröhrsdorf i. Sa. Der Wellensittich ist an einer mit Abzehrung verbundenen Ernährungsstörung eingegangen.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

hrgang 54 16. April 1925 Heft 16

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Die Nachtigall. Von J. Birk, Leipzig. (Schluß.)
Beobachtungen an fremdländischen Vögeln. Von Rudolf Neunzig.
Die Sterblichkeit der jungen Graupapageien. Von S. Lichtenstaedt.
Die Haubenlerche. Von Robert Thiele.
Neueinführungen und Seltenheiten. Von K. Neunzig. (Forts.)
Zur Fütterungstechnik der Vogelhaltung. Von A. Adlersparre. (Forts.)
Rotschwänze — Phoenicurus (*Forst.*). Eine Monographie von John Kuntzendorff. (Forts.)
Sprechsaal - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Ausstellungen - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen - Aufruf.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

reutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellungen.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. In Ergänzung der an gleicher Stelle veröffentlichten, unsere in der Zeit vom 19. bis 26. April 1925 stattfindende Ausstellung betreffenden Ankündigungen möchten wir heute zur Kenntnis bringen, daß der 1. Vorsitzende des Vereins, der 1. Vorsitzende des Reichsverbandes Herr Johannes Birk einen Radiovortrag Freitag, den 24. April in der Zeit von 7 bis 7^{30} Uhr über das Thema: „Vogelschutz und Vogelliebhaberei" halten wird. Herr Birk wird den Leipziger Sender für Mitteldeutschland besprechen. Wir benutzen die Gelegenheit, alle Liebhaber und Freunde unserer Sache nochmals herzlich zum Besuche unserer Ausstellung einzuladen. Der Presseausschuß.
J. A.: Vorwerk.

Der **Zier- und Singvogelverein zu Bernsbach im Erzgebirge** hält am 2. und 3. Mai 1925 im Saale des Gasthofes „Zum grünen Baum" in Bernsbach seine vierte allgemeine Ausstellung ab. Auszustellende Vögel sind bis zum 25. April 1925 bei Herrn Walter Müller in Bernsbach Nr. 74 anzumelden. Um gütigen Zuspruch der Liebhaber wird gebeten. Das Ausstellungs-Komitee.

Der **Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Zwickau** beabsichtigt in der Zeit vom 17.—21. Mai d. J. eine Vogelausstellung zu veranstalten.

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Sitz Leipzig. 1. Vors.: Hermann Höhne, Leipzig-Volkmarsdorf, Eisenbahnstr. 84, IV. 1. Schriftf.: Max Hunger, Leipzig-Gohlis, Polizeigebäude, Zimmer 196. Kassierer: Ludwig Böttcher, Leipzig, Inselstr. 17 II. — Am 26. April findet der zweite Wahlgang zur Wahl des deutschen Reichspräsidenten statt. Damit allen auswärtigen Mitgliedern, soweit sie an diesem Tage in Leipzig zur Jahresversammlung des L. V. bzw. zur Vogelschau des Vereins für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei weilen, die Ausübung ihres Wahlrechts ermöglicht wird, bitten wir alle in Frage kommenden Herren, sich an ihrem Orte einen Wahlschein ausstellen zu lassen. Mit diesem können sie dann in Leipzig in jedem beliebigen Wahllokal ihrer Pflicht genügen. Irgendwelche besondere Formalitäten sind nicht erforderlich. Ferner haben sich die Vogelliebhaber-Vereinigungen zu Schneeberg, Schönheide und Kamenz dem Landesverband angeschlossen. Genannte Vereine haben damit bewiesen, daß sie das Hauptziel des L. V., Organisierung aller Liebhaber unseres engeren Vaterlandes, voll erfaßt haben. „Nur geeint sind wir mächtig genug, unseren zahlreichen Widersachern erfolgreich die Stirn zu bieten." Allen noch Fernstehenden sei dies zur Nachahmung empfohlen. Im nachstehenden bringen wir unsern verehrten Mitgliedern zwecks Stellungnahme die eingegangenen Anträge zur Kenntnis. 1. Antrag des Vereins für Vogelschutz und -pflege zu Dresden: Die „Gef. Welt" soll Verbandsorgan bleiben und demzufolge dies auch im Namenskopf tragen. 2. Antrag der Vereinigung der Singvögel und Aquarienfreunde zu Eibenstock: Der Verband möchte bei vorkommenden Ausstellungen angeschlossener Vereine einen oder mehrere Ehrenpreise stiften, und zwar in Form einer Medaille oder sonstigen Gegenstands. 3. Antrag der Bezirkskonferenz für Aue und Umgebung: Bei Konflikten mit Behörden — Polizeiorganen — ist ein Rechtsbeistand zur Verfügung zu stellen.
Der Vorstand. J. A.: Hunger, Schriftf.

Vereinigung der Liebhaber, Landesverband Preußen. Am Sonnabend, dem 18. April, findet im Lokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a in Berlin, unsere diesjährige Jahresversammlung abends 8 Uhr statt. Alle dem Verbande angeschlossenen Mitglieder sind dazu herzlichst eingeladen. Fahrverbindung Hochbahn Prinzenstraße, Untergrundbahn Spittelmarkt sowie alle Straßenbahnen, welche den Moritzplatz und die Oranienstraße berühren. Vertreter auswärtiger Vereine werden gebeten, sich mit Vollmacht zu versehen. Die Tagesordnung für diesen Abend enthält folgende Punkte: 1. Begrüßung; 2. Verlesen des Protokolls; 3. Jahresbericht; 4. Bericht des Kassiers; 5. Bericht der Revisoren. Entlastung des Vorstandes; 6. Neuwahl des Vorstandes; 7. Anträge; 8. Geschäftliches. In Anbetracht der kurzen Zeit wird gebeten, pünktlich zu erscheinen.
Der Vorstand. J. A.: P. Böhme, Schriftf.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter (e. V.), Sitz München. Die am 24. Januar 1925 im Vereinslokal „Pschorrbräuhaus", Bayrstraße, tagende Generalversammlung war gut besucht und erledigte die Tagesordnung im besten Einvernehmen. Selbe lautete: 1. Jahresbericht des Vorsitzenden; 2. Jahresbericht des Kassierers und der Revisoren; 3. Neuwahl des Gesamtvorstandes; 4. Verbandsangelegenheiten und 5. Anträge und Wünsche. Zu Punkt 1 erwähnte der Vorsitzende, daß zu der heutigen Jahresversammlung laut Statut schriftlich eingeladen wurde und auch in den Fachzeitschriften Aufforderung hierzu erging. Weiter verbreitete er sich auf die wichtigen Vorgänge innerhalb des abgelaufenen Vereinsjahres und beleuchtete in kurzen Strichen die Tätigkeit des Verbandes. Besonders hervorgehoben wurde der Anschluß bzw. die Neugründung der „Ortsgruppe Augsburg", deren Vorsitzender zu den heutigen Verhandlungen delegiert war. Außerdem wurde noch die Ausstellung erörtert und für das kommende Jahr die Mitarbeit aller empfohlen. Erfreulich war der Zuwachs an neuen Mitgliedern zu hören, und hoffen wir, heuer die Zahl auf 100 aufrunden zu können. Als Kardinalfrage war das flaue Eingehen der Mitgliederbeiträge zu tadeln und ging an die Kollegen der Appell, mit dem Beitrag nicht zurückzuhalten, um das aufgestellte Pensum restlos erledigen zu können. Der Ausblick wäre dank der nun stabilen Verhältnisse günstig zu nennen und hoffen wir die Leistungsfähigkeit des Verbandes noch zu erhöhen. Über Neuerungen usw. innerhalb der Vereinigung sollen die Mitglieder jeweils durch die Fachpresse unterrichtet werden. Zu Punkt 2 kam der Kassierer zu Wort und konnte derselbe ebenfalls nur das laue Eingehen der Beiträge feststellen, im übrigen war die Kasse in Ordnung, wie auch die Revisoren das gleiche fanden. Nach Erledigung des Kassenberichts dankte der Vorsitzende für das der Leitung während des Jahres entgegengebrachte Vertrauen und legte im Namen das Gesamtausschusses die Geschäfte in die Hände der Versammlung zurück. Ein aus der Mitte der Anwesenden herausgewähltes Wahlkomitee brachte zu Punkt 3 die alte Vorstandschaft wieder unter Dach, nur wurde als 2. Kassierer Herr Petzold, Dortmund, neugewählt. Der Ausschuß setzt sich nun zusammen aus den Herren L. Keidel als 1. und B. Ziegler als 2. Vorstand; A. Aschenbrenner als 1. und B. Heinemann als 2. Schriftführer; M. Pfaller als 1. und M. Petzold als 2. Kassierer; J. Dellinger und J. Friedl als Revisoren und die Herren S. Redl und W. Diem als Beisitzer. Nach dem Wahlgange dankte der wiedergewählte Vorstand neuerdings für bekundetes Vertrauen und dem Wahlbüro für die rasche Erledigung dieses Punktes. Zu Verbandsangelegenheiten wurde beschlossen, baldigst eine Neuauflage der Züchterliste anzufertigen und mit den Vorarbeiten Kollege Pfaller betraut. Die Herren Ziegler und Heinemann gaben in längeren Ausführungen die Ziele und den Zweck des Verbandes zu Gehör, Ansichten, die sehr beifällig aufgenommen wurden. Den Jahresbeitrag sowie die Aufnahmegebühr auf den alten Sätzen zu belassen, war der Wunsch der Mitglieder, und wurde der Punkt auch in diesem Sinne geregelt. Neuaufgenommen wurden eingangs schon die Herren: H. Bartoschek, K. Freimuth, A. Trieb, H. Huber, G. Sold und E. Frankl, sämtlich in München. Mit dem Wunsche, alle Spezialzüchter im deutschen Verbande zusammenzufassen, schloß der Vorsitzende, da Anträge nicht mehr gestellt wurden, die harmonisch verlaufene Versammlung. Verbandsanschrift: Max Pfaller, München, Auenstr. 78 I. Anschrift des Vorsitzenden: Leopold Keidel, München, Schraudolfstr. 47 III.
M. Pfaller, München.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt Joseph Leininger, Gasthof, Frohnhof—Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Monatsversammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Als amtliches Vereinsorgan ist die „Gef. Welt" anerkannt worden.
J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Verband der Finkenvereine Ruhrgau-Bochum. Der Verband veranstaltet am 24. Mai 1925 in Bochum i. Westf. ein großes „Werbewettsingen". Das Singen findet statt in den Anlagen des Ausflugsortes Waldesruh, Inhaberin Ww. Weitkämper, Waldstr., direkt am Südpark gelegen; von jedem Bochumer Bahnhof leicht erreichbar. Ferner mache ich darauf aufmerksam, daß an jedem Bahnhof Liebhaber vom Bochumer Verband anwesend sind. Um Auskunft wende man sich bitte an diese, welche durch eine Armbinde erkenntlich sind. Aus sportlichem Interesse bitte ich um rege Beteiligung, damit dieses Singen ein Symbol für alle Außenstehenden wird. Die Preise stehen 14 Tage vor dem Singen im Schaufenster der Bochumer Fahnenfabrik Scheer, Metzstr., ausgestellt. Wettstreitbestimmungen: Anfang ½8 Uhr morgens. Einsatz von ½7 Uhr ab. Ende wahrscheinlich 11 Uhr. Die Vögel müssen nach der Prämierung in den Schönheitsklassen noch eine Stunde zur allgemeinen Anhörung stehen bleiben. Es werden ausgestellt: 1. Klasse: Dreißiger, Düsterweiat, Vierziger; diese Vögel müssen rein, also ohne jeden Nebengesang sein. 2. Klasse: Dreißiger, Düsterweiat, Vierziger; mit nur einem Beigesang, wie Inspektör, Widör, Flachvierziger, Vierundvierziger, Düsterweiat, Wardier, zweites Jahr und Fliertjahr. 3. Klasse: Jeder Vogel muß mehrere Beigesänge haben. Kampf oder Scharfsingen: Der Vogel muß Einsatz, Übergang und Schluß klar aussingen. Es werden drei Rundgänge zu je drei Richtern gemacht. Die nichtsingenden Vögel werden nach jeder Runde entfernt. Jeder Liebhaber ist für richtige Einsetzung seines Vogels in die richtige Klasse selbst haftbar. Vögel, welche bei der Prämiierung in einer falschen Klasse stehen, können nicht prämiiert werden. Jede Klasse ist einzeln abgeteilt und durch Plakate gekennzeichnet. Der Einsatz beträgt 1,50 Mk. Der Ausstellungskorb darf nicht länger als 24 cm und nicht kürzer als 18 cm sein. Jeder Korb muß möglichst mit einem weißen Tuch versehen sein. Ferner mit einer Schlinge (Bindfaden) zum Aufhängen.
Mit Sportsgruß der Vorstand. J. A.: Becker.
Anmerkung: Bitte höflichst sämtliche Vorsitzenden der einzelnen Vereine um sofortige Anmeldung der eventuell einzusetzenden Vögel, spätestens bis 15. Mai, an folgende Adresse: Friedrich Becker, Bochum i. Westf., Bahnhofstr. 10.

Aus den Vereinen.

Aufgenommen ist Mtgl.-Nr. 133n Dr. Ortfried Stehle, Köln-Mühlheim, Dreikönigen-Hospital.
A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen.
J. A.: O. Borbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurter Str. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.
J. V.: Emil Ivo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Vereinslokal: Karl Röhr, Heiligerweg 28. Versammlungen zweimal im Monat, jeden 2. und 4. Sonntag nachmittags 5 Uhr. — Liebhaber jederzeit herzlich willkommen.
J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Rietschelhof", Rietschelstr. 19. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinslokal „Parkhotel", Epinaystr. 1, Versammlung. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an. Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Die Vereinigung hannov. Vogelliebhaber will dem Vogelpfleger Ratgeber und Helfer sein, will die Liebe zum Tier und zur Natur wecken und stärken, will beitragen zum Kennenlernen der Vögel in Wald und Flur. Monatlich einmal kommen die Mitglieder zusammen, tauschen die Erfahrungen aus, hören Vorträge aus allen Gebieten der Vogelkunde, -schutz und -pflege an. Ein- oder zweimal im Jahre veranstalten wir große Lichtbilder- und Film-Abende. Im Frühjahr finden Beobachtungsausflüge unter Führung statt. Den Mitgliedern stehen zahlreiche Fachzeitschriften und Bücher kostenlos zur Verfügung. Regelmäßig berichtet die Zeitschrift nieders. Vereine über unsere Veranstaltungen. An den Vereinsabenden ist Rat und Auskunft, Kauf- und Tauschgelegenheit geboten. Jahresbeitrag Mk. 2,—, für Auswärtige und Schüler Mk. 1,—. Anmeldungen an Heinz Appel, Nienburgerstr. 7 A I. Auskunft: Buchhändler A. Troschütz, i. Fa. Cruses Buchhandlung, Gr. Agidienstr. 4.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Da die Heidelberger keinen Liebhaberverein haben, die wenigen wirklichen Liebhaber aber doch den Wunsch haben, zusammenzukommen, so haben sich die Liebhaber der Ortsgruppe Heidelberg, die alle dem Bund für Vogelschutz angehören, zu einer Sonderabteilung zusammengeschlossen und kamen auf Einladung von Professor Fehringer am Donnerstag, den 5. März, erstmals im Holländer Hof zusammen. Zwar war es nur ein kleines Häuflein Getreuer, das kam, aber es waren alles nur wirkliche Liebhaber und Vogelpfleger mit zum Teil recht guten Beständen. Da die Zahl der Heidelberger Liebhaber sich auf zirka 15 belaufen dürfte, wäre es angebracht, hierfür einen eigenen Verein ins Leben rufen zu wollen. Da ja Vogelschutz und -pflege unbedingt zusammengehören, ist die Zusammenkunft im Rahmen des bestehenden Bundes das einzig Gegebene. Der Abend war ausgefüllt mit einer zwanglosen Unterhaltung über das Wohl und Wehe unserer Stubenvögel. Wir brauchen kein Programm, keinen eigentlichen Vortrag, keine Statuten usw. Wir wollen uns gegenseitig aussprechen im gemütlichen Kreis und uns dabei wohl und behaglich fühlen. Möge jeder Heidelberger Vogelliebhaber es nicht versäumen, an jedem 1. Donnerstag im Monat im Holländer Hof zu erscheinen. Die sonstige Tätigkeit der Ortsgruppe ist eine äußerst rührige und ersprießliche. Von Zeit zu Zeit finden Vogelwanderungen statt, die im Frühjahr zu einer vielbesuchten Einrichtung geworden sind. Außerdem werden im Zusammenschluß mit anderen naturwissenschaftlichen Vereinigungen Vorträge, Filmdarbietungen und ähnliche Veranstaltungen abgehalten, in deren Mittelpunkt stets unser einheimisches Vogelleben steht. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, in den Wintermonaten von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Freunde und Gönner herzlichst willkommen.
Fritz Reyer, 1. Vors. Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden, Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende

(Fortsetzung auf der 4. Umschlagseite.)

Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. A. Voigt.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz und Umgegend. Vereinslokal „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" und „Kanaria". Vogelliebhaber und Gäste sind stets willkommen. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln. 1. Vorsitzender Hans Lohmar, Köln, Blumenstr. 1, Fernsprecher: Rheinland 1223 und Mosel 1646; 1. Schriftführer Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. Sonntag im Hotel Thüringer Hof, Klingelpütz 43. Nächste Versammlung Dienstag, den 21. April, ½9 Uhr. Gäste sind stets herzlich willkommen. — Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an. J. A.: H. Lohmar, 1. Vors.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 16. April 1925. Gäste willkommen. M. Roth, Schriftf., L.-Plagwitz.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung bei unserem Mitgliede Herrn Normast im Gasthof „Kaiser Friedrich", Breslauer Str. 50. Liebhaber sind als Gäste willkommen. J. A.: Friedrich.

„A. Z." Magdeburg. Am 22. März 1925, vormittags 11 Uhr, fand die in Nr. 11 der „Gef. Welt" bekanntgegebene Zusammenkunft der Magdeburger Liebhaber exotischer Vögel statt. Von sämtlichen Anwesenden wurde folgende Auffassung vertreten: 1. Ablehnung jeglicher Vereinsbestrebungen; 2. regelmäßige zwanglose Zusammenkünfte; 3. Anregungen, Austausch von Gedanken und Erfahrungen; 4. jeden zweiten Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Tage im „Goldenen Falken" Versammlung. Nächste Versammlung Freitag, den 17. April 1925. Freunde und Gönner stets willkommen. Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebendort. Rudolf Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabende aller vier Wochen, in der ersten Woche des Monats verbunden mit Vortrag, in der dritten Woche jedes Monats nur gesellige Zusammenkunft. Vereinslokal „Sächsischer Hof". Gäste stets willkommen. Studienrat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jedes Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Aufruf!

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Vogelliebhaber Hamburgs, schließt Euch dem Hamburger Verein für Vogelschutz und -liebhaberei an! Nehmt teil an den billigen Futterbestellungen und an allen anderen Vorteilen, welche Euch dadurch entstehen, daß Ihr in unserem Verein mit anderen wirklichen Vogelliebhabern Hamburgs bekannt werdet. Stärkt durch Euren Beitritt nicht nur unseren Verein, sondern dadurch auch den Reichsverband der deutschen Vogelliebhaber, Sitz Leipzig, e. V., so daß unsere gemeinsamen Interessen durch den Reichsverband genügend gewahrt werden können. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Der Verein bezweckt den Zusammenschluß aller wirklichen Liebhaber einheimischer und fremder Sing- und Ziervögel und bietet auf seinen Sitzungen viel des Vorteilhaften und Interessanten auf dem Gebiete der Stubenvogelliebhaberei. Gäste sind stets herzlich willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 21. April. Nähere Auskunft durch den Vorsitzenden Arnold Weber, Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Verband der Finkenvereine Ruhrgau-Bochum. An sämtliche Sportsfreunde und Gönner unseres Sports. Am 24. Mai 1925 gedenkt der Verband der Buchfinken-Liebhaber Ruhrgau in Bochum einen großen Zentral-Wettstreit abzuhalten. Grund dieses Wettstreites soll sein, unserem Sport sowie unseren Lieblingen den Platz in der Öffentlichkeit zu erringen, der ihnen gebührt. Dieses ist doch der Wille eines jeden ehrlichen Liebhabers. Um allen öffentlichen Organen sowie den gesetzgebenden Körperschaften zu zeigen, daß wir mit unseren Lieblingen uns nicht verdrängen lassen, ist es Pflicht eines jeden Liebhabers, diesen Wettstreit (Demonstration) mitzumachen. Ferner sollen zu diesem Wettstreite die Presse sowie sonstige Körperschaften geladen werden, um zu zeigen, daß unser Sport eine edle Liebhaberei ist und keine Tierquälerei, wie so oft geschrieben wird. Um Mitteilung an untenstehende Adresse, mit wieviel Vögeln ihres Vereins gerechnet werden kann, wird höflichst und schnellstens gebeten. Es kommen nur großartige Wertgegenstände und Plaketten zur Verteilung. Die Preisrichterfrage ist in ehrlichen und guten Händen. Ferner wird jedem Aussteller auf Wunsch über Gesang und Prämierung seines Vogels eine Bewertungskarte ausgestellt. Ihrer werten Antwort schnellstens entgegensehend Friedrich Becker, Bochum, Bahnhofstr. 10.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zi

Käfige u. Gerätschaften

Vogel-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50. **Schlagnetze** f. kl. schädl. Vögel M. 2,30, f. gr. M. 2,50 u. 2,80. Katalog gratis. **J. Tannen, Gronau 58,** Westf. [540

Inserate

für das am 23. April 1925 zur Ausgabe gelangende Heft 17 der Gef. Welt erbitten bis 18. April.

Futtermittel

Mehlwürmer

veget. gez., ¼ Liter franko gegen Vor-541] einsendung von Mark 2.—. **Bonitas-Versand, Rostock i. M. 3.**

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark ¼ Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [542

Universalfutter I

für Rotkehlchen, Nachtigallen, Grasmücken, Sprosser

Kilo 2 *M.* [543

Universalfutter II

für Drossel, Amsel, Stare

Kilo 1.50 *M.*

Vom Besten das Beste empfiehlt **Gebel, Köln,** Jakobstraße 8.

Vogelfutter

für Kanarien, Waldvögel, Papageien, Weichfresser. Aus bewährteste Mischungen auf Grund jähriger Erfahrung. Liste 13 über futter umsonst.

W. Göpel, Leipzig

Tröndlinring 1. Telephon 9

Bei Anfragen bitte auf die „Gef. Welt" Bezug zu nehmen.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 14
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Karl Neunzig

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 23. April 1925 | Heft 17

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

25 Jahre Schriftleitung.

Am 4. Januar 1900 richtete der Creutz'sche Verlag folgenden Aufruf an die Leser dieser Zeitschrift:

An die Freunde der Vogelwelt!

„Die „Gef. Welt", illustrierte Wochenschrift für Vogelliebhaber, tritt unter veränderter Leitung in das neue Jahrhundert. Am 29. September 1899 machte ein Herzschlag dem Leben ihres Begründers und bisherigen Leiters Dr. Karl Ruß ein Ende.

Für die Fortführung der Zeitschrift im Sinne ihres Begründers ist es uns gelungen, aus dem Kreise der Jünger des Dr. Ruß einen ihm seit langer Zeit befreundet gewesenen Kenner der Vogelwelt, den unseren Lesern durch seine Mitarbeit in Wort und Bild, insbesondere auch den Kreisen der Tierfreunde und Tierschützer bekannt gewordenen Tiermaler Herrn Karl Neunzig in Lehnitz an der Nordbahn (bei Berlin) zu gewinnen. Wir dürfen uns daher auch der Hoffnung hingeben, daß im Vertrauen auf diese neue Führung der Freundeskreis der „Gef. Welt" nicht nur derselbe bleiben, sondern sich stetig vergrößern wird."

Während der seit der Jahrhundertwende verflossenen fünfundzwanzig Jahre hat Karl Neunzig die „Gef. Welt" geleitet, durch Bild und Schrift sachkundig und wirkungsvoll ihre Entwicklung gefördert, sie allen Liebhabern zum geschätzten und unentbehrlichen Freunde, Berater und Wegweiser gestaltet. So wird man gern Näheres über die Persönlichkeit und den Werdegang des Mannes hören, zu dem ein Vierteljahrhundert gemeinsamen Strebens engere Beziehungen geschaffen hat.

Karl Neunzig wurde am 6. Oktober 1864 in einem Vorort Berlins geboren; nach erfolgreicher Gymnasialzeit bezog er achtzehnjährig die Hochschule für die bildenden Künste. Als Schüler Hugo Vogels und besonders Paul Meyerheims legte er hier den Grund zu seiner künstlerischen Vollkommenheit, deren Erzeugnisse uns allen eine nie versiegende Quelle der Freude und des Genusses geworden sind. Von lebendiger Liebe zur Natur und ihren Geschöpfen erfüllt, einer Liebe, die ihn dem Leben auf dem Lande in märkischer Dorfeinsamkeit länger als ein Jahrzehnt den Vorzug vor der großstädtischen Kultur geben ließ, machte er frühzeitig Beobachtungen in Wald und Heide, auf Feld und Flur und kam so bald in freundschaftliche Verbindung mit Dr. Karl Ruß, dem weitbekannten Kenner, Darsteller und Schützer der Tier- und besonders der Vogelwelt, eine Verbindung, die für seinen Lebensberuf bestimmend wurde. Auch in seinem städtischen Heim schaffte er sich durch Anlegung einer Vogelstube Gelegenheit zu ornithologischen Studien, die er alsbald schriftstellerisch und künstlerisch verwertete. So erscheint es ganz natürlich, daß beim Tode des Dr. Ruß der Verlag sich an ihn, den tüchtigsten der Jünger des Verblichenen, mit der telegraphischen Anfrage wandte, ob er die Nachfolge bei der „Gef. Welt" übernehmen wolle, und daß der also Gefragte die „bezahlte Drahtantwort" mit einem entschlossenen „Ja" ausfüllte. Neunzig stand damals in seinem 36. Lebensjahr. Seine künstlerischen, schriftstellerischen und ornithologischen Neigungen hatten in der Lebensgefährtin, die er sich erwählt, verständnisinnige, liebevolle Förderung gefunden.

Daß sich die in dem Aufruf des Verlages ausgesprochenen Hoffnungen erfüllten, daß ihre Erfüllung die Erwartungen weit übertraf, bedarf besonderer Erwähnung nicht. Karl Neunzig erfreut sich bei allen, die ihn persönlich oder aus seinen Werken kennen, ungeteilter Anerkennung. Seine Werke, sowohl die Bearbeitungen Rußscher Bücher wie seine eignen, sind im Urtext oder in fremdsprachlicher Übertragung über die ganze Erde verbreitet, und nicht nur von den Liebhabern, auch von der wissenschaftlichen Kritik ist und wird ihnen reicher Beifall gezollt.

Als altem, langjährigem Freund unseres Schriftleiters sei es mir vergönnt, ihm im Namen der Leser der „Gef. Welt", aller Vogelliebhaber und des Verlages die herzlichsten Glückwünsche darzubringen und die Hoffnung auszusprechen, daß uns und ihm seine Tätigkeit — die so glücklich Kunst und Wissenschaft in einer Person vereinigt — noch viele Jahre möge erhalten bleiben.

John Kuntzendorff.

Gelbspötter.

Von Paul Schwarz, Leipzig.

(Nachdruck verboten.)

Wieder einmal geht geheimnisvolles Raunen in der Luft, und wieder einmal jährt sichs, daß sich im Schoße der Natur das Werden vorbereitet für eine bevorstehende Geburt, wie sie vom menschlichen Geiste in ihrem gesamten Umfange niemals erfaßt werden kann, in Erfüllung eines ewigen Gesetzes, solange die Erde steht. Mensch und Tier und Pflanze, alles, alles ist dem Vorgange unterworfen, ohne Unterschied, ob arm oder reich, groß oder klein und jung oder alt, in guten oder bösen Tagen. Und nichts ist so mächtig, um sich diesem zu entziehen. Es braust der Sturm durchs Land mit Heulen und Fauchen, die schlummernde Natur wachrüttelnd, und der alte Mann auf schwachen Füßen, der Winter, muß, mag er wollen oder nicht, dem ungestümen Burschen, dem Frühling, weichen. Das Glück des Kampfes ist wechselnd, aber das Drängen unwiderstehlich. Und ist der Kampf beendet, dann sucht der Bursche sein Drauflosstürmen gutzumachen. Mit weicher Hand kost er, was ihm in den Weg kommt, und lockt und lockt, bis er das durch sein wildes Wesen verlorengegangene Zutrauen zurückgewonnen hat. Zaghaft zunächst, dann immer freier entwickelt sich das Werden, die ersten Pflanzen treiben Blüten. Da kommen Schneeglöckchen, weiß wie das warme Tuch des Winters und weiß wie der Schreck, sie läuten den Frühling ein. Nicht lange danach überzeugt sich auch das Buschwindröschen, ob es möglich ist, einen Blick auf die Erde zu werfen. Von all dem vielen Licht und Sonnenschein senkt es in jungfräulicher Reinheit sein Gesichtchen zur Erde. Schlüssel- und Gänseblümchen haben gar schon etwas Farbe bekommen, wie noch andere in Garten, Feld und Wald. Neues Leben erwacht auch im Tierreich an warmen Tagen und hellem Sonnenschein. Die Augen des Naturfreundes wandern unermüdlich von einem Punkt zum andern. Hier eine vorwitzige Fliege, dort ein flinkes Mäuslein, in junger Saat der Hase, im hohen Baum am Nest die Krähe, sich wärmend das eine, nestbauend das andere, hochzeitfeiernd das Häslein und Herr und Frau Krähe haben gar schon Elternpflichten zu erfüllen. Bereitet solches Schauen und Beobachten nicht Lust zum Leben und Genuß? Ich empfinde das jeden lieben Tag, der mir ganz gehört und Gelegenheit bietet, durch Feld und Flur und Busch und Wald zu wandern, dort ist eine Blume und da wieder etwas anderes zu sehen und zu beobachten, und kehre ich abends von meinen Streifereien müde und hungrig zurück, so ist doch bereits wieder der Wunsch fällig, es so wie heute recht bald einen anderen Tag tun zu können. Wenn ich auch Sinn und Interesse für alles was kreucht und fleucht, für alles Leben und Weben in der Natur habe, so wird aber wohl kaum etwas mehr fesseln, als die heimische Vogelwelt, unsere Sänger, die die Luft mit Lust und Liedern erfüllen. Was spricht nicht aus dem Vogellied? Nach menschlicher Gewohnheit Laute zu deuten, Klage, Sehnsucht, Freude, Schmerz. Jedem Menschen bietet der Vogelgesang etwas für Herz und Gemüt, er braucht nur hinauszuwandern mit Sinn für alles Gute und Schöne, und zu hören, er kehrt zurück zufrieden und froh, gestärkt für den Alltag. Gerade dieser Lieder wegen und seines so frei machenden Inhaltes erwarben sich die kleinen Künstler unter den Menschen eine vieltausendköpfige Menge Freunde, die nicht nur solche des Vogels im Käfig, sondern die aller Vogelwelt sind und die ihr ausgesprochenen praktischen Schutz zu bieten versuchen. Mittel und Zweck dieses Schutzes streben dem einen einzigen Ziele zu, den Bestand der Vogelarten zu heben oder wenigstens zu erhalten. Ein großes Beginnen und doch nahezu erfolglos. In ihrem Schaffen und Vernichten ist die Natur so grausam, daß ein Eingriff in diese Präzision zur Verhinderung dessen den allergrößten Schaden im großen ganzen hervorrufen kann. Seit Menschengedenken hat es zum regelnden Ausgleich nie des Menschen Hand und Geistes bedurft, die gewaltigen Naturmächte sind, wie das tagtäglich festgestellt werden kann, nicht auf Menschenkraft und Sinn angewiesen. Davon bietet die Tatsache ein Beispiel, daß im Jahre 1922 in unseren Auwaldungen die Spötter geradezu häufig waren, während im folgenden Jahre die Art nicht im mindesten mehr so stark vertreten war. Diese Abnahme ist nicht etwa in dem Umstande des Wegfangens, der Fang des Spötters ist, wie bekannt, ein sehr schwieriger, sondern in der ungünstigen Witterung des folgenden Jahres zu suchen. Die Käfigung ist niemals die Ursache der Vogelabnahme, dagegen aber die veränderte Forstkultur, die intensivere Landwirtschaft und Unternehmungen, die die Beseitigung der Nistgelegenheiten zur Folge haben, wie Austrocknung von Sümpfen mit ihren Unterholzbeständen, Veränderungen der Windschützen an den Bahnstrecken, Vernichtung der Feldgehölze und vor allen Dingen ungünstige Witterungseinflüsse. Unter Berücksichtigung aller dieser Umstände bleiben nur geringe Möglichkeiten des Schutzes, die aber vom größten Teil der Liebhaberschaft bis an die Grenzen erschöpft werden.

Den schönsten Monat im Jahre, den Mai, erwarte ich mit größter Ungeduld. Zu dieser Zeit hat sich die immer schaffende Natur herausgeputzt wie ein eitel Mädchen und empfängt Freund und Feind, groß und klein, arm und reich mit frischem Grün und Blütenpracht. Sie ladet zum frohen Genießen ein alle, die ihr Verstehen entgegenbringen. Es ist ein Schwirren, Summen und Singen in der Luft, wie sonst zu keiner Zeit, man möchte sagen, ein einziges Weben und eine einzige Hochzeit. Mitten in diesem Freien und Feiern kommt ein kleines Vögelchen von weiter gefahrvoller Reise zurück, der Gelbspötter. Froh, die vielerlei Gefahren hinter sich zu haben, stimmt er ein im vieltausendstimmigen Orchester mit Stimmenwohllaut, Kraft und Emsigkeit, wie man es nicht für möglich halten sollte. Gerade als habe er etwas versäumt und möchte es nachholen, gibt er sich dem Gesange und der Futtersuche hin, lustig und allweil fidel. Er kommt mir vor wie einer, der aus Übermut nicht weiß, was er tun soll vor eitel Lust und Freude. Wenn ich das Bürschlein zum ersten Male wieder höre, ist's für mich ein besonderer Feiertag, auf den ich das ganze Jahr hindurch mit aller Ungeduld warte. Nicht etwa, daß mir das Lied der Amsel oder des Rot-

kehlchens nicht gefiele, beileibe nicht, aber als Mensch mit frohem Sinn finde ich, daß das lustige Spötterlied mit der frohen Jahreszeit weit besser harmoniert als die feierlichen Weisen der vorgenannten Arten. Dudli dudli fidelio dringt's aus der gelben Brust hier oder dort, unten oder oben, und weiter singt's und klingt's im kurzen oder langen Liedlein. Nimmer müde fegt der Bursche in vorgestreckter Haltung durchs Gezweige, vorsichtig und scheu, Verdächtigem aus dem Wege gehend und am anderen Orte wieder auftauchend. Seine Stimme ist volltönig, ähnlich der der Amsel, und sein Gesang vielseitig mit Lauten oder Gesangsteilen anderer Sänger durchsetzt, die der kleine Meister recht angenehm mit seinem eigenen Gesang verbindet und in einem wohlgeformten Liede zum Vortrage bringt.

Gesang und Gesang ist zweierlei. Das Ohr des Liebhabers ist wohl in der Lage, diese oder jene Schönheit im Gesange trotz des auf ihn eindringenden Stimmenvielerleis festzustellen. Eine Auenwanderung bietet immer den seltensten Genuß, hier sind Spötter anzutreffen, die die besten ihrer Art sind. Als Jungvögel haben sie eine zahlreiche Schar Lehrmeister, die dank der großen Aufnahmefähigkeit des Spötters an fremden Vogelstimmen mit dem Lehrling wohl zufrieden sein können. Zwar möchten Sumpfrohrsänger, Blaukehlchen und Haubenlerchen im Vortrag übernommener Vogellaute dem Spötter vorangestellt werden, weil sie vielseitiger sind und naturgetreu vortragen, aber es fehlt ihnen allen doch der einzigartige Stimmenwohllaut der mit Recht den Gelbspötter in die Reihen der feinsten Sänger versetzt.

Die besten Sänger sollen auch nur Gegenstand der Käfigung sein. Was der Vogelwirt an einem guten Vogel vorauszusetzen hat, kann weder ich noch ein anderer Mensch erschöpfend beantworten, weil weder die menschliche Sprache noch die Musik reich genug ist, um erschöpfend zu erklären. Was ich vom Vogel der Art fordere, ist in der Hauptsache, kurz gesagt, eine vielseitige Imitation anderer Vogelrufe, die in tiefer Tour und unter Hintansetzung des unangenehmen Originalgesanges vorgetragen werden muß. Einen anderen Hinweis kann ich, wie gesagt, nicht weiter geben, ich nehme aber an, daß das wenige genügend ist, um den rechten Weg zu zeigen. Der Liebhaber braucht nur Sinn und Gehör bei seinen Freistudien auf diese zwei Hauptmerkmale zu lenken, dann wird er zur Erkenntnis des Besten kommen. Wem ist es aber nicht schon wie mir gegangen, nämlich, daß er beim Vogelkauf geleimt wurde und einen angeblich prima Spötter erwarb, der sich mit seiner Stimme wieder aus der Wohnung sang. Wohl fast allen solchen Vögeln wird der Liebhaber beim natürlichen Abgang, sei es beim Weitergeben oder Freilassen, keine Träne nachweinen, weil ein gesanglich minderwertiger Spötter nicht die Kosten und Mühe der Käfigung lohnen und unter Umständen darüber hinaus seinen Pfleger durch unschönen Gesang zur Verzweiflung bringen kann. Ich kann auf Grund meiner Erfahrungen in der Unterschiedlichkeit des Gesanges sagen, hinaus mit dem Vogel, wenn er sich lästig macht, unter frohem Verzicht auf die Ehre erfolgreicher Pfleger dieser zarten Geschöpfe zu sein. Gesunde Nerven sind immer besser als die eben erwähnte Ehre. Das gleiche gilt auch vom aufgezogenen Vogel, er wird zeitlebens kein Sänger. Ein Zeisig oder anderer Vogel ist mir hundert Mal lieber als eben der erwähnte. Abgesehen vom minderwertigen Gesang erfordern solche Tiere nicht die Intensivität des Pflegers und sind auch für den echten rechten Liebhaber niemals das, was der erwachsene Frischfang ist, ein guter Sänger und ein wertvoller Vogel. Und weiter wird der aufgezogene Vogel auch niemals als Maßstab der Kunst, Spötter zu pflegen und jahrelang zu halten, anzuwenden sein. Die Nichtbefriedigung des Liebhabers in gesanglicher Beziehung im Verein mit ungünstigen Pflegeergebnissen bringt es mit sich, daß der Spötter im Heim des Liebhabers nicht so häufig zu finden ist als etwa andere Arten. Dieser Umstand veranlaßt mich, näher auf die Ursachen dieses Standes einzugehen und meine Erfahrungen zum besten zu geben, hoffentlich mit dem Ergebnis, ernste pflichtbewußte Liebhaber für die Art zu interessieren.

Senegaltaube.

Mißerfolge in der Spötterpflege wird wohl jeder Liebhaber, soweit er sich an diesen Vogel schon herangewagt hat, ich selbstverständlich nicht ausgeschlossen, zu buchen gehabt haben. Und viele ernste Vogel-

wirte werden auch noch heute aller Mühe zum Trotz über keine guten Erfahrungen berichten können. Das Ende vom Liede ist dann in der Regel Mißmut und Ratlosigkeit. Wie kommt das nun und worin sind die Ursachen der Mißerfolge zu suchen? Nun, ich kann mir es nicht anders denken, als die Ursachen liegen im Pfleger, weniger im Pflegling, meine jahrelangen Erfahrungen haben mich dieses ausgiebig gelehrt. Wenn es sich bewahrheitete, daß Sorgen graue Haare bringen, müßte ich vielleicht einer derjenigen mit sein, die welche hätten. Früh, in jungen Jahren, fing ich mit der Spötterpflege an, wurde von Mißerfolgen heimgesucht, und bot den Schwierigkeiten immer wieder die Stirn, bis ich sagen konnte, ich habe die Oberhand im Kampf um die Haltung der Vögel im Käfig lange Jahre hindurch behalten. In meinem Vogelbestand findet der mich besuchende Liebhaber sechs Spötter in den verschiedensten Jahren der Käfigung, vom einjährigen bis zum achtjährigen, alle gleich munter, die Brust voll Lieder, wenn die Gesangszeit kommt. Der Schwerpunkt der erfolgreichen Spötterpflege liegt einzig und allein in der Mauser, die selbstverständlich ihren Anfangspunkt in der Pflege und Fütterung hat. Ich will es heute beweisen, daß die Kunst, den Vogel lange Zeit zu käfigen, nicht allzu schwierig auszuüben ist. Wenn ich es für meinen Teil für überflüssig halte, darüber zu reden, so scheint ein Hinweis doch nicht verfehlt, nämlich der, daß sich nur die Liebhaber der Käfigung von Spöttern widmen, die es mit dem Herzen, also mit Liebe tun, und nicht die, die es ihres Geldbeutels wegen auch zu können glauben, während das Herz nicht bei der Sache ist. (Fortsetzung folgt.)

Nochmals: Vogelschutz.

Von Adolf Voigt, Jena.

(Nachdruck verboten.)

Wieder und wieder findet man in den Thüringer Tageszeitungen neuerdings Vogelschutzartikel, die in völliger Verdrehung der Tatsachen die Käfighaltung einheimischer Vögel angreifen. Meist sind es Provinzblätter, und fast immer ist es der Bund für Vogelschutz in Coburg, der dahintersteckt. Er beeinflußt planmäßig die öffentliche Meinung gegen uns. Steter Tropfen höhlt den Stein, denkt man. Soweit Vogelliebhabervereine in den Städten bestehen, wo solche Artikel erscheinen, wird sich stets jemand finden, der ihnen entgegentritt. Aber damit ist es nicht getan. Die beste Parade ist der Hieb! Wir sollen nicht warten, bis wir angegriffen sind, sondern selbst immer wieder aufklärend wirken, indem wir selbst in der Lokalpresse Artikel bringen, die die wirklichen Ursachen der Abnahme einiger Vogelarten klarlegen, die zweckmäßige Käfigung und Fütterung der beliebtesten Waldvögel schildern, kurzum, alles tun, die Vogelliebhaberei wieder volkstümlicher zu machen. Dann wird auch der Vogelschutz vorwärtskommen. Mit Artikeln in der Fachpresse allein ist es nicht getan. Vor mir liegt ein altes Buch mit vergilbten Blättern. Der lange Titel lautet:

Des Durchläuchtigsten / Hochgebornen Fürsten und Herrn / Hn. Bernhards / Herczogen zu Sachsen / Julich / Cleve und Berg / LandGrafen in Thuringen / MarkGrafen Meisen / Gefürsteten Grafen zu Henneberg / Grafen zuder Mark und Ravensberg / Herrn zu Ravenstein / pp.

Forst- oder Wald-

Item

Jagt- und Weidewercks-Ordnung /

Wie es in S. F. D. Fürstentum JENA Forsten und Wäldern hinführo gehalten werden sol.

Publicirt

Und verfertiget zu JENA in der Wertherischen Druckerey.

Im 1674. Jahr.

Interessant für uns Vogelliebhaber ist der Ander Haupt-Punct. II. Von Jagten.

(Absatz) 7. Es sol auch hiermit / bey Vermeidung inbesagtem Jagt-Patent / verordneter / oder in Mangelung des Geldes / anderer unnachläßiger Straffe / mit Ernst verboten seyn / daß sich keiner im Frühling / wenndie Vögel ausbrüten / in Wäldern oder Feldern an Eyern oder jungen ausgebrüteten Vögeln in Nestern / krob und klein nichts ausgenommen / vergreiffen / auch sonsten niemands in den Wäldern / welcher darinnen nicht zu schicken / sonderlich an Feyer-Tagen / sich betreten / ingleichen die jungen Haasen / Rehe / und Wild-Kälber unaufgehoben und ungestohlen lassen.

Hier also wird schon so eine Art Vogelschutz befohlen, aber die nächsten Absätze beweisen, warum: Man wollte im Herbst recht viel Vögel fangen können, und die Fürstliche Hofküche war Abnehmer! Man höre:

(Absatz) 8. Die Vogel-Heerde und Gestelle / sollen durch den Ober-Förster mit Vorbewußt des Forstmeisters / soviel ohne Schaden und Nachtheil geschehen kan / umb nach specificirten Vogel-Zinß vermiehtet / so wohl die Vogel in Fürstl. Hoff-Küche Gelieffert / darneben ein Regiſter / wie hoch ein jeder Heerd uñ Vogelgestelle vermiehtet / und wo sie gelegen / darüber gehalten werden / Es sol auch keinem Unterthanen, welcher des Nieder-Weidewerks nicht befugt / gestattet werden / Vogel-Heerde und Gestelle auf seinen Gütern andern zu vermiehten.

Und nun kommt der „Vogelzinß", der beweist, wie lohnend der Fang gewesen sein muß.

„Von einem Heerde / 1 Mandel Krammets-Vögel / und 1 Schock Drusseln.

Von 1. Schock Schlingen / 1 Mandel Drusseln
Von 1. Schock Auffschlägen / 1 Mandel kleine Vögel
1 Meisenhütte / 2 Schock Meisen etc."

Es werden dann noch die „Forstbedienten" ermahnt, darauf zu achten, daß durch die Vogelsteller kein „hohes Feder-Wildpreht" gefangen werde.

Außerordentlich lehrreich ist das Büchlein. Damals fing man Meisen und „kleine Vögel" schockweise, um sie in der fürstlichen Hofküche zu verspeisen, und die Vögel haben kaum wohl abgenommen. Erst unserer fortschreitenden Kultur blieb es vorbehalten, gerade die für Forst- und Landwirtschaft nützlichen Arten zu dezimieren. Noch eine andere Stelle des Buches ist lehrreich. Sie spricht von den einzuführenden Grenzsteinen, da die bisherigen „Mahl-Bäume", die

nicht gefällt werden durften, durch den Wind umgerissen werden / auch nach lang gestandenen Jahren endlichen niedergehen und verwesen / und die Grentzen alsdann dadurch strittig werden /.

Ja, da gab es Nistgelegenheit für Meisen, Kleiber, Spechte in solchen alten „Mahlbäumen", die die Grenzen markierten!

Wir hier in den Thüringer Bergen können auch jetzt noch nicht klagen. Unsere Felswände bieten Nistgelegenheit in Hülle und Fülle, da sie einmal voller Risse und Spalten und dann mit Baum- und Strauchwerk aller Art bedeckt sind. Die Meise paßt sich an und brütet hier in den Felswänden auch sehr gern, wie ich oft feststellen konnte. Und bei dem Nachwinter, der im März einsetzte, sammelten sich sehr große Meisenschwärme in unserem Garten um die Fütterung, namentlich die Kohlmeise war überaus zahlreich vertreten. Auf jeden Fall muß das Lied von der Schädlichkeit der Käfigung der Vögel endlich mal verstummen.

Die Ursachen, die eine Abnahme der Vogelwelt bewirkten, sind ganz anderer Art und hier oft genug erörtert worden. Sorgen wir dafür, daß sie auch in der Tagespresse immer wieder erörtert werden, kommen wir unseren Gegnern zuvor! Nur so können wir für uns arbeiten. In großen Städten tun ja auch die von den Vereinen und Verbänden veranstalteten Ausstellungen viel für die Aufklärung der Öffentlichkeit, wir in Klein- und Mittelstädten lebenden Vogelliebhaber aber wollen uns mehr als bisher der Tagespresse bedienen und dabei gleichzeitig auf unsere Fachpresse verweisen, der dadurch mancher Abonnent gewonnen werden kann.

Die geglückte Brut meiner Amaranten.

Von Enno Schlosser.

(Nachdruck verboten.)

In nachstehendem werde ich erzählen, unter welchen Umständen meine kleinen Amaranten ihre zweite Brut glücklich zum Ausfliegen brachten. Von Herrn Götz erhielt ich im Juli 1921 u. a. ein Pärchen Amaranten, welche bei mir in einem Flugkäfig 120 × 55 × 150 ihren Einzug hielten. Sogleich plätscherten sie im Badegefäß, und zwar so ergiebig, daß sie kaum den nächsten Zweig des Fliederstrauches, welcher im Käfig untergebracht ist, erreichen konnten.

Allerliebst ist das Benehmen des Weibchens, welches, sobald ich mich nähere, auf den Käfigboden huscht, den Schnabel in den Sand steckt, das Schwänzchen aber kerzengrade in die Höhe stellt, und so bewegungslos sitzen bleibt, bis ich mich wieder entferne. Nur die kleinen gelbumränderten Äuglein beobachten scharf den Ruhestörer. Jeden ahnungslosen Besucher täuscht dieses kleine Vögelchen über seine Anwesenheit durch diese Weise hinweg. Dies beweisen immer wieder die Worte der Besucher: „Hat denn der „kleine Rote" da keine Frau?"

Sobald es sich aber entdeckt glaubt, stürmt es unter lautem tschek, tschek davon.

In dem oben erwähnten Käfig hatte ich verschiedene Nistgelegenheiten angebracht, in den ersten vier Wochen jedoch übernachteten meine Kleinen immer frei im Gebüsch.

Im August reichte ich Baumaterial, wie Bast von allerlei Zweigen, Moos, Heu, Schafwolle und Federn. Nicht lange sollte ich warten, so begann das Männchen Bast in ein geschlossenes Kästchen zu tragen, während das Weibchen das Nest formte und glättete.

Das grobe Gefüge des Nestes bestand aus grobem Bast, das Innere war schön mit Moos, Schafwolle und Federn ausgepolstert. Das Ganze machte den Eindruck eines wüst zusammengetragenen Haufens Genist, gleich dem Neste eines Sperlings. Oben war es überwölbt mit seitlichem Eingangsloch. Ende August war der Bau beendet und am 4. September das erste Ei gelegt. Um nun das erste Brutgeschäft nicht zu stören, unterließ ich von nun an jede weitere Kontrolle.

Weinrote Turteltaube.

Nach langem vergeblichen Warten konnte ich die vier gelegten Eier, welche fest bebrütet wurden, als unbefruchtet entfernen.

Legenot habe ich an dem Weibchen nicht bemerkt, auch während der zweiten Brut nicht.

Nach diesem Mißerfolg teilte ich den Käfig infolge Platzmangel in vier Teile und stellte in den den Amaranten zugewiesenen Teil ein kleines Tannenbäumchen.

Es dauerte auch nicht allzulange und wieder erstand ein Nest aus gleichem Baumaterial in einem gleichen Kästchen. Erwähnen möchte ich jedoch noch, daß meine kleinen Roten immer versteckt gehaltene Nistplätze wählten. Durch die erste ergebnislos verlaufene Brut etwas mißtrauisch geworden, ließ ich meine kleinen Zwerge von nun an schalten und walten

wie sie wollten. Frische Ameisenpuppen, welche ich zur ersten Brut reichte, waren nun nicht mehr zu haben, um so mehr bot ich Vogelmiere, welche sehr gerne angenommen wurde, den Rest aber immer ins Nest schleppten.

Am 6. Oktober vermißte ich das Weibchen, trotz eifrigen Suchens konnte ich das hochgestellte Schwänzchen nicht entdecken und vermutete es auf einem zweiten Gelege.

Diese Vermutung wurde auch bald durch das abwechselnde Fehlen des Männchens und Weibchens bestätigt. Am 10. Tage der Bebrütung mußte ich die traurige Entdeckung machen, daß beide vor dem Neste saßen und jedes zögerte, dasselbe aufzusuchen. Der Schreck dauerte nicht lange, das Weibchen wurde sich seiner Pflicht wieder bewußt und von nun an begann das Brüten emsiger denn je.

Leises Piepen ließ mich am 29. Oktober beim Reinigen der Futtergeschirre plötzlich aufhorchen, dies konnte doch nur aus der Amarantenstube kommen. Schnell war das verschiedenste Aufzuchtfutter zurechtgemacht, Weißwurm, in Milch gequellte Ameisenpuppen, zerschnittene Mehlwürmer, gequellte weiße und Senegalhirse, Glanz, geriebenes Eibrot und Eigelb. Angenommen wurde jedoch nur, und zwar während der ganzen Zeit der Aufzucht, gequellte Senegalhirse und Ameisenpuppen, seltener Glanz. Nie habe ich etwas anderes aufnehmen sehen, außer zerstoßenen Eierschalen, welche leidenschaftlich gern verzehrt werden.

Daß sich die Alten durch nichts im geringsten stören ließen, wenngleich sonst ängstlich, will ich durch folgendes feststellen.

Bereits Anfang November setzte hier schon größere Kälte ein, weshalb ich gezwungen war, dieses Zimmer, das weder Ofen noch Schornstein besitzt, zu räumen und meine befiederten Lieblinge im Wohnzimmer unterzubringen. Zu diesem Zwecke mußte ich den Nistkasten mit den Jungen herausnehmen und an einen anderen kleineren Heckkäfig aufhängen, auch die Alten herausfangen. Als wäre nichts geschehen, sang das Männchen sein kleines, aber goldenes Lied so hell und zart, wie Glockengeläut einer Weihnachtspyramide, und die Aufzucht nahm ihren Fortgang.

Am 19. Tage flogen vier noch unselbständige Junge aus, laut nach Futter bettelnd, welche ich des Abends mit einem Holzlöffel wieder ins Nest befördern mußte. Bemerken möchte ich hierzu, daß die Jungen ganz der Beschreibung des Herrn Neunzig in seinem „Fremdl. Stubenvögel“ gleichen.

Wunderschön nehmen sich die zu beiden Seiten der Schnabelwurzel befindlichen blau und weiß leuchtenden Papillen aus. Die gelben Augenringe fehlen noch gänzlich, jedoch lassen die roten Oberschwanzdecken die Art sogleich erkennen.

Am nächsten Tage flogen nur noch zwei Junge aus, die übrigen waren Schwächlinge, welche sich nicht mehr herauswagten und später auch eingingen.

Wenngleich die Alten stundenlang vor dem Neste saßen und lockten, um die zwei Jungen zum Verlassen des Nestes zu bewegen, so kümmerten sie sich doch recht wenig um ihre leiblichen Bedürfnisse.

Die zwei Überlebenden, ein Pärchen, sind sehr zahm geworden und kommen ans Gitter, sobald ich mich dem Käfig nähere.

Das heftige Schwanzwippen ist auch dem jungen Weibchen eigen. Die blauweißen Papillen sind jetzt Ende Dezember noch deutlich sichtbar. Ganz allmählich hat auch die Verfärbung beim Männchen, und zwar mit orangeroten Federchen, an der Brust begonnen.

Der Bluthänfling.

Von Karl Finck, Neukölln.

(Nachdruck verboten.)

Unaufhörlich rauschte der Regen herab. Dunkles Gewölk und dichter Wasserdunst verhinderten das klare Erwachen des Tages.

Mißmutig saß ich mit zwei Freunden in dem dumpfigen Dorfkrug. Erst gegen 9 Uhr hellte sich das Wetter auf, die Niederschläge ließen nach, und matte, wässerige Sonnenstrahlen brachen hervor. Nun gab es kein Halten mehr.

Verlassen lag das ärmliche Moordörfchen, nur zwei Kuhgespanne schwankten mit Dung beladen knarrend den nahen Äckern zu. Stumm nickend grüßten die Bauern.

Solange der Weg sandig war, ging es noch; aber schon die Bruchwiesen wurden unpassierbar.

Unser ursprünglicher Plan, die Durchquerung des ausgedehnten Moorbruches, um das Blaukehlchen und sonstige Sumpfvögel beobachten zu können, konnte mit bestem Willen nicht durchgeführt werden.

Nach kurzer Beratung wählten wir deshalb den schmalen Feldweg, welcher zu der hochgelegenen Geest führte. Gleichmäßig grau dehnte sich die Ebene aus, nirgends leuchteten freudige Farben, bloß hier und da sproßten junge Gräser, schimmerten aus den bräunlichen, verwitterten Plaggen die ersten grünen Triebe.

In den Föhrenkuscheln leierten ohne Unterbrechung monoton mehrere Goldammern. Kohlmeisen lockten schüchtern, hörten jedoch bald wieder auf; es wollte keine Frühlingsstimmung entstehen.

Die farblose Einförmigkeit und die Ruhe wirkten geradezu erdrückend. Auf einmal sang fern, wo die Stangenbestände und Vorhölzer ineinander verliefen, eine Heidelerche süß und bang, nicht lange so klangen von mehreren Seiten in das Schweigen die gleichen Weisen.

Schwarz wurde wieder der Himmel. Regen und Schnee rieselte auf die Erde. Verstimmt schwiegen alle Vögel, allein ein Rotkehlchen am Bruche behielt seinen frohen Mut, flötete ruhig weiter, manchmal zwar tief traurig, dann aber wieder voll zuversichtlicher Hoffnung. Plötzlich fegte ein scharfer, eisiger Wind über die Heide, peitschte das ächsende Birkengehölz und wirbelte den quarrenden Krähenschwarm aus seiner Bahn. Licht und Dunkelheit kämpften um das Vorrecht. Eilig zogen zerfetzte Wolken dahin und verursachten zitternde wechselvolle Schlagschatten.

Beinahe geisterhaft wogten dichte Nebelmassen, woraus sich allmählich Wachholder-, verkümmerte

Eichen- und Föhrengruppen erhoben. Goldene Lichtwellen, Ströme von Glück überfluteten nun das arme Heideland.

Alles Leid war vergessen. Die Stare auf den Bäumen der Landstraße pußten eilfertig ihr zerdrücktes Gefieder, begannen bald ein großes Lenzkonzert; sie kannten die Tücken des norddeutschen Frühlings und wollten keine sonnige Minute versäumen. Aus der spärlichen Wintersaat fliegen jubelnd Lerchen empor. Zwei Rammler ohrfeigten sich, daß die Wolle umherflog und hetzten bei unserm Herannahen feldeinwärts.

In einer Vertiefung blauten kleine Heidetümpel, ganz von pyramidenförmigen Wachholderstämmen, Erlen, Zitterpappeln und verschiedenen Straucharten eingerahmt. An den Ruten der Weiden prahlten weiche Kätzchen. Stellenweise brachen durch das matt gewordene Silber bereits goldgelbe Staubgefäße hervor. Es duftete überall eigenartig herb.

Das Heideland ist arm an Frühlingsblumen. Hier und da glänzten schon die Sonnen des Löwenzahns, der Huflattich entfaltete seine blattlosen Blüten. Aus dem dürren Graswerk guckten Gänseblümchen mit rot gefrorenen Bäckchen. Die Blumengesichtchen hingen noch voll bitteren Tränen, so kalt und unfreundlich war die Nacht. Oben, in dem Geäst der Birken, das der scharfe Wind ständig bewegte, saßen verstreut Hänflinge. Manches Männchen zeigte die schöne rote Hochzeitsfärbung. Mit aufgeblähten Kehlen flöteten sie ihr melodienreiches Liedchen.

Der Bluthänfling singt nach meiner Ansicht von den Körnerfressern am besten. Zwischen helle Strophen mischen sich klare schmetternde Triller, welchem volle Flötentöne folgen, dann wieder kommen sanfte Lockrufe, dabei sind alle Klangschattierungen angenehm und einschmeichelnd. Laut lockend flog das Völkchen davon und schon nach wenigen Minuten klang ihr Gesang aus den anliegenden verkümmerten Kiefern. Weiter unten, wo die Erlen größere Bestände bildeten, klirrten Grünlinge, schlugen mit den Flügeln oder trieben komische Liebesspiele. Fleißig probierten die Buchfinken ihren Schlag. Einzelne Hähne schlugen voll, andere quälten sich und fanden nicht das Ende. Darüber lachte eine alte Kohlmeise, daß es durch das ganze Bruch hallte.

Immer freundlicher wurde das Wetter. Wohl schwelgten über dem Moore noch häßliche Dünste; aber minutenweise öffneten sich weite Durchblicke, dann flirrte die unendlich braune Einöde in bläulich verdämmerter Kupferbronze. Drüben, in der Nähe alter Schirmkiefern, kollerten Birkhähne, lärmten Kiebitze und Elstern, während in der blauen Luft Weihen schrien. „Sonne, Sonne!“ rief ein herziges Sumpfmeischen. Rivalen antworteten. Wütend stritten die eifersüchtigen Dingerchen und fielen in das Brombeergerank, welches der Zaunkönig zu seiner Residenz erkoren hatte. Empört schimpfte der Wicht; seine Perläuglein glitzerten förmlich vor Zorn und Verachtung. Spärliche Besamungen folgten, krankhafte meterhohe Kiefern, dazwischen eingesprengt grünlich schimmernde Jungbirken. Dicht war der Boden von Heidekraut überzogen, vielfach mahlte grober Sand, dürftig mit Segge bestanden, dazwischen verstreute Polster verschiedener Borstengräser oder Blaubeeren bildeten zusammengeschlossene Flächen. Im Stangenholze wirkte der Wind weniger intensiv. Die Wipfel rauschten die uralten, ewig schönen Lenzesmelodien. An den Stämmen glühten Sonnenstreifen blutig rot, smaragdgrün schimmerte das Moos, selbst die Hirschflechte hatte warme Farben angenommen.

Gellend rufend trieb der Schwarzspecht sein Weibchen von Baum zu Baum. Blaumeislein zirpte ein kunstloses Brautliedchen. (Fortsetzung folgt.)

Zur Fütterungstechnik der Vogelhaltung.

Von A. Adlersparre.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Eine Frage, die in meinem vorjährigen Artikel in aller Kürze gestreift wurde, war der größere oder geringere Wert der verschiedenen Futterstoffe als Vitaminquellen. Zwar fehlen uns bisher vollständige, quantitative Analysen, aber eine für unsere Praxis vollkommen ausreichende Information dürfte uns folgende kleine Tabelle schenken, die ich des Raumes wegen aus meinem früheren Artikel fortließ. Die Tabelle, die eine von mir gemachte Auswahl verschiedener uns Vogelpfleger speziell interessierender Futterstoffe aufnimmt, stützt sich hauptsächlich auf die zuverlässigsten (jedoch nicht immer unter sich völlig übereinstimmenden) britischen und amerikanischen Arbeiten. Es dürfte nämlich eben in England und U. S. A. sein, wo man in jüngster Zeit das Vitaminproblem am energischsten angegriffen. Das ist ganz natürlich, wenn man einerseits die außerordentlichen Anforderungen an technischer und ökonomischer Ausrüstung der Versuchslaboratorien, die derartige Arbeiten erledigen, andererseits die sehr anzuerkennende Bereitwilligkeit, derartige theoretische Arbeit zu unterstützen, die man besonders in Amerika unter den Männern des praktischen Lebens so oft findet. Wir beneiden sie um diese Erfolge nicht, die sie hierdurch erreicht haben; eher beglückwünschen wir sie. Die Wissenschaft, wie auch die Vogelhaltung, ist und soll sein



Tigerfinken.

objektiv und international; ein entgegengesetztes Verhältnis, wo ein solches bisweilen vorkommt, ist ungesund und entwicklungshemmend.

Vitamingehalt gewisser Futterstoffe.

\+ = sehr gering, ++ = ziemlich gering, +++ = groß, ++++ = sehr groß.

	A-Gruppe	B-Gruppe	C
Weizen, Körner	+	++	
„ angekeimt	+	+++	++
„ Kleie	++	+++	
„ fein. Mehl			
Brot, feines weißes		+	
„ grobes (Graham) + Milch	+	++	
Hirse (ital.)	++	?	
Hafer	+	++	
Reis, in Hülsen	+	++	
„ poliert			
Mais, gelb	++	++	
Buchweizen		++	
Hefe		++++	
Pottasche, Bicarb. usw.			
Rindfleisch, roh	+	++	+
„ gekocht	+	+	
Leber, roh	++	++	+
Fischlebertran	++++		
Herz, roh	++	++	
Blut, roh	+		
Eigelb, roh	+++	++	+
Eiweiß, roh			
Ei, gekocht (3 Min.)	+++	+	
Sommermilch, frisch	++	++	++
Honig, Zucker			
Apfelsine, frisch	++	+++	++++
Zitrone, frisch		++	++++
Apfel, frisch	?	+	++
„ gedörrt			
Birne, frisch		++	+
Banane, frisch	?	?	++
Himbeere, Brombeere			+++
Weintraube, frisch		++	++
Pflaume, Kirsche, frisch		++	++
Pfirsich, frisch			+++
Dattel (frisch?)			++(?)
Rosine		+	?
Walnuß	+	++	
Haselnuß	+	+++	
Kokosnuß	+	++	
Mandel	++	++	
Erbsen	+	++	
„ angekeimt	?	+++	+
Möhre, roh	+++	++	++
Spinat	+++	+++	++
Salat	++	++	+++
Grüne Blätter im allg.	+++	++	++
Löwenzahn	++	++	+

Hierzu nur noch ein paar kurze Notizen. Von praktischem Interesse für den Vogelpfleger ist natürlich zu wissen, inwieweit die Vitamine bei überreicher Zufuhr (beispielsweise im Sommer) in Reserve, innerhalb des Organismus, für künftigen Bedarf gelagert werden können. Für einige Zeit — jedoch kaum genügend lang, um von größerer Bedeutung für uns zu sein — scheint dies der Fall mit den Vitaminen der A-Gruppe zu sein, also mit dem antirhachitischen (auch A_1 genannt), dem antixerophtalmischen A_2), dem zuwachsbefördernden (AD)*) und vermutlich dann auch mit zwei anderen fettlöslichen Vitaminen, mit welchen in allerletzter Zeit mehrere Forscher zu

*) Vgl. Adlersparre, a.a.O.

Blaukrönchen.

rechnen begonnen, nämlich mit einem besonderen infektionsschützenden Vitamin (A_3) und einem Fortpflanzungsvitamin (AX). Lagerungsfähigkeit von B und BD*) ist dagegen bei höheren Tieren sicher nicht vorhanden. Wie sich diese gegenüber C*) verhalten ist mehr ungewiß. Einige können anscheinend nicht C lagern, andere (beispielsweise Ratten und eine Anzahl Vögel) sind gegen C-Mangel so widerstandskräftig, daß die Möglichkeit längerer Lagerung in Verein mit minimalem Verbrauch nicht für ganz ausgeschlossen angesehen werden kann. Bei anderen Vögeln, beispielsweise junge Enten, ist es indessen kürzlich gelungen, durch C-freie Kost, Skorbut hervorzurufen (Knochenauftreibungen, abnorme Knochenbrüchigkeit, Knochenmarksveränderungen usw.). Was das Verhalten unserer Stubenvögel C gegenüber anbetrifft, dürften bisher keine einwandfreien Versuche hierüber veröffentlicht sein. Am vorsichtigsten ist wohl deshalb zuzusehen, daß die Kost nicht allzu C-arm wird; im Freien ist sie jedenfalls ziemlich C-reich. — Auch sei hier der praktisch bedeutsame Umstand betont, daß die A-Vitamine meistens parallel mit dem Karotin (ein roter Pflanzenfarbstoff, der beispielsweise den Möhren ihre Farbe gibt) vorzukommen pflegen, daß also bei reichlicherem Karotingehalt (starker Rotfärbung) gewöhnlich auch der A-Vitamingehalt reichlicher ist (Steenbocks Regel). Deshalb sind rote Möhren im Gegensatz zu den Behauptungen von Rausch in „Sängerfürsten" entschieden zu bevorzugen.

Zuletzt sei nochmals unterstrichen, daß man innerhalb der Tierpflege selten an einen bestimmten Punkt zeigen und sagen kann, daß da gerade der Fehle

*) Vgl. Adlersparre, a.a.O.

liegt. Sondern meistens sind es ganz große Komplexe von Ursachen, die miteinander zusammenwirken und über die man mühsam versuchen muß klar zu werden, um die einzelnen Faktoren zurechtlegen zu können. Dies ist es, welches rationelle, d. h. verstandsmäßig richtige (ratio=Verstand) Vogelhaltung zur ziemlich schwierigen und fördernden Sache macht. Hat man aber einmal die Vögel der Freiheit beraubt, so ist es nicht mehr als gerecht, wenn man als Wiedergutmachung sich selbst ein klein wenig Mühe und verständig eingerichtete Gedankenanstrengung gefallen läßt, um das Wohlbefinden der Tierchen in der Gefangenschaft zu sichern. Unglücklich ist, daß besonders diejenigen Leiden, die mit Spezialstoffhunger in Zusammenhang stehen, in unserer Praxis nur ausnahmsweise unter so typischen, leicht erkennbaren Erscheinungen wie bei Laboratorienexperimenten uns begegnen. Chemisch frei von Spezialstoffen dürften nämlich unsere in Liebhaberpraxis benutzten Futterkombinationen nie sein, oft aber von demjenigen Optimum von Spezialstoffgehalt, welches eine der Voraussetzungen für bestmögliche Stoffwechsel und Organleistung ist, mehr oder minder entfernt. Meistens zeigen deshalb die Spezialstoffkrankheiten einen ziemlich chronischen Verlauf, anfänglich schleichend und nicht selten atypisch, um dann — manchmal erst nach Jahren — mehr oder minder plötzlich recht grobe Erscheinungen zu zeigen wie Abmagerung, Wasseranschwellungen, verminderten Infektionswiderstand mit Geschwürbildung, Krampf, Lähmung (zuletzt oft Herzlähmung) usw.

Der rationellste Weg, welcher ein Vogelliebhaber betreten kann, ist deshalb, scheint es mir, der des Vorbeugens. Aber um Vorbeugen zu können — in allen anderen Fällen wie in den vorliegenden — muß er sich mit dem Leben und dessen allgemeinen Gesetzen wirklich vertraut zu machen versuchen, insbesondere mit der physiologischen Bedeutung des Milieu und deren Reize. Alles andere kann ein Vogelliebhaber im Notfall entbehren, nur nicht dies. Denn die Gefangenschaft ist, wie ich schon mehrmals in dieser Zeitschrift dargetan, biologisch gesehen, nichts anderes als eine Milieuveränderung; Krankheiten auch nichts anderes als die Reaktion eines Organismus auf gewisse Reize eines fehlerhaften Milieu und also die Kontrolle der Milieufaktoren (Futtersubstanzen, Licht, Luft, Temperatur, Bewegung, pflanzliche und tierische, mikro= und makroskopische Parasiten usw.) die Achse, um welcher sich die ganze Vogelhaltung drehen soll. Versäumt der Liebhaber etwas in diesem Punkte, setzt er sich stets der Gefahr aus, den Ast, auf welchen er selbst sitzt, abzusägen.

Wenn diese knappgefaßten, äußerst allgemein gehaltenen Zeilen über einen sehr umfangreichen Gegenstand irgend einem Vogelwirt zum Nutzen gereichen können, haben sie ihren Zweck erfüllt.

Stockholm, den 30. 12. 1924.

25jährige Pflege einheimischer Waldvögel.

Von Franz Kempf, Offenburg.

(Nachdruck verboten.)

Mit dieser Abhandlung will ich versuchen, hauptsächlich dem Anfangsliebhaber unserer schönen Sache, aus meinem 25jährigen Umgang mit meinen Lieblingen einige Winke in der Pflege desselben zu geben und einige Erlebnisse aus der Praxis zu erzählen. Zum voraus möchte ich bemerken, daß ich nur ein Freund von Wildfängen bin und für aufgepäppelte Sänger noch nie Sympathie hatte. Denn nur ein Wildfang, wenn man auch auf den Gesang bei manchen Arten oft lange warten muß und die Geduld des Liebhabers manchmal auf eine harte Probe gestellt wird, ist in der Regel ein guter Naturfänger, oder kann ein guter Sänger sein. Stümper gibt es ja auch bei Wildfängen. Aber ein aufgepäppelter Vogel wird

Länge der ersten Schwinge bei
Sprosser Nachtigall

im Naturgesang nie befriedigen. Es fehlt ihm eben der Lehrmeister, und der Anfangsliebhaber wird in der Regel keinen guten Vorsänger gleicher Art besitzen. Was die Eingewöhnung von Wildfängen anbelangt, so ist darüber schon viel geschrieben worden. Auch Herr Birk, Leipzig, hat in seiner letzten Arbeit in der Gefiederten Welt darüber geschrieben. Ich habe in den vielen Jahren meiner Liebhaberei die Wahrnehmung gemacht, daß unsere Körnerfresser (Finken) mit bedeutend größeren Schwierigkeiten und Verlusten einzugewöhnen sind als Weichfresser. Hat man bei Weichfressern frische Ameisenpuppen zur Hand, was im Frühjahr, wenn die meisten einzugewöhnen sind, ja der Fall ist, so ist die Eingewöhnung nicht schwer, Verständnis bei der Eingewöhnung vorausgesetzt. Aber unsere Finken, Edelfink, Hänfling, Stieglitz, Zeisig usw. werden in der Regel im Herbst und Winter gefangen. Das Naturfutter ist nie vollständig zu ersetzen und nach meiner Erfahrung gehen bei der Eingewöhnung unserer Finken viele an Verdauungsstörungen infolge des plötzlich veränderten Futters zugrunde. Wie mancher Liebhaber hat schon mit banger Sorge seinen Frischfang nach einigen Tagen, ja Wochen, auch wenn derselbe vom Vogelhändler kommt, betrachtet, wie derselbe mit gesträubtem Gefieder die Flügel hochstellt, das Köpfchen in das Gefieder gesteckt, dasitzt. Lieber Freund, in diesem Stadium tut Eile not. Entziehe dem Vogel sofort das Wasser. Nimm 2 Eßlöffel voll getrocknete Kamillen in ein Gefäß, mache $^1/_4$ Liter kochendes Wasser und gieße dasselbe kochend über die Kamillen. Lasse den Tee 10 Minuten ziehen und reiche dem Patienten im Geschirrle zu trinken, er nimmt es gerne. Aber immer alle 2 Stunden

handwarm reichen. So fahre einige Tage fort, meistens am anderen Tage merkt man schon, daß der Vogel lebhafter wird. In den meisten Fällen ist dein Liebling gerettet. Versuche es einmal, wenn Du einen solchen Patienten hast. Damit möchte ich aber nicht die Behauptung aufstellen, daß das Angeführte ein Universalmittel für alle Krankheiten unserer Vögel wie Herzschlag, Lungenentzündung usw. ist, denen ein Vogel unterworfen sein kann. Aber bei Verdauungsstörungen hat sich das Mittel, bei mir wenigstens, sehr gut bewährt.

Und an Verdauungsstörungen, hauptsächlich bei Eingewöhnung von Frischfängen, bedingt durch den Wechsel des Futters, gehen viele unserer Lieblinge zugrunde. Wie viele Vögel habe ich schon bei mir und anderen hiesigen Liebhabern gerettet. Diesen Spätherbst war bei mir ein Zeisig sowie ein schöner Stieglitz in sehr krankem Zustande, auch (Frischfänge). Meine Frau riet mir, mache das Vöglein tot, daß es nicht leiden muß. Aber ich machte die beschriebene Kur und heute zählen die 2 Todeskandidaten zu den schönsten Vögeln meines Bestandes. Selbstverständlich darf abwechselndes gutes Futter und Reinlichkeit nicht fehlen. Einem wirklichen Liebhaber ist keine Mühe zu viel, um ein Vogelleben zu erhalten im Käfig wie in der Freiheit. Nachher werde ich einige Beispiele hier anführen. Tut das ein Liebhaber nicht, dann möchte ich ihm zurufen: Hände weg von unseren schönsten Geschöpfen der Natur. Wir Liebhaber müssen es auch unseren Gegnern zeigen, daß wir es verstehen, einen Vogel im Käfig zu erhalten. Wie lange man einen Vogel im Käfig durch anständige, liebevolle Behandlung erhalten kann, will ich hier anzuführen nicht vergessen. Eine Amsel und Singdrossel hatte ich 14 und 15 Jahre, 2 Schwarzplättchen, eines 12, das andere 16 Jahre, sang aber bereits nicht mehr, Rothänfling, Zeisig und Stieglitz sind gut 8 bis 10 Jahre zu erhalten. Viele Anfangsliebhaber verfallen in den Fehler, gleich zu viele Vögel zu halten. Von jeder Art muß einer her, obgleich mancher nicht einmal Kenntnis der Pflege für eine Art besitzt. Was ist dann das Ende bei diesem Springinsfeld? Fiasko auf Fiasko, die Liebhaberei entleidet ihm und viele Vögel haben dem Auchliebhaber die Liebhaberei mit dem Tode bezahlt. Klein anfangen und erst sehen, ob man für unsere schöne Liebhaberei taugt und Ausdauer hat. Lieber anfangs einige Exemplare weniger. Ich besorge meine Lieblinge mir selbst, dann weiß ich, daß dieselben versorgt sind. Kein wirklicher Liebhaber geht im Sommer, Herbst und Winter in Flur und Wald ohne seinen Lieblingen etwas mitzubringen, sei es ein reifer oder auch halbreifer Kopf Distelsamen, etwas Erlen- oder Birkensamen usw. mehr. Immer gibt es etwas. Nun will ich noch erzählen, wie ich im Sommer 1923 zwei halbflügge Findlinge, einen Pirol und einen Segler (Turmschwalbe), groß zog und ihnen wieder die Freiheit schenkte.

Kam ich Mitte Juni in einen Metzgerladen, da hielt der Inhaber einen jungen noch nicht ganz flugfähigen Pirol in der Hand; am Flügel blutete er etwas, offenbar von einem Raubvogel herrührend, der vertrieben wurde. Der Inhaber hielt dem Vogel ein Stückchen Fleisch hin, aber vergebens. Ich fragte ihn, wo der Vogel herkommt. Vom Waldesrand haben ihn meine Leute mitgebracht. Ich bat ihn, mir den Vogel zu geben, was er gerne tat. Ich ging nach Hause, wusch dem Vogel die Wunde mit Alkohol aus und setzte ihn in ein Kistchen. Eine halbe Stunde darauf probierte ich, ob er Futter Ameisenpuppen, getrocknetes aufgeweichtes Weißbrot und Käsequark annimmt. Wirklich er sperrte. Aber, o Gott, der Kerl ließ sich lange füttern, 3 volle Monate, zum in den Wald setzen war es dieses Jahr nichts mehr. Im Käfig auf der Sitzstange ließ er sich noch füttern. Endlich fraß er allein. Mehlwürmer und Heuschrecken nahm er mit Vorliebe. Um Weihnachten kam er in die Mauser und wurde

Zwergtaucher.

ein hübsches Männchen. Auch fing er an seine Rufe zu üben, aber mit allerhand fürchterlichen Zwischenlauten. Da ich aber von vornherein keine Absicht hatte, den Vogel zu behalten, so setzte ich ihn im Mai 1924 vollständig flugfähig in den Wald. Der zweite Findling war eine halbflügge Turmschwalbe, die ich selbst fand. Auch diese setzte ich in ein Kistchen und sie sperrte ebenfalls nach einer halben Stunde. Sie nahm nur frische Ameisenpuppen, die ich mit Speichel anfeuchtete auf einem Stäbchen an. Immer hatte der kleine Kerl Hunger, ein Nimmersatt. Mehlwürmer nahm sie nicht an. Es wird Mitte Juli, die Alten rüsten sich bald zum Abzug. Jetzt, lieber Hans, bist du vollständig flügge, jetzt heißt es Flugversuche machen. Jeden Morgen nahm ich den kleinen Kerl mit auf die Wiesen, setzte ihn auf meinen Finger und warf ihn sachte in die Höhe. Es geht 4 und 10 Meter und ins Gras. So übten wir

wei, der Rekord ist schon auf 60 und 70 Meter gestiegen, so daß ich Mühe hatte, ihn zu finden. Es ist Ende Juli, schon rüsten die Alten zur Abreise, ich füttere ihn noch kräftig und gehe mit ihm auf die Wiesen. Gerade fliegt ein Schwarm alter Turmschwalben vorbei, ich werfe so gut ich kann, meinen Pflegling in die Höhe, mit lautem Schwirr erhebt er sich in die Lüfte, den anderen nach. Noch lange sah ich meinem Hans nach, ihm eine gute Reise wünschend.

Sollte der Inhalt dieser Zeilen dazu beitragen, die nahe verständnisvolle Liebhaberei der Stubenvogelpflege zu fördern und unsere Lieblinge fangesroh am Leben zu erhalten, so wäre mir das eine wohltuende Befriedigung.

Rotschwänze — Phoenicurus *(Forst.)*.

Eine Monographie von John Kuntzendorff.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der Formenkreis des Erithacus familiaris.

Zu diesem Formenkreis gehören die vier familiaris-Formen E. familiaris *(Steph.)*, E. f. galtoni *(Strickl.)*, E. f. hellmayri *(Rchw.)* und E. f. falkensteini *(Cab.)* sowie E. omoensis *(Neum.)* und E. sennaarensis *(Seeb.)*. Es ist eine merkwürdige Vogelgruppe, denn die ♂♂ haben ein den Rotschwanzweibchen ähnliches, unscheinbar gefärbtes Gefieder und die ♀♀ gleichen den ♂♂, erstere sind also sozusagen hennenfedrig. Das Verbreitungsgebiet dieses Formenkreises erstreckt sich über das südliche und mittlere Afrika. Die familiaris-Arten ähneln sich nicht nur äußerlich ungemein, sondern auch in ihrer Lebensweise und ersetzen einander in den von ihnen bewohnten Gebieten. Sie sind etwas kleiner bis ebenso groß wie Erithacus phoenicurus.

Der südafrikanische Rotschwanz — Erithacus familiaris *(Steph.)*.

Durch den Anblick unserer heimischen Rotschwänze an ein farbiges Bild des ♂ gewöhnt, wirkt der des familiaris ganz eigenartig auf uns, ist man doch gewissermaßen veranlaßt, in dem Vogel ein ♀ zu vermuten. Das ♂ hat äußerst viel Ähnlichkeit mit dem ♀ phoenicurus; unterscheidet sich aber in der Hauptsache durch die rostbräunliche Färbung des Bauches, dessen Mitte bei letzterem aber eine weißliche ist.

Oberkopf, Kopfseiten, Hinterhals, Halsseiten, Rücken und Bürzel braun, dunkler als beim ♀ phoenicurus; hinterer Bürzel, Oberschwanzdecken matt rostbräunlich, hinterer Bürzel schwach olivbräunlich schimmernd; Ohrgegend glänzender bräunlich; Zügel blaß hellgrau; Unterseite heller, blaß bräunlichbraun, Kinn, Kehle am hellsten; Bauch rostgelblich sandfarben; Unterschwanzdecken blaß rostbräunlich; Schwingen schwärzlichbraun, Handschwingen schmal sandfarben außen gerandet, Armschwingen ebenso gesäumt und gerandet; Unterflügel blaß rostbräunlich; Schwanzfedern matt rostbräunlich, mittelstes Paar schwärzlichbraun, an der Wurzel matt rostbräunlich gesäumt, die übrigen mit breitem schwärzlichbraunen Endsaum, bei gespreiztem Schwanze ein breites Endband bildend. Schnabel, Füße schwarz. Nach Reichenow Lg. 140—150, Fl. 80—87, Schw. 62 bis 67, Schn. 14—15, Lf. 23—25 mm.

Die Heimat des Erithacus familiaris ist Südafrika (Kapland, Natal, Sululand). In seiner Heimat ist er gemein und meistens Standvogel. Vielfach ist er bei Niederlassungen und Kralen anzutreffen und ist so zutraulich, daß er ohne Furcht durch offene Türen oder Fenster in das Innere der Häuser dringt. Er ist ein äußerst lebhafter Vogel, fliegt von Strauch zu Strauch, von Stein zu Stein, gewöhnlich Flügel und Schwanz beim Sichsetzen spreizend. Er nistet in Fels- und Mauerlöchern oder auch unter Steinen. Das Gelege besteht aus drei hellblauen, am stumpfen Ende zu einem Kranze rostbraun gefleckten Eiern.

Der Damararotschwanz — Erithacus familiaris galtoni *(Strickl.)*.

Dieser ist E. familiaris sehr ähnlich und nur durch hellere Färbung unterschiedlich, aber dunkler als das ♀ phoenicurus. Oberseite schwach gräulichbraun, Ohrgegend bräunlicher; Oberschwanzdecken heller als bei familiaris; unterseits heller und grauer als familiaris, blasser rostfarben; Unterschwanzdecken ins Weißliche gehend; Unterflügeldecken rostbräunlichweiß; Flügel heller braun, Handschwingen schmal und Armschwingen breit sandfarben gesäumt und ebenso gespitzt; Schwanz von der Farbe der Oberschwanzdecken, jedoch blasser als bei familiaris mit schwärzlichbrauner Endbinde, die aber wieder hell sandfarbig gesäumt ist. Schnabel braun, Füße schwarz. Die Eier sind hell blaugrün mit gelbbraunen Fleckchen, am stumpfen Ende und an den übrigen Teilen aber spärlich ebenso gefleckt.

Die Heimat des Erithacus familiaris galtoni ist Damaraland. Seine Lebensweise stimmt mit der des vorigen überein.

In der Färbung in keiner Weise von E. f. galtoni unterschieden, wohl aber in den Ausmaßen, ist

Lubberts Damararotschwanz — Erithacus familiaris lubberti *Rchw.*,

der gleichfalls in Damaraland beheimatet ist. Ein Exemplar des Museums wurde gemessen: Fl. 80, Schw. 62, Schn. 16, Lf. 22 mm.

Der Transvaalrotschwanz — Erithacus familiaris hellmayri *(Rchw.)*.

Der Transvaalrotschwanz vertritt die vorgenannten Arten im Transvaalgebiet. Er steht zwischen E. f. galtoni und E. f. falkensteini, ist aber kleiner und hat ein schmäleres schwärzlichbraunes Band am Schwanze. Die Oberseite ähnelt in der Färbung der des galtoni und ist heller als die des falkensteini und die Unterseite brauner und weniger grau. Das Verbreitungsgebiet ist Transvaal; an den Ufern des Limpopo ist er gemein. Seine Maße sind nach Reichenow: Fl. 80, Schw. 58, Schn. 15 Lf. 23 mm.

Der mittelafrikanische Rotschwanz — Erithacus familiaris falkensteini *(Cab.)*.

Erithacus familiaris falkensteini vertritt seine Verwandte in seinem Verbreitungsgebiet. Er ist der dunkelste der familiaris-Vertreter, dunkler und grauer

als familiaris und bräunlicher als galtoni. Oberseits braun, schwach ins Olive spielend; Kehle und Bauchmitte weißlich; Oberschwanzdecken dunkler als bei galtoni und heller als bei familiaris; Unterseite ist heller grau als bei galtoni; Schwanzfedern von der Farbe der Oberschwanzdecken, der dunkle Endsaum schmäler, an den äußeren Federn des öfteren fehlend, jedoch ohne die bei galtoni vorkommende hellere Einrahmung, etwa wie bei familiaris, nur heller; Flügelfedern braun, aber heller als bei familiaris und dunkler als bei galtoni, mit schmalen helleren Außensäumen; Schnabel braun, Füße schwarz. Das ♀ gleicht dem ♂. Das Jugendkleid ist oberseits rundlich blaßbraun gefleckt und diese Zeichnung wiederum dunkel umsäumt. Die Unterseite gleicht der des ♂ ad. Beim ♀ juv. ist die Zeichnung weniger deutlich. Reichenow gibt folgende Maße an: Lg. etwa 130—150, Fl. 77 bis 83, Schw. 57—63, Schn. 12—14, Lf. 21 bis 23 mm.

Das Verbreitungsgebiet des mittelafrikanischen Rotschwanzes ist Ostafrika vom Victoria Nianza bis zum Niassa-Gebiet, dem Kongogebiet und das Hinterland der Goldküste. „Der als Bessonornis gambagae von der Goldküste beschriebene Vogel hat etwas lebhafter isabellenfarbene Unterschwanzdecken und Weichen, ob dieser Umstand aber zur Sonderung einer besonderen Form berechtigt, bleibt festzustellen." Alle familiaris-Formen dürften sich in ihrer Lebensweise und in ihrem Wesen gleichen und darin unseren einheimischen Rotschwänzen ähneln. Nach Deutschland lebend eingeführt ist meines Wissens keine der angeführten Arten.

(Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Beförderung lebender Vögel durch Flugzeuge. Herr Heinrich Hahn jun., Neuß am Rhein, sendet folgende Auskunft, welche er auf Anfrage vom „Deutschen Aero Lloyd", Staaken, erhielt, zur Kenntnisnahme und Veröffentlichung zu: „Wir sind leider erst heute in der Lage, Ihnen auf Ihre Postkarte vom 6. ds. Mts. hin zu antworten. Der Transport lebender Vögel von Deutschland nach England und von London nach Berlin ist durch uns wiederholt durchgeführt worden. Wir sind deshalb auch bereit, den Transport Ihrer Tiere durchzuführen, und zwar von London nach Hannover. In Hannover würden die Pakete durch unsere dortige Flugleitung sofort zollamtlich abgefertigt und per Post oder als Expreßgut nach Neuß unter Nachnahme der entstehenden Kosten weitergesandt werden. Der Luftfrachttarif für lebende Tiere von London nach Hannover beträgt pro kg 4,— M., der Mindestsatz für eine Sendung ist 10,— M. Die Umschlagspesen in Hannover und die durch uns etwa auszulegenden Zollbeträge müßten natürlich separat bezahlt werden. Wir bitten Sie, Ihren Interessenten in England zu beauftragen, die Sendungen bei der mit uns in Betriebsgemeinschaft stehenden englischen Luftverkehrsgesellschaft, der Imperial Airways Ltd., Air Port of London, Croydon abzuliefern. Auf dem Frachtbrief müßte der Vermerk „via Hannover" angebracht sein."

Hochachtungsvoll
Deutscher Aero Lloyd A.-G.
Grulich."

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

W. Hiltmann, Berlin S 14, Dresdener Str. 24: Amerik. Spottdrossel, mex. Blauspötter, Krummschnabelspötter, Trupiale, Orangeblaufinken, Katharinasittiche.

Molz, Düsseldorf, Postfach: Kal. Schopfwachteln, Erloris.

Paul Oehme, Freiberg, Sa.: 1,0 amerik. Spottdrossel Schlöß. Allersberg b. Nürnberg: Ia Goldfasan, 1924er Paul Tzornack, Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 15: Massenawachteln, Katharinasittiche, Kubasittiche.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.



1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnitz, Merveldstr. 39; Kaufsvermittlung: Franz Nyncke, Berlin O, Königsberger Str. 17. Verbandsorgan: die „Gef. Welt".

In den Reichsverband hat Aufnahme gefunden: Herr Rudolf Ultes in Kaiserslautern. J. A.: Petters.



Herrn M. B., Breslau. Von den Tauchern eignet sich zur Bevölkerung eines kleinen Gartenteiches am besten der Zwergtaucher (s. Abb. S. 198). Näheres s. „Einh. Stubenvögel". Die kürzlich in den Handel gebrachten Fledermauspapageien waren die bekannten Blaukrönchen (s. Abb. S. 196).

Herrn E. M., Chemnitz; Frau N., Potsdam; Herrn Prof. A. H., Salzwedel; Herrn K., Lüdenscheid; Herrn J. G., Neuulm: ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn F. F., Saarbrücken; Herrn A. M., Suonenjoki; Herrn W. S., Speyer; Herrn v. d. H., Köln; Herrn Prof. F. B., Danzig-Langfuhr: Beiträge dankend erhalten.

Herrn M. St., Forst i. L. Besorgt jede Buchhandlung.

Herrn K. L., Amberg. Wenn die Beobachtung richtig ist, daß die Augenerkrankung der Prachtfinken durch Bisse des Mossambikzeisigs hervorgerufen ist, so müßte der Übeltäter sofort aus dem Gesellschaftskäfig entfernt werden. Wenn dann die Schwellungen der Augen aufhören, würde es erwiesen sein, daß sie durch Verletzungen hervorgerufen wurden. Kühlungen mit stark verdünnter essigsaurer Tonerde würden die Heilung fördern. Jedenfalls ist es ratsam, die Vögel, deren Augen geschwollen sind, aus dem Käfig herauszunehmen, denn es könnten auch andere Ursachen bei dem Übel wirksam sein, z. B. Zugluft, oder es könnte sich um diphtherisch-krupöse Erscheinungen handeln. In letzterem Fall wäre Heilung ausgeschlossen.

Herrn A. F., Straußberg. Genannten Vogel jetzt zu beziehen, ist kaum möglich. Sie werden meist aus Tirol oder anderen Teilen Deutschösterreichs eingeführt. Das ist aber während der Schonzeit verboten. Das Steinrötel erhält ein Gemisch von je einem Teil trockener Ameisenpuppen, Weißwurm oder Fleisch, Weißkäse, gemahlenem Hanfs, zuweilen Eierbrot, gemahlene Beeren mit soviel geriebener Möhre vermengt, wie zur Durchfeuchtung und Feuchterhaltung des Gemisches nötig ist. Frische Ameisenpuppen, allerlei Insekten werden gleichfalls gereicht, auch zerschnittene Äpfel und anderes Obst. Steinrötel werden leicht zu fett, daher Vorsicht beim Füttern.

Frau M. G., Krakau. Der Vogel ist eine Sumpfmeise. Das Geschlecht ist am Gefieder nicht zu erkennen. Die Züchtung dieser Meise ist bisher noch nicht gelungen.

Berichtigung.

Auf S. 156 rechte Spalte, zweiter Absatz, Z. 9 v. o. muß es heißen: Argya malcolmi (Sykes) und in der folgenden Zeile Argya.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

rgang 54 23. April 1925 Heft 17

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

25 Jahre Schriftleitung. Von John Kuntzendorf.
Gelbspötter. Von Paul Schwarz, Leipzig.
Nochmals: Vogelschutz. Von Adolf Voigt, Jena.
Die geglückte Brut meiner Amaranten. Von Enno Schlosser.
Der Bluthänfling. Von Karl Finck, Neukölln.
Zur Fütterungstechnik der Vogelhaltung. Von A. Adlersparre. (Schluß.)
25jährige Pflege einheimischer Waldvögel. Von Franz Kempf, Offenburg.
Rotschwänze — Phoenicurus (*Forst.*). Eine Monographie von John Kuntzendorff. (Forts.)
Kleine Mitteilungen - Vom Vogelmarkt - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig - Redaktionsbriefkasten - Berichtigung - Ausstellungen - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen - Bekanntmachung.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellungen.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. In Ergänzung der an gleicher Stelle veröffentlichten, unsere in der Zeit vom 19. bis 26. April 1925 stattfindende Ausstellung betreffenden Ankündigungen möchten wir heute zur Kenntnis bringen, daß der 1. Vorsitzende des Vereins, der 1. Vorsitzende des Reichsverbandes Herr Johannes Birk einen Radiovortrag Freitag, den 24. April in der Zeit von 7 bis 7³⁰ Uhr über das Thema: „Vogelschutz und Vogelliebhaberei" halten wird. Herr Birk wird den Leipziger Sender für Mitteldeutschland besprechen. Wir benutzen die Gelegenheit, alle Liebhaber und Freunde unserer Sache nochmals herzlich zum Besuche unserer Ausstellung einzuladen. Der Presseausschuß.
J. A.: Vorwerk.

Der **Zier- und Singvogelverein zu Bernsbach im Erzgebirge** hält am 2. und 3. Mai 1925 im Saale des Gasthofes „Zum grünen Baum" in Bernsbach seine vierte allgemeine Ausstellung ab. Auszustellende Vögel sind bis zum 25. April 1925 bei Herrn Walter Müller in Bernsbach Nr. 74 anzumelden. Um gütigen Zuspruch der Liebhaber wird gebeten. Das Ausstellungs-Komitee.

Der **Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Zwickau** beabsichtigt in der Zeit vom 17.—21. Mai d. J. eine Vogelausstellung zu veranstalten.

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Sitz Leipzig. 1. Vors.: Hermann Höhne, Leipzig-Volkmarsdorf, Eisenbahnstr. 84, IV. 1. Schriftf.: Max Hunger, Leipzig-Gohlis, Polizeigebäude, Zimmer 196. Kassierer: Ludwig Böttcher, Leipzig, Inselstr. 17 II. — Am 26. April findet der zweite Wahlgang zur Wahl des deutschen Reichspräsidenten statt. Damit allen auswärtigen Mitgliedern, soweit sie an diesem Tage in Leipzig zur Jahresversammlung des L. V. bzw. zur Vogelschau des Vereins für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei weilen, die Ausübung ihres Wahlrechts ermöglicht wird, bitten wir alle in Frage kommenden Herren, sich an ihrem Orte einen Wahlschein ausstellen zu lassen. Mit diesem können sie dann in Leipzig in jedem beliebigen Wahllokal ihrer Pflicht genügen. Irgendwelche besondere Formalitäten sind nicht erforderlich. Ferner haben sich die Vogelliebhaber-Vereinigungen zu Schneeberg, Schönheide und Kamenz dem Landesverband angeschlossen. Genannte Vereine haben damit bewiesen, daß sie das Hauptziel des L. V., Organisierung aller Liebhaber unseres engeren Vaterlandes, voll erfaßt haben. „Nur geeint sind wir mächtig genug, unseren zahlreichen Widersachern erfolgreich die Stirn zu bieten." Allen noch Fernstehenden sei dies zur Nachahmung empfohlen. Im nachstehenden bringen wir unsern verehrten Mitgliedern zwecks Stellungnahme die eingegangenen Anträge zur Kenntnis. 1. Antrag des Vereins für Vogelschutz und -pflege zu Dresden: Die „Gef. Welt" soll Verbandsorgan bleiben und demzufolge dies auch im Namenskopf tragen. 2. Antrag der Vereinigung der Singvögel und Aquarienfreunde zu Eibenstock: Der Verband möchte bei vorkommenden Ausstellungen angeschlossener Vereine einen oder mehrere Ehrenpreise stiften, und zwar in Form einer Medaille oder sonstigen Gegenstands. 3. Antrag der Bezirkskonferenz für Aue und Umgebung: Bei Konflikten mit Behörden — Polizeiorganen — ist ein Rechtsbeistand zur Verfügung zu stellen.
Der Vorstand. J. A.: Hunger, Schriftf.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Verband der Finkenvereine Ruhrgau-Bochum. Der Verband veranstaltet am 24. Mai 1925 in Bochum i. Westf. ein großes „Werbewettsingen". Das Singen findet statt in den Anlagen des Ausflugsortes Waldesruh, Inhaberin Ww. Weitkämper, Waldstr., direkt am Südpark gelegen; von jedem Bochumer Bahnhof leicht erreichbar. Ferner mache ich darauf aufmerksam, daß an jedem Bahnhof Liebhaber vom Bochumer Verband anwesend sind. Um Auskunft wende man sich bitte an diese, welche durch eine Armbinde erkenntlich sind. Aus sportlichem Interesse bitte ich um rege Beteiligung, damit dieses Singen ein Symbol für alle Außenstehenden wird. Die Preise stehen 14 Tage vor dem Singen im Schaufenster der Bochumer Fahnenfabrik Scheer, Metzstr., ausgestellt. Wettstreitbestimmungen: Anfang ½8 Uhr morgens. Einsatz von ½7 Uhr ab. Ende wahrscheinlich 11 Uhr. Die Vögel müssen nach der Prämiierung in den Schönheitsklassen noch eine Stunde zur allgemeinen Anhörung stehen bleiben. Es werden ausgestellt: 1. Klasse: Dreißiger, Düsterweiat, Vierziger; diese Vögel müssen rein, also ohne jeden Nebengesang sein. 2. Klasse: Dreißiger, Düsterweiat, Vierziger; mit nur einem Beigesang, wie Inspektör, Widör, Flachvierziger, Vierundvierziger, Düsterweiat, Wardier, zweites Jahr und Flugjahr. 3. Klasse: Jeder Vogel muß mehrere Beigesänge haben. Kampf oder Scharfsingen: Der Vogel muß Einsatz, Übergang und Schluß klar aussingen. Es werden drei Rundgänge zu je drei Richtern gemacht. Die nichtsingenden Vögel werden nach jeder Runde entfernt. Jeder Liebhaber ist für richtige Einsetzung seines Vogels in die richtige Klasse selbst haftbar. Vögel, welche bei der Prämiierung in einer falschen Klasse stehen, können nicht prämiiert werden. Jede Klasse ist einzeln abgeteilt und durch Plakate gekennzeichnet. Der Einsatz beträgt 1,50 Mk. Der Ausstellungskorb darf nicht länger als 24 cm und nicht kürzer als 18 cm sein. Jeder Korb muß möglichst mit einem weißen Tuch versehen sein. Ferner mit einer Schlinge (Bindfaden) zum Aufhängen. Mit Sportsgruß der Vorstand. J. A.: Becker.

Anmerkung: Bitte höflichst sämtliche Vorsitzenden der einzelnen Vereine um sofortige Anmeldung der eventuell einzusetzenden Vögel, spätestens bis 15. Mai, an folgende Adresse: Friedrich Becker, Bochum i. Westf., Bahnhofstr. 10.

Aus den Vereinen.

Unter Bezugnahme auf das Eingesandt des Herrn Amtmann Krumm, Lüdenscheid, in Heft 16 teile ich mit, daß kurz nach erfolgter Aufnahme der Herrn Matthias Lefebre in Merzig aus dem Mitgliederkreise Einspruch erhoben wurde, der Veranlassung zu näherer Erkundigung nach dem Benannten gab. Die Auskunft lautete so ungünstig, daß sich der Vorstand gezwungen sah, die Aufnahme rückgängig zu machen. Die daraufhin von dem Herrn erfolgten Zuschriften bewiesen die Richtigkeit unserer Folgerung. Nachdem nun von Herrn Amtmann Krumm der klare Beweis einer unlauteren Handlung angetreten ist, stehe ich nicht an, die Öffentlichkeit von der Angelegenheit in Kenntnis zu setzen. Um unsere Liebhaberei von einem Krebsschaden zu heilen, sei das Vorgehen des Herrn K zur Nachahmung empfohlen. Fachzeitschriften haben von jeher belegte Betrugsfälle zur Warnung von Berufskollegen veröffentlicht.
A. Krabbe, Anklam, Geschäftsführer der A. Z.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehrende Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unseres verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste gern willkommen.
J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurter Str. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. V.: Emil Ivo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Vereinsl.: Karl Röhr, Heiligerweg 28. Versammlung jeden 2. u. 4. Sonntag im Monat, nachmittags 5 Uhr. Liebhaber herzlich willkommen. J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Rietschelhof", Rietschelstr. 19. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinslokal „Parkhotel", Epinaystr. 1, Versammlung. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an. Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Vereinigung für Vogelschutz und Vogelliebhaberei zu Frankfurt a. M. Einladung zur Hauptversammlung am Donnerstag, den 23. April 1925, 8 Uhr abends, im Steinernen Haus, Braubachstr. 35, Saal 1 und 2. Auf der Tagesordnung stehen u. a. Lichtbildervortrag von Prof. Fehringer, Heidelberg, über „Die Vogelwelt Mazedoniens", Satzungsänderungen und Gratisverlosung. Gäste herzlich willkommen. Neuanmeldungen an den 2. Vorsitzenden: Herrn Dr. Kühner, Frankfurt a. M., Platz der Republik 12.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Vogelliebhaber Hamburgs, schließt Euch dem Hamburger Verein für Vogelschutz und -liebhaberei an! Nehmt teil an den billigen Futterbestellungen und an allen anderen Vorteilen, welche Euch dadurch entstehen, daß Ihr in unserem Verein mit anderen wirklichen Vogelliebhabern Hamburgs bekannt werdet. Stärkt durch Euren Beitritt nicht nur unseren Verein, sondern dadurch auch den Reichsverband der deutschen Vogelliebhaber, Sitz Leipzig, e. V., so daß unsere gemeinsamen Interessen durch den Reichsverband genügend gewahrt werden können. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Der Verein bezweckt den Zusammenschluß aller wirklichen Liebhaber einheimischer und fremder Sing- und Ziervögel und bietet auf seinen Sitzungen viel des Vorteilhaften und Interessanten auf dem Gebiete der Stubenvogelliebhaberei. Gäste herzlich willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 5. Mai. Nähere Auskunft durch den Vorsitzenden Arnold Weber, Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Die Vereinigung hannov. Vogelliebhaber will dem Vogelpfleger Ratgeber und Helfer sein, will die Liebe zum Tier und zur Natur wecken und stärken, will beitragen zum Kennenlernen der Vögel in Wald und Flur. Monatlich einmal kommen die Mitglieder zusammen, tauschen die Erfahrungen aus, hören Vorträge aus allen Gebieten der Vogelkunde, -schutz und -pflege an. Ein- oder zweimal im Jahre veranstalten wir große Lichtbilder- und Film-Abende. Im Frühjahr finden Beobachtungsausflüge unter Führung statt. Den Mitgliedern stehen zahlreiche Fachzeitschriften und Bücher kostenlos zur Verfügung. Regelmäßig berichtet die Zeitschrift nieders. Vereine über unsere Veranstaltungen. An den Vereinsabenden ist Rat und Auskunft, Kauf- und Tauschgelegenheit geboten. Jahresbeitrag Mk. 2,—, für Auswärtige und Schüler Mk. 1,—. Anmeldungen an Heinz Appel, Nienburgerstr. 7A I. Auskunft: Buchhändler A. Troschütz, i. Fa. Cruses Buchhandlung, Gr. Aegidienstr. 4.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im Holländer Hof. Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Begr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, in den Wintermonaten von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Freunde und Gönner herzlichst willkommen. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Die Vereinsabende finden regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr in der Wohnung des 1. Vorsitzenden, Herrn Jahn, Feodorastraße 7, statt. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. A. Voigt.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz und Umgegend. Vereinslokal „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" und „Kanaria". Vogelliebhaber und Gäste sind stets willkommen. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstr. 1, Fernsprecher: Rheinland 1223 und Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. Sonntag, 1/2 9 Uhr, im Hotel Thüringer Hof, Klingelpütz 43. Gäste sind stets herzlich willkommen. — Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 7. Mai 1925. Gäste willkommen. M. Roth, Schriftf., L.-Plagwitz.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung bei unserem Mitgliede Herrn Normast im Gasthof „Kaiser Friedrich", Breslauer Str. 50. Liebhaber sind als Gäste willkommen. J. A.: Friedrich.

„A. Z." Magdeburg. Am 22. März 1925 fand die erste Zusammenkunft der Magdeburger Liebhaber exotischer Vögel statt. Von sämtlichen Anwesenden wurde folgende Auffassung vertreten: 1. Ablehnung jeglicher Vereinsbestrebungen; 2. regelmäßige zwanglose Zusammenkünfte; 3. Anregungen, Austausch von Gedanken und Erfahrungen; 4. jeden zweiten Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Tage im „Goldenen Falken" Versammlung. Nächste Versammlung Freitag, den 1. Mai 1925. Freunde und Gönner stets willkommen. Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebendort. Rudolf Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabende aller vier Wochen, in der ersten Woche des Monats verbunden mit Vortrag, in der dritten Woche jedes Monats nur gesellige Zusammenkunft. Vereinslokal „Sächsischer Hof". Gäste stets willkommen. Studienrat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jedes Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

(Fortsetzung auf der 4. Umschlagseite.)

Bekanntmachung.

Der Unterzeichnete beabsichtigt in nächster Zeit einen **Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei Coblenz und Umgebung** zu gründen. Der Zweck dieses Vereins ist in hinreichendem Maße in dem Namen des Vereins klargestellt. Augenblicklicher Hauptzweck jedoch soll es sein, durch die Kraft des Zusammenschlusses Einfluß auf den Ausbau des Naturschutzparkes Coblenz, Oberwerth, der durch die Stadt errichtet wird, zu gewinnen. Denn wenn dieser Naturschutzpark so verkultiviert wird wie unsere Rheinanlagen, dann können wir bald unsere Nachtigallen und andere Sängerfürsten suchen gehen. Durch die Gründung dieses Vereins würde am Mittelrhein ein starker Stützpunkt für unsere Interessen entstehen. Interessenten bitte ich darum, mir ihre Adresse und diesbezüglichen Wünsche mitzuteilen. Ich werde jedem persönlich antworten, durch Brief oder auch durch Besuch, wenn angenehm. In Bälde hoffe ich dann die Gründung des Vereins ins Werk zu setzen. **Heinrich Groebel**, Coblenz a. Rh., Löhrstr. 14.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zw

Käfige u. Gerätschaften

Günstige Gelegenheit!

4 Sprosser-Käfige

(Schindler) 52×30×24, wie neu, verkaufe Stück für 15 Mark.

Evtl. Tausch mit Ia Schamadrossel

E. Pankatz, Stettin,

Pestalozzistr. 13. [565

Vogel-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50. **Schlagnetze** f. Kl. schädl. Vögel M. 2,30, f. gr. M. 2,50 u. 2,80. **Katalog gratis.** **J. Tannen, Gronau 58,** Westf. [566

Futtermittel

Mehlwürmer

à Pfund 5 ℳ, bei 6 Pfund Porto und Verpackung frei.

Ia Ameiseneier . . . à Pfd. 8 ℳ
Ia Weißwurm . . . à „ 6 ℳ
Ia Muska-Zecken . . à „ 3 ℳ
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen . . . . à Pfd. 1 ℳ
Ia Garnelen, gem. à Pfd. 0.40 ℳ

Ia Universalfutter.

Alecwa I für Nachtigallen 2.— ℳ
„ **II für Grasmücken** 1.80 ℳ
„ **III für Drosseln** . 1.50 ℳ

Proben und Analysen zur Verfügung. Vertreter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [567

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser

A. Eckrich II., Waldsee (Pfalz).

Mehlwürmer

pro 1/4 Pfund ℳ 2.— liefert franko [568 **Reichardt, Berlin N,** Böttgerstr. 23.

Ornis-Haus

Halle-Saale

Gegründet 1912

Spezialität:

Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)

Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall., Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspött., Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [569

Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1

Preisliste auf Wunsch!

Züchterwaren

Verbesserte L. K.	1/2-Kilo-Paket	R.-M. 1,40
Rübsen, selten schöne Züchterware	1/2-Kilo	„ 0,50
Glanz, Marokko großkörnig	„	„ 0,50
Hanf, deutscher	„	„ 0,35
Hafer, geschält	„	„ 0,35
Lein- und Negersaat	„	„ 0,45
Ital. Silberhirse	„	„ 0,45
Blau-Mohn, Speiseware	„	„ 0,60
Marokko-Hirse	„	„ 0,80
Prima Mischfutter für Kanarien, eigenes Verfahren	„	„ 0,50
Waldvogelfutter	„	„ 0,45
Sonnenrosenkerne, gestr.,	„	„ 0,35
Salatsamen, weiß,	„	„ 1,50
Sepiaschalen, große Stücke	„	„ 1,50
Einäpfchen aus Glas	Stück	„ 0,10
Futternäpfchen aus Glas	„	„ 0,15

Piep und Piep extra zu Originalpreisen.
Vereine und Großbezieher verlangen Sonderofferte. [570

Lorenz, Dresden, Drehgasse 5.

Versäumen Sie nicht das Abonnement der „Gefiederten Welt" zu erneuern!

Universalfutter I

für Rotkehlchen, Nachtigallen, Grasmücken, Sprosser

Kilo 2 ℳ. [571

Universalfutter II

für Drossel, Amsel, Stare

Kilo 1.50 ℳ.

Vom Besten das Beste empfiehlt **Gebel, Köln,** Jakobstraße 8.

Mehlwürmer

veget. gez., 1/4 Liter franko gegen Vor- [572] einsendung von Mark 2.—. **Bonitas-Versand, Rostock i. M. 3.**

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co., Biesenthal I** (Mark). [573

Vogelfutter [574

für **Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser.** Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,

Tröndlinring 1. Telephon 14 958.

Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

[575] **Mehlwürmer,** reine Ware, gegen Einl. von 1.75 ℳ 1/4 Pfd. franko. **Th. Witte, Niederndodeleben b. Magd.**

Vögel

Verkaufe:

1 hübschen sauberen weißen **Kakadu,** 80 M., **1 großen Arara,** 180 M., **1 Amazonenpapagei** für nur 60 M., **1 kleines Zwergäffchen,** 65 M.

A. Alberts, Hamburg 19, Fruchtallee 1. [576

Astriden	Paar	3.50
Amaranten	„	3.50
Silberschnäbel	„	3.50
Schönbürzel	„	5.—
Elsterchen	„	5.—
Goldsperlinge, rotrückig	„	5.—
Schmetterlingsfinken	„	3.50
Atlasfinken, unausgef.	„	3.—
Bandfinken	„	4.—
Grauedelsänger, ohne Geschlechtsgarant.	„	5.—
Mosambikzeisige	„	6.—
Weißwangenlerchen	„	6.—
Weber, grau	„	3.—
Dominikanerwitwen	„	6.—

Andere Vögel laut Preisliste.

E. Schöndube, Berlin N

Elisabethkirchstr. 1. [577

Vertausche Sprosser, Nachtigall, Schwarzplättchen, laut. Wipfelrotkehlchen geg. Schama, Steinrötel, Orpheus oder Blaudrossel. [578

H. Riedel, Gittersee,

Dresdener Str. 19.

Kaufe

ein bis zwei Männch

Wachtelastrilde

Offerten gefl. an

Dr. H. Steiner, Zürich

579] **Bolleystr. 40.**

Suche

0,4 **taraut. Zwergpapageien,**
0,4 **kleine Kubafinken,**
0,1 **Orangeblaufink,**
0,1 **Pennantsittich,**
0,2 **Adelaidesittiche,**
1,0 **Gould,**
0,1 **Buntastrild,**
0,1 **zuchterprobt. bl. Wellensitt**
0,2 **Singsittiche,**
1,1 **Spitzschwänze,** zuchterprobt, sowie **Lori in Paaren.**

Pracht, Düsseldorf-Ger

Lakronstr. 27.

Gebe ab:

1 ungebund. Exemplar Floericke, V buch mit Einbanddecke, ungebraucht 9 Mark. **Suche:** 1 grünes We sittichmännchen zur Zucht in bester fassung und 2 bestgeeignete Wellens nisthöhlen. Angebote an:

A. Westermayer, Spremberg Drebkauer Straße 12, I.

Gebe ab gegen Tausch

singende ff. Blaudrosseln, Stein Sing- und Ringdrosseln.

Oskar Sprewitz, Torgau, Schloßstraße 12.

Vertausche

8,11 weiße Mäuse, handz saubere Zuchtpaare, **gegen Vögel.** **H. Forster, Mainz,** Leibnizstr

Vertausche

edle Zwergrehpinscher-Hün

„Perle von der Rotenbu

mit Ia Stammbaum, dreivierte alt, allerliebstes Tierchen, gegen

sprechenden Papa

gebe evtl. noch Isola-Flaschen, -Te -Kaffeekannen zu.

W. Rath, Rudolsta

in Fa. Isola. A. Z.-Mitgl

Beschwerden we

Nichtzustellung der „ fiederten Welt" sind b zuständigen Postamt zubringen.

Inserate

für das am 30. April 192 Ausgabe gelangende Heft 1 Ges. Welt erbitten bis 25. 2

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 14
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 30. April 1925 | Heft 18

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Gelbspötter.

Von Paul Schwarz, Leipzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Die Käfigfrage ist nicht allein eine Geld-, sondern auch eine Platzfrage. Die Geldfrage spielt die weniger wichtige Rolle, ein echter rechter Liebhaber wird nicht danach fragen, ob er sich den geeigneten Käfig kaufen oder selbst herstellen muß. Hat er die Mittel nicht zur Verfügung, so baut er sich mit Lust und Liebe, und nicht minder mit Eifer, den Käfig selbst in einfacher Form, doch praktisch und genügend groß. Die Platzfrage erfordert die sorgsamste Lösung. Es kommt nicht darauf an, ob der Käfig hoch oder niedrig gehangen wird, sondern nur darauf, daß ein genügend großer Käfig untergebracht werden kann. Ist die Frage zu verneinen, dann kommt die Spötterkäfigung überhaupt nicht in Frage, denn es geht nicht an, dem Vogel einen Käfig in Größe einer Zigarrenkiste anzuweisen, weil eben ein größerer Kasten nicht untergebracht werden kann. Der erste Mißerfolg wäre zu verbuchen. In Berücksichtigung des Freilebens und der Art kommt ein Käfig von mindestens 50 cm Länge in Frage und dazu ein heller zugfreier Standort. Küchen sind niemals die geeigneten Unterkunftsräume. Die Temperaturschwankungen sind hier so außerordentlich groß, daß der ständige Aufenthalt sogar für den Menschen schädlich ist, um wieviel mehr dann für ein so zartes Kind der Natur. Der einzige geeignete Ort sind Stuben, ob bewohnt oder unbewohnt, ist egal, mit der Hauptsache, gleichmäßige Temperatur und trockene Luft. Berücksichtigt man diese zwei Punkte, praktischer genügend großer Käfig und gleichmäßig temperierter Aufenthaltsraum, so sind die ersten beiden Bedingungen, die der Vogel stellt, erfüllt. Der Käfig soll genügende Ausmaße haben. Ich verwerfe die Rauschschen Zweisprungkäfige, weil sie entschieden zu klein sind. Meinen Grundsätzen kommen die vom Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber festgesetzten Mindestnormalmaße weit näher. Sie reichen hin, dem Spötter einen einwandfreien Aufenthaltsraum zu bieten, wenn ich auch darüber hinausgegangen bin und für meine Vögel Käfige im Ausmaße von 60 cm biete. Ich stehe eben auf dem Standpunkte, daß der von Natur aus äußerst lebhafte Vogel sein Wesen in der Gefangenschaft nicht einbüßen soll, daß bei Außerachtlassung dieses Umstandes der Vogel an Natürlichkeit verliert und dann allem anderen ähnlich sieht als seiner Art. Ferner soll der Hinweis nicht unterlassen werden, Badegelegenheit zu bieten. Der Spötter badet gern und zur Zeit der Mauser viel. Ein günstiger Einfluß des Badens auf den Federwechsel, wie sonst auch auf sein Benehmen, ist nicht von der Hand zu weisen. Die Sprungstangen sind mit Sorgfalt zu wählen. Zu starke Stangen ermöglichen das unangenehme Austreten des Vogelfußes, der dann aussieht, als sei er auch zum Schwimmen bestimmt. Das sind sogenannte Elefantenfüße, die den Wert des Vogels stark beeinflussen. Die Wertfeststellung des Vogels regelt sich keinesfalls nur nach dem Gesang und der Gefiederbeschaffenheit, sondern eine wesentliche Rolle spielen auch die Füße. Das ganze Benehmen des Vogels und seine Beweglichkeit leidet unter solchen Mißstaltungen, und nicht zuletzt wird auch nicht ohne Grund behauptet, daß die Gesundheit in Mitleidenschaft gezogen wird. Aus diesen Gründen empfiehlt es sich, Sprungstangen nicht über Normalbleistiftstärke zu wählen, und der aufmerksame, auf das Wohl seines Pfleglings bedachte Liebhaber wird feststellen müssen, daß diese Stangenstärke die einzig zusagende ist. Was für Holz geboten wird, ist schließlich nicht so wichtig wie die Stärke, aber immerhin wird die Erfahrung dem Holunder den Vorzug geben.

Die Käfigdecke muß unbedingt mit Stoff bespannt sein, ob hierzu nun Wachstuch oder Nessel oder was sonst für ein helles Stoffgespinst Verwendung findet, ist wenig beachtlich. Fest im Gefüge, weiß, weil der Käfiginnenanstrich so gehalten ist, und nicht rauh muß es sein. Der Vogel ist zur Zugzeit immerhin ein Stürmer, mit der Gewohnheit, in diesem Zustande nach der Decke zu gehen. Rauhe Stoffe würden dieserhalb von ungünstiger Wirkung auf die Kopffedern sein, und nach der Zugzeit wäre es nicht ausgeschlossen, daß der Vogel wohl schmuck im Gefieder, aber kahlköpfig anzusehen ist. Der Käfigboden wird mit Papier ausgelegt, dessen Wechsel alle Tage stattfindet. Wenn die Innenfütterung auch vielfach von Liebhabern als nicht einwandfrei beurteilt wird, so leistet sie beim Spötter und Sumpfrohrsänger ganz Hervorragendes. Ganz abgesehen

davon, daß durch sie eine Beschmutzung der Stube vermieden wird, bietet sie die einzige Möglichkeit ergiebigster Futterausnützung. Ich will kein Streithahn sein und alle vorgebrachten Nachteile der Innenfütterung bekämpfen, aber im vorliegenden Falle gibt es nicht einen einzigen, der nicht zu widerlegen wäre. In Rücksicht darauf, daß nur die allerbesten Futtermittel imstande sind, den Vogel am Leben zu erhalten, kann nicht als nebensächlich angesehen werden, unter welchen Umständen der Vogel sein Futter zusammensuchen muß. Es muß dem Vogel ein leichtes sein, das ihm zusagende aus dem Gereichten zu wählen. Steht der Futternapf im Innern, dann kann er sich von allen Seiten Zugang verschaffen, ist er ein eingeschobenes Gefäß, dann ist nur eine Seite zugänglich. Sind die auf dieser Seite erreichbaren Bissen verzehrt, dann geht's ans Suchen und Wühlen, und manches wird mit zu Boden geworfen, an das der Spötter nicht mehr geht. Es ist verloren. Ich weiß, daß mancher Liebhaber darüber Reue empfindet, aber ans Ändern seiner Futterzuführung denkt er nicht und hat auch noch nicht gedacht. Steif und fest verficht er seine Methode, oft sogar ohne die andere erprobt zu haben. „Was soll ich ändern, meine Vögel sind doch einwandfrei, ein Zeichen, daß die Futterzufuhr nicht zu tadeln ist", hier und da die Antwort. Damit wird aber nicht der Nagel auf den Kopf getroffen. Der Kernpunkt ist nicht allein in der sachgemäßen, sondern, bei mir wenigstens, auch in der billigen Fütterung zu suchen. Wenn ich meine Fütterung nach Rausch einrichten wollte, der sagt, Gelbspötter sollen zwei Teile geriebene Möhre und je einen Teil Ameisenpuppen, geriebenen Käsequark und zerkleinertes rohes Rindsherz oder mageres Rindfleisch erhalten, dann könnte es nur zweierlei geben, einmal, ich müßte meinen Vogelbestand auf ein geringes Maß einschränken, oder, wenn ich mich nicht dazu entschließen könnte, ein reicher Mann sein. Letzteres deshalb, weil die Futternährmittel eine kaum erschwingliche Preishöhe haben. Wie es sich nun so vielfach erwiesen hat, kann auch in diesem Punkte wirtschaftlicher verfahren werden. Bei gleichen Teilen Ameisenpuppen, Weißwurm, Garnelenschrot, Weißbrot, gequetschten Hanf, befeuchtet mit zwei Teilen Möhre und einer Wurmzugabe, ist, wie ich den Beweis zu liefern vermag, der Spötter lange Jahre am Leben zu erhalten. Und nicht nur das, sondern er singt auch fleißig. Die Kunst des Vogelwirtes, den Spötter zu erhalten, liegt bei Erfüllung obenerwähnter Aufenthaltsbedingungen einzig und allein in der Fütterung, alles andere sind nicht so scharf hervorzuhebende Notwendigkeiten. Ich möchte nicht den Glauben erwecken, daß nur mit der Nennung der Futterbestandteile lustig darauflos gefüttert werden kann. In der Liebhaberei kann es keinesfalls heißen wie im Kochbuch: man nehme, und der Eierkuchen ist fertig. Füttere streng persönlich oder deutsch gesagt „individuell". Dann erst können Erfolge gebucht werden. Jede Futtergabe ist abgemessen am äußeren Zustand des Vogels, und jede Gabe richtet sich nebenher nach der Körperbeschaffenheit, ein Zuviel hier ergibt ein Zuwenig da, Dinge, die nicht ohne Einfluß auf den Pflegling sein werden. Verständnisvolle Sorgsamkeit soll nicht ausarten in übereiligen Handlungen, die unermeßliche Schädigungen hervorzurufen in der Lage sind. Das Auge des Pflegers ist doch so geschärft, um festzustellen, wenn dem Pflegling etwas fehlt, was, ist zunächst Nebensache und wird erst hauptsächlich, wenn es gilt die Ursachen des Übels zu erkennen. Nach derartigen Feststellungen gilt mein erster Blick den Ausleerungen und dem Futternapf; in der Regel ist schon dann erkennbar, welche Ursachen der Unbehaglichkeit des Vogels zugrunde liegen. Ein entschlossener Griff nach dem Würmertopf und siehe, wie auf Kommando — aller Augen warten auf dich. Durch Darbietung von Würmern schütze ich den Vogel zunächst vor vollständiger Magenleere und gewinne dadurch Zeit und Gelegenheit, weiter nach dem Übel zu forschen. Die Zimmertemperatur ist in Ordnung, das Trink- und Badewasser auch, es kann also nur am Futter liegen. Für den Rest des Tages, vor allem des Abends bei Lampenlicht, wo der Vogel wieder lebhafter wird, erhält er die Medizin, so viel, daß er satt wird. Das wirkt wie Elexier. Das frische Futter wird aus den einzelnen Bestandteilen mit gleichmäßiger Sorgsamkeit wie alle Tage zubereitet, es wird bei schwachen Vögeln mit Nährstoffen mehr bereichert als bei normalen und regelt dadurch ausgleichend. Würmer dürfen beim Spötter niemals fehlen. Die Menge regelt sich ebenfalls nach dem Zustande des Vogels. Mehr als einmal ist es vorgekommen, daß ich das Lebenslicht des zarten Tieres mit Medizin erhalten konnte. Zwanzig bis fünfundzwanzig Stück kann jeder Vogel erhalten, ohne dafür besorgt sein zu müssen, daß er nicht mehr ans Mischfutter geht. Reicht der Pfleger aber soviel Würmer, wie der Vogel fressen mag, hat er den Schaden und nicht der Pflegling. Es wird sich ergeben, daß das Futtergemisch nicht angerührt wird und der Spötter, auch der Sumpfrohrsänger macht's so, nur darauf wartet, bis das Herz der Vernunft weicht, d. h. bis der Pfleger zum Wurmtopfe greift und gibt und gibt, es will nicht aufhören. Diese Fütterungsweise wirkt außerordentlich schwächend — auf den Wurmtopf, der Vogel hat den wenigsten Schaden. Um eine geordnete Fütterung wieder zu erreichen, bleibt nichts anderes übrig, als mit zerschnittenen untergemengten Würmern einzufüttern. Es ist von großem Glück zu reden, wenn dieses mir unsympathische Unternehmen gelingt. In der Regel ist die Mühe vergeblich. Wenn die Mauser kommt, wird erst erkenntlich, welche Schädigung der kleine Körper erlitten hat. Darum, hart sein heißt nicht lieblos sein.

(Fortsetzung folgt.)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Die Gattung Felsschnäpper — Petroeca *Sw.* umfaßt ungefähr 18 Arten von Fliegenschnäppern, welche über Australien, Neuguinea, einige polynesische Inseln und Neuseeland verbreitet sind. Sie stehen den Schnäppern der Gattung Muscicapa nahe. Der feinere und schmalere Schnabel,

gewisse Schwingenverhältnisse, der längere gerade abgeschnittene Schwanz und vor allem die Färbung unterscheidet die Felsschnäpper hauptsächlich von unseren Fliegenschnäppern. Gould nennt sie ausgesprochene Charaktervögel der australischen Landschaft. Ihr z. T. leuchtend rotes Gefieder steht im schroffen Gegensatz zu den dunklen Tönen des Bodens, auf dem sie sich aufhalten.

Sie sind außerordentlich lebhaft in ihren Bewegungen, und ähnlich wie die Steinschmätzer richten sie sich auf, so daß die schöne Färbung ihres Brustgefieders stets ins Auge fällt. Ihre runden napfförmigen Nester stehen in Baumhöhlen, Mauerlöchern, zuweilen unter Steinen oder am Fuße eines Felsblockes Die Geschlechter sind verschieden gefärbt. Während das Gefieder der Männchen meist prächtig rot in verschiedenen Tönungen, schwarz und weiß gefärbt ist, ist das der Weibchen schlicht graubraun.

Leider sind diese schönen Vögel bisher noch nicht nach Deutschland gelangt, aber englische Liebhaber hatten Gelegenheit, zwei Arten von ihnen längere Zeit zu pflegen. Eine der schönsten (s. Abb. S. 203) ist der

orangerotbrüstige Felsschnäpper — P. phoenicea *J. Gd.*

Seine Verbreitung erstreckt sich über Tasmanien und den Südosten des australischen Festlandes. Im letzteren Gebiet ist er ein gemeiner Vogel, während er in Neusüdwales und dem südlichen Teil seines Verbreitungsgebietes nicht so häufig und nur lokal verbreitet ist. Zu seinem Aufenthalt wählt er offenes Gelände und öde Wüsteneien, weniger den Wald. Manche Züge seines Wesens erinnern sehr an die der Steinschmätzer, z. B. wenn er sich, was häufig geschieht, einen Stein, Erdklumpen oder sonst hervorragende Punkte auswählt, um von hier aus Insekten zu jagen, die wahrscheinlich seine Haupt-, wenn nicht seine alleinige Nahrung bilden. Zur Brutzeit zieht er sich in bewaldete Gebiete zurück. Sein Nest, welches in einem Felsspalt oder in einer Baumhöhle steht, ist dickwandig und warm. Es ist aus feinen Halmen und fadenähnlichen weichen Baststreifen, Tiergespinsten und Wolle erbaut und im Innern mit Haaren, Federn und fadendünnen Grashalmen gerundet. Das Gelege besteht in der Regel aus drei grünlichweißen, veilchenfarben und rotbraun, bald fein, bald grob, regelmäßig oder unregelmäßig gefleckten und gesprenkelten Eiern (18,5 × 14,3 mm). Während des Brütens läßt das Männchen einen hübschen, angenehmen Gesang hören, der aus tiefen, hohlen Tönen zusammengesetzt ist.

Dieser Felsschnäpper ist ein sehr vertrauter Vogel, der eher die Nähe des Menschen sucht als sie meidet und sich häufig in Gärten, Parks oder sonst kultiviertem Gelände aufhält. Gould fand sein Nest an einem abschüssigen Damm inmitten einer Stadt.

Gefiederbeschreibung: ♂ oberseits schwarzgrau; Stirnfleck weiß; schmales Band am Grund der Stirn schwarz; Zügel, Kopfseiten, Ohrdecken, Kinn schwarzgrau; Kehle, Brust leuchtend orangerot; übrige Unterseite weiß, an den Seiten mit Grau gemischt; Schenkel schwärzlich; kleine Flügeldecken wie oberseits; die inneren mittleren und großen Flügeldecken weiß, übrige Flügelfedern schwarz; Handdecken fein weiß gespitzt; innere Armschwinge außen weiß, übrige Armschwingen mit weißem Fleck am Grund der Außenfahne, ein ebensolcher kleinerer an den Handschwingen; Unterflügeldecken, Achselfedern dunkelgrau mit weißen Spitzen; Schwanzfedern schwärzlich; vorletzte wie Grundhälfte und Spitze der Außenfahne weiß; äußerste weiß mit graubraunem Längsfleck auf dem Innen- und Spitzenfleck auf der Außenfahne; Auge dunkel; Schnabel, Füße schwarz; Lg. 130, Fl. 78, Schw. 58 mm.

Die zweite nach England eingeführte Art ist der

scharlachbrüstige Felsschnäpper — P. multicolor *Gm.*

Orangerotbrüstiger Felsschnäpper.

Die Verbreitung dieses Felsschnäppers ist auf die Norfolk-Inseln beschränkt. In seinem Wesen wird er sich kaum von der vorstehenden Art unterscheiden (s. Abb. S 205).

Gefiederbeschreibung: ♂ oberseits schwarz; Stirnfleck heller weiß; übriger Kopf, Vorderhals schwarz; Unterseite leuchtend scharlachrot; hinterer Teil des Unterkörpers, Unterschwanzdecken weiß; Schenkel schwarz; Flügel schwarz, mittlere und innere große Flügeldecken weiß; Unterflügeldecke weiß mit schwarzem Grund, die am Flügelrand schwarz; Schwanzfedern schwarz, nach dem Ende zu etwas bräunlich mit trübweißem Spitzenrand; Auge dunkel; Füße, Schnabel schwarz; Lg. 115, Fl. 68, Schw. 52 mm.

Mennigvögel waren von jeher die Sehnsucht der Liebhaber von farbenprächtigen Vögeln fremder Länder. Unter den indischen Vögeln, welche von Fockelmann am Anfang des Jahres importiert wurden, befanden sich zwei Arten dieser prächtigen

Vögel, und zwar der schöne Mennigvogel — Pericrocotus speciosus *(Lath.)*, der schon in früheren Jahren, 1908—1910, mehrfach in den Handel kam, und eine kleinere Form der Gattung der kleinen Mennigvögel, in einem Paar, das leider sehr bald nach der Ankunft in Hamburg einging. Die erstgenannte Art hat sich in der Gefangenschaft als ein wenig scheuer Vogel gezeigt, der auch in Vogelstuben unschwer zu erhalten und mit allen anderen Vögeln durchaus verträglich war. Zu seiner Gesunderhaltung und besonders zur Erhaltung der schönen roten Färbung ist ein geräumiger Käfig, in welchem er Gelegenheit zu ausgiebiger Bewegung hat, Licht und Sonne notwendig, außerdem ein Futter, das ganz überwiegend aus tierischen Stoffen besteht, viel lebende Insekten. Ähnlich wird es sich mit dem

kleinen Mennigvogel — Pericrocotus peregrinus *(L.)*

verhalten (s. Abb. S. 184). Dieser zierliche Vogel tritt nach Jerdons Beobachtungen zahlreicher auf und hat auch in Indien eine größere Verbreitung als eine der verwandten Arten. Er wird fast überall in bewaldeten Gegenden gefunden, selbst in sehr trockenen Wäldern, im Dschungel und gelegentlich auch in den Hecken, welche Straßen säumen, in Parks und Gärten. Er ist ein kleiner unruhiger Vogel, immer in Bewegung, immer beschäftigt, hauptsächlich mit der Untersuchung der äußersten Zweige der Bäume, an deren schwächste Ausläufer er sich meisenartig anhängt, um die Blätter nach Kerfen abzusuchen. Mancherlei Larven bilden seine bevorzugte Nahrung. Daneben verzehrt er auch andere kleine Kerfe, denen er auch im Fluge nachstellt und die er nach Art der Fliegenschnäpper, vor ihnen rüttelnd, ergreift. Meist sieht man ihn in kleinen Flügen, häufig — so berichtet Jerdon — sieht man ein Männchen mit sechs bis sieben Weibchen umherstreifen, zur selben Zeit aber auch Flüge, welche nur aus Männchen bestehen, unter denen sich selten ein Weibchen befindet. Nach Tickells Beobachtung treiben sich die Männchen während der kälteren Jahreszeit in geschlossenen Zügen umher. Das Verbreitungsgebiet dieses Vogels ist ein sehr großes. Sie bewohnen ganz Vorderindien, Ceylon, die Andamanen, Assam, die indochinesischen Provinzen, Java und Borneo.

Gefiederbeschreibung: ♂ oberseits aschgrau; Bürzel, Oberschwanzdecken leuchtend rot; schmaler Stirnstreif, Kopfseiten, Vorderhals grauschwarz; Brust leuchtend rot, orangerot verwaschen und an den Flanken heller; Bauchmitte, Unterschwanzdecken weißlich, letztere mit gelblichem Ton; Schenkel schwarzgrau; Flügeldecken schwarz mit grauen Säumen, die größeren mit schwach orangefarbener Spitze; Schwingen schwarz, nach den Spitzen zu in Grau verlaufend; Handschwingen am Grunde orangerot, einen Spiegel bildend, bei einigen zieht sich diese Färbung entlang der Außenfahne; Unterflügeldecken gelblich, einige größere am Grunde grauschwarz; Schwanzfedern schwarz, die vier außen nach der Spitze zu orange, welche Farbe nach innen an Ausdehnung abnimmt; Auge braun; Schnabel, Füße schwarz; Lg. 150, Fl. 63, Schw. 72 mm.

♀ oberseits hellgrau; unterseits gelblich, an den Flanken dunkler; Bürzel rot, Kehle weiß, Flügeldecken hellgrau, Schwingen dunkel braungrau, gelber Spiegel, Handschwingen mit schmalen weißlichen Säumen; Unterflügeldecken gelblich; Schwanz wie beim Männchen.

Die Brutzeit des kleinen indischen Mennigvogels fällt meist mit der Regenzeit zusammen. Sie erstreckt sich über die Zeit von Mitte Juni bis gegen Ende des August. Sein kleines hübsches Nest erinnert insofern an das Nest des Buchfinken, als es von außen mit kleinen Rindenstückchen oder mit Stücken von trockenen Blättern des Baumes, auf dem es steht, zuweilen auch mit beiden, bekleidet ist und infolgedessen mit unbewaffnetem Auge kaum zu erkennen ist, zumal es meist auch ziemlich hoch steht, 10 m über dem Boden, und völlig den Auswüchsen eines Astes gleicht. Zum Nestbau wird der Mangobaum bevorzugt, für dessen Äste derartige Auswüchse kennzeichnend sind. Meist steht es in den Astgabeln am Ende eines schlanken seitlichen Zweiges des Baumwipfels. Zum Verräter des Nestes wird häufig der männliche Vogel, der in der Nähe der Brutstätte, während das Weibchen brütet, unruhig umherflattert. Als Baumaterial des kleinen ziemlich tiefen, napfförmigen Nestes werden fast nadeldünne Zweige verwendet. Aus ihnen und zuweilen, aber selten, einigen Federn, schmalen trockenen Blättern, feinen Flechtenfasern und selten dünnen Grashalmen wird das Nest errichtet. Alle Baustoffe werden sorgfältig miteinander verflochten und außen wird der Bau mit Insektengespinsten bekleidet, auf denen, wie oben geschildert, Rinden- und Blattstückchen gut haften. Auf den inneren Ausbau wird weniger Wert gelegt. Nur selten scheint eine gute Auspolsterung der Nestmulde stattzufinden. Sie besteht dann aus weichen kleinen Daunen, Insektengespinst oder auch aus feinen Grashalmen. Das Gelege besteht anscheinend nur aus 2—3 Eiern von hellgrünweißlicher Grundfarbe mit rötlichbraunen Sprenkeln und Flecken, die am dickeren Ende sich ausdehnen und hier so zahlreich auftreten, daß die Grundfarbe hier kaum sichtbar wird (16,5×12,5—13 mm).

In neuerer Zeit gelangten durch Lenger (Berlin) verschiedene Arten afrikanischer Täubchen in den Handel, darunter auffallend kleine **Kaptäubchen**, welche mit Senegalvögeln eingeführt wurden, sodann die schöne **Senegaltaube** (s. Abb. S. 191) und die sehr selten eingeführte „**Weinrote Turteltaube**" (s. Abb. S. 193). (Fortsetzung folgt.)

Der Bluthänfling.

Von Karl Finck, Neukölln.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Brauende Wolken verfinsterten auf einmal die Sonne, dunkel wurden die Bestände, grau der Kulturschlag. Erschrocken unterbrach der Standfink das Studieren; als aber die Sonnenstrahlen wieder erschienen, schlug er voll durch, sieghaft und frühlingsfroh.

Weitläufige Kahlschläge schoben sich dazwischen, vergraste und verheidete Kulturen, vielfach fast vollständig von den dürren Blättern der Adlerfarne bedeckt, darunter Wacholdergruppen und Kiefernhorste, die durch den Schattenwurf schädlich wirkten.

Plötzlich polterten Rehe hoch, eilten in weiten Fluchten davon, blitzschnell verschwanden Kaninchen, und an der Biegung des Weges machten zwei teilweise noch im Winterkleide befindliche Hermeline

aufgeregt ein Männchen. Um das blühende Salweidengestrüpp summten die ersten Wildbienen, im Sonnenschein tanzten Mücken, übern Sand hasteten Laufkäfer, freilich noch etwas matt.

Steil fiel das Gelände gegen Moorwiesen und an moorige Acker ab, zogen sich bis zum Horizont unheimliche Sümpfe hin. An der Böschung standen ausgesäte Föhren, gepflanzte, stark vom Rotwild verbissene Fichten und Wachholder in geschlossenen Verbänden.

Fleißig flöteten hier wieder Bluthänflinge, einmal da, manchmal dort, ständig die Nistmaterial suchenden Weibchen begleitend. Nach kurzem Stöbern fanden wir auch in dem struppigen Rottannenhorste mehrere der halbkugelförmigen, aus Würzelchen, Halmen, Quecken und Stengelchen hergestellte, weich mit Tier- und Pflanzenwolle ausgepolsterte Nestchen, wovon einige schon Eierchen enthielten, die hellblaugrünlich und meistens dunkelrotbraun punktiert sind. Voriges Jahr brüteten in der Umgebung ebenfalls viele Hänflinge. Das Gebiet gewährte geradezu ideale Lebensbedingungen. Futter gab es immer massenhaft. Gold- und weichhaariger Wildhafer, Kammschmiele, Trespe, Kaul-, Rispen-, Honig- und Zittergras wuchsen staudenweise oder vereinten sich zu Rasen. Zwischen den Kiefernstangen und in den Schonungen grünte die Heide, nickten in der Sommerzeit blaue Glockenblumen, blüten Stein- und Lichtnelken, Eisen- und gemeines Leinkraut, Natterkopf, Beifuß, Sandstrohblumen, Stachellattich, Wegebreit und sonstige Kräuter. Auf den Bruchwiesen leuchteten die Sonnenscheiben des Löwenzahns, lachten Gänseblümchen, standen wilde Möhren, Wiesenschaumkraut, Pinepinelle, die Hahnenfußarten usw. in üppigster Fülle. Wollgras, Teichbinse und verschiedene Rohrarten überzogen wieder weite Moorflächen, während das Sumpfvergißmeinnicht, dessen Samen der Rothänfling ungemein liebt, die Ränder der Abzugsgräben einnahm.

Das Ackerland hatte der Besitzer mit Kali, Phosphaten und Ammoniak zwar richtig gedüngt, jedoch den Hafer zu früh und dünn ausgesät, infolgedessen gewann das Unkraut die Oberhand. Die Mistmelde bildete schnell sperrige Stauden, jedes freie Plätzchen füllte protzig der Hederich aus, Wiesenwachtelweizen, Acker- und Gänsedistel, Klatschmohn, Kornblumen, kletterndes Klebekraut, Ackerwinde, grüner Fennich, Hundskamille, Wucherblume, Erdrauch und Kreuzkraut wetteiferten im Wachsen. Selbst in den Grenzfurchen webten verschiedene Kleearten, Ehrenpreis, Hauhechel, rote Bartnelke, Skabiosen und sonstige Pflanzen bunte, reich gesteckte Bänder.

Auch die flügge Brut fand einen üppig gedeckten Tisch. Bekanntlich kann der tierische Körper nur wasserlösliche Nährstoffe direkt verwerten, dagegen werden feste Verbindungen erst durch die Sekrete der verschiedenen Drüsen verflüssigt. Der Organismus jugendlicher Geschöpfe vermag diese Umwandlung schwer zu bewältigen. Aus diesem Grunde gehen gefangene Jungvögel leicht ein, und bekommen Darmkrankheiten, sobald sie allein harte, ausgereifte Körner erhalten.

Das überaus interessante Gebiet habe ich schon einmal 1912 in der „Gef. Welt“ (Füttert teilweise unreife Sämereien) Heft 28 und 29 behandelt.

Selbst die Pflanzen können bloß aufgelöste Nahrung zum Aufbau gebrauchen, weil der Weitertransport nach dem Gesetze der Endosmose geschieht.

Bei der Keimung erfolgt die Lösung der Reservestoffe durch gewisse Fermente, so wird z. B. das Stärkemehl ($C^6 H^{10} O^5$) in Zucker verwandelt. Die Diastase der keimenden Gerste benützt man in der Brauerei und Brennerei zur Versüßung großer Stärke-

Scharlachbrüstiger Felsschnäpper.

mengen. 5 Kilogramm Grünmalz vermögen bei geeigneter Temperatur 100 Kilogramm Kartoffeln von 20 Prozent Stärkegehalt vollständig zu verzuckern.

Unreife und gekeimte Körner, deren Entwicklungsprozeß verschiedene Stufen zeigt, bilden, abgesehen von Insekten und Grünkraut, das vorwiegende Futter der samenfressenden Vögel. Aber sogar im Winter sind dem Unkrautgesäme abweichende Reifegrade eigen; unreifes trocknet wohl im Spätherbst ein, besitzt jedoch viele wasserlösliche Kohlehydrate.

Während des Mähens wurden die meisten voll entwickelten Unkrautkörner ausgeschlagen, dann beim Umstoppeln mehr oder minder tief untergebracht, im Winter wieder vielfach freigespült und keimten nun freudig.

Durch das Glas sahen wir, wie Buchfinken, Feldsperlinge, Grün- und Bluthänflinge, Grau-, Gold- und Rohrammern emsig Nahrung aufnahmen.

Von den zweilappigen Sämlingen verzehrten die Vögel hauptsächlich die Keimblätter, worin noch die

Vorratsstoffe, freilich schon chemisch umgruppiert, enthalten sind, dagegen wurden die erweichten milchigen Körner der anderen Arten aus dem Boden gezogen und mit den Keimlingen und Würzelchen verspeist.

Schackernd strichen Elstern vorüber. Erschreckt flog der ganze Vogelschwarm nach den Wiesen, wo das Schmelzwasser verschiedene Pflanzenreste angeschwemmt hatte.

Vorsichtig suchten wir die Stelle auf. Die Schmutzwälle bestanden aus Ästchen, vermoderten Blättern, Gräsern, aus Blütenteilchen und Samen des Schilfrohres (Phragmitis communis), der Seebinse (Scirpus lacustris), des breitblättrigen Rohrkolbens (Typha latifolia), der nadelförmigen Simse, des mannshohen Rohrglanzgrases (Phalaris arundinacea), dazwischen fand ich Erlen- und Birkengesäme, ebenso zerfallene Blütenständer wie Körner verschiedener Kräuter. Fast alle Sämereien waren aufgequollen, in Keimung begriffen.

An den Erlen baumelten rötliche wurstförmige Kätzchen, die ersten Dotterblumen schmückten geschützte Stellen, braun und tot lag aber der Schilfwald, auch die dunklen Gewässer zeigten noch kein Leben.

Tief im Moore lärmten Häher, schrien rauh Möwen, quakten Enten, tönten die eigenartigen Rufe der Bekassinen.

Mühsam drangen wir ein Stück vor, mußten jedoch völlig durchnäßt umkehren. Nun suchte ich mit meinen Freunden eine halb in der Erde eingebaute Jagdhütte auf. Überrascht huschten Brandmäuse durcheinander; sie fühlten sich hier schon ganz zu Hause.

Schnell wurde im Ofen ein Feuer entfacht und tüchtig Torf aufgelegt. Schon nach zehn Minuten war die Erbsenmehlsuppe fertig, dazu gab es Speck und derbes Bauernbrot.

Allmählich entstand in dem halbdunklen Raum eine gemütliche Wärme, obwohl der beizende Rauch lästig wirkte. In Pferdedecken eingewickelt lagen wir auf den Holzpritschen, und ich berichtete meine vorjährigen Beobachtungen.

Frühling war es, an den Birken rieselten junge Blätter, geheimnisvoll entfalteten die Rotbuchen ihre goldgrünen Knospen, in manchen Gärten blühte schon der Flieder, dufteten Goldlack und Maiglöckchen, vor dem Schulhause steckten die alten Kastanien ihre weißen Kerzen an, Fichten und Föhren wollten nicht zurückbleiben und trieben eilfertig junge harzige Schößlinge.

Eines Abends unternahm ich einen nächtlichen Reviergang allein, bloß in Begleitung des angeleinten Jagdhundes.

Traumverloren schlummerte das Dorf, zeitweise röhrten schlaftrunken Rinder, wieherte ein Pferd, sonst vernahm das Ohr kaum andere Laute als das dumpfe Gequake der Moorfrösche. Mehrere Köter wurden rege, liefen kläffend ein Stückchen mit, dann herrschte wieder Stille, abgeklärter Friede.

Am Mühlenkolk begann eine Nachtigall zu schlagen, jenseits fielen zwei andere ein, und nun schwebten auf reinen Tonwellen vom Kirchhofe her die gleichen wundersamen Töne in die laue Frühlingsnacht, einmal jauchzend, voll überirdischer Seligkeit, nachher bange, flehend reichhaltige, anschwellende Strophen; es war beinahe, als wollten die herrlichen Melodien alles Hoffen, alles Erdenleid und ferne, ferne unbekannte Freuden ausdrücken.

Siehst du des Buchenwaldes junges Grün,
Und drunter leuchtend gelb die Weiden blüh'n?
Hörst du den tiefen sehnsuchtsvollen Schlag?
Das ist der erste Nachtigallentag.

Spürst du von Süden her den milden Zug?
Den Duft, den er von fern' herübertrug?
Empfindest du das ahnungsvolle Weh'n? —
Das ist der Erde selig Aufersteh'n.

Von Karl Müller.

(Fortsetzung folgt.)

Uhuzucht.

Von Franz Fuchs.

(Nachdruck verboten.)

Nach meiner Mitteilung über eine gelungene Uhuzucht an die „Gef. Welt" teilte mir Herr Neunzig den Wunsch mit, einen näheren Bericht darüber zu erhalten. Auf eine Anfrage bei dem glücklichen Züchter, Herrn Tierbildhauer Pallenberg, ob ihm mein Besuch in dieser Angelegenheit recht sei, erhielt ich den liebenswürdigen Bescheid, daß er mich erwarte.

Schon lange hegte ich den Wunsch, das Tuskulum des Künstlers, weit draußen vor den Toren der Stadt Düsseldorf, zu besichtigen, hörte ich doch schon so viel durch Kollegen von den Wunderdingen, die es berge, doch wagte ich nicht, mit der Bitte hervorzutreten, da ich weiß, wie Besitzer solcher Herrlichkeiten überlaufen werden und wie zuviele Besucher den Schaffenden stören.

So brachte mich nun die Kleinbahn an einem sonnigen Märznachmittage nach Düsseldorf-Lohausen, wo feldeinwärts der Landstraße die Besitzung des Herrn Pallenberg liegt. Die freundliche Gattin des Künstlers öffnete mir und führte mich in das große Atelier, wo Herr P. gerade mit dem Modellieren eines kleinen Elches beschäftigt war. Überall standen prächtige Bronzen umher, deren Lebendigkeit und künstlerische Ausführung den Ruf ihres Schöpfers weit über Deutschlands Grenzen brachten. Ganz besonders gefielen mir ein trompetender Elefant und ein sich sonnender Geier. Oben im Atelier befindet sich eine Galerie, welche die riesige Sammlung von Skeletten, Schädeln und Naturabgüssen birgt. Schädel vom kleinsten bis zum größten Raubtier, sowie solche von Gorilla, Bison, Nashorn, Elefanten, Biber, Elch usw., ferner Schädel vom Hornraben, Nashornvogel, Pfefferfresser, von Raub- und Wasservögeln u. a. m., waren dort wohlgeordnet zu sehen. Spiritusgläser bergen wertvollen Inhalt, z. B. einen jungen Schimpansen, farbige tropische Schlangen und allerlei sonstige Kriechtiere. Dann zeigte mir Herr P. seine ethnographische Sammlung im Treppenhause und in einem besonderen Raume zahlreiche Plastiken, meist Gipsabgüsse von bereits in Bronze gegossenen Tieren und Tiergruppen seiner Hand. Da waren wunderbare Arbeiten zu sehen, doch würde es zu weit führen, sich hierüber des längeren zu äußern.

So betrachten wir dann den großen Garten, ein Zoo im kleinen. Nur wenige Meter vom Hause befindet sich ein Teich, belebt von allerhand Ge-

flügel, und am Rande stolzierte ein prächtiger Kronenkranich, der sich schon seit elf Jahren in Besitz des Herrn P. befindet. Auf einer großen Obstwiese tummelten sich drei Geier im Sonnenschein, und zwar Mönch-, Gänse- und Schneegeier. Selbige sind auch ungefähr so lange wie der Kranich im Besitz ihres jetzigen Herrn. Interessant war mir, was Herr P. darüber erzählte, nämlich, daß sie in den Kriegsnöten bis zu vier Wochen ohne jede Nahrung verbrachten, ohne daß ein Kräfteverfall oder dergleichen eingetreten sei. Darauf ist wohl auch der Verdauungsapparat der Geier eingestellt, denn in der Freiheit dürften sie wohl kaum täglich eine Mahlzeit finden.

Darauf besichtigte ich den Baribal-Bären, der zahm und lustig, mit einem Jagdhund spielt, und einen prächtigen Wolf, der gleichfalls gezähmt, seinen Herrn freudig begrüßt. Löwen und sonstige große Katzen hat Herr P. augenblicklich nicht.

Nun standen wir vor dem großen Uhukäfig, welcher ein altes Männchen vom Kaukasus, ein Weibchen aus Sibirien, und das von beiden im vorigen Jahre erbrütete Junge enthält.

Das Uhuweibchen legte vor zwei Jahren ein Ei, aus welchem nach etwa dreißigtägigem Bebrüten ein Junges schlüpfte, dasselbe starb aber im Alter von etwa zehn Tagen oder wurde von den Eltern umgebracht. Jedenfalls entnahm es Herr P. dem Schnabel seiner Alten, halb zerfleischt. Die Überreste sind in Spiritus aufbewahrt. Im vorigen Jahre legte das Weibchen wieder ein Ei, aus dem sich das Junge prachtvoll entwickelte. Herr P. machte mir über die Zucht folgende Angaben:

„Nach meinen zehnjährigen Erfahrungen und Mißerfolgen benötigen die Uhus einen großen, windgeschützten Käfig (meiner ist 4 × 8 Meter), auch Sonne und Badegelegenheit. Wenn sie auch viel in einer dunklen Ecke sitzen, die sie auch haben müssen, so können sie auch zuweilen am Tage recht lebhaft sein, sich fleißig baden und sonnen. Will man züchten, so müssen die Tiere Ruhe haben, und darf man die Uhus von Mitte Dezember an nicht mehr zur Krähenhütte benutzen. Entweder Jagd oder Zucht, beides zugleich geht nicht. Zur Brut benutzen sie ein Ställchen von ungefähr einem Meter Breite und Höhe, mit einem Loch von 40 Zentimeter Durchmesser, wo das Weibchen auf dem natürlichen Boden, ohne Nistmaterial legt und brütet. Meine Uhus paarten sich im Dezember bis Januar. Das Junge (habe immer nur eins gehabt) schlüpfte stets im März aus und benötigte viel Futter, so daß die Alten immer Vorrat haben müssen. Habe beobachtet, daß das Männchen dem brütenden Weibchen Futter zuträgt, und daß beide gemeinsam später das Junge fütterten, indem sie Fleisch zerrissen und es dem Kleinen vor den Schnabel hielten, bis er fraß. Ende August war das Junge vollständig ausgefiedert und genau wie die Alten, nur die Federohren kamen zuletzt. In diesem Jahr hat es seiner brütenden Mutter alle Nahrung zugetragen und hält sich halbe Tage bei ihr auf".

Vorn ♂ Uhu, hinten im Kasten das ♀.

Soweit Herr P. Auffällig ist das Gelege von stets nur einem Ei, weil ein Uhugelege gewöhnlich aus zwei bis drei, sogar aus vier Eiern besteht. Herr P. hält die diesjährige Brut für mißglückt, weil das Weibchen diesmal schlecht brütet, er glaubt, es käme vielleicht dadurch, daß er das Junge dabei gelassen. Im nächsten Jahr will er das Paar wieder allein halten. Herr P. wollte mir das Ei zeigen, aber die Uhus, besonders das Weibchen, verteidigten mit Fängen, Schnabel und Flügeln das Gelege so, daß er davon Abstand nehmen mußte. Prachtvoll sah dabei die Kampfstellung der Tiere aus.

Im Winter kam häufig ein kleiner Merlin bei den Uhus durchs Gitter, um sich von dem Futter einen Tribut zu holen.

Nach einer anregenden Unterhaltung über die gesehenen Tiere sowie über neue Projekte des Künstlers,

der sich demnächst Leoparden und Adler, für welch' letztere bereits ein großes Flughaus zurecht steht, halten will, schloß der für mich so genußreiche Besuch. Mögen Herrn P. noch weitere Zuchten glücken.

Meine Prachtfinken und anderes.

Von B. Schuster.

(Nachdruck verboten.)

In Heft 11 berichtete ich über einige meiner kleinen Pfleglinge aus den Steppen Afrikas. Inzwischen hat sich mein Vogelbestand etwas vergrößert, neue Pflegekinder zogen ein, über die ich in folgenden Zeilen meine Beobachtungen mitteilen werde.

Die Fütterung meiner Vögel suchte ich möglichst den Ausführungen von Adlersparre usw. anzupassen. Stets werden gekeimte Sämereien, Grünkraut und auch Lebertran gereicht. Auch ein Futtergemisch, wie es für Insektenfresser verwendet wird, fehlt nicht, auf welches noch gehacktes Ei und zerschnittene Mehlwürmer gelegt werden. Dieses Futter wird sehr gern verzehrt. Blauastrilde und Schmetterlingsfinken, Amaranten und Goldbrüstchen sind stets die ersten, die von dem Futter Gebrauch machen. Die Erfolge durch planmäßige Fütterung, die den natürlichen Bedürfnissen der Vögel mehr entspricht, sind unverkennbar. Sie machen sich bei meinen Pfleglingen durch eine Steigerung der Brutlust, durch schönes, glattes Gefieder und ihre außerordentliche Munterkeit bemerkbar. Ich bin Herrn Dr. Adlersparre außerordentlich dankbar für seine Ausführungen, und ich glaube, daß es nicht nur mir allein so geht. Neben den üblichen Hirsearten und Spitzsaat wird noch Mohnsaat und angekeimte Rübsaat verabreicht.

Nach diesen kurzen Bemerkungen über die Fütterung soll nun über meine Pfleglinge berichtet werden. Zunächst erwarb ich ein Paar der südafrikanischen Rotkopfamadinen. Diese schönen Vögel erinnern mich stets in ihrem Benehmen und Wesen an meine Bandfinken. Sie waren nur wenige Tage bei mir, als sie auch schon mit dem Nestbau begannen. Dazu trugen sie allerlei Fasern und Halme in einen Harzer Nistkasten und erbauten ein sehr liederliches Nest, das oben offen war und nur an den Seiten mit einigen Halmen geschlossen wurde. Nach einigen Tagen lagen drei größere weiße Eier darin, die meist von beiden Ehegatten nur wenige Tage bebrütet wurden. Sie kümmerten sich dann nicht mehr um ihr Nest, sondern krochen öfter in die anderer Vögel hinein, wodurch sie sehr störend im Flugraum wurden. Später schritten sie von neuem zur Brut und legten die Eier in ein verlassenes Nest. Auch hier zeigten sie keine Ausdauer zum Bebrüten der Eier. So ging es verschiedene Male. Sie zeigten weder Lust zum Nestbau noch, wenn ein Gelege da war, Lust zum Bebrüten desselben. Einmal trat sogar der Fall ein, daß das Weibchen die Eier auf den Boden eines Harzer Nistkastens legte, ohne vorher auch nur wenige Niststoffe hineinzutragen. Jetzt sitzen sie in einem Einzelkäfig. Vielleicht schreiten sie dann zur Brut, wenigstens können sie die anderen Vögel nicht in ihrem Brutgeschäft stören.

Links das alte Paar. Das erbrütete Junge.

Die Malabarsasänchen schritten im März zur Brut. Sie erbrüteten aus vier Eiern vier nackte Junge, die sie anfangs mit großem Eifer fütterten. Nach acht Tagen ließen sie plötzlich ihre Jungen verhungern. Sie waren in der Größe recht verschieden, zwei waren erheblich größer als die anderen beiden. Seit einigen Tagen bebrüteten sie ein neues Gelege, hoffentlich erfolgreicher als das erste.

Nicht viel mehr, aber noch weniger Glück hatte ich mit meinen zwei Paar Zebrafinken. Sie bauen eifrig Nester, legen auch eifrig, verlassen nach wenigen Tagen das Gelege oder überdecken es mit Halmen. Auch kommt es vor, daß sie eifrig brüten und auch Junge im Nest haben, die sie aber stets schon am ersten Lebenstage aus dem Nest tragen und nicht

füttern. Das ist sehr unerfreulich, zumal die Zebrafinken und Mövchen später als Ammen für seltenere Prachtfinken dienen sollten. Sie bewohnten einen größeren Käfig allein. Nach den häufigen Mißerfolgen habe ich jetzt jedes Paar in einen anderen Käfig getan. Vielleicht brüten sie dann besser. An Legenot ist mir in den letzten Monaten kein Vogel mehr erkrankt. Die Eiablage erfolgte stets glatt und ohne Schwierigkeiten. Ich führe dieses auch auf die neue Fütterungsart zurück.

Die japanischen Mövchen sind schon lange in meinem Besitz. Sie haben bis heute, ebenso wie andere gleichartige Paare, noch keinen Brutversuch gemacht. Sie tragen nicht einmal Niststoffe in einen Nistkasten. Es ist was Eigentümliches mit diesen Tieren! Meine Vögel sind äußerlich gut imstande und schon lange zuchtfähig. Die Männchen balzen oder singen sehr selten. Meist sitzen alle in einem Nistkasten oder dicht gedrängt auf einer Stange, anscheinend sich wärmend, trotz einer dauernden Zimmertemperatur von 20 ° C. Mir scheint mit den Mövchen viel Inzucht getrieben zu werden. Vielleicht haben andere Liebhaber ähnliche Erfahrungen gemacht. Es ist für unsere Vogelzucht sehr bedauerlich, daß derartige Erscheinungen auftreten, nnd stellt den Züchtern dieser Mövchen ein recht schlechtes Zeugnis aus. Der Verkauf dieser Vögel grenzt schon an Betrug. Hier ist nicht den Händlern die Schuld zu geben, sondern den Züchtern oder Liebhabern, wenn man sie als solche überhaupt bezeichnen kann, die diese degenerierten, äußerlich häufig gut aussehenden Tiere verkaufen.

Zu den japanischen Mövchen setzte ich ein Paar der weißbäuchigen Bronzemännchen. Vielleicht verpaarten sie sich mit Mövchen, um auf diese Weise eine Zucht zustande zu bringen und für Blutauffrischung zu sorgen. Doch das war vergebens. Die Mövchen waren zu keiner Brut zu bewegen, ebenso die Bronzemännchen untereinander nicht. Jetzt fliegen sie mit den anderen Webefinken im Flugraum umher.

Wegen ihres hübschen Aussehens erwarb ich zwei schwarzköpfige und zwei weißköpfige Nonnen. Sie sind eine Zierde jedes Flugraumes. Es ist nur schade, daß sie schwer zu züchten sind. Eine weißköpfige Nonne befand sich noch im Jugendkleid, welches an das des Schilffinken erinnert. Sie verfärbte sich im Dezember und Januar. Eigentümlich ist das Freundschaftsverhältnis der Nonnen untereinander. Eine weißköpfige Nonne ist mit einer schwarzköpfigen befreundet, sie sitzen eng zusammen und krauen sich gegenseitig den Kopf. Eine andere Schwarzkopfnonne hat sich mit einem Muskatfinken angefreundet. Ob aus diesen Verhältnissen einmal eine Mischlingszucht entspringen wird, ist sehr fraglich. Bisher machen sie keine Anstalten zum Nestbau, noch zeigen sie sich brütlustig.

Unter den Webefinken lebt seit über einem Jahre ein Paar Brillenpfäffchen. Diese niedlichen Finkenvögel gehören zu meinen besonderen Lieblingen. Im vergangenen Sommer erbauten sie in einem offenen Nistkasten ein niedliches Nest und legten drei Eier hinein, aus denen ein Junges erbrütet wurde. Doch sie fütterten es nicht, worauf es am zweiten Tage tot war. Das Weibchen ist äußerst zahm, es kommt bei meiner Annäherung stets an das Gitter geflogen und sieht mit seinen großen dunklen Augen meinen Hantierungen zu.

In demselben Raume lebte im vorigen Jahre ein männlicher Waldhüttensperling und ein weiblicher Feldsperling. Beide erbauten im Juli ein Nest in einem Harzer Nistkasten. Das Weibchen legte fünf Eier hinein, die wie die des Feldsperlings gefärbt waren. Sie wurden längere Zeit erfolglos bebrütet, da sie unbefruchtet waren.



Rotschnabellerche.

Rotschwänze — Phoenicurus *(Forst.)*.

Eine Monographie von John Kunzendorff.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der äthiopische Rotschwanz — Erithacus omoensis *(Neum.)*.

Erithacus omoensis ist der familiaris-Gruppe nahe verwandt und falkensteini am ähnlichsten.

Oberseits ist er dunkler und mehr düster graubraun, unterseits trüb bräunlichgrau, Kehle, Brustmitte weißlich; die mittelsten Schwanzfedern sind am Wurzeldrittel rotbraun, die schwarze Endbinde ist sehr schmal. Nach Reichenow sind die Maße: Lg. etwa 130—140, Fl. 80—82, Schw. 57—62, Schn. 13—14, Lf. 20—22 mm. Seine Heimat ist das Omogebiet (Südabessinien).

Der sudanesische Rotschwanz — Erithacus sennaarensis *(Seeb.)*.

Wie der vorige, so ist auch dieser Rotschwanz mit den vorgenannten Arten nahe verwandt und E. familiaris am ähnlichsten, dürfte aber E. omoensis am nächsten stehen. Gleich diesem hat er das Wurzeldrittel der mittelsten Schwanzfedern rotbraun, aber der schwarze Endsaum der übrigen Schwanz-

Rotkappenlerche

federn ist bedeutend breiter, über 12 mm breit. Das Verbreitungsgebiet dieses Rotschwanzes ist Sennar (südlicher Sudan, in der Gegend des blauen Nils). (Nach Reichenow, Die Vögel Afrikas, III.) Die Lebensweise der beiden letztgenannten Arten stimmt wohl mit der der familiaris-Gruppe überein. Lebend nach Europa eingeführt sind diese Vögel noch nicht.

Gänzlich verschieden von allen vorerwähnten Rotschwänzen sind die Formenkreise der Gebirgsrotschwänze in ihrer Gefiederfärbung und in ihrer Flügelform. Und doch beweisen sie durch ihr Wesen und ihre äußere Erscheinung, daß sie echte, richtige Rotschwänze sind. Trotz ihrer Verschiedenheiten sind Übergänge von diesen zu jenen vorhanden, so bildet z. B. Erithacus hodgsoni einerseits mit seiner den Gebirgsrotschwänzen gleichfalls eigenen Flügelform einen solchen, während andererseits Erithacus auroreus und Erithacus diplootocus in gewisser Hinsicht eine Übergangsstufe zu Erithacus erythronotus und Erithacus rufiventris in der düsteren Färbung der Flügel zu Erithacus frontalis eine solche darstellen. Die Gruppe der Gebirgsrotschwänze bildet für sich ein abgeschlossenes Ganzes, das seinerseits wieder in vier selbständige Untergruppen zerfällt. Wie wir bei den Blumen die schönsten nnd farbenprächtigsten Vertreter der Gattung hoch im Hochgebirge finden, so sehen wir auch in diesen, die höchsten Höhen der asiatischen Gebirgszüge bevölkernden Rotschwänzen Vögel, bei denen sich die Farben zu einem der schönsten und farbenreichsten Gemälde vereinigt haben. So verschieden sie in ihrer Färbung sind, so viel Ähnlichkeit haben sie miteinander. So haben z. B. E. schisticeps und E. frontalis beinahe die gleiche Stirn- und Oberkopffärbung gemeinsam und ersterer den Schwanz fast wie E. coeruleocephalus; und beinahe die gleiche Flügelzeichnung weisen E. erythronotus, E. coeruleocephalus auf. Die ♀♀ ähneln einander sehr und steht dem ♀ erythronotus das des coeruleocephalus am nächsten, während das ♀ schisticeps zwischen diesem und frontalis zu stellen ist. Alle Gebirgsrotschwänze zeichnen sich durch bedeutend stumpferen Flügel aus und es hat der östlichste unter ihnen den stumpfsten.

Der Formenkreis — Erithacus erythronotus umfaßt zwei Arten, die wenig voneinander verschieden sind und das nördliche Hochasien bis nach Europa hin bevölkern. Man unterscheidet eine westliche und eine östliche Form. Mehr wie die folgenden sind diese beiden Zugvögel.

Der grauköpfige Finkenrotschwanz — Erithacus erythronotus samamisicus *(Hablizl.)*.

Der Name Finkenrotschwanz weist schon auf seine Gefiederfärbung auf eine gewisse Ähnlichkeit mit den Finken hin. ♂ ad. Oberkopf, Nacken hellgrau, an den Seiten weißlich, schwach bräunlich verwaschen, im Herbstgefieder aschgräulichbraun; Rücken, Bürzel, Oberschwanzdecken goldig rostrot, die Federn im Herbstgefieder schmal bräunlichgrau und am Bürzel stellenweise schwärzlich gespitzt; schmale

Stirnstreif, Zügel, Kopf- und Halsseiten, Kinn schwarz, ein breites Band bildend; Kehle, Brust, Körperseiten goldig rostrot, im Herbstgefieder die Federn weißlich gespitzt; Mitte des Bauches weißlich; Unterschwanzdecken blaß weißlich rostrot, Unterflügel weiß, an der Wurzel schwärzlich; Schwingen dunkelbraun; Armschwingen schmal fahl bräunlich, Handschwingen außen breiter weiß, innen rahmfarben gesäumt, kleine Flügeldecken schwarz, mit weißlichen Außenrändern, große und mittlere weiß, einen weißen Längsspiegel bildend; Handdecken weiß mit schwärzlichbraunen Spitzen; Schwanzfedern gelblich rostbraun, das äußerste Paar an der Außenfahne der Spitze zu braun gesäumt, die übrigen mehr oder weniger braun gespitzt und das mittelste Paar ganz braun. Schnabel und Füße schwarz. ♀ ad. Oberseits gräulichbraun, auf dem Bürzel in das Rostbraune der Oberschwanzdecken übergehend; unterseits heller, schwach röstlich verwaschen; Mitte des Bauches am hellsten; Unterschwanzdecken hellgräulich rostfarben; kleine Flügeldecken graubraun, mittlere und große mit weißen oder rahmfarbenen Außensäumen; Schwingen braun, Handschwingen schmal hellbraun, Armschwingen breit bräunlichweiß außen gesäumt; der Schwanz ist wie beim ♂. Beim männlichen Jugendgefieder im Herbste ist die weiße Binde der Handdecken undeutlich. Nach Hartert messen die Finkenrotschwänze: Fl. 85—89, Schw. 70—72, Lf. 21,5—23,5 mm.

Das Verbreitungsgebiet des grauköpfigen Finkenrotschwanzes ist das nördliche Hochasien, und zwar das Gebiet von Turkestan bis zum Altai, den Sajanbergen und dem Baikalsee. Auch am Südufer des Ochtnischen Meeres, sowie bei Orenburg im Ural und in Kleinasien wurde er angetroffen. Erithacus erythronotus samamisicus ist teils Zug-, teils Standvogel, und ersteres mehr als die anderen Gebirgsrotschwänze, und durchwandert auf dem Zuge Turkestan, Transkaspien und Ostpersien und überwintert im Tarimbecken, Südturkestan, Kaschmir östlich bis Kothokei, Afghanistan und Buschira am persischen Meerbusen. In Kultuk, westlich Irkutsk, wurde er von Anfang April bis Ende September, wenn auch nur ziemlich selten, auf dem Zuge beobachtet; im Frühjahr zeigten sich kleine Scharen an den Ufern der Bäche. Er bevorzugt die höheren Regionen der Gebirge und hält sich dort meist in buschreichen Gegenden auf. Vorzugsweise nistet er in felsigen Gebirgsgegenden oberhalb der Baumgrenze, in der zweiten Julihälfte wurden schon ausgewachsene Junge beobachtet. Das Gelege besteht aus blaugrünen, fein rotgepunkteten Eiern. Sein Lockruf klingt eigenartig und erinnert an leises Schweinegrunzen. Im Herbst und Winter ernährt er sich von Berberitzenbeeren. Nach Deutschland ist dieser interessante Vogel leider noch nicht eingeführt worden.

(Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Import- und Gefangenschaftsschädigungen exotischer Tiere und Versuch ihrer Bekämpfung durch Venecin-Darreichung. Die Tierhaltung in den Zoologischen Gärten arbeitet unter wesentlich anderen und schwierigeren Bedingungen, als sie der Pfleger und Züchter unserer bekannten Haustiere im allgemeinen vorfindet. Besteht doch das Material eines Zoologischen Gartens aus den mannigfaltigsten Gattungen der Tierwelt, die in einem solchen Institut aus äußeren Gründen einer gewissen schematischen Behandlung unterworfen werden müssen. So sehr auch das Bestreben vorherrscht, jedem Tiere seine biologischen Bedingungen wenigstens in großen Umrissen zu ersetzen, so bietet doch der Zwang, viele Tiere auf engem Raum vereinigen zu müssen, und die Unmöglichkeit, Ernährung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und dgl. wie im Freileben zu regeln, zweifellos Schädlichkeiten, der zahlreiche und wertvolle Tiere trotz aller Bemühungen immer wieder zum Opfer fallen. Wer wie der Verfasser aus dem fernen Osten und dem tropischen Indien Vögel und niedere Wirbeltiere persönlich importiert und gepflegt hat, kann allein ermessen, wie groß die Mühe und Schwierigkeit ist, die Tiere auf langer Seefahrt zu erhalten. Selbst bei einer geringen Anzahl von Pfleglingen, denen der Liebhaber seine ganze Sorgfalt widmet, ist die Zahl der Verluste eine sehr große. Um wieviel ungünstiger müssen die Bedingungen sein, wenn es sich um die großen Transporte bewerbsmäßiger Importeure handelt, bei denen eine einigermaßen ausreichende Versorgung der Tausenden von Tieren sich unter den ungünstigen Verhältnissen an Bord von selbst verbietet. Und diese Transporte sind es doch, die den Zoologischen Gärten das meiste Material zuführen. Es ist leicht zu verstehen, daß von den durch Fang und Reise in vieler Hinsicht geschwächten Tieren viele nicht mehr die Kraft aufbringen, sich an die neuen Bedingungen, die ihnen im Zoologischen Garten geboten werden, zu gewöhnen. Bekanntlich rechnet man in Fachkreisen bei manchen Vogelarten mit einem Verlust von 85 Prozent. Unter diesen Umständen hat das Bekanntwerden eines neuen Heilwassers „Venecin", erfunden und zusammengesetzt von Branco, in den Kreisen der Vogelliebhaber und Tierpfleger großes Interesse gefunden. Venecin ist ein aus natürlichen Mineralstoffen nach besonderem Verfahren hergestellter Brunnen und enthält die wesentlichen Salze der Zelle zum Teil in kolloidaler Lösung. Dem Mittel, dessen völlige Unschädlichkeit erwiesen ist, wird nachgerühmt, daß es die Abwehrstoffe im Körper erweckt und vermehrt, die Zellfunktionen steigert, vielleicht im Sinne seiner unspezifischen Heizkörpertherapie. Es werden in der Tat aus Kreisen der Vogelliebhaber hervorragende Resultate bei der Eingewöhnung exotischer Vögel berichtet. Auch soll die Aufzucht junger Vögel durch das Mittel wesentlich gefördert werden. Der erste Vorsitzende der Ornithologischen Gesellschaft Berlin, Freiherr von Lucanus, berichtet in der „Wochenschrift für Liebhaber fremdländischer und einheimischer Vögel" Nr. 3, 1924, über sehr gute Erfahrungen, die er mit der Darreichung von Venecin bei frisch importierten Vögeln gemacht hat. Auch der Zoologische Garten in Berlin hat sich veranlaßt gesehen, Venecin in größerem Umfange bei seinen Tieren zu versuchen. Wie mir Herr Geheimrat Professor Dr. Heck, der Direktor des Gartens, zuvorkommenderweise in einem Gespräch mitteilte, hat er einen günstigen Eindruck von der Anwendung des Mittels bekommen. Auf einem Gang durch den Garten unter Leitung des Herrn Dr. Hauchecorne wurde mir Gelegenheit gegeben, mit den einzelnen Pflegern über die Anwendung des Mittels Rücksprache zu nehmen. Von besonderen Fällen wurde mir berichtet, daß das Venecin z. B. bei Stomatis eines Schimpansen mit gutem Erfolg angewandt wurde. Besonders eifrige Verwendung findet es aber in der Abteilung exotischer Vögel, wo es der Wärter bei gefährdet erscheinenden Papageien usw. als ausschließliches Trinkwasser zu geben pflegt. Er führt seine Erfolge bei der Erhaltung seiner schwierigen Pfleglinge im wesentlichen auf Venecin zurück. Auch in anderen Tierhäusern soll sich das Wasser bewährt haben. Wenn sich die Beobachtungen auch bisher noch nicht als ein eindeutiges wissenschaftliches Experiment verwerten lassen, so scheint es doch berechtigt zu sein, daraus die Anregung zu weiteren Versuchen abzuleiten; denn es ist zweifellos, daß die Pfleger, die sich eine große Erfahrung auf ihrem Spezialgebiet erworben haben, Erfolge und Mißerfolge zu beurteilen verstehen. Herr Geheimrat Heck hat daher auch weitere Versuche in der Anwendung von Venecin in Aussicht genommen. Sollte hierbei in eindeutiger Weise die Wirksamkeit des V-Venecin sich bewähren, so wäre ein begrüßenswerter Fortschritt auf dem so schwierigen Gebiet der Haltung und Eingewöhnung empfindlicher exotischer

Tiere erzielt. Um so erfreulicher wäre dieses Resultat, da die Anwendung des Venecin sowohl als Trink- wie als Badewasser eine überaus einfache ist. Die Heilung äußerer Affektionen kann auch durch Waschungen und Umschläge günstig beeinflußt werden, und es hat sich gezeigt, daß die Tiere, wenn sie sich durch Entziehung gewöhnlichen Wassers erst einmal an V-Venecin als Getränk gewöhnt haben, dieses ohne Schwierigkeit annehmen und es sogar in manchen Fällen anderem Wasser vorziehen.

Dr. Richard Oeser, Charlottenburg IV.

Anfangs des Jahres 1923 hatte ich u. a. ein **Dompfaff-Männchen.** Der Vogel war, wie auch die anderen, vollständig zahm und flog ein und aus. Wo er auch saß — stets trug er sein Liedchen vor. — Da ich damals eine sehr kleine Wohnung hatte, war mein Aufenthalt stets in der Küche, wo auch meine Vögel untergebracht waren. Eines Nachmittags im Monat März saß ich allein in der Küche und war mit Schreiben beschäftigt. Die Tür zur Speisekammer hatte ich nur ein wenig geöffnet und auch das Fenster in der Kammer. — Auf einmal hörte ich den Dompfaff daselbst locken. Ich eilte nun in die Kammer, um das Fenster zu schließen. Dies glückte mir jedoch nicht rasch genug, und der Vogel war in Freiheit. Nun schloß ich das Fenster. — Nach etwa 1 Stunde hörte ich meinen Dompfaff locken, konnte ihn aber nicht sehen; ich gab mir auch gar keine Mühe, denn ich dachte: „Du kommst doch nicht wieder". — Nach Verlauf von einer weiteren Stunde kam das Dienstmädchen meines Hauswirts und fragte, ob mir einer meiner Vögel fortgeflogen sei; über der Türe ihres Flur-Abschlusses säße ein Vögelchen. — Es war mein Dompfaff! Wie war der Vogel ins Haus gekommen? Er war durch den von Gebäuden umgebenen, engen Hof durch die Hintertüre und das Treppenhaus „hinaufgewandert"! — Kann man einen solchen Vogel als „dumm" bezeichnen? Was mag ihn zur Rückkehr in die Gefangenschaft veranlaßt haben? Die Erkenntnis des „stets gedeckten Tisches" oder die Sehnsucht nach seinen Käfiggenossen? —

Gg. Becker.

Sprechsaal.

Antworten.

Auf Frage 13. Wie oft habe ich in dieser Zeitschrift Artikel über die Bekämpfung der Vogelmilben gelesen, und wie oft habe ich mir nach so vielseitigem Ansporn vorgenommen, auch meine Erfahrungen zu Papier zu bringen. Die Verzweiflung eines Vogelliebhabers, der nach Unkosten usw. von Käfigen immer wieder auf diese lästigen Schmarotzer trifft, brauche ich wohl nicht erst zu schildern. Ich für meine Person habe mit folgenden Mitteln die besten Erfolge gehabt. Vorerst möchte ich noch vorausschicken, daß die einfachsten Käfige die besten sind, und deshalb kaufe ich nie mehr einen Holz- oder Röhrenkäfig (Holzkäfige nur noch für Weichfresser, die ja auch nicht so belästigt werden, mit wenigen Ausnahmen, z. B. Lerchen), da es keiner Bürste und keinem heißen Wasser gelingt, überall hinzugelangen, sondern nur noch die sogenannten Nadlerkäfige, die die Bekämpfung der Milben sehr erleichtern, da sie ihnen fast gar keine Schlupfwinkel bieten, und man kann sie für wenig Geld, wenn man in der Tat Milben gesehen hat, neu verzinnen lassen, wonach dieselben bestimmt fort sind. Nun zu den anderen Käfigen; zuerst die Holzkäfige, diese habe ich mit heißem starken Soda und Lysol (zusammen) ausgekocht, dann vollkommen mit ziemlich unverdünntem Spiritus abgespritzt, besonders die Winkel und Fugen, und dann den ganzen Käfig samt Gitter mit ebenfalls Spiritus enthaltendem russischen farblosen Politurlack angestrichen. In diesen Käfigen habe ich keine Milbe mehr gesehen. Schwieriger ist die Sache bei den sogenannten Röhrenkäfigen; diese habe ich, wie die vorigen, erst ausgekocht und dann über einer Gasflamme Röhre für Röhre ausgeglüht, mühsame aber gründliche Arbeit. Den Kasten habe ich mit Petroleum oder Spiritus bearbeitet. Auch in diesem Falle gelang es mir, Herr dieses Ungeziefers zu werden. Mit Insektenpulver habe ich bisher nicht die geringsten Erfolge erzielt. Die Vögel befreite ich durch ein lauwarmes Seifenbad von ihren Peinigern. Besonders ist noch darauf zu achten, daß man neue Vögel nicht gleich zu den alten hinzusetzt, denn man weiß nicht, ob diese Milben mitbringen und man, wenn dies der Fall ist, von vorn beginnen muß. Deshalb setzte ich neue Vögel erst mindestens 24 Stunden in einen kleinen Nadlerkäfig und decke ihn nachts mit einem weißen Tuch zu. So orientiere ich mich genau, ob mit, ob ohne Milben, wenn mit Milben, so hilft auch hier wieder das lauwarme Seifenbad. Th. Otto Mühlbrecht.

Auf Frage 13. **Zur Bekämpfung der Milben,** bediene ich mich mit gutem Erfolg einer Spiritus-Abbrennlampe, wie sie die Anstreicher und Lackierer gebrauchen. Man läßt die Stichflamme dieser Lampe in gewissen Zeiträumen über die von Milben zumeist befallenen Stellen der Käfige hinübergleiten, und Milben und deren Eier sind vernichtet. Der Preis einer solchen Lampe ist 6—7 Mark. Sie ist meist in den Geschäften erhältlich, welche Malergebrauchsgegenstände feilhalten. J. L., Stolk (Schleswig).

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnitz, Miervelstr. 39; Kaufsvermittlung: Franz Nyncke, Berlin O, Königsberger Str. 17. Verbandsorgan: die „Gef. Welt".

An unsere Mitglieder!

Der Reichsverband hat Postscheckkonto erhalten und zwar Postscheckkonto Leipzig Nr. 22418. Wir ersuchen unsere angeschlossenen Mitglieder, bei Geldsendungen den Überweisungsweg zu benutzen. J. A.: Petters.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Wilh. Eimeke, Hamburg, Eilb. Weg 90: Orangeblaufinken, Braunkopfhabia, Trupiale, grüne Häher, Schwarzkopfkernbeißer, Kubatauben.

J. Horn, Vogelexport, Bremen, Fedelhören 101, Fernspr. Hansa 1996: Kubafinken, junger Doppelgelbkopf.

E. Schöndube, Berlin N, Elisabethkirchstr. 1: Rotrück. Goldsperlinge, Weißwangenlerchen.

Herrn J. R., Immenstadt. Der Vogel hatte jedenfalls im Vorjahre nicht richtig vermausert und infolgedessen geht jetzt der Federwechsel vor sich. Da im kommenden Sommer kaum auf Gesang zu rechnen sein wird, ist es wohl das beste, dem Vogel, sobald im Mai warme Witterung einsetzt, die Freiheit zu geben.

Herrn M., Dörnhagen, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn O. St., Ulm; Herrn K., Dresden; Frl. B. Sch., Berlin: Beiträge dankend erhalten.

Herrn J. E., Würzburg. Nach § 9 des deutschen Vogelschutzgesetzes bleiben die landesrechtlichen Bestimmungen, welche zum Schutz der Vögel weitergehende Verbote enthalten, durch die Bestimmungen des Vogelschutzgesetzes unberührt. L. v. Boxberger sagt in seinem Kommentar zum Vogelschutzgesetz: „Die hier und da erlassenen Polizeiverordnungen, welche das Halten von Stubenvögeln verbieten, entbehren der Gültigkeit, da der Vogelschutz nicht zu den dem Polizeiverordnungsrecht unterliegenden Materien gehört." Ihr Schreiben ist dem „Reichsverband der deutschen Vogelliebhaber" (Sitz Leipzig) übersandt. Sie setzen sich am besten mit dem Reichsverband zwecks Vertretung ihres Rechtes in Verbindung.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

hrgang 54 30. April 1925 Heft 18

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Gelbspötter. Von Paul Schwarz, Leipzig. (Forts.)
Neueinführungen und Seltenheiten. Von Karl Neunzig. (Forts.)
Der Bluthänfling. Von Karl Finck, Neukölln. (Forts.)
Uhuzucht. Von Franz Fuchs.
Meine Prachtfinken und anderes. Von B. Schuster.
Rotschwänze — Phoenicurus (*Forst.*). Eine Monographie von John Kuntzendorff. (Forts.)
Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Ausstellungen - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen - Bekanntmachung.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellungen.

Der **Zier- und Singvogelverein zu Bernsbach im Erzgebirge** hält am 2. und 3. Mai 1925 im Saale des Gasthofes „Zum grünen Baum" in Bernsbach seine vierte allgemeine Ausstellung ab. Um gütigen Zuspruch der Liebhaber wird gebeten. Das Ausstellungs-Komitee.

Auf Wunsch des **Vereins der Vogelfreunde für Remscheid und Umgebung** nehmen wir Gelegenheit, unsere Mitglieder auf die vom genannten Verein am 3. Mai 1925 stattfindende Vogelschau, verbunden mit Buchfinkenwettgesang, hinzuweisen. Wie uns der ausstellende Verein mitteilt, soll es an nichts fehlen, was den Besuch verlohnt. Wir empfehlen deshalb gern die Beteiligung bzw. den Besuch.
Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig.
Der Vorstand. J. A.: Petters, 1. Schriftf.

Der **Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Zwickau** beabsichtigt in der Zeit vom 17.—21. Mai d. J. eine Vogelausstellung zu veranstalten.

Aus den Verbänden.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Verband der Finkenvereine Ruhrgau-Bochum. Der Verband veranstaltet am 24. Mai 1925 in Bochum i. Westf. ein großes „Werbewettsingen". Das Singen findet statt in den Anlagen des Ausflugsortes Waldesruh, Inhaberin Ww. Weitkämper, Waldstr., direkt am Südpark gelegen; von jedem Bochumer Bahnhof leicht erreichbar. Ferner mache ich darauf aufmerksam, daß an jedem Bahnhof Liebhaber vom Bochumer Verband anwesend sind. Um Auskunft wende man sich bitte an diese, welche durch eine Armbinde erkenntlich sind. Aus sportlichem Interesse bitte ich um rege Beteiligung, damit dieses Singen ein Symbol für alle Außenstehenden wird. Die Preise stehen 14 Tage vor dem Singen im Schaufenster der Bochumer Fahnenfabrik Scheer, Metzstr., ausgestellt. Wettstreitbestimmungen: Anfang 1/2 8 Uhr morgens. Einsatz von 1/2 7 Uhr ab. Ende wahrscheinlich 11 Uhr. Die Vögel müssen nach der Prämiierung in den Schönheitsklassen noch eine Stunde zur allgemeinen Anhörung stehen bleiben. Es werden ausgestellt: 1. Klasse: Dreißiger, Düsterweat, Vierziger; diese Vögel müssen rein, also ohne jeden Nebengesang sein. 2. Klasse: Dreißiger, Düsterweat, Vierziger; mit nur einem Beigesang, wie Inspektör, Widör, Flachvierziger, Vierundvierziger, Düsterweat, Wardier, zweites Jahr und Fliertjahr. 3. Klasse: Jeder Vogel muß mehrere Beigesänge haben. Kampf oder Scharfsingen: Der Vogel muß Einsatz, Übergang und Schluß klar aussingen. Es werden drei Rundgänge zu je drei Richtern gemacht. Die nichtsingenden Vögel werden nach jeder Runde entfernt. Jeder Liebhaber ist für richtige Einsetzung seines Vogels in die richtige Klasse selbst haftbar. Vögel, welche bei der Prämiierung in einer falschen Klasse stehen, können nicht prämiiert werden. Jede Klasse ist einzeln abgeteilt und durch Plakate gekennzeichnet. Der Einsatz beträgt 1,50 Mk. Der Ausstellungskorb darf nicht länger als 24 cm und nicht kürzer als 18 cm sein. Jeder Korb muß möglichst mit einem weißen Tuch versehen sein. Ferner mit einer Schlinge (Bindfaden) zum Aufhängen. Mit Sportsgruß der Vorstand. J. A.: Becker

Anmerkung: Bitte höflichst sämtliche Vorsitzenden der einzelnen Vereine um sofortige Anmeldung der eventuell einzusetzenden Vögel, spätestens bis 15. Mai, an folgende Adresse: Friedrich Becker, Bochum i. Westf., Bahnhofstr. 10.

Aus den Vereinen.



Angemeldet sind die Herren Zollinspektor Grabmeyer in Baden-Baden und Gustav Merz, Königsberg/Bayern. Um genaue Adresse wird gebeten. — Mitglied 397 wohnt jetzt in Oellingen b. Ochsenfurt. A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Vereinsl.: Karl Röhr, Heiligerweg 28. Versammlung jeden 2. u. 4. Sonntag im Monat, nachmittags 5 Uhr. Liebhaber herzlich willkommen. J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Rietschelhof", Rietschelstr. 19. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinslokal „Parkhotel", Epinaystr. 1, Versammlung. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an. Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Vogelliebhaber Hamburgs, schließt Euch dem Hamburger Verein für Vogelschutz und -liebhaberei an! Nehmt teil an den billigen Futterbestellungen und an allen anderen Vorteilen, welche Euch dadurch entstehen, daß Ihr in unserem Verein mit anderen wirklichen Vogelliebhabern Hamburgs bekannt werdet. Stärkt durch Euren Beitritt nicht nur unseren Verein, sondern dadurch auch den Reichsverband der deutschen Vogelliebhaber, Sitz Leipzig, e. V., so daß unsere gemeinsamen Interessen durch den Reichsverband genügend gewahrt werden können. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Der Verein bezweckt den Zusammenschluß aller wirklichen Liebhaber einheimischer und fremder Sing- und Ziervögel und bietet auf seinen Sitzungen viel des Vorteilhaften und Interessanten auf dem Gebiete der Stubenvogelliebhaberei. Gäste herzlich willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 5. Mai. Nähere Auskunft durch den Vorsitzenden Arnold Weber, Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber. Nächste Veranstaltungen: Sonntag, den 3. Mai, Beobachtungsausflug nach Alfeld; Besuch der Tierhandlung Ruhe; Wanderung durch den Sackwald und Paradiesgarten nach Freden. Sonntagskarte Alfeld, Abfahrt 9 Uhr, Führer Troschütz. Donnerstag, den 28. Mai: Vereinsabend im Landesheim, 8 1/4 Uhr, Vortrag Dr. Neuwerth: „Mohrrüben-Fütterung". Donnerstag, der 18. Juni: Vereinsabend im Landesheim, 8 1/4 Uhr, Vortrag Böneker: „Australische Körnerfresser". Donnerstag, der 9. Juli: Vereinsabend im Landesheim, 8 1/4 Uhr, Vortrag Klocke: „Mimikry". Alle Mitglieder werden herzlich gebeten möglichst an allen Veranstaltungen teilzunehmen und sich nach Erhalt von Drucksachen und unseres Mitteilungsblattes die Tage gleich unverlierbar vorzumerken. Bei unseren Vereinsabenden freuen wir uns stets über Gäste; jeder möge Mitglieder werben, und zwar nicht nur unter den Vogelhaltern und -pflegern, sondern auch unter Naturfreunden jedes Alters und Standes, die bei unseren Veranstaltungen immer Freude und Belehrung finden werden. Wer unser Mitteilungsblatt nicht regelmäßig bekommt, möge sich in der Geschäftsstelle Königstr. 56, sofort beschweren. Unsere Mitglieder werden bei den in unserem Mitteilungsblatt von den anderen Vereinen angezeigten Veranstaltungen gern als Gäste aufgenommen. — Vereinsbeitrag: Der Beitrag für 1925 ist äußerst niedrig mit 2 M. für jedes Mitglied (Schüler, Jugendliche ohne feste Einnahme und Auswärtige bezahlen nur 1 M.), dazu kommt ein Jahresbeitrag von 1 M. für die Zustellung des Mitteilungsblattes, der aber nur einmal bezahlt wird, auch wenn jemand mehreren der in der Geschäftsstelle zusammengeschlossenen Vereine angehört. Von den auswärtigen Mitgliedern, über deren Zugehörigkeit zu unserem Verein wir uns stets besonders freuen, erhoffen wir einen kleinen jäh

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite)

lichen Zuschuß für die Mehrkosten an Portogeld. Die Verträge werden von der Geschäftsstelle in den nächsten Wochen eingezogen; jeder möge den Betrag zurücklegen, damit der Bote nicht vergeblich kommt, wenn er das Mitglied nicht selbst antrifft. — Sonderbeilagen: Für einen Teil der Mitglieder fügen wir dieser Drucksachensendung je eine Nummer des „Niedersächsischen Jägers" bei, deren Aufsätze weiteste Verbreitung verdienen, und dann eine unserer Werbekarten nach Aufnahmen unseres Vorstandsmitgliedes Dr. Weigold. Wir bitten, diese Karte an Leute zu geben, die für unseren Verein gewonnen werden können. — Futter: In den Sitzungen wird stets etwas preiswertes Futter an Mitglieder abgegeben, und zwar in den nächsten Ameisenpuppen und Körnermischfutter. — Wir haben durch einen glücklichen Zufall einen größeren Posten Eipulver, d. h. haltbares getrocknetes Eigelb, ohne jeglichen Zusatz erwerben können, das — nur von Mitgliedern — zu dem Vorzugspreise von 95 Pf. das Pfd. bei unserem Mitgliede Kirchhoff, Breite Str. 14, abgeholt werden kann. Jeder möge sich recht schnell und genügend eindecken, da eine solche Gelegenheit nicht so leicht wiederkommt. Das Eipulver hat sich als bestes, kräftigstes Zusatzmittel bewährt, und alle Vögel fressen es gern. — Verein zur Erhaltung des Zoo: Eine ganze Reihe unserer Mitglieder sind diesem Verein beigetreten. Einmal unterstützt man die mustergültige Arbeit dieses Vereins, dann erhält man Dauerkarten zum Vorzugspreise. Anmeldungen nimmt unser Mitglied Nr. 153 Gervais gern entgegen. — Anschriften: Anschriftenänderungen und Aufgabe von Gästen, die eingeladen werden sollen, müssen stets sofort an Heinz Appel, Nienburger Str. 7 A I, geleitet werden. — Vorträge: Wer für die Abhaltung bestimmter Vorträge Wünsche hat, möge solche an unser Mitglied Troschütz, Gr. Agidienstr. 4, geben; vor allem mögen sich auch häufiger als bisher solche melden, die, ohne große Redner zu sein, kurz über irgend ein Gebiet aus unserem großen Arbeitsbereich an einem der Vereinsabende sprechen wollen. — Vogelschutz: Wir wollen bei den Laubengartenbesitzern und Siedlern lebhaft für angewandten Vogelschutz werben. Jeder einzelne möge mit solchen in Verbindung treten, uns Anschriften aufgeben und versuchen, die Leitung der in Frage kommenden Fachvereine für Vogelschutzfragen zu gewinnen. Zu Rat, Auskunft und Büchernachweisen sind unsere Mitglieder Nr. 2 Becker, Nr. 7 Troschütz und Nr. 4 Greite stets gern bereit. Wer kann uns da tatkräftig helfen und die richtigen Wege zeigen? Der Vorstand.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, in den Wintermonaten von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Freunde und Gönner herzlichst willkommen. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Vereinsabende regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends) um 8 Uhr beim 1. Vors., Herrn Jahn, Feodorastr. 7. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. A. Voigt.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz und Umgegend. Vereinslokal „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" und „Kanaria". Vogelliebhaber und Gäste sind stets willkommen. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstr. 1, Fernspr. Rheinland 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. Sonntag, ½9 Uhr, im „Thüringer Hof", Klingelpütz 43. Gäste willkommen. — Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg (Pr.). Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 7. Mai 1925. Gäste willkommen. M. Roth, Schriftf., L.-Plagwitz.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Normast im „Kaiser Friedrich", Breslauerstr. 50. Liebhaber willkommen. J. A.: Friedrich.

„A. Z." Magdeburg. Am 22. März 1925 fand die erste Zusammenkunft der Magdeburger Liebhaber exotischer Vögel statt. Von sämtlichen Anwesenden wurde folgende Auffassung vertreten: 1. Ablehnung jeglicher Vereinsbestrebungen; 2. regelmäßige zwanglose Zusammenkünfte; 3. Anregungen, Austausch von Gedanken und Erfahrungen; 4. jeden zweiten Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Tage im „Goldenen Falken" Versammlung. Nächste Versammlung Freitag, den 1. Mai 1925. Freunde und Gönner stets willkommen. Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Monatsversammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstraße. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebendort. Rudolf Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabende aller vier Wochen, in der ersten Woche des Monats verbunden mit Vortrag, in der dritten Woche jedes Monats nur gesellige Zusammenkunft. Vereinslokal „Sächsischer Hof". Gäste stets willkommen. Studienrat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jedes Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Bekanntmachung.

Der Unterzeichnete beabsichtigt in nächster Zeit einen **Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei Coblenz und Umgebung** zu gründen. Der Zweck dieses Vereins ist in hinreichendem Maße in dem Namen des Vereins klargestellt. Augenblicklicher Hauptzweck jedoch soll es sein, durch die Kraft des Zusammenschlusses Einfluß auf den Ausbau des Naturschutzparkes Coblenz, Oberwerth, der durch die Stadt errichtet wird, zu gewinnen. Denn wenn dieser Naturschutzpark so verkultiviert wird wie unsere Rheinanlagen, dann können wir bald unsere Nachtigallen und andere Sängerfürsten suchen gehen. Durch die Gründung dieses Vereins würde am Mittelrhein ein starker Stützpunkt für unsere Interessen entstehen. Interessenten bitte ich darum, mir ihre Adresse und diesbezüglichen Wünsche mitzuteilen. Ich werde jedem persönlich antworten, durch Brief oder auch durch Besuch, wenn angenehm. In Bälde hoffe ich dann die Gründung des Vereins ins Werk zu setzen. Heinrich Groebel, Coblenz a. Rh., Löhrstr. 14.

Achtung! Am 15. d. M. erhebt die Post die Bezugsgebühr für Juni. Wir bitten den Betrag bereit zu halten, damit die Quittungen beim ersten Vorzeigen eingelöst werden und keine Unterbrechung in der Belieferung eintritt. Wo der Briefträger die Quittungen nicht vorzeigt, ist er daran zu erinnern. Bei Bestellung nach dem 25. erhebt die Post eine Extragebühr von 20 Pfg., die vermieden werden kann, wenn die Zeitschrift rechtzeitig bestellt wird.

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Vogel-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50. **Schlagnetze** f. kl. schädl. Vögel M. 2,30, f. gr. M. 2,50 u. 2,80. **Katalog gratis.** **J. Tannen, Gronau 58,** Westf. [593

Vogelfutter [594

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Universalfutter I

für Rotkehlchen, Nachtigallen, Grasmücken, Sprosser
Kilo 2 *M*. [595

Universalfutter II

für Drossel, Amsel, Stare
Kilo 1.50 *M*.
Vom Besten das Beste empfiehlt
Gebel, Köln, Jakobstraße 8.

Mehlwürmer

à Pfund 5 *M*, bei 6 Pfund Porto und Verpackung frei.
Ia Weißwurm . . . à Pfd. 5 *M*
Ia Muska-Zecken . . à „ 2,50
Ia Seidenraupenpuppen,
gemahlen . . . . à Pfd. 0,75
Ia Garnelen, gem. à Pfd. 0,40 *M*

Ia Universalfutter.

Alleskwa I für Nachtigallen 2.— *M*
„ II für **Grasmücken** 1.80 *M*
„ III für **Drosseln** 1.50 *M*
Proben und Analysen zur Verfügung. Vertreter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [596
Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
A. Eckrich II., Waldsee (Pfalz).

Mehlwürmer

vegel. gez., 1/4 Liter franko gegen Vor-
597] einsendung von Mark 2.—.
Bonitas-Versand, Rostock i. M. 3.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [598

Frische Ameisenpuppen, die ersten, à Ltr. 4.40
bei Voreinsendung.
Ameisenpuppen . . . Pfund 6.—
Weißwurm . . . . Pfund 5.—
Muska (Zecke) . . . . Pfund 2.—
Muska, Postkolli franko . . . 15.—
Mein Weichfutter „Primus" ist bisher von keiner anderen Qualität übertroffen worden. Pfund 2.50 M.
Weichfutter „Ornis" . Pfund 0.80
Koldenhirse . . . . Pfund 1.60
Senegalhirse . . . . Pfund 0.50
Algierhirse . . . . Pfund 0.60
Mohairhirse . . . . Pfund 0.60
Silberhirse . . . . Pfund 0.60
Marokkohirse . . . . Pfund 0.40
Kokos- und Agavefasern, Pfund 1.50
Exotennester . . . . à 1.50
Wellensittichnistkästen, aus Naturstamm ausgebohrt, à 1.75 M.
Wellensittichringe, gedreht in 4 Farben, 100 Stück 4.— M.
Milbentangen, à 0.20

E. W. Lenger, Berlin N 58
Schönhauser Allee 70 a [599
Postscheck Berlin 88386

600] **Mehlwürmer,** reine Ware, gegen Eins. von 1.75 *M* 1/4 Pfd. franko. **Th. Witte,** Niederndodeleben b. Magdb.

Züchterwaren

Verbesserte L. K.	1/2-Kilo-Paket R.-M.	1,40
Rübsen, selten schöne Züchterware	1/2-Kilo „	0,50
Glanz, Marokko großkörnig	„ „	0,50
Hanf, deutscher	„ „	0,35
Hafer, geschält	„ „	0,35
Lein- und Negersaat	„ „	0,45
Ital. Silberhirse	„ „	0,45
Blau-Mohn, Speiseware	„ „	0,80
Marokko-Hirse	„ „	0,30
Prima Mischfutter für Kanarien, eigenes Verfahren	„ „	0,50
Waldvogelfutter	„ „	0,45
Sonnenrosenkerne, gestr.,	„ „	0,35
Salatsamen, weiß,	„ „	1,50
Sepiaschalen, große Stücke	„ „	1,50
Einäpfchen aus Glas	Stück „	0,10
Futternäpfchen aus Glas	„ „	0,15

Piep und Piep extra zu Originalpreisen.
Vereine und Großbezieher verlangen Sonderofferte. [601

Lorenz, Dresden, Drehgasse 5.

Achtung! Liebhaber!

Ia Ameiseneier

Pfund 6,— M.

Ia Muska,

verlesen, Pfund 2,50 M.

Empfehle mein bekanntes Weichfutter
Pfund 80 Pfg., prima 1,50 M.

Von heute ab täglich frische Ameiseneier auch Versand. [602

Paul Gruhn
Zoologische Handlung
Berlin NW, Ottostr. 8.
Fernsprecher Hansa 390.

Suche zu kaufen: [603

0,1 Singsittich, 0,1 Pennantsittich.
Evtl. gebe für jeden Vogel 1 Zuchtpaar **Nymphensittiche** in Tausch.
Fabrikdirekt. R. Aumüller, Delitzsch.

Prima Harzer

Kanarien-Sänger

(Stamm Seifert)

mit schöner Hohlrolle, Hohlklingel, Schockel, Knorre, Glucke und tiefen Pfeifen, à 12, 15 u. 20 *M*, Weibchen à 3 u. 4 *M*. Versand geg. Nachnahme. Probezeit 6 Tage, was nicht gefällt, tausche um. [604

H. Voigt,
Kanarienzüchter,
Nordhausen am Harz.

Junge Italiener Landhühner, beste Legetiere, 3—4 Monate alt, kerngesund, p. Stück 3 *M*. Garantie, gute Ankunft. Geflügelpark **M. J. Breuer, Elmpt** bei Brüggen (Rhld.) [605

AFFEN - PAPAGEIEN

Senegalvögel usw.
Anfragen gegen Rückporto. [606
Willer, Altona, Kirchenstraße 34.

Gesucht

ein zahmes 2—3 jähriges
Feldsperlings-Weibchen
zu einem Zuchtversuch mit dem
Albino-Männchen
der gleichen Art. [607

Zoologischer Garten Frankfurt a. M.

Ia Wellensittiche, 2,0 gelbe und 0,2 grüne, zus. *M* 20, ohne Verp. ab hier, **Gr. Gelbhaubenkakadu** *M* 55, ohne Verp. ab hier, **Neunzig, „Fremdl. Stubenvögel"** 5. Aufl., völlig neu, Leinenband, *M* 30 franko. [608
Ludwig Weitzel, Frankfurt a. M.
Neuenhainer Straße 24, III.

Suche

Wellen- u. ä. Sittiche.

Gebe ab, evtl in Tausch: 4,12 Kanarien, Zeisig, Stieglitz, Rotkehlchen, Sportstiefel.
Wilh. Binder, Schwäb. Hall,
Brückenhof 3. [609

Schamadrosseln

in Ia Exemplaren sind wieder in größerer Auswahl eingetroffen, abgehörte Sänger 70.— M.

Grüner Kardinal	40.—
Roter Kardinal, Männchen	25.—
Roter Kardinal, Weibchen	30.—
Spottdrossel	40.—
Blauspötter	35.—
Klarinettenvogel	60.—
1 Flötenwürger, fleißig rufend	40.—
Ind. Grauwürger	20.—
Ind. Maskenwürger	20.—
1 Würgerschnäpper	30.—
1 Borstenhäherling	20.—
1 Blaubartblattvogel, prima	60.—
1 Braunscheiteltimalie	30.—
Schwarzschwanzsteinschmätzer, sehr fleißig im Gesang . . Paar	55.—
1 Schamaweibchen	50.—
1 Schopfwachtelweibchen	20.—
Francolinwachteln . . . Paar	28.—
Wellensittiche, erstklassige Zuchtpaare, grün und gelb, Paar	16.—
Katharinasittiche . . . Paar	30.—
Kubasittiche . . . . Paar	30.—
Japanische Möwchen . . Stück	3.—
Braunkopfammern . . . Stück	5.—
1 Indigofinkweibchen . . .	10.—
Dreifarbige Nonnen . . Paar	18.—
Weißkopfnonnen . . . Paar	18.—
Reisfinken . . . . Paar	6.—

Porto und Verpackung M. 3.50, als Dringend M. 6.50. Versand Nachnahme.

E. W. Lenger, Berlin N 58
Schönhauser Allee 70 a [610

Mehrere Pärchen

Schneeweiße Kanarien,

teils mit blaugr. Haube, gesunde, starke, brutreife Tiere, auch einzeln, abzugeben.
Rich. Heydenreich,
Bad Suderode, Harz. [611

Verkaufe:

1 hübschen sauberen weißen **Kakadu,** 80 M., **1 großen Arara,** 180 M., **1 Amazonenpapagei** für nur 60 M.
1 kleines Zwergäffchen, 65 M.
A. Alberts, Hamburg 19,
Fruchtallee 1. [612

Offeriere in gesunden und fehlerfreien Exemplaren: Vollständ. zahme Mangaveo Affen 70 *M*, Mohrenkopfpapageien St. 25 *M*, Elfenbeinsittiche P. 35 *M*, zahme Eichhörnchen (Zentral-Amerika) à 25 M. 613] **A. Fluck, Bremen,** Knoopstr. 39.

Offeriere hiermit freibleibend!

Schamadrossel, Männchen Stck.	55.—
Weibchen „	55.—
Langschwanzglanzstare „	11.—
Rote Arara, Prachtgefieder „	200.—
Graupapageien, fingerzahm „	95.—
dito. etwas sprechend „	75.—
Gelbnackenamazonen „	75.—
Doppelgelbkopf „	75.—
Blaustirnamazonen, gut sprechend . . . . Stck.	75.—
Kleiner weißer **Gelbhaubenkakadu,** fingerzahm u. sprechend Stck.	75.—
Grüne Wellensittiche, Zuchtpaare . . . . Paar	15.—
Gelbe Wellensittiche, Zuchtpaare . . . . . Paar	15.—
Astrilden . . . . „	3.5
Amaranten . . . . „	3.5
Silberschnäbel . . . „	3.5
Schönbürzel . . . „	5.—
Elsterchen . . . . „	5.—
Schmetterlingsfinken „	3.5
Atlasfinken . . . . „	3.5
Bandfinken . . . . „	4.—
Grauedelsänger, ohne Geschlechtsgarantie . . . . Paar	5.—
Rote Kardinäle, Männch. Stck.	25.—
Weibch. „	25.—
Mossambikzeisige . . Paar	6.—
Weber, grau . . . . „	3.—
Dominikanerwitwen . „	6.—
Kanarienrollen Stck. 12.— bis	15.—
Zuchtweibchen . . . Stck.	3.—

Bei Anfragen Rückporto.
Tierhandlung
Max Kleinert
Berlin NO 18, Strausberger Str. 1
Fernruf Alexander 3313. [6

Vertausche

2 Schwarzplättchen, Gebirgsvög 1 Jahr gekäfigt, Ia Überschläger, laut Schlag, sowie **1 roter Kardin** Prachtvogel, in vollem Gesang, 30 franko, tausche ev. alle 3 Vögel ge **1,0 Schamadrossel.** [
R. Diwersy, Merzig a. Sa
A. Z.-Mtgl. 183.

Vorjährige im Freien gezüch. **Wellensittiche** abzugeben, à 5 M. Darun 4 nicht verwandte Paare. [
Freiherr v. Berlepsch,
Burg Seebach, Kreis Langensal

2 Bände Gef. Welt

1901 u. 1903, geb., à Band 7 *M*, abzugeben [7
P. Bergmann, Köln a. Rhei
Pfälzer Straße 10.

Beschwerden wegen Nichtzustellung der „Gefiederten Welt" sind beim zuständigen Postamt zubringen.

Inserate

für das am 7. Mai 1925 erscheinende Heft 19 der Ges. Welt erbitten bis 2. M.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdeb.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 7. Mai 1925 | Heft 19

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Gelbspötter.

Von Paul Schwarz, Leipzig.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Eine unangenehme Sache in der Spötterpflege sind die Oktober-, mehr noch die Novembertage. Da sitzt der Vogel in traurigster Gestalt am Futternapf, stochert zuweilen darin herum und frißt doch nichts. Rat- und tatlos sieht der Vogelwirt diesem Treiben zu und weiß nicht aus noch ein. Solche Monate waren früher für mich die freudlosesten und sorgenreichsten. Da konnte es geschehen, daß man den Vogel mit Würmern verwöhnte zu beiderlei Schaden, wie ich es vorher gesagt habe. Und nichts ist doch einfacher für mich geworden, als das Hinüberbringen über diese dunkle Zeit meiner Liebhaberei. Viele Liebhaber scheuen die Ausgabe für frische Ameisenpuppen. Sie füttern all die Tage, die werden, Mischfutter, vielleicht versetzt mit einem Teile Puppen. Andere wieder, ich habe es mir viele viele Male erzählen lassen, möchten wohl blank füttern und tun es nur um deswillen nicht, weil sie glauben, der Übergang von der Blankfütterung zur anderen gestaltet sich schwierig. Beides sind die Übel, deren Früchte in der traurigen Gestalt geerntet werden. Wir Menschen ahnen nur den geringsten Teil von dem Kräftezustrom, der durch das Idealfutter, die Ameisenpuppen, dem kleinen Körper zugeleitet wird. Er äußert sich wohl im Gesange, im Wesen des Vogels und in der Mauser, also sichtbar; was aber dem menschlichen Auge verborgen im Vogelkörper für Veränderungen, Verbesserungen und Erneuerungen sich vollziehen, werden wir nicht wissen. Neben all diesem ist es dem Vogel auch noch möglich, ein Bäuchlein zu bekommen, nicht durch Überfressen, sondern durch Ausnützung des gebotenen Idealfutters. Dieses Bäuchlein im August betrachte ich, wenn die frischen Puppen zur Neige gehen, mit besonders liebevollen Augen, weil es mir jetzt schon sagt, daß ich gewonnenes Spiel habe. Die Einfütterung ins Mischfutter ist unter Zuhilfenahme der restlichen Puppen und einer begrenzten Würmerzahl nicht schwierig. Der Leibesumfang des Pfleglings nimmt wohl durch die Einfütterung und den beginnenden Zug etwas ab, aber nur bis zu einer gewissen Grenze, die eingehalten wird für eben die trübe Zeit. Ist die vorüber, dann geht es an die weitere Entfettung als vorbereitende Maßnahme für die im Januar bis Februar beginnende etwa achtwöchige Mauser beim Frischfang, oder die ungefähr drei- bis vierwöchige beim überwinterten Vogel. Dieser Federwechsel geht glatt vonstatten, wenn alle Voraussetzungen hierfür gegeben sind. Das will besagen, der Vogel muß normal genährt sein. Fett verhindert den Federausfall und den Eintritt der neuen Federn stets, zu magere Vögel besitzen nicht die Kräfte zur Gefiedererneuerung. Diese hindernden Umstände müssen auf jeden Fall erst beseitigt werden, ehe mit Erfolg auf den Vorgang gerechnet werden kann. Der Federwechsel magerer Vögel bereitet dem Pfleger immer mehr Kopfschmerzen als der der gegenteiligen, weil es nicht allzu leicht ist, durch Futterumstellung die Wohlgenährtheit zu erzielen. Ferner gehört zu den nötigen Voraussetzungen für den glatten Verlauf der Mauser unbedingte gleichmäßige trockene Zimmertemperatur. Auf diesem Umstand kann nicht genug hingewiesen werden. Fett, Unterernährung und das Fehlen dieser Voraussetzung ist fast immer die Ursache, weswegen der Eintritt des ersehnten Vorganges unterbleibt, der ohne Ausnahme das Eingehen dieses zarten Tieres besiegelt. Ohne sich über die Folgen des Federziehens im klaren zu sein, wird aus Ungeduld leichtsinnigerweise zu diesem Mittel in dem Glauben gegriffen, das erreichen zu können, was bisher vergeblich erhofft wurde. Wie sieht aber der Erfolg aus. Da sitzt der Ritter mit der traurigen Gestalt, der vordem noch so frisch und munter von Stange zu Stange sprang. Er sieht aus, als wollte er und kann nicht. Und so ist es. Wo soll das Tier die Kraft hernehmen, wenn in ihm selbst kein Fünkchen davon steckt? Das nach und nach ausgezogene Großgefieder wird durch Nachwuchs ersetzt, dem man auf den ersten Blick ansieht, daß er künstlich hervorgerufen worden ist. Und das Kleingefieder? Es haben sich aus der Praxis zwei Möglichkeiten ergeben. Einmal die, daß die künstlich eingeleitete Mauser des Großgefieders nach Beseitigung der Hinderungsgründe auf das Kleine übergegangen ist mit dem Ergebnis: Nach Beendigung dieses Vorganges sieht das Gefieder des Vogels wie ein Besen aus. Sorgsame Pflege ermöglicht es unter Umständen, den seiner besten Kräfte beraubten Vogel bis in die Zeit zu erhalten, in der

es frische Puppen gibt. Hat der Vogelwirt das erreicht, dann wird er ausschließlich blank füttern solange, als es irgend geht und den Fehler wettzumachen suchen. An Gesang wird natürlich kaum gedacht werden können, hierfür besteht sehr wenig Aussicht. Die zweite Möglichkeit, und zwar die nicht seltene, ist die, daß sich die künstliche Großgefiedermauser nicht auf das kleine Gefieder überträgt. Dann ist guter Rat teuer. Mir ist nicht bekannt, daß ein von diesem Mißgeschick betroffener Liebhaber sein Sorgenkind hinüberretten konnte ins zweite Jahr.

Diese angeführten Übelstände in der Spötterpflege sind vornehmlich Erscheinungen des ersten Jahres der Käfigung. Ich halte es deshalb für angebracht, auch einige Worte für die Eingewöhnung des Frischfanges zu sagen, weil die Gewöhnung von weittragender Bedeutung auf den Vogel im ersten Käfigjahr und der Schlüssel zum Erfolg ist.

Der Fang des Spötters muß unmittelbar nach seiner Ankunft erfolgen, wenn es später erst geschieht, ist das Brutgeschäft zu weit vorgeschritten, es schadet diesem. Überdies ist der eingebrachte Vogel kaum zur Fortsetzung seines Gesanges zu bringen und dadurch dem Liebhaber die Feststellung unmöglich, ob er ein käfigungswertes Tier erworben hat. Der Frischfang kommt sofort in den von mir früher schon beschriebenen Eingewöhnungskäfig mit dem Beobachtungsloch in der Rückwand und verbleibt so lange darin, bis der Pfleger durch fortgesetzte Beobachtung die Gewißheit der Futteraufnahme gewonnen hat. Das dauert in der Regel nicht länger als einen Tag. Als Futter erhält er halb Medizin, halb Mehlwürmer geboten. Ergibt sich, daß der Vogel den Würmern zugesprochen hat, wechselt er sein Gelaß mit dem sogenannten Absingkäfig, der in seinen Ausmaßen ebenfalls bekannt ist und verdeckt einen hellen Fensterplatz angewiesen bekommt. Dort verbleibt er so lange, bis der Insasse abgesungen hat. Während dieser Gesangszeit erfolgt die Fütterung ausschließlich blank mit frischen Ameisenpuppen. Die Gewöhnung an dieses Futtermittel geschieht in der Weise, daß die ersten zwei Tage zerschnittene und lebende Mehlwürmer unter die Puppen vermischt werden. Es wird dadurch bewirkt, daß beim Fressen der zerschnittenen Würmer auch Ameisenpuppen mit verspeist werden, die der Vogel, wenn er erst hinter den Geschmack gekommen ist, gern frißt. Die lebenden Würmer wiederum machen das Futter beweglich und üben einen Anreiz auf die Freßlust des Pfleglings aus. Bei dieser Fütterungsweise gedeiht der Vogel ausgezeichnet, er läßt es im Gesang nicht fehlen und kommt dann die Zeit der Ruhe, da präsentiert er sich mit einem wohlgenährten Bäuchlein. Ohne Schaden wird er Zug um Zug mit seiner Umgebung bekannt gemacht, um nach dem Vertrautsein seinen eigentlichen Käfig, für den im Innern der Stube bereits ein geeigneter Platz gewählt worden ist, zu beziehen. Etwa vier Wochen nach diesem Umzug wird es an der Zeit sein, mit der Umfütterung zu beginnen, die in der Weise vor sich geht, daß nach und nach den frischen Puppen ein kräftiges nahrhaftes Mischfutter beigemengt wird, bis ungefähr vierzehn Tage später der Umfütterungsprozeß erledigt ist. Würmer reiche ich nunmehr wieder reichlicher, etwa dreißig bis vierzig Stück von meiner Medizin. Wasser wird dem Vogel sowohl bei Blank- wie auch bei Ersatzfütterung gereicht. Ich erwähne das deshalb besonders, weil empfohlen wird, bei Puppenfütterung die Darreichung von Wasser einzuschränken oder ganz zu unterlassen. Die Wurmgabe hat den Zweck, dem Vogel den Fettansatz zu erhalten, die eintretende Zugzeit wird eine übermäßige Verfettung nicht aufkommen lassen. Fettansatz ist auch deshalb erwünscht, weil für die Monate Oktober bis November Vorsorge für eine Erhaltung der Lebensenergie zu treffen ist. In der zweiten Hälfte des Dezember kann dann die Wurmgabe zur Erreichuug normaler Körperbeschaffenheit verringert werden. Bis der Fettansatz vollständig verschwunden ist, ist die Zeit vergangen und der Beginn der Mauser steht vor der Tür. Es ist unerläßlich, den Vogel dauernd zu beobachten, auf die Temperatur im Zimmer zu achten und den Vogel Ruhe zu lassen. Bereits vorm Durchbruch des Federwechsels wird er nicht selten mit seinem Gesange einsetzen und ihn kaum unterbrechen, solange der Federwechsel normal verläuft. Während des letzteren, der an den Pflegling starke Anforderungen stellt, können dreißig Stück Mehlwürmer ohne Bedenken verabreicht werden. Mit dieser Fütterungsweise wird fortgesetzt bis Ersatz durch frische Puppen geschaffen werden kann.

Ein in dieser Weise verpflegter Vogel besprochener Art wird kein Sorgenkind sein, sondern dem Pfleger ebensolche reine Freude bereiten, wie seine anderen gefiederten Stubengenossen.

Um einen Überblick zu haben, woran es bei der Spötterpflege ankommt, fasse ich die oben angeführten Hauptmerkmale zur erfolgreichen Spötterpflege in folgende Punkte zusammen: 1. zweckentsprechende Käfigung; 2. Reinlichkeit; 3. schwache Sprungstangen; 4. gleichmäßige, trockene Zimmertemperatur (das ist das A und O überhaupt); 5. nahrhaftes Futter, vor allem Würmer; 6. fortgesetzte Beobachtung der Körperbeschaffenheit; 7. Möglichkeit zur hinreichenden Sättigung während der langen Abende der Monate Oktober bis etwa Mitte Februar und 8. Beseitigung jedes Fettansatzes oder Herbeiführung normaler Körperbeschaffenheit vor der Mauser.

Zwar sind das alles Dinge, die vom Liebhaber bei der Vogelpflege überhaupt vorausgesetzt werden müssen und die vom ernsten Menschen selbstverständlich auch beobachtet werden, der zarte Gelbspötter aber reagiert, wenn nicht sofort, dann aber gewiß früher oder später auf jeden kleinen Fehler, jede geringfügige Unterlassung, was bei der oder jener anderen Art nicht der Fall ist. Man hüte den Vogel so, als wäre es die feinste Präzisionsmaschine, dann werden die Erfolge nicht ausbleiben.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

In Heft 10 des laufenden Jahrganges hatte Herr Spille mit Befremden festgestellt, daß sich so wenig Liebhaber für die so anmutigen und zierlichen fremdländischen Täubchen interessieren. Er weist darauf

hin, daß sie bei guter Eingewöhnung harte Vögel seien, die recht gut in Außenflugräumen aushalten, zahm werden und daß eine ganze Reihe von Arten leicht zur erfolgreichen Brut schreitet. Eine der besten für Züchtungsversuche ist die von Lenger in den Handel gebrachte (s. Abb. S. 191)

Senegaltaube — Turtur senegalensis *(L.)*.

Sie nistet sehr ergiebig, und in dem Außenflugraum des Vogelhauses des Herrn Wiese brachte es ein Paar in der Zeit von Ende Juni bis Ende November auf acht Bruten, von denen allerdings einige verunglückten bzw. verhindert wurden. Dabei kommt es allerdings vor, daß ähnlich wie z. B. beim Zebrafinken eine schon im Gange befindliche Brut oder selbst Nestjunge verlassen werden, weil der außerordentlich rege Fortpflanzungstrieb den Alten keine Ruhe zum Brüten läßt und sie veranlaßt, ein neues Nest zu bauen. Das Nest ist nach Taubenart ziemlich nachlässig aus kleinen Reisern und einzelnen Halmen in einer Astgabel gebaut und es ist infolgedessen nötig, daß der Pfleger das Nest in geeigneter Weise sichert, indem er ein über einen kleinen Holzreifen gespanntes Nest darunter befestigt und am besten durch Darbietung von vielen Nistgelegenheiten, wie flachen Kistchen, kleinen runden Korbdeckeln, Drahtnestern, die man in Astgabeln, an Wänden oder sonst geeigneten Plätzen anbringt, dafür sorgt, daß die Täubchen gar nicht erst den Versuch machen, ein freistehendes Nest ohne feste Unterlage zu bauen. Die Senegaltäubchen sind außerordentlich lebhafte Vögel. Sie fliegen und laufen viel auf dem Boden umher, sind wenig scheu, werden sehr zutraulich und, wenn sie nisten sogar dreist. Mit anderen Vögeln sind sie im allgemeinen verträglich, nur zur Brutzeit sind manche Paare, nicht alle, gegen andere Tauben, besonders der gleichen Art oder etwa vorhandene selbständige Junge vorhergehender Bruten, unverträglich. Diese müssen aus dem Raum, in welchem das alte Paar brütet, entfernt werden.

Gelbspötter.

Die Ernährung der Turteltauben muß mannigfaltig und abwechslungsreich sein. Verschiedene Hirsearten, Spitzsamen, Rübsen, Raps, Mohn, Buchweizengrütze, feines Maisschrot, kleiner Weizen werden von ihnen verzehrt, aber auch allerlei Kerfe und deren Larven, besonders frische Ameisenpuppen, kleine Regenwürmer, kleine Nackt- und Gehäuseschnecken. Als Ersatz nehmen sie gequollene trockene Ameisenpuppen, Drosselfuttergemisch und kleine oder zerschnittene große Mehlwürmer an. Kleingeschnittenes frisches Grün (Vogelmiere, Salat, Spinat, zarte Kohlblätter) sollte nie fehlen. Neben diesen Futtermitteln können zur Aufzucht der Jungen auch gekeimte Samen der genannten Arten geboten werden.

Gefiederbeschreibung: ♂ Kopf, Hals, Brust bräunlich weinrot; Kropfband aus gegabelten Federn gebildet schwarz, rotbraun gefleckt; Vorderrücken, Schulter rotbraun, Hinterrücken, Bürzel grau; grau bestäubt sind auch die braunen Oberschwanzdecken; Kinn weißlich; Bauch, Unterschwanzdecken weiß; Weichen grau; innerste Flügeldecken rotbraun oder graubraun mit rotbraunen Säumen; übrige und Armschwingen grau; Handschwingen schwarzbraun; Unterflügeldecken grau; mittlere Schwanzfedern braun, grau bestäubt, andere schwarz, am Ende weiß; Auge braun bis orangerot, Lidrand karminrot; Schnabel schwarz; Füße wein- bis karminrot; ♀ an Kopf und Hals heller. Lg. 240—285, Fl. 130—145, Schw. 110—125 mm.

In bezug auf ihren Wohnsitz ist diese Taube nicht wählerisch. „Sie nistet in Städten und Dörfern, namentlich in verfallenen Wohnungen, Ruinen, Friedhöfen, Mauern und Gärten, bevölkert die Sykomoren, Straßen, Dattel-, Baumwoll- und Olivenpflanzungen, Akazienhaine und Tamariskengruppen" (Heuglin). Man findet sie auf der Karawanenstraße, an den Wüstenbrunnen, auf Flußinseln, an Lagunen, am Rand der Wüste und im Urwald. Ihre Verbreitung erstreckt sich über das ganze äthiopische Tiergebiet, Arabien und Palästina. Eine sehr ähnliche Form lebt in Südosteuropa, West- und Mittelasien, Indien.

Ein wesentlich beschränkteres Verbreitungsgebiet bewohnt die

weinrote Turteltaube — Turtur vinaceus *(Gm.)*.

Westafrika vom Senegal bis zum Niger und Nordostafrika ist ihre Heimat (s. Abb. S. 193). Sie ist sehr selten nach Europa gelangt und kam zuerst im Jahre 1858 in den Zoologischen Garten zu London, wo sie auch gezüchtet wurde. Auch sie kommt, wie Emin Pascha in seinem Tagebuch berichtet, in die Häuser und ist wenig scheu. Nur wenn sie, wohl zur Brutzeit, paarweise umherläuft verliert sie ihre Zutraulichkeit und geht dem Menschen aus dem Wege. „Sie bewohnt den lichten Steppenwald und die eigentliche Steppe, kommt aber auch auf die Felder", und hier vereinigen sie sich oft zu großen Schwärmen, in denen auch andere Arten vor-

kommen. Auf der Erde bewegt sie sich gewandt und zierlich, der Flug ist schön und leicht. Beim Aufgehen klatschen sie mit den Flügeln. Der Ruf ist dem der Lachtaube ähnlich, nur sanfter und nimmt sich besonders von fern sehr gut aus. Häufig hört man sie mitten in der Nacht rufen.

In der Gefangenschaft dürfte sie sich kaum wesentlich von der vorigen Art und wohl auch von der gemeinen Lachtaube unterscheiden, nur daß sie an die Ernährung höhere Ansprüche stellt als die letztere und in dieser Beziehung vermutlich mit der Senegaltaube übereinstimmt. Ob sie ein ebenso guter Vogel für Züchtungsversuche ist wie jene, muß die Erfahrung zeigen. Jedenfalls ist sie in ihrem zarten Gefieder ein ausnehmend schönes Täubchen.

Gefiederbeschreibung: ♂♀ Kopf, Hals hell weinrot, Stirn heller, Hinterkopf schwach grau verwaschen; Kinn, Kehle weißlich; Zügelstreif, breites Nackenband schwarz, letzteres oben weiß gesäumt; Rücken, Schultern rotbraun; Bürzel, Oberschwanzdecken grauer; Bauchmitte, Steiß, Unterschwanzdecken weißlich; innere Flügeldecken, Armschwingen rotbraun; äußere hellgrau mit hellen Säumen; Afterflügel, Handdecken schwarz; Armschwingen graubraun, Handschwingen schwarzbraun mit schmalen hellen Rändern; Unterflügeldecken tiefgrau; mittlere Schwanzfedern erdbraun; nächstes Paar blaugrau, nach der Spitze zu weißlich, Innenfahne am Grunde schwarz; übrige am Grunde schwarz, Spitzenhälfte weiß, äußerste jederseits mit weißem Außensaum; Auge hellkastanien- bis rotbraun; Schnabel schwarz; Füße weinrot bis rot; Lg. 250, Fl. 132—154, Schw. 132 mm. (Fortsetzung folgt.)

Der Bluthänfling.

Von Karl Finck, Neukölln.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der Mond ging auf, über Wälder, Heide und Moor breitete sich helles Silber aus. Die Süßkirschen hatten vielfach schon Früchte angesetzt, selbst die Blüte der Sauerkirschen war beinahe beendet, einzelne frühe Apfelsorten begannen ihre keuschen Blumen zu öffnen, dafür standen viele Pflaumen- und Birnbäume noch in strahlender Schönheit, still und feierlich.

Geraume Zeit saß ich auf einem Prellstein, hörte dem Nachtigallenkonzert zu und konnte mich an Herrlichkeiten nicht satt sehen.

Schlummernd lagen Wies' und Hain,
Jeder Pfad verlassen;
Niemand als der Mondenschein
Wachte auf den Straßen. Lenau.

Vorsichtig, mit ruhigen Schritten ging es weiter, durch Roggen- und Kartoffelschläge. Auf den Wiesen ästen Rehe, sicherten eine Weile und trollten dann dem Holze zu.

Die Uhr des Dorfkirchleins schlug zwölf wuchtige, lang hinhallende Schläge. Schüchtern raunte der Föhrenwald ein Märchen von Lenzglück. In dem Dunkel der Bestände blitzten Mondstrahlen auf, verursachten hier wundervolle Reflexe, hoben dort das zarte Astwerk der Birken plastisch vom Hintergrunde ab, versilberten die weißen Stämme, und das Wasser der Tümpel wallte bei jedem Luftzug wie flüssiges Metall.

Nur weit im Osten, wo das Moor verdämmerte, standen finstere Wolken, schwebten über die beinahe grenzenlose Ebene hauchartige perlmutterfarbige Schleier, vielfach von gelben Dämpfen unterbrochen, die zeitweise purpurrot oder bläulich aufflammten, sich zusammenballten, gespensterhaft um einsame Weiler tanzten, Wachholder- und Baumgruppen einhüllten und schließlich aufsteigend in lauter Gold und Silber zerflatterten. Lange stand ich vor der Jagdbude und blickte in die weltferne Schweigsamkeit hinein.

Leise, unhörbar strich der Waldkauz die Rohrwände entlang, ergriff blitzartig eine Wasserratte, die dort ihr Wesen trieb. Kurze schrille Todesrufe ertönten. Drüben, auf dem alten Überständer, kröpfte der Räuber die Beute; aber nach wenigen Minuten schrillte sein teuflisches Gelächter aus den nahen Erlenbrüchen.

Ohne Unterbrechung rumorten die Frösche.

Mond und Mitternacht zogen über Geest und Moor.

Sanft lullten Heidelerchen, zart innig, wie das milde Licht der Mondscheibe, weh, voll Ergriffenheit, wie die feinen, herben Schönheiten der armen entsagungsvollen Heide.

Nun brach aus der Kieferndickung eine Rotte Wildschweine, durchschwammen den dicht mit Rohr umrahmten Wasserarm, um nach den Äckern zu wechseln.

Ein toller Spuk entstand. Entsetzt plärrten Wildenten los, kleine Vögel stoben ab, Kiebitze schrien, selbst der Eichelhäher im Neste erwachte, warnte laut. Im Sumpfe nahmen Kraniche die Signale auf, trompeteten hell, weithin hörbar. Auch die große Rohrdommel mischte ihr dumpfes „Hebumrumbum-hebump" dazwischen, überall lärmten nun Artgenossinnen, die Aufregung wurde immer größer und verklang nur langsam.

Ermüdet schlief ich ein. Als ich erwachte klomm der erste lichte Schein hoch, rötliche Streifen überzogen immer mehr die eine Hälfte des Horizontes, während der andere Teil noch in dunkle Tinten schwamm.

Schon quoll vom Himmel fröhlicher Lerchenjubel, Rotschwänzchen begannen zu klirren, irgendwo sang eine Amsel ihr heimwehkrankes Morgenlied.

Freundlicher erschien das Braun des Moores, die Wiesen nahmen grüne Farbe an, Bäume und Sträucher wurden sichtbarer, nun ging die Sonne auf, brandrot glühte das Gewässer, und auf einmal wallten goldene Lichtstrahlen über die moorige Einöde und das Heidegebiet. Der nebelige Wasserdampf zerstob immer mehr, und die Ferne verlor sich in duftiges Schattenspiel.

Laut, zuversichtlich begannen Drosseln zu schlagen, weich zitterte das Stimmchen des Titis, fröhlich zirpten Meisen, Rotkehlchens inniges Lied erklang, lustig schmetterten die streitlustigen Buchfinken ihre Fanfaren, Wildtauben gurrten, hoch in der Luft schrie ein Bussard, dazwischen tönte das Flöten des Pirols und der Kuckuck rief unaufhörlich seinen Namen.

Aber in Fichten- und Föhrendickungen, ebenso an den ganz von Hundsrosen, Faulbeerbüschen, Brombeeren, Holunder, Weißdorn und Salweiden bedeckten Abhängen, hielten Bluthänflinge eine gemeinschaftliche Frühandacht ab, nicht lange zwar, da die Zeit kostbar ist, wenn junge Brut nach Nahrung schreit. Bald sah man das emsige Hänflingsvölkchen eifrig Futter suchen. Immer jedoch fanden die Hähne einige freie Minuten, um fröhlich und sorglos ihre flötenden einschmeichelnden Melodien erklingen zu lassen.

Mit zitternden Flügelschlägen flog junges, flügges Meisenvolk bettelnd von Zweig zu Zweig den Alten nach. Nebel-, Raben- und Saatkrähen belebten die Wiesen. Hurtig liefen Bachstelzen über Torfbrocken; ich fand in wenigen Minuten fünf Gelege. Ebenso häufig trat das Braunkehlchen auf; fleißig stümperte der Wiesenpieper, ständig lärmten Rohrammern, munter plapperte das Müllerchen, und auch das Lied der Dorngrasmücke war oft zu hören.

In den alten, zermürbten Kopfweiden brüteten Blauraken, übte fortwährend der Wiedehopf sein „Hudhud", schwatzten Stare. Libellen schwirrten, Mücken tanzten, ruckweise schwebten goldgelbe Fliegen im Sonnengeflimmer und verschwanden wieder plötzlich. Auf Schritt und Tritt sprangen mit lautem Aufklatschen Frösche in die Gräben. Eine große Ringelnatter schwamm in Bogenwindungen durch das Wasser.

Zwischen Moore und Bruchwiesen streckte sich eine mit Heidekraut und allerlei Strauchwerk bewachsene Landzunge hin, weit darin lagen dürftige Buchweizen- und Roggenschläge, schimmerte ein kleiner See. Hohe Weiden, Erlen, Hainbuchen und Eschen bildeten dort malerische Gruppen. Krähen flogen auf und ab. Wahrscheinlich moderte in der Nähe ein Stück Fallwild.

Verschiedene Wassergräben zerteilten die sumpfigen Wiesen. Hornblatt (Ceratophyllum demérsum) und die Wasserfarne des Tausendblattes (Myriophyllum) bedeckten beinahe vollständig den Grund der Gräben, an deren Randpartien die verschiedenen Schilfarten, Sumpfschachtelhalm, doldenblütige Schwanenblume, hoher Riesenampfer, geiler Schierling und sonstige Sumpfpflanzen wucherten.

Auf der Oberfläche des Moorwassers leuchteten wieder die weißen Blumen der Wasserrose (Nymphaea alba), Froschlöffel (Alisma plantágo), Pfeilkraut (Sagittária sagittáe fólia) und die Luftform des Tannenwedels (Hippuris vulgaris) ragten ihre hellgrünen Blätter heraus. In den stillen Buchten blühten Wasserstern (Calitriche vernalis), Wasserschlauch (Ultriculária vulgaris) und der schwimmende schlitzblätterige Hahnenfuß (Ranunculus trichophyllus). Auf sehr feuchten, moorigen Stellen grünte Pfefferminze, vereinte sich die Krebsscheere (Stratiótes aloides) zu Beständen.

Sumpfvögel kamen hier immer in bedeutender Anzahl vor, besonders Wasserhühner, Haubentaucher, Rallen, Krick- und Stockenten. Zwitschernde Schwalben durchschnitten das Luftmeer. Schreiend flogen Möwen auf und nieder, dabei glitzerte förmlich das weiße Gefieder. „Karle, Karle, kiek, kiek"! spottete die Rohrdrossel; die beiden kleinen Verwandten: Sumpfrohr- und Teichrohrsänger sangen fleißig in den Riedgräsern.

Wichtig, dabei stets vorsichtig, ruderten überall Entenmütter mit Kücken umher. Auf dem Wasser war es ja so mollig, das die liebe, liebe Sonne schon tüchtig wärmte.

An seichten Uferstellen, wo die Fischbrut umherflitzte, saßen auf überhängenden Ästen jagende Eisvögel.

Nun erreichte ich die Sandzone. Schwärme surrender Insekten flogen um die noch taunassen Blüten der Heidekräuter. Aus den verkümmerten

Braunkopfammer.

Kuscheln fibrierten immer noch die einschmeichelnden, flötenartigen Weisen der Hänflinge.

An dem nicht allzu großen, schilfigen Weiher standen Birken, Erlen und Hainbuchen. Nur manchmal glitzerten durch die hohen, geschlossenen Wipfel gedämpft einige Sonnenstrahlen. Auf dem dunklen, ganz veralgten Gewässer, zogen Taumelkäfer und Wasserläufer krause Kreise, spiegelten sich zart die Baumkronen und der blaue, wolkenlose Frühlingshimmel.

(Fortsetzung folgt.)

Singsittichzucht. Schöner Erfolg — kurze Freude!

Von Ado Mertes, Mainz.

(Nachdruck verboten.)

Als besonderer Liebhaber der australischen Plattschweifsittiche war es schon immer mein Wunsch, auch einmal Singsittiche zu halten und natürlich auch zu züchten. Nach vielem Hin und Her und mancher Schreiberei an dies und jenes A. Z.-Mitglied erhielt ich durch die Freundlichkeit des Herrn

M. in C. im vergangenen Frühjahr ein schönes Männchen und durch Herrn G. in M. ein wunderschönes kräftiges Weibchen dieser Art. (Kurz vorher war mir ein Weibchen, das ich von anderer Seite erhielt, gleich nach Ankunft eingegangen. An was, konnte ich nicht feststellen.) Ich hatte also die Gewißheit, ein blutsfremdes Zuchtpaar zu haben. Nach einigen Tagen Aufenthalt in einem kleinen Käfig brachte ich das Paar im April in eine meiner Volieren im Freien. Diese ist etwa 1×1,20×2,50 m groß. Das Paar kümmerte sich anfangs recht wenig umeinander und lebte vergnügt in den Tag hinein, trotz der Kälte und des Schneetreibens, das an manchen Tagen noch einmal verspätet einsetzte. Es schien ihnen sogar Freude zu machen, sich in den Schneeflocken herumzutummeln. Abends allerdings suchten sie eine geschützte Ecke unter dem Dache auf, doch niemals saßen beide zusammen, sondern es waren immer noch streng getrennte „Schlafgemächer".

Noch keine 14 Tage war das Paar eingesetzt, da merkte ich schon, daß das Weibchen so ganz vorsichtig manchmal den Nistkasten von außen und innen besah. (Größe des Kastens 27×27×40 cm.) Nach weiteren zwei bis drei Tagen war das Weibchen verschwunden und ich nahm an, daß es schon am Legen bzw. Brüten war. Die ganze Sache war mir viel zu schnell gegangen, zumal sich das Paar fast gar nicht umeinander kümmerte — und ich dachte mir gleich, daß es jedenfalls mit dieser Brut nichts Rechtes würde. Das Gelege bestand aus fünf Eiern, und zwar waren drei Eier scheinbar ein um den anderen Tag gelegt worden. Nun gab es eine Pause von zwei bis drei Tagen und dann folgten die beiden letzten. Ganz genaue Beobachtungen habe ich leider nicht gemacht, denn ich kannte Singsittiche noch nicht und wußte nicht, wie sie sich bei öfterer Kontrolle verhielten. Wenn einmal das Weibchen den Kasten verlassen hatte — was übrigens sehr selten geschah — und ich kam zufällig an den Käfig, dann stürzte es sich wie der Blitz in den Kasten und blieb verschwunden. Es kam vor, daß ich es manchmal zwei bis drei Tage überhaupt nicht sah. Das Männchen war unterdessen munter und fidel, sang ziemlich oft sein Liedchen und war gespannt — genau wie ich — auf den Erfolg des eifrigen Brütens seiner Gattin. Den Tag über ging es öfters zum Füttern des Weibchens in den Nistkasten und trällerte sogar im Kasten. Manchmal befürchtete ich, daß der temperamentvolle kleine Kerl die Brut stören würde, doch das Weibchen ließ sich nicht irre machen. Daß sich vom 19. Tag der Brut an meine Neugierde immer mehr steigerte, war begreiflich, und ich wartete auf das Piepsen im Kasteninnern. Der 20. Tag verging, der 21. und schließlich auch der 27. Da ließ es mir keine Ruhe und ich nahm eine Kontrolle vor. Das Weibchen ging, obwohl ich den Kasten abhängte, nicht vom Nest und drückte sich beim Herausnehmen der Eier in eine Ecke. Resultat: vier Eier unbefruchtet, das fünfte schon in den ersten Tagen abgestanden! Das Weibchen hatte also scheinbar zu schnell mit dem Legen angefangen, d. h. die beiden waren sich jedenfalls vor Beginn des Brutgeschäftes doch noch nicht so ganz einig!

Und nun die zweite Brut. Drei Wochen vergingen bis zur Ablage des ersten Eies. Das Paar war jetzt immer sehr besorgt umeinander und tauschte des öfteren Zärtlichkeitsbeweise aus. Das Weibchen ging sogar soweit, daß es dem Männchen aus Liebe den Hinterkopf kahlzupfte — sie hatten sich nun scheinbar „zum Fressen gern". Der dumme Kerl ließ sich, zu meinem großen Ärger natürlich, das Federausrupfen auch ganz ruhig gefallen. Das Weibchen brütete bald recht fleißig auf fünf Eiern und während dieser Zeit befiederte sich der Kahlkopf wieder. Am 21. Tage der Brut (16. Juni) hörte ich ganz leises Zirpen, und als ich drei Tage später im Kasten nachsah, waren schon drei grauflaumige Junge da, und bei Kontrolle am übernächsten Tage waren es deren fünf! Mit dem Nachsehen im Kasten war ich nicht mehr so ängstlich und tat es ein über den anderen Tag. Das Weibchen ging dabei nie vom Nest, und war es einmal gerade draußen, dann flog es bei meinem Näherkommen schnurstracks hinein. Die fünf Jungen entwickelten sich ganz prächtig, und das anfängliche feine Zirpen wurde bald durch ein ganz eigentümliches Geschnarre ersetzt, das man jedesmal beim Füttern der Jungen hörte. Ganz besonders belustigend war es, wenn die ganze Gesellschaft bei Kastenrevision unter dem Kommando ihrer Mutter ihr Konzert hören ließ und nicht eher Ruhe gab, bis der Kasten wieder an der Wand hing. Dann kam sofort das Männchen herbeigeflogen, setzte sich vor das Einschlupfloch und sang mit gespreiztem Schwanz und hängenden Flügeln unter Kopfnicken zwei- bis dreimal sein Liedchen. Es wollte damit scheinbar sagen: „Freche Bande — laßt mein Haus in Ruh'!"

Außer Hirse und Glanz gab ich als Aufzuchtfutter jeden Tag ganz wenig frische Ameisenpuppen und morgens und mittags ein Stück Biskuit. Letzters wurde besonders gerne genommen, ebenso Sepiaschalen. Grünfutter gab ich nicht. Für das Elternpaar wurde die Arbeit des Fütterns von Tag zu Tag größer und die fünf hungrigen Schnäbelchen schnarrten mit kurzen Unterbrechungen von morgens früh bis abends spät. Die Jungen wuchsen zusehends und bald zeigten sich die ersten Federkiele. Die Männchen waren schon an dem leuchtend roten Bürzel zu erkennen und ich stellte fest, daß es drei Männchen und zwei Weibchen waren.

Als die zuerst geschlüpften Jungen fünf Wochen alt waren, wartete ich täglich aufs Ausfliegen. Ich beobachtete immer das Schlupfloch, ob sich nicht ein neugieriges Köpfchen zeigte; aber es war niemals etwas zu sehen. Einige Tage später, als ich frühmorgens an den Käfig kam, war ein kräftiges Männchen ausgeflogen. Bei meinem Anblick wurde es etwas scheu und fing an zu toben, beruhigte sich jedoch bald wieder. Mittags machte es ein Schwesterchen dem ältesten Bruder nach und sprang beherzt in die weite Welt. Den nächsten und übernächsten Tag folgten die anderen und als letztes kam das zweite Weibchen, das um eine Kleinigkeit schwächer war als seine übrigen Geschwister. Unbeholfen war die ganze Gesellschaft eigentlich nicht und es wunderte mich manchmal, wie geschickt sie schon flogen und kletterten. Der Nistkasten wurde nicht mehr

aufgesucht. Abends setzte sich die ganze Familie in einer Reihe unter den Dachvorsprung an ganz geschützter Stelle. Tagsüber war es eine Freude, die muntere Schar bei ihrem Treiben zu beobachten. Bald liebkosten sich zwei, bald wurde geturnt oder auch um Futter gebettelt. Nach vier bis fünf Tagen schon flogen die Jungen zum Futternapf und fraßen Glanz- und Hirsekörner. Gebadet wurde oft und ziemlich gründlich. Fing ein Junges damit an, dann mußten es mindestens noch zwei nachmachen. Baden tun Singsittiche überhaupt sehr gerne. Auch während der Brut nahm das alte Weibchen regelmäßig sein Bad und machte sich dabei ganz gehörig naß.

Meine Freude sollte allerdings nicht allzu lange dauern. Mein Schreck war groß, als ich eines Sonntags morgens das älteste junge Singsittichmännchen tot am Käfigboden fand und ein zweites ganz matt daneben saß. Darmkrank! Ich hatte den Tieren am Tage vorher nicht das geringste angemerkt, keines von den sieben machte einen kranken Eindruck. Die drei ältesten Jungtiere gingen mir innerhalb weniger Tage ein, und zuletzt auch noch das alte Männchen. Ich hatte alles mögliche versucht, um dieses wenigstens am Leben zu erhalten, doch vergebens. Von was die Tierchen die Krankheit eigentlich bekamen, ist mir heute noch unklar. Entweder war irgend etwas im Futter, was nicht bekam, oder hatten sie den grünen Hafer, den ich kurz vorher in ganz kleiner Menge gereicht habe, zu gierig gefressen. Verdächtig war mir, daß gerade die Jungen eingingen, die schon allein fraßen, und die beiden anderen, die noch gefüttert wurden, am Leben blieben. Mit der Freude war es also aus und die Hoffnung auf die nächste Brut, zu der das Weibchen schon alle Vorbereitungen getroffen hatte, ward zu Wasser!

Zu dem Artikel von Jos. Delvaux-Venlo (Holland) „Eine Streitfrage".

Erwiderung von Karl Reich, Bremen.

(Nachdruck verboten.)

Auf den Artikel in Nr. 6 der „Allgemeinen Kanarienzeitung" vom 7. Februar cr. unter obiger Überschrift von Herrn Jos. Delvaux-Venlo (Holland), unter Heranziehung eines Artikels des Herrn Pelemann-Antwerpen-Borgerhout, in der holländischen Fachzeitschrift „Onze Gefleugelte Zangers" erwidere ich folgendes:

Sie möchten also wissen, durch welche Methode ich es erreicht habe, meinen Nachtigall-Edelkanarien-Stamm heranzubilden, ob ich dazu Nachtigallen oder belgische Waterslager als Vorsänger verwendet habe. Gut, ich will Ihnen den Gefallen tun und aus meiner Vogelstube plaudern, denn bei meinen Nachtigall-Edelkanarien sträubten sich alle — Federn, als sie die kühne „Behauptung" hörten, Waterslager seien ihre Lehrmeister gewesen. Ich glaube deshalb meinen Nachtigallkanarien, meinen deutschen Sportskameraden und meinen vielen ausländischen Freunden diese Erwiderung schuldig zu sein.

Wie ich verschiedentlich in den Fachblättern früher schon geschrieben habe, habe ich mich seit vielen Jahren, schon lange vor dem Kriege, mit dem Problem beschäftigt und Versuche mit Vögeln aus allen möglichen Kanarienstämmen gemacht, ob es nicht möglich sei, den herrlichen Gesang der Nachtigall auf Kanarienvögel zu übertragen. Um dieses zu erreichen, sagte ich mir, daß es vor allem darauf ankam, möglichst stammkräftige Tiere dazu zu verwenden. Ich habe mir dementsprechend in den ersten Jahren kräftige Vögel zu verschaffen gesucht, einerlei, welcher Herkunft. Die Hauptsache war mir, gesunde Tiere zu bekommen mit klangvollem, kräftigem Organ. Dieses sollte vererbt werden, die Gesangstouren waren dabei

Schmuckammerfink.

Nebensache, da diese Vögel ja nur als kräftige Zuchttiere in Frage kamen, die in keiner Weise entartet waren, ihre Jungen aber gar nicht ihre Eltern, sondern in isolierten Räumen nur Nachtigallen zu hören bekommen sollten. So habe ich mit folgenden Stämmen gezüchtet: Gluck- und Wasservögel, Hohl- und Knorrvögel, ferner Kanarien der sogenannten Landrasse, sowie auch mit den von Ihnen, Herr Pelemann, bezogenen Waterslagern. Für die Nachzucht habe ich dann immer nur Nachtigallen als Vorsänger verwendet und mir für die Weiterzucht natürlich stets die Junghähne herausgesucht, die am meisten Anlage zeigten, Touren der Nachtigall möglichst naturgetreu zu bringen (sowie deren Schwestern). Auf diese Weise ist meinem Nachtigall-Edelkanarien-Stamm, wie Sie sehen, Blut aus vielen Stämmen zugeflossen. Gesanglich habe ich aber stets nur die Nachtigall als Lehrmeister verwendet, bis schließlich vor wenigen Jahren dann auch meine Nachtigall-Edelkanarien als Vorsänger sattelfest wurden. — Daß ich aber gesanglich den Waterslager niemals als Vorsänger verwendet habe und niemals verwenden konnte, das wissen alle meine Freunde aus den damaligen Zeiten, da Ihre mir vor etwa

13 Jahren gesandten Waterslager, wie Sie selbst in ihrem Artikel schreiben, neben schönen Touren mit schweren Fehltouren behaftet waren. Das war auch der zwingende Grund, weshalb ich diese Vögel mit Bedauern schon im ersten Jahre wieder aus meinem Bestande entfernen und abschaffen mußte. Die scharfen, schappenden Touren der Waterslager waren einfach unerträglich. Nun, was die nachtigallartigen Töne der Waterslager betrifft, so hat der Belgier, soweit im Kanarienvogel von Natur aus einige der Nachtigall ähnlich anklingende Töne liegen, diese kultiviert. Diese nachtigallartig klingenden Töne liegen auch im Gesange des Kanarienvogels der sogenannten deutschen Landrasse, auch liegen dieselben im Liede des Hänflings, der Gartengrasmücke und die Drosseln, was oft Nichtkenner zu dem Ausruf verleitet: „Horch, da singt eine Nachtigall". Dieser nachtigallähnliche Klang einzelner — Töne ist auch die Veranlassung, daß im landläufigen Sinne bei den Waterslagern wie auch bei den eben angeführten Vögeln von nachtigallähnlichem Gesange gesprochen werden kann. Dieses Maß nachtigallähnlicher — Töne hat der Waterslager mit den vorgenannten Vogelarten gleich, nur kultiviert, weiter nichts, und nicht mehr.

Von wirklichen Nachtigalltönen aber und vielseitigen wirklichen Nachtigalltouren in ihrem Liede, wie sie meine Nachtigall-Edelkanarien im Laufe langer Generationen von der Nachtigall gelernt und erblich aufgenommen haben, kann bei dem Gesang der Waterslager gar keine Rede sein.

Für seine Annahme, daß meine Nachtigall-Kanarien nicht durch Nachtigallen ausgebildet sein könnten, führt Herr Pelemann folgende Behauptungen als — Beweise ins Feld.

1. „Die Nachtigall hat eine zu starke Stimme, um von den Kanarien nachgeahmt zu werden."

Aus meiner langjährigen Praxis als Nachtigallenpfleger kann ich und viele Nachtigallenpfleger mit mir Herrn Pelemann verraten, daß fast jede gute Nachtigall im Käfig bei entsprechender, darauf eingestellter Pflege zuerst in einer so bestrickend anmutigen Lautstärke ihren Gesang aufzunehmen beginnt und wochenlang vorträgt, die etwa der Lautstärke des kultivierten deutschen Edelrollers entspricht. Allmählich wird die Nachtigall dann lauter, um aber nur während des stärksten Triebes kräftig laut zu werden. Aber ihre selbst dann nur etwas größere Lautstärke als die kräftiger Kanarien hält diese letzteren sicher nicht davon ab, ihnen liegende Touren von der Nachtigall anzunehmen. Warum auch wohl nicht? Bringt doch die Nachtigall auch in der Freiheit alle ihre Touren je nach Stimmung und Laune in verschiedener Lautstärke, bald stark, bald mittellaut, bald piano. Nur bei den Gesangswettkämpfen der Nebenbuhler um die Gunst des Weibchens schlagen die Nachtigallen aus vollster Kraft. Sobald sie ihrer Eheliebsten sicher sind, ist ihre Lautstärke im Gesang aber seelenvoll gemäßigt. Im Käfig kommt auch die Nachtigall bei nicht zu treibender reizbarer Fütterung gar nicht zu der Lautstärke des Gesangswettkampfes, wenn man solche nicht absichtlich herbeizuführen sucht.

Unter 2. schreibt Herr Pelemann:

„Die Nachtigall singt von Anfang April bis Mitte Juni, also vor dem Zeitpunkt, wo junge Kanarien lernen können."

Diese Behauptung trifft nur zu für die Nachtigallen in der Freiheit. Die Nachtigall im Käfig ist durch entsprechende Pflege und Behandlung fast zu allen Jahreszeiten in den Gesang zu bringen, zumal wenn dem Pfleger mitunter noch Glücksumstände dazu günstig sind. Aber auch ganz ohne besonderes Zutun beginnen manche gekäfigten Nachtigallen schon im Oktober und November mit ihrem Gesange.

(Schluß folgt.)

Melanismus bei Gimpeln, Stieglitzen, Bergfinken, Lerchen und anderes.

Von Wilhelm Schreitmüller, Frankfurt a. M.

(Nachdruck verboten.)

Unzweckmäßig und einseitig ernährte oder sehr alte Vögel, besonders Körnerfresser, neigen mit der Zeit öfter zu Melanismus (d. i. Schwarzfärbung).

Ich kenne eine ganze Anzahl Fälle, in welchen nach Verlauf von Jahren solcher auftrat und sich nicht wieder verlor.

So entsinne ich mich eines Gimpels (siehe Abb. S. 95), welchen mein Vater besaß. Der Vogel kam im Jahre 1878 in unseren Besitz, nachdem er vorher schon drei Jahr lang unter den ungünstigsten Verhältnissen — einzig und allein bei Fütterung mit nur „Hanf" (!) — bei anderen Leuten vegetiert hatte. Die Rotfärbung der Brust dieses Vogels war sehr blaß. Er stellte die große nordische Form dieser Art dar. Vom Jahre 1880 ab stellten sich nach der Mauser bei dem Vogel erst vereinzelte schwarze Brustfedern ein, die sich im folgenden Jahre so vermehrt hatten, daß die Brust des Tieres fast ganz schwarz geworden war und nur noch vereinzelte rote Federn zeigte. Nach der letzten Mauser im Jahre 1883 hatte sich der Vogel gänzlich schwarz gefärbt. Er ging im Winter 1883 ein.



Wachtelammerfink.

Einen anderen Gimpel besaß ein Freund von mir; dieser Vogel färbte sich ebenfalls nach Verlauf von fünf Jahren völlig schwarz; eine Änderung trat auch im Laufe der nächsten zwei Jahre nicht mehr ein, wonach das Tier einging.

Mein Onkel besaß ferner einen Bergfinken, den er elf Jahre lang pflegte. Auch dieser Vogel färbte sich nach dem siebenten Jahre völlig schwarz und blieb so bis zu seinem Ableben.

Im Jahre 1901 kaufte ich in München von einem Händler eine schon längere Zeit gekäfigte Feldlerche, welche in den Flügeln und auf der Brust vereinzelte schwarze Federn zeigte. Auch dieser Vogel verfärbte sich im Laufe von drei Jahren völlig schwarz, worauf er bald einging, obwohl ich ihn nebenbei reichlich mit Weichfutter, Mehlwürmern und Ameisenpuppen versorgte. Der Vogel war anscheinend (den Beinen nach zu urteilen) schon sehr alt.

Zeisig und Stieglitz besaß (die Tiere waren je über 20 Jahre alt), welche während ihrer letzten Lebenszeit an Epilepsieanfällen litten. Die Vögel fielen oftmals ganz unvermittelt von den Sitzstangen, krampften die Zehen zusammen, verdrehten Hals und Köpfe, sperrten die Schnäbel auf und es trat starker Schaum aus letzteren hervor. Tropfte man ihnen hierauf einige Tropfen kaltes Wasser auf das Genick und in den Schnabel, so erholten sie sich bald wieder und waren wieder munter. Auch dieser letztgenannte Stieglitz war infolge Altersschwäche auf der Brust fast völlig schwarz gefärbt.

Im Zoologischen Museum zu Dresden befinden sich ebenfalls fast ganz schwarz gefärbte Gimpel, Stieglitze, Lerchen u. a. Vögel, die teilweise wohl auch Käfigvögel darstellen.

Der Melanismus ist das Gegenstück des Albinismus (Weißfärbung). Letzterer tritt (im Freien)



Sonnenastrilde.

verhältnismäßig häufiger auf als ersterer. So kenne ich z. B. Albinos von Dohlen, Elstern, Krähen, Amseln, Singdrosseln, Weindrosseln, Staren, Haus- und Feldsperlingen, Lerchen, Hänflingen, Haus- und Gartenrotschwänzen, Rotkehlchen, Rauch- und Mehlschwalben, Buchfinken, Fasanen, Rebhühnern, Lach- und Ringeltauben, Kanarienvögeln, Wildenten und sogar vom Waldkauz u. a. mehr.

Häufig kommt es vor, daß bei im Frühjahr gefangenen (resp. zu spät gefangenen) Rotkehlchen und anderen Vögeln nach der Mauser partieller (teilweiser) Albinismus auftritt, was eine Folge davon ist, weil sich die Tiere schon gepaart hatten und sie infolgedessen trauern und sich grämen. Auch ich besaß im Jahre 1897 ein Rotkehlchen, welches ich im Frühjahr von einem Händler erwarb, das nach der Mauser schneeweiße Flügel bekam und diese Färbung beibehielt, bis ich es im Jahre 1900 in Freiheit setzte. Ob sich das Tier daselbst späterhin wieder verfärbt hat, kann ich nicht sagen.

Auf jeden Fall besteht aber ein Unterschied zwischen angeborenen und erst später entstandenen Melanismus und Albinismus. Die Ursache

Im Jahre 1905 sah ich in Dresden bei einer Dame einen vierzehn Jahre alten Stieglitzhahn, welcher ebenfalls — vom neunten Jahre seiner Gefangenschaft ab — schwarze Färbung angenommen hatte. Der Vogel war sonst ganz gesund und munter und sang noch. Er ging im Jahre 1908 ein.

Diese Schwarzfärbung mancher Vögel ist meistens eine Folge davon, daß die Tiere unter ungünstigen Verhältnissen, bei ungeeigneter, einseitiger Körnerfütterung, Sonne-, Licht- und Luftmangel, jahrelang gehalten wurden und ihnen jedwede Insektennahrung, Früchte und Grünzeug vorenthalten blieben.

Auch in solchen Fällen dunkeln die Tiere, wenn sie zu nahe dem Ofen, in zu großer, trockner Wärme gehalten werden und ihnen Sonne, Luft und Licht in genügender Menge versagt werden.

Diese Neigung bei nicht richtig gepflegten Vögeln zu Melanismus tritt besonders stark bei Gimpeln und Stieglitzen auf, doch mag sie auch öfter eine Folge sehr hohen Alters sein resp. Altersschwäche darstellen. Im letzteren Falle treten dann meistens noch epileptische Anfälle hinzu. So entsinne ich mich auch, daß mein verstorbener Großvater je einen

des Entstehens letzterer dürfte stets nur darin zu suchen sein, daß die Tiere unzweckmäßig und einseitig gefuttert und ihnen Sonne, Licht und Luft nicht genügend geboten wurden oder daß die Vögel im Frühjahr zu spät gefangen wurden. Auch Vernachlässigung bei Verabreichung von Trink- und Badewasser, Sand, Sepia, Grünzeug und Insektennahrung und Halten in dumpfigen, feuchten und ungesunden Räumen tragen dazu bei, daß die Tiere mit der Zeit schwarze oder weiße Färbung — die in diesem Falle krankhafter Natur ist — annehmen.

Weiß jemand noch andere Ursachen des Entstehens von Melanismus bei zuerst normal gefärbten Vögeln? Vielleicht spielt auch reine Hanffütterung bei Körnerfressern hierbei eine Rolle?

Rotschwänze — Phoenicurus *(Forst.)*.

Eine Monographie von John Kuntzendorff.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der blauköpfige Finkenrotschwanz — Erithacus erythronotus alaschanicus *(Przew.)*.

Erithacus erythronotus alaschanicus vertritt seinen Verwandten in seinem Verbreitungsgebiet, das sich über Nordtibet von Zoidam bis Kansu und den Ala-schan-Bergen erstreckt, und sind diese Gebiete allem Anschein nach zugleich auch die Brutheimat des Vogels. Die Angabe, er zeichne sich durch bedeutendere Größe vor samamisicus aus, scheint nicht zutreffend zu sein. Er unterscheidet sich von letzterem durch graue, nicht schwarze Kopfseiten. ♂ ad. Oberkopf, Hinterhals, Kopfseiten, Nacken, Zügel, Ohrgegend gleichmäßig blaugrau, im Herbst sind die Federn braun gespitzt; übrige Oberseite, Schwanz, Flügel wie bei E. e. samamisicus, nur daß der Schwanz viel länger und auch runder ist, mittelste Schwanzfedern sind verlängert; Kopfseiten bis in Augenhöhe, Kinn, Kehle, übrige Unterseite lebhaft orange rostrot, nur die Mitte des Unterkörpers weißlich; die Unterschwanzdecken sind heller. Nach Jerdon zeichnet er sich durch bedeutendere Größe vor seinem Verwandten aus: ♂ ad. Fl. 89—95, Schw. 82—87 mm, ♀ ad. Fl. 87, Schw. 79 mm, Beide Finkenrotschwänze sind lebend noch nicht nach Deutschland eingeführt worden.

Der Formenkreis Erithacus coeruleocephalus

weist als einzige Form im westlichen Hochasien auf den

Elsternrotschwanz — Erithacus coeruleocephalus *Vig.*

Auf den ersten Blick ein Vogel, der infolge seiner Gefiederfärbung mit den Rotschwänzen nichts gemein zu haben scheint, ist der Elsternrotschwanz. Ist doch bei ihm die rote Farbe seines Federkleides zugunsten des weit ausgedehnten Schwarz gänzlich geschwunden und ist der Unterleib statt rostrot weiß. Und trotzdem ist er ein echter Rotschwanz, was das weibliche und das Jugendgefieder überzeugend dartut.

♂ ad. Oberkopf graublau; übrige Oberseite, schmaler Stirnstreif, Zügel, Kopfseiten, Hals, Kinn, Kehle, Vorderbrust, Oberschwanzdecken schwarz, im Herbst jede Feder bräunlich gesäumt; übrige Unterseite, Unterschwanzdecken, Unterflügeldecken weiß mit schieferschwarzen Federwurzeln, Schwanzfedern schwarz, Schwingen und Flügeldecken schwarz, Armschwingen an der Innenfahne von der Wurzel bis zum Spitzendrittel breit weiß gerandet, die letzten vier auch an der Außenfahne weiß, mittlere Flügeldecken weiß mit der weißen Färbung der Armschwingen einen breiten Längsspiegel bildend; Augen braun, Schnabel und Füße schwarz. ♀ ad. Ähnelt dem des erythronotus; Oberseite braun; Unterseite heller, mehr fahlbraun; Mitte des Bauches, Unterschwanzdecken weißlich, Unterflügeldecken rahmfarben. Nestkleid oberseits braun, Federn breit dunkelbraun gesäumt, vor diesen Endsäumen lichtbraun gefleckt; Unterseite wie Oberseite, jedoch heller, Bauch hellbräunlich, dunkler gewellt. Nach Hartert sind die Maße: Fl. 81—85,5, Schw. 67—68 mm.

Das Verbreitungsgebiet des Erithacus coeruleocephalus ist das westliche Hochasien von Turkestan, Afghanistan und der Himalaja von Gilgit bis Bhutan. Im nordwestlichen Himalaja gehört er zu den ge-

Anbringung eines Drahtnestes bei Zuchtversuchen mit Freibrütern.

meinen Vögeln, in den östlichen Teilen des Gebirges kommt er nur in den höher gelegenen Gebirgsgegenden vor, während er in den Randgebirgen nicht beobachtet worden ist. Er geht ins Gebirge sehr hoch hinauf, zur Brutzeit bis zu 3000 und mehr Meter, im Winter hält er sich in niedriger gelegenen Gegenden auf. Er baut sein Nest in Löchern und Höhlungen der Felswände, die Brut findet im Mai bis Juni statt. Das Gelege besteht aus 5 rahmfarbenen Eiern, die am stumpfen Ende dunkler gefärbt sind.

Der Formenkreis Erithacus schisticeps

weist zwei Formen auf, die im östlichen Hochasien beheimatet sind. Von derselben Gefiederfärbung unterscheidet sich die eine nur durch den weißen Kehlfleck von der anderen.

Der Sternrotschwanz — Erithacus schisticeps *(Hodgs.)*.

Auch bei diesem Rotschwanz ist die rostrote Färbung zugunsten des Schwarz zurückgegangen, jedoch erstreckt sich diese erweiterte Ausdehnung des Schwarz hier nur auf die Schwanzfedern.

♂ ad. Stirn, Scheitel lebhaft graublau; Kinn, Kehle, Zügel, Kopf- und Halsseiten schwarz; Hinterhals, Rücken bläulichschwarz; am Vorderhals, von der schwarzen Färbung umgeben und an die goldkastanienrotbraune des Unterkörpers angrenzend, ei-

reinweißer Kehlfleck; Flanken, Bürzel, Ober- und Unterschwanzdecken goldig kastanienrotbraun; übrige Unterseite goldig kastanienrotbraun, Bauchmitte weißlich bis weiß; Unterflügeldecken weiß mit schieferfarbiger Basis; Schwanzfedern schwarz, außer dem mittelsten Paar alle an der Basis etwa ein Drittel kastanienbraun; Schwingen und Flügeldecken tief bräunlichschwarz, die mittleren und die innersten großen sowie die breiten Außensäume der Armschwingen weiß, einen breiten weißen Längsspiegel bildend. ♀ ad. Ähnelt dem des coeruleocephalus; Oberseite braun; Brust mit rötlichem Schimmer; am Vorderhals ein großer weißer Fleck; Mitte des Unterkörpers weißlich; Unterschwanzdecken röstlich; Flügel wie beim ♂, nur braun statt bräunlichschwarz, und der Längsspiegel nicht so breit wie bei diesem; Schwanzfedern dunkelrostbraun, mittelstes Paar dunkelbraun. Nach Hartert sind die Maße: Fl. 84—88, Schw. 74—78, Lf. 23 mm.

Wie der Elsterrotschwanz ist auch der Sternrotschwanz ein ausgesprochener Gebirgsvogel. Seine Heimat sind die Gebirge von Kansu bis Tibet und das Hochgebirge des Himalaja vom Sikkim bis Nepal. Hier kommt er in Höhen bis zu ungefähr 3000 m vor. Er brütet in den Waldzonen der Hochgebirge und baut sein Nest in Felsspalten und -vertiefungen aus Moos und polstert es mit Haaren und Federn aus. Das Gelege besteht aus 4 hellnelkenrötlichen, zuweilen kaum bemerkbar bräunlich gepunkteten Eiern. Auch solche von rötlicher Farbe sollen vorkommen. Eine Einführung nach Deutschland hat nicht stattgefunden. (Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Einsammeln frischer Ameisenpuppen. Um sich vor den Bissen der Ameisen zu schützen, zieht man feste Handschuhe an und bindet den Rockärmel mit einem Faden fest zu, ebenso macht man es mit den Beinkleidern, wenn man es nicht vorzieht, sie in die Stiefelschäfte zu stecken. Zum Herausholen des Genistes bedient man sich einer Schaufel. Das Sammeln geschieht auf sehr verschiedene Weise. Rausch empfiehlt in den „Sängerfürsten" folgendes Verfahren: „Man breitet an einer sonnigen Stelle ein weißes Linnen über den flachen Boden, legt alle vier Enden desselben nach oben zu etwa 10—15 cm breit ein und legt kleine Zweige darunter, so daß durch den Umschlag der Linnenenden eine Art Höhlungen entstehen. Hierauf nimmt man mittelst einer Schaufel den Ameisenhaufen samt Spreu und schüttelt ihn in möglichst breiter Schicht mitten auf das Linnen. Nun werden die Ameisen ihre Brut zu retten suchen, indem sie die Eier rasch aus der Sonne in die durch Umschlagen der Linnenenden entstandenen Höhlungen bergen, wo sich nach etwa einer halben Stunde sämtliche Eier rein und sauber aufgehäuft vorfinden." Friderich gibt folgendes Verfahren an: „Man stülpt auf einen Ameisenhaufen einen oder mehrere Blumentöpfe, in welchen die Ameisen ihre Brut unterbringen. Sie füllen dieselben mit lockerer Erde aus und tragen in die Höhlungen zwischen denselben ihre Larven und Puppen. Nach wenigen Tagen ist jeder Blumentopf gefüllt; man hebt ihn mit seinem Inhalt vorsichtig ab und kann nun die darin enthaltenen Ameisenpuppen nebst lebenden Ameisen nach Ermessen verwenden: Auf diesem Wege läßt sich ein Ameisenhaufen jährlich mehrmals ausbeuten. Sehr ergiebig ist das Sammeln auf folgende Weise. Bei einem sonnigen Wetter reinigt man vermittels eines Rechens eine freie Stelle von etwa 4 □m im Walde von Nadeln, trockenen Blättern und dergleichen. Sodann gräbt man in einem Kreis von etwa 1 m Durchmesser in beliebigem, aber nicht zu weit voneinander entferntem Abstande etwa litergroße Löcher und legt über diese, wenn möglich, frische Nadelholzzweige. In die Mitte dieses durch die Löcher gebildeten Kreises schüttet man den Inhalt des Ameisenhaufens. Die Ameisen tragen die Puppen in diese Löcher, um sie vor den Sonnenstrahlen zu bergen. Mit einem Löffel können sie nun herausgenommen werden. Um die Puppen nochmals zu reinigen und sie schon ein wenig zu trocknen, zum Schutz gegen das Zusammenballen, breitet man jetzt ein weißes Linnen aus und schüttet die gesammelten Puppen langsam aus dem hochgehobenen Sammelgefäß auf das Linnen. Um die lebenden Ameisen, welche sich unter den Puppen befinden, zu entfernen, bedient man sich am besten eines langfaserigen Friestuches, mit dem man wiederholt über die ausgebreiteten Puppen hinwegstreift. Die Ameisen bleiben an dem Tuch haften und werden nach jedesmaligem Überstreichen durch Ausschleudern aus dem Tuch entfernt. Nachdem die Ameisenpuppen geborgen sind, wird das Genist wieder auf den Ameisenbau, dem es entnommen ist, zurückgebracht.

Über die Unterscheidungsmerkmale der Geschlechter der Spitzschwanzamadinen und ihrer Verwandten herrschen in den Kreisen der Vogelpfleger häufig irrtümliche Ansichten. Es ist auch keineswegs leicht, die Geschlechter dieser Vögel zu unterscheiden. Alle die häufig angegebenen Merkmale, wie die verschiedene Ausdehnung des schwarzen Kehlfleckes oder die Breite der schwarzen Binde über den Hinterleib halten oft nicht stand. An einer größeren Anzahl von Bälgen aus der Berliner Museums- und meiner eigenen Sammlung, deren Geschlechtsbestimmung einwandfrei ist, konnten übereinstimmende Merkmale für die beiden Geschlechter festgestellt werden. Sie treffen auch teilweise für andere Angehörige dieser Gruppe zu. Die beiden Formen der Spitzschwänze, acuticauda und hecki, unterscheiden sich in der Gesamtfärbung. Die Form hecki ist im Farbton dunkler gefärbt, der Schnabel bekanntlich korallenrot. Es ist möglich, daß es Mischlinge dieser beiden Formen gibt, welche dann in Schnabel und Gefiederfärbung zwischen beiden stehen. Die Geschlechter von P. acuticauda unterscheiden sich nach Untersuchung von neun Bälgen und einiger lebender Spitzschwänze am deutlichsten in der Kopffärbung, welche bei den Männchen reiner und zum Nacken hin abgesetzt ist, während die weiblichen Vögel schmutziger und Kopf- und Nackenfärbung ineinander übergehen. Anders verhält es sich bei der Form hecki. Hier treffen die oben angegebenen Unterschiede teilweise zu. Doch ist bei den Männchen der Farbton des Rückengefieders weit lebhafter und bräunlicher als bei den Weibchen, wie überhaupt der Gesamtausdruck des Gefieders der Weibchen bei beiden Formen schmutziger ist. Die Geschlechter der Maskengrasfinken (P. personala), von der Weißohramadine durch das Fehlen der weißen Wange, Ohrdecken, Kehlfedern und durch längere Schwanzfedern unterschieden, sind gut erkenntlich. Die Männchen sind auf der Unterseite heller, silbriger gefärbt, die Weibchen mehr bräunlich; ebenso erscheint die Rückenfärbung der Weibchen dunkler. Ähnlich scheint es sich bei den Geschlechtern der Weißohramadine zu verhalten. Doch reicht das geringe mir zur Verfügung stehende Material zu sicheren Angaben nicht aus. Für den Gürtelgrasfink scheinen dieselben Unterschiede wie für die Spitzschwanzamadinen zu gelten. Die verschiedene Schnabelfarbe der Maskengrasfinken kann innerhalb der Art variieren, oder es handelt sich um einen bisher nicht eingeführten geographischen Vertreter der Maskengrasfinken. Es steht mir zu wenig Literatur über australische Webefinken zur Verfügung, um feststellen zu können, ob es sich hier tatsächlich um Unterschiede zweier Formen handelt.

Rudolf Neunzig.

Bücher- und Schriftenschau.

Dr. Karl Holdhaus. Spuren der Eiszeit im Faunenbild von Europa. (Veröffentlichungen des Naturhistorischen Museums in Wien, Heft 4.) Wien 1924. Selbstverlag des „Vereines der Freunde des Naturhistorischen Museums", Burgring 7, Wien I.) Auslieferung durch den Buchhandel: Gerlach und Wiedling, Elisabethstraße 13, Wien I. — Kleinoktav, 24 Seiten, reich illustriert Preis 7500 K.

Vom Bestreben geleitet, die Museal-sammlungen in noch höherem Grade als bisher Gemeingut des Volkes werden

zu lassen und breitere Kreise an der Museumsarbeit teilnehmen zu lassen, von der die Schaukästen nur den sichtbarsten Teil darstellen, unternimmt das Naturhistorische Museum in Wien die Herausgabe einer neuen Schriftenreihe, die ergänzend neben seine alten „Annalen" tritt. — Diese Schriften erscheinen in freier Folge; jedes Heft ist in sich abgeschlossen und einzeln käuflich. Sie sollen in wissenschaftlichem Geist und gemeinverständlicher Fassung naturwissenschaftliche Fragen — auch in ihrer Beziehung zum Menschen — darstellen. Es ist dabei ebenso an allgemein orientierende Schriften gedacht wie an Führer durch Sammlungen selbst oder durch die Sammlungsgruppen, an Hilfsbücher für Aufsammlungen und sonstige Handweiser, durch die zwischen Museen und Öffentlichkeit der so nötige Kontakt aufrechterhalten werden soll. Der Preis der Hefte ist so niedrig, daß jedermann, auch der Schuljugend, die Anschaffung möglich ist, zumal es sich um kein auf Gewinn berechnetes Unternehmen handelt. — Die vorliegende Arbeit behandelt jene eigentümlichen Tatsachen der Tierverbreitung, welche noch in der gegenwärtigen Fauna Europas die Einflüsse der Eiszeit erkennen lassen. Während der Zeit intensivster Vergletscherung, als die Alpen eine gewaltige Eiswüste waren, und das nordische Inlandeis sich bis an den Rand der Sudeten und Karpathen nach Süden vorschob, lebte im eisfreien Mitteleuropa eine kälteliebende Tierwelt, welcher das Mammut, ferner Moschusochs, Lemminge, Rentier, Eisfuchs, Schneehase, Schneehuhn nebst mancherlei hochnordischen Schnecken und Käfern angehörten. Als das Klima wieder milder wurde, vermochten manche dieser arktischen Tierformen sich gleichwohl in Mittel-, teilweise selbst Südeuropa zu erhalten, indem sie sich hier ins Hochgebirge zurückzogen. In der Hochzone der Alpen, Karpathen, Pyrenäen, Abruzzen usw. treffen wir diese merkwürdigen Eiszeitüberreste in so großer Individuenzahl, daß sie im Faunenbild unserer Gebirge in auffälligster Weise hervortreten. Holthaus bespricht die Zusammensetzung und geographische Verbreitung dieser Reliktfauna und beschließt seine Arbeit mit einer kurzen Schilderung der europäischen Landschaft, wie sich dieselbe zur Zeit der intensivsten Vergletscherung darstellte. Eine Eiszeitkarte und eine Anzahl von Tierbildern sind der Arbeit beigegeben.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnitz, Merveldstr. 39; Kaufsvermittlung: Franz Nyncke, Berlin O, Königsberger Str. 17. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

An unsere Mitglieder!

Mit dem 1. April 1925 hat unser zweites Geschäftsjahr begonnen. Der Bericht über den Umfang der Geschäftstätigkeit wird in Kürze zur Kenntnis unserer Mitglieder gebracht werden. Bereits heute schon müssen wir das Ersuchen an die uns angeschlossenen Vereine richten, uns den Mitgliederbestand vom 1. April d. J. zur Kenntnis zu geben. Hinzugetretene Mitglieder müssen uns namentlich mitgeteilt werden, wie auch im Laufe des ersten Jahres ausgetretene Mitglieder angezeigt werden möchten, damit die mit viel Mühe und Arbeit geschaffene Mitgliederkartothek jederzeit auf dem laufenden gehalten werden kann. Die Beiträge — jährlich 30 Pf. pro Vereinsmitglied — sind nach dem Mitgliederbestand des 1. April d. J. einzusenden. Auch hier bitten wir nicht säumig sein zu wollen, damit das gute Werk nicht auf halbem Wege zum Stillstand kommt. Beitragsrückstände wollen ebenfalls alsbald überwiesen werden, Postscheckkonto Leipzig Nr. 22418. Der Beitrag für Einzelmitglieder beträgt auch für dieses Jahr wieder 2 M. J. A.: Petters.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten

A. Fluck, Bremen, Knoopstr. 39: Mohrenkopfpapageien, Elfenbeinsittiche.

Rich. Heydenreich, Bad Suderode, Harz: Schneeweiß, Kanarien, teils mit blaugr. Haube.

Max Kleinert, Berlin NO 18, Strausberger Str. 13, Fernruf Alexander 3313: Langschwanzglanzstare, Gelbnacken, Doppelgelbkopfamazonen.

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a: grüner Kardinal, Spottdrossel, Blauspötter, Klarinettenvogel, 1 Flötenwürger, ind. Grauwürger, ind. Maskenwürger, 1 Würgerschnäpper, 1 Borstenhäherling, 1 Blaubartblattvogel, 1 Braunscheiteltimalie, Schwarzschwanzsteinschmätzer, 1 Schopfwachtelweibchen, Francolinwachteln, Katharinasittiche, Kubasittiche, Braunkopfammern, dreifarbige Nonnen.

Herrn F. B., Osnabrück: 1. Die Mauser der Tigerfinken ist anscheinend keine regelmäßige, die zu einer bestimmten Zeit stattfindet. 2. Die Tigerfinken, welche hier und da „rote Flecken" im Gefieder zeigen nnd dann in wenigen Tagen ganz rot sind, sind keine jungen, sondern eher ältere oder alte Vögel. Man nimmt nach den Erfahrungen, welche an gezüchteten Vögeln gemacht sind, an, daß das gleichmäßige Rot des Gefieders sich erst im vierten oder fünften Lebensjahre zeigt. 3. Im Ruhekleid sind die Geschlechter am Gefieder nicht zu unterscheiden. Das ganze Gebaren des Vogels wird dann aber die Unterscheidung der Geschlechter ermöglichen. 4. Abgesehen von geselligbrütenden Vögeln sind am ehesten Züchtungserfolge zu erzielen, wenn von jeder Art nur ein Paar in demselben Behälter gehalten wird. Aber Mövchen, Zebrafinken, Silberschnäbelchen sind wiederholt erfolgreich gezüchtet worden, wenn mehrere Paare ihrer Art vorhanden waren. 5. Es läßt sich nicht genau sagen, bis zur wievielsten Generation Zebrafinken untereinander gepaart werden können, ohne daß sich die Folgen der Inzucht bei ihnen bemerkbar machen. Jedenfalls sollte man die Paarung von Geschwistern stets vermeiden, wenn nicht dadurch gerade bestimmte Ziele erreicht werden sollen. Die üblen Folgen der Inzucht sehen wir doch recht deutlich bei Kanarienvögeln, zuweilen auch bei Wellensittichen und leider auch sehr bedauerlicherweise bei japanischen Mövchen. Mit den wenigen Paaren dieser letztern, welche die Kriegszeit hindurch gehalten wurden, ist tüchtig darauflos gezüchtet worden und von ihnen stammt wohl die größte Zahl der im Handel erhältlichen Mövchen ab. Der Erfolg ist, daß es außerordentlich schwer hält, Mövchen zu erhalten, welche überhaupt noch zur Brut schreiten. Es wird nicht allzu schwierig sein, mit anderen Züchtern Männchen oder Weibchen auszutauschen.

Herr W. E., Oschatz i. Sa. Die zur Feststellung der Todesursache bestimmten Kadaver müssen an die Adresse des Herausgebers gesandt werden, nicht an die Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. Infolge der unrichtigen Adressierung war die Sendung zu lange unterwegs und die Fäulnis des Kadavers so weit fortgeschritten, daß die Feststellung der Todesursache nicht mehr möglich war. In den meisten Fällen ist es nicht möglich, die Ursache der Erkrankung, deren es sehr viele gibt, festzustellen.

Herrn Dr. St., Zürich; Herrn Dr. L., Brüssel; Herrn Dr. H. W. F., München; Herrn M. Sch., Karlsruhe; Herrn A. B., Jena; W. Sch., Frankfurt a. M.; Herrn G. W., Schötmar: Beiträge dankend erhalten.

Herrn F. F., Berlin-Friedenau. Beide Vögel sind kataplektischen Anfällen (Fallsucht) erlegen, eine bei Erlenzeisigen nicht gerade seltene Erscheinung.

Herrn A. C., Berlin. ♀ Rebhuhnastrild ist infolge von Blutarmut eingegangen.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite)

rgang 54 7. Mai 1925 Heft 19

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Gelbspötter. Von Paul Schwarz, Leipzig. (Schluß.)
Neueinführungen und Seltenheiten. Von Karl Neunzig. (Forts.)
Der Bluthänfling. Von Karl Finck, Neukölln. (Forts.)
Singsittichzucht. Schöner Erfolg — kurze Freude! Von Ado Mertes, Mainz.
Zu dem Artikel von Jos. Delvaux-Venlo (Holland) „Eine Streitfrage". Erwiderung von Karl Reich, Bremen.
Melanismus bei Gimpeln, Stieglitzen, Bergfinken, Lerchen und anderes. Von Wilhelm Schreitmüller, Frankfurt a. M.
Rotschwänze — Phoenicurus (*Forst.*). Eine Monographie von John Kuntzendorff. (Forts.)
Kleine Mitteilungen - Bücher- und Schriftenschau - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Ausstellungen - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellung.

Der Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Zwickau beabsichtigt in der Zeit vom 17.—21. Mai d. J. eine Vogelausstellung zu veranstalten.

Aus den Verbänden.

Bericht über die Tagung des Landesverbandes der Vogelliebhaber Sachsen und Großthüringen. Die Hauptversammlung des Landesverbandes gehört der Vergangenheit an. Sie bildete einen würdigen Abschluß des so erfolgreichen Jahres. Der Jahresversammlung voran ging ein Begrüßungsabend. Der Vorsitzende des Reichsverbandes, Herr Birk, begrüßte in Vertretung des Landesverbandsvorsitzenden sowie im Namen des Vereins für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig die zahlreich erschienenen Gäste aufs herzlichste. Der Abend selbst wurde durch Vorträge ernsterer und heiterer Art sowie durch stimmungsvollen Gesang eines Quartetts aufs beste ausgefüllt. Das Zusammengehörigkeitsgefühl, das uns Vogelliebhaber ja in so großem Maße auszeichnet, machte sich auch hier aufs angenehmste bemerkbar. Ein eifriger Gedankenaustausch ließ die Stunden leider viel zu schnell verrinnen, und schneller, als man gedacht hatte, war der so harmonisch verlaufene Abend zu Ende. Der nächste Tag stand im Zeichen der Jahresversammlung. Herr Höhne eröffnete dieselbe gegen ½11 Uhr vormittags und begrüßte die Erschienenen aufs herzlichste. Anwesend waren die Vertreter von 14 Vereinen, Herr Birk als Vertreter des Reichsverbandes, 3 Einzelmitglieder, die Herren Wenzel (Braunschweig), Ludwig (Halle) und Neunzig (Berlin), als Vertreter der „Wochenschrift" bzw. der „Gef. Welt" und zahlreiche Gäste. Der Bericht über die Tätigkeit des Landesverbandes zeigt, welch intensive Arbeit seitens des Vorstandes geleistet worden ist. Während wir vor Jahresfrist 11 Vereine mit zusammen 503 Mitgliedern, und 18 Einzelmitglieder aufzuweisen hatten, sind es am Schlusse dieses Jahres 17 Vereine mit zusammen 697 Mitgliedern 18 Einzelmitglieder, mithin ein Zuwachs von 6 Vereinen mit zusammen 194 Mitgliedern. Ein erfreuliches Zeichen wachsender Einsicht über die Bedeutung einer Organisierung aller Vogelliebhaber unseres engeren Vaterlandes. Ausgetreten ist ein Verein mit 16 Mitgliedern durch Auflösung desselben. An Ausgängen sind 163 und an Eingängen 79 zu verzeichnen. Vorstandssitzungen haben 5 stattgefunden. Der Bericht des Kassierers, Herrn Ludwig Böttcher, zeigt ebenfalls, daß der Landesverband auch finanziell zu gesunden beginnt. Die Einnahmen betrugen 407,45 M., die Ausgaben 331,80 M. Mithin bleibt ein Überschuß von 75,65 M. Im Rückstande verbleiben noch 5 Einzelmitglieder. Die Wahl des Vorstandes ergab einstimmige Wiederwahl des alten Vorstandes. Er setzt sich mithin aus den Herren Höhne als 1. Vorsitzenden, Waak als 2. Vorsitzenden, Hunger als 1. Schriftführer, Roth als 2. Schriftführer und Böttcher, Ludwig als Kassierer zusammen. Die erhöhte Tätigkeit des Landesverbandes auf organisatorischem Gebiete sowie die unbedingte Anschaffung einer Schreibmaschine lassen eine Beitragserhöhung für notwendig erscheinen. Der — in Würdigung der schlechten wirtschaftlichen Lage vorübergehend auf 0,50 M. festgesetzte — Beitrag von 1,— M. soll wieder in Kraft treten. Die Versammlung beschließt mit 64 gegen 27 Stimmen demgemäß. Der Antrag des Vereins für Vogelschutz und -pflege zu Dresden, die „Gef. Welt" solle Verbandsorgan bleiben, findet seine Erledigung, indem sich der Landesverband verpflichtet, sämtliche Veröffentlichungen in der „Gef. Welt" erscheinen zu lassen. Der Antrag der Singvögel- und Aquarienfreunde zu Ebenstock, den angeschlossenen Vereinen bei Ausstellungen ein Diplom bzw. Medaille zur Verfügung zu stellen, wird einstimmig abgelehnt. Um auftretende Mißhelligkeiten zu vermeiden, muß die Sache zurückgestellt werden, bis eine einigermaßen einheitliche Regelung der Käfigfrage erfolgt ist. Der Antrag der Bezirkskonferenz zu Aue wünscht bei vorkommenden Fällen die Stellung eines Rechtsvertreters. Alle Mitglieder werden ersucht, vorkommenden Falles den Reichsverband zu benachrichtigen, der dann das Weitere veranlassen wird. Der Betreffende muß die Sache entsprechend begründen und verpflichtet sich zur Übernahme etwa entstehender Kosten. Über die Pflege von Stieglitz, Hänfling und Zeisig ist eine von Herrn Birk verfaßte Broschüre erschienen. Herr Wenzel, Braunschweig, stellte in dankenswerter Weise dem Landesverbande einige Probeexemplare gratis zur Verfügung, von welchen jedem Vertreter ein Stück ausgehändigt wird. Weiter gelangten vom Reichsverband Mitgliedskarten zur Verteilung. Jedes Mitglied des Reichsverbandes, ganz gleich ob Vereins- oder Einzelmitglied, soll eine solche erhalten. Soweit noch Karten fehlen, werden sie den in Frage kommenden Mitgliedern nach Fertigstellung zugestellt. Herr Schmidt, Zwickau, macht noch auf die vom 17. bis 21. Mai stattfindende Vogelschau aufmerksam und bittet um rege Teilnahme. Das Schlußwort ergreifend, bittet Herr Höhne, die Liebhaberei so auszuführen, daß sie der öffentlichen Kritik standhält. Er dankt dem Leipziger Verein für seine so vorbildlich veranstaltete Vogelschau und fordert alle Anwesenden auf, auch weiterhin am Ausbau des Landesverbandes intensiv mitzuarbeiten. Die Vereinigung aller Vogelliebhaber im Freistaate Sachsen und Großthüringen wird auch im neuen Jahre das höchste Ziel des Landesverbandes sein, im Interesse unseres idealen Sports, zum Wohle der gesamten deutschen Vogelliebhaber.

Der Vorstand. J. A.: Hunger, Schriftführer.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Verband der Finkenvereine Ruhrgau-Bochum. Der Verband veranstaltet am 24. Mai 1925 in Bochum i. Westf. ein großes „Werbewettsingen". Das Singen findet statt in den Anlagen des Ausflugsortes Waldesruh, Inhaberin Ww. Weitkämper, Waldstr., direkt am Südpark gelegen; von jedem Bochumer Bahnhof leicht erreichbar. Anmeldung der eventuell einzusetzenden Vögel, spätestens bis 15. Mai, an folgende Adresse: Friedrich Becker, Bochum i. Westf., Bahnhofstr. 10.

Aus den Vereinen.

Aufgenommen ist Mitgl. Nr. 135 n Zollinspektor Grabmeyer in Baden-Baden; Mitgl. Nr. 136 n Gustav Merz in Königsberg in Bayern. Der Vorstand hat sich auf Antrag veranlaßt gesehen, Mitgl. Nr. 247 auszuschließen; die Nummer ist im Mitgliederverzeichnis zu streichen. — Interessenten sei mitgeteilt, daß Mitgl. Nr. 3 die Anfertigung praktischer Fußringe für Wellensittiche (offene starke Aluminiumringe) und Unzertrennliche, Nymphen- u. a. Sittiche (offene Neusilberringe) übernommen hat. Bei ausreichendem Bestelleingang wird die Herstellung sofort vorgenommen. Passende Zangen zum Anlegen der Ringe werden mitgeliefert. Hiermit dürfte einem dringenden Bedürfnis abgeholfen sein.

Der Vorstand. J. A.: A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37 a. Gäste stets willkommen.

J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Vereinsl.: Karl Röhr, Heiligerweg 28. Versammlung jeden 2. u. 4. Sonntag im Monat, nachmittags 5 Uhr. Liebhaber herzlich willkommen. J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Rietschelhof", Rietschelstr. 19. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinslokal „Parkhotel", Epinayplatz 1, Versammlung. Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an. Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Vogelliebhaber Hamburgs, schließt Euch dem Hamburger Verein für Vogelschutz und -liebhaberei an! Nehmt teil an den billigen Futterbestellungen und an allen anderen Vorteilen, welche Euch dadurch entstehen, daß Ihr in unserem Verein mit anderen wirklichen Vogelliebhabern Hamburgs bekannt werdet. Stärkt durch Euren Beitritt nicht nur unseren Verein, sondern dadurch auch den Reichsverband der deutschen Vogelliebhaber, Sitz Leipzig, e. V., so daß unsere gemeinsamen Interessen durch den Reichsverband genügend gewahrt werden können. Sitzungen finden statt jeden 1. und 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Der Verein bezweckt den Zusammenschluß aller wirklichen Liebhaber einheimischer und fremder Sing- und Ziervögel und bietet auf seinen Sitzungen viel des Vorteilhaften und Interessanten auf dem Gebiete der Stubenvogelliebhaberei. Gäste herzlich willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 19. Mai. Nähere Auskunft durch den Vorsitzenden Arnold Weber, Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber. Nächste Veranstaltungen: Donnerstag, den 28. Mai: Vereinsabend im Landesheim, 8¼ Uhr, Vortrag Dr. Neuwerth: „Mohrrüben-Fütterung". Donnerstag, den 18. Juni: Vereinsabend im Landesheim, 8¼ Uhr, Vortrag Böneker: „Australische Körnerfresser". Donnerstag, den 9. Juli: Vereinsabend im Landesheim, 8¼ Uhr, Vortrag Klocke: „Mimikry". Alle Mitglieder werden herzlich gebeten, möglichst an allen Veranstaltungen teilzunehmen.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, in den Wintermonaten von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Freunde und Gönner herzlichst willkommen. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Vereinsabend regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends um 8 Uhr) beim 1. Vors., Herrn Jahn, Feodorastr. 7. Jena besuchende Vogelfreunde wollen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. A. Voigt.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstr. 1, Fernspr. Rheinland 1223 Nr. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. Sonntag, ½9 Uhr, im „Thüringer Hof", Ringelpütz 43. Gäste willkommen. — Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 7. Mai 1925. Gäste willkommen. M. Roth, Schriftf., L.-Plagwitz.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Normast im „Kaiser Friedrich", Breslauerstr. 50. Liebhaber willkommen. J. A.: Friedrich.

Verein der Vogelliebhaber zu Lübeck (Ziervogelverein). Generalversammlung am Montag, den 6. April 1925. Tagesordnung: 1. Verlesen des Protokolls; 2. Jahresbericht; 3. Kassenbericht des Kassenführers; 4. Wahl der satzungsgemäß ausscheidenden Vorstandsmitglieder; 5. Verbandsangelegenheiten; 6. Verschiedenes. Um 8½ Uhr eröffnete der Vorsitzende die von 12 Mitgliedern besuchte Versammlung. Protokoll der letzten Versammlung wurde verlesen und genehmigt. Laut Jahresbericht wurden im letzten Vereinsjahr 11 Mitglieds- und 1 Generalversammlung abgehalten, durchschnittlich von 10—12 Mitgliedern besucht. Mitgliederzahl betrug am Ende des Vereinsjahrs 23 männliche Mitglieder, 2 Ehrenmitglieder. Vom 15. bis 17. November letzten Jahres hielt der Verein im großen Saale der Turnerschaft seine öffentliche Vogelausstellung ab, die sehr regen Besuch aufwies. Am Sonnabend darauf gemütliches Beisammensein der Mitglieder und der Preisrichter im Vereinslokal. Dem Kassenbericht folgte die Wahl des ausscheidenden 1. Vorsitzenden, des Schriftführers und eines Beisitzers. Als 1. Vorsitzender wurde Herr Max Wischendorf, als Schriftführer Herr Bösel einstimmig wiedergewählt, als Beisitzer wurde Herr Zembsch neu gewählt. Die Gewählten nahmen die Wahl an. Die Kasse wurde geprüft und dem Kassierer Entlastung erteilt. Verbandsangelegenheiten: Der diesjährige Verbandstag findet am 27. Juni in Flensburg statt. Anträge sind bis spätestens 15. Mai einzubringen. Die beiden Mitglieder erhielten die von dem Verband inzwischen eingetroffenen Medaillen, die ihnen nachträglich von demselben für besondere Leistungen auf unserer Ausstellung zugesprochen wurden. Zu Revisoren für die diesjährige Zucht wurden gewählt die Herren: Sagell, Zembsch, Platthoff, Erbe, Frank, Hänsel, Bösel, Otto Steinhagen und Marschallek. Die Preise der Sammelbüchse für die diesjährige Vereinsausstellung wurden festgelegt und für Himmelfahrt dieses Jahres ein Ausflug nach Hamburg beschlossen, um den Zoologischen Garten und eventuell auch Hagenbecks Tierpark zu besichtigen. Schluß 10^{45} Uhr. In der Sammelbüchse befanden sich 1,45 M. Herm. Bösel, Schriftf.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Str. gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Tage im „Goldenen Falken" Versammlung; nächste Freitag, den 15. Mai. Liebhaber willk. Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Versammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Liebhaber willk. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebenda. R. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche des Monats nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen.
Studienrat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. jedes Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant „Zur Bleibe", Katharinenkirchhof. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Vogel-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50. **Schlagnetze** f. kl. schädl. Vögel M. 2,30, f. gr. M. 2,50 u. 2,80. Katalog gratis. **J. Tannen, Gronau 58,** Westf. [618

Vogelfutter [619

für **Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser.** Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Universalfutter I

für Rotkehlchen, Nachtigallen, Grasmücken, Sprosser
Kilo 2 *M.* [620

Universalfutter II

für Drossel, Amsel, Stare
Kilo 1.50 *M.*
Vom Besten das Beste empfiehlt
Gebel, Köln, Jakobstraße 8.

Mehlwürmer

à Pfund 5 *M*, bei 6 Pfund Porto und Verpackung frei.
Ia Weißwurm . . . à Pfd. 5 *M*
Ia Muska-Zecken . . à „ 2,50
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen . . . à Pfd. 0,75
a Garnelen, gem. à Pfd. 0,40 *M*

Ia Universalfutter.

Alecwa I für Nachtigallen 2.— *M*
„ **II für Grasmücken** 1.80 *M*
„ **III für Drosseln** 1.50 *M*
Proben und Analysen zur Verfügung. Vertreter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [621

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser

A. Eckrich II., Waldsee (Pfalz).

Mehlwürmer

veget. gez., 1/4 Liter franko gegen Vor-
622] einsendung von Mark 2.—.
Bonitas-Versand, Rostock i. M. 3.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co., Biesenthal I** (Mark). [623

Frische Ameisenpuppen, die ersten, à Ltr. 3.40
bei Voreinsendung.

Ameisenpuppen	Pfund	6.—
Weißwurm	Pfund	5.—
Muska (Zecke)	Pfund	2.—
Muska, Postkolli franko		15.—

Mein Weichfutter „Primus" ist bisher von keiner anderen Qualität übertroffen worden. Pfund 2.50 M.

Weichfutter „Ornis"	Pfund	0.80
Kolbenhirse	Pfund	1.60
Senegalhirse	Pfund	0.50
Algierhirse	Pfund	0.60
Mohairhirse	Pfund	0.60
Silberhirse	Pfund	0.60
Marokkohirse	Pfund	0.40
Kokos- und Agavefasern,	Pfund	1.50
Exotennester	à	1.50

Wellensittichnistkästen, aus Naturstamm ausgebohrt, à 1.75 M.
Wellensittichringe, gedreht in 4 Farben, 100 Stück 4.— M.
Milbenstangen, à 0.20

E. W. Lenger, Berlin N 58
Schönhauser Allee 70a [624
Postscheck Berlin 88386

625] **Mehlwürmer,** reine Ware, gegen Eins. von 1.75 *M* 1/4 Pfd. franko. **Th. Witte,** Niederndodeleben b. Magd.

Züchterwaren

Verbesserte L. K.	1/2-Kilo-Paket	N.-M. 1,40
Rübsen, selten schöne Züchterware	1/2-Kilo	„ 0,50
Glanz, Marokko großkörnig	„	„ 0,50
Hanf, deutscher	„	„ 0,35
Hafer, geschält	„	„ 0,35
Lein- und Negersaat	„	„ 0,45
Ital. Silberhirse	„	„ 0,45
Blau-Mohn, Speiseware	„	„ 0,60
Marokko-Hirse	„	„ 0,30
Prima Mischfutter für Kanarien, eigenes Verfahren	„	„ 0,50
Waldvogelfutter	„	„ 0,45
Sonnenrosenkerne, gestr.,	„	„ 0,35
Salatsamen, weiß,	„	„ 1,50
Sepiaschalen, große Stücke	„	„ 1,50
Einäpfchen aus Glas	Stück	„ 0,10
Futternäpfchen aus Glas	„	„ 0,15

Piep und Piep extra zu Originalpreisen.
Vereine und Großbezieher verlangen Sonderofferte. [626

Lorenz, Dresden, Drehgasse 5.

Schamadrosseln

ausgefärbte, ganz hervorragende Sänger, fehlerfrei . . . . Stück 70.—
1 Schamaweibchen . . . . 50.—
Bergmeisen . . . . Stück 30.—
1 Rötelmerle, 1 ind. Blaumerle.
Blaurotschwanz — Phoenicurus frontalis.
Weißbrüstiger blauer Waldschmätzer — Tarsiger rufilata.
1 Klarinettenvogel . . . . 60.—
Blauspötter . . . . Stück 35.—
1 Flötenwürger . . . . 40.—
Ind. Maskenwürger . . Stück 20.—
Ind. Grauwürger . . . Stück 20.—
1 Würgerschnäpper . . . . 30.—
1 Borstenhäherling . . . . 20.—
1 Blaubartblattvogel . . . 60.—
1 Braunscheiteltimalie . . . 30.—
Laufhühnchen . . . . Paar 30.—
Reisfinken . . . . Paar 6.—
Grassittiche . . . . Paar 18.—
Kubasittiche . . . . Paar 30.—
Katharinasittiche . . . . Paar 28.—
Kanarienflügelsittiche . . Paar 35.—
Tuisittiche . . . . Paar 35.—
Pavuasittiche . . . . Paar 45.—
1 Paar Spix-Ara, 1 Benguelapapagei.
Ganz zahme, junge Mohrenkopfpapageien, leicht sprechen lernend . . . . Stück 35.—
50 junge, sehr sprachbegabte Blaustirnamazonen.
Rosella und Penantsittiche.
Feuerflügelsittiche, zahm . Paar 38.—
Dominikanerkardinäle . . Paar 16.—
Lasurblaue Bischöfe . . . Paar 16.—
Safranfinken . . . . Paar 12.—
Weißscheitelpfäffchen . . Paar 15.—
Braunkopfammern ♂♂ . Stück 5.—
Weißkopfnonnen . . . Paar 13.—
Dreifarbige Nonnen . . Paar 18.—
Wellensittiche, erstklassige Zuchtpaare, grün und gelb . Paar 16.—

Porto und Verpackung M. 3.50, als Dringend M. 6.50. Versand Nachnahme. Anfrager wollen Rückporto beifügen. [627

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a.

Züchter-Urteile:

Ein amerikanischer Züchterkollege hat mich gebeten, ein mir als gut bekanntes Kanarien-Nährfutter für ihn zu bestellen. Ich möchte aus den mir bekannten Futtermitteln Ihre „L. K.-N." wählen und bitte Sie 1 Postpaket „L. K." sofort zu senden. Berlin-Steglitz, 15. 4. 25. E. Weigand.

Bitte Sie um Übersendung von 2 Paketen „L. K.-N." Ich habe dieses Jahr, nachdem ich Ihre „L. K.-N." verfütterte, sehr gute Erfolge. Senden Sie mir dieselbe recht bald, da ich nur noch wenig habe, und zu nichts anderem mehr greifen möchte.
Gingen, 16. 4. 25. Fritz Koch.

Nach erfolgreicher Anwendung Ihrer beliebten „L. K.-N." bestelle wieder eine Kiste (50 Pakete) „L. K.-N." zum gleichen Preise wie die letzte Sendung. Ich bitte Sie höflichst die Bestellung bald zu senden.
Eßlingen, 20. 4. 25. Fr. Oesterle.

Lorenz, Dresden
Drehgasse 5. [628
Die Originale obiger Zuschriften haben uns vorgelegen.
Die Schriftleitung der „Kanaria".

Täglich
frische Ameiseneier
prima Vogelfutter
für Kern- und Weichfresser
Fritz Sterling
Spezialgeschäft für Weichfresser
Berlin NW 5, Perleberger Str. 35
Amt Moabit 4733. [629

1,1 prachtv. Schwäne 23, 170 *M*. Schloß. Allersberg b. Nürnbg. [630

Hanfknicke

gebraucht oder ungebraucht sucht
Fritz Richter, [631
Kamenz in Sachsen.

Vertretung.

Welche Firma ist gewillt, Vogelfutter auf Kommission oder Ziel zu vergeben?

Tausch. Ia Schwarzplattel und **ebensolche Wachtel,** sehr laut im Schlag, da beides doppelt vorhanden, gegen **Weichfutterfresser.** Werte Anschriften an **Rud. Seifert, Weißenborn 15 b,** b. Freiberg i. Sa. [632

Wellensittich-Nistkasten

das Beste, was es gibt, per Stück 2 *M*, gebrauchte Stück 1,10 *M*, gibt ab [633
Frau Klara Neugebauer, Deutsch-Lissa.

Vertausche: Lautes Wipfelrotkehlchen, Schwarzplattel, Nachtigall, Sprosser gegen Ameiseneier oder Mehlwürmer. [634
Riedel, Gittersee, Dresdenerstr. 19.

Abzugeben: 1,1 Zebraf. 18 *M*; 0,2 kl. Kubaf. Stck. 13 *M*; 1,1 Spitzschwanz 50 *M*, alles selbstgez. Zuchtpaare, Edelsänger (♂ herrl. Sänger) 10 *M*. Tausche zw. Blutwechsel 1,0 Spitzschwanz. Suche ferner 0,1 Helenafas., 0,2 Grauastr., 0,1 Sperl.-Pap., 0,1 Tigerfink. [635
A. Voigt, Jena, Feodorastr. 13.

Neu eingetroff

Massenawachteln, schöne Z
Zuchtpaar 30 M., **Katharinas**
à Paar 25 M., **Kubasittiche,**
15 M., **rote Kardinäle,** à Stü
sowie noch größere Auswahl von
Nr. 15 der „Gef. Welt" ange
Vögeln.
Paul Tzornack,
Berlin NO. 55,
Prenzlauer Allee 189

Seltenheit

Gebe ab:
fingende Köhler-A
(einzig. Exemplar i. Hande
Suche bzw. tausche a
Steinrötel, Ia einsch. B
und prima Feldlerche
Duran, Duisbur
Musfeldstr. 6a.

Verk.: **„Gef. Welt"** Jg
1909—17 à 3
1914 fehlt H. 22, 1917 fehlt
Gerh. Schmitter, Essen-Haa
Humboldtstr. 306.

Ein brasilianisches
Schamadrosselweib
zur Zucht geeignet, zu kaufen
Off. an **Fr. Benkert,**
Leipzig, Härtelstraße 17, 4.

Weg. Platzmangels verkaufe folg.
1,1 Kanarie, gelb, einj., erprob.
da vor. J. 17 Junge großgez., zu
1,1 Stiegl., j. Bast.-J. g., d. aufge
1,0 hell. Stiegl.-Kan., fleiß. Säng
Verpack., Porto extra, Nachnahm
Linda Hirsch, Aubstadt, Unt
640] A. Z.-Mtgl. 283; Ornis 31

Prima Harzer
Kanarien-Säng
(Stamm Seifert)
mit schöner Hohlrolle, Hoh
Schockel, Knorre, Glucke und
Pfeifen, à 12, 15 u. 20 *M*, V
à 3 u. 4 *M*. Versand geg. Nac
Probezeit 6 Tage, was nicht
tausche um.
H. Voigt,
Kanarienzüchter,
Nordhausen am H

Junge Italiener Landh
beste Legetiere, 3—4 Monate a
gesund, p. Stück 3 *M*. Garan
Ankunft. Geflügelpark **M. J. Le**
Elmpt bei Brüggen (Rhld.)

Offeriere in gesunden und fe
Exemplaren: Vollständ. zahme A
Affen 70 *M*, Mohrenkopfpapag
25 *M*, Elfenbeinsittiche P. 35 *M*
Eichhörnchen (Zentral-Amerika)
643] **A. Fluck, Bremen,** Kna

Jeder Vogelliebh
verlange **Preisliste** über **Vog**
Utensilien und **Bedarfsar**
Zucht und Pflege der V
Hermann Sieve
Hannover, Inselst

Vert. 1 kl. Grammophon, 6 S.
11 Stück 18-cm-Doppel-Platt.
Stifte, alles neu, geg. ausl.
Körnerfr., Sänger.
R. Mesthorn, Lößnitz, Stei

Inserat

für das am 14. Mai 19
Ausgabe gelangende He
Gef. Welt erbitten bis

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 14. Mai 1925 | Heft 20

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Meine Drosseln.

(Aus 50jährigen Erfahrungen.)

(Nachdruck verboten.)

Heute, am 10. März, ist der erste richtige Wintertag bei uns in Mitteldeutschland eingekehrt: weiße Landschaft soweit das Auge reicht, 4—5 Grad Kälte gegen 7 Uhr morgens, und dabei rieselt von Zeit immer noch mehr Schnee in dichten Flocken vom Himmel. Ich gedenke dabei traurig der armen gefiederten Sänger, die schon im Vertrauen auf den hier längst herrschenden Frühling — wenigstens dem bisherigen Wetter nach — zu uns zurückgekehrt sind, Hörte ich doch vor schon gute 14 Tagen die ersten Feldlerchen singen und der Starmatz besucht seit mehreren Tagen eifrig meine Nistkästen. Den ersten Ruf der Blaumeise, die allerdings wie alle Meisen, unsere ständigen Weggenossen sind, vernahm ich bereits am 7. Februar: „it is Tied, it is Tied", so schallte er eifrig aus den Bäumen unserer städtischen Anlagen, und am 1. März schlugen mehrere Finken im freundlichen Sonnenschein schon fast ihren Schlag durch. Die Amsel hörte ich in diesem Jahre zum ersten Male am 27. Januar halblaut. Da ich seit mehr als 50 Jahren eifriger Vogelliebhaber bin, so achte ich natürlich auf alle Vorgänge in der Vogelwelt sorgfältig, d. h. soweit ich sie erreichen kann. Meine Stubengenossen: Schwarzplatte, Singdrossel, Reitzugfink, Hänfling, Stieglitz und Zeisig schaffen mir längst den Frühling in die Stube. Aber gerade der heutige Spätwintertag führte meine Gedanken weit zurück, war's doch auch ein solcher Tag, als ich meine erste Schwarzdrossel erbeutete. Unsere einheimischen Körnerfresser, namentlich die vorgenannten Arten pflegte, ich seit meinen Knabentagen — an Weichfresser, also an unsere edleren Sänger, hatte ich mich noch nicht herangetraut, abgesehen von einigen Würgern, die ich jung dem Nest entnahm. Besonders waren mir die Drosselarten ganz unbekannte Größen geblieben. In meiner Heimat, einem kleinen Städtchen an dem mittleren Lauf der Elbe, in dessen Umgebung Waldungen ganz fehlten, gab es Drosseln nicht; denn bekanntlich hielten sich dieselben zu der Zeit, d. h. vor etwa 50—60 Jahren, meistens noch in Wäldern auf, Stadtbewohner sind sie, wie wissenschaftlich feststeht, erst später geworden. Erst in meinen Jünglingsjahren — ich stand im 22. Lebensjahre — war ich in einer Stadt dienstlich beschäftigt, die rings von großen Waldungen umgeben war. Auch sie lagen der Elbe, im Norden und Süden und und auch im Osten, jenseits der Elbe, reichten dichte Forsten nahe an sie heran. Letztere lagen so nahe, daß man zur Hirschbrunst die Schreie der Hirsche (Rotwild) bis auf den Marktplatz hörte. Natürlich gab es in diesen Waldungen auch viele Amseln und Singdrosseln, deren Gesang von allen Seiten ertönte. Es war ein Eldorado für Vogelliebhaber. Im Winter kamen die Amseln überall auf die Höfe und in die Hausgärten. Da kam mir natürlich der Gedanke, eine Amsel zu fangen. Wir hatten damals auch einen schneereichen Nachwinter bekommen, und ich stellte ein größeres Schlaggarn mit Ebereschen beködert im Garten auf. Nach mehrfachen Fehlschlägen fing ich endlich ein hübsches Männchen. Meine Freude war groß. Es war ein mehrjähriger Vogel, denn sein Gefieder war tiefschwarz, der Schnabel und die Augenränder goldgelb. Einen Kanarienheckbauer gab ich ihm zur Wohnung und als Futter Semmel in Milch, auch gekochte Kartoffeln mit Gerstenschrot. Von der eigentlichen Vogelpflege von Weichfressern hatte ich noch keine große Ahnung, auch waren Futtermischungen am Orte nicht käuflich. An der Amsel erlebte ich auch nicht viel Freude, weil sie immer scheu blieb und nur sang — zunächst leise —, wenn niemand im Zimmer war. Später wurde sie jedoch laut, namentlich in den frühen Morgenstunden, und zwar so früh, daß ich dadurch Unannehmlichkeiten mit den Hausbewohnern bekam. Da ich im Hause gewissermaßen nur geduldet war, so mußte ich mich dem harten Zwang fügen und die Amsel abschaffen. Ich gab ihr nach einigen Monaten die Freiheit wieder und ließ sie fliegen. Mit lautem schrillen „Tritschrittaktak" sauste sie davon. Im Frühjahr und Sommer habe ich dann eifrig Amsel- und Singdrosselnester in den Waldungen der Umgegend gesucht und viele gefunden. Die Anschaffung der Vögel aber verschob ich, bis ich einst einen festen Wohnsitz gefunden hätte. Die Nester der Amsel fand ich schon zeitig im Jahr — oft im März — in einem Holzstoß, in dichtem Gebüsch oder auch auf Wurzelstöcken aus dünnen mit Moos, Flechten und Wurzeln von der gewöhnlichen Heide mit dazwischen ge-

flochtenen Reiserspitzen, innen mit Lehm oder anderer Erde verklebt und darüber mit Halmen und Würzelchen ausgelegt. Die Eier sind graugrün mit unreinem Grundton, heller gefleckt wie die der Singdrossel, auch marmoriert. Auch Nester der Singdrossel traf ich häufig an, sie waren halbkugelig, sehr fest und warm gebaut, standen auf niederen Baumästen und größeren Büschen, z. B. fand ich sie in mannshohen Eichenschonungen und in Lebensbäumen, auswendig mit Moos und Flechten, Wurzeln und dürrem Gezweig, inwendig mit Lehm, Kuhmist und faulen Holzsplittern sorgfältig und glatt verkittet. Die Eier — gewöhnlich 4—5 — haben einen blaugrünen Grund und sind schwarzbraun gezeichnet. Wenn man Kenner ist, wird man Nest und Eier beider Vögel sofort unterscheiden. Ich habe in späteren Jahren oft Junge den Nestern entnommen und aufgefüttert, hierauf komme ich weiter unten zurück.

In den frühen Morgenstunden — ich war und bin noch Frühaufsteher — hallte die Umgebung des Städtchens von den herrlichen Drosselliedern wieder: tief, voll und markig schallt's aus der Kehle der Singdrossel dazwischen das melancholisch flötende Lied der Amsel in langsamer Kadenz erklingend. Ergriffen und gehoben stand ich oft auf einer Waldschneise, und beim Lied der Singdrossel zogen die Dichterstrophen durch mein Gemüt:

„Was bringt aus Frühlingssturm so laut und schön?
Willkommen du, o Waldesvollgetön!
Du Drossel singst, nun hat es keine Not,
Du rufst den Lenz und schlägst den Winter tot.
O mächtig süße Meist'rin musizier',
Und weck aus tiefem Schlaf das Waldrevier!"

Die Singdrossel blieb seit diesen fernen Tagen eigentlich mein Lieblingsvogel, und ich habe deren viele gehalten. Die Amsel störte mich bei ihrer Haltung im Zimmer durch ihren eigentümlichen Geruch, der ihr anhaftete und der für die Geruchsnerven doch empfindlich wird. Gerade bei dem Aufenthalt in dem betreffenden Städtchen, der mir im Frühjahr bis zum Sommer hinein durch den Drosselgesang so hohe Genüsse gewährte, lernte ich auch zu meiner tiefen Betrübnis die Nachtseite der Vogelfreuden kennen: den Dohnenstieg. Ich war im Laufe der Zeit mit den Förstern, namentlich den Hilfsjägern und Forstlehrlingen bekannt geworden und wurde von ihnen in den Dohnenstieg mitgenommen, deren es in jedem Revier zu der Zeit noch zahlreich gab. Da wanderten wir dann morgens beim Tagesgrauen an nebligen Herbsttagen los. Jeder trug ein Netz für die erbeuteten Vögel und eine Jagdtasche mit den Vogelbeeren (Ebereschen). In vielen Dohnen hingen neben den Krammetsvögeln, denen eigentlich der Fang gelten sollte, Singdrosseln und Amseln. Die süßen Liederkehlen waren durch die Pferdehaarschleife abgedrosselt, und „stumm schläft der Sänger". Ein großer Segen ist und bleibt für unsere einheimische Vogelwelt die gesetzliche Abschaffung des Dohnenstiegs! Diese vorgeschilderten Ereignisse spielten sich im Jahre 1881 ab.

(Fortsetzung folgt.)

Mein Mohrenkopf.

Von Max Schneider.

(Nachdruck verboten.)

Unter diesem Titel brachte uns die blaue Wochenschrift in Nr. 9 des laufenden Jahrganges einen dankenswerten Artikel aus der Feder des Herrn Dr. Luig (Brüssel) mit einer reizenden, naturgetreuen Abbildung. Diese ansprechende Abhandlung veranlaßt mich, den warmen Empfehlungen, die Herr Dr. Luig dem reizenden Kerlchen mit auf den Weg gibt, das Wort zu reden, um so mehr als ich durch Leser des A. Z.-Jahrbuches aufgefordert wurde, auch über meinen zahmen, sprechenden Mohrenkopf in der „Gef. Welt" Näheres zu berichten. Nun ist es freilich nicht allzuviel, was ich da anführen kann, und die Leser dieser Zeilen werden sich vielleicht etwas enttäuscht fühlen, zumal über den Mohrenkopf in diesen Blättern in den letzten Jahren schon so viel Rühmliches und Erfreuliches erzählt wurde, daß sich zu seinem Lobe kaum etwas hinzufügen, geschweige denn etwas Neues sagen läßt. Ich erinnere nur an die Schilderungen des Herrn Lichtenstaedt (Jahrg. 1921 S. 161), Fritz Braun (Jahrg. 1908 S. 389 und 1909 S. 59) und der Damen Cora Brick, Hildegard Schütt und Frau Oberin Kanzler (Jahrg. 1914 S. 69, 377 und 156); auch der hervorragende Papageienpfleger Herr Emil Kaforke rühmt in einer seiner bekannten kurzen und treffsicheren Abhandlungen den Mohrenkopf und sein drolliges Sprechen. Wer jemals den Mohrenkopf in einem einzelnen jungen Exemplar oder in einem Pärchen besaß, ist entzückt von dessen liebenswürdigem Wesen, und wenn ihn schon von Schlechtendahl als den liebenswürdigsten und menschenfreundlichsten Vogel preist und Lichtenstaedt als den entzückendsten und reizendsten Papagei bezeichnet, den wir überhaupt für unsere Käfige besitzen, so kann ich dies nach meinen Erfahrungen nur unterschreiben, obwohl ich doch gewiß schon viele große und kleine Papageien verpflegt habe. Auch einen Mohrenkopf habe ich schon vor Jahren mal besessen, der schon vollständig zahm (von Götz in Neuulm) in meine Hände kam, in kurzer Zeit seinen Namen „Coco" und das Wort „Papa" aussprechen lernte und mir und den Meinen viel Freude machte, den wir aber trotzdem verschenkten an eine — schon etwas ältere junge Dame, die einige Zeit bei uns zu Gaste weilte und sich in den so überaus zahmen und anhänglichen Vogel derart vernarrete, daß wir kaum anders konnten, als unserem Gast beim Abschied den lieben kleinen Kerl auf dem Altar der Nächstenliebe — wenn auch schweren Herzens — zu opfern. Aber das Heimweh nach dem so schnöde weggeschenkten Hausfreund war so groß, daß wir immer von ihm sprachen und ich, sobald nach dem Weltkrieg wieder überseeische Vögel in unserem Vaterlande auftauchten, mich eifrigst bemühte, Ersatz für den Verlorenen zu finden. Im vorigen Frühjahr entdeckte ich nun bei einem Münchener Händler ein Paar ganz junge, noch auffallend kleine und mattgefärbte Mohrenköpfe, die der Händler aus Italien mit kleinen Alexandersittichen und einem Braunwangensittich zusammen unter der Bezeichnung „Indische Perekitos" erhalten hatte. Dem Händler waren diese drei Vögel unbekannt, und ich freute mich

hm die Art feststellen zu können. Der Braunwangen-ittich war ein sehr hübscher und liebenswürdiger Vogel, die beiden kleinen Mohrenköpfchen noch sehr cheu und ängstlich; ich hätte sie gerne gekauft, aber der überaus starke Durchfall, an dem sie litten, rief mir zunächst ein warnendes Nein zu und obendrein konnte sich der Händler noch zu keiner Preisfest-setzung entschließen. Als ich nach meiner Heimkehr zu Hause von den Mohrenköpfen erzählte und meine Frau gar sehr bedauerte, daß ich den Ankauf unter-lassen, war das Ende vom Liede, daß ich nach acht-tägigem Zögern bei dem Händler nochmals nach dem Preise frug und, da dieser ziemlich bescheiden war, die Vögel bestellte, nach einigem Warten jedoch die Nachricht erhielt, daß dieselben inzwischen ander-weitig verkauft worden seien. Dafür erhielt ich zu gleicher Zeit von Götz in Neuulm die Nachricht, daß schöne junge Mohrenköpfe bei ihm eingetroffen seien, und wenige Tage nachher hielt ein solcher bei uns seinen Einzug. Es war tatsächlich ein auffallend schön gefärbtes Exemplar, das sich anfänglich sehr zurückhaltend zeigte, wenn wir uns bei ihm anbiedern wollten, aber durch den gemütlichen, menschenfreund-lichen Ausdruck, den er bei stiller Beobachtung zeigte, doch gleich unser volles Vertrauen erweckte, das er auch nicht täuschte, denn er wurde binnen wenigen Tagen schon so zahm und zutraulich, wie man es nur von einem Mohrenkopf erwarten kann, und ist rasch zum gefeierten Liebling der Familie geworden. Er vergilt uns mit Gegenliebe und hat nur immer das Bestreben, bei uns zu sein und sich mit uns zu unterhalten. Fremde liebt er nicht und geht solchen nie freiwillig auf die Hand, benimmt sich aber auch gegen diese durchaus freundlich und gesittet. Wir können über-haupt alles mit ihm anfangen, was wir wollen — ein Vorrecht, von dem meine kleine fünfjährige Enkelin Inge ausgiebig Gebrauch macht, und obwohl Mohrchen von der Kleinen dann gewöhnlich mehr als ihm an-genehm genudelt und gehudelt und nicht immer mit der nötigen Zartheit behandelt wird, ist er ihr doch nicht gram, läßt sich von ihr hätscheln und knutschen, im Puppenwägelchen spazieren fahren und sonst alles gutwillig gefallen, trotzdem er sich bei ihrem Er-scheinen stets in Sicherheit zu bringen sucht; auch er scheint mit Falstaff zu denken: „der größere Teil der Tapferkeit ist Vorsicht". Gutmütigkeit und Ge-mütlichkeit sind überhaupt die Grundzüge seines ganzen Wesens, am gemütlichsten ist es ihm wohl, wenn er mir oder meiner Tochter auf Hand oder Schulter sitzen oder nach lukullischer Mahlzeit hinter uns auf Stuhl- oder Sofalehne sich beschaulicher Ruhe hin-geben darf; dann muß man ihn sehen, mit welcher Behaglichkeit er sich breit macht, unter gemütlichem Knurren und leisen Plaudertönen stillzufrieden die Vorgänge in seiner Umgebung beobachtend. Man braucht ihn dann nur anzusehen oder gar anzusprechen, so streckt er sein Köpfchen her zum Krauen und bettelt unter zärtlichen Gebärden und mit so un-widerstehlicher Liebenswürdigkeit, daß man ihm wohl oder übel nachgeben muß. Das gleiche ist der Fall, wenn er im Käfig hinter geschlossener Türe sitzen muß, ist diese aber geöffnet und man geht ahnungslos am Käfig vorüber, so hat er mit Blitzesschnelle den Ärmel des Vorbeigehenden erfaßt und klettert hurtig auf die Schulter, so rasch und leise, daß man es oft gar nicht merkt und hinterher mit Verwunderung sein Dasein gewahrt. Wenn man das Zimmer ver-läßt, ohne die Zimmertür hinter sich zu schließen, kommt Mohrchen überallhin nachgetrippelt, hat man aber die Türe geschlossen, so faßt er neben derselben Posto und harrt geduldig auf ihr Geöffnetwerden. In allen Ecken und Winkeln treibt er sich herum und ist gar manches liebe Mal verschwunden, bis wir ihn schließlich auf einer Gardinenstange oder unter einem Möbelstücke finden. Sehr schlimm war dies Versteckspiel in der guten Jahreszeit, wo er stets, wenn er sich unbeobachtet wußte, durch die geöffnete Balkontür in den Garten hinaus verschwand. Bei geschlossener Tür saß er dann immer hinter dem Vorhang sorglich versteckt, hart am Türspalt, um beim geringsten Öffnen der Tür schleunigst aus-zukneifen. Sah man ihn ausreißen, so war das ja gut, man konnte ihn im Auge behalten oder unter

Mohrenkopf.

ernstem Verweis zurückrufen, dann kam er schuld-bewußt, manchmal rasch, manchmal zögernd zurück-gewatschelt ins Zimmer, was ja immer sehr komisch wirkte — gelang es ihm aber, sich unbemerkt hin-auszudrücken, so gab es große Aufregung, denn des Suchens war dann mitunter kein Ende, bis der gefährliche Ausreißer endlich in einer Weinrebe am Balkon oder im dichten Blättergewirr der Glyzine, die sich an einem Tummelraum für ein zahmes Eichhörnchen hinzieht, auch unter Grasbüscheln ver-steckt oder auf einem Zwergobstbaum entdeckt wurde; bei diesen Wanderungen und Raubzügen verhielt sich der schlaue Verbrecher stets mäuschenstill, wenn wir auch alle vier nach ihm riefen und in den zärt-lichsten Tönen seinen Namen flöteten; einmal fanden wir ihn auch im vergitterten Geflügelhof unter den paar Gänsen und Enten vergnüglich herummarschieren — wie leicht hätte er sein Leben im Schnabel der stets angriffslustigen Gänse oder in ihrem Wasser-bassin verlieren können, oder gar in den Krallen einer Katze, denn mein Garten ist immer von Katzen aus der Nachbarschaft heimgesucht, was mir auch das Halten von Vögeln in Freivolieren leider zur Un-möglichkeit macht; meine früheren diesbezüglichen Ver-

suche endeten stets mit Schaden und Mißerfolg. So ist es zu unserem Bedauern auch nicht möglich, Mohrchen ohne Aufsicht im Garten zu lassen, auch nicht im Käfig. (Fortsetzung folgt.)

Zur Vogelschau des Vereins für Vogelschutz, -pflege und -liebhaberei zu Leipzig.

Von K. Neunzig.

(Nachdruck verboten.)

Die Vogelausstellungen oder „Vogelschauen" des letzten Winters und des Frühjahrs boten durchaus kein einheitliches Bild. Waren sie schon untereinander recht verschieden, so hatten sie mit den Ausstellungen der Vorkriegszeit nur wenig gemein, sowohl was Umfang wie Vielseitigkeit der Ausstellungsobjekte anbelangt. Umfaßte doch z. B. die Ausstellung des Vereins „Aegintha" im Jahre 1894 an heimischen Weichfressern allein 389 Nummern, die gleiche Anzahl heimischer Körnerfresser, 548 Nummern Papageien, 128 ausländische Weichfresser und etwa 1000 Nummern Körnerfresser fremder Zonen. Dazu kamen noch Raub- und Hühnervögel, Tauben, Sumpf- und Schwimmvögel, nicht gerechnet, was an Kanarienvögeln vorhanden war. Unter den Ausstellern sahen wir die großen Tierhandlungen Deutschlands mit mancherlei Seltenheiten vertreten, die bekanntesten Liebhaber heimischer Weichfutterfresser und vor allem auch jene Liebhaber heimischer und fremdländischer Vögel, welche sich hauptsächlich mit der Züchtung beschäftigten. Sie brachten ihre Züchtungsprodukte häufig noch im jugendlichen Alter zur Ausstellung. Ich erinnere nur an die Namen Hauth, Nagel, Stehle usw. Die Ausstellungsobjekte der Liebhaber wurden damals keineswegs zurückgedrängt durch das, was den Vogelhandel zur Schau stellte. Diese Ausstellungen boten stets ein anschauliches Bild von dem damaligen Stand der Liebhaberei.

Letzteres kann nicht von allen Ausstellungen, die jetzt hinter uns liegen, gesagt werden. Wo waren die Liebhaber bei der Berliner Ausstellung des „Landesverbandes Preußen". Nur wenige hatten ihre Pfleglinge, überwiegend heimische Weichfresser, ausgestellt. Sie wurden von der gut beschickten Ausstellung der Händler erdrückt. Diese Ausstellung gab kein Bild vom zeitigen Stand der Liebhaberei in Preußen, den sie hätte geben müssen. Wo waren alle die erfolgreichen Züchter, deren es jetzt nicht weniger gibt als in der Vorkriegszeit?

In München scheint man sich bemüht zu haben, die Ausstellung so zu gestalten, wie wir es aus früheren Jahren gewohnt waren. Ein Bericht über diese Ausstellung wird in Kürze veröffentlicht werden. Jedenfalls zeigte diese Ausstellung die große Vielseitigkeit der Münchener Liebhaber.

Merkwürdig berührt es, daß in Hamburg, dem Sitz der bedeutendsten Tierhandlungen, trotz der bequemen Beschaffung ausländischer Vögel, die Liebhaberei für diese so völlig zurücktritt, und es den Pflegern heimischer Vögeln überlassen blieb, die hübsche Ausstellung, die uns Herr Weber in beredten Worten (s. S. 34 ff.) schilderte, zu beschicken. Dasselbe Bild bot die Dresdener Ausstellung, deren große Besucherzahl das rege Interesse und die Liebe zur Tierwe bekundete, das in allen Volksschichten der Großsta vorhanden ist. Wenn Herr Steinbauer seine Schi derung dieser Ausstellung (s. S. 63) mit den Da an die Behörden schließt, die, alle Bedenken zurü stellend, die Ausstellung genehmigten und so d idealen Sache wertvolle Dienste leisteten, so muß dies Dank in noch höherem Grade den Behörden d Stadt Leipzig ausgesprochen werden für die außer ordentliche Förderung, welche sie dem Zustandekom men und der Wirksamkeit der Ausstellung des „Ve eins für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig zuteil werden ließen.

In der Geschichte der Vogelausstellungen ist wohl einzig dastehend, daß für die Zwecke der Au stellung Räume eines öffentlichen Museums zur Ve fügung gestellt wurden, wie es hier der Fall wa Die Verwaltung des „Naturkundlichen Heima Museums" ging von dem richtigen Gedanken au daß eine Ausstellung lebender heimischer Vögel vo und ganz in den Rahmen dieses Museums gehör und stellte nicht nur die nötigen Räume für etw 14 Tage zur Verfügung, sondern gestattete währe der ganzen Dauer der Vogelausstellung jedem Au stellungsbesucher die Besichtigung der reichen u interessanten Sammlungen des Museums, in der E kenntnis, daß die Liebe zu den Tieren auch die Lie zur Heimat fördert.

Die Ausstellung selbst befand sich in eine großen, freundlichen, hellen Saal, an dessen Seit auf gleich hohen Tischen die Käfige in mehrer Reihen übereinander aufgestellt waren. Tannenreis und hier und da zwischen den Käfigen Topfpflanz gaben dem Ganzen ein anheimelndes Gepräge. jedem Käfig befand sich ein kleines Schild, welch den Vogel, der den Käfig bewohnt, benannte. D Aussteller war nicht genannt. Diese Ausstellu sollte kein Wettbewerb sein. Es sollte dem Beschau gezeigt werden, wie reizende, liebenswerte Geschöp unsere heimischen Singvögel sind, er sollte sie kenn lernen, aber auch sehen, daß richtig gehaltene Vög frohe sangesfreudige Geschöpfe sind, denen keine Fed gekrümmt wird, die in ihrem Äußeren, ihrem B nehmen, ihrem Gesang sich in nichts von ihr freilebenden Genossen unterscheiden, daß die Voge haltung keine verdammenswerte Tierquälerei, kei unnütze leichtfertige Spielerei sei, sondern daß an der liebevollen Hingabe des Pflegers zu sein Pfleglingen, an das lebhafte Verantwortungsgefü des Liebhabers für das Wohlbefinden seiner Vög die höchsten Anforderungen stellt, und gerade die sittlich erziehliche Moment der Tierliebhaberei allgemeinen und insbesondere der Vogelliebhabe gar nicht hoch genug anzuschlagen sei. Daß dies Ziel erreicht wurde, konnte man aus den Gespräch und dem Interesse der Besucher entnehmen, die zu größten Teil doch unserer Liebhaberei fernsteh Ihre Zahl war groß. Ungefähr 1000 Volksschu kinder und 1000 andere Besucher wurden tägl gezählt, unter denen zweifellos eine große Anza jetzt mit anderen Augen nicht nur die lebendige Nat ansieht, sondern auch unsere Vogelliebhaberei. mancher wird nicht mehr dem törichten Geschw unverständiger Tierschützler und den ebenso töricht

Schriften mancher Tierschutzvereinsorgane über unsere Liebhaberei Glauben schenken. Was er dort sah, stimmt durchaus nicht mit den üblichen tierschützerischen Lamentationen überein. Diese Ausstellung hat ihn eines Besseren belehrt.

Wenn wir nun als Vogelliebhaber diese Ausstellung betrachten, so ist ohne weiteres anzuerkennen, daß wir bisher keine Ausstellung heimischer Sänger sahen, die eine solche Fülle — es waren rund 300 Vögel ausgestellt — in so guter Verfassung zeigte. Es war für die Leipziger Liebhaber selbstverständlich, wie das ja auch in Hamburg und Dresden der Fall war, daß nur nach jeder Richtung hin tadellose Vögel ausgestellt wurden, selbst auf die Gefahr hin, daß nicht alles da sein würde, was man gern gezeigt hätte. So mußten z. B. die vielfach gehaltenen guten Sumpfrohrsänger der Ausstellung fernbleiben, weil ihr Gefieder doch noch nicht ganz in Ordnung war. Dafür waren aber andere schwierig zu haltende Vögel, z. B. Blaukehlchen, in einer so großen Zahl vorhanden, etwa 20 Vögel dieser Art, sämtlich in bester Verfassung und fast alle ließen ihr mehr oder minder gutes Lied fleißig hören. Ähnlich verhielt es sich mit den ausgestellten Gelbspöttern, anscheinend alles schon mehrere Jahre entkäfigte Vögel. Sie brachten ihren Gesang mit bewundernswertem Fleiß und ließen sich durch die große Schar der Zuhörer, welche ihren Käfig umdrängten, nicht stören. Aber auch Nachtigallen, Grasmücken und Lerchen, sowie Finken ließen sich hören, und besonders in den ersten Vormittagsstunden konnte man, gemächlich auf einer der Bänke sitzend, einem wunderbaren Vogelkonzert lauschen, wie es selten an unser Ohr dringt. Zuweilen ließ allerdings eine Schamadrossel, die nicht zu den Zierden ihrer Art gehört, etwas aufdringlich und laut einen, d. h. immer denselben Ruf hören.

Die Käfigung der Vögel war, wie nicht anders zu erwarten, einwandfrei. Im allgemeinen waren die Käfige in Größe und Einrichtung unter Berücksichtigung der den Käfig bewohnenden Art übereinstimmend. Und doch zeigten die Käfige eine große Mannigfaltigkeit, die vor allem durch den verschiedenen Anstrich der einzelnen Käfigkollektionen zur Geltung kam. Mit wenigen Ausnahmen zeigten alle Käfige eines Ausstellers dieselbe Farbe. Da fanden etwa ein Dutzend dunkelgrüne, im Innern weiß gestrichene Käfige beisammen, daneben zehn Käfige in heller Holzfarbe, dann einige zwanzig meist hellgrün im Innern gleichfalls weiß gestrichen, daneben dunkelbraune usw. Diese Verschiedenartigkeit des Anstrichs belebte den Gesamteindruck des Ausstellungsbildes ungemein.

Die Futtervorrichtungen waren nach Geschmack und Erfahrung des einzelnen Ausstellers verschieden. Zumeist bediente man sich der von außen einschiebbaren, trogartigen Gefäße; aber man sah auch die große Kollektion eines sehr erfahrenen und erfolgreichen Vogelwirtes, der es vorzieht, das Futter in runden Gefäßen zu reichen, welche auf dem Käfigboden stehen. In diesen Verschiedenheiten kommt zum Ausdruck, wie sehr sich die Leipziger Liebhaber bemühen, ihren Pfleglingen das Beste zu bieten, was erreichbar ist. Selbst der Aussteller, dessen Käfige an der vorderen Seite keine Tür haben, ähnlich wie die Wiener Käfige, wird dafür seine guten Gründe haben. Daß sich aber diese Einrichtung in jedem Falle bewährt, ist nicht ohne weiteres zu bejahen.

Die Besprechung der ausgestellten Vögel, meist langjährige Bewohner ihrer Käfige, über die viel zu erzählen ist, wird folgen. Herr Birk wird darüber in einen folgenden Artikel berichten.

Es bleibt nur noch übrig, den Leipziger Damen und Herren, deren Gastfreundschaft die auswärtigen Besucher der Ausstellung, deren Zahl ganz erheblich war, genossen, für ihr liebenswürdiges Bemühen, allen den Aufenthalt in Leipzig so angenehm zu gestalten, herzlich zu danken.

Ein altes Sprichwort sagt: „Wo viel Sonne, da ist starker Schatten". Dieses Sprichwort wurde in Leipzig Lügen gestraft. Hier stand die Sonne so hoch, daß vom Schatten nichts bemerkt wurde. Es war alles eitel Sonne!

Amsel.

Zu dem Artikel von Jos. Delvaux-Venlo (Holland) „Eine Streitfrage".

Erwiderung von Karl Reich, Bremen.

(Schluß.)

Unter 3. schreibt Herr Pelamenn:

„Die Nachtigall singt niemals zwei derselben Töne oder Strophen. Damit ein Kanarienvogel bestimmte Gesangsstücke erlernen kann, ist es aber nötig, daß ihm diese in bestimmter Reihenfolge vorgesungen werden, und zwar tage-, wochen-, ja monatelang hintereinander, speziell in dem Abschnittt der ersten Mauser, welche von Ende Juli bis Ende September, und für die Spätbrut sogar später stattfindet."

Diese „Behauptung" zu widerlegen würde außerordentlich schwerfallen, wer will widerlegend beweisen, ob die Nachtigall zwei oder sogar mehrere Male hintereinander gleiche Töne oder sogar gleiche Strophen bringt? Kenner werden dies zwar genügend bestätigen, aber dann stünde meine Behauptung nur gegen Herrn Pelemanns „Behauptung".

Aber Herr Pelemann, auch hier habe ich einen schlagenden Beweis für die Unrichtigkeit Ihrer Behauptung. Bitte legen Sie meine Nachtigall-Grammophonplatte — Grammophon schwarz Etikette Nr. 61905 — auf das Grammophon. Diese Platte wird Ihnen nicht nur zwei, sondern vierundzwanzig aufeinanderfolgende gleiche herrliche Nachtigalltöne in zwei aufeinander folgenden Strophen vorspielen. Dieselbe Platte wiederholt desgleichen verschiedene längere andere Strophen gleich aufeinanderfolgend. Die auch recht gut gelungene Nachtigallplatte — Grammophon schwarz Etikette Nr. 61906 — bringt ebenfalls des öfteren verschiedene schöne Nachtigallstrophen in sechs- bis achtfacher Wiederholung hintereinander.

Hinsichtlich des Gesangsausbruchs der gekäfigten Nachtigallen zu verschiedenen Jahreszeiten, Herr Pelemann, lesen Sie bitte nur die zahlreichen Abhandlungen über dieses Thema in den Jahrgängen der „Gef. Welt", Magdeburg, nach, oder richten Sie eine diesbezügliche Anfrage an den Briefkasten dieser Liebhaberzeitschrift. Im Laufe der Zeit sind natürlich noch weitere Methoden der Verschiebung der Gesangsperioden der Nachtigall bekannt geworden und in Kennerkreisen bekannt. Herr Pelemann braucht sich nur bei Herrn Dr. Heinroth in Berlin, dem Verfasser des jüngst erschienenen Prachtwerkes „Die Vögel Mittel-Europas in allen Entwicklungsstufen, photographisch aufgenommen und in ihrem Seelenleben bei der Aufzucht vom Ei ab beobachtet", nach näheren Einzelheiten erkundigen. Daß eine Umstellung der Mauser auch in der Regel eine Umstellung der Gesangszeit zur Folge hat, ist eine alte Erfahrung auch bei Kanarienzüchtern. Eine Abhandlung: „Unterricht von den verschiedenen Arten der Kanarienvögel und der Nachtigallen, wie diese beyderley Vögel aufzuziehen und mit Nutzen so zu paaren sein, daß man schöne Zunge von ihnen haben kann", welche in Form eines kleinen Buches im Jahre 1772, also schon vor über 150 Jahren erschienen ist, behandelt im Abschnitt 29 auf Seite 180—182 schon damals eingehend das Thema: „Von künstlicher Verleitung der Nachtigall, außer ihrer Zeit zu singen".

Tatsache ist, daß ich jahrelang fast zu jeder Jahreszeit singende Nachtigallen als Vorsänger für meine Nachtigall-Edelkanarien hatte. Nur im Monat September habe ich noch keine erwachsene Nachtigall im Gesang gehabt, aber in diesem Monat übten bei mir des öfteren junge, von mir aufgezogene Nachtigallen fleißig ihren Gesang mitten in der Kinderstube meiner Kanarienjunghähne, und die „gute Kinderstube" macht sich, Herr Pelemann, nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Kanarienvögeln in ihrem späteren Leben geltend.

Wenn es aber wirklich mal mit einer Nachtigall im Gesang in irgend einem Monat nicht ganz klappen wollte, dann hatte ich als niemals versagenden Vorsänger eine wundervolle Nachtigall, bei der es mir im Jahre 1910 gelungen war, den Gesang derselben auf die Grammophonplatte zu bannen. Diese Platte singt jahraus jahrein jeden Tag zu jeder gewünschten Minute, so lange es Grammophone geben wird, den schönsten natürlichen Nachtigallengesang. Meine Kanarien konnten also niemals in Verlegenheit wegen eines Vorsängers geraten. Meine Nachtigall-Edelkanarien haben den Beweis erbracht, daß es möglich ist, durch Übertragung vermittels Vorsänger dem Kanarienvogel einen anderen Gesang aufzupfropfen. Das ist vom wissenschaftlichen Standpunkt aus ein anerkanntes Ergebnis.

Soweit meine sachlichen Auseinandersetzungen mit Herrn Pelemann. Nun haben wir aber ein weiteres Wörtchen miteinander zu sprechen. Herr Pelemann scheint noch nicht vergessen zu haben, das Belgier und Deutsche sich einmal befehdeten. Neid und Haß, wohl geboren aus der Kriegspsychose, scheinen aus seinen Zeilen zu sprechen. Wir sind es ja seit Jahren gewöhnt, daß man während und nach dem Kriege mit fast einer Welt von Lügen gegeneinander arbeitet und jeden Erfolg zu verkleinern versucht. Man wird uns aber nicht daran hindern können, daß wir uns dagegen wehren. Die Zeit des Stillschweigens ist vorbei. An den Pranger mit denen, die die Ehre eines anderen angreifen. Herr Pelemann, Sie wagen es zu schreiben, ich hätte eine falsche Behauptung aufgestellt, und fahren fort: „Diese Behauptung mußte natürlich aufgestellt werden, um den Zeitpunkt des ‚Gesangslernens' der jungen Kanarienvögel in Übereinstimmung mit der normalen ‚Ausbildung' seitens der Lehrerin ‚Nachtigall' zu bringen. Und wozu diese unannehmbare Behauptung? Auf diese Weise brauchte der genannte deutsche Züchter nicht zu bekennen, daß er den belgischen Waterslager gebraucht hat, um zu seinem ‚Erfolge' zu gelangen, was die Bewunderung der deutschen Preisrichter erregte; ein ‚sauberer' deutscher Erfolg, womit der belgische Waterslager nichts zu tun hatte. Ist dies deutlich?"

Meine Ehre als Züchter steht mir zu hoch, als daß ich mich als Mensch durch diesen unglaublichen unwahren Anwurf berührt fühlte. Als deutscher Züchter aber frage ich Herrn Pelemann, wie es mit der „Sauberkeit" seinerseits steht, daß er den plumpen Versuch macht, den Erfolg eines deutschen Züchters für seine belgischen Waterslager zu buchen?

Herr Pelemann behauptet dann weiter: „Nicht allein ‚behaupte' ich, sondern gebe auch die größte Versicherung, was ich bereits in einer Reihe von Artikeln deutlich ins Licht stellte, die im vorigen Jahre in diesem Blatte (Onze Gefleugelde Zangers) erschienen. Nie hat Herr Reich-Bremen, noch ein anderer versucht, dieses zu leugnen oder zu widersprechen."

Herr Pelemann, kann man antworten auf Artikel, die man nie gelesen hat? Ich kann versichern, daß weder Herr Pelemann noch irgend jemand anderes mir Kenntnis von Herrn Pelemanns Artikeln in der holländischen Zeitung gegeben hat. Wenn Herr Pelemann sich das Recht nimmt, aus meinem Schweigen Folgerungen zu ziehen und diese als — Beweise — für seine „Behauptung" benutzt, so mußte er sich vorher vergewissern, ob mir die Artikel bekannt waren. So aber kennzeichnet dieses Vorgehen nur seine haltlose unfaire Kampfesweise.

Unsere Lerchen.

Von M. Kretschmar.

(Nachdruck verboten.)

Die Haubenlerche.

„Ich glaubte die Schwalbe träumte schon vom teuren Nest, ich glaubte die Lerche dachte schon ans Liederfest" — so könnte man glauben, wenn einem an sonnigen, milden Wintertagen der liebliche Gesang der Haubenlerche entgegenschallt.

Im Gegensatz zur Feldlerche, welche, zu den Zugvögeln gehörend, uns zum größten Teil im Oktober verläßt und langsam südwärts zieht, überwintert die Haubenlerche hier und zieht sich in der kalten Jahreszeit in die Nähe der menschlichen Wohnungen zurück.

Gleich manchen andern Standvögeln lebt sie im Herbst in Familien, sonst aber paarweise und unverträglich mit ihresgleichen. Obgleich in der Freiheit ruhig und zutraulich, behält sie, alt gefangen, im Käfig meist ein etwas stürmisches Wesen.



Feldlerche.

Die Haubenlerche ist ein so bekannter Vogel, daß eine nähere Beschreibung überflüssig erscheint, die Weibchen unterscheiden sich durch eine weniger hohe Tolle und einige runde, schwarze Flecken auf der Brust von den Männchen. Die Nester findet man meist an der Erde an Gräben, in Kohlgärten, in und an Kartoffel- und Getreidefeldern, es ist dem der Feldlerche ähnlich, wird aber nur vom Weibchen gebaut. Das Weibchen besorgt überhaupt die ganze Brut allein, während das Feldlerchenweibchen um die Mittagszeit vom Männchen abgelöst wird. Die erste Brut findet Ende März oder Anfang April, die zweite Ende Mai oder Anfang Juni statt, selten wohl kommt es im Juli zu einer dritten Brut. Das Gelege besteht aus 3—6 rötlichweißer, grau und braun gepunkteter Eier.

Ist nun die Haubenlerche im Freien durch ihr ruhiges und nicht scheues Wesen ungemein sympathisch, erinnert sie in ihrer emsigen Geschäftigkeit an ein sorgsames Hausmütterchen, so kann ihr Wert in der Gefangenschaft für Kenner und Liebhaber durch ihr großes Nachahmungstalent von großer Bedeutung werden.

Und hiermit komme ich zum Kernpunkt meiner Ausführungen. Die Haubenlerche ist als Spottvogel viel zu wenig bekannt und geschätzt. Mir ist, außer dem rotrückigen Würger, kein Vogel bekannt, der, jung aus dem Nest genommen und aufgezogen — mit solcher Leichtigkeit Lieder verschiedener anderer Vögel nachsingen lernte. Jedenfalls möchte ich nochmals betonen, daß man einen jung aufgezogenen Vogel haben muß, will man Freude an ihm erleben.

Ich besaß ein Haubenlerchenmännchen, welches den Finkenschlag, den wundervollen Lockruf der Kohlmeise, den Gesang des Hänflings und des Zeisigs außerordentlich naturgetreu nachahmte. Dabei lernte es unaufhörlich Neues hinzu, war außerdem sehr zahm und zutraulich. Während es mir Mehlwürmer aus der Hand nahm, ließ es unaufhörlich den Finkenschlag erschallen.

Der Naturgesang der Haubenlerche kommt dem der Königin der Lerchen, der Feldlerche, nicht gleich, auch dem der Heidelerche nicht, immerhin ist er von großer Lieblichkeit und Anmut.

Wie alle Lerchen, bekommt auch die Haubenlerche leicht Ungeziefer, Läuse oder Milben. Es gibt Exemplare, welche sich selbst helfen, indem sie die Läuse vertilgen.

Im übrigen sei auf die Mittel hingewiesen, welche letzthin in der „Gef. Welt" als gegen Milben am wirksamsten empfohlen wurden. Trotzdem kann es vorkommen, daß sich jedes Mittel, verbunden mit peinlichster Sauberkeit als auf die Dauer unwirksam erweist; immerhin sind das große Ausnahmen. Bei entsprechender Fütterung, namentlich

dem gewöhnlichen Körnerfutter öfter beigefügtem Salat, Kohl oder Brunnenkresse ist die Haubenlerche ausdauernder als die Feldlerche, viel ausdauernder als die Heidelerche und kann im Käfig alt werden. (5—10 Jahre).

Ich komme nun zur Königin der Lerchen, der

Feldlerche.

Die Feldlerche ist einer der herrlichsten deutschen Singvögel, von vielen Kennern nach der Nachtigall als Sängerin am höchsten geschätzt. Dr. Ruß schätzt nach der Nachtigall den Gesang der Feldlerche am höchsten. Dieser Ansicht möchte ich mich anschließen. Die Nachtigall und Lerche sind von unsern lyrischen Dichtern am meisten besungen.

„An ihren bunten Liedern klettert
Die Lerche selig in die Luft." — Lenau.

„Nachtigall und Lerche Du
Die ihr singt zur frühen Stunde" —
(Geibel u. Heyse) aus dem span. Liederbuch.

„Die Nacht war kaum verblühet
Nur eine Lerche sang
Die stille Luft entklang". Eichendorff.

Die Quellen von den Klüften,
Die Ströme auf grünem Plan,
Die Lerchen hoch in den Lüften,
Der Dichter frisch voran. Eichendorff.

Die Feldlerche verleiht der mittel- und norddeutschen Tiefebene erst ihren besonderen Reiz, ihren eignen Zauber. Saatengrün, wogende Kornfelder, Feldeinsamkeit sind für uns ohne Lerchengesang kaum denkbar. —

In den Feldern an der Erde, oft in einer kleinen Vertiefung, baut die Feldlerche ihr ziemlich kunstloses Nest. Die 3—5 grauen oder weißlichgrauen Eier sind graubraun gefleckt. Vierzehn Tage werden sie bebrütet, anfang Mai findet man meist Junge. Sie werden nur mit Insekten gefüttert und verlassen frühzeitig das Nest. —

Die Aufzucht junger, halbflügger Lerchen ist leicht. Mit aufgeweichter, altbackener Semmel, etwas Mohn und gewiegten grünen Salat vermengt sind sie unschwer aufzuziehen. Mir ist wenigstens jede Aufzucht ohne die geringste Schwierigkeit geglückt.

Da sie, wie die Haubenlerchen, sehr gelehrig sind, lernen sie, wenn sie später mit anderen Vögeln in einer Stube hängen, deren Gesang.

Von dem Naturgesang bleibt dann freilich wenig oder nichts übrig.

Heidelerche.

Hält man sie dagegen allein, so ist der Naturgesang einer aufgezogenen Feldlerche mit dem eines altgefangenen Vogels nicht zu vergleichen.

Solch einen altgefangenen Vogel muß man zu bekommen suchen, wenn man den reinen Feldgesang der Lerche im Zimmer haben will.

Einen wirklich guten Vogel zu bekommen ist nicht ganz leicht. Es gibt genug Lerchen, welche derart heftig und stürmisch sind, daß sie sich überhaupt nicht zum Singen in der Gefangenschaft bequemen, oder nur, wenn niemand im Zimmer ist.

Mit derartigen schwierigen Exemplaren macht man am besten wenig Umstände und gibt ihnen die Freiheit. Hat man aber eine gute Lerche, dann wird man reich entschädigt, denn bei keinem Vogel ist der Gesangstrieb oft so stark entwickelt als gerade bei der Feldlerche.

Ich besitze jetzt eine solche, welche ich vor zirka 2 Monaten von Herrn Behnke-Berlin kaufte. Zwei Tage nach ihrer Ankunft im November fing sie abends bei Licht vorerst sehr schüchtern an zu singen. Heute singt sie jeden Vormittag und abends bei Licht, noch nicht ganz vollaus, jedoch lange Perlketten des reinsten und glockenhellen Lerchengesangs. Ähnlich ist es mir mit meinen anderen Feldlerchen immer gegangen. Das heißt: Im November—Dezember fingen sie leise an zu singen, nach 8 Tagen sangen sie halblaut, im Februar waren sie im vollen Gesang besonders vormittags bei Sonnenschein, und sangen dann ununterbrochen bis Ende Juli. Ich habe früher öfter Feldlerchen aus Holland und Siebenbürgen bezogen. Vor zirka 25 Jahren wurden sie damals in der Geflügelbörse dutzendweise und lächerlich billig angeboten. Man kaufte dann mit mehreren Bekannten und Liebhabern ein Dutzend und hatte dann unter 4 Exemplaren mit größter Wahrscheinlichkeit einen oder zwei gute Sänger. Die Siebenbürger Lerchen sahen viel heller in der Farbe als unsere norddeutschen, schönen, braunen Lerchen aus. Wir haben diese damals auch nur einmal bezogen.

Vor 2 Jahren zog ich 2 Feldlerchen auf. Sie waren von der zweiten Brut. Beide gediehen sehr gut und fingen ungefähr nach 6 Wochen, nachdem sie allein fraßen, an zu dichten. Die eine kleinere war die fleißigere im Gesang und gab ich jeder einen eignen Käfig in der festen Überzeugung 2 Männchen zu haben. Jedoch allmählich hörte die kleinere mit dem Gesang auf und legte in Abständen von ungefähr Woche zu Woche 6 oder 7 Eier. Man sieht hieran, wie schwer es ist, bei aufgezogenen Feldlerchen das Geschlecht festzustellen. Diese kleinere Lerche war sehr zahm, fraß Mehlwürmer aus der Hand und war sehr gut befiedert. Das Männchen hingegen war nie besonders in den Federn, auch lange nicht so zutraulich. Es lernte den Gesang des Finken und Zeisigs, war aber kein fleißiger Sänger, brach oft ab und war sehr launisch. Nicht viel anders ist es mir mit anderen, in früheren Jahren aufgezogenen Feldlerchen gegangen. Will man Lerchen aufziehen, so nehme man Haubenlerchen, gebe ihnen irgend einen Meisterschläger — je nachdem man selber Liebhaber ist — als Vorsänger und man wird meist Freude erleben. Ich will aber durchaus nicht behaupten, daß eine aufgezogene Feldlerche nicht ein ausgezeichneter Nachahmer werden könnte, Temperament, Talent und Charakter sind selbst bei Vögeln derselben Gattung oft verschieden.

Mir persönlich würde aber eine sehr gut nachahmende Feldlerche niemals eine solche ersetzen, welche den Naturgesang meisterhaft singt.

Wenn ich nun als letzte unserer einheimischen Lerchen die

Heidelerche

nenne, so soll keineswegs damit angedeutet sein, daß diese Lerche etwa geringer wäre als eine der beiden vorgenannten. Einer der älteren Vogelkenner und Vogelschriftsteller, der alte Dr. J. M. Bechstein, schätzt den Gesang der Heidelerche unter den Lerchen am höchsten. Er sagt darüber: „Unter den Lerchen singt die Heidelerche am schönsten; ja, nach meinem Geschmacke singt sie unter allen deutschen Vögeln, die ihren natürlichen Gesang haben, die Nachtigall und den gemeinen Finken ausgenommen, am anmutigsten. Ihre Stimme ist hellflötenartig und die deutlich abwechselnden Strophen ihres Gesanges klingen zärtlich melancholisch. Im Freien fliegt sie von dem Gipfel eines Baumes so hoch in die Luft, daß sie das Auge kaum erreichen kann und hängt gleichsam mit ausgebreitetem Schwanze lange Zeit auf einem Flecke und singt so, oft stundenlang, ununterbrochen fort".

Vorzüglich schön klingt ihr Gesang nachts in der Heide; ganz wundervoll, wie leises, melodisches

Borstenhäherling.

Läuten, klingt der Lockruf der Heidelerche. Diesen Lockruf haben meine Heidelerchen ausnahmslos oft in der Gefangenschaft hören lassen, aber mit dem eigentlichen Gesang benahmen sich verschiedene recht zurückhaltend. Die Heidelerchen erscheinen mir darin bedeutend eigensinniger als die Feldlerchen. Man muß schon etwas Glück haben bei Anschaffung einer solchen Lerche. Die Heidelerchen sind ungefähr ein Drittel kleiner als die Feldlerchen, der Schnabel oben schwarz, unten heller, an der Spitze beinahe fleischfarben. Oberkopf rötlichbraun mit vier dunklen Strichen. Im Affekt machen sie oft eine Holle.

In der Stube sind sie von allen Lerchen die zärtlichsten, ich gebe ihnen dasselbe Futter wie den vorgenannten Lerchen. Nach meiner Meinung werden sie aber selbst bei sorgfältigster Pflege schwerlich länger als fünf Jahre in der Gefangenschaft ausdauern.

Am meisten muß man acht auf die Füße geben, da diese leicht brüchig werden. Oft stirbt ein Zehen ab.

Meine Heidelerchen haben in ihren Käfigen stets zwei sehr starke, runde Sprunghölzer, wenige Zentimeter über dem Boden angebracht, während ich den Feld-

lerchen nur einen starken, ungefähr faustgroßen Kieselstein in den Käfig gebe. Alle Lerchenkäfige müssen niedrig sein, weiche Decke haben und ungefähr 1 m lang sein. Sind sie länger, um so besser.

Allen meinen Lerchen streue ich Körnerfutter besonders und für sich in den Käfig, meist wird blauer Mohn oder Hirse am liebsten gefressen; wenn es die Jahreszeit mit sich bringt, füge ich dem Universalfutter feingewiegten Salat, Brunnenkresse und Vogelmiere bei.

Mehlwürmer werden fast immer gern genommen, besonders Heidelerchen sollte man gut damit füttern. Als Merkwürdigkeit erwähne ich, daß meine jetzige Feldlerche keinen Mehlwurm annimmt.

Ich habe das Gefühl, als ob sämtliche Lerchen in ihrer Eigenart als unsere besten Edelsänger viel zu wenig gewürdigt werden.

Ich kenne eine Menge Vogelliebhaber, welche außer den bekannten Körnerfressern Nachtigallen, Schwarzplättchen und Rotkehlchen halten, einen eigentlichen Lerchenliebhaber habe ich bis heute nicht gefunden.

Vielleicht ist auch das Angebot in den Fachzeitungen der schwachen Nachfrage halber so gering.

Mir selbst beispielsweise gelingt es nicht, trotz eifrigen Suchens, Ersatz für meine eingegangene Heidelerche zu bekommen.

Braunwangensäbler.

Kupferhaltige Vögel.

Von cand. med. Ingo Krumbiegel, Dresden.

(Nachdruck verboten.)

Von den vielen Menschen, die im Bauer irgendein Vögelchen als Stubengenossen halten, ahnen nur wenige, welche Wunder ein solches Tier in sich birgt, und zwar nicht nur im kleinen gefiederten Körper, sondern auch in den Exkrementen, die vom Unkundigen meist als völlig uninteressant und wertlos beim Reinigen des Käfigs fortgeworfen werden. Nur an wenigen Beispielen wollen wir einmal einen Einblick tun, was für merkwürdige Eigenschaften der Vogeldung hat, welchen materiellen Wert er darstellt und welche Probleme er dem Naturforscher eröffnet.

Einen interessanten Versuch kann jeder Vogelbesitzer mit den einfachsten Mitteln anstellen, wenn er ein Stückchen Exkrement mit Salpetersäure verreibt und hinterher mit Ammoniak betupft, dann bekommt das weißgraue Etwas eine prachtvolle rotviolette Farbe: es ist Purpurrot entstanden, also ein Farbton, wie ihn die Alten mühsam aus der Purpurschnecke gewannen und, welcher ein Sinnbild des Seltenen und Kostbaren, als das Abzeichen königlicher Würde galt. Auch vom praktischen Standpunkt sind Vogelexkremente wichtig: die volkswirtschaftliche Bedeutung des sogenannten Guano, des seit Jahrtausenden angesammelten Dunges südamerikanischer Seevögel, ist ja allgemein bekannt. Noch mancherlei ließe sich von den Ausscheidungsprodukten der Vögel sagen; sie zeigen die nahe Verwandtschaft der gefiederten Welt mit dem Reiche der kaltblütigen Reptilien und noch vieles andere; doch darauf einzugehen würde uns ins Uferlose führen. Wir wollen an dieser Stelle nur noch von einer ganz besonders merkwürdigen Art von Ausscheidungen sprechen, welche von Vögeln stammen die der wissenschaftlichen Welt schon viel Arbeit bereitet haben und noch bereiten werden.

Im afrikanischen Buschwalde haust eine Familie schön gefärbter etwa elster- bis fasanengroßer Vögel aus der nächsten Verwandtschaft der Kuckucke, die sogenannten Pisangfresser, zu denen z. B. die unter dem Namen „Helmvögel, Turakos, Bananenfresser“ usw. bekannten Vogelgestalten gehören. Was diese Tiere so interessant macht, ist die Tatsache, daß sie in ihren Federn einen organischen roten Farbstoff besitzen, das sogenannte Turazin, das nach der Analyse von Church bis zu 7% Kupfer enthält, also ein Metall, das man meist für ein ausschließlich anorganisches, d. h. nur in Salzen, Gesteinen usw. vorkommendes Element hält, aber nie und nimmer in lebenden Vögeln vermuten sollte. Von Federn sollte ja streng genommen hier nicht die Rede sein, aber wir werden gleich sehen, was die Federn dieser Vögel mit unserem Thema „Exkremente“ zu tun haben. Jenes seltsame Turazin ist chemisch nahe verwandt mit in der Tierwelt weitverbreiteten Stoffen, den sogenannten Porphyrinen. Unsere Vögel nun haben, ganz populär ausgedrückt, in ihrem „chemischen Laboratorium“ im Körper den Versuch gemacht, Abfallstoffe auf besondere Art und Weise aus dem

Körper zu entfernen. Das ist theoretisch gut geglückt, hatte aber in Wirklichkeit den Haken, daß dabei „lichtgiftige" Stoffe entstanden, d. h. Substanzen, welche für unter freiem Himmel lebende Tiere giftig sind, während sie Tieren, die in ewiger Dunkelheit leben, wie gewissen Höhlentieren, nichts schaden können; diese Substanzen sind die sogenannten Urinoporphyrine. Die Pisangfresser sind also Vögel, die sich, nach der Fischerschen Theorie, beinahe von selbst und an sich selbst vergiftet hätten. Doch da setzt der Gegenschachzug der Natur ein. Die Vögel haben das fertig gebracht, was auch der Arzt anstrebt, wenn er zu einer Vergiftung geholt wird. Kann er nicht durch Brech-, Abführmittel oder sonstwie das Gift entfernen, so wird er versuchen, andere Stoffe zuzuführen, die mit dem Gift zusammen einen anderen unschädlichen Stoff bilden; er wird das Gift „chemisch binden". Das haben auch diese Vögel getan. Sie haben Kupfer, das sie auf unbekanntem Wege aufnehmen, gespeichert und mit Hilfe dieses Metalls ihr Gift, das Urinoporphyrin, in dessen Kupfersalz übergeführt, welches nicht mehr lichtgiftig ist und nun in den Federn abgelagert wird, ein Vorgang, den Laidlow nachgemacht hat, indem er als erster Forscher das Turazin aus einem Porphyrin mit Kupferlösung künstlich herstellte. Wenn die Vögel baden, dann färben die Flügel ab, durch eine sehr merkwürdige Ursache, auf die ich ein andermal zu sprechen komme. Nach der Fischerschen „Exkretionstheorie" handelt es sich dabei um eine Entfernung von unbrauchbar gewordenen, in unserem Fall sogar mit knapper Mühe und Not eben noch unschädlich gemachten Stoffwechselprodukten aus dem Körper, es ist also ein Exkretionsvorgang; und so wird das Ganze auch von der physiologischen Chemie angesehen. Da nach Brehm sich der Farbstoff beständig regeneriert (was übrigens nicht der Fall ist!), so . . . „kann man versucht sein zu meinen, daß die Feder hier gewissermaßen ein Exkretionsorgan darstellt, wodurch der Organismus das bekanntlich intensiv lichtgiftige Urinoporphyrin zur Ausscheidung bringen könnte. Durch Überführung ins Kupfersalz wird dann einer weiteren schädlichen Lichtwirkung vorgebeugt, denn das Kupfersalz des Urinoporphyrins ist nicht lichtgiftig, wie wir bei Paramaecien (das sind Infusorien oder Aufgußtierchen, mikroskopisch kleine Urtiere) feststellten" (Fischer-Hilger). Die Pisangfresser sind also — kühn ausgedrückt — Vögel, die ihre Flügel als Ausscheidungsorgan benutzen. Und damit kommen wir zum Ende unserer Betrachtung. Es ist wenig verwunderlich, daß auch die Exkremente dieser Tiere selbst, also die Ausscheidungen des Darmes, von denen aller anderen Vögel in bestimmten Dingen abweichen. Weiteres ist noch nicht erforscht, insbesondere ist es anatomisch unmöglich, daß ein toter Körperteil, wie die Vogelfeder, bzw. der sogenannte „Spiegel", ein hornartiges Gebilde auf dem Flügel, je imstande sein sollte, Farbstoffe abzusondern usw.

Jedenfalls sehen wir, wie vieles sich über „Vogelexkremente" sagen läßt und wie viele Probleme eine scheinbar so banale Materie wie der Vogeldung in sich birgt.

Im Vogelhaus des Berliner Zoologischen Gartens sind zurzeit nicht weniger als drei Exemplare dieser Pisangfresser, Angehörige einer ganz besonders seltenen Art, Turacus donaldsoni (s. S. 25), zu sehen. Eigentlich würde auch ohne den übrigen zurzeit großen Tierbestand ein Besuch des Gartens schon allein dieser drei rätselhaften Vögel wegen lohnen.

Kleine Mitteilungen.

Weitere Frühjahrsbeobachtungen. Am 12. März stellte sich für einige Tage böser Nachwinter ein. Fand an diesem Tage Federn einer weißen Bachstelze, wahrscheinlich durch eine Katze herrührend. Am 14. März schuhtiefer Schnee, am Morgen 12 Grad Kälte; Futterplätze werden von Meisen besucht. Vormittags beobachtete ich einen Flug Rothänflinge, etwa 100 Stück; Feldlerchen etwa 50 Stück; mehrere Starenschwärme und zirka 10 Kiebitze; ferner Heidelerchen etwa 20 Stück. Die Vögel waren arg in Not; da fast alle Nahrungsquellen verschlossen. Unter heftigem Schneegestöber zogen etwa 1000 Stück Saatkrähen, vermischt mit Dohlen, von West nach Ost. Am 15. März wiederum Schnee; viele Schwärme Stare, davon ein Schwarm unter Krähen, einen riesigen Schwarm Feldlerchen, etwa 300 Stück, kleinere Gruppen Singdrosseln und Amseln; ferner mehrere Schwärme Hänflinge, vermischt mit Berg- und Grünfinken, beobachtet. Am 16. März Schneeschmelze, warmes Wetter, ein totes Amselweibchen wurde gefunden. Am 18. März beobachtete ich, wie eine Katze eine Goldammer fing; am 19. März hörte ich vormittags einen singenden Dompfaff und bei Abenddämmerung konnte ich noch etwa 500 Krähen wahrnehmen, welche von Nordwest nach Osten zogen in ziemlicher Höhe. Dieses über die beobachteten Frühlingsvorboten, weitere Beobachtungen folgen.

Anton Luginger, Pfarrkirchen

Der Massenmord im Süden. Letzten Sonntag besuchte mich ein Südländer in der Wohnung. Sein Blick fiel gleich auf meine Vögel, und es entwickelte sich ungefähr folgendes Gespräch:

Südl.: Sie haben auch Vögel?

Ich: Ja, seit meinen Jugendjahren!

Südl.: O, wir haben zu Haus' viele Vögel! Wir haben eigene Waldungen und mein Bruder fängt die Vögel selbst.

Ich: So, wie macht er es denn?

Südl.: Er stellt einen Baum mit Ästen auf, besteckt denselben mit Leimruten, stellt Lockvögel darunter; dann setzt er sich in eine Hütte. Die Vögel kommen in Scharen an, setzen sich auf die Ruten, kleben fest und fallen zu Boden. Das zuzusehen ist schöner als im Theater sitzen.

Ich: Was wird denn mit den Vögeln gemacht?

Südl.: Die schönsten werden in Käfige gesetzt, alle anderen getötet und verkauft.

Ich: Wieviel fängt er denn dabei?

Südl.: In 2 Stunden 250—400 Stück.

Dann kam er auf das Blenden der Buchfinken zu sprechen. Dabei lief es mir ganz kalt über den Rücken und ich brach das Gespräch ab. Als der betreffende Herr fortgegangen, fing mein Hauswirt, der Zuhörer der Unterhaltung war, gleich an zu rechnen: „Ein Mann fängt in 2 Stunden 250—400 Vögel; wenn nun 10 Mann dasselbe tun, und zwar in der Woche zweimal, dann fangen die 10 Mann in einem Zugmonat 20000—32000 Stück." Aber wieviel mehr werden gemordet? Ich dachte dabei an die deutschen Gesetze bzw. an die Tierschutzvereine, die doch in den letzten Jahren soundso oft mit Eingaben kamen, um uns das Vogelhalten zu verbieten. Was hätten die betreffenden Vereine ein schönes Betätigungsfeld, wenn sie sich mit den Südstaaten in Verbindung setzten, damit dort das Massenmorden verboten würde. Wir käfigen ja nur Vöglein, die uns meistens 5—10 Jahre aus Dankbarkeit für die gute Pflege mit ihrem Gesang erfreuen, während sie in irgendeinem Magen im Süden schon lange verdaut wären.

Saarbrücken, den 2. April 1925. Fritz Fuchs.

Sprechsaal.

Über den Versand lebender Vögel nach Österreich. Wohl jeder Liebhaber fremdländischer Vögel, der in die Lage kommt, Tiere lebend zum Versand zu bringen oder sich solche aus dem Ausland schicken zu lassen, wird sich

dazu mit gemischten Gefühlen entschließen. Sind doch unsere Lieblinge dabei allen möglichen Zufälligkeiten und Gefahren unterworfen, und durch unvorhergesehene Verzögerungen, Zugluft und Temperaturschwankungen ist ihr Leben und ihre Gesundheit oft genug ernstlich gefährdet. Während aber der Versand lebender Tiere in Deutschland allenthalben klaglos funktioniert, herrschen in dieser Beziehung in Österreich geradezu trostlose Zustände. Keinesfalls dürfen von Deutschland Vögel per Bahn (also auch nicht per Eilgut) nach Österreich zum Versand gebracht werden, da dem Empfänger, abgesehen von einer bedeutenden Verzögerung der Reisezeit, geradezu unglaubliche Laufereien und Schikanen bereitet werden, ehe er die Sendung ausgefolgt bekommt. Eine an mich gerichtete Sendung von vier Stück Pennantsittichen wurde in Fulda laut Frachtbrief am 2. Oktober im Schnellzug als dringendes Eilgut zur Aufgabe gebracht. Laut Abfertigungsstempel hat die Sendung am 3. Oktober die österr. Grenzstation Passau passiert, und obwohl täglich ein halbes Dutzend direkter Züge von Passau nach Wien geführt werden, dauerte es bis zum 7. Oktober, bis ich durch ein Telegramm verständigt werde, daß ich die Vögel am Wiener Hauptzollamt abholen soll. Da ich unglückseligerweise ganz an der Peripherie der Stadt wohne, muß ich nach eineinhalbstündiger Straßenbahnfahrt für heute wieder unverrichteterdinge nach Hause, denn hier wird nur bis 2 Uhr amtiert. Am nächsten Morgen erhielt ich, nachdem ich mich, nicht ohne vielen Ärger, durch ein Labyrinth von Gängen und Höfen durchgefragt den Frachtbrief und werde nun an einen anderen Schalter gewiesen, um dort die Zolldokumente zu beheben, obwohl die Sendung eigentlich keinen Zollgebühren unterliegt. Der Beamte, der durch mein Erscheinen bzw. über die von mir verursachte Störung seiner beschaulichen Ruhe sehr verstimmt zu sein scheint, erklärt mir, daß er die Zolldokumente noch nicht hier habe, ich möge nachmittag oder morgen kommen. Nun war aber meine Langmut zu Ende und ich schlug dort tüchtig Krach, mit dem Erfolg, daß das Gewünschte nach einer Minute auch schon in meinen Händen war. Wer aber glaubt, daß ich jetzt endlich meine Vögel bekomme, der irrt gewaltig. Vorerst soll ich Faktura vorlegen, um die Warenumsatzsteuer bemessen zu können, die ich auch noch zu leisten habe. Nachdem die Vögel aber ein Tauschgeschäft mit einem A. Z.-Mitglied sind, habe ich auch keine Faktura. Nach einem hochnotpeinlichen Verhör muß ich endlich eine schriftliche Erklärung abgeben, was die Tiere wert sind. Nachdem also auch die Warenumsatzsteuer bezahlt ist, werde ich nun in ein Magazin gewiesen, wo sich die Sendung befinden soll. Daß die von der langen Reise total erschöpften Vögel sich in einem trostlosen Zustand befanden, braucht wohl nicht erwähnt zu werden. Nach mehr als einstündiger Straßenbahnfahrt kommen die Tiere endlich in eine entsprechende Voliere. Nach einigen Tagen hatten sich die wirklich prachtvollen Sittiche, für die ich Herrn Balser sehr zu Dank verpflichtet bin, sehr erholt, und aller Ärger ist vergessen. Eines aber diene allen Liebhabern und Händlern zur Richtschnur: Versand lebender Vögel in und nach Österreich nur per Post, Sperrgut-Expreß! Sehr viel schneller geht die Sache wohl auch nicht, aber doch wenigstens mit etwas weniger Ärger und Verdruß. A. Z. 41, Wien.

Bücher- und Schriftenschau.

Die Vogeleier. Ein Leitfaden für Eiersammler von Dr. Kurt Flöricke. Mit 4 farbigen Tafeln, Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde, Franckhsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.

Nachdem der Verfasser auf den Unfug des planlosen Einsammelns und die dadurch erstehende Schädigung der Vogelwelt hingewiesen, betont er die Berechtigung des nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten planmäßig betriebenen Sammelns und seine Bedeutung für die Naturerkenntnis. Er bespricht die Technik des Sammelns, die hierfür nötigen Gerätschaften, die auch bildlich dargestellt sind, die Präparation der Eier, ihre Aufbewahrung, Etikettierung usw. Der 2. Abschnitt handelt von Größe, Gestalt, Gewicht und Färbung der Eier und allen dem, was zur Bestimmung notwendig ist. Im 3. Abschnitt werden die einzelnen Arten in systematischer Reihenfolge nach ihren wichtigsten Merkmalen kurz gekennzeichnet. Vier Farbendrucktafeln mit Darstellungen von Vogeleier sind dem Buch beigegeben. N.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Duran, Duisburg, Musfeldstr. 6a: Köhler-Amsel.

A. Fluck, Bremen, Knoopstr. 39: Mohrenkopfpapageien, Elfenbeinsittiche.

Linda Hirsch, Aubstadt, Unterfranken, A. Z.-Mtgl. 233, Ornis 318: 1,0 helle Stieglitz-Kanarie.

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a: 1 Schamaweibchen, Bergmeisen, 1 Rötelmerle, 1 ind. Blaumerle, Blaurotschwanz — Phoenicurus frontalis weißbrüstiger blauer Waldschmätzer — Tarsiger rufilata, 1 Klarinettenvogel, Blauspötter, 1 Flötenwürger, ind. Maskenwürger, ind. Grauwürger, 1 Würgerschnäpper, 1 Borstenhäherling, 1 Blaubartblattvogel, 1 Braunscheiteltimalie, Laufhühnchen, Gras-, Kuba-, Katharina-Kanarienflügel-, Tui-, Pavuasittiche, 1 Paar Spix-Ara, 1 Benguelapapagei, junge Mohrenkopfpapageien, Rosella und Penant-, Feuerflügelsittiche, Lasurblaue Bischöfe, Weißscheitelpfäffchen, Braunkopfammern ♂♂, dreifarbige Nonnen.

Paul Tzornack, Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189: Massenawachteln, Katharina-, Kubasittiche.

A. Voigt, Jena, Feodorastr. 13: 0,2 kleine Kubafinken, 1,1 Spitzschwanz.

Herrn G. M., Aachen: Derartige Fußgeschwülste be Weichfutterfressern können verschiedene Ursachen haben. Einmal können sie durch Verletzungen der Zehen und Ein dringen von Schmutz in die häufig nur sehr kleine Wund hervorgerufen werden, sodann durch Unreinlichkeit, unge eignete Sitzstangen oder auch durch Verabreichung zu star eiweißhaltiger Nahrung (zu reichliche Mengen von Mehl würmern besonders in der gesangslosen Zeit). Welche de genannten Ursachen vorliegt, wird Fragesteller selbst feststelle müssen. Die mit dem Fußleiden befallenen Vögel komme jeder einzeln in einen besonderen Käfig, der aufs sorg fältigste rein zu halten ist. Als Sitzstangen werden a besten frische Weidenzweige mit Rinde verwendet, die häufi erneuert werden müssen. Die Füße werden täglich mehr mals in lauem Kamillentee gebadet, mit einem Wattebausc gut getrocknet und dann mit Kartoffelmehl bestäubt. Ande seits wird dünnes Bestreichen der Füße mit Jodvasoge an Stelle des Einstäubens mit Kartoffelmehl empfohlen.

Herrn A. S., Zschopau. Die jungen Mövchen sin von den Alten nicht mehr gefüttert worden.

Herrn A. M., Suonenjoki. 1. „Die Papageien" vo Dr. Karl Ruß ist der dritte Band des großen, vierbändige Werkes von Dr. Karl Ruß, „Die fremdländischen Stuben vögel". Der Band ist im Jahre 1881 erschienen und enthä 10 Farbentafeln, welche 39 Arten darstellen. 2. „Fremd ländische Stubenvögel" von Karl Neunzig. Von de 42 farbigen Tafeln dieses Werkes stellen 9 Tafeln Papa geien in 26 Arten dar. Papageienabbildungen im Schwar druck sind 57 vorhanden. Im Text sind etwa 300 Papa geienarten behandelt.

Herrn W. Sch., Madrid; Herrn K. R., Stargard i. P Herrn A. B., Jena; Herrn Dr. H. W. F., München; Herr L. K., München; Herrn Dr. F. H., Berlin; Herrn D L., Brüssel: Beiträge dankend erhalten.

Herrn B., Waltrop; Herrn Dr. St., Zürich; Herr K. B., Eisenach: ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn H. Sch., Berlin N. Der Sonnenvogel ist i folge einer Knochenwucherung an den Stirnbeinen, welch die Augen aus ihrer Höhlung drängte, eingegangen.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite)

rgang 54 14. Mai 1925 Heft 20

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Meine Drosseln. (Aus 50jährigen Erfahrungen.)
Mein Mohrenkopf. Von Max Schneider.
Zur Vogelschau des Vereins für Vogelschutz, -pflege und -liebhaberei zu Leipzig. Von K. Neunzig.
Zu dem Artikel von Jos. Delvaux-Venlo (Holland) „Eine Streitfrage". Erwiderung von Karl Reich, Bremen. (Schluß.)
Unsere Lerchen. Von M. Kretschmar.
Kupferhaltige Vögel. Von cand. med. Ingo Krumbiegel, Dresden.
Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Bücher- und Schriftenschau - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Ausstellung - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellung.

Der Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Zwickau hält in der Zeit vom 17. bis mit 21. 5. d. J. seine 4. große Ausstellung im Saale des „Badegartens", Schloßgrabenweg, ab. Außer in- und ausländischen Vögeln kommen noch reichhaltige Präparate verschiedener Tiergattungen, Käfersammlungen, Aquarien usw. zur Ausstellung. Da sich der Reichsverbandsvorsitzende, Herr Joh. Birk, in liebenswürdiger Weise bereit erklärt hat, das Amt als Preisrichter zu übernehmen und auch einen hochinteressanten Vortrag zugesichert hat, können wir allen, die uns mit ihrem Besuch beehren, einige genußreiche Stunden versprechen.

J. A.: F. Burgkhardt, 2. Vors.

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Preußen. Jahresversammlung, verhandelt Berlin, den 18. April 1925, abends 8 Uhr, im Lokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Der Vorsitzende Nuke eröffnete die gut besuchte Versammlung um 9 Uhr. Anwesend sind der Verband der Vogelhändler e. V., „Aegintha", Verein der Vogelfreunde Berlin, Vereinigung der Liebhaber einh. Vögel Berlin und der Vorsitzende des Vereins Herne i. Westf. Nach Begrüßung der Anwesenden durch den Vorsitzenden erhält der Schriftführer das Wort zur Verlesung des letzten Protokolls. Dasselbe wird angenommen. Hierauf erstattet der Schriftführer den Jahresbericht. Im abgelaufenen Geschäftsjahr fanden statt: 1 Generalversammlung, 1 außerordentliche Generalversammlung, 1 ordentliche Sitzung, 10 Vorstandssitzungen und die 2. große Vogelschau. Folgende Ortsgruppen sind dem Landesverband angeschlossen: Hannover, Berlin, Vogelhändler, Aegintha, Vereinigung Kiel, Görlitz, Weißwasser, Kassel, Herne, Dortmund, Ornis Magdeburg, Liegnitz, sowie 15 Einzelmitgliedern. Es folgt der Bericht des Kassierers. Einnahmen 6561,47 M., Ausgaben 6374,79 M., Bestand 186,68 M. Die Angaben sind durch den Revisor, Herrn Gumprich, eingehend geprüft und für richtig befunden. Hierauf wird dem alten Vorstand Entlastung erteilt. Es folgt die Neuwahl des Vorstandes. Zum Wahlleiter wird Herr Gumprich ernannt. Aus dem Wahlakt geht als 1. Vorsitzender Herr K. Gumprich, Rechnungsrat, Berlin W. 50, Nürnberger Str. 44, hervor. Alle den Verband betreffenden Anschreiben sind an diesen Herrn zu richten. Die Herren Vorstände der Ortsgruppen werden gebeten, von dieser Adresse Notiz zu nehmen. Zum 2. Vorsitzenden wird Herr Gerhardt Günther Kanschube, Kriminal-Kommissar, Berlin-Friedenau, Alleestr. 15, gewählt; zum 1. Schriftführer wird Herr Paul Böhme, Kaufmann, Berlin O 17, Rüdersdorfer Str. 69, wiedergewählt; 2. Schriftführer Herr L. Schmidt, Vogelhandlung, Berlin-Neukölln, Fuldastr. 57; zum Kassierer wird Herr Erich Merz, Bankdirektor, Berlin-Friedenau, Wilhelm-Hauff-Str. 14II, wiedergewählt; Revisoren sind die Herren F. Zimmermann, Bankbeamter, Berlin, Kirchstr 19. und Carl Gohlke, Redakteur, Berlin-Halensee, Friedrichsufer Nr. 1. Zu Punkt Anträge wird die Frage gestellt, welche Zeitschrift Verbandsorgan sein soll. In dieser Sache wird sich der Vorstand mit dem Reichsverband in Verbindung setzen. Es liegt ein weiterer Antrag vor, Festsetzung der Verbandsbeiträge. Nach längerer Aussprache wird wieder 1 M. pro Jahr und Mitglied nach dem Mitgliederstande vom 1. April, und Einzelmitglieder 3 M., festgesetzt. Zu Punkt Verschiedenes kommt ein vom Reichsverband eingegangenes Schreiben durch den Schriftführer zur Verlesung. Die Tagesordnung ist erledigt. Die außerordentlich sachlich und harmonisch verlaufene Sitzung schließt der Vorsitzende, Herr Gumprich, mit Dankesworten an die Versammelten um 12 Uhr. Der neue Vorstand wird bemüht sein, die Interessen der Vogelliebhaber in jeder Weise zu wahren, um so mehr, als aus der Mitte der Versammlung die Mitteilung wurde, daß an einer Verschärfung des Vogelschutzgesetzes eifrig gearbeitet werde. P. Böhme, Schriftf.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Verband der Finkenvereine Ruhrgau-Bochum. Letzter Appell zum Werbewettsingen in Bochum in den Gartenanlagen Waldesruh, Inh. Ww. Weitkämper, am Südpark gelegen. Erstklassige Preise, erstklassige Prämiierung, erstklassige Organisation. Wer nicht kommt, schadet sich selbst. Nicht an Verlust irdischer Güter. Nein, an Erfahrung zwecks guter Abwicklung einer großen Veranstaltung, an Erfahrung wirklich richtiger Prämiierung in den Schönheitsklassen auf Grund einer erprobten und anerkannten Skala (Standort). Wer nicht kommt, verzichtet auf den wirklichen Genuß dieser großen Veranstaltung und leistet unseren Gegnern und denen Vorschub, die gegen uns sind.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Anschrift: H. Höhne, Leipzig-Vo., Eisenbahnstr. 84. — Der Zwickauer Verein für Vogelschutz und -liebhaberei veranstaltet vom 17. bis 21. Mai eine Vogelschau. Wir nehmen gern Veranlassung, unseren Mitgliedern den Besuch derselben besonders zu empfehlen. Eine Ausstellung soll nicht nur für unsere Liebhaberei verteidigend wirken, der Öffentlichkeit gegenüber, sie soll auch belehrend sein für uns selbst. Daß dieses in Zwickau erreicht wird, dafür bürgen uns unsere dortigen Mitglieder. Eine zwanglose Sitzung am Sonntag wird Gelegenheit zur Aussprache geben. Auf Wiedersehen also in Zwickau!

Höhne.

Aus den Vereinen.

Berichtigung aus Bekanntmachung in Heft 19: Aufgenommen ist Mitgl. Nr. 135n Zollinspektor Max Grabinger, Baden-Baden, Sinzheimerstr. 11. Die weitere Aufnahme geschah irrtümlich, da Herr Merz, Königsberg, Unterfr., bereits die Mitgl.-Nr. 374 führt.

A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.

J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Vereinsl.: Karl Röhr, Heiligerweg 28. Versammlung jeden 2. u. 4. Sonntag im Monat, nachmittags 5 Uhr. Liebhaber herzlich willkommen. J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Blasewitzer Hof". Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Rietschelhof", Rietschelstr. 19. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinslokal „Parkhotel", Epinaystr. 1, Versammlung. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an. Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8,15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 19. Mai. A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber. Nächste Veranstaltungen: Donnerstag, den 28. Mai: Vereinsabend im Landesheim, 8¼ Uhr, Vortrag Dr. Neuwerth: „Mohrrüben-Fütterung". Donnerstag, den 18. Juni: Vereinsabend im Landesheim, 8¼ Uhr, Vortrag Böneker: „Australische Körnerfresser". Donnerstag, den 9. Juli: Vereinsabend im Landesheim, 8¼ Uhr, Vortrag Klocke: „Mimikry". Alle Mitglieder werden herzlich gebeten, möglichst an allen Veranstaltungen teilzunehmen.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste willk. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Vereinsabend regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends um 8 Uhr) beim 1. Vors., Herrn Jahn, Feodorastr. 7. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. — Die Versammlung am 2. Mai 1925 war leider nur schwach besucht. Nach einem Referat des Vorsitzenden wurde beschlossen, der Süddeutschen Vogelwarte in Stuttgart als Mitglied beizutreten. Der Vorsitzende gab allerlei Zeitungsartikel, die sich mit Vogelschutz befassen, bekannt. Der Schriftführer wird in der Tagespresse von Jena, und möglichst auch in der einiger umliegender Städte, Artikel über Vogelschutz und Vogelliebhaberei anzubringen versuchen, namentlich über den Schutz der Raubvögel, z. B. des Uhus. Auch über den internationalen Vogelschutzkongreß in Luxemburg soll in der Tagespresse berichtet werden. Über die Jahresversammlung des Landesverbandes Sachsen-Großthüringen sowie die Leipziger Vogelschau berichtete der Schriftführer ausführlich. Vom Bund für Vogelschutz Stuttgart, dem der Verein als Mitglied angehört, soll das bekannte Merkblatt über den Schmuckreiher angefordert werden, falls es noch vorhanden ist. Die weiteste Verbreitung dieses Blattes wäre gerade jetzt sehr nötig, denn der Reiherstutz auf den Köpfen der Frauen ist gerade in der „guten Gesellschaft" wieder einmal Model Über einige Exkursionen ins Brutgebiet des Uhus in Jenas weiterer Umgebung berichtet Herr Dr. Sack. Mehr als je ist es nötig, für die Erhaltung dieses Naturdenkmals in Wort und Schrift einzutreten. A. Voigt.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat, abends ½9 Uhr, im Hotel „Thüringer Hof", Köln, Klingelpütz 43. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 28. Mai 1925. Gäste willkommen. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Normast im „Kaiser Friedrich", Breslauerstr. 50. Liebhaber willkommen. J. A.: Friedrich.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wsl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Tage im „Goldenen Falken" Versammlung; nächste Freitag, den 15. Mai. Liebhaber willk. Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Versammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Liebhaber willk. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebenda. R. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Am 3. Mai unternahm der Verein in aller Frühe eine Wanderung nach dem nahen Ort Lonnewitz. Der Weg führte die kleine Schar von Vogelfreunden durch den einzig dastehenden Stadtpark. Trotz der vorgerückten Jahreszeit herrschte in der Vogelwelt ungewöhnliches Schweigen. Vielleicht hatte die kalte Nacht den Vögeln die Freude am Lob und Preis des Schöpfers genommen? So mancherlei früher öfters beobachtete Sänger blieben ungesehen und ungehört. Man wurde den Eindruck nicht los bei längerem Nachdenken, daß sich doch ein Rückgang in der Vogelwelt von Jahr zu Jahr bemerkbar macht, selbst in einem wohl kaum idealer zu denkenden Gelände wie dem Oschatzer Stadtpark mit seinen prächtigen Laub- und Nadelholzbeständen. Auch das durch die trefflichen Tierschilderungen eines Naturforschers wie Arno Marx bekannte Zöschau ist nicht mehr dasselbe für den Vogelfreund wie früher. Wer weiß, wieviel gefiederte Sänger wieder vergangenen Herbst und Winter im Süden ihr zartes Leben lassen mußten! Wenn doch der Vogelschutz Allgemeingut der Völker werden könnte! Solchen betrüblichen Gedanken nachgehend, gelangte man ans gesteckte Ziel, in die traute Gaststätte des Mitgliedes Beling. Bei Trank und wohlschmeckendem Imbiß wurde die Zeit mit anregenden Gesprächen verbracht. Auch das Zusammengehörigkeitsgefühl wurde gestärkt durch die kurzen Schilderungen des stellvertretenden Werkmeisters Mann über seinen Besuch bei dem Leipzig-Plagwitzer Verein, dessen schöner Geist und Brudersinn dem Erzähler unvergessen sein wird. Mit dem Entschluß, solches Bewußtsein der Zusammengehörigkeit auch im Oschatzer Verein fruchtbar werden zu lassen, ging man gemeinsam gegen Mittag recht befriedigt nach Hause. Nächstes Zusammensein am 18. Mai, zugleich Hauptversammlung. Studienrat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

el-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50. **agnetze** f. kl. schädl. Vögel M. 2,30, M. 2,50 u. 2,80. Katalog gratis. **annen, Gronau 58,** Westf. [646

llensittich-Nistkasten
este, was es gibt, per Stück 2 ℳ, chte Stück 1,10 ℳ, gibt ab [647
frau Klara Neugebauer, Deutsch-Lissa.

Mehlwürmer, reine Ware, Einf. von 1.75 ℳ ¼ Pfd. franko. Bitte, Niederndodeleben b. Magd.

Vogelfutter [649
für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 18 über Vogelfutter umsonst.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Universalfutter I
für Rotkehlchen, Nachtigallen, Grasmücken, Sprosser
Kilo 2 ℳ. [650
Universalfutter II
für Drossel, Amsel, Stare
Kilo 1.50 ℳ.
Vom Besten das Beste empfiehlt
Gebel, Köln, Jakobstraße 8.

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark ¼ Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [651

RÜBSEN [652
erstklass. Züchterware, in eig. Anlage dopp. gerein. u. sort., liefere als Spezialität. Detailversand in meinen plombierten Originalbeuteln zu 5 u. 10 Pfd. Wiederverk. u. Vereine bitte Sonderofferte einzuholen.
Carl F. Müller, Kiel-Wellingdorf.

Mehlwürmer

à Pfund 5 ℳ, bei 6 Pfund Porto und Verpackung frei.

Ia Weißwurm . . . à Pfd. 5 ℳ
Ia Muska-Zecken . . à „ 2,50
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen . . . . à Pfd. 0,75
a Garnelen, gem. à Pfd. 0,40 ℳ

Ia Universalfutter.

Alleewa I für Nachtigallen 2.— ℳ
„ **II für Grasmücken** 1.80 ℳ
„ **III für Drosseln** 1.50 ℳ

Proben und Analysen zur Verfügung. Vertreter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [653

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser

A. Eckrich II., Waldsee (Pfalz).

Frische Ameisenpuppen

billigst abzugeben. [654

Jos. Chrlich, Würzburg, Weißenburgstr. 9.

Frische Ameisenpuppen

Liter 3 M.

Ameisenpuppen getrocknet Pfd. 6 M.
Weißwurm . . . . Pfd. 5 M.
Muska (Zecka) . . Pfd. 2 M.
Drosselfutter . . . Pfd. 80 Pfg.
Weichfutter Ia . . Pfd. 2 M.
Senegalhirse . . . Pfd. 50 Pfg.
Marokkohirse . . . Pfd. 50 Pfg.
Silberhirse . . . . Pfd. 60 Pfg.
Agavefasern . . . . Pfd. 1.50 M.

Exotennester Stck. von 1 M. an.
Wellensittiche-Nistkasten Stck. 2.50 M.

655] **Tierhandlung**

Max Kleinert

Berlin NO 18, Strausberger Str. 18.
Fernruf Alexander 3313.

Züchter-Urteile:

Bin mit Ihrem Rübsen und anderem Futter sehr zufrieden; werde Sie meinen Freunden warm empfehlen. Bitte senden Sie mir sofort 9 Pfund Rübsen, meine Vögel fressen ihn gerne.
Rulfingen, 22. 4. 25. Josef Schlude.

Senden Sie mir bitte 10 Pakete verbesserte „L. K.-Nahrung". Habe bereits im vorigen Jahre Ihre „L. K.-N." verfüttert und habe damit sehr gute Erfolge gehabt.
Dermbach, 23. 4. 25. R. Völker.

Bin mit „L. K." sehr zufrieden. Vögel nehmen dieselbe sehr gerne.
Kohlfurt, 26. 4. 25. H. Schmidt.

Ersuche um möglichst schnelle Zusendung von 1 Kilopaket „L. K.". Bin mit dem Präparat sehr gut zufrieden und werde mich immer desselben bedienen.
Herten, 26. 4. 25. Vinzenz Ketterer.

Bitte senden Sie sofort wieder als Päckchen 1 Karton „L. K.-Nahrung" zu 1,40 ℳ. Es gibt nichts Besseres als „L. K.-Nahrung".
Nordhausen, 27. 4. 25. Willy Holle.

Lorenz, Dresden

Drehgasse 5. [656

Die Originale obiger Zuschriften haben uns vorgelegen.
Die Schriftleitung der „Kanaria".

Täglich frische Ameiseneier

auch Versand.

Ia Weißwurm . . . . Pfd. 6.—
Universalfutter I . . . „ 2.—
dto. II . . . „ —.80

G. Behnke

Spezialhandlung für bessere Weichfresser, Papageien und sonstige Exoten.

657] **Berlin O 34**

Petersburger Str. 29.

Bei Anfragen bitte Rückporto beifügen.

Suche zu kaufen:

1,1 Sperlingskanz (Glaucidium passerinum).

Apotheker Deißböck, Wasserburg a. Inn. [658

Züchterwaren

Verbesserte L. K.	½-Kilo-Paket N.-M.	1,40
Rübsen, selten schöne Züchterware	½-Kilo „	0,50
Glanz, Marokko großkörnig	„ „	0,50
Hanf, deutscher	„ „	0,35
Hafer, geschält	„ „	0,35
Lein- und Negersaat	„ „	0,45
Ital. Silberhirse	„ „	0,45
Blau-Mohn, Speiseware	„ „	0,60
Marokko-Hirse	„ „	0,80
Prima Mischfutter für Kanarien, eigenes Verfahren	„ „	0,50
Waldvogelfutter	„ „	0,45
Sonnenrosenkerne, gestr.,	„ „	0,35
Salatsamen, weiß,	„ „	1,50
Sepiaschalen, große Stücke	„ „	1,50
Einäpfchen aus Glas	Stück „	0,10
Futternäpfchen aus Glas	„ „	0,15

Piep und Piep extra zu Originalpreisen.
Vereine und Großbezieher verlangen Sonderofferte. [659

Lorenz, Dresden, Drehgasse 5.

Junge Graupapageien, gesunde Vögel, à 90 ℳ, Gelbnackenamazonen à 75 ℳ, kleine Gelbhaubenkakadus à 45 ℳ, prachtvolle, fehlerfreie gelbe Aras (blaue Flügel), ganz zahm, in Prachtgefieder, à Stück nur 175 ℳ, ganz zahme Diademamazone 50 ℳ, ganz zahme, etwas sprechende Gelbstirnamazone 45 ℳ, ganz zahmer Zwergara, prachtvoll im Gefieder, 75 ℳ, junge Doppelgelbköpfe à 40 ℳ (zahm), junge zahme Mamojetäffchen à Stück 40 ℳ, Feuerflügelsittiche, ganz zahm, à Paar 40 ℳ, Katharinasittiche à Paar 30 ℳ, Kubasittiche à Stück 12,50 ℳ, Blaubürzel. Sperlingspapageien, nur Männchen, à Stück 6 ℳ, ausgefärbte Zuchtpaare, grüne und gelbe Wellensittiche à Paar 15 ℳ, Massenawachteln à Paar 30 ℳ, Kaptäubchen, richtige Paare, à Paar 8 ℳ, graue Reisfinken à Paar 5,50 ℳ, Schwarzkopfnonnen à Paar 4 ℳ, graue Astrilden à Paar 4 ℳ, Schönbürzel à Paar 6 ℳ, Safranfinken, ausgefärbte Männchen, à 8 ℳ, Braunkopfammern, prächtige Vögel, à Stück 6 ℳ, Jap. Möwchen, Männchen, à 3,50 ℳ, griechische Landschildkröte à Stück 1,20 ℳ, Moselweißwurm à Pfund 5 ℳ, frische Ameiseneier zu Tagespreisen.

Paul Tzornack, Berlin NO 55,

660] **Prenzlauer Allee 189.** Telefon Humboldt 2063.

Suche zu erwerben gut eingewöhnte bis je 1 Dutz. Heidelerchen und Gartengrasmücken, auch einzelne. Ferner je 2,0 Sprosser, Alpenbraunellen, Haubenlerchen und Dorn- u. Mönchgrasmücken, für singendes Männchen muß bei allen Vögeln volle Garantie gegeben werden. Je nach Angebot kann ich dafür in Tausch geben folgende über ein Jahr gut eingewöhnte zahme Männchen, seit Nov. resp. Dez. in vollem Gesang: 2,0 Feldlerchen, 2,0 Baumpieper, 1,0 Gebirgsamsel, 1,0 Singdrossel, 1,0 Nachtigall und eine wirklich Ia prima Schamadrossel. Suche zu kaufen im Juni-Juli je 2 Zentner gut Ia getrocknete Ameiseneier und Eintagsfliegen, auch jed. kl. Posten, nur neue Ernte, und bitte um Offerten. [661

Peter Matzen, Göttingen.

Prima Harzer

Kanarien-Sänger

(Stamm Seifert)

mit schöner Hohlrolle, Hohlklingel, Schockel, Knorre, Glucke und tiefen Pfeifen, à 12, 15 u. 20 ℳ, Weibchen à 3 u. 4 ℳ. Versand geg. Nachnahme. Probezeit 6 Tage, was nicht gefällt, tausche um. [662

H. Voigt,

Kanarienzüchter,

Nordhausen am Harz.

Ornis-Haus Halle-Saale

Gegründet 1912

Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)

Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall., Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspött., Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [663

Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1
Preisliste auf Wunsch!

Schamadrossel,

ausgefärbte erstklassige Sänger, fehlerfrei	Stck.	65 M.
nicht ausgefärbte, gute Sänger	Stck.	55.— „
Greidrossel	Stck.	15.— „
Langschwänzige Glanzstare	Stck.	10.— „
Rote Arara, Prachtgefieder, zahm u. sprechend	Stck.	150.— „
Graupapageien, fingerzahm	Stck.	95.— „
Gelbnackenamazonen	Stck.	65.— „
Doppelgelbkopf	Stck.	65.— „
Blaustirnamazonen, sehr gelehrige, schon etwas sprechend	Stck.	55.— „
Grüne Wellensittiche (Zuchtpaar)	Paar	15.— „
Gelbe Wellensittiche (Zuchtpaar)	Paar	15.— „
Rote Kardinäle, Männchen	Stck.	25.— „
Weibchen	Stck.	25.— „
Graudelsänger, ohne Geschlechtsgarantie	Paar	5.— „
Graudelsänger, garantierte Männchen	Stck.	6.— „
Grangehäubte Kardinäle	Stck. 8 M., Paar	15.— „
Kapptäubchen	Paar	7.50 „
Stahlfleckttäubchen	Paar	7.50 „
Senegaltäubchen	Paar	7.50 „
Kanarienrollen	Stck. 12 bis	15.— „

Bei Anfragen Rückporto.
Porto u. Verpackung 3.50 M.

664] **Tierhandlung**

Max Kleinert

Berlin NO 18, Strausberger Str. 18.
Fernruf Alexander 3313.

Schamadrossel

Stück 55, 60 u. 70 ℳ, tadellose g
Wellensittiche Paar 15 ℳ, Sperl
papageien Paar 20 ℳ, Goldstirnsi
Paar 25 ℳ, Safranfinken Paar 8
Reisfinken, blau, Paar 8 ℳ, Nor
schwarzköpfig, Paar 6 ℳ, gr. Ast
Paar 5 ℳ, Atlasfinken Paar 5
Zebrafinken Paar 25 ℳ, Indigofi
blau, Paar 80 ℳ, Rothrbülbül
16 ℳ, graue Kardinäle Stück 9
Dominikaner Stück 9 ℳ, Papstfi
Stück 20 ℳ, Landschildkröten Stück
2.—, 2.50, 3.— ℳ, Alligatorschildkr
Stück 5 ℳ, Laubfrösche Stück 50
Liste und Anfragen nur geg. Freim

Beck, Tier-import, Stuttgart

Verk. ein sehr gutes Zuchtpaar
Wellensittiche, Preis 16 M., u.
gelbes pr. Wellensittichzuchtwb
Preis 8 M.
Otto Nitsche, Nonneburg (Th
A. Z.-Mtgl. 344.

2,6 Kanarie

gegen kleine Exoten

H. Seizinge

Hildburghausen.

Tausch

1,1 Zuchtpaar Grassittiche,
1,0 Goldstirnsittich
gegen Wellensittiche.
Willy Schmidt, Hofheim i.
(Hessen, Kr. Bensheim), Neugasse 8.

Habe abzugeben:

1,2 Truthühner, 24er legend.
0,1 engl. Bulldogg, geworfen
25. Juni 22, eingetragen Nr. 920, lbr
farbig mit sgt. und vorzüglich bewe
1 mal 2,3 geworfen, gegen Gebot
unter 130 M., steht vor der Hitze.
Truthühner nehme in **Tausch Exo**
singend, mit Käfig. Auch suche
erh. **I. Band, Die fremdländis**
Stubenvögel von Karl Neunzig,
ältere Ausgabe. Gefl. Off. an
H. Christian, Sulz a. Neckar, Drog

---

1 Blutschnabelweber, Männche
1 Feuerweber, Männchen,
1 Dominikaner-Kardinal, Mch
(alle drei gesund und munter), w
Räumung zu verkaufen für den
von 25.— M. oder geg. Tausch.
Josef Perner, Straßburg (Uck
Schulstraße 15.

8,8 Wellensittiche, grüne Zuchtp
aus Gartenvoliere, à Paar 15.—
Umstände halber zu verkaufen. Ver
Porto extra.
Carl Blüm, Mainz a. Rh
Bebelring 46. A. Z.-Mtgl.

Frische Ameiseneier, 1925, à
4.— M. franko, solange Vorrat. G
eine Kollektion Muster Rausch.
Rückporto.
Carl Blüm, Mainz a. Rh
Bebelring 46. A. Z.-Mtgl.

Beschwerden we
Nichtzustellung der „
fiederten Welt" sind b
zuständigen Postamt
zubringen.

Inserate

für das am 21. Mai 1925
Ausgabe gelangende Heft 21
Ges. Welt erbitten bis 16.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 21. Mai 1925 | Heft 21

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Meine Drosseln.

(Aus 50jährigen Erfahrungen.)

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Im Jahre 1882 trat ich mein weiteres Wanderleben durch fast ganz Deutschland an. Ich war Postbeamter und ein solcher muß bis zu seiner festen Anstellung stets den Wanderstab in der Hand haben. Die Jahre 1885—1888 führten mich viel nach Hannover, und diese schöne Stadt mit ihrer herrlichen waldreichen Umgebung — die Eilenriede, ein prachtvoller Laubwald, erstreckt sich unmittelbar bis an die Stadt — war damals für die Vogelliebhaberei wie geschaffen. Hier machte ich meine ersten Studien mit selbstgehaltenen Drosseln. Die Eilenriede lebte und webte geradezu in Drosseln, namentlich Singdrosseln und Amseln. Bald lernte ich auch mehrere Vogelhändler und Vogelfänger persönlich kennen. Unter diesen einen alten Vogelhändler in einer kleinen Seitengasse der Georgstraße, ein Original und Vogelnarr, wie sie heute längst ausgestorben sind; wenigstens habe ich keinen ähnlichen wiedergefunden. Er führte nur einheimische Weichfresser und unter diesen besonders Sing- und Schwarzdrosseln. Letztere lernte er auch zum Nachpfeifen von Liedern an, und zwar nur mit dem Munde. Trotz seines hohen Alters von mehr als 70 Jahren pfiff er noch so rein und klar, wie ich es selten gehört habe. Ganz stolz war er darauf, daß er 1866 — als die verdammten Preußen in Hannover einrückten, er war nämlich, wie alle alten Hannoveraner, starrer Welfe — einem preußischen Hauptmann eine gelernte Amsel, die drei Lieder rein und schön pfiff, für 12 Taler verkauft hatte. Die Vögel saßen bei ihm alle in Holzbauern, andere Käfige führte er überhaupt nicht. Sie waren rotbraun oder auch grün gestrichen. Ebenso kannte er keine Lerchenbauer der für Lerchen eigentlich naturgemäßen Art, sogenannte Laufkäfige mit niedriger weicher Decke. Seine Lerchen saßen in Harzerbauern mittlerer Art, in deren Mitte ein niedriges Tischchen angebracht war, auf das sich die Lerche beim Singen setzte. Ich habe selbst gehört, daß sie in diesen Käfigen sehr schön sangen, namentlich wenn sie vor den Fenstern hingen. Also von diesem meinem Vogelfreunde — ich kann ihn so nennen, weil ich ihn alle Woche mehrere Male besuchte und ihn besonders seiner treuherzigen Erzählungen aus dem Vogelleben und seiner Erfahrungen wegen in mein Herz geschlossen hatte — kaufte ich meine erste Singdrossel. Er nannte sie allerdings „den Buntdrossel", unter anderem Namen kannte er sie gar nicht. Es war ein prächtiger Wildfang. Von seinen aufgefütterten Buntdrosseln wollte ich keine, obgleich ich damals über den Wert bzw. Unwert des Wildfangs und der aufgefütterten Drossel keine Erfahrung hatte. Erst im folgenden Jahre (1886) lernte ich die „Ges. Welt" kennen und ich bin ihr seit dieser Zeit ein treuer Anhänger geblieben. Ebenso kaufte ich mir das „Handbuch für Vogelliebhaber usw. II einheimische Stubenvögel" von Dr. Karl Ruß, Hannover, Carl Rümpler 1881. Da ich auch das Geschlecht der Singdrossel nicht unterscheiden konnte — gesehen und gehört hatte ich schon viele in der Freiheit —, belehrte mich mein alter Freund darüber gründlich, war er doch in früheren Jahren selbst oft auf den Fang gegangen. Als Hauptkennzeichen des Männchens bezeichnete er mir den breiten bedeutenden Kopf mit dem an der Wurzel zusammengedrückten, vorn scharf umgebogenen Schnabel, die beiderseits von der Schnabelwurzel bis zur Kehle herunterlaufenden, beim Männchen besonders breiten und schwarzen Streifen, die Zügel genannt, die hellorangefarbenen Unterseiten der Flügel und die mit der Spitze nach oben gekehrten großen, dunkelbraunen Herzflecken auf hellrötlichgelbem Grunde der Brust, dieser breit- und hochgewölbten Liederwohnung. Auch die weißgelbe Kehle und der weiße, eiförmig braunpunktierte Bauch, sowie besonders der charakteristische Firnis- oder Seidenglanz des olivbraunen Oberkörpers mit den rostgelben Flügeldeckfederspitzen sind die besten Kennzeichen. Beim Weibchen sind alle Farben mehr verschwommen und weniger klar. Soviele Singdrosseln später durch meine Hände gegangen sind, ich habe mich in der Geschlechtsbestimmung nie geirrt. Neulinge verwechseln leicht die Wein- oder Rotdrossel (Turdus iliacus *L.*) mit der Singdrossel, namentlich mit der kleineren Art, die gerade als ganz hervorragende Sängerin angepriesen wird. Aber das Dunkelorange unter den Flügeln und die zwei dunkelgelben Flecke an den Seiten des Halses der Weindrossel lassen den Unterschied zwischen ihr und der Singdrossel leicht erkennen.

Also diese meine erste Singdrossel machte mir viele Freude. Ich kaufte mir auch einen größeren Holzkäfig, Clausthaler Arbeit, etwa 70 cm lang, 40 breit und 50 hoch. Futtervorrichtungen waren nicht angebracht, die Futternäpfe usw. mußten durch die Tür auf den Boden gesetzt werden. Hierzu benutzte ich glasierte Blumenuntersätze. Übrigens hat man heute noch in Böhmen und Mähren viele Käfige ohne Futtervorrichtungen. Ich habe wiederholt daher solche bezogen, um ihre Einrichtung kennen zu lernen, und zwar jedesmal, wenn ich Drosseln schicken ließ. Diese Drosselbauer — als solche wurden sie ausdrücklich angeboten — waren aus Holzgestell mit Drahtstäben, rundbogiger weicher Wachstuchdecke, unten Holzstäbe und darüber Holzkasten zum Herausziehen, an der Vorderseite zwei Türen, durch die Futternäpfe hereingestellt wurden. Mir haben diese Käfige nicht besonders für Drosseln gefallen, ich fand sie zu klein und benutzte sie meistens für meine Edel-(Buch-)finken. Ein schwieriges Kapitel war damals — also vor 50 Jahren — die Fütterung der Weichfresser. Mein alter Freund, der Vogelhändler, fütterte meistens Mohnmehl mit geriebener Mohrrübe. Er hielt zähe an diesem Futter fest; namentlich deshalb, weil der Schmutz der Vögel — besonders der größeren wie die Drosseln — danach sehr fest war. Er sah grau bis braun aus und bildete lauter kleine Würstchen, wie Mehlwürmer groß. Dies war also sehr praktisch, auch sangen seine Vögel dabei sehr gut. Der Lieferant des Mohnmehls war die Firma Georg Kapelle in Hannover. Auch ich habe diese Fütterung in den ersten Jahren meiner Drosselhaltung beibehalten. Meine erste Singdrossel erwarb ich zur Herbstzeit. Nach der Eingewöhnung bei mir fing sie im Oktober an, leise zu singen. Nach Weihnachten, in der zweiten Hälfte Januar — ich weiß dies noch wie heute — wurde sie lauter und von da ab gab ich täglich einige Mehlwürmer, aber höchstens 3—4 Stück, dabei blieb sie immer gleichmäßig in Gesang, bis sie dann Anfang März vollständig laut durchsang. Da ich damals nur den einen Weichfresser neben einigen Körnerfressern hielt, ist der Zeitabschnitt des Gesangs meiner Singdrossel genau im Gedächtnis geblieben. Sie wurde auch nach einigen Monaten ihrer Gefangenschaft bei mir ziemlich ruhig, obwohl sie zuerst — wie alle Drosseln aus der Wildbahn — sehr scheu gewesen war. Nach meiner Beobachtung werden Wildfänge der Sing- und Schwarzdrossel nie richtig zahm. Ich habe mir wahrhaftig immer alle Mühe gegeben, alle Vorschläge aus der „Ges. Welt" und aus Lehrbüchern nach dieser Richtung zu beachten; aber Wildfang bleibt Wildfang. Meine Drossel brachte den David-Kuhdiebruf sehr gut und ihr Gesang blieb ein Meisterwerk, solange ich sie besaß. Im Jahre 1886 (Herbst) siedelte ich mit ihr nach Magdeburg über. Dort erregte sie unter Vogelfreunden viel Aufmerksamkeit. Da ich dienstlich oft nach Hannover kam, habe ich von dort viele Singdrosseln von meinem alten Freunde daselbst erwerben und mitbringen müssen. Die Vogelgemeinde war zu der Zeit gerade in Magdeburg sehr zahlreich. Z. B. war ein Destillateur darunter, der neben 5—6 Feldlerchen nur 1—2 Singdrosseln hielt, auch ihn belieferte ich. Seine Vögel hingen alle in seinem Laden, eine Singdrossel über der Eingangstür. Wenn man im Sommer morgens um 3 oder 4 Uhr vorbeiging — ich kam oft in diesen Stunden dienstlich da vorbei — dann lärmte und sang die Drossel, daß es weit durch die Straßen schallte. Wie oft stand ich da still und lauschte dem Gesang! Und wenn ich dann nach Hause kam, erquickte ich mich weiter an dem Gesang meiner Drossel. Von diesen Tagen ab bin ich eigentlich begeisterter Anhänger meiner Freundin, der Singdrossel, geblieben und bin es heute noch und ich ziehe sie der Nachtigall und dem Sprosser vor, die ich auch vielfach gepflegt habe. In dieser Zeit kam ich auch in den Besitz meiner zweiten Amsel. In Magdeburg war damals auch ein Restaurateur, der nebenbei einen schwunghaften Vogelhandel trieb. Deshalb suchte ich ihn öfter auf. Bei ihm traf ich auch eines Tages einen Vogelhändler aus dem Hessischen, der in einem kleinen gewöhnlichen Kanariendrahtbauer eine bildschöne, ganz zahme Amsel bei sich führte, die zwei Lieder pfeifen sollte. Sie nahm den Mehlwurm aus jedermanns Hand. Sofort war mein Sinnen und Streben auf diesen Vogel gerichtet und ich kaufte ihn für 12 M. Das war zu der Zeit für mich eine bedeutende Aufwendung — aber ich mußte den Vogel besitzen! Zunächst borgte ich mir das dafür nötige Bauer von dem Restaurateur, im nächsten Monat kaufte ich es. Auf dem Gebiet der Vogelkäfigfabrikation, die sonst bei uns in Mitteldeutschland noch stark vernachlässigt war, war zu der Zeit schon ein erheblicher Aufschwung eingetreten. Es wurden sachgemäße Weichfutterfresserkäfige in guter Vervollkommnung angefertigt. Z. B. ließ der vorerwähnte Restaurateur Kistenkäfige für Drosseln anfertigen, die einen guten Eindruck machten. Sie hatten die genügende Größe, waren mit Zinkblechschubkasten versehen und innen sowie außen dunkel poliert. An der vorderen Seite, die aus Drahtgitter bestand, waren zwei Futter- bzw. Trinkgläser angebracht, und zwar Birnenform mit Glasdach. Es konnte wenig Futter nebengestreut werden, so daß die Stube rein blieb und damit war schon bei der Hausfrau viel gewonnen, die Gegnerin der Vogelhaltung war — weil bisher die Vögel ihr zu unsauber waren. In gewissen Grenzen hatte sie auch recht, denn z. B. gerade die Amsel hat die Gewohnheit, arg mit dem Futter zu schleudern. Damals tauchten auch bei uns die ersten Käfige — ich rede natürlich örtlich — mit weicher Decke auf, und auch die vorbeschriebenen Bauer hatten sie. Übrigens habe ich viele Jahre noch nachher, ja bis in die neueste Zeit, bei meinen vielen Reisen in den Thüringerwald dort noch oft Drosseln in Käfigen mit fester Decke gefunden.

(Fortsetzung folgt.)

Mein Mohrenkopf.

Von Max Schneider.

(Fortsetzung und Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Mit besonderer Vorliebe treibt er sich auf dem Tisch herum, wenn wir beim Kaffee oder Abendbrot sitzen — man weiß oft nicht, wie und wo er herkommt, auf einmal ist er vertraulich in unserer

Mitte und macht sich's mollig. Das erste ist, daß er seine begehrlichen Blicke nach Milchhaut umherschweifen läßt, auf die er ganz besonders erpicht ist, er eilt von einer Tasse zur andern und holt sich die obenauf schwimmende Sahne heraus, dann schleicht er zum Milchtopf, nach jedem zweiten Schritte stehen bleibend, um uns mit herausforderndem Blicke zu mustern, denn er weiß, daß es ihm verboten ist, auf die Milchkanne zu klettern; ruft man ihm ein warnendes „Mohr —!" zu, so kehrt er um, beschäftigt sich einen Augenblick mit irgend sonst etwas, um sich, sobald wir ihn dann scheinbar nicht mehr beachten, mit List und Schläue auf Umwegen zum Ziele seiner Wünsche hinzuschlängeln und plötzlich sitzt er auf dem Topfrand und senkt den Kopf in die Tiefe; die Milchhaut im Schnabel, steigt er herab, während ihm die Augen übergehen vor Begierde, bis er seinen Raub verzehrt hat bis auf den letzten Rest; nun geht er aber gleich auf weitere Raubzüge aus, und es ist ein schweres Amt, ihn immer fernzuhalten von allem, was er nicht haben darf, ist es ihm doch der größte Genuß, nach der Milchhaut Butter oder ein Stückchen Wurst vom Teller zu stehlen und, wenn man ihm sein unrecht erworbenes Gut entreißen will, sich schleunigst damit aus dem Staube zu machen. Man muß ihm oft solch kleinen Leckerbissen überlassen, um ihn nicht zu verdrießen. Aber wir lassen ihn schon statt von Fett und sonstigen verbotenen Früchten lieber von bekömmlicheren Leckerbissen naschen, von Brot, Zwieback, Kuchen, in Tee oder Kaffee leicht getaucht. Auch Kartoffeln liebt er sehr und ganz besonders Obst, zumal Nüsse, Kirschen, Äpfel und Weintrauben. Letzteren zuliebe stahl er sich im Sommer stets aus dem Zimmer auf den Balkon, wo wir ihn dann im dichtesten Weinlaub versteckt beim behaglichen Schmause fanden. Leider aber vergriff er sich bei solcher Gelegenheit nicht nur an den einzelnen Traubenbeeren, sondern nagte gar manche Traube am Stiele ab, so daß wir immer ein wachsames Auge auf ihn haben mußten. Er ist ein rechter Lumpazivagabundus — Bummeln und Stehlen ist ihm Lebenszweck. Von seiner Hauptnahrung, die ihm von Amts- und Rechtswegen zukommt, will er sich immer drücken, den eingeweichten Pferdezahnmais, Hafer, Glanz und Hirse frißt er nur, wenn er nichts anderes bekommt, Reis nur gekocht, zumal wenn er ihn uns vom Teller stehlen kann, Erdnüsse beißt er entzwei und wirft sie fort, Zirbelnüsse, Sonnenblumen- und Hanfkerne, wovon er nicht so viel bekommen darf, frißt er um so lieber, auch Vogelbiskuit, Ameisenpuppen und Mehlwürmer, wovon er mir morgens, wenn ich das Futter für Brillenvögelchen und brütende Prachtfinken zurechtmache, unter den Fingern wegstiehlt, was er erwischen kann; es entspinnt sich da jeden Morgen ein heißer Kampf zwischen uns beiden — ich weiß nicht, ob ich behaupten darf, daß ich immer der obsiegende Teil bin. Sein Nagebedürfnis ist groß, er kann sich stundenlang mit dem Benagen von frischen Obstzweigen u. dgl. beschäftigen. Viel Vergnügen bereitet es ihm auch, mit einem Zweig, einem Holzstückchen, einer Nußschale oder kleinen Kette zu spielen oder auf seiner Käfigtüre sitzend, dieselbe mittels seines Schnabels durch Anziehen an den Käfig und wieder Abstoßen in Bewegung zu setzen; ebenso gerne tummelt er sich in seinem Schaukelring, alles ohne Geschrei, ganz ruhig oder mit gemütlichem Geplauder. Er badet leidenschaftlich gern, besonders wenn Sonne ins Wasser scheint, und plantscht dabei so ausgiebig, daß ihm die Federn triefend naß vom Leibe hängen, doch liebt er es nicht, sich bespritzen zu lassen, auch vor Regen hat er Angst, wie er sich überhaupt oft als kleiner Hasenfuß zeigt, der sich vor fremden großen oder schwarzen Gegenständen entsetzlich fürchtet und in Angst und Aufregung gerät, hingegen anderen Tieren gegenüber keine Furcht zeigt, sondern angriffslustig gegen solche vorgeht, z. B. gegen meine Amazone, die ich seit kurzem besitze, gegen Hunde, die mit Fremden gelegentlich ins Zimmer kommen, gegen eine neckende Hand oder gegen die Teddybären meines Enkelchens. Da senkt er den Kopf wie ein Bisonbulle, drückt den Schnabel zur Erde und geht mit funkelnden Augen, laut knurrend, los gegen den Feind. Wird er eines Hundes wegen vorsichtshalber in den Käfig gesteckt, so gibt er seinen Unwillen gegen das fremde Getier durch anhaltendes Knurren und Schnabelhacken kund. Von Eifersucht ist er sehr geplagt, wenn ich nur vor meinem Prachtfinkenkäfig stehe, tobt er hin und her und ruft mir mit den einschmeichelndsten Lauten und mit der Zunge lockend und schnalzend, bis ich mich über ihn erbarme. Wie schwer gekränkt war der Arme, als die vorhin erwähnte Amazone (Doppelgelbkopf) ins Haus kam und wir uns nun mit dieser beschäftigten. Er zog sich verdrießlich in seinen Käfig zurück und war nicht mehr zu sprechen; er reagierte nicht mehr auf unsere Ansprache, noch auf die verlockendsten Leckerbissen, drehte sich um, wenn man ihn krauen wollte, stieß mit dem Schnabel nach der Hand, die ihn freundlich aus dem Käfig nehmen wollte, und ließ sich erst nach etlichen Tagen wieder unsere Annäherung gefallen.

So war es auch vor einem Vierteljahr eines jungen Nymphensittichs wegen und heute noch zeigt Mohrchen denselben gekränkten Stolz und Trotz,

Olivenastrild.

wenn meine Tochter oder mein Enkelchen sich mit dem Nymphensittich beschäftigt, obwohl er sich mit dem Vorhandensein desselben trotz seines anfänglich so glühenden Hasses im Laufe der Monate einigermaßen abgefunden hat. Diese junge Nymphe verdanke ich der Güte des Herrn Dr. Bilfinger, der uns bekanntlich, wie Herr Lichtenstaedt, schon durch so manchen unterhaltenden und wertvollen Aufsatz in dieser Zeitschrift erfreut hat. Die Nymphe kam, etwa vier Wochen alt, wild und scheu (wie die Nymphen fast immer sind) in meine Hände, wurde aber in der Pflege meiner Tochter in kürzester Frist erstaunlich zahm, fraß bald meiner Tochter und dann jedem von uns aus der Hand, läßt sich gerne streicheln und Köpfchen krauen und will vor allem immerzu bei meiner Tochter sein. Da hatten wir anfangs ordentlich Mühe, die Nymphe vor Mohrchens wütenden Angriffen zu schützen. Auch heute noch, da die beiden Sittiche aneinander gewöhnt sind, möchten wir es nicht wagen, dieselben ohne Aufsicht beisammen zu lassen, denn Mohrchen ist doch weitaus der Stärkere und er kriegt mitunter eine heillose Wut auf Coco (so heißt die Nymphe), auch macht es ihm einen Mordspaß, Coco ganz unerwartet aus seinem Käfig zu werfen oder über den Tisch hinunter zu jagen. Und doch ist er gerade Coco gegenüber so überaus langmütig und geduldig; wenn sich die feindlichen Brüder beim Abendbrot auf unserm Eßtisch tummeln, holt sich Coco einen Bissen um den anderen aus Mohrchens Schnabel, Mohrchen kann dies nicht leiden, sträubt sich dagegen, läßt es sich schließlich aber doch gefallen und nun stiehlt sich Coco jeden Bissen, den Mohrchen soeben gemächlich von unserem Teller stahl, aus dessen Schnabel so lange, bis Mohr, des Spieles überdrüssig, sich einen andern Platz aussucht, und endlich, da ihn Coco auch da mit hartnäckiger Zudringlichkeit verfolgt, plötzlich von Wut gepackt, ein paar Schritte rückwärts geht, knurrend mit gesenktem Kopfe wie ein Büffel vorwärts schießt mit einem Ruck, um dem Aufdringlichen einen Schnabelhieb zu versetzen, dem wohl weitere folgen würden, wenn nicht Coco, der Mutige, sich mit lautem Angstschrei schleunigst in die Büsche schlüge. Aber nach ein paar Minuten beginnt das Spiel aufs neue, und es ist erstaunlich, wie sehr sich der gute Mohr trotz seines Ärgers über die unwillkommene Kameradschaft zu beherrschen weiß, um so mehr als ihm bei seiner angeborenen Gemütlichkeit das aufgeregte Gebaren des unruhigen Nymphensittichs, der beständig hin- und hertrippelt, hüpft, mit dem Kopfe nickt, quäkt, auf allen Tassenrändern klopft und mit den Teelöffeln herumwirft, offensichtlich ebenso unbehaglich ist, wie seine „plumpe Vertraulichkeit", die Mohr zuweilen nur damit beantwortet, daß er Coco knurrend mit dem Schnabel beiseite schiebt, als wolle er dem gemütlichen Stammgast am Biertisch gleich dem Fremdling bloß sagen „meine königlich bayrische Ruh' will i ha'm." — Einen köstlichen Anblick gewährt es, wenn die zwei Gesellen bei gemeinsamem Verzehren eines Leckerbissens, z. B. eines Stückes Milchhaut, sich beeilen, um dem andern ja keinen Vorsprung zu lassen, oder wenn sie ein Stückchen Brotrinde oder Wursthaut hin- und herzerren, jeder an einem Ende, und mehr noch, wenn sie friedlich und artig, als könnten sie kein Wässerlein trüben, meiner Tochter oder meiner kleinen Enkelin gemeinsam aus dem Munde fressen, was sie mit großer Vorliebe tun. Tabakrauch hat Mohrchen sehr geliebt, es machte ihm immer Spaß, den Rauch mit dem Schnabel zu erhaschen und einzufangen, seit er jedoch dabei einmal ein Rauchwölkchen in den Rachen bekam, flieht er den Rauch, und wenn man ihn los sein will, braucht man ihm nur ein kleines Wölkchen Zigarettenrauch ins Gesicht zu blasen — und schon ist er über alle Berge.

Wenn er sich lange genug auf dem Eßtisch getummelt oder mit seinem Genossen Coco genügend geärgert hat und nichts mehr vorfindet, was sein Diebesgelüste anregt, dann sucht er sein Ruheplätzchen auf der Sofalehne auf, seit neuestem wählt er hierzu auch gerne den Platz auf dem Knie eines der am Tische Sitzenden, wobei er sich sodann zwischen Tischwand und Tischtuch behaglich einrichtet. Ebenso wonnig fühlt er sich, wenn man eine Zeitung auf dem Tische aufstellt, so daß er bequem unter derselben wie in einem Zelte sitzen kann; ruft man ihn dann, kommt er ein wenig vor, streckt sein grauschwarzes Köpfchen heraus und schielt um die Ecke, um sich sofort wieder unter leisem Knurren oder Zungenschnalzen in sein gemütliches Heim zurückzuziehen. Schreien kennt er eigentlich nicht oder nur ganz wenig, wenn er durchs Fenster einen Vogel oder eine Katze sieht, denen er gerne zu Leibe rücken möchte. Aber einen Fehler hat er, den Fehler aller Papageien, die Lust zum Nagen. So hat er an Sofa und Polstersesseln allmählich sämtliche Quasten und Einfassungsschnüre abgetrennt — —, aber es gibt ja Nadel und Faden, sie sind alle wieder festgenäht, Mohrchen kann von neuem beginnen. Er plaudert allerliebst und sein Sprechen ist so drollig wie sein ganzes Wesen. Er schnalzt verlockend mit der Zunge, miaut wie ein junges Kätzchen und knurrt wie ein Hund, sowohl aus Behagen als aus Zorn, im ersteren Falle leise und zärtlich, im zweiten grollend und unfreundlich und mitunter so laut, daß sich Uneingeweihte im Zimmer umsehen und den knurrenden Hund irgendwo in einer Zimmerecke suchen. Sein Sprachverzeichnis ist kein großes, aber was er sagt, spricht er allerliebst, und das Meiste hat er ganz von selbst gelernt, ohne daß er jemals sachgemäßen Unterricht bekommen hätte. Durch einen solchen würde er gewiß noch manches hinzu lernen, aber ich hatte gar nie die Absicht, ihn zum Sprechen abzurichten, obwohl wir uns natürlich auch über diese Begabung des kleinen Kerlchens sehr freuen, es genügte uns schon die Freude an seinem ganzen drolligkomischen Wesen, seiner Zutraulichkeit und Klugheit und — ich darf auch sagen — seiner Farbenschöne, welche übrigens in der Mauser noch zugenommen hat; der vorher ganz hellgraue Kopf ist dunkler geworden, die grünen Nacken-, Hals- und Brustfedern noch leuchtender, das herrliche Gelb der Unterseite intensiver, an den Brustseiten etwas ins Orangerote übergehend. Die Oberseite ist, namentlich in der Sonne besehen, wie von einem leichten Bronzeglanz überhaucht. Mohrchen kann sich auf jeder Schönheitskonkurrenz sehen lassen. Das erste Wort, mit dem er uns

überraschte, war der Name unseres Enkelchens; eines Tages rief er ganz deutlich: „Inge“ und seitdem läßt er diesen Namen in allen Tonarten hören, lautrufend und leise, ernst und streng, zärtlich und liebevoll, auch „Ingele“ und „Ingelchen“ oder „Ingelchen, geh da her.“ Sehr drollig hört es sich an, wenn er sich plötzlich mit einem „verständnisinnigen“ lauten „Ja“ oder mehrfachen „jajajaah“ ins Gespräch mischt oder einem an ihm Vorübergehenden zuruft: „Komm her — komm mal her!“ Er nennt auch seinen eigenen Namen „Mohrchen“, sagt beim Anblick von Brot oder Kuchen (auch mal zu Obst, Wurst oder Käse) „Mohrchen Brot“ — und versichert uns, „wie gut — ah, wie gut“ es ihm schmeckt. Morgens beim Abdecken des über Nacht verhängten Käfigs spricht er fein artig „guten Morgen“ und abends beim Zudecken „gute Nacht, Mohrchen geht schlafen“, jedoch letzteres noch undeutlich und oft nur halb. Auch läßt er sonst noch ein paar Worte und zwei Sätze hören, vorläufig aber noch recht undeutlich.

Alles in allem: unser Mohrenkopf ist ein Prachtkerlchen, das uns viel Freude macht, und wenn ihn auch seine Verbrechernatur zu manchen kleinen Schandtaten anspornt, wie Durchbrennen, Stehlen, Möbel und Gardinen benagen, so darf ich mich doch angesichts all seiner hier geschilderten Tugenden und Vorzüge guten Gewissens dem wohlwollenden Urteil über den Mohrenkopf durch Herrn Dr. Luig und viele andere anschließen und jedem, der einen gemütlichen, intelligenten und unterhaltenden Vogel zum Hausgenossen wünscht, zur Anschaffung solch eines kecken kleinen Spaßmachers raten. Hoffentlich wird er auch bald wieder billiger werden, zurzeit ist sein Preis leider dreimal so hoch als in Friedenszeiten.

Der Bluthänfling.

Von Karl Finck, Neukölln.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der Heimweg führte durch Getreidefelder. Nichts sah man als die Weite der Luft, die große Bläue, unendliche Moore, harzige Föhrenbestände und sandiges, verträumtes Ödland.

Vorsichtig schob sich aus dem Buschwerk ein Fuchs, eine abgearbeitete Fähe und schnürte weiter. Ihren Bau kannte ich schon geraume Zeit; er lag drüben in der wüchsigen Besamung, neben dem Brandstreifen. Schon der ekelhafte Fäulnisgeruch wurde zum Verräter.

Die Umgebung war die reine Richtstätte. Erst gestern beobachtete ich die Füchslein, wie sie in den sonnendurchglühten Mittagsstunden vor der Hauptröhre spielten. Sonntag kommen Jagdgäste, und da soll das Gehecke ausgegraben werden. Mögen den wolligen Schelmen wenigstens unnötige Qualen erspart bleiben! Alle Vorsichtsmaßregeln und die heiße Mutterliebe waren erfolglos gewesen.

Verkrüppelte Eichen, Zitterpappelgebüsch, Weißdorn, Wildrosen, selbst ausgesäte Kiefern, vielfach mit Hopfen, Zaunrebe und Winde verwebt, bildeten horstweise Vorhölzer. Wieder krähten Hänflinge. Pfeilschnell stieß plötzlich ein Sperber nach mehreren Hähnen. Auch das Weibchen des frechen Räubers wurde sichtbar. Aufmerksam gemacht, suchte ich nach und fand bald drei Nester mit toten und halbtoten Jungen.

Verwaiste Nestlinge werden, wenn das ängstliche Schreien keine Feinde anlockt, bald schlaff, dann kommt die Ordnungspolizei des Waldes: die rote Ameise, beendet schnell alle Leiden und verwertet das Fleisch.

Amsel füttert die Jungen. Aufnahme von G. Wolff-Schörmar.

Am Sonntag nach dem Fuchsgraben stöberte ich mit dem Revierbeamten den ganzen Umkreis ab. Schließlich erspähten wir auf einer alten Heidekiefer auch den Horst und konnten das Pärchen wegschießen. Unter dem Baume lagen viele Köpfe von Hänflingen, Buchfinken, Staren, Lerchen und sonstigen Vögeln.

In der Ackerflur nistete auf einer einsam stehenden Pappel ebenfalls ein Sperberpaar. Auf meinen besonderen Wunsch wurden die Tiere geschont, weil sie vornehmlich Feldsperlinge schlugen, die während der Milchreife unsere Gerstenschläge unverschämt plünderten. Nebenbei zählten zu den Opfern der unersättlichen Raubögel auch einige Grünhänflinge, Buchfinken, Goldammern und Lerchen. Um aber jede übermäßige Vermehrung des Sperbers zu verhindern, ließ ich von einem Dorfknaben die halbflüggen Jungen ausnehmen.

Krähen, Elster, namentlich der Eichelhäher, zerstören ebenfalls viele Gelege des Hänflings, seltener wohl der rotrückige Würger, vielleicht nur strichweise, jedenfalls stehen mir keine auffallenden Beobachtungen zur Seite, obwohl ich im nieder-österreichischen Waldviertel geschlossene Fichtenschonungen

kannte, wo sich geradezu unglaublich viele Rot-hänflingsnester befanden. Die Brut kam beinahe immer hoch, obwohl in den Dornen- und Brombeergestrüppen, den Kulturrändern zahlreiche Würger nisteten.

Die noch niedrigen Pflanzungen und Kahlschläge zeigten aber einen überaus üppigen Pflanzenwuchs und beherbergten infolgedessen viele Insektenarten. Geeignete Kerfe liebt nun einmal der Würger über alles.

In den sonnigen Schlägen überzog das rötliche Schwielengras ganze Flächen, blühten purpurne Weidenröschen, strahlten die Goldsterne der Feigwurz, vereinte sich das gelbe Johanniskraut zu Büscheln, bildeten Margueriten und die verschiedensten Kleearten eine bunte, wohlriechende Blumenwildnis.

Im August, wenn die Winde über die Stoppelfelder streichen, zieht der Nachwuchs des Hänflings mit den Alten unruhig umher, suchen Mohnfelder, Gemüse- und Hackfruchtkulturen auf, erscheinen nicht selten in Gärten, durchstöbern mit Vorliebe Ödflächen, wo bereits allerlei Gesäme die Halbreife erlangt haben.

Der Bluthänfling brütet im Jahre zwei- bis dreimal.

Hell und windig waren meistens die Tage zwischen Sommer und Herbst. Wochen kamen, so warm und schön, als wollten sie alles vergangene Glück wieder zurückrufen. In breiten Wellen floß das goldene Sonnenlicht herab. Die Heide glühte, feierte erst jetzt ihre Auferstehung.

Auf den umgepflügten Ackerbreiten lasen Hänflinge emsig Futter auf, flogen dann nach den gilbenden Kartoffeläckern, wo Mistmelde, Knöterich, Hederich, Kornblumen und andere Unkräuter reiften. Weithin klang das helle Krähen.

Aber in den sonnigen Mittagstunden tönte noch der fröhliche Gesang; besonders fleißig übten die jungen Hähne, um bald in der edlen Kunst Meisterschaft zu erlangen.

Naß, unfreundlich war der Spätherbst. Ende Dezember setzte heftiges Schneetreiben ein. Brausend fegten eisige Stürme über die unendliche, hemmungslose Ebene. Eines Abends kämpfte ich mich von dem Katendorfe nach der Försterei durch. In einer Vertiefung suchten Hänflingschwärme Schutz, klammerten sich die erschöpften Vögelchen verzweiflungsvoll an den rauhrindigen Kopfweiden fest. Am andern Tage lagen viele der herzigen Sänger tot umher, trotzdem schien wieder die Sonne, verklärte mit ihrem Lichte die flirrende, weißschimmernde Welt.

Wie im Menschenleben bloß schweres Leid und harte Schicksalschläge die Sehnsucht nach der Tiefe weckt, verhindert in der freien Natur nur der erbarmungslose Kampf um's Dasein Entartungen, fördert den Fortschritt, bringt eine Annäherung zu den unendlich fernen, weit gesteckten Zielen.

Der Hänfling beginnt schon im Vorfrühling mit seinem Gesang.

Grau färbte sich der Schnee und auf den Wegen entstandeu schmutzige Bäche und Pfützen.

An einem Sonntag Nachmittag suchte ich meine liebe Jagdhütte auf. In den Schonungen sangen Hänflinge, schon ganz frühlingsmäßig; sie wurden zeitweise von Erlzeisigscharen übertönt, welche noch immer hier weilten.

Früh setzte die Dämmerung ein, verwischte mit breiten Strichen alle Farbenabstufungen, warf da lange Schlagschatten und füllte die Gräben mit Dunkelheit aus.

Zart flötete im Bestand eine Amsel ihr erstes Lenzlied. Dann durchschnitt eigenartiges Pfeifen die naßkalte Luft. Die Vögel mit dem langen Gesicht begannen zu balzen; ein Schnepfenkonzert brach an, wie ich es selten wieder hörte.

Häßliche Nebel stiegen hoch, ballten sich zusammen und wogten durcheinander. In kurzen Zwischenzeiten fielen quakend starke Entenflüge ein, strichen geisterhaft dahin. Drüben, auf den überschwemmten Wiesen, flogen Scharen von Gänsen mit tollem Geschrei auf. Überall ging es laut her.

Tiefschwarze Wolkenwände schoben sich vor, Regen und Klatschschnee strömten herab, der brausende Tauwind zerwühlte die Wipfel der schlanken Kiefern. Wotans wilde, verwegene Jagd ritt durch den Wald, über Heide und Moor.

Einzelne Sterne blitzten durch die Wolkenfetzen. Zwei Eulen schwebten unhörbar umher, hakten auf, und nun machte der Kauz der dickköpfigen, etwas größeren Käuzin auf der knorrigen Eiche seine Liebeserklärung, bellte, kicherte, jauchzte, trillerte und wimmerte steinerweichend. Nicht lange, so meldeten sich Rivalen, kamen näher, heulten ebenfalls; es war beinahe als hätten die bösen Geister der Unterwelt eine Zusammenkunft veranstaltet.

Ich saß in der Erdhütte, sah in die Dunkelheit hinaus und lauschte den Stimmen der stürmischen Vorfrühlingsnacht.

Solche Weihestunden in verlassener Einsamkeit, weit von dem Getriebe der Menschen waren und sind mir heute noch am liebsten.

Nach Beendigung meines Berichtes zogen wir erwärmt, gut ausgeruht, die getrockneten Mäntel an. Im Westen umgaben zart rosa gefärbte Wolken die untergehende Sonne. Über den Mooren webten bläuliche Dünste. Ganz ferne verschwammen schon die Umrisse der Wälder und Gehölzgruppen. Nicht weit von der Jagdhütte lockten Feldhühner, rief eine Wiesenralle. Schon verträumt trillerten am Boden noch Lerchen. Die Hänflinge beendeten soeben ihre Abendunterhaltung; selig, feurig schlugen im Bestande mehrere Drosseln, dazwischen mischte sich der Minnegesang vieler Rotbrüstchen. Bekassinen gaukelten im Fledermausfluge vorüber. (Schluß folgt.)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Von indischen Vögeln, die Fockelmann einführte, sind noch einige Häherlinge zu besprechen. Den auf S. 233 abgebildeten

Borstenhäherling — Trochalopterum lineatum (*Vig.*)

nennt Hume den neben dem Sperling vertrautesten Vogel in der Nähe menschlicher Wohnstätten. Er lebt in seinem Verbreitungsgebiet, Himalajaländer

von Kaschmir bis Nepal, in Höhen von 1250 bis 2000 m. Man sieht sie paarweise, zu gewissen Zeiten in Familien, von 4—5 Vögeln umherstreifen und wie Hutton berichtet, zeitweise so häufig, daß fast jedes Gebüsch von ihnen belebt wird, dabei hört man ihre tiefe etwas rätschende Stimme. Das Nest steht immer im dichten Gebüsch oder im unteren, dichten Geäst eines Baumes, besonders gern in der Himalajazeder, etwa 1—2 m über dem Boden. Es ist stets gut versteckt oder wenigstens schwer zu erkennen, weil er im Geäst einen ziemlich umfangreichen, lockeren Bau aufschichtet, der nur schwer als Nest zu erkennen ist. Das Nest ist tief napfförmig aus trockenem Gras, Pflanzenstengeln, oft mit Bast von Faserpflanzen und vielen trockenen Blättern vermengt, die hauptsächlich im Nestboden in großer Menge zu finden sind. Im Innern finden sich feinere Grasblätter und auch zarte Würzelchen. Auch bei Wahl des Nistplatzes kommt seine Vertrautheit mit dem Menschen zur Geltung, denn nicht selten wählt er als Nistplatz Bäume, welche an stark besuchten Straßen stehen oder Gebüsche in Gärten dicht bei Häusern. Das Gelege besteht aus 3 (selten 4) Eiern von hell grünlichblauer Färbung. Die Schale hat nur matten Glanz (21—28×17,5—20 mm). Die Brutzeit beginnt meist im April und endigt etwa im September.

Gefiederbeschreibung: ♂ Federn am Oberkopf Hinterhals, Oberrücken aschgrau mit rostbräunlicher Federmitte und schwarzen Schäften; Rückenmitte rotbraun, Federspitzen aschgrau, Schäfte weißlich; Bürzel, Oberschwanzdecken aschgrau, olivverwaschen; Zügel, Federn vor und über dem Auge weißlich mit rotbrauner Spitze; Ohrdecken braunrot; Wangen, Federn der Bauchseiten bis zum Bauch braunrot mit grauen undeutlichen oder schmalen Säumen und glänzend weißen Schäften; übrige Unterseite olivengraubraun; Bauchmitte, Schenkel rotbraun; Flügeldecken wie Rücken mit weißen, die großen mit rotbraunen Schaftstrichen; Schwingen braun, nach den Spitzen zu grauer mit rotbraunen Außenfahnen; Unterflügeldecken dunkelrotbraun; Schwanzfedern olivbraun mit verschieden breiter schwarzer Binde vor den aschgrauen Spitzen; mittlere grau mit dunklen Querbändern, unter bestimmtem Licht sichtbar, graue Spitze undeutlich; Auge rotbraun bis braun; Schnabel hornbraun, Unterschnabel heller; Füße hellhornbraun; Lg. 187, Fl. 74—77, Schw. 90—95, Schn. 18,5—20, Lf. 25 bis 27 mm. ♀ wie ♂; ob Vögel mit schmalen schwarzen Schwanzbändern ♀♀, die andern ♂♂ sind, bedarf der Feststellung.

Der Borstenhäherling gelangte zuerst im Jahre 1905 zu uns. Ab und zu war ein vereinzeltes Stück im Handel. Das eigenartige, starke und kraftvolle Wesen der Häherlinge hat für jeden Vogelfreund etwas ungemein anziehendes. Vielen sind sie gar zu stürmisch und unruhig. Obgleich sie im Wesen sich doch wenig von dem Sonnenvogel unterscheiden. Es ist wohl besonders die Größe der Häherlinge, welche ihre Lebhaftigkeit und Unruhe störend erscheinen läßt, dieselben Eigenschaften, welche man am Sonnenvogel schätzt. Bei dem kleinen Borstenhäherling tritt diese Eigenart keineswegs störend hervor. Anscheinend ist er, seiner natürlichen Zuneigung zum Menschen entsprechend, auch leichter zähmbar als seine größeren Verwandten. Ein Sangeskünstler scheint er allerdings nicht zu sein. Braun vernahm von ihm nur „ein mäuseartiges Piepen und ein silberhelles klirrendes Wettern". Ob das aber alles ist, was er kann, möge dahingestellt bleiben. Jedenfalls ist es ein schöner munterer Vogel, der dem Pfleger, der ihm einen geräumigen Käfig anweisen kann, sicher Gelegenheit zu mancherlei Beobachtungen bietet. Ein Drosselfutter mit Beigabe von Fleisch und viel Insekten genügt seinen Ansprüchen.

Durch den sichelartig gekrümmten, seitlich zusammengedrückten Schnabel, die haarartig verlängerten Kinnfedern und die längeren Läufe unterscheiden sich die lärmenden „Sichelschnabeltimalien" — Pomatorhinus *Horsf.* hauptsächlich von den Häherlingen. Eine gleichfalls bisher sehr selten eingeführte Art befand sich unter den Vögeln, welche Aug. Fockelmann zu Beginn des Jahres aus Indien einführte, der auf S. 234 abgebildete

Maskenwürger.

Rotwangensäbler — P. erythrogenys (*Vig.*),

welcher das nordwestliche Himalajagebiet in Höhen bis zu 3000 m bewohnt, während er in tieferen Lagen etwa bis 1500 m nistet. Unstet wandern sie paarweise umher, stets laut schwätzend und rufend und die Rufe anderer Artgenossen beantwortend. Aufgestört hüpfen sie in langen Sprüngen dicht über den Boden

dahin, so schnell, daß Hutton in einem fliehenden Rotwangensäbler eine Ratte zu sehen glaubte.

Das Nest steht gewöhnlich am Boden oder an Abhängen. Es gleicht einem großen überwölbten Klumpen von allerlei Genist. Selten steht es in einem dichten Busch, etwa 0,5—0,75 m über dem Boden. Es ist lose gebaut aus Nistmaterial wie es an der Örtlichkeit gerade vorhanden ist. Häufig werden trockene Blätter von Farnkraut, trockenes Gras, Moos, Mooswurzeln verwendet. Es ist meist gut gewölbt mit weitem seitlichen Eingang in der oberen Hälfte, aber da, wo es unter Farnkraut oder überhängendem Gras angelegt wird, ist es nur eine einfache flache Mulde. Eine innere Auspolsterung ist in der Regel nicht vorhanden. Hume fand die Nester stets in offenem Gelände, welches unmittelbar an bewaldete oder mit dichtem Unterholz bedeckte Abhänge grenzt, in welchen diese Vögel Nahrung und Schutz bei Verfolgungen finden. Beim Suchen der Nahrung kommt ihnen der gekrümmte Schnabel gut zustatten. Sie scheinen ausschließlich Kerfe zu verzehren, die sich am Boden und im trockenen Laub aufhalten. Im dichten Gewirr des Unterholzes der Farn und gebrochenen Äste flattern sie gewandt umher, beständig beobachtend und emsig die am Boden liegenden Blätter umwendend auf der Suche nach Kerfen, die sie nach Art der Widerhopfe aufnehmen sollen. Die Brutzeit fällt in die Monate April bis Juni. Das Gelege besteht aus 3 weißen Eiern (28 × 20 mm).

Gefiederbeschreibung: ♂♀ oberseits olivbraun, leicht grau überhaucht. Stirn, Kopfseiten rostfarben, auf dem Zügel ein weißer Fleck; Bartstreif dunkelgrau; Vorderhals, Mitte der Unterseite weiß; Federn der unteren Kehle häufig mit grauer Spitze; Hals-, Körperseiten, Unterschwanzdecken, Schenkel rostfarben; Flügel dunkler braun, Armschwingen mit der Farbe des Rückens gesäumt; Schwanz wie Rücken; Auge weiß, gelblich- oder grünlichweiß; Schnabel hellgelblich hornfarben, oben am Grunde dunkler; Füße bräunlich fleischfarben; Lg. 220, Fl. 98—101, Schw. 100—105, Schn. 35—36, Lf. 36 mm. Jugendkleid: rötlichbraun, Kehle weiß.

Der Rotwangensäbler ist wohl ein selten eingeführter Vogel, aber er ist unter den bisher eingeführten Arten der häufigste. In seinem Benehmen in der Gefangenschaft gleicht er den Häherlingen, kann aber wohl mit gleichgroßen oder größeren Vögeln in einem Flugraum gehalten werden, während er kleineren Vögeln wohl gefährlich werden könnte, da er dazu neigt, sie zu verfolgen und ihnen Schnabelhiebe zu versetzen. In der Ernährung sind sie anspruchslos. Da sie in der Freiheit anscheinend nur von Insekten leben, muß ihnen überwiegend animalisches Futter gereicht werden: Ein Himalajasäbler im Vogelhaus des Berliner Zoolog. Gartens verzehrt allerdings auch Obst. (Fortsetzung folgt.)

Rotschwänze — Phoenicurus *(Forst.)*.

Eine Monographie von John Kuntzendorff.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der schwarzkehlige Sternrotschwanz — Erithacus schisticeps nigrigularis *(Moore)*.

Der schwarzkehlige Sternrotschwanz ist seinem vorgenannten Verwandten völlig gleich und unterscheidet sich von ihm nur durch das Fehlen des weißen Kehlflecks, so daß bei ihm der ganze Unterhals bis zur goldig kastanienrotbraunen Färbung des Unterkörpers gänzlich schwarz ist. Da jedoch die Ausdehnung des Kehlflecks bei schisticeps eine sehr wandelbare ist und nach Hartert sogar bisweilen fehlen soll, so liegt die Vermutung nahe, daß es sich bei E. sch. nigrigularis um eine sternlose Phase des Sternrotschwanzes handeln könnte, ähnlich wie beim Blaukehlchen, bei welchem eine derartige Phase bekanntlich vorkommt. Das ♀ nigrigularis gleicht dem des schisticeps, desgleichen auch die Eier.

Das Verbreitungsgebiet ebenso wie die Lebensweise und die Brutorte sind dieselben wie bei E. schisticeps. Jerdon führt sein Vorkommen in Nepal an.



Teichrohrsänger zum Nest gehend. Aufnahme von G. Wolff-Schötmar.

Der Formenkreis Erithacus frontalis

reiht sich an die vorhergehenden als letzter an und als einzige Form aus dem südlichen Hochasien ist zu nennen der

Blaurotschwanz — Erithacus frontalis *(Vig.)*.

Die Färbung des Gefieders dieses Vogels ist sehr variabel, doch scheint das hellere wie dunklere Federkleid auf Jahreszeit und Alter zu beruhen, so daß, da Gansu- und Himalajavögel keinen Unterschied in Größe und Färbung aufweisen, eine Trennung nicht am Platze ist (Kleinschmidt).

♂ ad. Stirn, kurzer Augenbrauenstreif kobaldblau, Oberkopf, Kopfseiten, Hals, Rücken, Schulterfedern, Flügeldecken schwärzlichblau, im frischen Gefieder mit bräunlichen Spitzensäumen der Federn, Kehle lebhafter gefärbt; Bürzel, Oberschwanzdecken sowie die übrige Unterseite leuchtend bräunlich rostfarben; Unterflügeldecken blaßgelb; Schwingen schwarzbraun, Armschwingen breit rostbraun, Handschwingen schmal aschgrau gesäumt; Schwanzfedern bräunlich

rostfarben, außer dem mittelsten Paar, das äußerste Paar breit, etwa $1^1/_2$ cm schwarz gespitzt und etwa bis zur Hälfte der Außenfahne schwarz, die übrigen nur breit schwarz gespitzt und das mittelste Paar schwarz, an der Außenfahne etwa zwei Drittel von der Wurzel aus mit bräunlich rostfarbenen Säumen, schmal beginnend und zur Wurzel hin sich immer mehr verbreiternd, so daß an dieser die Außenfahne ganz bräunlich rostfarben gefärbt ist, an der Innenfahne am Wurzelteil ein etwa 1 cm großer bräunlich rostfarbener Fleck; Schenkel bräunlich schieferartig; Schnabel und Füße schwarz. ♀ ad. Oberseits dunkelbraun; Bürzel, Ober- und Unterschwanzdecken bräunlich rostfarben, jedoch matter; unterseits heller und gelblicher braun, Mitte des Unterkörpers fahl rostgelb; die mittelsten Schwanzfedern bis zur Basis schwarz. Hartert gibt folgende Maße an: Fl. 85 bis 90, Schw. 68—74, Lf. 21—23 mm.

Die Heimat des Blaurotschwanzes ist der Himalaja von Kaschmir bis China, Westchina, die Tsing-ling-Berge und das südwestliche Kansu und das Khasia-Hügelland. In Darjeeling ist er als Wintervogel gemein. Im Hochgebirge geht er bis zu einer Höhe von über 4000 m, er ist aber auch in Höhenlagen von 1400 m anzutreffen. Zur Winterszeit wandert er in die unteren Regionen des Gebirges und in das Hügelland südlich des Bramaputra. Er bewohnt offene Waldteile und lichte Gegenden und ist ein ziemlich scheuer Vogel, der aufgescheucht, sofort ins lichte Unterholz flüchtet. Die Eier haben die typische Form der Rotschwanzeier und sind auf grünlich-blauem Grunde bald deutlich, bald weniger deutlich blaß rostrot gefleckt oder sie sind einfarbig blaßblau. Es sollen aber auch nach Kleinschmidt rötliche Eier vorkommen.

Es ist sehr zu bedauern, daß diese farbenprächtigen, schönen und sicher auch in Vogelstuben und Volieren höchst interessanten Gebirgsrotschwänze noch nicht bei uns eingeführt worden sind, würde man doch auf diese Weise viel Wertvolles über ihr Wesen, wie über die von ihnen bevorzugten Örtlichkeiten und über manches andere noch mancherlei Aufklärung erhalten.

Der Formenkreis Erithacus grandis.

In den zu diesem Formenkreis gehörenden Rotschwänzen haben wir Vögel vor uns, die nicht nur durch ihre bedeutendere Größe, sondern auch durch ihre Färbung, resp. durch ihre Farbenverteilung von den übrigen Formen stark unterscheiden. Bezeichnend sind für sie der reinweiße, von der schwarzen Färbung scharf abstechende Oberkopf, der gleichfalls von den schwarzen Flügeln scharf abgegrenzte reinweiße Flügelspiegel, der, wie bei E. auroreus durchgehend, also ebenso auch auf der Unterseite des Flügels wahrnehmbar ist, der schwarze Unterflügel und die im Alter beinahe verschwindende Zeichnung des Schwanzes. Der Formenkreis Erithacus grandis zerfällt in zwei Formen, einer östlichen, E. gr. erythrogaster, und einer westlichen, E. gr. grandis, die, wenig voneinander unterschiedlich, nur andere Farbennuancierung, verschieden großen Flügelspiegel und hellere, resp. dunklere ♀♀ aufweisen. Die Gefiederfärbung jeder Form zeigt deutliche Variationen. Verglichen mit den anderen Rotschwänzen könnte man die ♀♀ als überaus vergrößerte ♀♀ des E. titys und die ♂♂ infolge gewisser Farben- und Farbverteilungsähnlichkeiten, jedoch in satterem und tieferem Farbton, als überaus vergrößerte ♂♂ des E. auroreus ansprechen.

Der kaukasische Riesenrotschwanz — Erithacus grandis erythrogaster *(Gould.)*.

Ein prächtig gefärbter Vogel, der durch seine Farbenkontraste, schwarz, weiß, rot, angenehm auffällt, ist der kaukasische Riesenrotschwanz. ♂ ad. Seidenweiß ist der Oberkopf und Hinterhals, im frischen Gefieder mit grauen Federspitzen; schmales Stirnband, Zügel, Kopf- und Halsseiten, Rücken, oberer Teil des Bürzels, Oberflügeldecken, Kinn, Kehle, Kropf tief schwarz, oberseits tiefer als unterseits, an Kinn, Kehle mit schwachem, schieferartigem Schimmer;

Zaunkönig mit Futter vor der Nisthöhle.
Aufnahme von G. Wolff-Schötmar.

unterer Teil des Bürzels, Oberschwanzdecken, Brust, Bauch, Unterschwanzdecken lebhaft kastanienbraun; Schwingen schwarz, Handschwingen an der Basis etwa ein Viertel, Armschwingen etwa drei Viertel weiß, einen großen Flügelspiegel bildend; Schwanzfedern rötlich kastanienbraun, mittelstes Paar schwach dunkler braun, übrige Federn an der Spitze undeutlich dunkelbraun; — diese Endzeichnung der Schwanzfedern variiert in der Färbung und fehlt zuweilen auch gänzlich, was besonders bei den alten Vögeln der Fall ist — Schenkel mattschwarz; Auge braun, Schnabel und Füße schwarz. ♀ ad. Oberseite bräunlich olivgrau, etwas heller als das ♀ titys; Unterseite heller und schwach rötlichbraun verwaschen, zuweilen mit roten Flecken (hahnenfiedrig); Oberschwanzdecken kastanienbraun, Unterschwanzdecken gelblich rostbraun; Schwanzfedern gelblich rostbraun bis rostbraun, nur mit dunkler Endbinde; Flügel graubraun und ohne Spiegel. Im Jugendgefieder hat das junge ♂ am Oberkopf die Federn deutlicher grau, — besonders im Herbstgefieder — der Unterflügel ist nicht so rein schwarz, die großen Flügel-

und Handdecken sehr fein weißlich gesäumt und die mittelsten Schwanzfedern dunkler gefärbt. Größenmaße nach Hartert: Fl. 101—106, einmal 107, Schw. 72—76, Lf. 26 mm; nach Kleinschmidt: Fl. ♂ 103—107, ♀ 95—100, juv. ♂ 99—105 mm.

Das Verbreitungsgebiet des Erithacus grandis erythrogaster ist das Kaukasusgebiet und Transkaspien. Er lebt an den Ufern reißender Gebirgsbäche und bevorzugt hier hauptsächlich mit Steinen durchsetzte sandige Stellen und wandert, hauptsächlich die jungen Vögel, sobald der Winter herannaht, südwärts und in tiefere Regionen. Oberhalb der Poststation Kasbeck im Terektal ist er in größeren Mengen angetroffen worden. Auch jenseits der Waldzone wurde der kaukasische Riesenrotschwanz festgestellt; in Darasun ist er gleichfalls beobachtet worden. Er ist ein äußerst lebhafter und unruhiger Vogel, jedoch nicht scheu oder furchtsam. Bemerkenswert ist, daß er mit seinem Schwanze die zitternden Bewegungen noch in erhöhterem Maße vollführt, und das dann, wenn er auf freistehenden Zweigen niederer Büsche sitzend nach Beute ausspäht. Sein Nest baut er zwischen den Zweigen der Gebüsche oder Bäume. Die Eier werden als einfarbig blaugrün angegeben. (Fortsetzung folgt.)

Liebhaberei und exakte Forschung.

Von Dr. Wagner, Bad Salzbrunn.

(Nachdruck verboten.)

Die „Ges. Welt" ist in der günstigen Lage, nicht nur eine große Zahl von vortrefflichen Praktikern zu ihren Mitarbeitern zu zählen, sondern auch eine ganze Reihe von wissenschaftlich geschulten Liebhabern zur Seite zu haben. Ich erinnere an die Arbeiten von Adlersparre-Stockholm und Lauer-Witzenhausen auf dem Gebiete der Physiologie und Biologie, von Braun-Danzig auf dem der Psychologie, von Duncker-Bremen und Braune Kl.-Zschachwitz, auf dem der Vererbungslehre, von Krabbe-Anklam auf dem der Systematik. Wissenschaft und Praxis sollen sich gegenseitig befruchten, das gilt auch für die Vogelhaltung. In welcher Weise, zeigt uns einerseits, um ein Beispiel herauszugreifen, die ausgezeichnete Arbeit von Adlersparre über Vitamine, die für die Fütterung der Weichfresser von größter Bedeutung ist, und andererseits die Tatsache, daß die Liebhaberei die Kenntnis der Jugendstadien vieler ausländischer Vögel, ich erinnere an die Leuchtpapillen der Gouldamadinen-Nestlinge, der Wissenschaft erst übermittelt hat. Am wichtigsten für die Liebhaberei werden immer die ernährungsphysiologischen Fragen bleiben, und gerade auf diesem Gebiete ist noch viel wissenschaftliche Kleinarbeit zu leisten. Anregungen zu solchen Arbeiten findet man in älteren und neueren Jahrgängen der „Ges. Welt" in Menge, sei es, daß es gilt, frühere Beobachtungen zu bestätigen oder bekannte Tatsachen in einem neuen Lichte erscheinen zu lassen, sei es, daß alte Irrtümer aufzuklären sind. Als Beispiel derartiger Untersuchungen will ich im nachstehenden über einige von mir angestellte Beobachtungen berichten.

1. In Nr. 42 Jahrgang 1924 der „Ges. Welt" S. 335 berichtet ein angesehener Liebhaber über die von ihm geübte Fütterung ausländischer Körnerfresser. In der wertvollen, so recht für den Praktiker geschriebenen Arbeit sagt er über das Aufquellen von Hirse: Wir quellen mit Wasser so lange, daß die Keime durchzubrechen beginnen, werfen die nasse Hirse in Sandgefäße, ohne sie abzutrocknen, denn „viel vom entwickelten Zucker geht durch das Trocknen verloren". Es schien mir von Wichtigkeit, festzustellen, wieviel Zucker unter ungünstigen Umständen beim Quellen und Trocknen verlorengehen kann und ich beschloß, darüber eine Untersuchung anzustellen in ähnlicher Weise, wie ich das früher über das Aufquellen der Ameisenpuppen getan habe. („Ges. Welt" 1921 S. 52.) Wenn ein stärkemehlhaltiges Samenkorn, z. B. ein Getreidekorn, eine genügende Menge Wasser aufgenommen hat, so beginnt der Keimling zu wachsen. Alsbald entsteht ein diastatisches Ferment, das von dem am Keimblatte anliegenden Schildchen in den Mehlkörper hinüberwandert und die Stärkekörner zu lösen und zu verzuckern beginnt, soweit sie als Nährstoff von dem wachsenden Keimling verbraucht werden. Das wasserunlösliche Kohlenhydrat „Stärke" ist als solches für die Ernährung des jungen Pflänzchens ungeeignet, es muß vielmehr erst in das wasserlösliche Kohlenhydrat „Zucker" verwandelt werden. Von dieser Eigenschaft des Getreidekorns, besonders der Gerste, macht man ja bei der Malzbereitung den weitgehendsten Gebrauch. Hierbei tötet man den Keimling, der allmählich die gesamte Stärke verzehren würde, nach einigen Tagen ab, ohne daß die Diastase zerstört wird (Darren). Der Verzuckerungsprozeß geht dann weiter, der Zucker aber bleibt im Malz erhalten. Aus dem Gesagten geht hervor, daß die Möglichkeit des Verlustes von Zucker beim Einquellen des Körnerfutters, in unserm Falle der Hirse, besteht.

Blaumeise verläßt die Nisthöhle. Aufnahme von G. Wolff-Schötmar.

Versuch a. Bei meinen Versuchen ging ich in folgender Weise vor. 50 g Hirse (es handelte sich um eine gelbliche, angeblich rumänische Hirse, die

von den Vögeln sehr gern genommen wird) wurden mit 200 ccm destilliertem Wasser übergossen und 24 Stunden bei Zimmertemperatur sich selbst überlassen. Ich verwendete eine verhältnismäßig sehr große Menge Wasser, um dem gebildeten Zucker ausgiebige Gelegenheit zur Lösung zu geben und um eine greifbare Menge Untersuchungsmaterial zu haben. Hirse und Wasser wurden nach 24 Stunden durch Absaugen auf dem Büchnerschen Trichter mit Hilfe der Wasserstrahlluftpumpe getrennt. Die wässerige Flüssigkeit betrug 180 ccm, 20 ccm waren also von der Hirse aufgenommen worden. Diese 180 ccm Flüssigkeit mußten alles enthalten, was aus den 50 g Hirse ausgelaugt worden war. Ich bestimmte daher in der Flüssigkeit die Gesamtmenge der gelösten Stoffe (Extrakt), die Mineralbestandteile und den Zucker. Die bei der Untersuchung angewandten Methoden waren die gleichen wie sie für die Untersuchung der gleichen Bestandteile des Weins durch die amtliche Anleitung vom 25. Juni 1896 vorgeschrieben sind. Es wurden in 180 ccm gefunden: Gelöste Stoffe (Extrakt 0,3225 g, Mineralbestandteile 0,1256 g, Zucker 0,1080 g. Wie wir sehen, ist die Menge der vom Wasser aus den 50 g Hirse ausgelaugten Stoffe, namentlich die des Zuckers, äußerst gering. Allerdings hatte ich die Hirse auch nur 24 Stunden eingeweicht, nach welcher Zeit von einer Entwicklung des Keimlings äußerlich noch nichts zu sehen war, während der eingangs erwähnte Autor das Einquellen so lange fortsetzt, bis die Keime durchzubrechen beginnen.

Versuch b. Ich setzte daher einen neuen Versuch in der gleichen Weise, wie oben beschrieben, an, nur ließ ich die Hirse 48 Stunden im Wasser. Nach dieser Zeit konnte bei jedem Körnchen ein 0,1 bis 0,3 mm langer Keim beobachtet werden. Ich erhielt wieder 180 ccm wässerigen Auszug aus den 50 g Hirse, dessen Untersuchung folgendes Ergebnis lieferte: Gelöste Stoffe (Extrakt) 0,3895 g, Mineralbestandteile 0,1490 g, Zucker 0,1125 g. Demnach ist auch im zweiten Falle, nachdem die Entwicklung des Keimlings deutlich eingesetzt hatte, ein sehr geringer Verlust an gelösten Stoffen, namentlich an Zucker, zu beobachten. Besonders bemerkenswert ist die geringe Steigerung des Verlustes gegen den ersten Versuch bei nur 24stündigem Einwässern. Aus 50 g Hirse können etwa 25 g Zucker gebildet werden, von denen unter ungünstigen Umständen 0,149 g, also etwa 0,6 % verlorengehen.

Auch der Verlust an Mineralbestandteilen ist nicht groß. In 50 g trockener Hirse habe ich 1,744 g Mineralbestandteile festgestellt. Der Verlust beträgt also in unserm Falle 8,5 %. Diese Mineralbestandteile, die beim Auslaugen in das Wasser übergehen, dürften in erster Reihe der Samenschale entstammen, also für die Ernährung der Vögel ohne Bedeutung sein.

Jedenfalls ergibt sich aus den vorstehenden Versuchen, daß man mit dem Einquellen und Abtrocknen der Hirse nicht allzu große Vorsicht anzuwenden braucht. Will man die angegebenen Verluste aber dennoch verringern, so braucht man nur die halbe Gewichtsmenge Wasser auf einen Teil Hirse zu nehmen, dann ist die Diffussionsmöglichkeit für Zucker und Mineralbestandteile so stark eingeschränkt, daß nennenswerte Substanzverluste überhaupt nicht eintreten können, auch wenn man die eingequellten Körner gründlich abtrocknet. (Schluß folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Zucht vom Feldsperling-Männchen mit einem Haussperling-Albino-Weibchen. Im Anzeigenteil von Nr. 18 der „Gefiederten Welt" las ich, daß der Zoologische von Frankfurt am Main die Züchtung von Feldsperlingen versuchen will. Wie leicht dieselbe unter Umständen ist, und wie ich zu dieser Zucht kam, möchte ich hier kurz berichten. Im Mai 1923 brachte mir ein hiesiger Villenbesitzer einen Albino vom Haussperling, den er am selben Tage in seinem Garten durch Bespritzen mit dem Gartenschlauch gefangen hatte. Es war ein eben ausgeflogener Vogel, der mit geschlossenen Augen und gesträubtem Gefieder dasaß. Da er anscheinend auch noch verstopft war, er bog dauernd den Unterleib nach hinten und wippte mit dem Schwanz, hatte ich wenig Hoffnung, ihn durchzubringen. Ich stopfte ihn nun gewaltsam mit zwei in Speiseöl getauchten Mehlwürmern. Und siehe da, nachdem er sich tüchtig entleert hatte, wurde er munter. Wie ich ihn nun aber mit frischen Ameisenpuppen stopfen wollte, wehrte er diese Aufdringlichkeit energisch ab, er schluckte auch einfach nicht mehr. Als er wohl zwei Stunden gefastet hatte, ging er zu meiner größten Freude an die Ameisenpuppen, die ich ihm in den Käfig gestellt hatte, und sprach ihnen tüchtig zu. Er hatte sich anscheinend den Spruch: „Friß Vogel oder stirb", den ich ihm eindringlichst vorgehalten hatte, zu Herzen genommen. Vom nächsten Tage an bekam er Nachtigallenfutter mit etwas gehacktem Ei und Körnern. Bei diesem Futter gedieh er prächtig und entwickelte sich zu einem schneeweißen, frechen Spatzen. Nach vierzehn Tagen Einzelhaft warf ich ihn in meine 2 × 2 × 3 m große Zimmervoliere, in der er außer einer seit fünf Jahren in meinem Besitz befindlichen Tannenmeise noch ein halbes Dutzend Körnerfresser, eine Heckenbraunelle und einen Baumpieper zur Gesellschaft hatte. Durch Zufall fing ich im Winter in meinem Stall ein Feldsperling-Männchen. Da es ein hübsches, schmuckes Exemplar war, konnte ich es nicht über mich bringen, es fliegen zu lassen. Es wanderte in die Voliere. Im Frühjahr merkte ich, daß sich die beiden Sperlinge gefunden hatten, sie schleppten ungeheuere Mengen Baustoff in einen Nistkasten. Drei Bruten machte das Pärchen im Laufe des Sommers. Von der ersten flogen zwei Junge aus, zwei waren im Alter von sieben Tagen aus dem Nest geworfen, von der zweiten und dritten je fünf. Sie waren ganz grau, fünf hatten vereinzelte weiße Federn. Leider wurden sämtliche Junge, wenn sie acht bis vierzehn Tage selbständig waren, trotz bester Pflege, frische Ameisenpuppen, Eifuttergemisch, Mehlwürmern, gequellten Sämereien, rotleibig. Was ist dagegen zu machen? Bei meinen jungen Zeisigen ging es mir bis jetzt auch immer so. Nachdem mir nun drei Junge gestorben waren, ließ ich die andern, als ich merkte, daß sie zu kränkeln begannen, fliegen. Während ich diese Zeilen schreibe, ist das alte Pärchen wieder fleißig am bauen, was für die Mitbewohner der Voliere gerade nicht sehr angenehm ist. Das Weibchen rupft nämlich, trotzdem es genügend anderen Baustoff hat, den anderen Vögeln ganze Büschel Federn aus. Erwähnen möchte ich noch, daß heute (3. 5.) bei mir vier Girlitzbastarde ausgekommen sind.

K. Rinke.

Praktischer Vogelschutz im Regierungsbezirk Düsseldorf. Aus Düsseldorf geht mir eine Zuschrift folgenden Inhaltes zu: „da hier auch im Winter der Handel mit Vögeln verboten ist, beschlagnahmte die Polizei auf Veranlassung des Tierschutzvereins sämtliche heimischen Vögel bei den Händlern, etwa 30 Stück, meist Körnerfresser. Durch die sachgemäße Behandlung gingen diese Vögel sämtlich ein. Ein Vorstandsmitglied des Tierschutzvereins brauchte mir gegenüber den Tod dieser Tiere als Beweis dafür, daß gefangene Vögel sehr bald eingehen". N.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Beck, Tierimport, Stuttgart: Goldstirnsittiche, Indigofinken, Rotohrbülbül.

Max Kleinert, Berlin NO 18, Strausberger Str. 13, Fernruf Alexander 3313: Graydrossel, langschwänzige Glanzstare, Gelbnackenamazonen, Doppelgelbkopf, Kap-, Stahlfleck-, Senegaltäubchen.

Paul Tzornack, Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189, Fernruf Humboldt 2063: Gelbnacken-, Diadem-, Gelbstirnamazone, Zwergara, Doppelgelbköpfe, Feuerflügel-, Katharina-, Kubasittiche, Massenawachteln, Kaptäubchen, Braunkopfammern.



Herrn A. B., Anklam. Vermutlich ist „Red billied Parrakeet" = „Red vented Parrakeet" — Platycercus haematorrhous *Bp.* 3 Formen des Sperlingspapageies unter den bekannten 18 Formen leben in Mexiko, vielleicht noch mehr. Die drei Arten sind Psittacula cyanopygia *Bp.* aus Westmexiko, P. pallida, *Nelson* aus der nordwestlichen Provinz Mexikos, Sonora und P. insularis *Ridgn.* von den Tres Marias, drei Inseln an der Westküste südlich vom Kalifornischen Meerbusen.

Herrn W. K., Berlin S. Der Nester zerstörende Stieglitz wird am besten aus dem Zuchtungskäfig herausgenommen und in einem anderen dicht neben ersterem stehenden untergebracht. Das Weibchen wird dann ab und zu zu dem Stieglitz gebracht, damit die Begattung erfolgen kann. Nach erfolgter Begattung kommt es zurück in den Zuchtkäfig. Es baut dann allein das Nest, erbrütet die gelegten Eier und füttert die ev. erbrüteten Jungen allein auf.

Herrn K. Sch., Wien. Ob Vegetabilin noch im Handel erhältlich ist, kann ich nicht sagen. Lahmannsches Nährsalzextrakt ist in den meisten Apotheken erhältlich, jedenfalls in der homöopathischen Apotheke von Dr. Schwabe in Leipzig.

Herrn K. M., Hermsdorf b. Prittisch. 1. Hier gezüchtete Wellensittiche sind genau so farbenprächtig wie importierte. Vermutlich handelte es sich um junge Vögel oder um Kreuzungsprodukte mit gelben W. 2. Für den Innenanstrich genügt Weißkalk. 3. Ein Werk, in welchem gerade nur die genannten Vögel abgebildet sind, gibt es nicht. Die Beschreibungen finden Sie in dem Vogelzuchtbuch, farbige Abbildungen auf den Farbentafeln, die einzeln käuflich sind.

Herrn A. J., Dresden-A. Das Rotkehlchen wird gemästet. Es ist zu fett und kann sich bei der Schwere des Körpers nach genossener Mahlzeit nicht auf den Ständern halten. Wenn es neben dem Futtergemisch täglich 3 Würmer bekommt, so genügt das.

Herrn A. C., Berlin. ♀ Rebhuhnastrild ist infolge von Blutarmut eingegangen.

Herrn W. B., Nusse b. Lübschen; Herrn J. K., Berlin; Herrn J. B., Leipzig-Mockau; Herrn K. D., Duisburg: Beiträge dankend erhalten.

Frl. F. L., Oberkirch i. Baden. Sachgemäße Pflege wird allmählich dazu führen, daß der Star das Ausrupfen der Schenkelfedern unterläßt. Neben dem üblichen Futter muß auch Obst gereicht werden. Er muß Gelegenheit zum Baden und reichliche Bewegung, auch zeitweise außerhalb des Käfigs, haben. Ferner ist während des Winters Unterbringung in nicht geheiztem Raum zweckmäßig.

Herrn E. in W. Der Erlaubnisschein entspricht den Bestimmungen des § 3 des Bayerischen Vogelschutzgesetzes. Wenn es im § 3,[3] heißt, daß die Ausnahmebewilligung unter dem „Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs" erteilt ist, so könnte sich diese im Gesetz vorgeschriebene Bedingung doch nur auf die Fangerlaubnis beziehen, nicht auf einen ausdrücklich erlaubten Ankauf von Vögeln. Eine Ankaufserlaubnis kann nicht mehr widerrufen werden, wenn der Ankauf erfolgt ist. Nach § 2 des genannten Gesetzes wird die Ausnahmebewilligung von der Distriktspolizeibehörde erteilt.

Herrn E. Sch., Arnsfelde. Gleichmäßige Wärme (+ 20° C) ist für die Züchtung kleiner Vögel, wie Prachtfinken, am zuträglichsten, sonst tritt leicht Legenot und Tod der Weibchen ein. Wellensittiche, Nymphen und Prachtfinken könnten in den größeren Käfig untergebracht werden. Durch ein Schutzgitter, durch welches die Prachtfinken, nicht die Sittiche, schlüpfen können, wird etwa 1/4 des Käfigs abgeteilt, in welchem die Nistgelegenheiten der Prachtfinken angebracht werden. Im großen Raum befinden sich die Nistkästen der Sittiche. Die Züchtung von kleinen Alexander-, Tovi- und Goldstirnsittichen ist nur möglich, wenn jedem Paar ein größerer Käfig allein überlassen wird. Auch sonst werden sie anderen, besonders kleineren Vögeln, gefährlich. Schopfwachteln werden am besten in einer Voliere im Freien gezüchtet. Sie sind winterhart und wegen ihrer Größe nicht recht für den Käfig geeignet.

Herrn Fr. B., Ludwigslust. Der rote Kardinal wird in einer Zimmerwärme gehalten wie unsere heimischen Vögel, also besonders im Winter nicht in zu hoher Temperatur. Seine Ernährung besteht in Samen (Hafer, Hülsenreis, Hirse, Spitzsamen, Rübsen, Buchweizen, Sonnenblumenkerne, wenig Hanf) in der wärmeren Jahreszeit, Ameisengemisch mit geringen Beigaben von Ei, erweichtem Einbrot und ein bis zwei Mehlwürmern täglich. Dazu stets Obst (Apfel), Beeren, frisches Grün, Zweige mit Knospen. Da der K. sehr zum Fettwerden neigt, muß er einen sehr großen Käfig und stets reichlich Badewasser haben. Vorsichtig füttern. Kann auch in geräumiger Voliere im Freien überwintert werden. Der Gesang ist sehr laut und wird auch Nachts vorgetragen. Er beginnt gewöhnlich damit im Januar und singt bis zur Mauser. Er ist wechselvoll und melodisch und fällt in der Tonstärke allmählich ab, um wieder laut einzusetzen. Zur Züchtung muß das Paar allein gehalten werden. Das Nest wird im Gebüsch auf dichtästigen wagerechten Zweigen eines Nadelholzbaumes frei oder in einem großen Nistkorb erbaut. Als Nistmaterial werden Halme, Fäden, Federn usw. gereicht. Zur Aufzucht werden neben den genannten Futterstoffen reichlich frische Ameisenpuppen, Mehlwürmer, allerlei lebende Insekten, zuweilen auch feingemahlenes, mageres, rohes Fleisch (Herz) gereicht. Junge sind von Beginn einer zweiten Brut zu entfernen. Die Züchtung ist mehrfach gelungen. Sie legen vier bis fünf Eier, manche gewöhnlich zwei. Brüten in der Zeit von Mai bis Ende Juni. Rentabel ist die Züchtung nicht, selbst wenn sie im günstigsten Falle zehn Junge in einem Jahr aufziehen.

Herrn Gg. B., Nassau. Der mexikanische Karmingimpel erhält als Futter Rübsen, Spitzsamen, Hafer, Leinsamen, wenig Hanf, im Herbst und Winter reichlich Beeren (Ebereschen), Obststücke (Apfel), Zweige mit Knospen, Nadelholzschößlinge, Vogelmiere, in der wärmeren Jahreszeit etwas Insektenfressfutter, frische Ameisenpuppen. Dem ♀ fehlt das rote Gefieder, unterseits weißlich mit graubraunen Schaftstrichen. Der Gesang ist kräftig, ein langgezogenes etwas glückendes Pfeifen, etwas eintönig, aber doch angenehm. Man kann diese durchaus friedlichen Vögel mit Wellensittichen zusammenhalten, aber es kann vorkommen, daß die Wellensittiche auch mal den Mitbewohnern die Läufe zerbeißen. Die genannten beginnen spätestens im Februar März mit dem Gesang, häufig auch schon früher.

Herrn A. C., Berlin. Die Tangare ist einer ausgebreiteten Darmentzündung erlegen. Der Nährwert des gekochten Reis ist ein sehr geringer. Die Hinfälligkeit vieler tropischer Vögel, besonders der Weichfutterfresser, hängt damit zusammen, daß sie in ihrer Heimat fast ausschließlich mit geschältem Reis gefüttert wurden.

An die Leser!

Bei der Vollendung des 25. Jahres meiner Schriftleitung sind mir zahlreiche Glückwünsche gewidmet worden. Sie erinnern mich erneut an die Pflicht der Dankbarkeit gegen meine Mitarbeiter und Leser. Ihrem Wohlwollen und ihrer tatkräftigen Unterstützung verdankt „Die Gefiederte Welt" in erster Linie ihre Erfolge und ihre Verbreitung. Mit besonderer Freude erfüllt mich die feste Zuversicht und die von vielen Seiten ausgesprochene freudige Bereitwilligkeit zu fernerer Mitwirkung am Ausbau und Gedeihen der Aufgaben, denen unsere Zeitschrift zu dienen bestimmt ist. Karl Neunzig.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite)

ahrgang 54 21. Mai 1925 Heft 21

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Meine Drosseln. (Aus 50jährigen Erfahrungen.)
Mein Mohrenkopf. Von Max Schneider.
Der Bluthänfling. Von Karl Finck, Neukölln.
Neueinführungen und Seltenheiten. Von K. Neunzig.
Rotschwänze — Phoenicurus *(Forst.)*. Eine Monographie von John Kuntzendorff.
Liebhaberei und exakte Forschung. Von Dr. Wagner, Bad Salzbrunn.
Kleine Mitteilungen - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Ausstellung - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellung.

Der **Verein für Vogelschutz, -pflege und -liebhaberei zu Aue** im Erzgeb. veranstaltet vom 31. Mai bis 3. Juni (Pfingstfeiertage) seine erste öffentliche Ausstellung. Die Einlieferung der zur Ausstellung gelangenden Vögel geschieht bis Sonnabend, den 30. Mai, abends 7 Uhr. Die Aushändigung derselben erfolgt Dienstag (3. Feiertag), nicht vor 6 Uhr abends. Haubenbauer werden zur Ausstellung nicht zugelassen. Wir bitten, dieses zu berücksichtigen. Liebhaber, die nicht Mitglied eines Vereins sind, werden als Aussteller nicht zugelassen. Ferner ersuchen wir sämtliche Brudervereine des Bezirks, unsere Veranstaltung zu unterstützen. Die Ausstellungs-Kommission: Walter Werner, 1. Vorsitzender, Aue, Druidenstr. 23 I.

Aus den Verbänden.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Grotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhaberverins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen. J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Joo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Vereinsl.: Karl Röhr, Heiligerweg 28. Versammlung jeden 2. u. 4. Sonntag im Monat, nachmittags 5 Uhr. Liebhaber herzlich willkommen. J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung Freitags, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Blasewitzer Hof". Liebhaber willk. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Rietschelhof", Rietschelstr. 19. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinslokal „Parkhotel", Epinaystr. 1, Versammlung. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an. Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 2. Juni. A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber. Nächste Veranstaltungen: Donnerstag, den 28. Mai: Vereinsabend im Landesheim, 8¼ Uhr, Vortrag Dr. Neuwerth: „Mohrrüben-Fütterung". Donnerstag, den 18. Juni: Vereinsabend im Landesheim, 8¼ Uhr, Vortrag Böneker: „Australische Körnerfresser". Donnerstag, den 9. Juli: Vereinsabend im Landesheim, 8¼ Uhr, Vortrag Klocke: „Mimikry". Alle Mitglieder werden herzlich gebeten, möglichst an allen Veranstaltungen teilzunehmen.

Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber. 51. Mitgliederversammlung am 19. März 1925. Anwesend waren 29 Personen. Neu aufgenommen wurden: Nr. 154 Kirchhoff, C., Aquarienhändler; Nr. 155 Klußmann, W., Weinhändler; Nr. 156 Mackowsky, Maria Therese. Nach Erledigung der üblichen Eingänge wird mitgeteilt, daß wir einen großen Posten Eipulver für unsere Vereinigung günstig erwerben konnten. Das Eipulver besteht nur aus bestem, getrocknetem Hühnereigelb und bildet einen vorzüglichen Zusatz zu jeglichem Weichfutter. Wir können es in Posten von mindestens ½ kg durch unser Mitglied Determann, Schillerstr. 33, zu M. 1,70 für das kg abgeben. Gutes Körnerfutter kann ebenso preiswert zu 95 Pf. für das Pfd. bezogen werden. Auch getrocknete Ameisenpuppen werden verhältnismäßig preiswert bestellt. — Es wird darauf hingewiesen, daß unsere Mitglieder an all den Veranstaltungen der in der Geschäftsstelle zusammengeschlossenen niedersächsischen Vereine, wie sie in unserem Mitteilungsblatt aufgeführt sind, als Gäste teilnehmen dürfen. — Unser Mitglied Eskuche schenkt eine ganze Reihe wertvoller Bücher für unseren Vereinsschrank. Unser Mitglied Schriftleiter Klocke hält dann einen gründlichen, glänzenden, wissenschaftlichen Vortrag über „Schutzfärbung". Er erweitert im Rahmen dieses Vortrages den Begriff aber erheblich, geht ausführlich auf die Darwinsche Theorie, auf Entwicklungslehre und Zuchtwahl ein und bringt eine Fülle von Beispielen. Er unterscheidet erstens die Tiere, die sich mit ihrer Färbung ihrer Umgebung anpassen, zweitens diejenigen, die eine Ähnlichkeit mit anderen vortäuschen, und drittens solche, die durch Schreckstellung, Flügelverschiebung, Körperzusammenziehung, Farbenwechsel und anderes in sog Schreckstellung andere Tiere nachäffen (Mimikry). Wir dürfen auch hierbei nicht unseren allzu menschlichen Standpunkt hervorkehren und annehmen, daß sich die Tiere vor dem Menschen und deren doch sehr beschränkten Sinnesorgane schützen wollen. Es ist überhaupt festzustellen, daß durch alles, was Schutzfärbung heißt, vor dem wirklichen Feinde der Tiere kaum Schutz geboten wird, da diese ihre Opfer doch zu finden wissen. Es ist nur ein sehr bedingter Schutz geschaffen, und man muß von Fall zu Fall entscheiden und weiterforschen, wie das einzelne Tier zu seiner Entwicklungsstufe auch in dieser Beziehung gekommen ist. Man muß sich klar werden, daß es bei dieser Forschung kaum wissenschaftliche Endergebnisse gibt, daß alles weitergebildet und zum Teil überholt wird. Appel.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste willk. Fritz Meyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V, Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat, abends ½9 Uhr, im Hotel „Thüringer Hof", Köln, Klingelpütz 43. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 4. Juni 1925. Die Sitzung am 23. Mai fällt des Feiertags wegen aus. Gäste willkommen. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Normast im „Kaiser Friedrich", Breslauerstr. 50. Liebhaber willkommen. J. A.: Friedrich.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wst., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Tage im „Goldenen Falken" Versammlung; nächste Freitag, den 29. Mai. Liebhaber willk. Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Versammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Liebhaber willk. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebenda. R. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Studienrat Prof. Jahn, 1. Vors.

Der Verein der Vogelfreunde e. V. für Remscheid und Umgegend veranstaltete mit dem **Vogelliebhaberverein Remscheid** am 3. Mai d. Js. eine gemeinsame Ausstellung verbunden mit Buchfinkenwettstreit in den Lokalitäten des Herrn Luchtenberg, Remscheid. Trotz der schlechten Witterung, die in den Vortagen der Veranstaltung herrschte, wurden wir mit dem schönsten Sonnenschein am Festmorgen überrascht. Um 7 Uhr morgens trafen die Buchfinkenliebhaber aus den Nachbarstädten mit ungefähr 60 Buchfinkenkampfvögeln und Reinschlägern am Hauptbahnhof ein, wo sie von einer Abordnung der festhabenden Vereine empfangen wurden. Auf dem Wege vom Bahnhof zum Festlokal entfaltete sich schon unter diesen Vögeln ein Wettgesang, der sich dahin auswirkte, daß selbst die Vögel, die sich in der Natur befanden, dem Zuge unter Gesang bis zum Lokale folgten. Um 8 Uhr morgens wurde dann der Vogelwettstreit und die Ausstellung eröffnet, und es begann ein reges Treiben unter den Zuhörern sowie Zuschauern, so daß sich die Lokalitäten bei weitem nicht für ausreichend erweisen haben. Der Wettstreit endete um 11 Uhr. Nachdem die Punktzahl zusammengestellt war, konnten wir die Buchfinkenliebhaber mit hohen Preisen und Ehrenpreisen beglücken. Sie kehrten dann um 1 Uhr mittags wieder in ihre Heimatstädte zurück. Die Freude war übergroß und brachte den Wunsch zum Ausdruck, derartige Veranstaltungen unter den Vogelliebhabern öfters abhalten zu können. Betreffs der Ausstellung möchten wir bemerken, daß wir trotz Rundschreiben an viele größere Firmen, welche wir ersucht hatten, uns bei der Ausstellung zu unterstützen, nicht berücksichtigt worden sind. Eine Firma Eckrich in Waldsee (Pfalz) ist unserem Wunsche entgegengekommen, indem sie uns Vogelfutter „Marke Alwecka" zur Verfügung stellte. Auch Freiherr von Berlepsch schickte uns einige Drucksachen über „Praktischen Vogelschutz", wofür wir ihm herzlichen Dank abstatten. Aus vorstehenden Gründen sahen wir uns gezwungen, die Ausstellung im engeren Rahmen herzustellen. Zur Ausstellung gelangten „in- und ausländische Vögel" sowie Vogelkäfige und viele Sorten von Futtermitteln, welche bei allen Besuchern lobenswerte Anerkennung fanden. Wir hatten es uns auch zur Aufgabe gemacht, die schönsten und besten Ausstellungsgegenstände mit einem Preis zu versehen, so daß auch viele Liebhaber zufriedengestellt wurden. Die Ausstellung dauerte bis in die späten Abendstunden und fand mit erneuter Begeisterung für die Liebhaberei ihren Abschluß. Max Schuhmann, Schriftf., Intzestr. 5.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

---

viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

el-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50. agnetze f. k. schädl. Vögel M. 2,30, M. 2,50 u. 2,80. Katalog gratis. annen, Gronau 58, Westf. [673

llensittich-Nistkasten
este, was es gibt, per Stück 2 ℳ, uchte Stück 1,10 ℳ, gibt ab [674
Frau Klara Neugebauer, Deutsch-Lissa.

IIS Freie Bezugsvereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands
ahm. werden gerichtl. geahndet
orm-Normal-Käfige
gesetzlich geschützt
I: für Rotkehlchen, Nachtigallen usw.
II: für Drosseln usw. [675
III: für Laubvögel (mit Pflanzenabteil.)
IV: Gesellschaftskäfig für Finken
äfige sind geschützt geg. Zug- Milben, haben fed. Sitzstang. rchs. Rück- und Seitenwände; barkeit siehe Ornis-Buch S. 19. -Mitglieder erhalten Zahlungs- hterung. Jeder Liebhaber bei Anfrage bis 31. Mai das buch (90 Seiten) über Vogel- und prakt. Vogelpflege gratis.
rnis-Haus
Halle-Saale

Vogelfutter [676
anarien, Waldvögel, Exoten, ieien, Weichfresser. Anerkannt este Mischungen auf Grund langr Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.
. Göpel, Leipzig,
linring 1. Telephon 14 958.
nfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Zücherterwaren

Verbesserte L. K.	1/2-Kilo-Paket	R.-M.	1,40
Rübsen, selten schöne Züchterware	1/2-Kilo	„	0,50
Glanz, Marokko großkörnig	„	„	0,50
Hanf, deutscher	„	„	0,35
Hafer, geschält	„	„	0,35
Lein- und Negersaat	„	„	0,45
Ital. Silberhirse	„	„	0,45
Blau-Mohn, Speiseware	„	„	0,60
Marokko-Hirse	„	„	0,30
Prima Mischfutter für Kanarien, eigenes Verfahren	„	„	0,50
Waldvogelfutter	„	„	0,45
Sonnenrosenkerne, gestr.,	„	„	0,35
Salatsamen, weiß,	„	„	1,50
Septaschalen, große Stücke	„	„	1,50
Einäpfchen aus Glas	Stück	„	0,10
Futternäpfchen aus Glas	„	„	0,15

Piep und Piep extra zu Originalpreisen.
Vereine und Großbezieher verlangen Sonderofferte. [677

Lorenz, Dresden, Drehgasse 5.

Täglicher Versand von frischen haltbaren
Ameisenpuppen
à Ltr. 3,40 M. franko inkl. Verpackung bei Voreinsendung des Betrages.
Alle Vogelfuttersorten zu Tagespreisen.
W. Lenger, Berlin N 58,
Schönhauser Allee 70 a.
678] Postscheckkonto Berlin 83 386.

Jeder Vogelliebhaber
verlange Preisliste über Vogelfutter, Utensilien und Bedarfsartikel zur Zucht und Pflege der Vögel. [679
Hermann Sievers,
Hannover, Inselstr. 2.

Frische Ameiseneier
liefere den ganzen Sommer hindurch, zurzeit das Ltr. 3.50. 1/10 Ltr. 1,60 franko.
Mehlwürmer
1/4 Pfund 2.— M. franko. Alles gegen Voreinsendung des Betrages. Dauernden Abnehmern empfehle ein Konto einzusenden, wovon jede Sendung zum Tagespreis abgebucht wird. [680
W. Hiltmann, Berlin S 14
Dresdener Str. 24.
Postscheckkonto Berlin 84 968.

Frische Ameiseneier
neue Ernte 1925 Liter 3.— Porto und 681] Verpackung extra 0,60.
Carl Blüm, Mainz, Bebelring 46.

Mehlwürmer
veget. gez. [682
1/4 Liter franko gegen Voreinsendung von 2 Mark
Bonitas-Versand
Rostock i. M. 3.

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. D. Waschinski & Co., Biesenthal I (Mark). [683

684] Mehlwürmer, reine Ware, gegen Eins. von 1.75 ℳ 1/4 Pfd. franko.
Th. Witte, Niederndodeleben b. Magd.

Mehlwürmer
à Pfund 5 ℳ, bei 6 Pfund Porto und Verpackung frei.
Ia Ameiseneier
Pfund 6.50 M.
Ia Weißwurm . . . à Pfd. 5 ℳ
Ia Muska-Zecken . . à „ 2,50
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen . . . . à Pfd. 0,75
Ia Garnelen, gem. à Pfd. 0,40 ℳ
Ia Universalfutter.
Alecwa I für Nachtigallen 2.— ℳ
„ II für Grasmücken 1.80 ℳ
„ III für Drosseln . 1.50 ℳ
Proben und Analysen zur Verfügung. Vertreter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [684
Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
A. Eckrich II., Waldsee (Pfalz).

Mehlwürmer neue, feinste Qual., Pfd. 6 M.
Jeltner, Breslau Weinstr. 12. [685

Züchter-Urteile:

Bitte senden Sie mir sofort wieder 8 Pfd., wie ich schon gehabt, von Ihrer „L. K.-Nahrung", denn meine Vögel nehmen es sehr gern. Ich kann ohne dieselbe gar nicht mehr sein. Es ist also ein gutes Präparat und werde dasselbe jedem Züchter empfehlen. Bitte schicken Sie mir dieselbe per Nachnahme, aber sofort, da ich es notwendig brauche.

Saalfeld i. Thür., 29. 4. 25. Ernst Müller.

Dieses Frühjahr habe ich Kanarienzucht angefangen. Ich habe ein Weibchen mit 4 Jungen, die 14 Tage alt sind. Durch einen Bekannten wurde mir Ihr Präparat „L. K. N." empfohlen. Letzteres ist in einem hiesigen Geschäft erhältlich und ich reiche diese Nahrung dem Weibchen seit 10 Tagen Es füttert fleißig und die Jungen gedeihen vorzüglich. Dagegen sagt das andere in den hiesigen Geschäften erhältliche Vogelfutter dem Hahn und dem Weibchen offenbar nicht recht zu. Ich möchte Sie deshalb bitten, mir umgehend 6 Pfd. Sommerrübsen und 3 Pfd. Glanz per Nachnahme zu senden.

Tauberbischofsheim (Baden), 4. 5. 25. Emil Hübner, Justizobersekretär.

Bitte um möglichst baldige Zusendung von 2 kg „L. K.-Nahrung". Bin mit dem Präparat sehr zufrieden und werde mich immer desselben bedienen.

Goslar a. H., 6. 5. 25. Karl Wilke.

Bitte Sie nochmals um eine Sendung von 2 Paketen „L. K.-Nahrung". Habe mit diesem Präparat sehr gute Erfolge gehabt. Bitte senden Sie per Nachnahme, aber recht bald.

Halbau, 8. 5. 25. Hermann Jäkel.

Lorenz, Dresden
Drehgasse 5. [686

Die Originale obiger Zuschriften haben uns vorgelegen.
Die Schriftleitung der „Kanaria".

Gesucht zur Zucht:
0,2 Amaranten
1,1 Goldbrüstchen
687] 1,1 Zwergelsterchen
1,1 Schönbürzel.
O. Kochendoerfer,
Zahnarzt, Eschwege a. W.

Prima Harzer
Kanarien-Sänger
(Stamm Seifert)
mit schöner Hohlrolle, Hohlklingel, Schockel, Knorre, Glucke und tiefen Pfeifen, à 12, 15 u. 20 ℳ, Weibchen à 3 u. 4 ℳ. Versand geg. Nachnahme. Probezeit 6 Tage, was nicht gefällt, tausche um. [688
H. Voigt,
Kanarienzüchter,
Nordhausen am Harz.

Schamadrosseln, herrliche Sänger, fingerzahm, ohne Fehler	Stck.	75.—
Amazonenpapageien, junge Tiere, sehr gelehrig	Stck.	50.—
Edelsittiche, z. Sprechenlernen, fleißig plappernd	Stck.	18.—
Javasittiche	Paar	30.—
Grüne Wellensittiche, ausgefärbte Zuchtpaare,	Paar	15.—
Gilbweber i. Verfärbg.	„	6.—
Feuerweber i. Verfärbg.	„	4.—
Atlasfinken i. Verfärbg.	„	3.50
Reisfinken, blaue	„	5.—
Schwarzkopfnonnen	„	4.50
Blutschnabelweber	„	4.—
Grauastrilde, Amaranten	„	3.50
Orangebäckchen	„	4.50
Grauedelsänger, gar. Hähne	Stck.	4.—
Elsterchen	Paar	6.—
Orangeweber i. Verfärbung	„	4.50

Sonnenvögel (Chin. Nachtigallen) bis 20. Mai eintreffend, Hähne à 15.— dtto Paare 20.— Porto u. Verp. 3.50 ℳ, Dringend 6.50 ℳ.
Carl Blüm, Mainz,
689] Bebelring 46.

AFFEN, PAPAGEIEN,
Kakadus, Senegalvögel.
690] Off. Karl Willer,
Altona, Kirchenstraße 34.

Suche 0,1 jav. Mövchen (zuchtreif).
A. Schiebe, Zschopau (in Sachsen)
691] A. Z. 282.

Achtung! Vogelliebhaber!

Da ich beabsichtige, einen neuen Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig in das Leben zu rufen, erfahren die Liebhaber und Interessenten, welche beitreten wollen, alles Nähere bei

P. Schwarz, Leipzig,
Südstraße 67 II.
692]

Sonnenvögel,
693]

chin. Nachtigallen, Männchen		13.—
Schamadrosseln, ausgefärbte, ganz hervorrag. Sänger, fehlerfrei		60.—
1 Schamaweibchen		40.—
1 Paar Bergmeisen		60.—
1 Rötelmerle, jung		80.—
1 ind. Blaumerle		80.—
1 Blauroteschwanz (Phoenicurus fr.)		75.—
1 weißbrüstiger blauer Waldschmätzer (Tarsiger rufilata)		85.—
1 graublauer Fliegenschnäpper		50.—
Klarinettenvogel		60.—
Blauspötter		35.—
Flötenwürger		30.—
ind. Maskenwürger		20.—
ind. Grauwürger		20.—
Borstenhäherling		20.—
Würgerschnäpper		20.—
Blauwangenblattvogel		45.—
Braunscheiteltimalie		20.—
Spottdrossel		40.—
Rosellasittiche	Paar	120.—
1 Pennantsittich, Männchen		60.—
Pavuasittiche	Paar	45.—
Kubasittiche	Paar	30.—
Katharinasittiche	Paar	28.—
Grassittiche	Paar	18.—
Wellensittiche, grün u. gelb, schöne Zuchtpaare	Paar	12.—
Mohrenkopfpapageien, jung und zahm	Stück	35.—
Reisfinken	Paar	5.—
Weißkopfnonnen	Paar	10.—
Dominikanerkardinäle à 8,	Paar	16.—
Braunkopfammern	Stück	5.—
Safranfinken	Paar	10.—
1 grüner Kardinal		40.—
1 Paar Spix-Ara, jung u. zahm		700.—
1 Benguelapapagei, jung u. zahm		200.—
Blaustirnamazonen, jung und gelehrig		50.—
Schmetterlingsfinken	Paar	2.50
Grauastrilden	Paar	2.—
Orangebäckchen	Paar	2.50
Amaranten	Paar	2.—
Silberschnäbelchen	Paar	2.30
Bandfinken	Paar	2.50
Webervögel	Paar	2.—
Atlasfinken	Paar	1.80
Schönbürzel	Paar	4.—
Grauedelsänger o. Garantie	Stück	2.—
Marmosettäffchen	Stück	35.—

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70 a.

In gut eingewöhnten Vögeln biete freibleibend an:
2 Schamadrosseln, herrliche Sänger, fingerzahm à 75.—
2 Sonnenvögelhähne à 16.—
Blaustirnamazonen, gut spr., tadellose Vögel à 75.—
Doppelgelbköpfe à 70.—
Gilbweber, in Verfärbg., Paar 6.—
Orangeweber, „ „ 4.50
Atlasfinken, „ „ 4.—
Grauedelsänger, Hähne à 4.—
Elsterchen, K. Paar 5.—
Schönbürzel „ 3.50
Astrilde „ 3.50
Amaranten „ 3.50
Schmetterlingsfinken „ 3.50
Wellensittiche, grün, Zuchtp. 15.—
Edelsittiche, fleißig plappernd, zum Sprechenlernen à 18.—
Verp. u. Porto 3.-0, Dringend 6.50.
Carl Blüm, Mainz.
Bebelring 46. [694

Junge Wellensittiche
vollständig zahm, frei am Finger sitzend, Stück 12 Mark
Nistkasten für Wellensittiche u. andere Höhlenbrüter, seit 18 Jahren in eigener Züchterei erprobt, von maßgebenden Züchtern als einzig praktischer Nistkasten empfohlen, Stück 2 Mark
Wellensittich-Züchterei
697] Deutsch-Lissa, A. Z. 349.

Suche junge Wachtel,
sowie gute Feldlerche zu kaufen.
Keine Luxuspreise.
Xaver Schuster, Dentist.
696] Eggenfelden.

Verkaufe oder tausche:
1 prachtvolle Blaustirnamazone u. 2,1 grüne Wellensittiche, garantiert blutfremdes Zuchtpaar, davon 1 ♂ echter Anstralier (24er Import).
Walter Borwig, Kakteen-Kultur
697] Polzin i. P.

Bestellungen für Juni sofort der Post übergeben!
Bestellzettel für Deutschland.

Postbestellzettel.
Hiermit bestelle ich für den Monat Juni 1925
1 „Die Gefiederte Welt"
(eventuell mit Nachlieferung). — Erscheinungsort Burg Bz. Mgdb.

Name: .....

Wohnung: .....

Postquittung: ..... Mk. ..... Pf. sind heute bezahlt worden.

Ort: ..... den .....

Postannahme

.....

Schamadrossel
große Auswahl, Männchen 50—70 M. Weibchen 55 M., Trupiale 80 M. sowie alle andern edlen Weichfres gibt ab
W. Hiltmann, Berlin O 1
698] Dresdener Str. 24.

2,0 gelbe Lachtauben
24er Brut, 10 Mark,
6 Dohlen Stück 2.— Mark
(Porto extra) verkauft [6
A. Gayda, Gr. Pramsen,
Kreis Neustadt O.Schles.

Kirschkernbeißer
vertauscht gegen anderen Vogel
Mohr, Stralsund,
Oberpostsekr. [7

Sprechender Graupapagei
zu kaufen gesucht.
Erbitte nähere Angabe mit Preis.
W. Heimann.
Hagen in Westfalen,
701] Kampstraße 24.

Amazon
blaustirnig, jung, fingerz., sprich „Papagei" und „Lora", ist se zutraulich und gelehrig, verkaufe für 75 M.
702] Fr. Ganter, Steinen (Bade

Tarant. Unzertrennlich
1 Paar (Weibch. ist vom Hahn am H gerupft) und 3 Stück 6 Monate a Junge zusammen 50 M.
Gefiederte Welt, 6 Jahrgän 1919—1924, 20 M.
W. Reitzig, Berlin N 39,
703] Reinickendorfer Str. 109.

Angorakatze
704] Stück 10.—
Kapuzineraffen, „ 100
Schwarzplättchen (Albino), weiß roten Augen, tausche gegen Exoten.
Josef Pichler, Zoologis Handlu
Wien IV, Karolinengasse 25.

Umständehalber zu verkauf
1,2 grüne Wellensittiche
0,1 gelber Wellensittic
705] (Zuchtpaare)
0,1 Napoleonsweber
2 Nistkästen für Sittiche
zirka 4 kg. Senegalhirse
Ruhs „Der Wellensittich"
Preis 30 Mark
einschl. Verpackung, ab hier.
E. Franke, Nüche
(Bezirk Halle), Oelberg Nr.

Verkaufe junge
Wellensittiche Ia befiedert kerngesu
i. Freiflug gezüchtet, grün u. gelb, à
Saller, Planegg bei Münch
706] Hofmarkstraße 8.

1,1 Kanarien, junges erfolgr. Zu paar, gebe in Tausch gegen 1 Finger **Gelbspötter** (dies). Frühjahrsfa
707] Glatter Tausch.
Linda Hirsch, Aubstadt (Unte franken). A. Z. 283, Ornis 318.

708] **TRUPIAL**
fleißig im Gesang, gebe ab für 20 Zuchtpaar Grauedelsänger 6 3 Mossambikweibchen à 2 M
A. PETERMAN
Glauchau, Theaterstraße

Inserate
für das am 28. Mai 1925 Ausgabe gelangende Heft 22 Ges. Welt erbitten bis 23. M

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Dunkler Wellensittich
Himmelblauer Wellensittich
Hellolivgrüner Wellensittich

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 28. Mai 1925 | Heft 22

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Meine Drosseln.

(Aus 50jährigen Erfahrungen.)

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Also meine Amsel hatte ich nun, meine größte Spannung war auf den Gesang gerichtet und in der Tat sang mein Vögelchen die erste Strophe des Liedes: „Blau blüht ein Blümelein", rein und schön durch, aber von einem zweiten Liede habe ich nie etwas gehört. Also immerhin ein Reinfall! Aber trotzdem erfreute mich der Besitz desselben unendlich. Schon das Äußere der Amsel war ein Genuß für den Liebhaber: nobel sammetschwarz vom Kopf bis zur Zehe und dazu den goldgelben Schnabel und den gleichfarbigen Augenrand, und dann die ungemeine Zahmheit. Man konnte sich mit „Hänschen" richtig unterhalten, ich möchte behaupten, er verstand jedes Wort. Im Besitz dieses Tierchens beschloß ich, später — sobald ich meinen dauernden Wohnsitz erlangt hatte — selbst an die Auffütterung junger Amseln heranzugehen und sie anzulernen. Wie ich dies versucht habe, ist weiter unten zu lesen. Hier in Magdeburg gab es auch schon geeignetes Mischfutter für Weichfresser zu kaufen, aber leider hatte dasselbe den gleichen Fehler, den ich immer wieder am Mischfutter auszusetzen hatte, der Geruch des Schmutzes der Vögel war widerlich, er glich verdorbenen Heringen. Jedenfalls weil Fisch- oder Fleischmehl darunter war. Eine Hauptfreude für meine Drosseln war die Zeit der frischen Ameiseneier, und die gab's damals in Magdeburg reichlich und billig. Auf jedem Wochenmarkt — also zwei- bis dreimal wöchentlich — waren mehrere Handelsfrauen aus der nahegelegenen Letzlinger Heide anwesend, die dies Labefutter für unsere Weichfresser brachten. Für etwa 25 Pfennig kaufte man den hinreichenden Wochenvorrat vom Mai bis in den August hinein. Wie haben sich doch die Zeiten geändert, wenn ich jetzt hier — auch in einer Großstadt — frische Ameiseneier haben will, kann ich von „Hinz zu Kunz" laufen und andere Preise anlegen. Zwei Jahre vergingen so für mich freundlich im Besitz meiner Singdrossel und Amsel, da ging die erstere ein. Den Grund konnte ich nicht feststellen. Jedenfalls wird aber das Lebensalter die Todesursache gewesen sein; denn man weiß bei Wildfängen nie, wie alt sie eigentlich sind, wenn man sie erwirbt. Eine Singdrossel mußte ich aber wieder haben, und da sah ich eines Tages in einer Vogelhandlung eine prächtige ihres Geschlechts in einem Kanarienheckkäfig sitzen. Sie war tadellos im Gefieder und auch gar nicht wild. Allerdings konnte der Händler keine Garantie dafür übernehmen, ob es ein Wildfang sei, er selbst habe sie vor einiger Zeit aus zweiter Hand erworben, sie singe schon leise — es war im Herbst —, weitere Auskunft konnte oder wollte er nicht geben. Das Tierchen gefiel mir aber so, daß ich es kaufte. Den Preis weiß ich heute nicht mehr. Später erkannte ich aber, daß es eine aufgefütterte Drossel war — daher die Zahmheit —, sie blieb auch im Frühjahr ein Stümper. In dieser Hinsicht muß ich auf Grund langjähriger Erfahrungen den Ausführungen von Ruß in seinem Handbuch II und demjenigen von Mathias Rausch in den „Gefiederten Sängerfürsten" unbedingt beitreten, daß künstlich aufgefütterte Singdrosseln oder junge Herbstfänge im Gesang stets Stümper bleiben, wenn sie nicht einen tüchtigen Vorsänger tunlichst täglich hören. Trotzdem habe ich unter Vogelfreunden und auch bei tüchtigen Kennern oft die Meinung vertreten hören, daß der Vorsänger überflüssig sei: jeder Singvogel bringe seine Gesangskunst durch die Geburt mit, sie liege ihm im Blute. Dagegen nützte auch mein Hinweis auf den Kanarienvogel, der ohne tüchtigen Vorsänger überhaupt Stümper bleibe, nichts. Endlich im Jahre 1889 erlangte ich meine feste Anstellung, und zwar in einer Mittelstadt nicht weit von der großen Letzlinger Heide — damit war mein Sehnen nach einem dauernden Aufenthalte erfüllt und meine Vogelliebhaberei konnte nun erst die richtigen Bahnen betreten. Sobald ich mich eingerichtet und verheiratet hatte, begann ich die Vogelhaltung in großem Maße. Neben einer größeren Voliere mit Körnerfressern hielt ich nur immer einen Bestand an Sing- und Schwarzdrosseln. Den Stümper aus Magdeburg hatte ich nicht mit auf die Reise genommen und meine gute gelernte Amsel einem lieben Vogelfreunde überlassen. Zunächst ging ich auf die Suche nach einer tüchtigen, sogenannten Ia Singdrossel, mit den Amseln hatte ich noch etwas Besonderes vor. Hierüber weiter unten. Ich studierte fleißig die Anzeigen in der „Gef. Welt" und in der

„Geflügelbörse". Da stieß ich dann auf eine Anzeige aus der Harzgegend, die tadellose Sänger anbot. Aber leider mußte ich da die Erfahrung machen, daß es im Vogelhandel oft wie in der Politik ist, und zwar frei nach Talleyrand: „Die Sprache ist dazu da, die Gedanken zu verbergen." Auf meine Bestellung erhielt ich — natürlich gegen Postnachnahme — eine Misteldrossel (Turdus viscivorus). Ich war starr; denn trotzdem diese Drossel der Singdrossel sehr ähnlich ist, erkannte ich sie sogleich als das, was sie war. Sehr zustatten kam mir dabei meine gute Lehrzeit in Hannover und auch ihre Beschreibung im Handbuch II Ruß. Ich teilte dem Verkäufer sofort das Nötige mit, er stellte sich unschuldig nnd erst nach langen Verhandlungen nahm er das Tier zurück und erstattete mir mein Geld. Ich führe dies hier nur an, um zu zeigen, wie im Vogel-, auch wohl im Pferdehandel oft auf die Unerfahrenheit der Mitmenschen gerechnet wird. Ähnlich erging es mir einige Jahre später mit dem Ankauf einer Schwarzdrossel, auch hier erhielt ich — natürlich durch Postnachnahme — eine Ringdrossel (Turdus torquatus) statt einer Amsel. Sie kam aus einer Gebirgsgegend, und der Verkäufer mochte wohl denken: was versteht ein Flachlandbewohner von Gebirgsvögeln. Das Tier war sehr scheu, sang gar nicht, ließ aber desto fleißiger den ganzen Tag ihr ewiges „töt" und „taut" hören. Durch die weißgraue Veränderung der Federn wurde ich sogar zuerst getäuscht, indem ich annahm, eine sehr alte Schwarzdrossel, vielleicht einen Ur-Urgroßvater, vor mir zu haben. In diesem Falle blieb ich der „Geblaumeierte", denn auf meine Reklamationen erhielt ich keinerlei Antwort, der Verkäufer hüllte sich in Schweigen. Eine gerichtliche Klage anzustellen, hatte ich wenig Lust; schließlich fürchtete ich, noch die Kosten tragen zu müssen, wenn der Verkäufer nichts hatte — wie man so sagt —, denn es handelte sich um einen Privatmann „unbekannten Glaubens". Ich jagte meine Ringdrossel, als ich ihr „getök" und „getack" satt hatte, zum Teufel und betrachtete als einzigen Gewinn, um eine Erfahrung reicher zu sein. Schließlich hätte sich der Verkäufer auch noch darauf berufen können, daß er eine „Waldamsel" angeboten und geliefert habe, denn in seiner Gegend hieße die Ringdrossel so. Ich hatte von dieser Tatsache damals allerdings keine Ahnung, habe aber später aus Ruß II ersehen, daß dies zutrifft. Diese beiden Lehren haben auch dahin geführt, später Vögel durch die Post nur von bekannten, sicheren Firmen, niemals wieder von Privatpersonen trotz aller lockenden Anpreisungen zu beziehen. Was übrigens auf diesem Gebiet alles geleistet wird, ist kaum glaubhaft. Ich möchte hierzu noch einen ähnlichen Fall erwähnen, der hier zwar nicht zum Thema gehört, der aber auch sehr charakteristisch ist. Vor etwa 14—15 Jahren bot ein Kürschnermeister aus Schlesien echte Reitzugfinken aus — die Zeitschrift weiß ich nicht mehr genau —, der Preis war dem Wert eines solchen Schlägers entsprechend. Ich bestellte. Da die Postversendung nach dem Vogelschutzgesetz nicht mehr zulässig war — es war Ende April —, schrieb er mir eine Postkarte, daß er den Vogel in doppelter Verpackung abgesandt habe: vorn, sichtbar, einen Kanarienvogel (Weibchen) und dahinter, unsichtbar, den Finken. Die Sendung kam mit Nachnahme an, die Mitteilung auf der Postkarte hatte mich aber mißtrauisch gemacht, und ich ließ die Sendung in Gegenwart eines Postbeamten öffnen, und zwar den hinteren Teil ein wenig. Das Nest war leer, entwichen konnte bei dem guten Verschluß der Kiste der Finke nicht sein. Also handelte es sich um eine direkte Prellerei. Natürlich verweigerte ich die Annahme und die Sendung ging sogleich zurück. Der Absender hate das aufgelaufene Porto für den Hin- und Rückweg zu tragen. Trotzdem hat er nichts von sich hören lassen, damit war wohl auch der Beweis für seine Betrügerei erbracht, denn sonst hätte er mir oder der Post doch wohl Schwierigkeiten gemacht. Also liebe Zunftgenossen! Augen und Ohren auf, wenn ihr euch vor Schaden bewahren wollt!

(Fortsetzung folgt.)

Kubafinkenzucht mit Hindernissen.

Von Adolf Voigt, Jena.

(Nachdruck verboten.)

Seit etwa Jahresfrist ist ein Pärchen kleiner Kubafinken in unserer Vogelstube, das Weibchen ist importiert worden, das Männchen entstammt der Vogelstube des Herrn Buschendorf. Zweimal hatten diese beiden im Herbst vorigen Jahres erfolgreich gebrütet und die Jungen hochgebracht. Allzu zuverlässig waren sie nie gewesen. Nun war es Winter geworden und wieder waren Junge in dem alten, so oft benutzten Neste, das durch immerwährendes Ausbessern und Vergrößern einen gewaltigen Umfang angenommen hatte. Sauber und ordentlich war es immer trotz der häufigen Benutzung. Vogelmiere und halbreife Gräser gab es fast gar nicht mehr und die 10 Tradeskantiatöpfe waren schon so mitgenommen, daß fast nur noch einzelne Rippen standen. 56 Vögel brauchen den Winter über ansehnliche Mengen Grünfutter. Die große Frage war: Ob die Kubafinken wohl ohne Gras füttern werden? Bisher war jede Brut unter Beigabe von Gräsern zum Aufzuchtfutter gelungen. Und richtig: Eines Tages lagen zwei junge Kubafinken tot im Sande, trotzdem wir stets Spinat zur Verfügung gestellt hatten und Eifutter und gekeimte Hirse nicht fehlte. Das war ärgerlich, aber nicht zu ändern. Nach etwa fünf Wochen dasselbe Ergebnis: Wieder eine vergebliche Brut. Schon planten wir, die Vögel herauszufangen und zu trennen, um einer Erschöpfung des Weibchens vorzubeugen. Aber ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit dem Trennen von Zuchtpaaren gemacht, und anderen bekannten Züchtern ging es ebenso. Ich lasse jetzt stets den Dingen ihren Lauf: Erschöpfen sich die Weibchen, so liegt das eben in ihrer Natur begründet. Von Gewinnsucht da zu reden, wie es in einem bekannten Werke geschah, ist verkehrt. Jeder Einsichtige weiß, daß von Gewinn in realer Bedeutung bei der Vogelstubenzucht wohl kaum die Rede sein kann.

Es wurde März, aber nicht der Frühling kam, sondern ein kalter Nachwinter. Wieder waren Junge im Neste der Kubafinken, und programmäßig lag

nach einigen Tagen ein toter, junger Kubafink draußen. Wir hatten Grasbüschel des einjährigen Rispengrases in Blumentöpfe gepflanzt und hielten diese Töpfe sehr warm und feucht. Nun wurde ein Topf nach dem andern in die Vogelstube gestellt, und sofort saßen die Kubafinken darauf, die wenigen Blütenknospen und auch die Bläter des Grases zernagend. Aber auch alle andern Vögel machten sich darüber her, so daß unser geringer Vorrat bald erschöpft war. Draußen zwang Frost die Erde in seinen Bann, das Thermometer zeigte täglich 5—7° C unter Null, weder Vogelmiere noch Kreuzkraut war zu finden. Sollte wieder die Brut zugrunde gehen? Da fiel mir ein, daß ich schon in früheren Jahren im Frühjahr Rasenplatten im Garten abgestochen hatte und daß die Vögel gern dies junge Gras zernagt hatten. Mit Radehacke und Spaten ging's in den Garten, und nun wurden $^1/_2$ qm große Rasenplatten abgehoben, allmählich aufgetaut und dann den Vögeln gereicht. Daneben hackte ich unter den Obstbäumen die Erde auf und warf sie mit Laub und Gras in die Vogelstube. Man glaubt gar nicht, was darin alles erstarrt den Winterschlaf hält. Schon nach einigen Stunden schwirrten Insekten aller Art im Zimmer, auch in der Erde fand sich mancherlei Futter für die Vögel und — die Aufzucht gelang. Daneben gab es gekeimten Glanz, Mohn, ebenso angekeimte Hirse aller Art. Merkwürdigerweise nimmt dies Kubafinkenpaar weder frische noch gebrühte Ameisenpuppen in nennenswerter Menge auf, auch gehacktes Ei wird nur selten gefressen, einige Mehlwürmer ab und zu mal ausgekaut. Gras in jeder Form verlangen sie, und ohne dies gelingt keine Brut. Nun, diesmal ist sie gelungen und für den Sommer gibt es ja reiche Auswahl an Gräsern. Es war ja etwas mühsam, aber dafür erfreuen uns jetzt die jungen, selbständig gewordenen, flinken Kubafinken um so mehr. Man lernt nie aus in der Vogelzucht, und selten verhält sich ein Paar so wie das andere. Der botanische Name des Grases ist mir nicht bekannt, ich werde versuchen, ihn festzustellen. In einer englischen Zeitschrift war es kürzlich beschrieben und abgebildet, sein Reichtum an Vitaminen wurde hervorgehoben (Annnual Meadov grass). Die Blüten des Grases sind schon Anfang April zu finden und bilden ein fast ebenso begehrtes Futter wie der winzig kleine, frische Samen.*)

*) Vermutlich handelt es sich um das „jährige Rispengras" — Poa annua *L.*, dessen Halm etwa 5 bis 25 cm lang wird und fast das ganze Jahr hindurch blüht. Es bildet mit anderen Rispengräsern den grünen Rasenteppich auf Angern und Weiden. Auf letzteren wird es stets mit ausgesät, da es ein sehr nahrhaftes Gras ist, sowohl grün wie auch als Heu getrocknet. Es liebt gutes Erdreich. N.

Übrigens änderte das Kubafinkenmännchen sein Betragen gegen die Schmetterlingsfinken, die es früher heftig verfolgte; heute beachtet es sie gar nicht mehr und hat dem dicken Spitzschwanzmännchen die Fehde erklärt, so daß dieses sich kaum vor dem Knirps retten kann. Die Geschlechter der Jungen erkennt man in der Jugend am besten aus dem Verhalten der Eltern gegen sie: Das ♂ jagt die jungen ♂♂ bald nach dem Selbständigwerden, so daß man sie bald herausfangen muß. Weniger arg macht es die Mutter mit den Töchtern, denen der Herr Papa nie etwas tut. Daß man nie zwei Paare Kubafinken in einem Raume, ja nicht einmal in zwei durch eine Drahtwand getrennten Räumen halten kann, habe ich wiederholt erfahren: Noch durch das sehr engmaschige Drahtgeflecht hindurch bekämpften sich die Männchen, bis wir das zweite Paar entfernten. Bildhübsche, flinke Kerlchen sind die Kubafinken und sie werden in unserer Vogelstube nie fehlen.

Gartengrasmücke am Nest. Aufnahme von G. Wolff-Schötmar.

Der Bluthänfling.

Von Karl Finck,
Neukölln.

(Schluß.) (Nachdr. verboten.)

Trotz des schlechten Wetters hatten wir viel Schönes gesehen und gehört.

Das Verbreitungsgebiet des Rothänflings ist ungemein ausgedehnt; man trifft das Vögelchen sowohl in den ärmsten Sandgegenden, in fetten Marschbezirken, am Meeresstrande, sehr häufig in manchen Mittelgebirgen, ebenso in den bebauten Tälern der Hochgebirgszone, auch in der ungarischen Pußta, hier sogar streckenweise, wo Natronsalze beinahe jeden Pflanzenwuchs unterbinden. Bäume fehlen da vollständig, bloß an manchen Plätzen vereinen sich verzwergte Büsche zu Gruppen, vegetieren einige Salzpflanzen, wie z. B. das Meerstranddreizack (Triglochin maritimum), der Seewegerich (Plantago maritima), die Strandnelke und Strandaster (Aster Tripolium *L.*).

Im Hochsommer sind derartige Steppen unsagbar öde. Disteln, Kochien, Melden und die spärlichen niedrigen Grasbüschel vertrocknen vollständig. Glühend heiß brennt die Sonne herab. Unaussprechliche Trostlosigkeit liegt über der Landschaft. Man wird angenehm überrascht, wenn auf einmal zwischen den ärmlichen Hütten der Schafhirten das fröhliche Geplauder des Hänflings erklingt, der mit Vorliebe in den Rohrdächern brütet. Allerdings kommt der Vogel hier verhältnismäßig selten vor, und ich sah auch im Herbst meistens kleine Verbände.

Geradezu gemein ist dagegen der Bluthänfling in der goldenen Wachau und in dem niederösterreichischen-ungarischen Leithagebirge.

Der tiefgründige, kalkhaltige Lehmmergel begünstigt ungemein die Vegetation. Früher wußte ich dort

Gräben und zerrissene Abhänge, die forstwirtschaftlich kaum ausgenützt werden konnten, aber von einem undurchdringbaren Buschwald bedeckt waren. Schleh- und Sauerdorn, Wildkirschen, Holzbirnbäume, Hartriegel, Ahlkirschen, angeflogene Schwarzföhren, Lärchen, Legewacholder, Atlasbeer-, sowie Spindelbäume, Vogelbeerbüsche, namentlich jedoch die wilde Rose — noch durchwirkt von Brombeeren, Hopfen, Waldrebe, Platterbse, Zaunwinde und den verschiedenen Wicken — bildeten feste Verhaue.

Schon zeitig im Jahre, sobald Schlehdorn, Wildkirschen und Kornelbüsche im lenzlichen Schmucke standen, sangen die unzähligen Hänflinge mit dem Chor der Amseln und Singdrosseln um die Wette; schwieg er auch nicht im Vorsommer, wo die Hundsrose ganzen Abhängen ein duftiges, zartes Rosa verlieh, an den Böschungen die ersten reifen Erd- und Himbeeren nickten, die Drosselleder schon schwächer wurden und der Buchenwald von dem Jubelgesang der verschiedenen Grasmücken hallte.

Wegen seines schönen Gesanges ist der Bluthänfling in manchen Gegenden als Stubenvogel sehr beliebt, zumal die Pflege wenig Umstände macht. Allerdings muß der Liebhaber die leidige Fettsucht zu vermeiden wissen, wozu dieser Vogel besonders neigt.

Das Futter besteht am besten aus einwandfreiem Sommerrübsen, daneben gibt es noch etwas Mohn, einige Spitzsamen- und Hanfkörner.

Sämereien von Salat, Stachellattich, Königskerze, Zichorie, Disteln und Kornblumen bilden gesunde Beigaben, besonders im halbreifen Zustand. Geeignetes Grünkraut wird gern angenommen.

Leider stellt sich in der Gefangenschaft die Prachtfärbung nicht ein.

Als Ursache können Witterungseinflüsse allein kaum gelten, wenigstens hielt ich früher Hänflinge in einer freistehenden Voliere, trotzdem entwickelte sich niemals das schöne Rot; es entstand aber öfters mehr oder minder ausgeprägt bei Vögeln im Käfig, wenn die Tiere gekeimte und verschiedenste unreife Samenarten bekamen. Häufig unterblieb jedoch die Wirkung.

Vielleicht übt das Gesäme von Nadelhölzern und solches, welches viel Gerbsäure enthält, einen besonderen Einfluß aus. Für den Wildfang paßt der Kistenkäfig am besten, dessen Vorderseite zuerst mit Fichtenreisern durchflochten wird.

Aufgepäppelte Nestlinge werden, wenn man mit den Pfleglingen innigen Umgang pflegt, ungemein zahm und meistens vorzügliche Sänger, sofern sie alte gute Vögel hören. Andere Vogelstimmen sollen bis zur vollendeten Ausbildung keine Einwirkung haben.

Die Tierchen müssen schon ziemlich befiedert sein, obwohl sie zunächst schlecht sperren. Zur Atzung verwendete ich früher vorwiegend erweichte süße, enthäutete, feingestoßene Walnußkerne, wozu etwas hartes Eigelb gemischt wurde.

Auch Kanarienweibchen brüten Hänflingseier ohne weiteres aus, ziehen auch die Jungen groß.

Das Aufpäppeln nackter Nestlinge ist schwierig, weil die Kleinen von den Alten aus dem Kropfe gefüttert werden, worin die enthülsten Körner nicht nur erweicht, sondern durch gewisse Sekrete schon eine chemische Umformung erfahren. Übrigens besteht die erste Nahrung aus dem sogenannten Kropfschleim.

Bei Beginn des Krieges brachte mir ein Freund drei Kanarienhähne und sechs Weibchen und bat mich himmelhoch, den prämiierten Stamm nicht aussterben zu lassen. Obwohl ich kein Verehrer von den gelben Sängern bin, züchtete ich, solange es eben durchführbar war, munter darauf los, und zwar mit Erfolg. Nicht eine Hecke ging ein.

Mehrmals verließen aber Weibchen einige Tage vor dem Ausschlüpfen der Brut das Nest. In solchem Falle legte ich die Eier unter halbbefiederte Jungvögel, welche durch ihre Körperwärme das Ausbrüten unbewußt weiter besorgten.

Die kleinen roten Fleischklümpchen bekamen zunächst den Kropfschleim einer Taube, der mit einer Kleinigkeit Eigelb verrieben wurde. Die Gewinnung des Kropfinhaltes in derart geringen Mengen ist technisch nicht schwierig und mit keiner Tierquälerei verbunden. Man hält den Kopf der Taube nach abwärts und knetet vorsichtig den Kropf. Da Tauben nicht das Gesäme enthülsen, darf das betreffende Tier tagsüber nur geschälte Körner erhalten, muß jedoch abends vollwertiges Futter bekommen, sonst entsteht infolge Vitaminmangels eine gewisse typische Drehkrankheit.

Derart gefütterte Nestlinge blieben zuerst etwas zurück, erholten sich aber schnell, sobald sie vermehrte Eigaben erhielten.

Trotz der Artverschiedenheit scheinen die Kropfsekrete bestimmter Vögel eine gewisse chemische Ähnlichkeit zu besitzen.

Flügge gewordene junge Hänflinge, Buchfinken, Stieglitze und sonstige Körnerfresser, ebenso spät erbeutete Frühjahrsfänge gewöhnen sich bekanntlich schwer ein, erkranken leicht an Darmleiden, weil man kaum die naturgemäße Nahrung zu bieten vermag.

Wer genügend Zeit hat, kann im Herbst wohl halbreifes Gesäme sammeln. Die Haltbarkeit läßt freilich zu wünschen übrig. Noch schwieriger ist die Sache im späten Frühjahr. Gekeimter Samen verändert sich schnell. Aus diesem Grunde reiche ich Wildfängen während der Eingewöhnungszeit vorwiegend gekochten, aber wieder vollständig abgetrockneten, nachher angequetschten Hanf.

Durch das Kochen erfolgt zwar keine chemische Veränderung, aber die Gewebe werden stark gelockert, wodurch das Eindringen der Verdauungssäfte erleichtert wird. Dieser Umstand genügt, um Verdauungskrankheiten fernzuhalten. Die Kochzeit beträgt zehn Minuten. Der Hanf wird dann scharf abgespült und sorgsam getrocknet und hält sich wochenlang.

Rübsen darf nicht gekocht werden, da er durch das Trocknen steinhart und unverdaulich wird.

Während ich diese Zeilen schreibe, singt mein Hänfling mit dem Buchfinken um die Wette, obwohl ich ersteren vor ungefähr sechs Wochen im sterbenden Zustande, vollständig abgemagert, geschenkt bekam.

Gekochter, wieder getrockneter Hanf und gewisse Medikamente (Fermente) brachten schnell Heilung.

Die Vogelschau in München.

Von Leopold Keidel.

(Nachdruck verboten.)

Der „Bayr. Vogelliebhaberverein" in Verbindung mit dem „Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter" und der „Weltbundesgruppe Oberbayern der Kanarienzüchter" hielt in dem Saale des Hirschbräukellers vom 6.—11. Dezember 1924 eine Vogelschau ab, die ihre Vorgängerin von 1922 an Reichhaltigkeit weit übertraf. Wetteiferten doch die Vereine, etwas Besonderes zu leisten. Auch die bekannte Fa. Frank (München) schickte reichhaltiges und wertvolles Material zur Ausstellung. Alles, was ausgestellt war, aufzuführen, dürfte zu weit führen. Ich beschränke mich in meinem Bericht darauf, auf die Sehenswürdigkeiten näher einzugehen.

Die dekorative Aufmachung der Ausstellung lag in den bewährten Händen des Herrn Architekten Ernst Kaiser, der den ganzen Raum in einen fröhlichen, frischgrünen Tannenwald verwandelte und durch geschickte Gruppierung lauschige Plauderplätzchen geschaffen hatte. Besonders augenfällig war die Anordnung der Käfige usw., die, fachmännisch aufgestellt, harmonisch geschlossene Bilder gaben. Nun zu den einzelnen Ausstellungsobjekten. Beim Eintritt fesselte den Besucher eine hübsche Gruppe Papageien der Fa. Frank in tadelloser Verfassung. Da war ein Ara, ein Doppelgelbkopf, großer und kleiner Gelbhaubenkakadu, letzterer sehr zahm, Graupapagei, Blaustirn- und Blaubartamazone, ein Peru- und zwei reizende, zahme Feuerflügelsittiche. Besonders bewundert wurde der Ara und der Doppelgelbkopf. Ein großer Käfig mit Kaktus-, Goldstirn- und Guatemalasittichen vervollständigte diese Gruppe. Rechts vom Eingang war ein von Kunstmaler A. Viegelmann originell errichteter Bücherladen untergebracht, der in liebenswürdigster Weise von der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung mit einschlägiger Literatur ausgestattet war. Der Stand erfreute sich lebhaften Besuches, allerdings nur von „Schaupublikum", und man hörte allenthalben sehr günstige Urteile über die Rührigkeit des Fachverlegers. Anschließend kam das Reich des bayr. Vogelliebhabervereins und hier eröffnete den Reigen wieder Herr Frank mit einer Auswahl Fremdländer, die durchweg einen sehr guten Eindruck machten. Da waren Schama- und Dayaldrosseln, ein Klarino und Trupiale; außerdem Seiden-, Dreifarben- und Soldatenstare, rote, graue und Dominikanerkardinäle, Purpur-, Trauer- und meerblaue Tangaren, eine Hahnschweifwitwe, ein Büffelweber und eine Einfarbdrossel. Dazwischen waren reizende, besetzte Wachtelhäuschen, zwei Graupapageien und ein roter, sehr schöner Edelpapagei aufgestellt. Ein Flugkäfig mit einem Pärchen Baumwachteln, Lachtauben und einer heimischen Wasserralle, ein dressierter, zahmer, vielbewunderter Zeisig im eigenen Käfig mit Futterkarren und Ziehbrunnen bildeten den Schluß dieser farbenprächtigen Sammlung. Gegenüber befand sich die Käfiggruppe des Herrn Rosenberger. Diese Käfige, die in ihrer vornehmen, gediegenen Aufmachung jedem Salon zur Zierde gereichen konnten, entsprachen dem in München üblichen Käfigtyp. „Münchner Käfige" beherrschten auch zum großen Teil die Ausstellung und wurden mit Kennerblick bewundert. Die Gruppe Rosenberger beherbergte eine Nachtigall, je eine Sperber-, Garten- und Mönchgrasmücke, ein Rotkehlchen und eine Feldlerche. Herr Kurz stellte einen Sprosser, eine Nachtigall, verschiedene Grasmücken, ein Blau- und ein Rotkehlchen und eine Feldlerche aus; außerdem eine Sammlung heimischer Finken, darunter sehr schöne, selbstgezüchtete Hänflings- und Stieglitzbastarde. Eine reizende Sammlung war die Gruppe Wagenbauer; das Flughaus mit heimischen Finken, Meisen und Zaunkönig und Einzelkäfige mit Sprosser, Nachtigall, Garten-, Dorn- und Mönchgrasmücken, Rotkehlchen und Feldlerche. Herr Seufert stellte einen Star, einen Kernbeißer, eine Wachtel, eine Drossel und einen Baumpieper aus. Herr Türwinkel mit einem Rotkehlchen, einer Nachtigall, einem Buchfink, einer Lerche, einem Rohrammer und einem flott singenden, schön gezeichneten Stieglitzbastarden, und die Herren Siml & Falk mit heimischen Erdsängern und Grasmücken schloß die reiche Kollektion der Münchner Käfige. Ein schönes Bild gab ein Flughaus mit Meisen, in deren Haltung dieser sich und die Herren Zierer, Engl sen. und Kaiser jun. teilen. Ich stellte einen Kuckuck, der in tadellosem Federkleid sich in geradezu vornehmer Ruhe bewundern ließ; außerdem zwei zahme, sehr schöne Steinkäuzchen, eine Waldohreule, einen Pirol und eine prachtvoll verfiederte Nachtigall. Nicht zu vergessen sind unsere Wiener Freunde, die die Reise hierher nicht gescheut hatten und in eigenen Wiener Käfigen eine reinweiße Feldlerche, ein Wiener Waldplattl und einige Nachtigallen und Sperbergrasmücken ausstellten. Der Wiener Delegation, bestehend aus den Herren Salinger und Janouschek, zu Ehren wurde am ersten Ausstellungstag ein Ehrenabend gewidmet, über dessen Verlauf in der „Gef. Welt" schon berichtet wurde. Die „Musil-Käfiggruppe", benannt nach deren Hersteller Herrn Musil (München), war in ihrer Eigenart ein hervorragendes Ausstellungsobjekt. Mit welcher Liebe und Exaktheit diese Käfige gemacht sind, kann nur ein Vogelliebhaber beurteilen und die Besucher waren des Lobes voll über das Gesehene. Die darin beherbergten Vögel des Herrn Flierl,

Zaungrasmücke wärmt Junge. Aufnahme von G. Wolff-Schötmar.

Fischer, Rieger und Egger, darunter Steinrötel, Sprosser, Nachtigallen, Sumpfrohr- und Weidenlaubsänger, Sperber-, Garten- und Mönchgrasmücken, Blau- und Rotkehlchen, Gelbspötter, Heidelerche und Braunelle kamen sehr vorteilhaft zur Geltung. Gegenüber die Gruppe des Herrn Schwindler war in ihrer Ausführung ganz neuartig und die ruhig gehaltene Tönung der Lasur und die moderne Richtung konnten auch einmal an Vogelkäfigen bewundert werden. Der Besitzer stellte in seinen Käfigen je eine Nachtigall, Drossel-, Sperber-, zwei Mönchgrasmücken und ein Rotkehlchen zur Schau. Sehr interessant waren auch die verschiedenen Käfigtypen. Man konnte dort außer den bekannten Münchner, Musil- und Wiener Käfigen, noch Nürnberger und Schindlerkäfige und einen nach dem neuen Heidelberger Modell, zu kritischen Vergleichen gegenüberstellen. Auch Futterproben nach Prof. Fehringer als sog. „Heidelberger" bekannt und „Ornis"-Futter" waren bereitgestellt. Daran reihten sich weitere Käfiggruppen mit den schönen Jendayasittichen des Herrn Ottinger, ein großer Flugkäfig mit Exoten des Herrn Altmann, meine Käfige mit kleinen Alexander-, Goldstirn- und Kaktussittichen, Herr Uhlmann mit Erlen-, Zitronen- und Meerzeisigen, Herr Neumayr mit heimischen Finken usw. Hervorzuheben wären noch ein Flußuferläufer, ein Bläßhuhn und ein Wendehals des Herrn Schimang und viele einzelne Tiere, wie Dohlen, Wachteln, Rebhühner, Stare, eine reizende zahme Rauchschwalbe des Herrn Mayerhofer, fremdländische Finken verschiedener Aussteller, die ich nicht alle einzeln aufführen kann. Soweit die Schau des Bayr. Vogelliebhabervereins.

Nun zur Abteilung des deutschen Verbandes. Wie schon im Katalog vermerkt, stellte das Gebotene nur eine kleine Auslese der reichen, vielseitigen Erfolge der Bestrebungen des deutschen Verbandes dar. Die ausgestellten Tiere waren, wenn sie auch nicht in der gewohnten, großen Kopfzahl eingeliefert wurden, doch sämtlich als hervorragend zu bewerten. Die Holländerkanarien der Züchter-Altmeister Ziegler und Heinemann stellen wohl nun bald die „letzten Mohikaner" dieser interessanten Zuchtrichtung dar und mit Wehmut denkt man zurück an die Jahre, wo diese Vogelgattung ganze Ausstellungen füllte und in allen Farben zu sehen waren. Heute auf dem Aussterbeetat gesetzt, wird es wohl kaum mehr möglich sein, nochmals auf die frühere Höhe zu kommen, weil Kreuzungsmaterial nicht mehr zu erhalten ist, da die Provinzen Nordfrankreichs, in denen diese Vögel gezüchtet wurden, während des Krieges Operationsgebiet waren. Als Ersatz, oder noch besser, um von den belgischen und englischen Märkten unabhängig zu werden, erstand jüngeren Datums ein deutsches Erzeugnis, der „Münchner Gestaltfarbenkanarienvogel". Die Zucht dieser Richtung, der Eigentyp des deutschen Verbandes, findet besonders in München seine Pflege und an Hand der ausgestellten Tiere konnte ein schöner Schritt vorwärts gebucht werden. Mit Genugtuung wurde wahrgenommen, daß die Tiere konstante Durchzucht verraten und in allen Farbenschlägen zur Schau standen. Zu den bekannten Tönen stroh- und hochgelb, braun, grün und den dazwischen liegenden Schattierungen, erregte ein reinweißes Exemplar in tadelloser Bogenstellung und Größe berechtigtes Aufsehen. Nicht lange wird es mehr dauern, wird auch der Gestaltsfarbenvogel in neueren Tönen schieferblau-, silber- und goldbraun rein und in Zeichnung vertreten sein. Von der Kategorie der Gestaltsfarben stellten aus die Herren Heinemann, der auch das reinweiße Tier gezüchtet hat, Ziegler, Redl und Friedl je mit mehreren Kollektionen, die durchweg einen sehr vorteilhaften Eindruck machten. Besonders die grünen und braunen Tiere des ersteren waren tadellos nach dem Rasseschema und die Preisrichterurteile sind auch danach ausgefallen; die Edelgoldkanarien Zieglers, eine Spezialzucht dieses weit über die deutschen Grenzen hinaus bekannten Züchters, waren auch diesmal wieder vertreten und verdienten in Figur sowohl wie in Farbe die ihm gezollte Anerkennung. Eine Kollektion ungehaubter, cayennegefütterter Norchwichkanarien in dieser Gruppe brachten ihrem Besitzer, Herrn Frank, ebenfalls ungeteilten Beifall. Leider konnten diese sehr schönen Tiere einem Preisrichterurteil nicht ausgesetzt werden, da Rassenmerkmale englischer Vögel nicht zum Reglement des deutschen Verbandes gehören, der sich ausschließlich, wie ja schon der Name sagt, mit deutschen Zuchtrichtungen befaßt. Die Gruppe „Gesangsfarben" bot eine reizende Auswahl. Die Herren Bibrack, Pöttl, Heinemann, Redl und Friedl hatten hier Auserlesenes ausgestellt. „Gesangsfarben in sieben Farben" konnte man hören und Zweifler, deren es genug gab, mußten erst durch diese Zusammenstellung belehrt werden. Es waren da weiß, weißblaubunt, weißbraunbunt, silberbraun, goldbraun, grün und rein schieferblau, die paarweise, gleichgezeichnet zur Schau standen und ihrem Züchter, Herrn Heinemann, Anerkennung eintrugen. Die Abteilung Bastarde war von den Herren Egger und Frank beschickt und unter den Hänflings- und Stieglitzbastarden waren sehr schön gezeichnete Exemplare. Ein farbenfrohes Bild bot die letzte Gruppe des Verbandes: Exoten. Die Gruppe zog wohl die Beschauer und Kenner am meisten an und dort waren auch Raritäten, die manchem das Exotenherz höher schlagen ließen. Gouldamadinen, rot- und schwarzköpfige, des Herrn Diem waren ausgesucht schöne Tiere, die viel bewundert wurden. Blaue Wellensittiche und weiße Reisfinken des Herrn Frank ebenfalls in ausgesuchter Verfassung. Besonders die blaue Spielart der Wellensittiche, in München noch nicht gezeigt, fand viele Bewunderer. Dann die große Familie der Pracht- und anderer ausländischer Finken, demselben Aussteller gehörig, füllten ganze Reihen von Käfigen. Ich will nur die schönsten herausgreifen: Papst- und Indigofinken, Schuppenköpfchen, große und kleine Kubafinken, Schmuck-, Weißstirn- und Weißkehlpfäffchen, Malabarfasänchen usw. Etwa 90 Nummern umfaßte diese Gruppe und darunter manch interessante Vertreter. Zum Schluß noch die „Vierfüßer", ein Nasenbär, ein Hundspavian, drei Nonnen- und Dickkopf-Kapuzineräffchen trugen viel zur allgemeinen Heiterkeit bei und waren natürlich stets dicht umlagert. Die „Weltbundesgruppe Oberbayern" stellte 49 Kollektionen Gesangskanarien zur Konkurrenz, die um die Palme des Sieges stritten. Abschließend möchte ich nicht vergessen alle jene zu

nennen, die hervorragenden Anteil an dem Gelingen der Sache hatten. Frau Kurz als unermüdliche, mit viel Sachkenntnis ausgerüstete Futtermeisterin; Künstlermitglied A. Viegelmann für die Herstellung des Katalogumschlagbildes und der Schaustellung seiner reizenden Zoo-Tiere usw. Der Dank gilt auch allen Mitgliedern, die mit ihrem Vogel- und Käfigmaterial oder in sonst einer Hinsicht beteiligt waren, und da besonders Herr Frank, den wir als langjähriges Mitglied nicht nur als reellen Geschäftsmann, sondern noch mehr als erfahrenen Liebhaber zu schätzen wissen, der auch während der Inflationszeit die Vereine und Liebhaber über Wasser halten half; außerdem noch die Vereinigung „Ornis", die in Anerkennung der Sache eine Plakette mit Diplom stiftete. Besonders gefielen auch die ebenfalls von einem Künstlermitglied, Herrn Hans Lindl, hergestellten und heuer erstmalig ausgegebenen Verbands-Plaketten und Plaketten für den Bayer. Vogelliebhaberverein. Im übrigen glaube ich, daß die Ausstellung, die sehr gut besucht war und in langen Artikeln in der Presse genügend gewürdigt wurde, ihren Zweck erfüllt hat — sollte doch dem großen Publikum gezeigt werden, daß sich der Vogel in der Gefangenschaft nicht unglücklich fühlt, damit endlich einmal dieser Köhlerglaube aus der Welt geschafft wird.

Rotschwänze — Phoenicurus *(Forst.)*.

Eine Monographie von John Kuntzendorff.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der zentralasiatische Riesenrotschwanz — Erithacus grandis grandis *(Gould.)*.

Dem kaukasischen Riesenrotschwanz in Gestalt und beinahe in Färbung gleich ist der zentralasiatische Riesenrotschwanz, und er unterscheidet sich von jenem durch matteres Schwarz, helleres, mehr gelbliches Kastanienbraun, unreine weiße Kopfplatte und größeren Flügelspiegel.

♂ ad. Oberkopf, Hinterhals weiß, ganz schwach hellgräulich verwaschen, im Herbstgefieder mit grauen Federrändern; schmales Stirnband, Zügel, Kopf- und Halsseiten, Rücken, oberer Teil des Bürzels jedoch nicht ganz so weit reichend wie bei E. gr. erythrogaster, Kinn, Kehle, Kropf mattschwarz, an Kinn und Kehle mit schieferartigem Schimmer; unterer Teil des Bürzels, Oberschwanzdecken, Brust, Bauch, Unterschwanzdecken lebhaft gelblich kastanienbraun; Schwingen schwarz, Handschwingen an der Basis etwa ein Viertel, Armschwingen etwa drei Viertel weiß, einen großen Flügelspiegel bildend, größer als bei E. gr. erythrogaster; Schwanzfedern kastanienbraun, etwas dunkler als Oberschwanzdecken, mittelstes Paar schwach angedeutet dunkler und übrige Federn mit nur schwach angedeuteter dunklerer Endbinde, die zuweilen ganz fehlt; Schenkel schwärzlichbraun; Auge braun, Schnabel, Füße schwarz. ♀ ad. Heller und etwas mehr sandfarben als das ♀ E. gr. erythrogaster. Junge ♂ haben im Jugendgefieder, besonders im Herbst, am Oberkopf die Federränder deutlicher grau, auch ist der Unterflügel weniger rein schwarz, die Flügel- und Handdecken sind sehr fein weißlich gesäumt, die Kehle maulwurfsgrau, unterseits die Federn weiß gespitzt und die Schwanzfedern dunkler gefärbt. Kleinschmidt gibt als Maße der Flügel an: ♂ 102—107, ♀ 97—100, ♂ juv. 100—105 mm; aus der Wüste Gobi ♂ juv. 105, ♀ 103. Hartert verzeichnet wiederum als Flügellänge für die westlichen Vögel Fl. 102—107 mm, für die östlichen Vögel 102—110.5 mm; Pleske für solche aus Nordtibet Gansu gleichfalls bis 110.5 mm.

Nach Angaben Kleinschmidts, Harterts und Pleskes erreichen die östlichen Vögel eine erheblichere Größe als die westlichen, da bei diesen, nach den gemessenen Bälgen zu urteilen, Flügellängen von über 107 mm nicht vorkommen, während andererseits solche von unter 102 mm bei den östlichen nicht gefunden worden sind. Dasselbe Resultat habe ich bei den von mir untersuchten Bälgen erhalten; während die westlichen Vögel eine Flügellänge von 100—107 mm und eine Schwanzlänge von 75.5—83.5 aufweisen, zeigen die östlichen Vögel solche von 105—109.5 resp. 83—84.5 mm. Es hat daher den Anschein, daß die

Dorngrasmücke auf dem Nestrand. Aufnahme von G. Wolff-Schötmar.

östlichen Vögel sich durch erheblichere Größenmaße, somit auch Körperlänge auszeichnen — was bei dem kolossal ausgedehnten Verbreitungsgebiet dieses Vogels nicht zu verwundern ist — und wäre hier vielleicht eine Trennung der östlichen Vögel von den westlichen am Platze. Kleinschmidt wies schon auf diese eventuell nötige Spaltung von E. gr. grandis hin und schlug für diesen Fall für die östlichen Vögel den Namen „vigorsi" *(Moore)* vor. Berajah 1908. St. 1. Erithacus Grandis *(Kl.)*. Ich schließe mich Kleinschmidt an und betone jedoch, daß es durchaus wünschenswert wäre, wenn noch mehr Bälge E. gr. grandis für Untersuchungen zur Verfügung ständen, hauptsächlich auch von ♀♀ der östlichen Vögel, damit man zu einer endgültigen Klärung dieser Frage schreiten könne. Außerdem weise ich noch darauf hin, daß die vier östlichen von mir untersuchten Bälge eine grauere Kopfplatte aufweisen, als die ♂♂ der westlichen.

Das Verbreitungsgebiet des zentralasiatischen Riesenrotschwanzes dehnt sich über Turkestan, von Semiretschensk bis nach Ost-Turkestan, Afghanistan, Tibet, Kaschmir, das Himalajagebiet bis Sikkim und im Osten über die Gebirge der Mongolei vom Altai

an, Transbaikalien, Amdos, Kuku-nor und Kansu. Er lebt als ausgesprochener Gebirgsvogel in den höheren und höchsten Regionen der Gebirge; auch wurde er in kahlen, baumlosen Gebirgsteilen festgestellt. An den Ufern reißender Gebirgsgewässer, besonders mit kiesigem und steinigem Boden, wurde er hauptsächlich angetroffen. Menschlichen Wohnstätten bleibt er fern. Zur Brutzeit geht er sehr hoch ins Gebirge und lebt dort nach Pleske in 4000 m Höhe im Felsengeröll; bei Ladak in Tibet ist er in einer Höhe von 4800 m brütend angetroffen worden. Der Angabe Jerdons, er brüte in Büschen, setze ich einigen Zweifel entgegen, denn nach dem Aufenthalt und der Lebenweise ist das Brüten in Erd- oder Felslöchern oder -spalten eher zu erwarten. Die Eier sind einfarbig blau bis blaugrün gefärbt. Im Winter soll er nach Pleske in den Dickichten von Hippophae ramnoides leben.

Es ist sehr zu bedauern, daß diese an Farbenpracht schönsten Rotschwänze im Handel bei uns in Deutschland noch nicht erhältlich sind. Wie sehr sie durch ihr lebhaftes Wesen und ihre Farbenschönheit zur Belebung einer Voliere beitragen würden, braucht weiter nicht ausgeführt zu werden. Man stelle sich nur den schneebedeckten Außenflug eines Vogelhauses vor, auf dessen im kleinen ausgeführte Gebirgsimitation sich diese herrlichen Vögel herumtummeln; wie wunderschön müssen sich ihre leuchtenden Farben von der weißen Schneedecke abheben und wie interessant muß es für den Pfleger sein, diese Vögel in einem Stückchen — wenn auch nur nachgeahmten — Heimat beobachten zu können, wie hochinteressant muß es sein, ihr Leben und Treiben zu belauschen. Könnte man doch — ich möchte nur darauf hinweisen — viele wertvolle Schlüsse auf ihre Lebensgewohnheiten ziehen. So manchen wird wohl das Verlangen nach dem Besitz dieser prächtigen und wertvollen Tiere übergroß geweckt werden, aber leider ist alles das nur ein frommer Wunsch, ein schöner Traum des Vogelliebhabers. Hoffen wir aber, daß die Zeit nicht allzu weit entfernt ist, in welcher dieses Sehnen so vieler in Erfüllung geht.

(Fortsetzung folgt.)

Fütternde Mönchgrasmücke. Aufnahme von G. Wolff-Schötmar.

Liebhaberei und exakte Forschung.

Von Dr. Wagner, Bad Salzbrunn.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

2. Eine weitere Untersuchung bewegte sich in ähnlicher Richtung, wie die eben beschriebene, hatte aber Hafer zum Gegenstande. Ich benutze seit Jahren, gleich dem Verfasser der oben erwähnten Arbeit über die Fütterung ausländischer Körnerfresser, eingequellten Hafer bei der Aufzucht von Wellensittichen, allerdings setze ich zum Einquellen 5 g rohe Salzsäure auf 1 Liter Wasser zu. Näheres vgl. „Ges. Welt" 1922 S. 46. Dieser Zusatz hat vor allem den Vorteil, daß er die sonst leicht im Sommer eintretende Fäulnis oder Schimmelbildung verhindert. Außerdem befördert er das „Aufschließen" des Mehlkörpers. Mit diesem Verfahren habe ich bisher nur gute Erfolge gehabt. Beim Studium älterer Jahrgänge der „Ges. Welt" fand ich eine Bemerkung, die den Säurezusatz verwirft, und zwar heißt es im Jahrgang 1911 S. 26 in einem Aufsatz von Dr. Otto: „Einweichen der Körner in Salzsäure ist anorganisch. Die Salzsäure macht die Tiere krank." Wodurch diese Erkrankung zustande kommt, sagt Dr. Otto an dieser Stelle nicht. Man kann aber aus seinen übrigen Ausführungen schließen, daß der Nachteil des Salzsäurezusatzes darauf beruht, daß dadurch den Körnern „Nährsalze" entzogen werden. In diesem Sinne ist wohl auch der merkwürdige Ausdruck „Erweichen der Körner ist anorganisch" zu verstehen.

Um den Einfluß der Salzsäure auf den Einquellungsvorgang des Hafers kennenzulernen, stellte ich folgende beiden Versuche nebeneinander an. Bei Versuch a wurden 50 g Hafer mit 200 ccm destilliertem Wasser übergossen, bei Versuch b wurden statt des reinen Wassers 1 g rohe Salzsäure + 199 ccm Wasser angewendet. In beiden Versuchen wurde die Einwirkung des Wassers bez. Salzsäurewassers auf 48 Stunden ausgedehnt. Nach dieser Zeit wurde in der gleichen Weise wie bei der Hirse die Flüssigkeit von den Körnern getrennt. Es wurden je 160 g Flüssigkeit erhalten, in der die gelösten Stoffe (Extrakt), Mineralbestandteile und Zucker bestimmt wurden. Dabei ergab sich folgendes: Versuch a (mit reinem Wasser). Gelöste Stoffe (Extrakt) 0,5049 g, Mineralbestandteile 0,2022 g, Zucker 0,0608 g. Versuch b (mit salzsäurehaltigem Wasser). Gelöste Stoffe (Extrakt) 0,4192 g, Mineralbestandteile 0,2985 g, Zucker 0,1000 g. Wenn wir die beiden Untersuchungsergebnisse genauer betrachten, so fällt uns vor allem auf, daß die Menge der gelösten Stoffe beim Versuch a, also mit reinem Wasser größer ist, wie bei b. Es ist das kein Zufall oder Analysenfehler, sondern durch wiederholte Versuche bestätigte Tatsache. Die Sache erklärt sich daraus, daß gewisse schleimige Bestandteile des Haferkorns von dem säurehaltigen Wasser schwerer gelöst werden wie von reinem. Weiter sehen wir, daß von dem säurehaltigen Wasser etwas mehr Mineralbestandteile gelöst werden, wie von dem reinen Wasser. Nach meinen Feststellungen enthalten 50 g Hafer insgesamt 1,738 g. Der Verlust an Mineralbestandteilen beim Quellen in reinem Wasser beträgt also etw

1/8, in salzsäurehaltigem Wasser 1/6 der Gesamtmenge. Dabei kann man bestimmt annehmen, daß der größte Teil der vom Wasser aufgenommenen Mineralbestandteile aus der kieselsäurereichen harten Fruchtschale stammt. Ist an sich der Verlust des Haferkornes an Mineralbestandteilen beim Quellen schon ohne Bedeutung für die Ernährung der Vögel, so erscheint er noch unerheblicher, wenn wir beobachten, daß die Vögel ja fast nur den mineralstoffarmen Mehlkern zu verzehren pflegen, während sie die mineralstoffreicheren Teile, die Frucht- und Samenschale liegen lassen. Betrachten wir nun weiter den Zuckergehalt der wässerigen Auszüge des Hafers, so finden wir zwar beim salzsäurehaltigen Wasser einen höheren Wert, wie beim reinen Wasser, aber selbst im ersteren Falle ist die absolute Menge des Zuckerverlustes 0,1 g auf 50 g Hafer so unbedeutend, daß dieser gar keine Rolle spielt.

Sollte aber die Dr. Ottosche Behauptung, „die Salzsäure macht die Tiere krank", sich darauf be-

Köhleramsel
(s. S. 258).

sehen, daß die schwach saure Reaktion der mit salzsäurehaltigem Wasser eingequellten Körner den Vögeln schadet, so weise ich darauf hin, daß man dies leicht vermeiden kann, indem man, wie ich das auch angegeben habe, die Körner 24 Stunden in salzsäurehaltigem und weitere 24 Stunden in reinem Wasser einweicht. Dann wird die Salzsäure wieder vollständig entfernt. Andererseits geben viele Vogelfreunde mit gutem Erfolge Salzsäure als Arzenei, ohne je eine krankmachende Wirkung beobachtet zu haben. Demnach ist die Warnung vor dem Einquellen in salzsäurehaltigem Wasser ganz und gar unbegründet. Das Verfahren kann im Gegenteil warm empfohlen werden.

3. Auch die Anregung zu der dritten Untersuchung, über die ich berichten will, verdanke ich der „Gef. Welt", und zwar wiederum einer Arbeit von Dr. Otto. Im Jahrgang 1910 Seite 387 finden wir eine „Nährsalztabelle der Futtermittel für Körnerfresser" von Dr. med. Otto. Unter vielen andern Futterstoffen ist auch die Vogelmiere erwähnt, und zwar ist angegeben, daß sie einen Gesamtnährsalzgehalt von 13 % (dreizehn Prozent) habe. Diese Angabe erschien mir von vornherein unrichtig. Ich habe sie daher nachgeprüft, und zwar habe ich schöne vollsaftige Pflanzen verwendet. Die eine Untersuchung erfolgte im Juli 1923, die andere im Oktober desselben Jahres, da immerhin die Möglichkeit bestand, daß im Herbst eine Anreicherung an Mineralstoffen in der Vogelmiere erfolgt. Das Untersuchungsergebnis war folgendes: a) Vogelmiere vom 9. Juli 1923. In 100 g Vogelmiere sind enthalten: Wasser 91,47 g, Mineralbestandteile 2,05 g. b) Vogelmiere vom 17. Oktober 1923. In 100 g Vogelmiere sind enthalten: Wasser 91,36 g, Mineralbestandteile 2,11 g. Das Ergebnis ist sehr bemerkenswert, da es uns zeigt, daß die zu ganz verschiedener Zeit und von verschiedenen Standorten entnommenen Pflanzen genau übereinstimmende Werte für Wassergehalt und Mineralstoffgehalt aufweisen. Wie sind aber die gefundenen Zahlen mit den Ottoschen Angaben vereinbar? Es ist das nur so zu erklären, daß sich die Ottoschen Angaben auf den Gehalt der wasserfreien Pflanze an Mineralbestandteilen beziehen, obwohl darüber jegliche Angaben fehlen. In diesem Falle würden meine Zahlen sich von 2,05 bzgl. 2,11 g auf 14,4 bzgl. 24,0 erhöhen. Diese Zahlen wären aber wieder annähernd doppelt

so groß wie die Ottosche (13 %), immerhin ist denkbar, daß auf sehr magerem Boden Vogelmiere mit 13 % Mineralbestandteilen, bezogen auf Trockensubstanz, vorkommen könnte. Es ist aber ganz und gar unzulässig, ohne nähere Erklärung anzugeben, Vogelmiere habe 13 % Mineralbestandteile, wenn diese Angabe sich auf die vollständig ausgetrocknete Pflanze (Trockensubstanz) bezieht. Daß dem Autor diese Verhältnisse gar nicht klar geworden sind, geht daraus hervor, daß in derselben „Nährsalztabelle" einige Zeilen unter der Vogelmiere die Kuhmilch mit 0,7 % Nährsalzen angeführt ist, eine Zahl, die sich auf das unveränderte Stallprodukt, also nicht auf Trockensubstanz bezieht.

So ist auf Grund mißverstandener Analysenergebnisse und mit Hilfe von viel Phantasie das s. Z. bewunderte Dr. Ottosche Nährsalzsystem entstanden, daß in der Ablehnung des organischen Kalks seinen Gipfelpunkt erreichte. In vortrefflicher Weise sind die Dr. Ottoschen Behauptungen zum großen Teil von Heindl („Ges. Welt" 1911 S. 114 und von Lauer „Ges. Welt" 1914 S. 406, 1917 S. 12, 1919 S. 26 und 43) widerlegt worden.

Wenn man die Analysen der vielen im Handel befindlichen Nährsalze studiert, wie Nährsalz Demme, Nährsalze Schäffer, Nährsalze Winter, Nährsalz Hensel, Nährsalz Makrobion, Nährsalz Plantol, Nährsalzpräparat Dr. Morck, Nährsalz Schloß Bergfried, Nährsalztabletten Dr. Ullersberger und die große Anzahl der mit Nährsalzzusatz hergestellten Präparate, wie nährsalzhaltiges Apfelpulver, Nährsalzkaffee, Nährsalzkakao, so muß man zu dem Schluß kommen, daß der Begriff Nährsalz kein klarer, fest umschriebener ist, sondern sehr verschieden ausgelegt wird, denn alle genannten Erzeugnisse sind in der Zusammensetzung verschieden. Größtenteils allerdings bestehen sie aus den Chloriden, Sulfaten und Phosphaten von Kalium, Natrium, Calcium, Magnesium und Eisen oder einigen davon. Dr. Otto sieht die bei der wissenschaftlichen Analyse aufgefundenen „Mineralbestandteile" als gleichbedeutend mit Nährsalzen an. Dabei ist aber wohl zu beachten, daß die in der lebenden Pflanze vorhandenen Verbindungen der genannten Basen ganz andere sein können, als in den durch Zerstörung der organischen Pflanzenbestandteile in gelinder Glühtemperatur gewonnenen Mineralbestandteile der chemischen Analyse. Calcium, das in der Analyse gewöhnlich als Carbonat erscheint, ist in der Pflanze als oxalsaurer Kalk (Calciumoxalat) sehr verbreitet. Es wird sich fragen, ob man diese in größerer Menge giftig wirkende Verbindung als Nährsalz ansehen darf (Vergiftung von Ziegen nach dem Genuß von Rhabarberblättern). Der Schwefelsäurerest der Sulfate (S 03) kann vorher als Schwefel im Eiweiß gebunden gewesen sein, der Phosphatrest (P 04 H) kann als Phosphatid (z. B. Lecithin) vorhanden gewesen sein. Man würde also gut tun, den Begriff „Nährsalz", wenigstens in wissenschaftlichen Arbeiten, auszuschalten. Was wissen wir denn überhaupt bis jetzt von dem Mineralstoffwechsel der Vögel? So gut wie nichts!

Selbst über den Mineralstoffwechsel des Menschen sind unsere Kenntnisse noch lückenhaft. Allerdings hat uns die neuere Zeit auf diesem Gebiet zwei ausgezeichnete Arbeiten gebracht, die vielleicht die Grundlage für ähnliche Forschungen in der wissenschaftlichen Vogelkunde abgeben könnten. Ich meine die Arbeiten Prof. H. Leo, Bonn, „Über Synergismus und Antagonismus in der Balneologie" (Veröffentlichungen der Balneologischen Gesellschaft in Berlin 1922 S. 165 und „Über die antionkische Wirkung der Mineralwässer von Professor H. Schade, Kiel (Veröffentlichungen aus dem Gebiete der Medizinalverwaltung XVIII. Band, 8. Heft, S. 51.) Wir lernen da die quellungsfördernde Wirkung der Natrium-



Enchyträen (s. S. 259).

Ionen auf die Schleimhautzelle und die entquellende der Calcium- und Magnesium-Ionen kennen. Wir hören von der entzündungswidrigen Wirkung der Kieselsäure u. dgl. Hier bietet sich für unsere junge Veterinärmediziner, Zoologen und auch Chemiker ein dankbares Feld wissenschaftlicher Betätigung, die auch der Liebhaberei zum Segen gereichen würde.

Aufgabe der Wissenschaft ist es, das, was die erfahrenen Praktiker seit langen Jahren erprobt haben zu erforschen und zu ergründen, Irrtümer zu beseitigen und falsche Vorurteile abzustreifen und auf der Grundlage dieser Erkenntnis aufbauend der Praxis neue Wege zu weisen.

Kleine Mitteilungen.

Meine Köhleramsel (briefl. Mitteil.) (s. Abb. S. 25 ist jedenfalls ein junges Tier, denn der in Ihrem We erwähnte weiße Fleck am Bauch fehlt, und der Gesa ist dann auch entsprechend der eines Jungtieres, leise, me

ein Studieren, ähnlich wie das der Singdrossel im Winter. Es kommen schöne, klare Rufe darin vor, auch Pfiffe, ähnlich dem Starengeplauder, aber allgemein ist der Gesang nicht lauter als der eines Rotkehlchens. Vielleicht wird der Vogel mit zunehmendem Alter auch lauter. Bemerken will ich noch, daß die Köhleramsel im vergangenen Januar in die Mauser ging, die sie in vier Wochen glatt überstand, und jetzt ist der Vogel prachtvoll im Gefieder. K. Durau.

Enchyträen. Wohl mancher Vogelliebhaber wäre geneigt, außer den weniger empfindlichen Insektenfressern, auch die zarten dieser Art zu halten, wenn Eingewöhnung und Pflege derselben nicht mit besonderen Schwierigkeiten verbunden wäre. Da sind z. B. Rohrsänger, Goldhähnchen, Zaunkönige, Laubsänger usw., welche in der Regel in Ermangelung eines geeigneten, lebenden Futters in den ersten Tagen ihrer Käfigung, eingehen. Liebhaber, welche derartige trübe Erfahrungen gemacht haben, verlieren wohl meistens die Lust, diese Art Vögel nochmals zu käfigen. Hat man dagegen ein geeignetes, lebendes Futter zur Hand, so ist die Eingewöhnung dieser zarten Vögel sehr leicht und werden dieselben dem Liebhaber viel Freude bereiten. Es kommen hier in erster Linie außer Mehlwürmern, die sogenannten Enchyträen, kleine 1—2 cm lange und nadelstarke Röhrenwürmchen in Betracht, welche in guter Garten- oder Walderde leicht zu züchten sind, und infolge ihrer schnellen Vermehrung bei richtiger Behandlung stets ausgiebigen Ertrag liefern. Auch der empfindliche Vogelfreund kann diese Würmchen züchten, da wir hier mit Maden, eklem Geruch usw. nichts zu tun haben. Eine richtig behandelte Zuchtkiste mit Enchyträen ist fast geruchlos und kann an jedem beliebigen Ort untergebracht werden. Unseren alten Vogelkennern sind die Enchyträen wohl als ein vorzügliches Futter für zarte Vögel bekannt. Ich verwende diese Würmchen seit Jahren zur Eingewöhnung und als Beigabe für Insektenfresser und habe stets die besten Erfolge damit gehabt. Während der Mauserzeit sind mir dieselben fast unentbehrlich. Auf die Zucht der Enchyträen will ich an dieser Stelle nicht näher eingehen, da Zuchtkisten gut bevölkert mit genauer Zuchtanweisung von mir laufend zu beziehen sind. (Siehe Inserat in Heft Nr. 14.) Bemerken möchte ich noch, daß Enchyträen auch für Aquarienfische und Terrarientiere das beste Futter sind, und sich im Wasser lange lebend halten, daher keinerlei Fäulnis bilden.

H. v. d. Höh, Köln a. Rhein.

Unterscheidung der Männchen und Weibchen beim japanischen Mövchen. Im Oktoberheft Nr. 34 des letzten Jahrganges der „Gef. Welt" macht Herr Max Beyer darauf aufmerksam, daß beim japanischen Mövchen die Geschlechter nicht bloß nach dem überall angegebenen Erkennungszeichen des Gesanges des Männchens unterschieden werden können, sondern daß auch im gewöhnlichen Lockton zwischen den beiden Geschlechtern ein erheblicher Unterschied besteht, der zu ihrer Unterscheidung dienen kann. Vielleicht darf ich an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, daß dieses Unterscheidungsmerkmal von mir schon 1910 im 39. Jahrgang der „Gef. Welt" Seite 170 beschrieben wurde. Ich schrieb damals: „Ich wurde darauf zuletzt bei einem Paar Bronzemännchen aufmerksam; es fiel mir nämlich auf, daß der Lockruf der beiden Geschlechter deutlich voneinander abwich; denn während das Weibchen mit einem knarrenden „trerr, trerr, trerr . . .!" ruft, lockt das Männchen mit einem schleifenden „quoch, quoch . . . quirr!" Wie man sieht, ist der Unterschied in der Tat sehr bedeutend und er besteht auch bei den japanischen Mövchen, wie ein jeder sich leicht selber überzeugen kann." — Es freut mich nun heute, daß auf dieses Unterscheidungsmerkmal auch von einem anderen Liebhaber hingewiesen wird; außerordentlich wünschenswert wäre es aber, wenn seine Beschreibung auch in den Handbüchern über Vogelzucht usw. zu finden wäre, denn Anfänger in der Stubenvogelzucht werden gerne auf die dankbaren japanischen Mövchen hingewiesen, mit welchen sie auch hoffnungsvoll die ersten, leider oft vergeblichen Versuche beginnen, um erst nach Monaten und manchen vergeblichen Bruten feststellen zu müssen, daß sie gar kein richtiges Paar besessen haben. Was dieses Unterscheidungsmerkmal besonders wertvoll macht, ist, daß es sich bei einer Vogelart (japanische Mövchen und Bronzemännchen) vorfindet, deren Geschlechter in der Färbung und in der Gestalt absolut keine Unterschiede aufweisen. Der kleine Gesang des Männchens bildet allerdings nach wie vor ein ebenso sicheres und untrügliches Erkennungszeichen für die Männchen — aber eben nur für die Männchen. Wenn es sich darum handelt, unter frisch erworbenen Vögeln richtige Paare zusammenzustellen, dann wird man nie bestimmt sagen können, ob die nicht singenden Vögel vielleicht nicht doch auch Männchen sind, die nur gerade eben nicht zum Singen aufgelegt sind. Anders, wenn man sich an die Unterschiede im Lockton hält. Da ist es selbst beim Vogelhändler unter Hunderten von japanischen Mövchen möglich, sofort die gewünschten Geschlechter herauszusuchen. In solchen Fällen bin ich stets so verfahren, daß ich aus der Gesellschaft einen einzelnen Vogel herausfing und ihn allein in einen Käfig in der Nähe der anderen setzte. Er wird recht und bald recht ängstlich nach seinen Artgenossen zu rufen beginnen: wenn es nun mit einem hellen, knarrenden Lockrufe geschieht etwa wie „trerr, trerr", dann ist es bestimmt ein Weibchen, lautet der Ruf aber tiefer und schleifender, etwa wie „quoik, quoik", dann ist es ein Männchen. Ich habe mich schon seit mehr als zwanzig Jahren darnach gerichtet, und es ist mir noch nie vorgekommen, daß ich einen unrichtigen Vogel ausgelesen hätte. Unterschiede im Lockton zeigen übrigens auch manche andere Prachtfinkenarten, und zwar nicht bloß solche, deren Geschlechter gleichgefärbt sind, wie man vielleicht vermuten dürfte. So lassen bekanntlich nur die weiblichen Gouldsamadinen den Lockruf „witt, witt" ertönen, ebenso nur die weiblichen laugrünen Papageiamadinen das mäuseartige Pfeifen. Auch beim allbekannten Zebrafinken findet sich ein solcher Unterschied; außer dem ewigen Trompeten, das beide Geschlechter genau gleich ausstoßen, läßt das Männchen hin und wieder einen helleren Lockruf hören, den das Weibchen nicht besitzt, und zwar speziell bei australischen Importvögeln. Endlich weise ich auf die Schönbürzelchen und Elfenastrilde hin, deren Männchen, sobald sie einzeln sind, klangvolle flötende Lockrufe ausstoßen, die den Weibchen fehlen. Speziell bei den Schönbürzelchen gelingt es auf diesem Wege ebenfalls mit Sicherheit die Männchen zu erkennen, was sonst bekanntlich beinahe ein Ding der Unmöglichkeit ist.

Dr. H. Steiner, Zürich.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Volksverdummung oder Aufklärung! Wenn ich hier zu obiger Frage Stellung nehme, so tue ich dies aus folgenden Gründen. 1. Zur allgemeinen Aufklärung; 2. zur Verteidigung unserer Interessen. Eine hiesige größere Zeitung zeigt das Bestreben, jedem Leser etwas zu bieten. Auch uns Vogelliebhaber vergißt sie nicht. Leider kennt der leitende Redakteur keinen Brehm oder Naumann, sonst könnten wir nicht so oft lachen. Es ist nur schade um die Verdummung der breiten Volksmassen, die dadurch entsteht. So lesen wir im „Coblenzer General-Anzeiger" vom 13. Januar 1925, Nr. 9, im dritten Blatt unter Allerlei folgendes. Motto: Verborgene Wohnungen! Wörtlich wiedergegeben. „Ziegenmelker und Feldlerche lassen den Hausschlüssel nicht von außen stecken, um das Geheimnis ihres Hauses zu verraten, und wir hören von Laurence H. Saider im „American Forest and American Life", daß man beim Streifzug durch Wald und Feld an Dutzenden von Heimstätten, Wohnungen von Vögeln, Säugetieren und Insekten vorübergehen und nur einen geringen Prozentsatz davon erblicken kann. Manche dieser Geschöpfe sind geradezu genial im Verstecken ihres Wohnortes vor den menschlichen Riesen, die achtlos vorbeitraben." Nachdem nun die Rede ist von Feldlerche und Kolibri, geht es wörtlich weiter: „Auch der Specht und mehrere Fliegenfänger haben ähnliche Methoden und setzen ihre Nester sorgfältig auf kahle Äste (von mir gesperrt gedruckt!). Der Zaunkönig baut ein rundes dickes Nest im Schilf und hat eine eigenartige Weise, es unauffindbar zu machen. Da das Nest groß und nicht leicht zu verstecken ist, bauen die Zaunkönige mehrere, von denen eines benützt wird, die anderen dienen nur als Strohmänner. Das Männchen lockt zuweilen einen Eindringling zu einem leeren Nest, als ob es ihm zeigen wolle, daß keine Familie in der Nähe sei. Wenn eines noch nicht als Beweis genügt, führt es den Gast zu einem anderen leeren. Ein vorzügliches Schutzmittel für

das brütende Weibchen! Es gibt Vögel, die überhaupt keine Nester bauen, sondern deren Wohnungen dadurch verborgen sind, daß ihre Eier genau ihrer Umgebung gleichen. Die Eier des Habichts, die dieser auf den Boden legt, meist auf flache Steine, ähneln dem Untergrund so sehr, daß sie fast unsichtbar sind." Soweit diese Ausführungen. Ich habe noch keinen Specht gesehen, der sein Nest „sorgfältig" auf kahle Äste setzte. Und einen Habicht, der seine Eier auf flache Steine auf den Boden legt, suche ich auch vergebens. Es fragt sich nur, wie solche Artikel in einer von akademisch gebildeten Redakteuren geleiteten Zeitung veröffentlicht werden können. Meiner Ansicht nach war die kostenlose Redaktionsschere der ausschlaggebende Punkt. Und was im „American Forest and Life" steht, ist doch sicher richtig. Da lacht die ganze Ornis! Vor kurzer Zeit leistete sich diese Zeitung auch den Witz, daß in einer Novelle ein Liebespärchen in Eis und Schnee in winterlicher Waldeinsamkeit dem Gesange der Nachtigall lauschte. Arme Philomele! Ob du nicht einem Zaunkönig glichest, oder ob du nur in der Phantasie eines armen Schriftstellers schlugst? Eine andere hiesige Zeitung, die jedoch Lehre angenommen hat, weshalb ich sie auch nicht nenne, frischte vor längerer Zeit das alte Märchen neu auf, daß der Kuckuck sich im zweiten Jahre in einen Sperber verwandeln würde. Gerade dieser Unsinn ist hier weit verbreitet. Hielt doch ein mir bekannter Waldarbeiter einen Kuckuck drei Jahre gefangen, um mir die Verwandlung beweisen zu können. Er verwandelte sich auch, jedoch in einen Leichnam. Kein Brehm, kein Naumann konnte diesen Mann überzeugen. Eine ähnliche Geschichte ist die von der Verwandlung der Bienen in Ameisen und umgekehrt der Ameisen in Bienen. Obengenannte Zeitung brachte auch vor kurzem eine Skizze, die mit den Worten begann: „Wenn man einen Vogel aus der Freiheit nimmt und ihn in ein Bauer steckt, so stirbt er nach kurzer Zeit." Ist es da verwunderlich, wenn immer wieder gegen unsere edle Liebhaberei Sturm gelaufen wird? Ich habe alles menschenmögliche versucht, um dagegen anzukämpfen, aber, wer kommt gegen solchen kleinen Herrgott von Chefredakteur auf? Dem alten Waldarbeiter konnte ich verzeihen, wenn er an der alten Überlieferung seiner Väter festhielt. Doch gegen Dummheit kämpfen selbst Götter vergebens! In hiesigen besseren Kreisen, unter denen sich auch Vogelliebhaber befinden, geht die Sage um, daß eine gefangengehaltene Nachtigall nicht mehr singe, sondern wenn sie den Schnabel auftut, anfängt zu weinen. Leider ist gegen solche Menschen nichts auszurichten. Die läßt man am besten ihren Weg weitergehen. Vieles und ähnliches könnte ich noch berichten, doch liegen diese Dinge mehr auf zoologischem Gebiete. Darum will ich für heute Schluß machen, in der Hoffnung, daß, wenn diese Zeilen dem leitenden Chefredakteur oder dem Direktor der Zeitung zu Gesicht kommen, dieselben sich doch besinnen und lieber schweigen, wie mit oder ohne Wissen das Volk verdummen.

Heinrich Groebel, Ornis-Mitglied Nr. 310.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Carl Blüm, Mainz, Bebelring 46: Doppelgelbköpfe, Gilbweber in Verfärbung, Javasittiche.

W. Hiltmann, Berlin S 14, Dresdener Str. 24: Trupiale.

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a: 1 Paar Bergmeisen, 1 Rötelmerle, jung, 1 ind. Blaumerle, 1 Blaurotschwanz (Phoenicurus fr.), 1 weißbrüstiger blauer Waldschmätzer (Tarsiger rufilata), 1 graublauer Fliegenschnäpper, Klarinettenvogel, Blauspötter, Flötenwürger, ind. Maskenwürger ind. Grauwürger, Borstenhäherling, Würgerschnäpper, Blauwangenblattvogel, Braunscheiteltimalie, Spottdrossel, Rosella-, 1 Pennant- (Männchen), Papua-, Kuba-, Katharinasittiche, Mohrenkopfpapageien, Braunkopfammern, 1 grüner Kardinal, 1 Paar Spix-Ara, 1 Benguelapapagei.

A. Petermann, Glauchau, Theaterstraße 53: Trupial.

W. Reitzig, Berlin N 39, Reinickendorfer Str. 109: 1 Paar Tarant. Unzertrennliche.



Herrn B. in W. Unsere „Sänger" sind während der Gesangszeit gegen einen Käfigwechsel, selbst gegen den Wechsel des Käfigstandortes so empfindlich, daß sie meist in einem solchen Fall den Gesang einstellen und ihn in der Regel während der laufenden Gesangsperiode nicht wieder aufnehmen. Der Zeitpunkt, an welchem normalerweise auch die Mauser einsetzt, ist dadurch früher herbeigeführt, und wie im vorliegenden Fall kommen manche Vögel bei derartiger Unterbrechung des Gesanges auch in den Federwechsel. Rotkehlchen beginnen, wenn sie überhaupt singen, meist wenige Wochen nach der Mauser mit dem leisen Gesang, der sich im März zum lauten Gesang steigert. Es könnte demnach, da eine Verschiebung des ganzen Rotkehlchendaseins durch die vorzeitige Mauser herbeigeführt ist, etwa im Juli wieder der leise Gesang und um die Jahreswende lauter Gesang zu erwarten sein. Voraussetzung hierfür ist die gute und vollständige Erledigung des Federwechsels. — Die Feststellung des Körpergewichtes vermittels einer Briefwage ist das beste Mittel, um immer über den Ernährungszustand eines Vogels unterrichtet zu sein. Je nach Befund wird dann reichlicher kräftigeres Futter gereicht oder an kurzen Wintertagen wird durch Beleuchtung des Käfigs längere Zeit Gelegenheit zur reichlichen Futteraufnahme gegeben. Bei zu fetten Vögeln wird naturgemäß umgekehrt verfahren.

Herrn H. P., Düsseldorf ist briefl. Bescheid zugegangen.

Herrn K., Berlin; Herrn Sch., Halle a. S.; Herrn W. Sch., Frankfurt a. M.: Beiträge dankend erhalten.

Herrn M. Qu., Dessau. Kleine ausländische Täubchen sind anfänglich meist sehr scheu und ängstlich. Es kommt in erster Linie darauf an, sie möglichst zahm zu machen. Das geschieht am besten, wenn man sie anfänglich in kleineren Käfigen hält. Der Pfleger muß sich viel mit ihnen beschäftigen, sie selbst mit allem versorgen und sie möglichst zahm zu machen suchen. Dann erhalten sie recht geräumige Käfige, in welchen viele Arten auch zur Brut schreiten. Da Tauben liederliche Nester bauen, gibt man ihnen viele verschiedene Gelegenheiten, das Nest sicher zu bauen, z. B. oben offene Harzer Bauer, flache Kistchen, runde Korbdeckel, Drahtnester u. dergl. Als Futter wird Hirse, Spitzsamen, Rübsen, Mohn, Buchweizengrütze, Maisschrot und ein gutes Drosselfuttergemisch gereicht, auch allerlei lebende Insekten, frische Ameisenpuppen, Würmer, dazu kleingeschnittener Salat, Vogelmiere, Spinat. Sand, Kies, zerstoßene Eischale darf nicht fehlen. Badewasser ist stets zu reichen. Zur Aufzucht werden auch gekeimte Samen gereicht. Niststoffe sind dünne, etwa spannlange Birkenreiser, Halme u. dergl. Im allgemeinen genügt im Winter die übliche Zimmerwärme, in der wärmeren Jahreszeit können sie auch in einem Flugraum im Freien gehalten werden. Über Kardinäle s. S. 56, Redaktionsbriefkasten unter „E. G., Ludwigslust".

Herrn L. in B. Ringneck = Halsbandsittich, Alexandrine = großer Alexandersittich, Greatbill = Alexandersittich von den Andamanen (Palaeornis magnirostris), Browns = Platycercus browni.

Herrn O. W., Bln.-Borsigwalde. Die Heimat der Graydrossel ist Mittelamerika (Südmexiko, südlich bis S. Salvador). Die Geschlechter sind nicht zu unterscheiden. Der Gesang wird von vielen Vogelwirten sehr gerühmt, andere beurteilen ihn weniger günstig. Es verhielt sich mit ihm wahrscheinlich genau so wie mit dem Gesang der Singdrossel. Im ersten Fall handelt es sich vermutlich um alte Wildfänge, im andern Falle vielleicht um aufgefütterte Nestvögel. Die Verpflegung ist die anderer Drosseln.

Herrn E. J. Das ♀ hat mit dem Nestbau und dem Eierlegen begonnen, bevor das Stieglitzmännchen brütlustig war. Das kommt häufiger vor. Ich empfehle anregendes Futter, wie Hanf, hartgekochtes Ei, zu reichen.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

:gang 54 28. Mai 1925 Heft 22

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Meine Drosseln. (Aus 50jährigen Erfahrungen.) (Forts.)
Kubafinkenzucht mit Hindernissen. Von Adolf Voigt, Jena.
Der Bluthänfling. Von Karl Finck, Neukölln. (Schluß.)
Die Vogelschau in München. Von Leopold Keidel.
Rotschwänze — Phoenicurus *(Forst.)*. Eine Monographie von John Kuntzendorff. (Forts.)
Liebhaberei und exakte Forschung. Von Dr. Wagner, Bad Salzbrunn. (Schluß.)
Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten -Ausstellung - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellung.

Der **Verein für Vogelschutz, -pflege und -liebhaberei zu Aue** im Erzgeb. veranstaltet vom 31. Mai bis 3. Juni (Pfingstfeiertage) seine erste öffentliche Ausstellung. Die Einlieferung der zur Ausstellung gelangenden Vögel geschieht bis Sonnabend, den 30. Mai, abends 7 Uhr. Die Aushändigung derselben erfolgt Dienstag (3. Feiertag), nicht vor 6 Uhr abends. Haubenbauer werden zur Ausstellung nicht zugelassen. Wir bitten, dieses zu berücksichtigen. Liebhaber, die nicht Mitglied eines Vereins sind, werden als Aussteller nicht zugelassen. Ferner ersuchen wir sämtliche Brudervereine des Bezirks, unsere Veranstaltung zu unterstützen. Die Ausstellungs-Kommission:
Walter Werner, 1. Vorsitzender, Aue, Druidenstr. 23 I.

Aus den Verbänden.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Vereinsl.: Karl Röhr, Heiligerweg 28. Versammlung jeden 2. u. 4. Sonntag im Monat, nachmittags 5 Uhr. Liebhaber herzlich willkommen. J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung Freitags, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Blasewitzer Hof". Liebhaber willk. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Rietschelhof", Rietschelstr. 19. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinslokal „Parkhotel", Epinaystr. 1, Versammlung. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an. Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 2. Juni.
A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber. Nächste Veranstaltungen: Donnerstag, den 28. Mai: Vereinsabend im Landesheim, 8¼ Uhr, Vortrag Dr. Neuwerth: „Mohrrüben-Fütterung". Donnerstag, den 18. Juni: Vereinsabend im Landesheim, 8¼ Uhr, Vortrag Böneker: „Australische Körnerfresser". Donnerstag, den 9. Juli: Vereinsabend im Landesheim, 8¼ Uhr, Vortrag Klocke: „Mimikry". Alle Mitglieder werden herzlich gebeten, möglichst an allen Veranstaltungen teilzunehmen.

Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber. 52. Mitgliederversammlung am 16. April 1925. Anwesend 11 Personen. Da unsere Einladung nicht rechtzeitig im Mitteilungsblatt veröffentlicht werden konnte, hatte sich nur ein kleiner Kreis zusammengefunden. Der vorgesehene Vortrag von Dr. Neuwerth wird daher bis zur Mai-Versammlung verschoben. Es fand aber eine besonders rege Aussprache über alle möglichen Fragen aus unserem Vereinsgebiete statt. Wir wollen von unserem Verein aus demnächst ein von unserem Mitgliede Dr. Neuwerth hergestelltes, geruchfreies, dauernd haltbares Blutmehl in größerem Maßstabe vertreiben. Dieses ohne jede fremde Zusätze hergestellte, eiweißhaltige Mehl hat sich als Zugabe zum Weichfutter ganz außerordentlich bewährt. Näheres darüber und über sonstige preiswerte Futterzuteilungen wird in der nächsten Sitzung bekanntgegeben. — 2. Beobachtungsausflug am 22. März 1925 nach Celle. Teilnehmer: Dr. Weigold und Frau, Herr Oetke und Frau, Lehrer Homann, Dr. Döhler, Troschütz, Führer: Hegemeister Matthies, Celle. Nach Besichtigung des Schlosses mit seiner berühmten Kapelle, des Naturwissenschaftlichen Museums und der Eiersammlung unter Führung des Herrn Hildebrandt wurde das schöne Vomann-Museum besichtigt. Durch die alten Gassen mit ihren bunten Häusern wurde nach Lachthausen gewandert, das Vogelschutzgehölz, das Hegemeister Matthies angelegt hat und pflegt, besichtigt. Das kleine Gebiet ist dicht an der Straße gelegen, wird aber von dem Lachteflüßchen von zwei Seiten begrenzt und bietet durch das üppige Wacholdergestrüpp, durch die dichten Rosen- und Weißdornbüsche, schönen Birken- und Kiefernbestände ein selten schönes Landschaftsbild dar, indem sich eine reiche Vogelfauna aufhält und niedergelassen hat. Dann auf sehr schönen Waldwegen durch den Forstort Sprache über den Königsplatz nach der blauen Brücke und nach einer weiten Lichtung an der Lachte. Sehr schöner Ruhepunkt. Rings lockten die Tauben, hämmerten die Grün- und Schwarzspechte, wohl ein Dutzend an der Zahl. Ein Pärchen Schwarzspechte flog in seinem Liebesspiel dicht vor unseren Augen um die alten Eichen. In der Luft riefen Raubvögel. Ein ganz selten schöner Platz. Auf dem Rückwege am Rande der Heide, vielfach Rehe. Schöner sonniger Frühlingstag. Beobachtete Vögel: Star, Nebelkrähe, Rabenkrähe, Eichelhäher, Grünfink, Buchfink, Hänfling, Goldammer, Heidelerche, Feldlerche, Kohlmeise, Tannenmeise, Haubenmeise, Sumpfmeise, Mattkopfmeise, Goldhähnchen, Amsel, Singdrossel, Misteldrossel, Rotkehlchen, Zaunkönig, Bussard, Schwarzspecht, Grünspecht, großer Buntspecht, Kleiber, Hohltaube, Ringeltaube. Appel.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste willk. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vors.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat, abends ½9 Uhr, im Hotel „Thüringer Hof", Köln, Klingelpütz 43. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 4. Juni 1925. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Zur Aufklärung. Die Bemühungen des Herrn Paul Schwarz, Leipzig, Südstraße 67, zu den bereits in Leipzig bestehenden drei Vereinen noch einen neuen Verein für

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu gründen, sind der Auswuchs einer Verärgerung, weil unser Verein den von Herrn Schwarz unterstützten Antrag, daß jedes Mitglied für jeden ausgestellten Vogel 1,— M. erhalten sollte, gegen 2 Stimmen aus idealen Gründen zurückgewiesen hatte. So schädlich derartige Quertreibereien auf die Einigkeit der Vogelliebhaber wirken, ebenso verwerflich wie unzulässig ist die Gründung eines Vereins unter dem Namen eines bereits 28 Jahre bestehenden Vereines. Der Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig hat mit dieser beabsichtigten Gründung nichts zu tun, er legt hiermit schärfsten Protest gegen den Mißbrauch seines Namens ein und behält sich für später weitere Schritte vor.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig.
J. A.: Johann Birk, 1. Vorsitzender.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Normast im „Kaiser Friedrich", Breslauerstr. 50. Liebhaber willkommen. J. A.: Friedrich.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Versammlung am 16. Mai 1925. Der vorgesehene Vortrag fiel aus, da der Ref., Herr stud. rer. nat. Bickerich, verhindert. Dafür besprach der 1. Vorsitzende den Star. In der Aussprache gingen die Meinungen, ob der Star ein- oder zweimal brütet, sehr auseinander. Nur durch Ringversuche kann hier Klarheit geschaffen werden. In der „Gef. Welt" 1908 S. 32 erwähnt Herr E. Heindl einen Brief von Rausch, in dem Rausch als sicheres Kennzeichen der jungen Stare ♂♂ einen mohngrauen Fleck an der Zunge anführt. Der Vorsitzende hat seinen Starkasten daraufhin revidiert, aber bei keinem der Jungen einen solchen Fleck feststellen können, und bittet die Mitglieder, weitere Beobachtungen diesbezüglich anzustellen. Da für Sonntag ein Ausflug geplant ist, wird die Sitzung kurz nach 10 Uhr geschlossen. A. Voigt.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Tage im „Goldenen Falken" Versammlung; nächste Freitag, den 29. Mai. Liebhaber willk. Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Versammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Liebhaber willk. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebenda. R. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Studienrat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

äßige u. Gerätschaften

llensittich-Nistkasten
Beste, was es gibt, per Stück 2 M, uchte Stück 1,10 M, gibt ab [709
Frau Klara Neugebauer, Deutsch-Lissa.

el-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50. **agnetze** f. kl. schädl. Vögel M. 2,30, M. 2,50 u. 2,80. **Katalog gratis.** **annen, Gronau 58,** Westf. [710

Futtermittel

Vogelfutter [711
Kanarien, Waldvögel, Exoten, geien, Weichfresser. Anerkannt brteste Mischungen auf Grund langer Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.
. Göpel, Leipzig,
dlinring 1. Telephon 14 958.
Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

RÜBSEN [712
ss. Züchterware, in eig. Anlage gerein. u. sort., liefere als Spezia-Detailversand in meinen plom. Originalbeuteln zu 5 u. 10 Pfd. erverk. u. Vereine bitte Sonderofferte einzuholen.
F. Müller, Kiel-Wellingdorf.

der Vogelliebhaber
ige **Preisliste** über **Vogelfutter,** ilien und **Bedarfsartikel** zur Zucht und Pflege der Vögel. [713
Hermann Sievers,
nnover, Inselstr. 2.

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. D. Waschinski & Co., Biesenthal I (Mark). [714

715] **Mehlwürmer,** reine Ware, gegen Eins. von 1.75 M 1/4 Pfd. franko. Th. Witte, Niederndodeleben b. Magd.

Mehlwürmer
veget. gez. [716
1/4 Liter franko gegen Voreinsendung von 2 Mark
Bonitas-Versand
Rostock i. M. 3.

Bei Anfragen und Bestellungen bitten wir, sich auf die „Gef. Welt" zu berufen

Zur gefälligen Beachtung!

§ 3 des am 1. September 1908 in Kraft getretenen „Vogelschutzgesetzes" lautet:

In der Zeit vom ersten März bis zum ersten Oktober ist das Fangen und die Erlegung von Vögeln sowie der Ankauf, der Verkauf und das **Feilbieten,** die **Vermittlung** eines hiernach verbotenen An- und Verkaufs, die Ein-, Aus- und Durchfuhr von lebenden sowie toten Vögeln der **in Europa einheimischen** Arten überhaupt, ebenso der Transport solcher Vögel zu Handelszwecken untersagt.

Wir machen darauf aufmerksam, daß der **Tausch** von einheimischen Vögeln wie auch der nicht zu Handelszwecken dienende Transport **nicht verboten ist,** wir bitten, dies bei Aufgabe von Inseraten berücksichtigen zu wollen.

Die Geschäftsstelle der „Gefiederten Welt"
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer
à Pfund 5 M, bei 6 Pfund Porto und Verpackung frei.

Ia Ameiseneier
Pfund 6.50 M.
Ia Weißwurm . . . à Pfd. 5 M
Ia Muska-Zecken . . à „ 2,50
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen . . . . à Pfd. 0,75
Ia Garnelen, gem. à Pfd. 0,40 M

Ia Universalfutter.
Alleckwa I für Nachtigallen 2.— M
„ **II für Grasmücken** 1.60 M
„ **III für Drosseln** . 1.50 M
Proben und Analysen zur Verfügung. Vertreter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [717
Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
A. Eckrich II., Waldsee (Pfalz).

Mehlwürmer neue, feinste Qual., Pfd. 6 M.
Jeitner, Breslau Weinstr. 12. [718

Frische Ameisenpuppen
à Ltr. M. 2.50 fr., 1/2 Ltr. M. 1,50 fr. gegen Voreinsendung des Betrages. [719
Th. Witte, Niederndodeleben b. Mgbg.

Beschwerden wegen Nichtzustellung der „Gefiederten Welt" sind beim zuständigen Postamt anzubringen.

Ornis-Haus
Halle-Saale

Gegründet 1912

Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)
Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall., Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspött., Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart [720

Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1
Preisliste auf Wunsch!

Vögel

Prima Harzer
Kanarien-Sänger
(Stamm Seifert)
mit schöner Hohlrolle, Hohlklingel, Schockel, Knorre, Glucke und tiefen Pfeifen, à 12, 15 u. 20 M, Weibchen à 3 u. 4 M. Versand geg. Nachnahme. Probezeit 6 Tage, was nicht gefällt, tausche um. [721

H. Voigt,
Kanarienzüchter,
Nordhausen am Harz.

Deutsche Nachtigall
zu tauschen,
Wert 30 Mark, erstklassig im Gesang, tadellos im Gefieder, gesunde Füße.
O. Engelke, Dortmund,
722] Moltkestraße 5 p.

Für Liebhaber fremdländischer Vögel

Die fremdländischen Stubenvögel,
ihre Naturgeschichte, Pflege u. Zucht Von Karl Neunzig. (Zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Rußschen Handbuchs für Vogelliebhaber Band I.) Mit 42 Fabentafeln und 400 Textabb. Geh. 30.— M., geb. 35.— M.

Die fremdländischen Weichfutterfresser
(Insekten- oder Kerbtierfresser, auch Wurmvögel genannt, Frucht- oder Beerenfresser und Fleischfresser). Mit Anhang: Tauben- und Hühnervögel. Von Dr. Karl Ruß. (Die fremdländischen Stubenvögel Band II.) Mit 10 Farbentafeln. Geh. 30.— M.

Gefiederte Hausfreunde II.
Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbild. Kart. 1.— M.

Dr. Karl Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel,
ihre Naturgeschichte, Pflege u. Zucht. Band I—IV. Geh. 150 M., in Halbleder geb. 175.— M. Band I. Körnerfresser ist einzeln nicht käuflich. Band II. Weichfresser. Geh. 30.— M. Band III. Papageien. Geh. 30.— M. Bd. IV. Lehrbuch der Stubenvogelpflege.

Webervögel u. Widafinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege u. Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Kart. 3.— M.

Zu beziehen durch:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg
Postschließfach 148.

Chines. Nachtigallen (Sonnenvögel)
abgehörte gutsingende Männchen, Stck. 13 Mk.

Zuchtweibchen 5 Mk., Graublaue Reisfinken Paar 5,50 Mk., Schwarzkopfnonnen Paar 4,50 Mk., Grauastrilde, Orangebäckchen, Amaranten Paar 4 Mk., Schönbürzelchen, Golddrüstchen Paar 6 Mk., Bandfinken, Blutschnabel- u. Feuerweber, Atlasfinken außer Pracht Paar 4 Mk., Paradieswitwen Paar 5 Mk., Silberfasänchen, Schmetterlingsfinken, kleine Elsterchen Paar 5 Mk., Flammenweber u. Gilbweber Paar 6 Mk., kleine Textorweber Paar 8 Mk., Goldsperlinge, Männchen Stck. 5 Mk., Lerchenfinken u. Morgenammerfinken Stck. 6 Mk., Kaptäubchen, Stahlfleckiäubchen, Palmtäubchen, Halsbandtäubchen Paar 8 Mk., weiße Lachtauben Paar 15 Mk., Zebrataubchen Paar 10 Mk., Gelbe Wellensittiche Zuchtpaar 16 Mk., Grüne desgl. unausgefärbt Paar 12 Mk., Rote Kardinäle Stck. 25 Mk., Zuchtweibchen Stck. 30 Mk., Dama- u. Danaldrosseln Stck. 50 Mk., Rotbraune Zwergtimalien Zuchtpaar 70 Mk., Männchen 40 Mk., Braunscheitel-, braunköpfige u. Goldaugentimalien Stck. 40 Mk., Kaprötel 75 Mk., Streifentrupial 30 Mk., prima junge gut eingewöhnte Graupapageien, sehr lebhaft plaudernde und studierende Vögel, Stck. 120 M. empfiehlt geneigter Abnahme

723] **Süddeutsches Vogelexporthaus**
Joh. Götz, Neu-Ulm (Bayern)

Wer
in der „Gefiederten Welt" inseriert,
hat Erfolg!

Offeriere freibleibend:
Schamadrosseln
ausgefärbte erstklassige Sänger, fehlerfrei, Stück 60 M.
Schamadrosseln, unausgefärbte gute Sänger, fehlerfrei, Stück 55 M.

Schamazuchtweibchen	Stück 50.—	Grauedelsänger,	
Chinanachtigallen	Stück 13.—	ohne Geschlechtsgarantie	Paar 5.—
Langschwanzglanzstare	Stück 10.—	Mossambikzeisige	Paar 6.—
Graugefärbte Kardinäle	Stück 8.—	Tarant. Unzertrennliche,	
	Paar 15.—	fehlerfrei	Paar 18.—
Graue Reisfinken	Paar 5.—	Grüne u. gelbe Wellensittiche, prima,	
Schmetterlingsfinken	Paar 3.50	garantierte Zuchtpaare	Paar 15.—
Graue Astrilden	Paar 3.50	Grüne Wellensittiche	Paar 11.—
Orangebäckchen	Paar 3.50	Graupapageien, junge, erstklassige, fehlerfreie, futterfeste Tiere	Stück 90.—
Amaranten	Paar 3.50	dto. mit Fußfehler	Stück 50.—
Silberschnäbel	Paar 3.50	Blaustirnamazonen	Stück 53.—
Bandfinken	Paar 3.50	Rhesusaffen,	
Elsterchen	Paar 3.50	an Kette gewöhnt	Stück 50.—
Schönbürzel	Paar 4.—	Drillaffen, klein u. zahm	Stck. 130.—
Atlasfinken	Paar 3.—	Frische Ameisenpuppen	Ltr. 2.75
Webervögel	Paar 2.—		

724] Voreinsendung franko.

Max Kleinert, Berlin NO 18, Strausberger Str. 13.

Bitte!

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß

a) **alle für die Redaktion** der „Gefiederten Welt" bestimmten **Zuschriften** (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten, Vereinsnachrichten usw.) und **Sendungen** (tote Vögel, Manuskripte) nur an **Herrn Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf,** Neue Bismarckstr.,

b) **alle Bestellungen** auf **Abonnements, auch vom Ausland, nur durch die Post,**

c) **Inserate** und dergl. Geschäftliches nur an die **Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,** Postschließfach 148,

zu richten sind.

Seltene Angebote
Vollständig zahmen, auf N... hörenden
ostindischen Mung...
in der Größe eines Marders, als ... und Rattenfänger unübertroffe... Leistungen, Photographie gegen ... sendung von 1 Mark.

1 ostindisches Streifeneichhörn...
in der Größe eines Hermelins, K... und Obstfresser, große Seltenh...
Ganz zahme, sehr gut sprechen... **Rotstirnamazone,** kein Schr...
1 Paar kleine Alexanderst...
725] verkauft
Julius Sauer, Leip...
Neumarkt 16.

Habe abzugeben:
1,0 wirklich Ia prima **Gartens... spötter,** selten schönes Tier, ... Weihn. im vollen Gesang v. frü... spät, auch b. Licht. Singt sofort ... Ankunft. Selbiger ist im Frühja... von Götz Neu-Ulm für 35 M. er... ben u. sang noch bis Anf. Sept. ... selbigen ab gegen gleichen ... resp. tausche gegen Alpenbrau... oder Sprosser u. nur Männch. im... len Gesang. Verpack. und Dring... Porto 5 M. extra. Noch andere ... vertausche, resp. suche ich, laut... nem Inserat in Gefied. Welt He...
726] **Peter Matzen, Götting...**

Suche
1,1 Sprosser, 1,1 Blaukehl... 0,1 Schwarzplättchen, geb... Tausch 2,0 Nachtigallen, fr... und getr. Ameisenpuppen ... Mehlwürmer.
Th. Witte, Niederndodel...
bei Magdeburg.

1 garant. erstklass. Sänger **Amerik. S... drossel-Wildfang** (Krallenfehl.) 4... **1,0 Grauedelsänger,** 1a fle... Sänger 6.—. Ferner vertausche ... 1,1 Schamas folg. einhalb bis drei... Jahr gekäfigte, zum Teil ganz ... Männchen: 1,0 **Reitziger Edel...** 1,0 großer **Stieglitz,** 1,0 **Rothänf...** 2,0 grüne **Zeisige,** 1,0 **Berg...** 1,0 **Gold-,** 1,0 **Rohr-,** 1,0 **Ger... Ammer,** 1,0 **Kernbeißer, ... Baumpieper.** Off. unt. **W. ...** an die Geschäftsstelle d. Gef. Welt.

Verkaufe
wegen Raummangels vier auser... Zuchtpaare **jap. Mövchen** per ... 12 M., alle zusammen 50 M. fr...
Fr. Gauter, Steinen (Baden).

Gebe ab:
1,0 **Grauer Kardinal** 20 M., ... frei, 2,0 **Safranfink** à 10 M. ... **Bandfink** 3,50 M. Porto extra.
K. Raabe, Crimmitschau...
730] Schützenstr. 8.

Verkaufe:
Gef. Welt Jahrgänge 1917 bi...
731] **C. Balser, Fulda.**

Vertausche
geg. kleinere Exoten, evtl. ver... auch, gut eingew. zahmen 1,0 ... **Kardinal.**
G. Zeeh, Buchhalter, **Pöhla** i. E...

Für Vogelschutz
Handbuch des Vogelschutz...
Von Prof. Dr. C. Hennicke. 9 Doppeltontaf., 1 Karte u. me... 200 Textabbild. Geh. 8, geb. ...
Zu beziehen durch:
Creutz'sche Verlagsb... handlung, Magdebu...
Postschließfach 148.

Inserate
für das am 4. Juni 1925 ... Ausgabe gelangende Heft 2... Gef. Welt erbitten bis 30. ...

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 14...
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdeb...

Der heutigen Nummer liegt die Farbentafel „Wellensittiche"

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 4. Juni 1925 | Heft 23

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Meine Drosseln.

(Aus 50jährigen Erfahrungen.)

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Da las ich in der „Gef. Welt" eine Anzeige von Georg Brühl in Kötzschenbroda, der Singdrosseln mit prachtvollen Rufen empfahl. Sie sollten aus Siebenbürgen stammen. Dort waren große Gebirgswaldungen, das war mir ja bekannt, auch Sprossergegenden; ich sagte mir also, von daher kann nur Gutes kommen. Ich bestellte und wurde nicht enttäuscht. Die ankommende Drossel war sogar gut im Gefieder, was bei frischen Wildfängen dieser Art meistens selten ist — und dabei ein herrlicher Sänger. Er brachte Sprosserrufe, wie „David", „Judith" und „Kuhlik", und war sehr fleißig im Gesang. Ich bekam ihn Ende April. Bald wurde er im Zimmer doch zu laut, und ich brachte ihn vor das Fenster. Dies tue ich nämlich durchaus in den milderen Monaten bei allen meinen Waldvögeln. Ich finde, sie halten sich dann bedeutend besser im Gefieder, auch bleiben die Farben viel frischer. Z. B. bringe ich meine Finken stets pünktlich am 1. März — wenn es die Witterung irgend zuläßt — nach draußen, neben das Schlafstubenfenster. Hier kann ich dann ihren Schlag des Morgens im Bett so schön lauschen. Ihr Gesang weckt mich aus dem Schlafe. So war's auch mit meiner Singdrossel. Aber es dauerte nicht lange, da kamen die Klagen meiner Nachbarn im Hause und von nebenan. Die Leutchen wollten morgens ausschlafen und hatten für Frühkonzerte der Art, mochten sie noch so schön sein, kein Verständnis. In der Stadt selbst gab's wenig oder gar keine Drosseln, ihr Gesang war ganz unbekannt, und auch die meinige fand keine Gegenliebe. Des lieben Friedens halber mußte ich sie hereinnehmen. So geht es einem meistens heute noch in der Stadt, ins Freie darf man laute Sänger kaum bringen, wenn man mit der Nachbarschaft in Frieden leben will. Ich habe sogar schon erlebt, daß sich die Leute im Hause über zu lauten Gesang aus der Wohnung beklagten, wenn er früh erschallte — und die liebe Polizei muß sie darin sogar noch von Gesetz und Rechts wegen unterstützen. Wie gesagt, ich mußte meine Singdrossel wieder in die Stube bringen, wo sie mich jeden Tag mehr mit ihren Liedern ergötzte. Da kam mir der Gedanke, mit ihr das Anlernen junger Nestvögel zu versuchen. Ein mir befreundeter Förster in der Letzlinger Heide hatte in seinem Garten in einem Lebensbaume ein Nest entdeckt, und ich fuhr im Juli zu ihm, sie mir zu holen. Jedenfalls war es die zweite Brut. Mit vieler Mühe päppelte ich die Jungen – fünf Stück — groß. Alle zwei Stunden fütterte ich oder meine Frau, und zwar Semmel in Milch, Ameisenpuppen und Mehlwürmer, natürlich unter Beobachtung größter Reinlichkeit. Sie gediehen auch prächtig. Nach meiner Ansicht waren es zwei Männchen und drei Weibchen. Die ersteren verrieten sich bald nach dem Flüggewerden durch Zwitschern. Ich setzte sie in Einzelbauern und hing diese auf jeder Seite meiner Meisterin auf. Leider hörte diese aber gerade zu dieser Zeit mit ihrem Gesang auf. Nach der Mauser — im Oktober — fing sie ihn allerdings wieder leise an; aber mit der Anlernerei war es nichts. Die jungen Drosseln zwitscherten im Winter fleißig mit, aber auch im Frühjahr, als die alte Drossel wieder laut sang, lernten sie nichts Rechtes. Ich behielt sie noch tief bis in den folgenden Sommer hinein, trotzdem blieb ihre Kunst sehr schwach und stümperhaft. Im Herbst, als ihre Genossen dem Süden zuzogen, gab ich ihnen die Freiheit, sie konnten ihren drei Schwestern vom vorigen Jahre nacheilen. Damit war ich wieder zu der Überzeugung gelangt, daß für den wirklichen Gesangsliebhaber nur Wildfänge in Betracht kommen. Ebenso ist es auch mit jungen Amseln der Fall. Mit diesen habe ich es aber auf andere Weise versucht, und zwar gleich im großen, auf deutsch „en gros". Ich hatte nämlich in Hannover s. Z. aus Liebhaberei eine Vogelorgel gekauft, die sechs Stücke langsam, schön und rein spielte. Und was das Schönste war, sie wurde durch ein Uhrwerk getrieben, man brauchte sich also nicht den Arm lahmzuleiern, nein, sie wurde angestellt und spielte dann das eingestellte Stück wieder und immer wieder durch, bis die Feder abgelaufen war. Im folgenden Jahre — etwa im April — erlangte ich drei junge Schwarzdrosselmännchen, die eben flügge geworden waren. Der schwarze Schwanzstummel zeigte deutlich ihr Geschlecht, denn bei jungen Amseln sind die schwarzen Schwanzfedern die einzigen und deutlichen Anzeichen

ihres Geschlechts. Ich brachte sie so zeitig wie möglich in kleinere Einzelbauer, Harzer Holzarbeit, und stellte diese mit der Vogelorgelmaschine in einem abgelegenen Bodenzimmer auf. Das Anlernen bzw. Studieren konnte nun losgehen. Des Morgens, tunlichst früh, zog ich die Orgel auf, fütterte die Studenten und überließ sie dann ihrem Fleiße. Des Mittags und Abends folgte nochmals eine Unterrichtsstunde. Bemerken will ich noch, daß die Tonart gerade für Amseln abgestimmt war; denn für solche Vogelart war die Orgel eigentlich gebaut worden. Eifrig beobachtete ich die Fortschritte meiner, d. h. der Orgelzöglinge. Einer versuchte bald einige Töne, die beiden anderen schwiegen sich noch aus. Nach meiner Überzeugung mußte der Versuch gelingen, denn die Orgel spielte immer viel gleichmäßiger, wie die Melodie mit dem Munde gepfiffen werden kann. Aber es wurde Herbst, es wurde Winter, das Weihnachtsfest nahte, meine Zöglinge lernten wenig oder nichts. Sie fingen an, neben den Pfeiftönen ihren Naturgesang zu üben, und nach weiteren vier Wochen machte ich der Sache ein Ende. Ich stellte die Orgel ins Altertumsmuseum, wohin sie eigentlich ihres Ursprungs wegen gehörte, sie war nämlich schon mehr als 20 Jahre alt, als ich sie kaufte. Jedenfalls hatte sie seinerzeit ein „Erfinder" angefertigt, der aber von der Praxis der Vogelanlernerei keine Ahnung hatte. Der Goethesche Ausspruch (Faust): „Grau, mein Freund, ist alle Theorie, doch grün des Lebens goldener Baum", hatte sich mal wieder bewährt. Und doch habe ich später noch zweimal versucht, mit der Maschinenorgel junge Amseln und einmal einen jungen, aufgepäppelten Star anzulernen. Bei den Amseln hatte ich aber wieder keine, auch nur annähernd befriedigende Erfolge, während der Star ganz gut zwei Lieder nachpfeifen lernte. Ich strebte nunmehr danach, wieder eine gute Wildfangamsel zu erlangen. Hierzu verhalf mir der Zufall. Seit mehreren Jahren besuchte ich regelmäßig während meines Urlaubs den Thüringer Wald. Dieser zieht mich nicht nur seiner eigenartigen Naturschönheiten wegen an — die lieblichen, so tief sattgrünen Wiesen mit den rauschenden Bächlein und den herrlichen Laub- und Fichtenwäldern —, sondern auch besonders die Vogelliebhaberei der Waldbewohner hat's mir angetan. Ich habe ihn jahrelang nach allen Richtungen hin durchwandert und alle Orte, in denen Vogelhändler und Vogelfänger wohnen sollten, aufgesucht: von Eisenach bis zum Schwarzatal, Rennsteig und Seitentäler. Bei diesen Wanderungen nahm ich gewöhnlich längere Zeit in Frauenwald — oben auf dem Rennsteig — Wohnung. Hier wohnte nebenan ein alter mehr als 80jähriger Mann, der zeit seines Lebens eifriger Vogelliebhaber und -fänger gewesen war. Jetzt lag er schwer krank und mußte sich von dem letzten seiner Vögel, einer schönen Amsel, trennen. Es war ein prächtiges Tier, tiefschwarz, mit goldgelbem Schnabel und Augenringen, zahm und dabei natürlich in vollem Gefieder. Kein Federchen fehlte oder war bestoßen. Nach der Versicherung des Besitzers und seines Sohnes war es ein Wildfang, der vor etwa drei Jahren von ihnen „eingesteckt" wäre. Sie konnten mir sogar die Stelle im Walde — die ich auch kannte —, wo sie gefangen war, bezeichnen. Die alte Ehefrau, eine echt Thüringer Waldbewohnerin, versicherte mir wiederholt so recht treuherzig: „Lieber Herre, andere Vögel, die nicht gut sangen, hat er nie „eingesteckt". Singen hatte ich die Amsel nicht gehört, da ich am andern Morgen weiterreisen wollte und am Tage vorher erst von dem zu verkaufenden Vogel gehört hatte. Eine schwer zu lösende Frage war noch der Transport, mit der Post war die Versendung nicht zulässig — es war im Juli —, und wir wollten noch zwei Tage wandern. Da verschaffte mir mein Hauswirt ein kleines Thüringerbauerchen von der Größe, wie sie für Stieglitz, Hänfling usw. verwendet werden. Hier hinein steckte ich meine gekaufte Amsel und wanderte los, den Käfig oben auf den Rucksack gebunden. Etwas Futter hatten wir ihr in das Krippchen gelegt und unterwegs — wir wanderten das Ilmtal hinunter — trafen wir an verschiedenen Stellen Straßenarbeiter, die die Gräben säuberten und aufharkten. Dabei fand ich Regenwürmer, die ich meinem Amselchen in den Käfig steckte. Von Zeit zu Zeit überzeugte ich mich, ob sie verzehrt waren, was der Fall war. Die Ernährungsfrage war also gelöst.

(Fortsetzung folgt.)

Kleiber und Sumpfmeise.

Von Arthur Dresler.

(Nachdruck verboten.)

Wenn auch im allgemeinen die Vogelliebhaber den singenden Vögeln das Hauptinteresse zuwenden, so gibt es doch eine erhebliche Anzahl von Freunden der Gefiederten, die den verschiedenen Arten der Sprachbegabten ihre Liebe schenken, oder sie sehen sogar von beiden Eigenschaften bei ihnen ab und finden ein herzliches Genüge nur an ihrem originellen Wesen, das ja zumeist bei richtiger Behandlung und Beobachtung ihres natürlichen Charakters im gekäfigten Dasein, verbunden mit reizender Zutraulichkeit, so recht in Erscheinung tritt.

Der echte Vogelfreund wird sich zudem niemals an das Herkömmliche dieses wunderbaren und seelenvollen Sports für gebunden erachten, und er begegnet sich da mit der ernsten Wissenschaft des nach tieferer Kenntnis und Erkenntnis der Natur bzw. der Seele der Natur schürfenden Fachgelehrten, der ohne weiteres dem Satze lebt, daß all und jedes Ding und Wesen eine originale Seite hat.

Unter den vielen Vögeln, die sich dieses Vorzugs besonders erfreuen, ist es der Kleiber, auch Blauspecht oder Spechtmeise genannt, da er die Eigenschaften des Spechtes und der Meise in sich vereinigt, einer besonderen Eigentümlichkeit seines Nestbaues aber den Namen oder die Bezeichnung Kleiber, d. i. Kleber, verdankt.

Diesen hübschen, auf dem Rücken blaugrauen Vogel mit dem schwarzen Zügelstreif in dem intelligenten Gesicht, der sich bis in den unteren Hinterhals verliert, und der hellen rosa angehauchten Brust, finden wir oft in unseren heimatlichen Gehölzen, in der Nähe von Lichtungen und Feldern, wie er in fast ununterbrochener Bewegung emsig die Rinden der Bäume

nach Holzmaden, haarlosen Raupen und deren Eiern und anderen Kerbtieren absucht, sie entweder gleich verzehrt, oder er fliegt mit seiner Beute seiner Vorratskammer, einem anderen Baume, zu, der unter Umständen sein Nest enthält, wo er sie in den Ritzen und Spalten dieses Baumes sorgfältig versteckt, nachdem er sie vorher regelrecht bearbeitete. Er tut das aus Vorliebe für besondere Leckereien, die er sich für später vorbehält, freilich wohl auch für Zeiten ausnahmsweise schlechten Wetters, um die Nahrung in der Nähe bequem erreichen zu können. Denn unser Kleiber ist selbst außer der Brutzeit ein Nestschlüpfvogel, der eine trockene sichere Behausung liebt, deren Schlupfloch er gegebenenfalls so verengt, daß er sich bei schlank gemachtem Leibe gerade nur knapp hindurchzwingen kann. Um nun die von ihm angestrebte gewisse Enge seines Nestschlupfes zu erreichen, benutzt er lehmigen Boden, den er im Schnabel dem Neste zuträgt, wo er ihn mit Hilfe seines Speichels dem zu weiten Rande des Schlupfloches anklebt. Seine derartige Maurerei, in Verbindung mit dem Speichel des Vogels, gewinnt eine Festigkeit, daß man sie nur unter einiger Anstrengung mit der Hand losbrechen kann.

Alle diese interessanten und vielfach höchst amüsanten Eigenheiten entwickelt der Blauspecht auch gekäfigt

Singdrossel (s. S. 262).

sobald man ihnen durch zweckentsprechende Einrichtung die Entfaltung sichert. Ja, es ist geradezu geboten und die größte Wohltat für den Vogel, wenn man ihm durch einschlägige Ausstattung seines Käfigs die reichlichste Gelegenheit gibt, seine eigentliche Natur oder sein Wesen zu betätigen, wodurch sein Besitzer und Pfleger überhaupt erst in den rechten Genuß seines gefiederten Freundes tritt.

Der Kleiber ist ein bescheidener, genügsamer, sympathischer und kluger Vogel, der seine Bedürfnisse sehr deutlich zu erkennen gibt, die man andererseits ihm auch wieder ablauschen muß. Danach hat hat sich sein Pfleger zu richten. Und da er mehr Lebensbedürfnisse hat wie gewöhnliche Käfig- oder Singvögel, so muß man diese um so sicherer feststellen suchen, was seinem Pfleger wiederum zu einer Quelle des Interessanten und Vergnüglichen wird, wodurch eben der Zweck des Vogelsports erfüllt wird. Nenne ich ihn einen „klugen" Vogel, so will ich damit bei ihm die Tatsache hervorgehoben haben, daß er sehr bald die Worte und den Sinn der Rede seines Wirtes versteht, sobald er durch die rechte, d. i. liebevolle, sich stets gleichbleibende Behandlung, von dessen Seite die Scheu erst überwunden und Vertrauen zu ihm gefaßt hat. Denn der Kleiber ist ein äußerst scharf beobachtender Vogel, dem nichts entgeht, wenn es auch den Anschein hat, daß er bei seinem ewigen Beschäftigungstrieb auf gar nichts weiter achtet, als auf das, was er gerade vor hat; er ist für andere Vögel zugleich ein auf etwas aufmerksam machender und entschiedener Warner vor irgendwelcher Gefahr, und so kommt es, daß besonders die kleinen und kleinsten Gefiederten unserer heimatlichen Nadelwälder, Meisen und Goldhähnchen, sich ihm gewissermaßen als Schützer in mehr oder weniger Kopfzahl anschließen, so daß er auch als deren Führer zu gelten hat. Er ist also höchstens nur in der Brutzeit mit dem Weibchen und den Jungen in engerer Familie zu finden, demnach höchst selten oder nie allein, also immer in Gesellschaft.

Sein zärtlicher Lockruf, ist ein „tü tü", sein Ruf des Aufmerksammachens ein scharfes, klingendes „tirr tirr", woneben er zeitweilig noch leise und energische Laute oder Rufe zur Verfügung hat.

Die Wahl des Käfigs für den Kleiber muß denn auch seinem Bedürfnis nach Beschäftigung, ja direkter Arbeit, denn er arbeitet wie ein rechter Specht, und lebhafter Bewegung Rechnung tragen, er muß für einen zweiten oder auch dritten und vierten für ihn

passenden Insassen mitberechnet sein, so daß seine Maße unter 50—70 cm Länge und entsprechender Höhe und Tiefe nicht recht zu nehmen sind. Dahinein gibt man nun für ihn einiges an den Seitenwänden befestigtes Gezweig, das auch aus trockenem Laubholz bestehen kann, sodann aber das Wichtigste: den imaginären Baumstamm in Gestalt eines Holzscheites, das mit dicker Borke entweder benagelt oder besser beleimt ist, und ein für seine Größe — er hat etwa die Größe eines Dompfaffen — angefertigtes Nest mit Schlupfloch. Diese Nester werden zweckmäßig aus leichtem Holz angefertigt, wie es die kleinen leeren Kistchen beim Krämer billig oder gratis hergeben, und außen mit kleinen Rindestückchen, besonders um den Einschlupf herum, beleimt. Denn was bei dem Kleiber nicht gediegen fest ist, das hämmert er zu seinem größten Vergnügen in kürzester Zeit kaputt oder herunter, daß man sein Erstaunen hat, wie er die Schwächen der Arbeit seines Wirtes ausfindig zu machen weiß! Nachdem er diesem also gezeigt hat, wie alles zu machen sei, damit er keinen Tadel daran findet, ist erst alles für den schmucken Vogel in Ordnung. Für seine Arbeit und Belustigung hat der Blauspecht am liebsten weiche Kiefernrinde, deren äußere lose sitzende Teile er leicht herunterhämmern kann, und deren tiefe Spalten ihm genügend und reichlich Gelegenheit geben, Sonnenblumenkerne in ihnen zu verstecken, Mehlwürmer und dergleichen. Die hartschaligen Kerne hämmert er in die Risse der Rinde, um sie bequem öffnen zu können, aber auch Steinchen finden aus Spielerei dort Unterkunft.

Es ist nun eine Quelle unversieglichen Vergnügens, den Kleiber bei seiner Arbeit und in seinem Wesen beobachten zu können, so daß er mit Recht ein äußerst drolliger Vogel genannt wird, den man auch seiner Zutraulichkeit und seines Verständnisses wegen liebgewinnen muß.

Sehr bald nimmt er die Mehlwürmer und andere Leckereien seinem Pfleger artig vom Finger weg, kommt auf den Ruf herbei, sobald er seinen Namen kennengelernt hat, und hört auch auf manches, was ihn oder seine Mitinsassen des Käfigs angeht, ja, er läßt sich prächtig erziehen. Nichtsdestoweniger hat er wie alle Tiere seinen Eigenwillen, und man soll im Verkehr mit ihm nie die gütige und geduldige Manier verleugnen.

Bei der Befestigung der Nester, die für Schlüpfvögel zugleich die wichtige Schlaf- und Ruhegelegenheit darstellen — denn sie benutzen sie auch am Tage um zu ruhen oder sich gern einmal zu verstecken —, achte man sorgfältig darauf, daß sich die Vögel nicht irgendwie und wo an spitzen Nägeln oder Drahtenden verletzen können; ebensowenig dürfen Schnüre usw. innerhalb des Käfigs die Füße der Vögel gefährden. Vielmehr müssen Nester und, wie im Falle unseres Kleibers, der kleine illusionäre „Baumstamm" außen am Käfig zweckentsprechend befestigt werden; ebenso darf eine Sitzstange nicht fehlen, welcher man, je nach Bedürfnis, eine zweite hinzufügt. Die Nahrung des Kleibers ist nun verhältnismäßig einfach: im Herbst und Winter begnügt er sich mit leicht angequetschtem Hanf und Sonnenblumenkernen, auch zerkleinerte Walnuß nimmt er gern, zum Frühjahr beginnt man bei ihm mit der Insektenfuttermischung, in welcher einige zerschnittene Mehlwürmer den Anreiz und Leckerbissen für ihn bilden, reicht ihm, sobald zu haben, eine kleine Portion frischer Ameiseneier, und kann sich das Vergnügen machen, ihm den ganzen Tag Fliegen zu fangen, er nimmt sie ziemlich vom Finger weg und kann ganze Näpfe voll davon vertilgen, ebenso Spinnen, haarlose Raupen. Eine besondere Leckerei für ihn ist, wo Honig zur Semmel gegessen wird, ein Tropfen der süßen Speise mit einem Bröselchen Semmel gemischt. Mehlwürmer erhält er sechs bis acht Stück pro Tag in drei bis vier Portionen. Bei dieser Gesamternährung wird der Kleiber durchaus nicht fett, zumal man darauf achtet, daß er Hanf, der in Menge gereicht für alle Vögel schädlich ist, nicht im Übermaß erhält, sondern die Sonnenblumenkerne sollen das Hauptfutter ausmachen. Das Wichtigste für die Gesundheit des Kleibers ist, daß er keinen gewöhnlichen feinen Vogelsand, oder nicht nur diesen, als Einstreu erhält. Der Kleiber hat Kiessand nötig, den er regelmäßig aufnimmt, anders geht er sicher an Verdauungsstörung zugrunde. Jeden dritten Tag nimmt der Blauspecht gern ein Bad in nicht zu kaltem Wasser. Bei guter Witterung an das offene Fenster gebracht, hat er eine große Freude, es entgeht ihm nichts, und er läßt eifrig sein helles „tirr tirr" als Lockruf gegen vorüberfliegende andere Vögel ertönen, womit er viel Erfolg hat, denn allerlei Gefiederte kommen zu Besuch. (Schluß folgt.)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der Wunsch vieler Vogelliebhaber, die schönen farbenprächtigen Rotschwänze einiger Gebirge Asiens zu besitzen, ist nunmehr, wenigstens in bezug auf eine Art, der Erfüllung näher gerückt. Die Firma Lenger, Berlin, brachte (s. das Inserat in Nr. 19) den prächtigen

Blaurotschwanz — Phoenicurus frontalis *(Vig.)*

in den Handel. Auf die Beschreibung usw. dieses schönen, das Erstemal eingeführten Vogels, der auf S. 265 abgebildet ist, an dieser Stelle einzugehen erübrigt sich, da Herr Kuntzendorff in seiner Besprechung der Rotschwänze diesen Vogel auf S. 244 f. eingehend geschildert hat.

Gleichfalls von Lenger, Berlin, wurde ein anderer farbenprächtiger Vogel das Erstemal auf den Markt gebracht, der

weißkehlige blaue Waldschmätzer — Tarsiger rufilatus *(Hodgs.)*.

In der Gattung Tarsiger sind Vögel vereinigt, die durch die gut entwickelten Schnabelborsten an die Fliegenschnäpper erinnern, sonst aber wohl den Rotschwänzen nahe stehen. Bei oberflächlicher Betrachtung konnte man die Waldschmätzer, welche im Besitz von Lenger sind, tatsächlich für Rotschwänze halten, sowohl in bezug auf ihre Gestalt, wie auch in der Art ihrer Bewegung.

Der blaue Waldschmätzer ist Sommervogel in den Gebirgen des Himalaja in Höhe von 2000 bis

4000 m östlich bis in die Gebirge der chinesischen Provinz Szetschwan und den Tsin-ling Bergen. In der kälteren Jahreszeit hält er sich in tieferen Lagen auf. Jerdon sah ihn im Winter um Darjeeling in Höhe von 1000 m sehr häufig. Er bewohnt bewaldete Gebiete, schlüpft durch Gebüsche und niedere Bäume, durchstreift den Buschwald und kommt nur auf den Erdboden, um Insekten der verschiedensten Arten zu erbeuten, sowohl hartschalige Käfer, wie weichhäutige Schmetterlinge und andere. Fleischige Beeren verschmäht er nicht. Wie meist die Waldbewohner ist er ziemlich scheu. Trotzdem sieht man ihn nicht selten an Straßen und Fußwegen auf der Jagd nach Insekten. Das Nest steht in Löchern

indische Blaudrossel — Monticola solitarius pandoo *(Sykes)*,

welche von der europäischen Form sich durch kleinere Gestalt und im frischen Gefieder sich durch dunkleren Ton der Gefiederfärbung auszeichnet. Ihre Verbreitung erstreckt sich wahrscheinlich über Teile von Turkestan, Afghanistan, Teile des Himalajagebietes, Tibet östlich bis Mittelchina. Im Winter hält sie sich in Indien, auf Ceylon, in Birma und Südchina auf.

In früheren Jahren vereinzelt eingeführt, brachte uns der Fockelmannsche Import aus Indien den

Maskenwürger — Lanius vittatus *Valenc.*

in mehreren Stücken (s. Abb. S. 243). Dieser sehr hübsche und ungemein ansprechend gefiederte



Blaurotschwanz (s. S. 264).

an Böschungen und Uferrändern. Man findet es auch unter Baumwurzeln oder umgestürzten Baumstämmen. Das Gelege wird im Mai und Juni gefunden und besteht aus vier blaugrünlichweißen Eiern, die am dickeren Ende fein blaßrotbraun gefleckt sind (18 × 13,9 mm).

Gefiederbeschreibung: ♂ (s. Abb. S. 267) oberseits und an Kopf- und Halsseiten dunkelblau; Stirn, Augenbrauenstreif und Oberschwanzdecken heller, lebhaft ultramarinblau; schmaler Streif an Vorderhals rahmweiß, schmutziggrau verwaschen; Seiten leuchtend rostfarben; kleine Flügeldecken leuchtend ultramarinblau, übrige Flügel-, Schwanzfedern wie oberseits, Schnabel schwarz; Auge dunkel; Füße dunkelhornbraun; Lg. 145, Fl. 80—84,5, Schw. 66—68 mm.

♀ olivbraun oberseits, Bürzel mit grünlichblauem Schein; Oberschwanzdecken blau; Kopfseiten, Kropfgegend bräunlich ockerfarben, Kehle in der Mitte weißlich, übrige Unterseite trübweiß, Seiten leuchtend rostfarben; Schwingen wie Oberseite mit rostfarbenen Säumen, Schwanzfedern schwarzbraun, mittelstes Paar mit trübblauen Säumen.

Gleichfalls das Erstemal eingeführt und durch Lenger in den Handel gebracht ist die

Würger ist die am häufigsten vorkommende Würgerform Indiens. Er bewohnt Indien mit Ausnahme der westlichen Küste und des nordöstlichen Tieflandes von Bengalen, Afghanistan und Belutschistan. Er lebt wie unser rotrückiger Würger, dem der Maskenwürger nahe steht, in Hainen, Gärten, Hecken, Gebüsch in der Ebene, steigt aber im Himalaja bis 1000 und 1200 m empor. Er ist ein ebenso fleißiger Sänger wie jener, und besonders morgens und abends läßt er seinen Gesang stundenlang hören. Seine Kunst, die Gesänge anderer Vögel wiederzugeben, wird in Indien bewundert. Man hört seinen Vortrag bis Ende Juli. Seine Nahrung bilden Insekten, besonders Grashüpfer und Heuschrecken. Ab und zu verzehrt er auch mal einen kleinen Vogel. Die Hauptbrutzeit sind die Monate Juni und Juli, aber auch schon im April und noch im September findet man besetzte Nester, die er gern in nicht zu hohe Bäume oder in Hecken, in eine Gabelung schlanker Zweige baut. Das sehr hübsche, ziemlich tief halbkugelige

Nest ist aus den verschiedensten Stoffen, aber immer sehr fest gebaut. Man fand Nester aus Grashalmen, mäßig dünnen Zweigen, Pflanzen- und Tierwolle, Lumpen und Zeugfetzen, allerlei Fäden und Federn, deren Inneres zuweilen gar nicht, zuweilen mit dünnen Halmen, einigen Pferdehaaren, Federn und Faserwurzeln gerundet war. Zuweilen fehlt aber jede innere Auspolsterung des Nestes. Der Maskenwürger hat die stark ausgesprochene Neigung, sein Nest gegen wirkliche oder vermeintliche Feinde zu verteidigen. Nähert man sich seinem Nest, so hat es den Anschein, als würde er sich im nächsten Augenblick kampflustig und mit Todesverachtung auf den Gegner stürzen, „aber der Mut scheint ihm doch zu fehlen, und der besseren Einsicht Raum zu geben", wie ein Beobachter des Vogels mitteilt, „er zog es vor, sich in die nächsten Mangobüsche zurückzuziehen und sein Angriff auf die dort vorhandenen Kerfe zu machen und sie zu verzehren". Das häusliche Leid hatte er sehr schnell vergessen.

Das Gelege besteht aus vier bis sechs Eiern von grünlichgrauer oder gelblichbrauner Grundfarbe mit hell- oder olivenbraunen Flecken und mattgrauen Schalenflecken, oft kranzförmig angeordnet (21 × 16,5 mm).

Gefiederbeschreibung: ♂ Zügel, Stirn bis Scheitelmitte, ein breiter Streif über Auge und Ohrdecken schwarz; übriger Oberkopf weiß, allmählich in das Grau des Vorderrückens übergehend; Hinterrücken Schulterfedern rötlich kastanienbraun; Bürzel, Oberschwanzdecken grau, vordere Oberschwanzdecken heller; Unterseite weiß, Seiten hellrostbraun; Flügeldecken schwarz, kleine, mittlere im frischen Gefieder mit hellrostbraunen Säumen; Schwingen schwarzbraun mit schmalen bräunlichen Säumen, Grund der Handschwingen ausgedehnt weiß; äußerstes Schwanzfedernpaar weiß, zuweilen innen mit schwarzem Fleck; nächstes Paar weiß, innen mit schwarzem Fleck; übrige schwarz, mittelste mit schmalem schwarzen Spitzensaum, übrige mit weißer Wurzel und Spitze; Auge braun, Schnabel, Füße schwarz; Lg. 180—200, Fl. 82—92, Schw. 82—92 mm. ♀ mit schmaler schwarzer Stirnbinde; das Schwarz des Zügels mit Weiß gemischt; Rücken heller rotbraun; sehr alte dem ♂ ähnlich, kleiner. Jugendkleid oberseits hellbräunlich mit schwärzlichen wellenförmigen Querbinden; Unterseite weiß, Seiten, Brust schwärzlich quergewellt; Schwanz rostbräunlich quergewellt; Schwanz rostbräunlich, seitliche Schwanzfedern mit weißen Säumen. (Fortsetzung folgt.)

Sind die hohen Preise im Handel mit einheimischen Vögeln gerechtfertigt?

Von A. Jena, Biberach/Riß.

(Nachdruck verboten.)

Wir leben heute noch immer in der Nachkriegszeit. Man ist während des Krieges und erst recht nach demselben an so Vieles gewöhnt worden, das man früher für untragbar gehalten hätte. Ein ganz besonderes Kapitel nimmt in diesem Sinne die Preisberechnung der Waren jeder Art ein und ist diese wohl an erste Stelle im täglichen Nachkriegsleben zu setzen. Wir alle haben während der Inflation Preise erlebt, deren Riesenzahlen uns früher nicht recht geläufig waren, und trotzdem brachten diese märchenhaften Preise den meisten nur Verluste. Heute, nachdem die Währung wieder stabil geworden ist, drücken sich die Preise wieder in den kleinen Zahlenreihen der Vorkriegszeit aus, wenn auch nicht durch den gleich niedrigen Stand. Das Vorkriegsniveau der Warenpreise werden wir in der nächsten Zeit wohl kaum auf allen Gebieten erreichen, die Preisentwicklung ist von so vielem abhängig, von der Produktion, der Konkurrenz, dem Weltmarkt, den Steuern und Geschäftsunkosten, Frachten usw. Trotzdem ist es Pflicht jedes einzelnen, an der Preissenkung mitzuwirken, insbesondere ist es Pflicht des reellen Handels, ein Steigen der Warenpreise, wenn es unlauteren Motiven entspringt, zu unterbinden. Wenn wir Vogelliebhaber uns für das Gebaren im Vogelhandel in erster Linie interessieren, so ist das sehr begreiflich. Besonders begrüßen wir es, daß die deutschen Handelsfirmen sich so unendlich viel Mühe geben mit dem Import von Vögeln aus allen Erdteilen, und der aufmerksame Leser der Fachzeitschriften wird immer wieder staunen über die zahlreichen und vielköpfigen Transporte, oft mit den auserlesensten Seltenheiten, die in Hamburg für die altrenommierten Tierimporthäuser ankommen. Wenn wir all die Schönheiten sehen, ist unsere erste Frage nach dem Preise, die Erwerbslust wird wach, und die Größe des Geldbeutels wird im stillen abgewogen. Freilich sind im allgemeinen die Preise durchweg höher als vor 10 Jahren, aber das ist ja gerade hier bei den Importierten auch leicht begreiflich. Wie viel Schwierigkeiten bereitet nur die Überfahrt mit dem Dampfer, dann die Zollspesen, dann angekommen in Deutschland oft riesenhafte Verluste durch Umgewöhnung oder andere krankhafte Ursachen; das alles ist mitbestimmend für den Händler bei der Preisberechnung. Und doch, wenn wir die Preise von heute mit denen von 1914 vergleichen, so müssen wir sagen, daß die heutigen Preise nicht übermäßig hoch erscheinen unter Zugrundelegung des Importrisikos. Ich entnehme aus einer Liste einer bekannten reellen Vogelhaltung aus dem Jahre 1914 folgende Arten und Preise und stelle die heutigen von 1925 gegenüber.

Im Juni 1914 kosteten: Schamadrosseln 40 bis 50 M., 1924: 60—70 M.; Dayaldrosseln 25 M., 1925: 60 M.; Singdrosseln 10—15 M., 1924: 8—20 M.; Schwarzdrosseln 6—8 M., 1924: 10 M.; Sprosser 10—30 M.; Nachtigallen 6—10 M.; 1924: 10—15 M.; Orpheusgrasmücken 18 M.; Sperbergrasmücke 5—8 M., 1924: 8—10 M.; Mönchgrasmücke 4—10 M., 1924: 8—15 M.; Gartengrasmücke 4—6 M., 1924: 8—10 M.; Rotkehlchen 2—3 M., 1924: 3—5 M. Die Preise für Prachtfinken, Webervögel usw. sind im allgemeinen ums doppelte bis dreifache gestiegen.*) Wir können aus dieser Aufstellung aber entnehmen, daß z. B. der Preis für die indische Schama sich nur um 20—40 % erhöht hat, sie ist somit im Verhältnis nicht teuerer geworden als unsere einheimischen Weichfresser, deren Preis ebenfalls höchstens um 60%, wenn man die Höchstpreise in Betracht zieht, gestiegen ist.

Aus diesem Grunde und in Anbetracht der allgemeinen Teuerung wird gewiß kein Vogelliebhaber an diesen Preisen Anstoß nehmen. Etwas anderes ist es aber, wenn man Angebote liest, in denen für deutsche Nachtigallen im Schlag 40—50 G.-M.,**)

*) Sind inzwischen fast auf die Preise der Vorkriegszeit gesunken. N.

**) Hier handelt es sich doch meist um Vögel, welche schon einmal überwintert sind und deren frühzeitiger Gesang nur erreicht wurde durch eine immerhin mühevolle und kostspielige Pflege, wie das z. B. bei der Nachtigall des Vogelhändlers Behnke auf der Berliner Ausstellung der Fall war. N.

für Sperber und Gartengrasmücken 25 Gm. im Monat Januar 1925 verlangt wird. In demselben Angebot stehen Schwarzplättchen mit 15—20 M.! und Rotkehlchen und Kleiber mit 8 M., Amseln 12—15 M. Das sind Preise, die meines Erachtens in keinem Verhältnis mehr zu dem Wert des Vogels stehen. Ich gebe zu, daß es vorkommt, daß man für ein Exemplar, das für einen Liebhaber einen gewünschten Vorzug besitzt, einen sog. unsinnig hohen Liebhaberpreis bezahlt; ist es doch in alter Zeit vorgekommen, daß für einen gutschlagenden Buchfinken eine Kuh in Zahlung gegeben wurde. Ich nehme auch an, daß die anbietende Firma nur ganz erstklassige Vögel mit diesen Preisen belegt, und gebe auch zu, daß es Liebhaber geben wird, die auch diese Preise anlegen. Trotzdem bin ich aber der



Weißkehliger blauer Waldschmätzer (s. S. 264).

Ansicht, daß die genannten Preise unnatürlich hoch sind und daß durch sie mancherlei Schädigungen auftreten können. Denn erstens wirken sie automatisch preistreibend auf die Preise anderer Verkäufer, und zweitens fordern solche Preise bei vielen arbeitslosen Leuten zum Vogelfang direkt auf. Es ist also eine unbeabsichtigte Schädigung der Liebhaber, die von den sog. Vogelschützlern sowieso über die Achsel angesehen werden, vorhanden, abgesehen von dem wirklichen Wertverhältnis. Z. B. erachte ich für eine Gartengrasmücke im Januar, auch wenn sie schon halblaut ist, einen Preis von 10 M. für vollauf gerecht, da ja der Vogel kurz vor der Mauser steht, und also dem Nachbesitzer das Risiko der Mauser verbleibt, es ist dabei ganz gleichgültig, ob die Grasmücke erst die erste oder schon die zweite Wintermauser im Käfig durchmacht. Ist der Vogel gut vermausert und wieder voll im lauten Gesang, so kann ein Preis von 12 M. noch angelegt werden, wenn überhaupt ein Verkauf noch getätigt wird, denn oft wird der Vogel vor der Mauser abgestoßen. Das gleiche gilt auch von der Sperbergrasmücke; besonders die Gartengrasmücke hat ein enormes Verbreitungsgebiet und kommt überall zahlreich vor, ein großer individueller Gesangsunterschied wie bei der Schwarzplatte kommt hier wenig in Betracht, und der Fang ist auch mit keinen Schwierigkeiten verbunden, ein guter Tränkplatz kann dem Liebhaber an einem sonnigen, heißen Mittag mehr liefern, als er käfigen will. Ebenso ist es mit dem Schwarzkopf, der, obschon er nicht so gleichmäßig verbreitet ist, doch in seinem Gebiet recht zahlreich auftritt, für ihn ist ein Preis von 15 M. mehr wie angemessen.

Etwas anderes liegt der Fall bei der Nachtigall; sie kommt nicht mehr so häufig vor als früher und fehlt an manchen Orten ganz, wenn wir aber berücksichtigen, daß „deutsche Nachtigallen" seit jeher billiger im Handel waren und fast bei allen reellen Händlern der Preis vor dem Krieg wie auch nachher auf gleicher Höhe wie der des Schwarzkopfes stand, auch für beste Tiere, so ist ein Preis von 40—50 M. einfach undenkbar. Ebenso ist der Preis mit 15 M. für die bereits Standvogel gewordene Amsel, die manchem Liebhaber im Winter fast von selbst in's Zimmer fliegt, und derjenige von 8 M. viel zu teuer, zudem hat der Kleiber für die meisten Liebhaber gar kein Interesse, auch gehört er zu den das ganze Jahr geschützten Vögeln.

Wenn wir also noch einmal das Merkwürdige vergleichen, so steht unsere herrliche indische Sangeskünstlerin Schama mit 60 M. neben unserer deutschen Sängerfürstin Nachtigall mit 50 M. Diese fängt irgendein deutscher Vogelfänger im Frühjahr mit dem Schlagnetz, und zwar ist es ja beinahe sprichwörtlich, wie leicht die Nachtigallen in's Garn gehen. Er liefert sie dem Händler ab und wird entsprechend entschädigt. Jene hat eine lange risikogroße Seereise hinter sich, macht dem Importeur, bis sie bei ihm im Käfig sitzt, noch allerhand

Schwierigkeiten und finanzielle Auslagen (ich kenne einen Fall, bei dem einem Importeur durch zu langes Stehen an der Zollgrenze sämtliche Schama verdurstet, also tot ankamen). Trotzdem kostet die Nachtigall dort fast so viel wie die Schama! Das sind ungesunde Verhältnisse, und gegen solche muß im Interesse der Vogelliebhaber wie der Liebhaberei eingeschritten werden. Hier wäre ein Betätigungsfeld für den Reichsverband, der die Preisbildung zu überwachen hätte und solche Unterschiede auf ein vernünftiges Maß zurückführen könnte, denn durch solche Preise wird die Liebhaberei nicht gefördert, es wird dem wirtschaftlich Schwächeren unmöglich gemacht, sich edlere Weichfresser zu halten bzw. zu kaufen und er wird dadurch veranlaßt, sofern er auf die Käfigung nicht verzichten will, durch verbotenen Fang in den Besitz des Vogels zu kommen. Sofern unsere Liebhaberei ideale Ziele verfolgt, sollen sie nicht durch materielle Überforderungen zerstört werden.

Widerwärtigkeiten.

Von Emil Kaforke, Berlin.

(Nachdruck verboten.)

Die Lösung eines Rösselsprungs, dessen Verfasser mir unbekannt, lautet:

Es lebte einst in Indien
Ein alter Kakadu,
Der drückte beinah' immerfort
Das eine Auge zu.
Und wenn ihm das verleidet war,
Was tat der Kakadu?
Er macht' das eine Auge auf
Und drückt' das andre zu.
Das war ein großer Philosoph,
Der alte Kakadu!
Und wer zufrieden leben will,
Drückt stets ein Auge zu.

Rosakakadu.

Der in diesen lustigen Reimen ausklingende Rat ist zwar für alle mißvergnügten Menschenkinder sehr heilsam, indes nur so lange von Bedeutung, als ein unerwarteter Fehler sich mit einem Auge übersehen läßt. Muß man jedoch beide Augen schließen, dann wird der Fehler zur Widerwärtigkeit, die am besten verschwindet, wenn wir sie mit echt orientalisch weiser Ruhe als unser Kismet betrachten. So vermochte ich viele wenig angenehme Überraschungen leicht zu ertragen. Es sei mir gestattet, einige Erlebnisse zu erzählen.

Im quartier latin, in dem Hause eines Käsehändlers, nicht ganz fünf Treppen hoch, lag meine bescheidene Studentenbude, die dem ersten Papagei, leider nur kurze Zeit, als Herberge diente. Eine schön befiederte, gesunde Portorico-Amazone war es, und ein zahmer, ruhiger, gutsprechender Vogel sollte es außerdem sein. Der neue Zimmergenosse erhielt seinen Platz an dem einzigen Fenster, während ich mich gegenüber auf einem antiken Rohrsessel niederließ, um der Dinge zu harren, die da kommen sollten. Und sie kamen verteufelt schnell. Nach kurzer Mahlzeit lüftete der mit Ungeduld sehnsüchtig erwartete Liebling seine Flügel, schrie laut Lora, Lora und kreischte nach Herzenslust. Alle Beruhigungsversuche mit Worten und Leckerbissen scheiterten, bis endlich die hereinbrechende Nacht ihr Recht geltend machte. Am folgenden Morgen mußte ich früh ins Kolleg, kam erst gegen Abend heim, erfuhr aber bereits auf der zweiten Treppe von meiner braven fürsorglichen Wirtin, daß der Papagei fortgesetzt gelärmt habe und auch bissig sei. Bitter enttäuscht, war es nun meine Aufgabe, die Ursache des sinnlosen Tobens zu ergründen, ohne jedoch ein Resultat zu erzielen. Als am übernächsten Tage mich dann noch eine junge Mutter ihres Kindes wegen flehentlich bat, den unerträglichen Schreihals abzuschaffen, turnte ich Hals über Kopf zum nächsten Vogelhändler, um die Amazone gegen einen — „lieben, süßen, ganz stillen" Rosakakadu einzutauschen. Jetzt war ich vom Regen in die Traufe gekommen. Das „prächtige Kakaduchen" zeterte nicht nur bei Tage, sondern auch in der Nacht; es zerstörte in wenigen Minuten mit bewundernswertem Eifer jeden Sitzstab. Heiliger Brahma, was tun? In dieser Not kam ein rettender Engel in Gestalt eines tierfreundlichen Schneiders, der Röschen für wenige Mark erstand.

Das war der erste Streich, der zweite folgte gleich.

Im Berliner Zoologischen Garten, an einem regnerischen sogenannten Fünfundzwanzigpfennig-Sonntag schloß ich intime Freundschaft mit einem liebenswürdigen stattlichen Molukkenkakadu, welcher mich derart fesselte, daß an demselben Tage nach Hamburg eine Anfrage abging, ob ein ähnlich zutraulicher Gesellschafter vorhanden wäre. Und fast postwendend schilderte eine gute Seele in einem vier Seiten langen Briefe die hervorragenden Eigenschaften ihres Molukken, den sie mir gern überlassen wolle. Ja sagen, Geld beschaffen war das Werk einer kurzen Spanne Zeit; achtundvierzig Stunden später lachte ich Tränen über den lustigsten aller von mir gepflegten Papageien. Koko, einem Federball gleichend, schlug um Stab und Tau die tadelloseste Riesenwelle, sprach und pfiff, flog auf Wunsch vom Käfig auf meine Schulter und saß friedlich neben mir, wenn ich arbeitete. Ein Idealpapagei! Doch mit des Geschickes Mächten . . . Nach Verlauf von zwei Wochen hatte der begabte tugendreiche Krummschnabel das Krähen und Gackern von Hahn und

Henne so naturgetreu gelernt und so laut und fleißig bei Tag und Nacht wiedergegeben, daß die Einwohner beim Polizeiamt wegen Ruhestörung Beschwerde führten. Da alle Abhilfsmittel versagten, mußte ich schweren Herzens das an sich kostbare Tier verkaufen. Koko wanderte nach Rußland.

Ruhig, aber auch öd und leer erschien meine Klause, freudlos fühlte ich mich einsam und verlassen. Um aus dieser trüben Stimmung herauszukommen, hielt ich sogleich wieder Umschau nach einem neuen Freunde, der mir dann auch bald angepriesen wurde. Ein zahmer, etwas plaudernder kleiner Alexandersittich sollte meinen Molukken ersetzen. Auf Grund der mir „streng reell zugesicherten Bedienung" bestellte ich den Vogel, empfing jedoch einen großen furchtsamen Alexander, der infolge eines völlig verkrüppelten Fußes nur auf einem Bein richtig sitzen konnte. Jeglicher Protest bei dem Lieferanten war aus naheliegenden Gründen zwecklos. Den sonst hübschen Papagei nahm als Geschenk eine edle mitleidsvolle Dame. Diese widerwärtige Episode verleidete mir die Papageienliebhaberei, welche erst dann erwachte, als von privater Seite ein zutraulicher Pflaumenkopfsittich abgegeben werden sollte. Auftrag und Zusendung erfolgten prompt, und aus dem Kasten spazierte ein quarrender Mönchssittich! Hier rettete ich mit größter Mühe das bereits verloren geglaubte Geld.

Molukkenkakadu.

Um das Maß des Mißgeschicks gerüttelt voll zu machen, ließ ich mich verleiten, auf ein „brütlustiges Pärchen Philippinenkakadus" zu reflektieren. Durch Eilboten gelangten die Tiere sorgfältig verpackt in meiner Abwesenheit an. Seelenvergnügt hörte ich die Meldung, schnell war die Hülle entfernt, und, o Kismet, o Kismet, zwei allerdings muntere, aber um keinen Preis gewünschte Rosakakadus kamen zum Vorschein. Darob entstand großer unerquicklicher Krieg, der mit einem Pyrrhussiege meinerseits endete.

Das war der letzte Streich. Endlich hatte ich begriffen, daß man nur von renommierten zuverlässigen Firmen kaufen und zuweilen ein Auge schließen soll, um die Finanzen nicht über Gebühr zu schwächen und die Liebe zum Federvolk dauernd zu erhalten.

Nun, lieber Leser, drück' auch du
Dann und wann ein Auge zu! —

Rotschwänze — Phoenicurus *(Forst.)*.

Eine Monographie von John Kuntzendorff.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

In Südostasien und dem ostindischen Inselarchipel leben Vertreter einer Vogelgruppe, deren einer mit Erithacus grandis eine derartige Ähnlichkeit hat, daß man in ihm das naturgetreue Abbild des letzteren zu sehen vermeint, wenn man das Fehlen des weißen Flügelspiegels und die aufs höchste gesteigerte Farbenpracht dieses Vogels außer Acht läßt. Er zeigt, wie seine Verwandten gleichfalls, dasselbe Benehmen, dieselben Lebensgewohnheiten, das Bevorzugen gleicher Örtlichkeiten, allergrößte Ähnlichkeit im Wesen und dieselbe Farbeneinteilung wie die Riesenrotschwänze. Es sind dies die zur Gattung

Chaimarrhornis

gezählten Vögel, die sich in einigem von den Rotschwänzen unterscheiden, Unterschiedsmerkmale, die jedoch in verringertem Maße auch bei diesen vorkommen. Ich weise z. B. auf die etwas verschiedenen impulsiveren Schwanzbewegungen der Riesenrotschwänze gegenüber den der übrigen Rotschwänze hin. Ganz auffallend ist es, daß die Schwankungen des Flügels und die Altersunterschiede bei E. grandis auch bei Chaimarrhornis leucocephala vertreten sind. Wie bei E. grandis ist bei Ch. leucocephala das Jugendkleid mit dem Alterskleid übereinstimmend, ist jedoch an den großen Flügeldecken klein hell gefleckt. Wenngleich bei Ch. fuliginosa das Jugendkleid dem des Weibchens ähnelt und dieses dem des Männchens nicht ähnlich ist und auch nicht dem weiblichen Kleide der Rotschwänze, so ist seine Ähnlichkeit in seinem Wesen und seinen Lebensgewohnheiten mit dem Ch. leucocephala einerseits und den Rotschwänzen andrerseits eine derart eklatante, daß man ihn mit beiden als verwandt erachten muß. Ich hatte jahrelang Gelegenheit, Chaimarrhornis leucocephala und Chaimarrhornis fuliginosa zu beobachten — da ich während der Jahre 6 Exemplare des ersteren und über zwei Jahre ein Exemplar des letzteren verpflegt habe — und trotz etlicher Verschiedenheiten die Wesens- nnd Lebensgewohnheitsgleichheit dieser mit denen der Rotschwänzen festzustellen. Ich betone nochmals, die Unterschiede, die beide von den Rotschwänzen zu trennen scheinen, kommen in geringerem Maße auch bei diesen vor und nähern sie ihnen gerade, statt sie von diesen zu entfernen. Bevor man aber definitiv dazu schreitet, alle vier Chaimarrhornis-Arten dem Subgenus Phoenicurus einzuverleiben, ist es notwendig, das nicht nur hauptsächlich von Chr. bicolor und affinis — daneben natürlich auch von beiden anderen Arten — eine größere Anzahl Bälge und nicht nur ♂♂, sondern auch ♀♀ und solche im Jugend- und Nestkleide, für die Untersuchung zur Verfügung stehen, sondern auch alle vier Arten lebend genügend beobachtet werden. Weniger wichtig ist, wie diese Beobachtung bewerkstelligt wird, sei es in der Natur oder, was der Beobachtung zum mindesten gleich dienlich ist, in einer

der Heimat dieser Vögel entsprechend eingerichteten Voliere, die den Erfordernissen ihrer Lebensgewohnheiten nachkommt, da man hier die Vögel ständig unter Augen hat und sie nicht Gelegenheit haben, sich dem Beobachter durch Flucht zu entziehen. Dazu müßten aber zwei Arten erst eingeführt werden und alle vier in genügender Anzahl nach Deutschland kommen. Hierbei ist es natürlich sehr wünschenswert, ja sogar erforderlich, daß auch von allen vier Arten die dazu gehörenden ♀♀ mitgebracht werden, damit die über passende Räumlichkeiten verfügenden Liebhaber und besonders die zoologischen Gärten, als die dazu berufenen Institute, denen ja Flugräume genügend zur Verfügung stehen — ich erinnere daran, daß diese Vögel sich sehr gut im Freien überwintern lassen — spezielle Beobachtungen über das Brutgeschäft machen können und diese der Wissenschaft und damit auch der Allgemeinheit zugute kommen lassen. Es muß auch hier — wie es eigentlich immer der Fall sein sollte — die Liebhaberei mit der Wissenschaft Hand in Hand arbeiten, so daß dann diese von jener und jene von dieser profitieren könnte.

Bei genügender Kenntnis der beiden noch nicht eingeführten Chaimarrhornis stände ich nicht an, sie in das Subgenus Phoenicurus einzureihen, falls sie alle vier gleich Ch. leucocephala, der Prachtausgabe von E. grandis, und fuliginosa, die ersterer, außer in der Gefiederfärbung, in allem gleicht, den Rotschwänzen ähnlich sind. In der Gefiederfärbung aber stellen die vier Chaimarrhornis-Arten regelrechte Übergangsstufen zueinander dar, indem Bicolor, abgesehen von dem Fehlen des leuchtenden Weißes und der statt der schwarzen, graublauen Färbung, das verkleinerte Ebenbild von Ch. leucocephala ist und affinis und fuliginosa wiederum in ähnlicher Weise gleicht, nur mit dem Unterschied, daß bei jenen die blaugraue Farbe die kastanienbraune bis auf ein Minimum verdrängt hat. Sie haben im Verhältnis zu den Flügeln etwas kürzeren und auch abgerundeteren Schwanz und stärker entwickelte Schnabelborsten als die Rotschwänze.

Inkakakadu.

Der weißköpfige Wasserrotschwanz (Weißkopfschmätzer) — Chaimarrhornis leucocephala (*Vig.*).

Der farbenprächtigste aller hier behandelten Vögel ist der weißköpfige Wasserrotschwanz, der das Ebenbild der Riesenrotschwänze mit ins kolossale gesteigerter Farbenpracht darstellt.

♂ ad. Oberkopf, Nacken, Hinterhals, beinahe bis zum Rücken reichend, atlasweiß; breiter Stirnrand, Kopfseiten, Hals, Rücken, Vorderbrust, Schultern, Oberflügeldecken glänzend schwarz; Bürzel, Oberschwanzdecken, übrige Unterseite tief rötlich kastanienbraun; Flügelfedern schwarz, Unterflügeldecken mattschwarz, rotbraun gespitzt; Schwanz von der Farbe der Oberschwanzdecken mit 1—2 cm breiter, schwarzer Endbinde, das äußerste Paar an der ganzen Spitzenhälfte schwarz und an der Außenfahne bis zur Hälfte schwarz gesäumt; Schnabel schwarz, Auge braun, Füße schwarz. ♀ ad. ist dem ♂ gleich, jedoch merklich kleiner. Jugendkleid ist dem des ♂ ad. ähnlich, nur brauner, das Weiß des Oberkopfes verwaschen mit Grau gemischt. Nordchinesische Stücke sind etwas größer als die des Himalajas, jedoch ist der Größenunterschied nicht konstant genug, um die nordchinesischen Vögel von den übrigen abzutrennen.

Beheimatet ist Chaimarrhornis leucocephala im Himalaja von Afghanistan, Kaffiristan und Kaschmir bis zu den Khassiahügeln und Burma, in den chinesischen Gebirgen, Kansu, Tsin-ling, Szetschwan bis zum Irrawaddi und Yangtse. Im Berglande südlich des Brahmaputra kommt er im Sommer vereinzelt vor, ist jedoch im Winter ziemlich gemein. Desgleichen ist er in Sikkim vorzugsweise Wintervogel. Im Gebirge steigt er bis in Höhen von 6000 m, im Winter aber geht er bis 900 m in die Täler hinab. Er hält sich hauptsächlich an den Ufern der Flüsse auf und ist weniger an reißenden Gießbächen zu treffen, da er flachere und steinigere Gewässer bevorzugt, wo er, das Wasser durchwatend und von Stein zu Stein hüpfend und eifrig hin- und herlaufend, der Insektenjagd obliegt. Doch ebenso oft sieht man ihn, gleich den Rotschwänzen, nach Art der Fliegenschnäpper die Beute in der Luft erjagen. In etwas anderer Weise, als die Rotschwänze, wippt und spreizt er seinen Schwanz. Diese Bewegungen sind bedeutend impulsiver und das Schwanzspreizen augenfällig. Der Flug ist schnell und wellenförmig und gleicht dem der Rotschwänze. Das Nest wird napfförmig an den Uferwänden der Gebirgsgewässer in Höhlungen oder Spalten aus Moos, Wurzeln, Stengelchen und Halmen gebaut und mit Fasern und Haaren gepolstert. Das Gelege besteht aus 3 hellgrünen bis grünlichweißen Eiern, die rotbraun und graulila gefleckt sind. Die Brut findet im Mai statt. Der Lockton ist tief pfeifend und der Gesang ein eigenartiges Gemisch von trillerartigen knarrenden Lauten. (Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Ein Beitrag zur Bekämpfung der Mäuseplage in der Vogelstube. Für jeden Vogelhalter ist das Fernhalten der Mäuse aus der Vogelstube eine sehr wichtige Angelegenheit; denn die nächtliche Beunruhigung durch Mäuse-

besuche ist für Vögel im höchsten Grade schädlich. Auch in dem Zimmer, in dem ich meine gefiederten Stubengenossen halte, derzeit nur Körnerfresser und Kanarienvögel, habe ich immer wieder trotz Fallen und Auslegen von Strychninweizen Mäusebefall feststellen müssen, bis ich schließlich ein neues, allerdings sehr giftiges Präparat anwandte, das vor kurzem vom deutschen Pflanzenschutzdienst als gutes Mäusegift empfohlen worden ist, die Zelio-Giftkörner der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer u. Co. Landwirtschaftliche Abteilung in Leverkusen b. Köln a. Rh. Das Mittel ist sparsam in der Anwendung, da schon wenige Körner genügen, um die Mäuse zu töten. Der Hauptvorteil der Zelio-Giftkörner liegt aber meines Erachtens darin, daß sie von den Nagern sehr gern gefressen werden. Ich habe hier, um mich von dem Werte dieses Giftes zu überzeugen, folgenden Versuch gemacht: Ich habe den Mäusen geschmorten Speck, unvergifteten Weizen, Mehl und diese Zelio-Giftkörner angeboten und nur letztere wurden von ihnen angenommen! Offenbar sind dieselben gesüßt und munden den Mäusen recht gut. Das Gift — die Zelio-Körner sind ein Thalliumpräparat — muß auch recht schnell auf die Mäuse einwirken; denn ich fand, nachdem ich abends 10 Körner ausgelegt hatte, am nächsten Morgen, obwohl nur 2 Körner fehlten, schon eine tote Maus ganz in der Nähe des gestreuten Giftes. Seit ich mich dieses Präparates bediene, ist die Mäuseplage in meiner Wohnung und vor allem in meinem Vogelzimmer behoben. Der hohen Giftigkeit wegen verbietet sich die Anwendung freilich in allen Vogelstuben, in denen die Vögel freifliegend gehalten werden und damit auch die Giftkörner, die allerdings zum Schutze rot gefärbt sind, auslesen könnten. In anderen Räumen aber und im Haushalt stellen die Zelio-Giftkörner das beste Mäusegift dar, das ich kenne.

Dr. H. W. Frickhinger, München.

Mehlwurmzucht. Als Vogelliebhaber war es auch mein Bestreben, meine Mehlwürmer zu züchten. Ich war auch darauf verfallen, möglichst absolut dichte Behälter dazu zu verwenden. Da hielt ich Blechdosen und Blecheimer für das Zuverlässigste. Jedoch wurde ich durch meine Erfolge eines andern belehrt. In sämtliche Behälter hatte ich Milben bekommen, durch Stoffreste, die ich hineintat, Motten. Nach allem Hin und Her baute ich mir neue Kisten. Die Milben konnten sich nur entwickeln durch ungenügende Porosität. Um das Durchbeißen der Kisten zu verhindern, hobelte ich die Innenseite ganz glatt. Die Ecken wurden gefandelt. Damit Luft doch noch genügend Zutritt hat, machte ich oben einen mit Drahtgaze überzogenen Rahmen. Dadurch kann der Käfer auch über den Deckel laufen. Diesen Deckel schraubte ich auf. Um aber leicht die Mehlwürmer füttern zu können, machte ich in den Rahmen ein 12 cm breites Mittelstück. In diesen brachte ich einen Blechzylinder von 10 cm Durchmesser und 10 cm Tiefe an. Da kann ich jederzeit leicht an die Mehlwürmer, da auf dem Blechzylinder nur ein leichtes Deckelchen darauf liegt. Gegen die Motten nehme ich keine Stoffreste mehr, sondern Wellpappe. Da bin ich die Motten und Milben los geworden und ziehe schon mehrere Jahre mit Erfolg in den Kisten. Da eine solche Kiste auch gebeizt und mattiert werden kann, kann man sie in jedem Raum unterbringen.

J. Ruppert, Würzburg.

Kauenfang und Vogelschutz! Als alter Vogelliebhaber, der ich schon fast alle Sorten Vögel eingebauert, hat mir eine Art Vogelfang nie imponieren können. Es ist dieses der sogenannte „Kauenfang". Dieser Fang wird von versteckt gebauten Hütten (Kauen), mit davorliegendem Vogelherd betrieben. Hier im „Bergischen" und in Thüringen wird dieser Fang viel betrieben. Wenn der Sommer zur Neige geht und nächtlicher Rauhreif erinnert uns an das Herannahen des unerbittlichen Winters, dann sagt der Instinkt unsern gefiederten Sängern, daß es Zeit wird, die Heimat zu verlassen und sich in wärmere Zonen bis zur Wiederkehr des blühenden Frühlings zu begeben. Daß bei ihrem Zuge dorthin tausende Vögel ihr Leben einbüßen, ist bekannt. Den Löwenanteil an diesem Zugrundegehen haben leider wir Menschen. Nun wird hier in Deutschland viel über den Vogelfang in Italien, mit Recht, gewettert. Denn was dort für Schwärme unserer nützlichen Schwalben gemordet, nur um den verwöhnten Gaumen einzelner Menschen zuliebe, spottet jeder Beschreibung. Aber sieht's hier viel anders aus? Morden —, Pardon, töten nicht auch unsere Kauenfänger nützliche Vögel. Tiere, welche schädlich sind, mögen ja zum Fangen und Töten freigegeben bleiben, denn auch diesen Leuten will ich ihren, wenn auch nicht schönen Sport (denn öfter sind die Kauen nicht allein zum Fangen, sondern zum Schlemmen, Saufen und noch etwas anderm da) — gönnen. Aber daß Vögel, wie unsere Singdrossel — Turdus musicus zum Verzehren gefangen werden, will mir nicht gefallen Dieser Vogel, der uns zuerst bei seiner Wiederkehr mit seinem Sange an den kommenden Frühling gemahnt, ist außerdem sehr nützlich. Da er sich fast ausschließlich von Schnecken und Würmern ernährt, welches ein vereinzelndes Naschen an Beeren und Trauben gut wettmacht. Daß dieser Vogel auf Ungeziefer versessener ist, wissen seine Fänger genau, denn bei regnerischen Tagen sagen sie: „Die Drossel zieht nicht, kommt aber nicht auf den mit Trauben und Beeren belegten Vogelherd, sondern sucht sich ihre Mahlzeit am Waldrand, wo das Ungeziefer bei Regen ans Licht kommt. Weiß nun einer, wie diesem Fangen und Morden Einhalt geboten werden kann. Man sollte sagen, wer etwas Liebhaberei und Mitgefühl hat, brächte es nicht fertig, diesen Tieren einfach nach dem Fangen den Kopf kalt einzudrücken. Ich denke, Wehmut müßte diese Leute befallen, wenn sie jetzt diesen Vogel „flöten" hörten, und denken darüber nach, daß sie im Herbst (ich sage es nochmal) Mord daran begehen. Könnte der Fang übrigens nicht etliche Wochen verlegt werden, bis diese Tiere fortgezogen sind. Unsere Singdrossel gehört nämlich zu den ersten, welche nach Süden zieht. Wohingegen der eigentliche Krammetsvogel später hier durchzieht. Hier mögen übrigens die Vogelschützler einmal mit eingreifen. Denn obenerwähnte Leute sind keine Liebhaber, welche ihre gefangenen Vögel hegen und pflegen, sondern in gewissem Sinne Vogelmörder.

Otto Bergmeister, Auf der Höhe (Kr. Solingen).

Am 22. Mai verstarb im Alter von 74 Jahren der Nadlermeister

Paul Schindler.

Wir verlieren in ihm nicht nur den verständnisvollen und kenntnisreichen Hersteller seiner weithin bekannten und geschätzten Käfige und Volieren, sondern auch einen tüchtigen Vogelpfleger und prächtigen Menschen. Wer den 74jährigen, den die Last der Jahre in keiner Weise zu bedrücken schien, auf der letzten Berliner Vogelschau sah und von ihm hörte, wie er frischen Mutes die Herstellung seiner Käfige, die während des Weltkrieges und der schweren Nachkriegszeit geruht hatte, wieder aufzunehmen gedachte, hätte nicht geglaubt, daß er sobald von uns gehen würde.

Er war der Typ des tüchtigen Handwerksmeisters, stets bestrebt, das Beste in seinem Fach zu leisten, und der nicht ruhte, bis er dieses Ziel erreicht hatte.

Der Name Paul Schindler wird in den Kreisen der Vogelliebhaber unvergessen sein.

Bücher und Zeitschriften.

Bandfische und „Große Seeschlange". Von Dr. V. Pietschmann. (Veröffentlichungen aus dem Naturhistorischen Museum in Wien, Heft 5.) Wien 1925. Selbstverlag des „Vereins der Freunde des Naturhistorischen Museums", Burgring 7, Wien I. — Kleinoktav, 22 Seiten, reich illustriert. Preis 7500 Kr.

Vom Bestreben geleitet, die Musealsammlungen in noch höherem Grade als bisher Gemeingut des Volkes werden zu lassen und breitere Kreise an der Museumsarbeit teilnehmen zu lassen, von der die Schaukästen nur den sichtbarsten Teil darstellen, unternimmt das Naturhistorische Museum in Wien die Herausgabe einer neuen Schriftenreihe, die ergänzend neben seine alten „Annalen" tritt. —

Diese Schriften erscheinen in freier Folge; jedes Heft ist in sich abgeschlossen und einzeln käuflich. Sie sollen in wissenschaftlichem Geist und gemeinverständlicher Fassung naturwissenschaftliche Fragen — auch in ihrer Beziehung zum Menschen — darstellen. Es ist dabei ebenso an allgemein orientierende Schriften gedacht, wie an Führer durch Sammlungen selbst oder durch die Sammlungsgruppen, an Hilfsbücher für Auffammlungen und sonstige Handweiser, durch die zwischen Museen und Öffentlichkeit der so nötige Kontakt aufrechterhalten werden soll. Der Preis der Hefte ist so niedrig, daß jedermann, auch der Schuljugend, die Anschaffung möglich ist, zumal es sich um kein auf Gewinn berechnetes Unternehmen handelt. — Im vorliegenden Hefte finden wir eine kurze Beschreibung der hochinteressanten Tiefseefische, die unter dem Namen Bandfische bekannt sind und daran anschließend eine Erörterung der Fabeln und Märchen, die sich um sie herum gebildet haben. Die merkwürdig gestalteten Tiere, die nur sehr selten durch Strömungen oder Stürme an die Küsten oder an die Oberfläche des Meeres getrieben werden, haben unter anderem auch Ursache zu verschiedenen Schilderungen von dem Auftauchen der großen Seeschlange gegeben, von der sonderbarerweise der weitaus größte Teil der Menschheit mehr spricht und weiß, als von den meisten wirklich genau bekannten Tieren. Die beigegebenen Abbildungen unterstützen und erläutern die vorliegende Schilderung in besonderem Maße.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnitz, Merveldstr. 39. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

Aufnahme haben in unseren Verband folgende Vereine gefunden: 1. Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Offenbach a. M. und 2. Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Köln a. Rhein. J. A.: Petters, 1. Schriftf.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Joh. Götz, Süddeutsches Vogelexporthaus, Neu-Ulm, (Bayern): Gilbweber, kleine Textorweber, Goldsperlinge (Männchen), Lerchenfinken, Morgenammerfinken, Kaptäubchen, Stahlflecktäubchen, Palmtäubchen, Halsbandtäubchen, Zebratäubchen, Dama- u. Dayaldrosseln, rotbraune Zwergtimalien, Braunscheitel, braunköpfige u. Goldaugentimalien, Kaprötel, Streifentrupial.

Max Kleinert, Berlin NO 18, Strausberger Str. 13: Langschwanzglanzstare, tarant. Unzertrennliche.

Julius Sauer, Leipzig, Neumarkt 16: Rotstirnamazone.

Off. unt. W. H. B. an die Geschäftsstelle d. „Gef. Welt": Amerik. Spottdrossel-Wildfang.



Herrn H. M., Berlin. Die Züchtung von Sonnenvögeln ist nicht sehr häufig gelungen, sie ist auch kostspielig, weil diese Vögel zur Aufzucht der Jungen reichliche Mengen von frischen Ameisenpuppen und Mehlwürmern verzehren. Um einen sicheren Erfolg zu haben, müßte einem Pärchen die ganze Voliere angewiesen werden. Aber selbst wenn die Züchtung gelingen würde und vier junge Vögel erbrütet und aufgezogen werden, so wirft diese Züchtung keinen Gewinn ab. Gewinn kann nur das Gelingen der Züchtung von sehr hoch im Preis stehenden Vögeln abwerfen, oder von solchen, die mehrere Bruten hintereinander machen, keine hohe Anforderung an Futter und Pflege stellen und, in großen Räumen wenigstens, gesellig nisten. Es kämen demnach in erster Reihe Kanarienvögel und Wellensittiche in Betracht. Es ist nun nicht möglich an dieser Stelle über die Züchtung der beiden genannten Arten eingehende Anweisung zu geben. Diese ist aber durchaus nötig, wenn ein Erfolg erzielt werden soll. Die Bücher von Dr. Karl Ruß „Der Kanarienvogel" und „Der Wellensittich" erfüllen diesen Zweck.

Herrn J. F., Karlsruhe. Die von der genannten Handlung bezogene Drossel ist die „Braundrossel—Turdus fumigata *Lcht.*" aus Brasilien. Von einer Drossel dieser Art wird gesagt, daß sie einige sehr schön klingende Rufe hören ließ. Sonst enthält „Fremdländische Stubenvögel" darüber keine Mitteilungen. Die in Nordamerika lebende „Wilsonsdrossel — T. fuscescens *Steph.*" wird auch Fuchs-, Braun- und lohfarbene Drossel genannt und ihr Gesang wird sehr gerühmt. Diese Drossel ist aber in letzter Zeit in Deutschland nicht im Handel gewesen.

Herrn J. B., Leipzig; Herrn R. N., Berlin; Herrn O B., Remscheid; Herrn F. E. O M.: Beiträge dankend erhalten.

Herrn Dr. R., Lobenstein. Der Wellensittich ist einer Darmentzündung erlegen.

Herrn E. Sch., Eystrup a. d. Weser; Herrn Reg.-Baumeister Sch., Stettin; Herrn Th. G., Badenweiler: ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn E. W., Stralsund. ♀ Wellensittich ist einer Kropfentzündung erlegen.

Herrn H. U., Altenburg. Schlechte, verdorbene, rauchige Luft ist der Gesundheit der Vögel natürlich nicht zuträglich. Dasselbe ist der Fall, wenn die Luft von starken Gerüchen durchsetzt ist. Der Geruch des in der Werkstatt gebräuchlichen Mittels ist mir unbekannt und ich kann infolgedessen die ev. schädliche Einwirkung des Geruches auf die Gesundheit der Vögel nicht beurteilen.

Herrn J. K., Laband. Der Papagei ist der Mönchsittich. Wenn ein Mönchsittich sehr jung in die Hände eines Liebhabers gelangt, so ist es möglich, ihn zum Nachsprechen von Worten zu bringen. 7—10 M. wird augenblicklich für einen Mönchsittich gefordert (s. Inseratenteil). Zur Züchtung müßte einem Paare ein sehr großer Raum, mindestens 2 qm, zur Verfügung gestellt werden. Er baut ein sehr umfangreiches, freistehendes, kugelförmiges Nest aus Zweigen und allerlei Reisig, soll aber auch schon in einen sehr geräumigen Nistkasten (40 × 30 cm lichte Weite, Flugloch 11 cm) gebaut haben. Als Futter wird Hirse, Spitzsamen, Hafer, Hanf, Obst (Apfelschnitte), Grünkraut gereicht.

Herrn A. S., Regis-Breitingen. Wellensittiche erhalten weiße Hirse, Hafer, Spitzsamen. Animalische Kost wird von W. zur Aufzucht in den seltensten Fällen angenommen. Meist genügen die genannten Samen. Lebertran kann in geschilderter Weise auch für W. verwendet werden. So jung sind die Geschlechter nicht zu unterscheiden. Die Blaustirnamazone ist ein sehr gelehriger angenehmer Stubengenosse. Es gibt darunter aber auch arge Schreier. Hirse, Mais, Spitzsamen, Hafer, Hanf, Nüsse, Obst.

Herrn H. H. Unter den geschilderten Verhältnissen können die genannten Vögel gehalten werden. Da diese Vögel sehr bewegungslustig sind, dürften 6—8 Vögel genügen. Wenn nur die kleinen zarten Arten gehalten werden, könnte auch ein Zaunkönig den Käfig mitbewohnen. Das genannte Futter genügt, nur müßten entsprechend den Arten im Herbst und Winter auch Obst und einige Sämereien, Nußkerne und dergleichen geboten werden.

Herrn E. K., Schwerte. Die Doppelgelbkopfamazone zeichnet sich durch leichte Fassungsgabe und gutes Behalten der vorgesprochenen Worte aus, die stets deutlich nachgesprochen werden. Zeitweise ist sie ein arger Schreier trotzdem wohl aber die begabteste unter allen Amazonen Es gibt aber auch solche, welche nichts lernen.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

rgang 54 4. Juni 1925 Heft 23

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Meine Drosseln. (Aus 50jährigen Erfahrungen.) (Forts.)

Kleiber und Sumpfmeise. Von Arthur Dresler.

Neueinführungen und Seltenheiten. Von K. Neunzig. (Forts.)

Sind die hohen Preise im Handel mit einheimischen Vögeln gerechtfertigt? Von A. Jena, Biberach/Riß.

Widerwärtigkeiten. Von Emil Kaforke, Berlin.

Rotschwänze — Phoenicurus *(Forst.)*. Eine Monographie von John Kuntzendorff. (Forts.)

Kleine Mitteilungen - Bücher und Zeitschriften - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Ausstellung - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf. vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellung.

Der **Verein der Vogel- und Aquarienliebhaber Herne i. Westf.** veranstaltet in der Zeit vom 11. bis 21. Juni d. Js. im Saale des Herrn Eduard Lobeck zu Herne, Neustraße 67, eine Ausstellung. Ausgestellt werden einheimische und fremdländische Zier- und Singvögel, Zierfische und Reptilien, Hilfsmittel zur Haltung und Pflege, Präparate usw. Wie in früheren Jahren, werden die Mitglieder des Vereins auch in diesem Jahre bemüht sein, den Besuchern eine interessante und reichhaltige Schau zu bieten, damit die seither als mustergültig bekannten Ausstellungen des Herner Vereins ihre alte Anziehungskraft behalten. Die Ausstellung ist geöffnet von morgens 9 Uhr bis abends 9 Uhr. Ein Besuch ist sehr zu empfehlen.

Aus den Verbänden.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Vereinsl.: Karl Röhr, Heiligerweg 28. Versammlung jeden 2. u. 4. Sonntag im Monat, nachmittags 5 Uhr. Liebhaber herzlich willkommen. J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung Freitags, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Blasewitzer Hof". Liebhaber willk. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Rietschelhof", Rietschelstr. 19. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinslokal „Parkhotel", Epinaystr. 1, Versammlung. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an. Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 16. Juni.
A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber. Nächste Veranstaltungen: Donnerstag, den 18. Juni: Vereinsabend im Landesheim, 8¼ Uhr, Vortrag Böneker: „Australische Körnerfresser". Donnerstag, den 9. Juli: Vereinsabend im Landesheim, 8¼ Uhr, Vortrag Klocke: „Mimikry". Alle Mitglieder werden herzlich gebeten, möglichst an allen Veranstaltungen teilzunehmen.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste willk. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 4. Juni 1925. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Normast im „Kaiser Friedrich", Breslauerstr. 50. Liebhaber willkommen. J. A.: Friedrich.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Vereinsabend regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends um 8 Uhr) beim 1. Vors., Herrn Jahn, Feodorastr. 7. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. A. Voigt.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße.
gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Tage im „Goldenen Falken" Versammlung; nächste Freitag, den 12. Juni. Liebhaber willk. Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Versammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Liebhaber willk. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebenda. R. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. — Am 18. Mai hielt der genannte Verein im Sächs. Hof seine Jahreshauptversammlung ab. Leider war die Beteiligung an ihr ebenso schwach wie das ganze Jahr hindurch bei dem bunten Wechsel der Versammlungen. Der 1. Vorsitzende und sein Kassierer haben darum ihre Wiederwahl von einem hoffentlich regeren Interesse der Mitglieder im neuen Vereinsjahr abhängig gemacht. Nach den eingehend gehaltenen Jahresberichten des Schriftführers und Kassierers schritt man zur Vorstandswahl, die satzungsgemäß jedes Jahr stattfindet. Die bisherigen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt; nur die beiden Schriftführerposten mußten neu besetzt werden, da bedauerlicherweise der bisherige 1. Schriftführer Reinhard, kaufm. Angestellter, sein Amt niedergelegt hat. Den neuen Vorstand bilden: Stud.-Rat Prof. Jahn 1. Vors.; Werkm. Mann 2. Vors.; Pensionär Koch Kassierer; Lagerhalter Fritzsche 1. Schriftf. und Werkm. Köhler 2. Schriftf. Die 4 Beisitzer sind Kassenrevisor Echoft, Fabrikant Hermann sen., Postbote Schulze und Werkm. Wemme. Der Verein zählte

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

50 Mitglieder, 2 hat er durch Tod, 1 durch freiwilliges Ausscheiden verloren. Zu Ehren der durch den Tod entrissenen, Rosenschulbesitzer Viktor Guericke und Renter Adolf Weise, erhob sich die Versammlung zu stillem Gedenken vom Platze. Auf Antrag des 1. Vorsitzenden wurde beschlossen, den Stadtrat zu bitten, etwas Aufmerksamkeit auf die im Stadtpark lästig werdenden Eichhörnchen und Eichelhäher zu haben, die nach einwandfreier Feststellung Starbauten und andere Nester geplündert haben, um solche dann als Schlafstätten zu benutzen. Mit einem nicht ganz hoffnungslosen Ausblick ins 4. Vereinsjahr wurde die Versammlung geschlossen, um noch einige Zeit bei gemütlicher Unterhaltung zusammen zu sein. Für Sonntag nach Pfingsten ist wieder eine Morgenwanderung geplant.

Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per ef od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweck

Futtermittel

Mehlwürmer
fund 5 ℳ, bei 6 Pfund Porto und Verpackung frei.

a Ameiseneier
Pfund 6.50 M.
Weißwurm . . . à Pfd. 5 ℳ
Muska-Zecken . . à „ 2,50
Seidenraupenpuppen, gemahlen . . . . à Pfd. 0,75
Garnelen, gem. à Pfd. 0,40 ℳ

la Universalfutter.
ctwa I für Nachtigallen 2.— ℳ
„ II für Grasmücken 1.80 ℳ
„ III für Drosseln . 1.50 ℳ
ben und Analysen zur Verfügung.
treter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [733

pezialvogelfutterhaus für Weichfresser
Eckrich II., Waldsee (Pfalz).

Mehlwürmer, reine Ware,
n Einf. von 1.75 ℳ 1/4 Pfd. franko.
Witte, Niederndodeleben b. Magd.

Mehlwürmer
veget. gez. [735
iter franko gegen Voreinsendung von 2 Mark
onitas-Versand
Rostock i. M. 3.

hlwürmer neue, feinste Qual., Pfd. 6 M.
tner, Breslau, Weinstr. 12. [736

Mehlwürmer
Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd.
ko versend. D. Waschinski & Co., Biesenthal I (Mark). [738

Vogelfutter [739
Kanarien, Waldvögel, Exoten, ageien, Weichfresser. Anerkannt hrteste Mischungen auf Grund langer Erfahrung. Liste 18 über Vogelfutter umsonst.
F. Göpel, Leipzig,
blinring 1. Telephon 14 968.
Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

meisenpuppen
h frisch, à Liter M. 2,30 franko
Garantie f. Qualität.
Th. Witte, [740
derndodeleben b. Magdeburg.

Täglich frische
Ameiseneier
à Liter M. 2,30 franko gegen Voreinsendung des Betrages. [741
G. Behnke
Spezialgeschäft für bessere Weichfresser
Berlin O 34, Petersburgerstr. 29.
Bei Anfragen erbitte Rückporto.

Jeder Vogelliebhaber
verlange **Preisliste** über **Vogelfutter, Utensilien** und **Bedarfsartikel** zur Zucht und Pflege der Vögel. [742
Hermann Sievers, Hannover, Inselstr. 2.

Mehlwurmkisten,
eigene Konstruktion, werden billigst angefertigt. [743
Joh. Ruppert, Würzburg, Kettengasse 18.

Enchyträen
(siehe Heft 22)
in Zuchtkisten mit genauer Zuchtanweisung, das beste lebende Futter für Weichfresser, gibt ab zu 10 M. [744
H. v. d. Höh, Köln, Ulrichgasse 19.

Züchterkollegen!
Wer seine Nachzucht gesund erhalten will, der befolge nachstehenden Wink:
Jungvögeln im Fluge verabreiche man guten Rübsen zur Genüge und „L.K." trocken, soviel sie fressen mögen. Gekochtes Ei verursacht Krankheiten und ist deshalb die Verabreichung zu vermeiden.
Lorenz, Dresden
Drehgasse 5. [745

Mehlwürmer
veget. gez., 1/4 Liter franko gegen Voreinsendung von Mark 2.—. [746
Bonitas-Versand, Rostock i. M. 3.

Mehlwürmer [747
jedes Quantum, 1 Pfd. 4.50 M., Porto u. Verp. extra. 1/4 Pfd. 1,50 M. franko, bei Nachn. 20 Pf. mehr. 5 oder 6 Pfd. franko u. Verpack. frei (Dringend Eilboten). **Händler und Vereine sowie Großabnehmer erhalten hohen Rabatt bei Abnahme von 5—6 Pfd.**
Karl Claus, Mutterstadt 2, Hauptbahnhof.

Züchter-Urteile:

Möchte Sie hierdurch bitten, mir umgehend 8 Pakete Ihrer „L. K.-N." zu senden, da es eine einfache Fütterung ist und sich in der Hecke als Zusatz zum Eifutter gut bewährt.
Linse, den 11. 5. 1925. H. Meyer.

Bitte senden Sie mir sofort per Nachnahme 8 Pfd. „L. K.-Nahrung". Habe selbige immer von einem Aufkäufer bezogen, sie ist ihm aber zurzeit ausgegangen. Seit ich nicht dieses Futter gebe, fange ich tagtäglich blutige Vögel aus, denn es rupft alles. Dittmann.
Ziegenhals, den 12. 5. 1925.

Im Dezember 1924 habe ich „L. K." von Ihnen bezogen und bin damit sehr zufrieden.
Mittenwald, Oberbayern, den 16. 5. 1925. Josef Hofer.

Bitte doch wieder um 8 Pakete „L. K.-Nahrung" per Nachnahme. Weibchen füttern besser wie voriges Jahr. Habe das letzte Paket.
Quedlinburg, den 17. 5. 1925. Chr. Tiebe.

Bitte senden Sie postwendend 3 Kilo Ihrer „L. K.". Ich habe eine Probe Ihres Präparates von einem mir bekannten Züchter erhalten und muß ich aufrichtig gestehen, daß dasselbe großartig ist und gut bekommt. Sendung per Nachnahme. Also nochmals, bitte postwendend senden, da ich nicht aussetzen möchte.
Ilmenau i. Th., den 19. 5. 1925. C. Träger.

Lorenz, Dresden
Drehgasse 5.
Die Originale obiger Zuschriften haben unsvorgelegen. Die Schriftleitung der „Kanaria". [748

Käfige u. Gerätschaften

Wellensittich-Nistkasten
das Beste, was es gibt, per Stück 2 ℳ, gebrauchte Stück 1,10 ℳ, gibt ab [749
Frau Klara Rengebauer, Deutsch-Lissa.

Vogel-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50. **Schlagnetze** f. all. schädl. Vögel M. 2,30, f. gr. M. 2,50 u. 3,80. **Katalog gratis.**
J. Tannen, Gronau 58, Westf. [750

Vögel

Prima Harzer
Kanarien-Sänger
(Stamm Seifert)
mit schöner Hohlrolle, Hohlklingel, Schockel, Knorre, Gluck und tiefen Pfeifen, à 12, 15 u. 20 ℳ, Weibchen à 3 u. 4 ℳ. Versand geg. Nachnahme. Probezeit 6 Tage, was nicht gefällt, tausche um. [751
H. Voigt,
Kanarienzüchter,
Nordhausen am Harz.

Verkaufe dauernd junge Wellensittiche la befiedert, kerngesund, i. Freiflug gezüchtet, grün u. gelb, à 5 M.
Sailer, Planegg bei München, Hofmarkstraße 8. [752

100 Paar
Rotköpfige Inseparables
prachtvolle Vögel, Paar 18 M., 5 Paar 80 M., **Feuerflügelsittiche** Paar 55 M.
Gustav Müller, [753
Vogel-Großhandlung, **Hamburg 31**
Langenfelderdamm 27, Tele. Vulkan 7141.

Suche zuchtfähiges Weibchen **Zebrafink** zu kaufen. Kann evtl. dafür in Tausch geben 1,0 grün. Wellensittich, 1,1 Dompfaff od. Stieglitz×Grünlinge, diesjährig. [754
Apoth. **Viktor, Oberaula** Bz. Kassel.

Papagei, sprechend, zu kaufen ges.
H. Schott, [755
Uffenheim (Bay.), Bahnhofstr.

Chin. Nachtigallen
feurige Schläger 15 M., v. 8 St. an 12 M
junge, prächtige fleißige Graupapageien . . . . . von 125 M
junge, prächtige fleißige Blaustirnamazonen . . . . . von 60 M
junge prächtige große weiße Gelbhaubenkakadus . . . . . 60 M
fingerzahme kleine weiße Gelbhaubenkakadus . . . . . 80 M
fingerzahme Rosakakadus . . . 85 M
Nymphensittich, Männchen . . 35 M
Dayaldrossel . . . . . 55 M
Goldaugentimalie . . . . . 50 M
ind. Buschschnäpper . . . . . 50 M
Indigofinken . . . . . Paar 20 M
Papstfinken . . . . . Paar 25 M
afrik. Goldsperlinge . . . Paar 10 M
Malabarfasänchen . . . Paar 12 M
große Kubafinken . . . Paar 20 M
meerbl. Tangaren . . . Paar 15 M
afrik. Bronzefleck-, Palm-, Kap- und Halsbandtäubchen Paar 9 M
Senegalfinken . . Paar 4, 5 u. 6 M
blaue Reisfinken . . . . Paar 6 M
gelbe Wellensittiche . . . Paar 18 M
grüne Wellensittiche . . Paar 16 M
junge St. 5 M
Zuckervögel, sehr schön . . . . 40 M
junger Hundspavian, wirklich ganz zahm . . . 150 M
Mangabemeerkater, wirklich ganz zahm . . . . . 125 M
Weiß-Pinseläffchen (Saguin), zahm, St. 50 M
Kapuziner, richt. Spieläffchen, zahm, St. 150 M
Eichkätzchen, zahm . . . . St. 8 M
Verpackung 2 M, Porto Dringend 6,50 M
bietet an [756
Friedrich Frank
Zoologische Handlung
München, Gabelsbergerstraße 9
Fernruf 28190.
NB. Kaufe garantiertes Männchen braunbrüstigen Blauschnäpper.

Fremdländische
Stubenvögel
von Dr. **Karl Ruß,**
4 Bände, gebunden, fast neu, zus. 100 Mark (Nachnahme), zu verkaufen.
Heinz Frh. von Haustein
Graz, Herrengasse 18|20. [757

Für alleinstehende Dame mit Kapital, die Interesse für Vogel- u. Zierfischzucht hat und sich gern in der Tierliebhaberei betätigen würde, b.etet sich Gelegenheit, in landschaftlich schön gelegenem Landhaus in der Nähe einer Großstadt Norddeutschlands bei kinderlosem Ehepaar als Hausgenosse Aufnahme zu finden. [758
Zuschriften erbeten unter A. Z. 120 an die Exped. der „Gefiederten Welt".

Achtung! Am 15. d. M. erhebt die Post die Bezugsgebühr für Juli. Wir bitten den Betr bereit zu halten, damit die Quittungen beim ersten Vorzeigen eingelöst werd und keine Unterbrechung in der Belieferung eintritt. Wo der Briefträger die Quittungen ni vorzeigt, ist er daran zu erinnern. Bei Bestellung nach dem 25. erhebt die Post eine Extr gebühr von 20 Pfg., die vermieden werden kann, wenn die Zeitschrift rechtzeitig bestellt wi

Empfehlenswerte Bücher für Vogelfreund

Für Freunde der heimischen Vogelwelt

Die deutsche Vogelwelt nach ihrem Standort.
Ein Beitrag zur Zoogeographie Deutschlands und zugleich ein Exkursionsbuch zum Kennenlernen der Vögel. Von Werner Hagen. Mit 74 Abbildungen und 4 Schwarzdrucktafeln. Kart. 3.— M.

Die einheimischen Stubenvögel,
ihre Naturgeschichte und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 6. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs für Vogelliebhaber Band II.) Mit 22 Farbentafeln und 188 Textabbildungen. Geh. 14.—, geb. 17.— M.

Die gefiederten Sängerfürsten des europäisch. Festlandes,
ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Matthias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln und 16 Textabbildungen. Kart. 3.— M.

Die Hauptregeln der Sprosserpflege.
Scherzreime von Oskar M. Risch. Mit 2 Abbildungen. 1.— M.

Der Dompfaff,
seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Zucht. Auf Grund 54jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8. bis 10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Kart. 1.— M.

Die deutschen Sumpf- und Strandvögel.
Von Dr. Kurt Floericke. Mit ca. 44 Abb. auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.

Die deutschen Schwimm- und Wasservögel.
Von Dr. Kurt Floericke. Mit ca. 45 Abb. auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.

Die mitteleuropäischen Vögel.
Von Dr. E. Bade. Band 1. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Tafeln in Photographiedruck und 144 Textabbild. von Nestern, Eiern u. Vogelteilen. Geb. in Ganzleinen 5.— M.

Allerlei sprechendes gefiedertes Volk
(Raben- und Krähenvögel, Starvögel usw.). Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Kart. 3.— M.

Gefiederte Hausfreunde I.
Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung üb. d. Pflege heimischer Stubenvögel. Kart. 1.— M.

Die Fänge der Raubvögel Mitteleuropas.
Von Prof. Dr. Carl R. Hennicke. Mit 33 lithogr. Tafeln. Kart. 5.— M.

Für Liebhaber fremdländischer Vögel

Die fremdländischen Stubenvögel,
ihre Naturgeschichte, Pflege u. Zucht Von Karl Neunzig. (Zugleich 5. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs für Vogelliebhaber Band I.) Mit 42 Fabentafeln und 400 Textabb. Geh. 30.— M., geb. 36.— M.

Die fremdländischen Weichfutterfresser
(Insekten- oder Kerbtierfresser, auch Wurmvögel genannt, Frucht- oder Beerenfresser und Fleischfresser). Mit Anhang: Tauben- und Hühnervögel. Von Dr. Karl Ruß. (Die fremdländischen Stubenvögel Band II.) Mit 10 Farbentafeln. Geh. 30.— M.

Gefiederte Hausfreunde II.
Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung über die Pflege fremdländischer Stubenvögel. Mit 51 Abbild. Kart. 1.— M.

Dr. Karl Ruß, Die fremdländischen Stubenvögel,
ihre Naturgeschichte, Pflege u. Zucht. Band I—IV. Geh. 150 M., in Halbleder geb. 175.— M. Band I. Körnerfresser ist einzeln nicht käuflich. Band II. Weichfresser. Geh. 30.—M. Band III. Papageien. Geh. 30.— M. Bd. IV. Lehrbuch der Stubenvogelpflege.

Webervögel u. Widafinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege u. Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Kart. 3.— M.

Bilder aus der Vogelstube.
Schilderungen aus dem Leben fremdl. und einheimischer Stubenvögel. Von Dr. Karl Ruß. Kart. 3.— M.

Für Papageien-Pfleger

Die Papageien,
ihre Naturgeschichte, Pflege, Züchtung u. Abrichtung. Von Dr. Karl Ruß. (Die fremdl. Stubenvögel Bd. III.) Mit 10 Farbentafeln. Geh. 30.— M.

Der Wellensittich,
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Sechste, von Karl Neunzig gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 Farbendrucktafel und 31 Textabbildungen. Kart. 2.50 M.

Sprechende Papageien.
Ein Hand- u. Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. 3. verb. Aufl. Mit 2 Farben- u. 32 Schwarzdrucktaf. Kart. 4.50 M.

Der Graupapagei,
seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. 2. von Karl Neunzig bearbeitete Auflage. Mit 1 buntfarbigen Aquarelldruck, [illegible] Textabbild. u. 1 Verbreitungskarte. Kart. 2.50 M.

Der Graupapagei
in der Freiheit und in der Gefangenschaft. Von Dr. Carl Hennicke. Mit 1 Buntbild. Geh. 1.50 M.

Die Amazonen-Papageien,
ihre Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Züchtung. Von Dr. Karl Ruß. 2. von Karl Neunzig bearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1 buntfarbigen Aquarelldruck u. 21 Textabbildungen. Kart. 2.50 M.

Behandlung und Heilung der Krankheiten von grauen und grünen Pagageien.
Von O. Majewski. Geh. 1.— M.

Für Kanarienzüchter

Der Kanarienvogel,
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. 14. Aufl. mit 3 Farbentafeln und zahlreichen Textabbildungen. Bearbeitet und herausgegeben von Karl Neunzig. Kart. 2.50 M.

Die Bastardkanarien-Vogelzucht.
Von Walter Barth. Mit 20 Abb. und 1 Tontafel. 1.50 M.

Die Farben- und Gestaltskanarien
nebst Beschreibung aller verschiedenen Kanarienrassen, deren Entstehung, Form und Farbenveränderung, Bastardzucht und Farbenfütterung von A. Aschenbrenner. Mit vielen stichhaltigen Abbildungen. 1.75 M.

Der Kanariengesang.
Allgemeinverständliche sowie musikalische und phonetische Darstellung von W. Kluhs. 1.— M.

Für Vogelschutz

Handbuch des Vogelschutzes.
Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Doppeltontaf., 1 Karte u. mehr als 200 Textabbild. Geh. 8, geb. 10 M.

Für Geflügelzüchter

Der Brutapparat in der Geflügelzucht.
Darstellung der Herkunft, Bauart, Nutzanwendung und Herstellung des Brutapparates. Von M. Schwarzlose. Mit 10 Abb. im Text. 1.— M.

Für Sammler

Der Präparator und Konservator.
Eine praktische Anleitung zum Erlernen des Ausstopfens, Konservierens und Skelettierens von Vögeln und Säugetieren. Für Naturfreunde herausgegeben von Rob. Boegler. 4. verb. und erweiterte Auflage. Mit 38 Abbildungen im Text. 2.— M.

Der philosophische Bauer
oder Anleitung, die Natur durch Beobachtung und Versuche zu erforschen, von Johann Andreas Naumann. Neudruck nach der 1. Orig.-Ausg. von 1791, besorgt u. herausgeg. von Paul Leverkühn. Geh. —.50 M.

Für Aquarienfreund

Praxis der Aquarienkunde.
Aus der Praxis für die Praxis. Dr. E. Bade. 4. u. 5. Auflage. 1 Farbentafel, 12 Schwarzdrucktafeln und 203 Textabbild. Kart. 5.—

Die ausländischen Aquarienfische,
ihre Naturgeschichte, Pflege Züchtung. Von Dr. E. Bade. 1 Farbentafel, 12 schwarzen Tafeln und 122 Abbildungen im Text. Kart. 5.—

Katechismus für Aquarienliebhaber.
Fragen und Antworten über Einrichtung, Besetzung und Pflege des Süßwasser-Aquariums sowie Krankheiten und Züchtung der Fische. Von Wilhelm Geyer. 8. und von Hans Geyer besorgte Auflage. Kart. 3.—

Der Schleierschwanz und der Teleskopschleierschwanz,
ihre Zucht, Pflege und die Beurteilung ihres Wertes. Von Dr. E. Bade. Mit 5 Schwarzdrucktafeln u. 19 Textabbildungen. Vergriffen

Zimmer- und Freilandaquarienpflanzen.
Von Mönkemeyer. Mit 26 Abbildungen. Kart. 1.20

Die künstliche Fischzucht.
Von Dr. E. Bade. Mit 2 Schwarzdrucktafeln u. 16 Textabbildungen. Geh. 1.—

Das Seewasser-Aquarium,
seine Einrichtung, seine Bewohner, seine Pflege. Mit einem Anhang: Das Brackwasser-Aquarium. Von Dr. E. Bade. Mit 1 Farben- 14 Schwarzdrucktaf. u. 104 Textabb. Kart. 5.— M., geb. 6.—

Für Terrarienfreund

Deutschlands Amphibien und Reptilien.
Eine Beschreibung und Schilderung sämtlicher in Deutschland und den angrenzenden Gebieten vorkommenden Lurche und Kriechtiere. Von Dr. Dürigen. Mit 12 Farbentafeln 47 Textabb. Geb. 20

Praxis der Terrarienkunde.
Terrarium und Terra-Aquarium. Von Dr. E. Bade. 2. u. 3. Aufl. Mit 2 Farbentafeln, 19 Schwarzdrucktafeln u. 116 Abbildungen im Text. Kart. 5.—

Katechismus für Terrarienliebhaber.
Fragen und Antworten über Einrichtung, Besetzung und Pflege des Terrariums. Von Hans Geyer. Kart. ca. 2.50

Die Giftschlangen Europas
beschrieben und in ihrer Lebensweise geschildert von H. Lachmann. 9 Textabbildungen. Geh. 1.—

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Postscheckkonto: Magdeburg 3148 / Postschließfach 148

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 11. Juni 1925 | Heft 24

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Meine Drosseln.

(Aus 50jährigen Erfahrungen.)

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Nach zweitägiger Reise gelangte ich in meinem Heim an, der Vogel war vollständig munter. Er wurde in seinen großen Standkäfig gesetzt und mit Futter sowie Wasser, auch Badewasser, versehen. Zuerst nahm er ein tüchtiges Bad, fraß und setzte sich auf die oberste Sitzstange. Schon am anderen Morgen — ich war gegen Abend tags zuvor eingetroffen — sang er, und zwar gleich laut, tief flötend und gut zusammenhängend. Die Flötentouren glichen groben, aber reinen Orgeltönen, sie endeten in einem melancholisch ersterbenden Akkord. Es war also ein reiner Wildfang, wie ich ihn gesucht hatte, bei der Sache hatte ich Glück gehabt. An seinem Gesang habe ich mich noch jahrelang erfreut, er blieb immer ein rühriger und treuer Sänger, der sogar während der Mauser sang. Bemerken will ich hierbei noch, daß die Amsel nur von kleinerer Größe war, wie im allgemeinen die Amseln sind. Übrigens habe ich unter den vielen Amseln, die ich im Laufe der Jahre besessen habe — wohl an 30 Stück —, oft bedeutende Unterschiede in ihrer Größe festgestellt, und ich habe immer gefunden, daß die kleine Art als die besseren Sänger angesprochen werden können. Hierin unterstützten mich auch ältere Vogelsteller rührig. Sie nannten diese kleine Art Storch- oder Bergamsel. Der bessere Gesang wird aber wohl darin beruhen, daß die Gebirgsvögel im allgemeinen nach allen Erfahrungen die hervorragendsten Künstler unter ihren Genossen sind. An den Gebirgsabhängen der Laubwaldungen, die eben einen guten Widerhall haben, hört der Vogel seinen Gesang wieder und immer wieder ertönen; er glaubt einen Nebenbuhler in der Nähe zu haben und will diesen übertönen sowie überflügeln, dadurch gelangt er zur immer weiteren Ausbildung seines Gesanges. Ich hatte nun zwei prächtige Drosselsänger in meinem Besitz — aber „je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Wünsche still" —, sobald ich ein Angebot von einem hervorragenden Sänger las, mußte ich ihn haben. So wurde von einem kleineren Ort her im bayerischen Wald — von Cham — eine echte Gebirgssingdrossel angeboten. Lesen und bestellen war eins. Damals bestand das jetzige Vogelschutzgesetz noch nicht, und der Versand sowie der Handel waren während des ganzen Jahres gestattet. Der Vogel traf bald mit der Post ein, als Futter empfahl mir der Absender sogar täglich etwas hartgekochtes Hühnerei. Donnerwetter, dachte ich, muß das ein Leckermäulchen sein; denn meine Drosseln hatten bisher solches nicht bekommen. Also der Vogel wurde ausgepackt und in den bereitgemachten Käfig gesteckt. Es war ein schönes, aber altes Männchen, wie ich sofort erkannte, dessen Gefieder stark beschädigt war, es war also ein „wilder" Wildfang. Und hierin täuschte ich mich nicht, er war und blieb wie rein von Sinnen, sowie sich nur jemand seinem Käfig näherte. Auch bei größter Ruhe meinerseits trat hierin keine Änderung ein. Er saß in einem größeren Kistenkäfig, so daß also nur von der Vorderseite eine Störung an ihn herantreten konnte; aber seine Scheu gab sich nicht. Da ich nach der Mitteilung des Absenders wußte, daß er schon seit einem Jahre gekäfigt sein sollte, so hielt ich ein Binden der Flügel nicht für erforderlich, denn das unterdrückte nach meinen Erfahrungen den Gesang fast ganz. Ich erhielt den Vogel Anfang Mai und wollte ihn doch bald hören. Da es im Zimmer mit ihm seines Tobens wegen, trotzdem ich ihn sehr hoch gehängt hatte, kaum auszuhalten war, brachte ich ihn auf den sogenannten Küchenbalkon, also ins Freie. Ich hoffte, die Ruhe dort und die frische Luft sollten ihn beruhigen — aber auch dies war vergebens. Eines Morgens fand ich ihn mit gebrochenem Bein (Oberschenkel) im Käfig, trotzdem tobte er wie toll weiter. Ich ergriff ihn, brachte das gebrochene Bein in die richtige Lage und legte es in eine aus einer Hühnerfeder gefertigte Schiene, bestrich das Bein mit Öl und aufgelöstem Gummiarabikum und umwickelte die Schiene mit Garn. Am folgenden Tage hatte mein Patient aber den Verband wieder abgetobt, ich erneuerte denselben nochmals und verschmierte die Schiene und Bänder mit aufgeweichtem Gips, auch behielt ich den Vogel solange in der Hand — um ganz sicher zu gehen —, bis der Gips hart geworden war. Dann setzte ich ihn in ein kleineres Bauer, damit er sich ruhiger verhalten sollte und mußte. Aber alles vergebens, ich hatte schon öfter Beinbrüche bei meinen Vögeln — selbst bei zarteren — so gut verheilt, bei diesem

Starrkopf half nichts, er beschädigte sich Verband und Bein immer wieder, er ging dabei ein. Ich hätte ihn vielleicht gerettet, wenn ich das Bein einfach amputiert hätte, aber dazu konnte ich mich nicht entschließen, denn als einbeinigen Krüppel wollte ich das Tierchen nicht sehen. Ich hatte einem Rotkehlchen, das ein sehr böses, unheilbares Fußgeschwür hatte, einst ein Bein amputiert, die Operation gelang auch gut, aber der Anblick des Vögelchens verdarb mir meine ganze Liebhaberei, und ich sagte mir: einmal und nicht wieder! Von dieser Singdrossel hatte ich also trotz meiner großen Hoffnungen nichts gehabt. Ich sann aber trotzdem auf baldigen Erwerb einer zweiten. Inzwischen hatte ich die Bekanntschaft des längst verstorbenen Händlers Mathias Rausch in Wien gemacht; vorher bezog ich verschiedentlich sehr gute Vögel aus Prag, zoologische Handlung von Thomas Wessely. Denn als die besten Bezugsquellen edler Wurmvögel war und galt mir Böhmen oder Österreich. Beispielsweise hatte ich aus Prag Edelfinken mit ganz hervorragenden Schlägen, wie Reitzug- und Wildsaufinken, bezogen. Die Vögel waren unter den Flügeln gestempelt als Garantie und sie hielten tatsächlich das, was sie versprachen. Von Mathias Rausch bezog ich Sprosser, Schwarzplättchen und Rotkehlchen. Bei ihm bestellte ich mir eine Singdrossel, und zwar einen hervorragenden Sänger, tunlichst kleiner Art aus den galizischen oder böhmischen Karpathen. Herr Rausch machte mich gleich darauf aufmerksam, daß derartige bestimmte Sänger schwer und oft gar nicht zu erlangen seien, und daß er mir die Lieferung kaum in Aussicht stellen könnte. Wenigstens müßte ich dann längere Zeit warten und die nötige Geduld haben. Hiermit war ich gern einverstanden, denn ich wollte nur einen ganz hervorragenden Sänger. So vergingen fast zwei Jahre, erst nach dieser langen Wartezeit konnte die Lieferung erfolgen. Der Vogel kam an, und wie alle Vögel des Genannten, in tadelloser Beschaffenheit: Gefieder, Farbe wie bei einem aus frischer Luft gegriffenen Vogel. So waren dessen Vögel alle, wenigstens die, die ich bezogen habe. Ich zahlte damals 15 M. für die Singdrossel, tat dies auch gern, denn ich wußte, was ich erhielt. Diese Drossel zu hören, war ein Hochgenuß. Ich bekam sie Mitte Mai, nach acht Tagen etwa sang sie leise und nach weiteren acht Tagen vollständig laut. Da ich inzwischen meine Wohnung gewechselt hatte — ich war an das Stadtäußere, an die Umwallung, gezogen —, konnte ich in den wärmeren Monaten meine Vögel mehr ins Freie bringen, ich hing diese Drossel also neben meinem Schlafstubenfenster auf. Hier begann sie regelmäßig morgens gegen 4 Uhr ihr Konzert. Sie hatte vieles dem Gesang anderer Vögel abgelauscht und brachte dies in ihrer Art wieder, sie hatte Sprosserrufe jeder Weise, wie „Philipp", „Kuhlik" und andere, die natürlich im Drosselgesang viel besser als im Sprosserschlag ertönen. Der beste Beweis für ihr Können war der, daß sich niemals ein Nachbar — die es auch hier gab — über sie beklagt hat. Verschiedene sagten mir, daß es ein wirklicher Genuß sei, diesem Künstler zu lauschen, die Störung im Morgenschlafe nehme man dabei gern in den Kauf. Diesen Vogel habe ich gerade zehn Jahre besessen und nie — auch nicht in der Stube — bin ich seiner überdrüssig geworden. Von ihm stammt es auch besonders, daß die Singdrossel mein Lieblingsvogel, die sie zwar schon in gewissem Maße war, geblieben ist. Ich ziehe sie dem Sprosser und der Nachtigall in der Gefangenschaft vor; ihr Gesang ist mir mindestens gleichwertig und dabei ist ihre Haltung und Verpflegung erheblich einfacher, denn sie ist viel widerstandsfähiger wie die vorgenannten Künstler.

Durch die Verbindung mit Rausch in Wien kam ich auch in den Besitz einer Steindrossel, und zwar auch, wie ich gleich bemerken will, eines Wildfangs. Daß ich andere Vögel nicht nahm, war dem Genannten bekannt. Ich bin sonst nur für sogenannte einheimische Sänger, und zwar deshalb, weil ich die mich umgebende Natur, also die meiner Heimat, im Zimmer haben will. Das Gefieder war an Kopf und Hals schieferblau, auf dem Rücken braun, der Schwanz und der in einen weißen Steiß übergehende Unterleib waren rötlichgelb. Sie war fast so groß wie meine kleinere Singdrossel, aber etwas gedrungener. Ihr Gesang erschien mir grasmückenartig und mit viel fremden Nachahmungen gemischt: Strophen des Schwarzplättchens, der Gartengrasmücke, der Lerchen und anderer Sänger. Dabei war er schön flötend und reich an Tonabstufungen, und wurde fleißig auch abends bei Licht vorgetragen. Ich hielt die Steindrossel, auch Steinrötel genannt, in einem Drosselkäfig und verpflegte sie wie meine anderen Drosseln. Sie wurde auch später sehr zahm und zutraulich und nahm manchen Mehlwurm aus meiner Hand. Ich habe sie sieben Jahre besessen, sie blieb immer ein fleißiger Sänger, und ich verdanke ihr viele genußreiche Stunden. Wie schon vorgesagt, bin ich aber mehr Liebhaber unserer hiesigen Sänger, und die Steindrossel bleibt für uns Mitteldeutsche immerhin ein Fremdling. Sie soll ja auch vereinzelt am Rhein vorkommen und dort in alten Burgen und Felsen nisten*), aber eigentlich gehört sie dem Süden an, in Kärnten, Steiermark und Krain wird sie viel in Gefangenschaft, namentlich auf dem Lande in Bauernhäusern, gehalten, wie ich aus Erfahrung weiß. Mit einem zweiten Exemplar habe ich es nicht versucht, da auch inzwischen mein bewährter Lieferant, Rausch, starb. (Schluß folgt.)

Kleiber und Sumpfmeise.

Von Arthur Dresler.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Eben weil der Blauspecht als Gesellschaftsvogel bekannt und beliebt ist, hat er unter den Gefiederten viel Freunde, auch seiner Verträglichkeit wegen. Ich merkte ihm seine Einsamkeit bald an und gab ihm eine Sumpfmeise zum Käfiggenossen. Dieses reizende, äußerst sympathische, auch gegen andere Vögel völlig harmlose Vögelchen mit der schwarzen Kopfplatte und dem kleinen schwarzen Lätzchen oder Bärtchen

*) Vor etwa 30 Jahren wurde der letzte Steinrötel am Rhein beobachtet. R.

am unteren Schnabelansatz bei seinem übrigen hellen und dunkelgrauen Gefieder, stellt an Munterkeit und neckischem Wesen alle mir bekannten einheimischen Kleinvögel in den Schatten. Auch sie kann auf die Dauer nicht allein gehalten werden, sondern ist auf engere Gesellschaft angewiesen; sie will ein Schlupfnestchen wie der Kleiber haben, das sie nachts zum Schlafen, am Tage als Spiel- und Ruhenest benutzt. Aber sie hat selten Ruhe, und man muß sie in ihrer ungemeinen Lebhaftigkeit und Drolleret bewundern, worin sie alle Anmut entfaltet. Ist der Blauspecht in einem größeren Käfig durch seine Flinkheit bereits schwer mit der Hand einzufangen, so ist das bei der Sumpfmeise — will man keine gefährliche Hetzjagd auf das Vögelchen anstellen — fast unmöglich. So sicher ist ihr Blick und ihre Berechnung für die

Sonst ist die Sumpfmeise durchaus nicht scheu, eher wird sie leicht vertraulich, ja gewissermaßen zahm, da auch sie den Mehlwurm bei freundlichem Zureden vom Finger wegnimmt; sie ist überhaupt ein kluges Vögelchen, das die Worte des Pflegers bald versteht, und es gehört zu dem Lieblichsten, wenn sie dabei das Köpfchen links und rechts wendet und den mit ihr Redenden bald mit dem einen, bald mit dem andern Auge betrachtet. Viel Spaß macht ihr neckisches Wesen, ja ihr Übermut den andern Insassen des Käfigs gegenüber, sei es, daß sie ein Nestchen des andern begehrt oder ihm einen Lieblingsplatz besetzt. Gewöhnlich verstehen viele Vögel darin keinen Scherz, aber der Kleiber ist ein gutmütiges Kerlchen, und bei der Hartneckigkeit seiner kleinen flinken Genossin hat er ihr sein Nest als älterer



Die neuen Flugkäfige im Vogelhaus des Berliner Zool. Gartens. Aufnahme des Zool. Gartens zu Berlin.

greifende Hand, so blitzschnell ihre Flucht. Man muß schon, wie die Vogelhändler, ungemein geübt sein, sie nach mehrmaligem Fehlgreifen dennoch zu erwischen. Am sichersten und ohne sie zu beschädigen wird man ihrer habhaft, wenn man den oberen Teil des Nestchens als Klappe einrichtet und den Moment abwartet, wo sie in ihrem Nestchen den Versteck sucht. In diesem Augenblick verstopft man das Schlupfloch desselben mit Papierschnitzeln, nimmt das leicht ein- und auszuhakende Nestchen heraus und den kleinen Gefangenen aus seinem engen Gefängnis. Entwischt dabei die Sumpfmeise der Hand und ins Zimmer, so ist jede Jagd auf sie sicher vergeblich und nur der Hunger kann sie freiwillig wieder in ihren Käfig zurückführen — wenn der Blauspecht oder die übrigen Insassen des Käfigs inzwischen nicht entwischt sind. Ich erwähne den Umstand des Herausgreifens der Vögel, weil es zeitweilig nötig wird, sie auf ihren körperlichen Ernährungszustand hin zu untersuchen und ihre Fütterung, d. h. die Wahl der Futtermittel, danach zu treffen.

Insasse des Käfigs endlich doch überlassen müssen und begnügt sich mit dem für die Sumpfmeise bestimmten. Das hat ihm viel Beunruhigung gemacht, bis er sich schließlich resigniert in sein Schicksal ergab; vielmals, daß er nach Art der Meisen sich an die Käfigdecke hing und köpflings durch das Schlupfloch seines ihm so liebgewordenen Nestes auf die niedliche Freche schaute, die es sich darin bequem machte und ihn dabei so harmlos freundlich anblickte. Kein Federchen ist bei beiden bei diesem Streit verlorengegangen, denn auch die Sumpfmeise macht nie auch die Miene zum Beißen. Man gibt ihr das Futter des Kleibers, auch etliche Körner Fichtensamen nimmt sie zeitweilig gern. Einen eigentlichen Gesang hat die Sumpfmeise nicht, aber sie läßt meisenartig anheimelnde, ziemlich energische Lock- und Warnrufe ertönen.

Einen Versuch, eine Kohlmeise bei ihnen einzubürgern, haben beide Vögel mit hellem Entsetzen aufgenommen und keine Ruhe eher gefunden, bis ich

die Gefürchtete von ihnen wieder entfernte. Dabei weiß ich sicher, daß die Kohlmeise ihnen nichts zuleide tun würde, da sie Fleisch, selbst Gehirn absolut verschmäht; sie hat nur Vorliebe für Mehlwürmer. Dicht, Käfig an Käfig, dulden sie sie, aber sobald ich die Kohlmeise im Zimmer frei fliegen lasse und sie setzt sich auf den Käfig des Kleibers, macht er Miene, ihr in die Füße zu beißen: so gut gehaßt ist sie, deren Harmlosigkeit er nicht traut, und die er erfahrungsmäßig als Vogelmörder betrachtet. Aber er irrt sich, auch hier gibt es rühmliche Ausnahmen. Die jetzt in meinem Besitz befindliche Kohlmeise ist ein liebes, sangeslustiges kluges Vögelchen, das jedes Wort seiner Umgebung versteht, und besitzt sie auch noch einen Rest von scheuer Vorsicht, so sucht sie ihn doch tapfer durch Vertrauen zu ihrem Pfleger und ihrer Umgebung zu überwinden.

Aus dem Vogelhause des Berliner Zoologischen Gartens.

Von Dr. F. Hauchecorne.

(Nachdruck verboten.)

Das Vogelhaus des Berliner Zoologischen Gartens war ursprünglich mit seiner großen Anzahl von Einzelkäfigen zur Ausstellung einer reichen Vogelsammlung in systematischer Anordnung eingerichtet. Diese Anordnung entsprach durchaus der damaligen Einstellung der Vogelkunde, in der die Systematik eine überragende Rolle spielte. In neuester Zeit hat die Systematik stark hinter der Biologie zurücktreten müssen, sicher nicht zum Schaden der Vogelliebhaber, denen ja in erster Linie die Beobachtung des Vogellebens am Herzen liegt. Dieser Zeitrichtung trug auch der Zoologische Garten Rechnung, indem er auf Anregung des Assistenten Dr. Lutz Heck im Frühjahr 1924 eine Abteilung des Vogelhauses grundlegend umgestaltete. Es ist nicht ohne Bedeutung, wie sich in der Tätigkeit von Vater und Sohn die verschiedene Auffassung zweier Generationen ausdrückt. Eine ganze Seite mit Einzelkäfigen wurde jetzt zu vier großen Gesellschaftskäfigen hergerichtet. Vier Volieren sind jetzt mit verschiedenen Vogelgruppen besetzt, deren Lebensweise dem Beschauer besonders anziehende Bilder zu bieten vermag. Wenn man, besonders an den Sonntagen, den ungeheueren Andrang der Besucher gesehen hat, die sich in endlosen Reihen an den Käfigen vorbeidrängen (denn zur ruhigen Betrachtung läßt einer den anderen kaum noch kommen), sieht man den besten Beweis dafür, daß mit dieser Umgestaltung durchaus das Richtige getroffen war. So sehr es auch für einen Fachmann von Interesse ist, einen Überblick über den Formenreichtum unserer Vogelwelt zu bekommen, so darf man doch sagen, daß noch viel größer das Verlangen ist, wenigstens bei einigen Arten einen Überblick über ihre Lebensweise zu erhalten. Dazu bieten die großen Gesellschaftskäfige die beste Gelegenheit. Wenn man das Vogelhaus vom Hauptweg aus betritt, dann trifft man zur Linken auf den Gesellschaftskäfig für tropische Prachtfinken. Auf freistehenden Bäumchen, auf Kästen und aufgehängten, schaukelnden, stark verzweigten Wurzeln versammeln sich etwa 60 kleine Finkenvögel, für die als Nistgelegenheit an den Wänden und Baumstämmen Harzer Bauerchen, kleine Körbchen und Kästchen angebracht sind, aus denen dann vielfach die Schnäbel der brütenden Weibchen herausschauen. Palmenzweige geben der Voliere ein freundliches, einigermaßen natürliches Aussehen, und auch sonst ist dafür gesorgt, daß das Allzukäfigmäßige möglichst überwunden wird. In der Mitte hängt eine Ampel, die immer mit frischer Tradescantia bepflanzt ist. Auf dem Boden stehen Töpfe mit frischem Grün und Kästchen mit stets erneutem jungen Hafer und Rübsenpflänzchen. Die kleinen Vögel verarbeiten das Grünzeug sehr gern und gründlich. Gefüttert wird mit dem üblichen Körnerfutter. Für feine Körnerfresser vor allen Dingen Senegalhirse, Kolbenhirse ist in Büscheln an vielen Stellen aufgehängt, um den Tieren Beschäftigung zu geben. Auch etwas Weichfutter wird dauernd gereicht, das auch immer Liebhaber findet.

Bisher nisteten hier Silberschnäbel, Schnurrbärtchen und Zebrafinken. Die auffälligsten Bewohner sind wohl die Dominikanerwitwen, deren Männchen zwar einen besonders schönen Schmuck der Voliere bilden, aber leider recht zänkische Gesellen sind. Von anderen Finkenvögeln sind vertreten: Rotstrichastrilde, grüne und graue Astrilde, Elsterchen, Spitzschwanzamadinen, Orangebäckchen, Schnurrbärtchen, Goldbrüstchen, Zebra-, Schmetterlings-, Atlas- und Tigerfinken.

Auch einige Täubchen sind hier mit untergebracht: Kapp-, Schuppen- und Rosttäubchen. Viel hat man von ihnen nicht. Es sind im allgemeinen langweilige und sehr wärmebedürftige Vögel, die sich viel in die Ecken drücken, wenig bewegen und daher leicht zu fett werden.

Die nächste Voliere beherbergt die Weber. Hier wird wohl das Eindruckvollste gezeigt, was der Beschauer sich wünschen kann. Der Nestbau der Webervögel ist ja allgemein aus Reisebeschreibungen und jetzt auch immer mehr von den Reisefilmen her bekannt. Aber es ist doch eine ganz andere Sache, wenn man zusehen kann, wie die Vögel unmittelbar vor unseren Augen die Palmenwedel zerfasern und mit diesem Baustoff in ruhelosem Arbeitstrieb Nest an Nest bauen. Mit unglaublicher Geschwindigkeit verarbeiten die Webervögel solche großen Palmenwedel. Es werden zu diesem Zweck fortlaufend aus unserer Gärtnerei und aus dem Botanischen Garten in Dahlem Palmenblätter beschafft. Vor allen Dingen wird möglichst zum Sonntag immer die Käfigausstattung neu aufgefrischt, damit das zahlreiche Sonntagspublikum die Entstehung der Webernester von Anfang an beobachten kann. Außer den vollständigen Palmenblättern werden noch Sisal-, Hanf- und Agavefasern gegeben. Besetzt ist die Voliere mit etwa 60 Vögeln von 10 Arten, darunter Vieh-, Oryx- und Textorweber, ein Dutzend rotbraune Weber, dann der Breitschwanz-, Masken- und Blutschnabelweber machen zurzeit den Bestand der Webervoliere aus. Obwohl manche Arten schon sehr schöne Nester gebaut haben, sind hier doch noch keine Jungen gezogen worden. Selbstverständlich zerstören sich die Webervögel bei dem nie ruhenden Nestbautrieb auch sehr häufig gegenseitig ihre Nester, um das Material

neu zu verarbeiten. Im allgemeinen vertragen sich die genannten Arten untereinander gut. Nur die Sperlingsweber mußten wir entfernen, weil sie fortwährend schwächere Käfiggenossen umbrachten. Diese Maßnahme war an sich sehr zu bedauern, weil die sehr auffällig und hübsch gefärbten Sperlingsweber gerade in der Mitte des Flugkäfigs ein außerordentlich großes Gemeinschaftsnest gebaut hatten. Außer Webervögeln sind hier noch einige Rotkopfamadinen und abessinische Bandfinken (Neumanns Bandfink) untergebracht, die sich mit den anderen Vögeln durchaus vertragen. Die Amadinen haben auch bereits in Webernestern Eier gelegt und Junge gezogen. Die Fütterung besteht hier aus Weichfutter und Hirse und häufigen Mehlwurmgaben, wofür die Webervögel als 13 Jahre zum Bestand des Vogelhauses gehört. Drei brasilianische Tyrannen sorgen für die nötige Bewegung ihrer Käfiggenossen. Sie sind recht dreist, richten aber nicht gerade Schaden an. Ferner finden wir hier noch vier Arten Trupiale, den Gilbstärling und ein Paar Orangekopfstärlinge. Trotz erheblich geringerer Körpergröße verstehen sich auch die hübschen Perlbartvögel durchzusetzen, die mit ihrem gepunkteten Gefieder und der kleinen Haube recht lustig aussehen. Als unverträgliche Störenfriede mußten alle Langschwanzstare bis auf einen entfernt werden. Als Nistgelegenheit sind an den Wänden Berlepsch-Nisthöhlen angebracht. Einem besonderen Lebensbedürfnis der Stare entsprechend, geben wir ihnen immer frischen Rasen. Diese Maßnahme hat sich sehr gut bewährt.

Die neuen Flugkäfige im Vogelhaus des Berliner Zool. Gartens. Aufnahme des Zool. Gartens zu Berlin.

sehr dankbar sind. Eine unangenehme Gefahr bietet in solchen Webergesellschaftskäfigen die Milbenplage. Da man die Webernester natürlich möglichst lange erhalten will, ist es immer schwer, die Milben in Schranken zu halten.

Den benachbarten Flugkäfig bewohnen tropische Stare, Stärlinge, Trupiale, Mainas und Beos. Eine ebenso farbenprächtige, wie fröhliche und laute Gesellschaft. Ein Paar große Beos hat bereits aus Federn, Pflanzenresten und Rasenstückchen ein Nest gebaut, und oft sieht man das Männchen vor dem Eingang der Nisthöhle mit zitternden Flügeln wie ein Star singen. Unten am Boden ist ein buntes Gewimmel von Glanzstaren. Vertreten ist der Prachtglanzstar, der große Glanzstar, der Dunkelaugen-Glanzstar und der gewöhnliche Glanzstar. Sieben Soldatenstare gehören auch noch zu der Gesellschaft, dann noch einige Veteranen des Vogelhauses, z. B. zwei Cambodja-Stare, die bereits seit dem Jahre 1913 hier leben, und ein Elsterstar, der auch nicht weniger Bekanntlich wachsen allen diesen Vögeln sehr leicht die Schnäbel aus, weil ihnen die Abnutzung beim Stochern im Erdboden im Käfig fehlt. Deshalb ist ein Teil des Käfigbodens mit Rasen ausgelegt, der durch einen umlaufenden Blechstreifen zusammengehalten wird, um Verschmutzung des Sandes und Wassers zu verhindern. Der Rasen hält sich, wenn er gut feucht gehalten wird, recht gut, andererseits trocknet er natürlich, weil er ganz durchlöchert wird, sehr schnell aus. Häufig werden auf den Rasen Regenwürmer gestreut. Durch Heraussuchen der Würmer aus dem Boden bietet sich den Vögeln eine gesunde Beschäftigung und dem Beschauer ein anziehendes Bild. Als Futter wird das übliche Starmischfutter gegeben, dann viel Obst, das besonders bei den Trupialen beliebt ist, Ameiseneier, rohes Mahlfleisch, Mehl- und Regenwürmer. Auf die Schaben, die sich in den Tierhäusern leider mehr als erwünscht vermehren, aber in diesem Falle nicht ganz ungern gesehen sind, machen alle starartigen Vögel eifrig Jagd.

Die Reihe der Gesellschaftskäfige wird geschlossen durch eine Papageienvoliere. Einen fliegenden Papagei zu sehen, ist ja den meisten Menschen ein ungewohntes Bild, aber gerade ein besonders schönes. Wenn der Königssittich gut gelaunt ist und im schwirrenden Fluge seine prächtigen roten und grünen Farben schillern läßt, erregt er stets allgemeine Bewunderung. Die Besetzung eines Papageiengesellschaftskäfigs ist nicht ganz einfach, denn viele Arten sind doch recht unverträglich. Besonders die Loris sind sehr futterneidisch und verteidigen hartnäckig ihren Futterplatz gegen jeden „Unbefugten". Da sie so gut wie nie fliegen, gehen sie von der Umgebung ihrer Futterstelle auch selten weit fort. Als ganz unverträglich mußten Blaustirn- und Mönchssittiche entfernt werden. An Sittichen sind in dieser Voliere ein Königs-, zwei Ring-, drei Oliven-, zwei Jendaya-, fünf Goldstirn-, zwei Rosella-, ein Guatemalasittich, dann zwei tarantinische Unzertrennliche, zehn Paar gelbe, drei Paar olivgrüne und vier Paar grüne Wellensittiche. Von Loris sind gegenwärtig nur Rotnacken- und Schwarzkappen vorhanden. Um den Frieden in einem Papageiengesellschaftskäfig aufrechtzuerhalten, ist das Vorhandensein vieler und verschiedenartig angebrachter Futterstellen ein Haupterfordernis. Für die Loris sind die Futternäpfe an den Wänden und an den Ästen angehängt. Die Sittiche gehen auch gut an Futternäpfe auf dem Boden. Zur Brut schritt bisher mit Erfolg nur der Wellensittich. Als Nistgelegenheit finden die Papageien hier Berlepsch-Nisthöhlen und Nistkästen für Wellensittiche, sowie größere halbrunde Nisthöhlen für Loris. Den Sittichen wird Spitzsaat, Senegalhirse gegeben, Hafer nehmen sie besonders gern, dann erhalten sie noch Sonnenblumenkerne. Trotzdem sie regelmäßig Kalk und zerstoßene Eierschalen bekommen, können sie es nicht lassen, Löcher in die verputzte Wand zu nagen. Die Lorifütterung ist bekanntlich nicht so einfach. Wir sind hier am besten durchgekommen mit gekochtem, gesüßtem Reis, Datteln, Feigen, Bananen und Birnen, Hirse, Spitzsaat und Sonnenblumenkernen. Nur dem großen Nagebedürfnis der Papageien muß man Rechnung tragen. Wir geben deshalb die am meisten beliebten Weidenzweige hinein, von denen sie Rinde und Blätter mit größter Geschwindigkeit und Eifer abnagen, auch Kasten mit junger Rübsaat, ebenso Vogelmiere finden freudige Annahme.

Die Käfige sind alle gleich groß. Jeder hat 3,50 m Giebelhöhe, ist 4,50 m lang und 2 m tief. Der Boden ist mit Flußsand bedeckt. In jeder Voliere befindet sich ein Wasserbassin mit Durchfluß, die Heizung ist unter den Käfigen, eine Rohrleitung geht auch an der Hinterwand entlang. Oberlicht sowie ein großes Fenster an der Sonnenseite sorgen für Helligkeit und Sonne, ein Ventilator für vorsichtige Durchlüftung. Selbstverständlich ist die Besetzung der Voliere nicht immer gleichbleibend. Es wird nach Möglichkeit versucht, den Bestand dauernd zu ergänzen und zu bereichern. Aber man stößt dabei auf sehr große Schwierigkeiten; denn es bilden sich überraschend schnell in solchen Gesellschaftskäfigen „Vogelvereinigungen", die sich zwar untereinander durchaus nicht alle gleich gut vertragen, aber sofort einig sind, wenn es gilt, neue Gäste zu überfallen. Sehr oft ist es durchaus unmöglich, einzelne neue Vögel hinzuzusetzen, sogar nur vorübergehend entfernte wieder an ihren alten Platz zu bringen.

Referat über „Wieder ein Massensterben von Vögeln in der Ostsee".

(Nachdruck verboten.)

In den „Ornith. Monatsberichten" Heft 3 S. 73 berichtet Prof. Dr. J. Thienemann, Vogelwarte Rossitten, über „Wieder ein Massensterben von Vögeln in der Ostsee". Der Verfasser berichtete bereits in der September/Oktobernummer 1918 der Zeitschrift über ein Massensterben von Zugvögeln im Frühjahr in der Ostsee. Im Frühjahr des Jahres 1923 (3. April) fand Dr. W. Quenstedt, Assistent am geologischen Institut der Universität Königsberg, auf dem Wege von Cranz nach Rossitten, wobei er drei Kilometer am Seestrande entlang ging, folgende Vogelkadaver:

Auf der ersten Kilometerstrecke: 2 Stare; 1 Wacholderdrossel; 2 Heidelerchen; 3 Buchfinken; 4 Feldlerchen = 12 Vögel.

Auf der zweiten Kilometerstrecke: 1 Star; 1 Wacholderdrossel; 1 Singdrossel; 4 Weindrosseln; 6 Heidelerchen; 16 Buchfinken; 38 Feldlerchen; 1 Goldammer = 68 Vögel.

Auf der dritten Strecke: 7 Stare, 1 Wacholderdrossel; 4 Weindrosseln; 9 Heidelerchen; 39 Buchfinken; 69 Feldlerchen; 1 Misteldrossel; 3 Amseln; 1 Hänfling = 134 Vögel. Im ganzen 214 Vögel.

Beim Rückweg ging der Herr die ganze Strecke am Seestrande entlang und stellte fest, daß überall Vögel zerstreut herumlagen. So können wir folgende Rechnung aufstellen: auf einem Kilometer entfallen etwa 72 Vögel. Cranz—Rossitten liegen 35 Kilometer auseinander, so kommen auf diese Strecke allein 2520 Vögel. Zu den oben genannten Toten treten noch als neu hinzu: Ringeltauben, Nebelkrähen, Dohlen, Kiebitze, Bergfinken, Waldohreulen, Alpenlerchen — alles Vögel, die sich um diese Frühlingszeit auf dem Zuge befinden. Auch angespülte Säger, Lummen und Tauchenten wurden gemeldet. Die Mehrzahl stellten die Lerchen und Finken.

Der Verfasser berichtet weiter, daß gewöhnlich nur die Gerippe mit Flügeln und Schwänzen usw. gefunden wurden. Ein Teil der Kadaver ist schon fast versandet. Mit Recht schätzt Prof. Thienemann die Anzahl der verunglückten Vögel noch höher ein, da ein Teil derselben nicht gefunden wird. Auf Aufrufe des Verfassers kam der Bescheid, daß auch an der Samlandküste, ferner auf der Frischen Nehrung und bei Zoppot überall im Jahre 1923 dieselben Funde zu machen waren. Der Bericht von der Frischen Nehrung, der von zwei Touristen herstammt, die den Weg Danzig—Königsberg zu Fuß zurückgelegt hatten, enthält noch den Bescheid, daß im Frühjahr 1922 dasselbe Massensterben stattgefunden habe. Die Zahl der auf der Frischen Nehrung aufgefundenen toten Vögel sei etwa zwei- bis dreimal so groß gewesen wie 1923. Auch verendete Möven und sogar Schwäne wurden damals gefunden.

Weiter geht der Verfasser auf die Ursachen dieser „Katastrophen“ ein. Nässende Nebel durchnässen das Gefieder und der folgende Frost bringt es zum Zusammenfrieren. Aus diesen Beobachtungen werden Schlüsse auf den Vogelbestand und das plötzliche Abnehmen einer Art gezogen.

Weiter fährt Prof. Thienemann fort: „Wie nichtig kommen einem angesichts solcher Tatsachen die Anstürme mancher Vogelschützler vor, die gegen Vogelhaltung, Jagd und Sammeln einschreiten wollen. Geht ein paar Kilometer am Seestrande entlang, ihr Übereifrigen, und kratzt euch die herumliegenden Lerchen und Finken aus dem Sande heraus! Da habt ihr bald soviel in euren Rucksäcken, wie die ganze Vogelhaltung in Deutschland jährlich aufbraucht. Und die wollt ihr den Pflegern nicht gönnen?“ R. N.

Die Flugkäfige im Vogelhaus des Berliner Zool. Gartens. Aufnahme des Zool. Gartens zu Berlin.

Die Tage von Leipzig.

Von J. Birk, Leipzig.

(Nachdruck verboten.)

Sie sind verrauscht und haben bei allen denen, die zugegen waren, sicher eine liebe Erinnerung hinterlassen. Mit freudigem Stolz empfand der Kreis der Leipziger Vogelliebhaber die Ehre, welche ihm durch den Besuch der vielen auswärtigen Liebhaber zuteil wurde. Daher Dank allen denen, die wir als Gäste in Leipzigs Mauern begrüßen durften, die mit uns teilnahmen an den Tagen von Leipzig. Es war ein Erleben für das Herz des begeisterten Vogelliebhabers, so manchem Gleichgesinnten die Hand zu drücken, Aug in Auge das gegenseitige Verstehen bestätigt zu finden, und das angenehme Gefühl über sich ergehen zu lassen, daß wir in einer großen Familie der deutschen Vogelliebhaber alle ein wichtiges Glied verkörpern. Kurz, es waren Freudentage, die Tage von Leipzig, die weiter keinen stillen Wunsch aufkommen ließen als den, daß alle, alle die vielen Anhänger unserer edlen Sache mit dabei zu sein in der Lage gewesen wären, wenn Vogelliebhaber zusammenkommen zu stiller Arbeit und innerer Erbauung im verständnisinnigen Gedankenaustausch. Der Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig hatte zu seiner anläßlich der Jahrestagung der Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen veranstalteten Vogelschau alle eingeladen, die ein Herz und eine Seele sind im Ideal unserer Liebhaberei, und sie waren gekommen, wenn auch nicht alle, so doch viele, die durch ihren Besuch die Tage von Leipzig zu Ehrentagen für die Leipziger Liebhaber stempelten. Ihnen allen sei hiermit gedankt die herbeigeeilt waren aus Berlin, Hamburg, Harburg, Dresden, Chemnitz, Jena, Zwickau, Braunschweig, Halle, Aue i. E., Kamenz, Oschatz, Erfurt, Dessau, Eilenburg, Weißenfels, Schneeberg, Zschorlau, Bernsbach, Schönheide, Neugersdorf, Ebersbach, Roßlau, Reidenburg, Roda, Weißwasser, Altenburg, Forst i. L. Der zahlreiche Besuch aus obigen Orten legte Zeugnis

ab von dem guten Ruf, den Leipzig in den Kreisen der Vogelliebhaber genießt, und wenn ich nicht unbescheiden erscheine, so möchte ich es aussprechen, was mich in meinem Innern beseelt: Die Tage von Leipzig haben das Vertrauen, welches die Besucher in die Leistungsfähigkeit der Leipziger Liebhaber gesetzt haben, durch Zufriedenheit mit dem Geschauten bestätigt gefunden, wenigstens bewiesen dies in reichlichem Maße die Worte der Anerkennnng unserer werten Gäste.

Eine Vogelausstellung zu veranstalten ist nicht leicht, gilt es doch dabei, so einwandfrei als nur möglich in der Auswahl des zu zeigenden Materials zu verfahren, alles muß dabei vermieden werden, was Anlaß geben könnte, die Zahl unserer Gegner zu vergrößern, nein, im Gegenteil, wir müssen versuchen, ihnen eine andere Meinung beizubringen von der Berechtigung und Notwendigkeit der Stubenvogelliebhaberei. Die Ziele und der Zweck einer Ausstellung von einheimischen Vögeln sind nicht etwa damit erschöpft, dem Anhänger der Liebhaberei ein Bild zu geben vom Stand der Liebhaberei am Orte, — nein, in erster Linie muß der Eindruck auf die große Masse des Publikums ein überwältigender, jeder Kritik standhaltender sein, wollen wir Vogelliebhaber auch bei dem Laien in dem Lichte erscheinen, wie wir es wirklich verdienen. Niemals darf eine Ausstellung dem Ansehen der Stubenvogelliebhaberei schädlich sein, denn sonst wäre es besser, sie unterbliebe im Interesse unseres Ansehens. Von allen den Ausstellungen, die ich an verschiedenen Orten Deutschlands besucht habe, kann gesagt werden, daß sie, wenn man nicht ein zu scharfer Kritiker ist, würdig waren gezeigt zu werden, so auch wiederum die letzte Leipziger Ausstellung.

Rötelmerle.

Der Zweck derselben war: 1. Den zum Landesverbandstag versammelten Vogelliebhabern den Kern der Leipziger Vogelliebhaberei zu enthüllen. 2. Den vielen Tausenden sonstigen Besuchern ein Bild zu geben, was man eigentlich unter Stubenvogelliebhaberei versteht und wie berechtigt dieselbe ist, wenn Liebe und Sachkenntnis die Triebfeder hierzu sind. 3. Die Kenntnis vom Artenreichtum unserer einheimischen Kleinvogelwelt weiter zu verbreiten, Liebe und Verständnis zu Natur und ihren gefiederten Geschöpfen in die Herzen zu legen, ihren so notwendigen Schutz zu predigen und speziell in unserer heranwachsenden Großstadtjugend das Interesse zu wecken für die so notwendige Rückkehr zur Natur mit ihrem unerschöpflichen Born von Freuden und Wundern. Und halten wir Rückschau auf die Leipziger Ausstellung, die von ziemlich 7000 Erwachsenen und 260 Schulklassen mit 7112 Kindern besucht war, so können wir mit einem zufriedenen Gefühl und freudiger Genugtuung feststellen, daß der moralische Gewinn dieser Veranstaltung nicht unterschätzt werden darf. Bei vielen der Besucher wird doch etwas hängen geblieben sein von dem Geschauten, sie haben sicher den Eindruck mit fortgenommen von dem jubelnden Chor der gefiederten Sänger und den reichlich zur Schau gestellten Schätzen des naturkundlichen Heimatmuseums, daß unsere Heimat schön ist, daß unsere Natur ein interessantes Buch ist, wenn man versteht darin zu lesen. Möge die Ausstellung daher die gewünschten Früchte tragen, denn dies wäre der schönste Dank für die Veranstalter derselben.

Machen wir im Geiste nochmals einen Rundgang durch die Ausstellung, so wird sich zeigen, daß diese Schau das Lob, welches ihr in so reichem Maße gespendet wurde, auch verdient hat. Mir soll es fern liegen, etwa eine Kritik zu üben an dem Gezeigten, dabei bin ich nicht unparteiisch genug und deshalb nicht berufen dazu, hoffentlich geschieht dies von berechtigter Seite ohne jeden Schein von Schönfärberei, wir Leipziger würden dankbar sein für jede Anregung in bezug auf Verbesserungen bei späteren Veranstaltungen. Auch dieses Mal galt als Grundprinzip, sowie bei allen früheren Ausstellungen, Vögel in vollständiger Natürlichkeit, Käfige in fortgeschrittener Vollendung dem kritischen Auge des Publikums zu zeigen, und dies ist auch, was vorneweg erwähnt sein soll, wiederum gelungen, wenn man die drei Vögel, die auf dem Transport zur Ausstellung ihr Schwanzgefieder etwas zerstoßen hatten, mildernd ausschalte. Was es heißt gegen 50 Vogelarten mit einigen hundert Exemplaren zu zeigen, daß keine Feder im Gefieder vermissen lasse, was es bedeutet in Anbetracht der Schwierigkeit der Überwinterung mancher Art sangesfreudige gesunde Exemplare in den Käfigen zu haben, dies alles kann nur der Fachmann, kann nur der Vogelliebhaber im vollen Sinne ermessen. Das Herz muß ihm

höher schlagen in dem Bewußtsein, daß dies alles nur das Resultat einer sachgemäßen Pflege, einer praktischen Käfigung ist, daß wir doch auf dem richtigen Wege sind, die Liebhaberei in etwas fortgeschrittene Bahnen zu lenken, nicht nur in Leipzig, sondern überall, wo organisierte Vogelliebhaber in dieser Richtlinie handeln.

Das Gebiet der Vogelkunde wurde durch eine Ausstellnng der bekanntesten Werke der Fachliteratur erweitert, neben den Werken von Naumann, Brehm, Friedrich, Liebe usw. waren auch alle im Creutz'schen Verlag, Magdeburg, erschienenen Bücher von Ruß, Neunzig usw. zur Orientierung für den Interessenten ausgelegt. Ferner waren zur Ansicht sämtliche zur Pflege der Stubenvögel im Handel befindlichen Sämereien und sonstigen Futtermittel vorhanden, ebenso waren soweit als möglich die Nester und Eier der bekanntesten Singvögel zur Schau gestellt. Um die Vögel zu den betreffenden Nestern und Eiern vor Augen zu führen, veranschaulichten die bekannten Farbentafeln von Kleinschmidt die Zusammengehörigkeit von Vogel, Nest und Eier. Ein sehr natürlich anmutender Futterplatz, sowie alle Arten Berlepsch'scher Nisthöhlen, sowie Futterhäuser veranschaulichten die Notwendigkeit eines praktischen Vogelschutzes.

(Schluß folgt.)

Rotschwänze — Phoenicurus *(Forst.)*.

Eine Monographie von John Kuntzendorff.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der wahrhaft schöne weißköpfige Wasserrotschwanz gehört zu den häufiger eingeführten Vögeln und ist ein lebhafter und munterer Geselle von anmutigem Wesen. Im Käfig ist er ständig in Bewegung, nichts entgeht seinen aufmerksamen Augen. Selten sieht man einen derart lebhaften Vogel. In eleganten, man könnte beinahe sagen, selbstbewußten Bewegungen hüpft er schnalzend von einem Sprungholz zum anderen, wobei er ständig mit dem Schwanze wippt. Dieses Schwanzwippen ist ein kräftiges Auf- und Niederschlagen, das vielmals hintereinander ausgeführt wird. In der Erregung vollführt er diese Bewegungen mit großer Vehemenz, wobei der Schwanz nahezu senkrecht zum Körper gestellt wird. Dabei werden die Schwanzfedern des öfteren mal nach links, mal nach rechts oder auch zugleich nach beiden Seiten gefächert. Mit diesen Schwanzbewegungen verbunden sind tiefe Bücklinge und Verbeugungen. Wenn auch der Gesang nicht als Schönheitsprodukt zu bezeichnen ist, so enthält er wiederum Stellen, die einen nicht unangenehm und unschön anmuten. Als Ganzes aber ist der Gesang als unbedeutend und doch wieder überaus eigenartig zu bezeichnen. Diese, mit hellen, hohen Trillern vermischte Pfeifmute werden von Tönen abgewechselt, die dem Gerausch eines über Steine plätschernden Baches ähneln. Dahinein mengen sich wieder Laute, die denen eines ungeschmierten Wagenrades und einer kräftig gewungenen Knarre vergleichbar sind, an deren Ende stets der obligate Schnalzlaut zu finden ist. Als Käfigvogel ist er ein angenehmer Bewohner der Vogelstube, da er in keiner Weise scheu und störrisch ist. Diese nicht zu unterschätzenden Eigenschaften zeigt er bereits bei seiner Ankunft, denn schon kurze Zeit nach seiner Unterbringung in seine neue Behausung legt er gewöhnlich eine gewisse Zutraulichkeit an den Tag, die er dadurch beweist, daß er sich durch den ihn beobachtenden Pfleger in keiner Weise in der Inaugenscheinnahme seines neuen Domiciliums und dessen Umgebung stören läßt. Richtig zahm werden die weißköpfigen Wasserrotschwänze bei zutreffender Behandlung gar bald, denn in Kürze hat sie der Pfleger so weit, daß sie ihm Leckerbissen aus der Hand nehmen.

Gewinnt Chaimarrhornis leucocephala durch diese Eigenschaften als Käfigvogel sehr an Wert, so ist er als Volierenvogel nicht weniger zu schätzen, da er auch hier weder scheu noch stürmisch ist, überhaupt in keiner Weise unangenehm auffällt. Seine Zutraulichkeit behält er auch hier, ja, er wird dem ihn verpflegenden Menschen gegenüber leicht so zahm, daß er die ihm zugeworfenen Mehlwürmer in der Luft auffängt oder er entreißt sie vorüberfliegend gewandt der sich ihm entgegenstreckenden Hand. Im Flugraum gewährt der weißköpfige Wasserrotschwanz einen gar prächtigen Anblick, hauptsächlich, wenn er sich im Schnee der Außenvoliere herumtreibt. Er hält sich meist auf erhabenen Sitzgelegenheiten auf, die ihm einen weiten Umblick gestatten. In der Hauptsache sucht er die Felspartien auf, wo er besonders die höchsten Gipfel als seine privilegierten Sitze anzusehen scheint, da die anderen Vögel bei seinem Herannahen sofort das Weite suchen. Gebüsch und Äste werden von ihm selten aufgesucht, von den letzteren wählt er nur freistehende als Sitzgelegenheit aus, während er erstere immer nur im Notfalle benutzt. Sein Benehmen in der Voliere deckt sich also völlig mit den in der freien Natur gemachten Beobachtungen. Am Boden bewegt er sich laufend wie hüpfend. Sein Trink- und Badebedürfnis ist ein großes, mehrmals am Tage nimmt er ein ihn gänzlich durchnässendes Bad, oder er durchwatet planschend das Badebassin. Zwischen und unter den dieses auf einer Seite umrahmenden und auch auf der Felspartie befindlichen Zwergnadelhölzern schlüpft er mit großer Gewandtheit durch. Der Flug ist wellenförmig und dem der Rotschwänze sehr ähnlich, jedoch nicht ganz so gewandt. Zur Nachtzeit sucht er als Schlafplatz stets den Zwischenraum zwischen einem mit Birkenrinde ausgekleideten Harzerbauer und einem Längsbalken an der Wand im Außenflug auf. Immer ist er einer der ersten Vögel, die bei Tagesbeginn munter werden, und einer der letzten, die ihren Ruheplatz aufsuchen. Er ist ein durchaus verträglicher Vogel und den anderen Insassen der Voliere gegenüber harmlos. Die Ernährung des weißköpfigen Wasserrotschwanzes bereitet keine große Schwierigkeiten; die Eingewöhnung vollzieht sich meist ohne Zwischenfälle, da er gewöhnlich schnell ans Futter geht. Am leichtesten gestaltet sich diese bei einer Fütterung mit frischen Ameiseneiern und möglichst mit lebend gefangenen Kerfen, denen man allmählich das gewöhnliche Futter in immer größeren Portionen beimischt. Das Futtergemisch ist dasselbe, das man den Rotschwänzen reicht.

Fasse ich die am weißköpfigen Wasserrotschwanz gemachten Beobachtungen zusammen und vergleiche

Alpendohle
(s. Beobachtungen in Davos, S. 283).

Alpenkrähe.

ich sie mit den an Rotschwänzen erhaltenen, so ist die Gleichheit beider eine erstaunliche, und einzig die Schwanzbewegungen sind voneinander verschieden, und das in noch nicht so sehr erhöhtem Maße. Das Schwanzspreizen allerdings ist für Chaimarrhornis charakteristisch und den Rotschwänzen nicht eigen. Aber sonst, der Flug, die Art der Nahrungsaufnahme, das Bevorzugen exponierter Gesteinsteile und freistehender Zweige, das Meiden dichteren Gebüsches, das Aufsuchen gerade der höchsten Felspartien und nicht zuletzt das sonstige Benehmen ist beiden gemeinsam eigen. Vereinigt man dies mit dem eingangs des Abschnittes Chaimarrhornis Gesagten, so liegt die nahe und nächste Verwandtschaft Chaimarrhornis mit dem Subgenus Phoenicurus klar auf der Hand.

Der braunbäuchige Wasserrotschwanz — Chaimarrhornis bicolor *Grant.*

Sieht man von dem Fehlen der Kopfplatte, der graublauen Färbung des Vorderkörpers und des einfarbig braunen Schwanzes ab, so vermeint man die Miniaturausgabe des weißköpfigen Wasserrotschwanzes vor sich zu haben. In Gestalt, Haltung und Wesen gleichen diese Vögel den letzgenannten in einer Weise, daß man sein Erstaunen kaum unterdrücken kann. Andererseits aber ähnelt er wieder den beiden anderen Chaimarrhornis-Arten derartig, hier jedoch nicht nur in Gestalt, Haltung und Wesen, sondern auch in der Gefiederfärbung, daß man sofort in ihm die Übergangsstufe von Ch. leucocephala zu affinis fuliginosa feststellen kann. Leider lag mir von diesem Vogel nur ein Museumsbalg vor, so daß ich nur von diesem meine Beurteilungen wiedergeben kann.

♂ ad. Kopf, Hals, Rücken, Bürzel, Brust dunkel graublau; Bauch, Ober- und Unterschwanzdecken, Schwanz einfarbig kastanienbraun; unterseits dunkler als oberseits; Schenkel graubraun; Flügelfedern dunkelbraun, an Außenfahne schmal — schmäler als bei den beiden folgenden Arten — graublau gesäumt; Schnabel schwarz, Füße schwärzlichbraun. Die Maße des Museumsstückes sind: Fl. 77, Schw. 61.5, Schn. 13, Lf. 23 mm. Fundort: Nord-Luzon, Philippinen.

Das Verbreitungsgebiet des Chaimarrhornis bicolor sind die Philippinen. Auch er dürfte, gleich seinen Verwandten, ein ausgesprochener Gebirgsvogel sein, der vorzugsweise an reißenden Gebirgsgewässern vorkommt. Lebend ist diese Art noch nicht nach Deutschland gelangt.

Der formosische graublaue Wasserrotschwanz — Chaimarrhornis fuliginosa affinis *Grant.*

Von seinem nächsten Verwandten, Chaimarrhornis fuliginosa, ist dieser Wasserrotschwanz schwer zu unterscheiden, da er, mit ganz geringen Abänderungen, jenem völlig gleich gefärbt ist. Nach dem mir vorliegenden einzigen Exemplar des Museums sind die sichersten Unterscheidungsmerkmale die weißen Flecke an der Spitze der großen Flügeldecken. Die wenig erheblicheren Größenmaße dieses einen Stückes sind mir nicht maßgebend genug, um sie als Unterscheidungsmerkmale anzuführen.

♂ ad. Kopf, Hals, Rücken, Bürzel, Bauch graublau, der hintere Teil des Bauches und der Bürzels rostfarben verwaschen erscheinend, da die Federn rostfarben verwaschen gespitzt sind; Ober- und Unterschwanzdecken röstlich kastanienbraun, letzter heller; Schwingen schwärzlichbraun, an Außenfahne schmal graublau gesäumt, Flügeldecken schwarzbraun an Außenfahne schmal graublau gerandet, die graublauen Säume aber etwas breiter als bei bicolor; große Flügeldecken, in der Mitte der Spitze ein kleiner weißer Fleck, Schwanzfedern kastanienbraun, mittelstes Paar dunkelbraun, nächstes Paar nur an der Innenfahne das Enddrittel dunkelbraun; Schnabel schwarz, Füße braun. Das ♂ ist nach Hartert an der Unterseite düsterer und hat weniger ausgedehntes Weiß an den Schwanzfedern wie die ♀♀ von fuliginosa fuliginosa. Die Maße des untersuchten Museum

stückes ergaben: Fl. 77.5, Schw. 61, Schn. 12, Sf. 21.5 mm. Fundort: Formosa.

Chaimarrhornis fuliginosa affinis vertritt Ch. fuliginosa fuliginosa auf Formosa. Sein Wesen und seine Lebensgewohnheiten sind mit denen des letzteren übereinstimmend. Ins Gebirge geht er bis über 6000 m hinauf und wählt seine Aufenthaltsorte gleich jenem. Nach Deutschland ist diese Art lebend noch nicht eingeführt worden. (Schluß folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Beobachtungen in Davos. Hier ist den Vögeln, die im Winter größtenteils auf Beeren angewiesen sind, der Tisch reichgedeckt. Sämtliche Ebereschen (Vogelbeeren), deren es hier in Gärten und Anlagen eine Unzahl Sträucher und Bäume gibt, hängen voll schöner roter Beeren; dieselben sind nicht etwa trocken, sondern das Fleisch ist noch schön weich, wenn ihm ein großer Teil des Saftes auch durch die trockene Bergluft entzogen ist. An diesen Tischleindeckdich stellen sich ein Haussperling, Buchfink, Bergfink, Dompfaff und Alpendohle; außer Sperlingen und Alpendohlen alle nur in geringer Zahl. An den Erlen finden sich regelmäßig einige Zeisige ein. Am Bachbett in den Wiesen gehen etwa ein Dutzend Rabenkrähen der Nahrungssuche nach. An sonstigen Vögeln bekam ich nur noch ein paar Meisen, eine Drossel, einen Ammer und einen Raubvogel zu Gesicht, doch konnte ich die Art nicht feststellen. Also auch hier, wie meist in den Hochgebirgstälern, weder ein großer Reichtum an Arten, noch an Individuen. Zeisige und Buchfinken lassen ihren Gesang schon in leidlicher Stärke vernehmen, sonst hört man außer den Rufen der Krähen und Alpendohlen keinen Vogelgesang. Recht interessant war es für mich, einmal die Alpendohle in der Freiheit beobachten zu können. Den ersten Trupp von 8 Stück beobachtete ich vor zirka 14 Tagen auf resp. an den meinem Balkon gegenüber gelegenen Häusern. Bald saßen sie auf der Dachfirst, bald auf den Schornsteinen, dann unternahmen einige wieder kleine Rundflüge, bei welchen sie anfangs flattern, dann schweben; ganz besonders willkommen schienen ihnen die Holzkonsolen, die die vorstehenden Hausdächer tragen, zum Tummeln und Ausruhen zu sein, vielleicht fanden sie dort aber auch eine Schmetterlingspuppe oder ein sonstiges Insekt. Teils saßen sie auf den Balken, teils hingen sie sich nach Seglerart an dieselben an. Im Flugbild erkennen wir an den breiten Flügeln sofort die Zugehörigkeit zu den rabenartigen Vögeln; der ziemlich lange Schwanz wird beim flatternden Flug mittel-, beim Schweben weitgespreizt. Ihren Ruf, der etwas an den Lockton eben ausgeflogener Stare erinnert, nur entsprechend stärker ist, lassen sie fleißig hören. Einen anderen wohllautenderen Ruf geben wahrscheinlich nur die Männchen von sich. Sieht man sie in einiger Entfernung auf einem Pfahl sitzen, so sehen sie einer Amsel in der Haltung und Färbung nicht unähnlich, nur daß sie wesentlich größer sind und rote Füße haben. Gestaunt habe ich, mit welcher Geschicklichkeit sie sich an die dünnen Äste der Ebereschen hängen, um zu den Beeren zu gelangen. Zu gern hätte ich eine Aufnahme von den Vögeln bei diesem Tun gemacht, doch ist mir's bisher leider noch nicht gelungen. Gestern waren wohl 15 Stück auf einem kleinen Baum und ließen mich bis auf zirka 15 m herankommen, doch hatte ich leider den Apparat nicht zur Hand. Einige Zeit darauf hatten sich an einer Stelle 28 Stück versammelt, die höher und höher sich hinaufschraubten und wohl 400 m Höhe erreichen mochten und dann den Bergen zuflogen. Ob einige von ihnen im Orte bleiben und vielleicht in den Kirchtürmen nisten, konnte ich nicht erfahren, es ist aber wohl anzunehmen, daß mit scheidendem Winter ihre eigentliche Heimat, die Felswände der Berge, doch zu sehr locken und dann alle von hier Abschied nehmen. Noch einige Wochen und der Frühling zieht auch hier ein; hoffentlich bringt er auch manchen Wanderer in unser hiesiges Bergtal. Kracht.

Drahtkörbchen als Brutstätten für Freibrüter und anderes. In Heft 19 der „Gef. Welt" 1925, S. 222, befindet sich eine Abbildung über die „Anbringung eines Drahtnestes bei Zuchtversuchen mit Freibrütern". Diese einfache, hübsche Skizze bringt mir drei Fälle in Erinnerung, bei welchen ich in ähnlichen Drahtkörbchen (mit Henkeln), die auf Bäumen im Freien aufgehängt worden waren, Vogelnester beobachten konnte. Im ersten Falle handelt es sich um ein Rothänflingsnest, welches ich im Jahr 1889 in einem Privatgarten der Wilhelmsallee zu Weimar sah. Die Besitzer des Grundstückes hatten in diesem Falle an den Zweigen eines Obstbaumes ein kleines rundes Drahtkörbchen befestigt, in dem ein Rothänflingspaar sein Nest errichtet hatte. Die Jungen flogen sämtlich aus. Soviel ich mich entsinne, wurde das betr. Körbchen einige Male als Brutplatz benützt. Im zweiten Falle hatte ich im Jahre 1883 drei der käuflichen künstlichen Taubennester aus Stroh in unserem derzeitigen Garten auf Ästen von Bäumen angebracht in der Absicht, für meine vier freifliegenden Lachtauben geeignete Nistgelegenheit zu schaffen. Ich hatte mich nicht getäuscht, denn zwei der Brutkörbe, welche auf Birken angebracht waren, wurden von je einem Taubenpaar angenommen, während das dritte Nest, welches ich in einer Tanne befestigt hatte, von einem Amselpaar als Brutstätte erwählt wurde, welches sich darin ein regelrechtes Nest aufbaute. Auch die Jungen dieses Paares kamen glücklich hoch und flogen aus. Das Nest wurde zweimal benutzt und im folgenden Jahr wieder angenommen. Der dritte Fall betrifft wiederum ein Rothänflingspaar. Im Mai 1924 beobachtete ich in den Anlagen des Untermainkai zu Frankfurt a. M. in einem Busch der klee- oder dreiblättrigen Zitrone (Citrus trifoliata L.) ein ziemlich versteckt hängendes, kleines rundes Drahtkörbchen, wie solche oft Kinder zum Spielen benutzen. Es hatte einen Durchmesser von etwa 9—10 cm und eine gleiche Höhe (ohne Henkel gerechnet). In diesem Drahtkörbchen, welches wohl irgendein Kind verloren hatte, und das hierauf von jemand gefunden und in den Strauch gehängt worden war, hatte das genannte Vogelpaar sein Nest eingebaut, in dem, als ich es auffand, vier etwa zwei bis drei Tage alte Junge lagen. Ich habe dieses sonderbare Nest einige Tage ständig aufgesucht und mich daran erfreut, doch war es nach Verlauf von fünf Tagen verschwunden. Irgend ein Nesträuber oder Versorger von Vogelhändlern hatte das schöne Idyll zerstört bzw. geräubert. Wie man aus obigen Beobachtungen ersehen kann, nehmen nicht nur in Käfigen und Freilandvolieren untergebrachte Vögel derartige Drahtkörbchen als Nistplätze an, sondern sogar auch wildlebende Sänger in freier Natur. Es ist noch zu bemerken, daß die an den Henkeln aufgehängten Körbchen natürlich nicht hin- und herschaukeln dürfen, sondern entweder zwischen Astgabeln geklemmt oder anderweitig an den Ästen befestigt werden müssen, damit sie nicht schaukeln, sondern festsitzen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch noch darauf hinweisen, daß ich in früheren Jahren verschiedentlich auch die Schalen von halbierten Kokosnüssen in gleicher Weise wie obengenannte Drahtkörbchen verwendete. Auch diese wurden einmal von Fliegenschnäppern und ein anderes Mal von Grünlingen als Nistplatz angenommen. Im übrigen gehen Höhlenbrüter auch in aufgehängte trockene Kürbisse, deren Inhalt herausgenommen und erstere mit einem Einschlupfloch versehen wurden. So fand ich vor Jahren einmal ein Blaumeisennest in einem trockenen Kürbis, welcher in einem Schuppen der früheren großherzoglichen Hofgärtnerei zu Schloß Belvedere bei Weimar auf einem Regal lag. Der Kürbis war anscheinend vorher von Ratten oder Mäusen seines Inhaltes beraubt worden, denn in seinem Inneren fand ich außer dem mit sechs jungen Blaumeisen besetzten Nest andere Bestandteile nicht vor.

Wilhelm Schreitmüller, Fr. a. M.

Da mich die **Wanderdrossel** immer an unsere deutsche Amsel erinnert, habe ich als Vogelfreund schon oft Gelegenheit gehabt, sie hier in Amerika zu beobachten. Ich habe sie und ihr Nest im tiefen undurchdringlichen Walde gefunden. Es war fast dunkel, die Sonne konnte kaum durch das dichte Laubdach der Bäume ihre Strahlen senden. Es tat mir wohl, das fröhliche „bheerup bheerup" dieser Drossel in der stillen Waldeinsamkeit zu hören. Ich gehe oft für viele Stunden in den Wald, um Ameiseneier zu sammeln. Häufiger wird dann der Wunsch in mir lebendig, wieder mal den deutschen Wald durchstreifen zu können. Der deutsche Wald ist heilig und hat eine Seele, aber der amerikanische Wald, obwohl schön, ist kalt, nüchtern und

seelenlos. Aber ich habe zwei deutsche Schäferhunde und mein doppelläufiges Jagdgewehr als Begleiter und fühle mich dann nicht so verlassen. Viele Wanderdrosseln siedeln sich auch in der Nähe menschlicher Behausungen an. Sie bauen ihr Nest in Obstbäumen, Weinspalieren, auch im Stall und in der Scheune. Ich fand letzten Sommer acht Drosselnester mit Eiern oder Junge in meinem Obstgarten. Ein Paar hatte sein Nest in der Scheune auf einem Balken gebaut, ein anderes Paar im Stalle nur einen Meter vom Erdboden entfernt, aber leider fraß eine Katze ihre drei Jungen auf. Sie verteidigt ihre Jungen sehr tapfer und scheut sich nicht, einem Menschen ins Gesicht zu fliegen, wenn er zu dicht an ihr Nest herantritt. Ich arbeite als Werkzeugmacher in einer großen, auf freiem Felde stehenden Automobilfabrik. Groß war mein Erstaunen, als im letzten Sommer zwei Drosselpärchen durch die offenen Fenster flogen und anfingen ihre Nester auf einen eisernen Träger über der klappernden Transmission zu bauen. Ich glaubte nicht, daß sie es in dem Riesenlärm aushalten würden. Aber sie ließen sich nicht stören und zogen ihre Jungen auf. Die Wanderdrossel ist unser erster Frühlingsbote. Sie kommt schon im Februar aus dem Süden zurück und muß oft bittere Not leiden, da wir im März und April noch Schnee haben, aber sie läßt ihr „bheerup bheerup" ungehindert erklingen.

Fred H. Polzin in P.
(Nord-Amerika, früher Berlin-Neukölln).

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnitz, Merveldstr. 39. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

Wir möchten unsere Mitglieder doch recht sehr bitten, zur Vermeidung der Erleichterung unseres Verbandssäckels bei Anfragen Rückporto beizufügen.

J. A.: Petters, 1. Schriftf.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Neues von Herrn Matth. Lefébre. Ich habe in Nr. 16 schon mitgeteilt, wie Herr L. den von mir gekauften Karmingimpel nicht sandte, aber auch nicht den dafür gezahlten Kaufpreis von 12 M. zurückerstattete. Er hält den bereits im Februar erhaltenen Kaufpreis auch heute noch zurück. Jetzt erhalte ich von ihm ohne Bestellung einen Stieglitz und einen Dompfaff mit folgender Postkarte: „Werter Herr Amtsmann ich nehme Bezug auf Ihr Inserath in Heft 16 in der Gef. Welt und teile Ihnen mit, das ich Ihnen am 26. 4. 25. ein Blutfink Weibchen und 1,0 Stieglitz abgesand habe hofe das Sie hiermit zufrieden sein werden. Ich bitte Sie, mihr das Kistchen als Warenprobe returzusenden. Falls ich im Laufe des Jahres Karmin-Gimpel erhalte werde ich Ihnen einen zukommen lassen." Offenbar will mich Herr L. foppen! Das Dompfaffenweibchen hat keinen Schwanz, und das angebliche Stieglitzmännchen ist, soweit sich ohne Sektion mit ziemlicher Bestimmtheit sagen läßt, ein kümmerliches Weibchen. Nachdem ich bereits vorher meinen Vogelbestand komplettiert habe, auch durch Bezug eines Karmingimpels von anderwärts, sind mir die von L. „auf den Hals" gesandten Tiere durchaus störend zur Last. Dieses zur Erheiterung und zur Warnung der Leser! Amtmann Max Krumm.

In Nr. 19 kommt Herr R. N. nochmals auf die **Geschlechtsunterscheidungsmerkmale bei Spitzschwanzamadinen** zurück. Wir haben eben den Himmelfahrtstag benutzt, um fünf Spitzschwanzamadinen zu untersuchen. Zwei Junge am 1. 2. ausgeflogen, drei Junge am 11. 3. ausgeflogen. Nach den breiteren Kehlflecken hatten wir sofort nach dem Ausfliegen ein ♂ und vier ♀♀ festgestellt. Heute maßen wir auch die Schwanzlänge. Sie betrug bei den vier ♀♀ 5 cm, beim ♂ 5,7 cm vom Aster bis zum Schwanzende von unten gemessen. Und dabei ist das ♂ von der am 19. 3., also zuletzt ausgeflogenen Brut (drei Junge). Bis jetzt haben unsere Geschlechtsfeststellungen, an etwa einem Dutzend Spitzschwanzamadinen vorgenommen, immer gestimmt. Von Prof. Dr. Götze in Frankfurt erhielt ich vor vierzehn Tagen eine Spitzschwanzamadine. Diese war unterwegs eingegangen. Wir stellten ein ♂ fest, und die durch Prof. Götze vorgenommene Sektion ergab auch ein ♂. Auch das Verhalten des alten Zuchtpaares zu den Jungen lieferte uns den Beweis für die Richtigkeit unserer Feststellungen. Die obere der beiden spitzen Schwanzfedern ist beim ♂ länger als 5 cm, meist 5,7—5,8 cm.

A. Voigt.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Friedrich Frank, Zoologische Handlung, München, Gabelsbergerstraße 9, Fernruf 28190: Rosakakadus, Nymphensittich, Männchen, Dayaldrossel, Goldaugentimalie, ind. Buschschnäpper, afrik. Goldsperlinge, große Kubafinken, meerbl. Tangaren, Bronzefleck-, Palm- und Halsbandtäubchen, Zuckervögel.

Gustav Müller, Vogel-Großhandlung, Hamburg 31, Langenfelderdamm 27, Fernruf Vulkan 7141: Rotköpfige Inseparables, Feuerflügelsittiche.

Herrn Dr. L., Brüssel. Die englischen Vulgärnamen im Handbuch I sind dem Werk von Butler entnommen. Im vorliegenden Fall ist zweifellos der Andamanensittich — Palaeornis tytleri gemeint.

Herrn Fr. B., Göttingen; Herrn J. Sch., Dresden-N. ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn A. G., Lommatzsch; Herrn J. K., Berlin N: Beiträge dankend erhalten.

Herrn W. Ch. in B. (Polen). 1. Herr Paul Schindler ist, wie aus Heft 23 hervorgeht, vor kurzem verstorben. Die Firma besteht noch an der alten Stelle. Eine an die Firma gerichtete Anfrage mit Antwortkarte wird Ihnen Aufschluß über die gestellten Fragen geben. Von anderen Firmen werden „Schindlerkäfige" nicht hergestellt. 2. Die besten Sänger unter den eingeführten ausländischen Körnerfressern sind der rote Kardinal, Rosenbrustkernbeißer, Grauedelsänger, unter den Weichfutterfressern Schamadrossel, Dayaldrossel, nordamerikanische Spottdrossel, Augenbrauenhäherling. Es verhält sich mit den ausländischen Sängern genau wie mit den heimischen. Wie hier nicht jede Nachtigall eine gute Sängerin ist, so ist es auch nicht jede der obengenannten. Wirklich gute Sänger sind unter allen Ausländern, die zu uns kommen, nicht gar zu häufig.

Herrn L. in Pf. Bei der Schama scheint es sich um ein nervöses Leiden zu handeln, das entweder durch Erschrecken oder durch eine Verletzung der Wirbelsäule oder der Schädeldecke (Anfliegen beim Erschrecken) hervorgerufen ist. Es muß versucht werden, eine Heilung herbeizuführen. Der Käfig wird in einem stets gut gelüfteten Zimmer, in in welchem der Vogel vor jeder Beunruhigung bewahrt ist, untergebracht. Um den Käfig werden Blattpflanzen gestellt, deren Blätter vorsichtig ab und zu benetzt werden, um Luftfeuchtigkeit zu erzielen. — Als Futter wird ein Gemisch von fein geriebener Möhre mit gleichen Teilen trockener Ameisenpuppen, gemahlenen Zwieback und geriebenen Weißkäse gereicht, dem auch ab und zu frische Ameisenpuppen in bester Beschaffenheit beigegeben werden können. Statt der Möhre kann ab und zu gehackter Apfel verwendet werden. — Trink- und Badewasser wird gereicht. Mehlwürmer, Weißwürmer, Fleisch, überhaupt alle anregenden Futterbestandteile bleiben fort. Es kommt darauf an, jede Erregung, auch die durch Futterstoffe hervorgerufene, fernzuhalten.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

rgang 54 11. Juni 1925 Heft 24

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Meine Drosseln. (Aus 50jährigen Erfahrungen.) (Forts.)
Kleiber und Sumpfmeise. Von Arthur Dresler. (Schluß.)
Aus dem Vogelhause des Berliner Zoologischen Gartens. Von Dr. F. Hauchecorne.
Referat über „Wieder ein Massensterben von Vögeln in der Ostsee".
Die Tage von Leipzig. Von J. Birk, Leipzig.
Rotschwänze — Phoenicurus *(Forst.)*. Eine Monographie von John Kuntzendorff. (Forts.)
Kleine Mitteilungen - Reichsverband der deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig - Sprechsaal - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Ausstellungen - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellungen.

Vogelschutzausstellung. In der Zeit vom Sonntag den 7. bis Dienstag den 19. Juni d. Js. findet in Schwetzingen (südliches Zirkelhaus des Schlosses, langer Saal) unter Leitung des Herrn Professor Dr. Fehringer, Heidelberg, eine Ausstellung für Vogelschutz statt, verbunden mit Lichtbildervorträgen durch Herrn Professor Dr. Fehringer im Lichtspielhaus Friedrichstraße. Am Mittwoch, dem 10. Juni d. Js., hält Herr Professor Dr. Fehringer einen Sondervortrag für die Gäste der Ausstellungsleitung. Beginn nachmittags 3 Uhr im Lichtspielhaus Friedrichstraße, anschließend Besuch der Ausstellung.

Badisches Forstamt Schwetzingen.

Der **Verein der Vogel- und Aquarienliebhaber Herne i. Westf.** veranstaltet in der Zeit vom 11. bis 21. Juni d. Js. im Saale des Herrn Eduard Lobeck zu Herne, Neustraße 67, eine Ausstellung. Ausgestellt werden einheimische und fremdländische Zier- und Singvögel, Zierfische und Reptilien, Hilfsmittel zur Haltung und Pflege, Präparate usw. Wie in früheren Jahren, werden die Mitglieder des Vereins auch in diesem Jahre bemüht sein, den Besuchern eine interessante und reichhaltige Schau zu bieten, damit die seither als mustergültig bekannten Ausstellungen des Herner Vereins ihre alte Anziehungskraft behalten. Die Ausstellung ist geöffnet von morgens 9 Uhr bis abends 9 Uhr. Ein Besuch ist sehr zu empfehlen.

Aus den Verbänden.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Vereinigung der Vogelliebhaber Deutschlands, Landesverband Südwest. Am 21. Mai (Himmelfahrt) war die Vorstandschaft obiger Vereinigung, sowie einige Mitglieder des Mannheimer Liebhaber-Vereins, zum Besuch des Herrn Prof. Fehringer in Heidelberg. Leider konnten einige Herren der Vorstandschaft nicht mehr eingeladen werden, weil die Exkursion zu kurz anberaumt war. Herr Prof. Fehringer führte uns in seine Vogelzimmer, wir waren erstaunt über die Einrichtung und Vögel; alles war in schönster Verfassung, besonders die Sprosser, Pirol und Gelbspötter, verschiedene sind schon vermausert und wieder im Gesang. Sehr schön sind seine verschiedenen Würger, auch die Lerchen sind sehr munter, obgleich sie in Nachtigallenkäfigen sitzen mit harten Decken. Leider konnten wir nicht den vollen Genuß vom Gesang aller Lieblinge haben, denn so viele Menschen stören in einer Vogelstube. Ganz besonderes Interesse hatten wir an einem Nachtigall-Kanarienhahn, den Herr Karl Reich, Bremen, an Herrn Prof. Fehringer zum Abhören sandte. Wir Mannheimer Liebhaber waren sehr erfreut, endlich einmal Gelegenheit zu haben, eines dieser Wunder der Kanarienzüchtung zu hören, waren aber sehr enttäuscht, da wir allen Nachtigallenschlag zur Genüge kennen aus unserer Umgebung, denn unsere rheinischen Nachtigallen stehen in Liebhaberkreisen sehr im Ansehen. Daß ein Kanarienhahn, der seinen Gesang in langen Strophen bringt, es nicht gut fertigbringen kann, den Schlag einer Nachtigall mit den dazu gehörigen Pausen wiederzugeben, davon waren wir überzeugt. Wir spannten deshalb unsere Ansprüche nicht zu hoch; was wir aber hier hörten, war reiner Kanariengesang mit sehr langen und guten Strophen, die Teile des Gesanges, die an Nachtigallenschlag erinnern sollten, ähneln den Schappertönen der früheren Landkanarien, die von der heutigen Züchtung ausgemerzt wurden. Der Gesang dieses Vogels macht den Eindruck eines guten Kanarienvogels mit Schappertouren. Diese Kanarien kann man noch in entlegenen Dorfwirtschaften hören mit ihrem lauten Gesang. Wir bedauerten immer die modernen Zuchtrichtungen, die aus den fröhlich schmetternden Landkanarien eine Roll- und Rollermaschine machten, die auf die Dauer mehr ermüdet als erfreut. Wir alle hatten den Wunsch, einen Kanarienhahn, der die Strophen der Sängerkönigin nur teilweise wiedergeben könnte, zu besitzen. Wir bewundern Herrn Reich, der dieses Ziel verfolgt und wünschen ihm Erfolg und Glück dazu. Ob es je gelingen wird, dem Kanarienvogel die abgesetzten Strophen der Nachtigall beizubringen, bezweifeln wir jedoch, und hat uns Prof. Fehringer hierin beigepflichtet. Es wurden noch organisatorische Fragen behandelt über Anmeldung zum Landesverband Südwest. Da viele Liebhaber noch nicht orientiert sind, möchten wir alle Liebhaber und Liebhabervereine bitten, sich dem Landesverband anzuschließen. Anmeldungen an den Kassierer August Sommer, Mannheim, Laurentiusstr. 20. Nach Besichtigung des Heidelberger Schlosses blieben wir noch gemütlich beisammen. Herr Prof. Fehringer lud uns noch zu seiner Jagdausstellung in Schwetzingen am 7. Juni ein. Wir dankten ihm herzlichst für seine Bemühungen und gab er seinen Besuch bei uns in Bälde bekannt.

Ludwig Frank.

Aus den Vereinen.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. J. A.: O. Vorbrodt, 1. Schriftf., O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.

J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Vogelschutz und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke, Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Vereinsl.: Karl Röhr, Heiligerweg 28. Versammlung jeden 2. u. 4. Sonntag im Monat, nachmittags 5 Uhr. Liebhaber herzlich willkommen. J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung Freitags, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Blasewitzer Hof". Liebhaber willk. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Rietschelhof", Rietschelstr. 19. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinslokal „Parkhotel", Epinaystr. 1, Versammlung. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an. Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 16. Juni.
A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber. Nächste Veranstaltungen: Donnerstag, den 18. Juni: Vereinsabend im Landesheim, 8¼ Uhr, Vortrag Böneker: „Australische Körnerfresser". Donnerstag, den 9. Juli: Vereinsabend im Landesheim, 8¼ Uhr, Vortrag Klocke: „Mimikry". Alle Mitglieder werden herzlich gebeten, möglichst an allen Veranstaltungen teilzunehmen.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Der Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde, gegründet 1920, feierte vom 23. bis 25. Mai seine 2. Frühjahrsausstellung, verbunden mit Prämiierung, im Saale des Vereinslokals Ungewitter, Bruchstraße 29. Die Prämiierung der Vögel fand am 23. Mai, nachmittags von 3—5 Uhr statt. Als Preisrichter fungierten folgende Herren: Herr Rektor Weimann, Dortmund; Herr Dr. Kühnemann, Hörde; Herr Rostek aus Witten sowie Kollege Hellmann. Insgesamt waren von den Kollegen des Vereins 61 Vögel zur Ausstellung eingeliefert, selbige verteilten

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

ich in folgende Gruppen: 17 Hänflinge, 13 Buchfinken, Distelfinken, 3 Zeisige, 5 Rotkehlchen, 4 Mönchgrasmücken, Amseln, 2 Singdrosseln, 1 Graudrossel, 2 Dorngrasmücken, 2 Lerchen, 1 Braunelle, 1 Paradieswitwe und Dompfaff. Man konnte an dem Bestand sowie der Pflege der Tiere ersehen, daß die Herren Preisrichter einen schweren Stand hatten, um den ausstellenden Mitgliedern gerecht zu werden. Zur Verfügung standen an Preisen: 40 Einzelpreise, 12 Trostpreise sowie 1 Hauptehrenpreis; sämtliche Preise bestanden in Kunstgegenständen und waren aus der Vereinskasse gestiftet. Die Ausstellung war aufs geschmackvollste mit Girlanden, Tannengrün und Bäumen ausgeschmückt, ferner befanden sich neben jedem Käfig herrliche Blumenarrangements, welche in hochherziger Weise von den Damen des Vereins zur Verfügung gestellt waren. Die Käfige waren, was Praktischkeit, Geräumigkeit und Sauberkeit anbetrifft, durchweg mit gutem Anstrich versehen nnd wirkten harmonisch. In einer Ecke hatte man ein entzückendes Waldidyll hervorgezaubert, indem zwischen Tannenbäumen und Weißdorn ein Rehlein hervorlugte, um vorsichtig Umschau zu halten. Außerdem stellte sich die Vogelhandlung Sengstock, Dortmund, in den guten Dienst der Sache, indem selbige ihre gesamten präparierten Tiere sowie verschiedene Exoten zur Ausschmückung der Ausstellung leihweise gratis zur Verfügung stellte, wofür ihr besonderer Dank gebührt. Unsere Lieblinge fühlten sich auf diese Weise sehr heimisch und ließen alle aufs fleißigste ihren Gesang erschallen, so daß man das schönste Waldkonzert vor sich hatte, ferner waren auch etliche Aquarien ausgestellt, wofür die Kinder großes Interesse zeigten. Nachdem um 5 Uhr die Prämiierung beendet war, eröffnete der 2. Vorsitzende, Kollege Hellmann, die Ausstellung für die Besucher mit dem Wunsche, daß jeder Gast befriedigt die Ausstellung verlassen möge, im Bewußtsein, unsere gefiederten Lieblinge in guten Händen zu wissen, wo ihnen die Natur nach Möglichkeit ersetzt wird. Um 8 Uhr abends erschien unser 1. Vorsitzende Kollege Reyer und hielt vor den anwesenden Mitgliedern und Gästen eine kernige Festansprache. Er führte aus, leider wären in dieser Ausstellung die Tiere in so zahlreichen Arten nicht vertreten wie bei der verflossenen Herbstausstellung, das liege aber einesteils daran, daß der Verkauf von einheimischen Zier- und Singvögeln vom 1. April bis 31. September verboten ist, anderenteils verschiedenen Kollegen vom Herbst bis zur jetzigen Zeitspanne etliche Tiere eingegangen wären, letzten Endes wären wir aber nicht darüber aus, um Geschäfte zu machen, sondern unsern Feinden, welche uns in der Haltung von Tieren bekämpfen, sowie der breiten Öffentlichkeit die Pflege unserer Lieblinge in der Gefangenschaft zu zeigen. Ferner hegte Kollege Reyer den Wunsch, daß sich sämtliche Vereine auf diesem Gebiet einig sein möchten insofern, daß alle geschlossen dem Reichsverband sowie dem Preußischen Landesverband beitreten, damit wir unsern Feinden und Bekämpfern gewappnet entgegentreten können, denn nur Einigkeit macht stark und führt zum Ziel. Ferner spricht Kollege Reyer dem Preisrichterkollegium für seine Mühe und Arbeit im Namen des Vereins seinen besten Dank aus, ferner allen denjenigen, welche zum Gelingen der Ausstellung beigetragen haben. Seine Schlußworte klingen in den Toast aus: Der Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde, gegr. 1920, möge wachsen, blühen und gedeihen! Hierauf widmet Kollege Rostek vom Wittener Bruderverein unserm festgebenden Verein herzliche Worte. Er führt aus, daß es ihm eine besondere Genugtuung und Freude sei, eine solche Harmonie und Einigkeit unter den Mitgliedern feststellen zu können, und schließt mit einem dreimal kräftigen Hoch auf den Hörder Bruderverein, in das alle Anwesenden begeistert einstimmten. Als Kollege Rostek nun Abschied nimmt, gibt ihm Kollege Lohs die herzlichsten Grüße an den Bruderverein Witten mit auf den Weg. Aber auch die Fidelitas kam an allen drei Abenden nach Schluß der Ausstellung zu ihrem Rechte. Kollege Haase als Klavierspieler stellte sein ganzes Können dem Verein unentgeltlich zur Verfügung, wofür ihm im Namen des Vereins besonderer Dank gebührt. Vorträge, gemeinschaftliche Gesänge sowie Tanz wechselten im Gesellschaftszimmer ab. Es waren frohe Stunden für die Gäste sowie für die Vereinsmitglieder und deren Angehörigen. Am Montag, den 5. Mai, abends 10 Uhr, wurde die Ausstellung geschlossen. Darauf erfolgte durch den 1. Vorsitzenden die feierliche Preisverteilung an die Mitglieder, gleichzeitig gab er bekannt, daß die nächste Versammlung am Sonntag, den 14. Juni, abends 8 Uhr stattfindet und hegte den Wunsch, daß alle Mitglieder zur Stelle sind. An Brudervereinen waren aus der näheren Umgebung erschienen: der Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Herne i. Westf., Verein der Finkenliebhaber Witten an der Ruhr, Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend sowie der Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Aplerbek.

Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 18. Juni 1925. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Normast im „Kaiser Friedrich", Breslauerstr. 50. Liebhaber willkommen. J. A.: Friedrich.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Vereinsabend regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends um 8 Uhr) beim 1. Vors., Herrn Jahn, Feodorastr. 7. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. A. Voigt.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Tage im „Goldenen Falken" Versammlung; nächste Freitag, den 12. Juni. Liebhaber willk. Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Versammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Liebhaber willk. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebenda. R. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Ornis-Haus
Halle-Saale

Gegründet 1912

Spezialität:
Individuelle Weichfresserpflege nach Angaben des Herrn Apotheker Adalbert Jena-Biberach-Riß. (Alleiniges Herstellungsrecht.)
Reform-Normal I, Volierenm.,
Reform-Normal II, f. Rotkehlchen, Schwarzplatten usw.,
Reform-Normal III, f. Nachtigall., Sprosser usw.,
Reform-Normal IV, f. Gelbspött., Goldhähnchen usw.,
Reform-Normal V, f. Schama usw.,
Körnerfutter Ia für jede Vogelart. [759

Inhaber langjähriger Fachmann, siehe „Ornis-Buch" (90 S.) Mk. 1
Preisliste auf Wunsch!

Mehlwürmer
à Pfund 5 ℳ, bei 6 Pfund Porto und Verpackung frei.

Ia Ameiseneier
Pfund 6.50 M.
Ia Weißwurm . . . à Pfd. 5 ℳ
Ia Muska-Zecken . à „ 2,50
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen . . . . à Pfd. 0,75
Ia Garnelen, gem. à Pfd. 0,40 ℳ

Ia Universalfutter.
Alectwa I für Nachtigallen 2.— ℳ
„ **II für Grasmücken** 1.80 ℳ
„ **III für Drosseln** . 1.50 ℳ
Proben und Analysen zur Verfügung. Vertreter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [760

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
A. Eckrich II., Waldsee (Pfalz).

761] **Mehlwürmer,** reine Ware, gegen Einsl. von 1.75 ℳ ¼ Pfd. franko.
Th. Witte, Niederndodeleben b. Magd.

Mehlwürmer neue, feinste Qual., Pfd. 6 M.
(6 Pfd. Porto, Verpack. frei).
Jeitner, Breslau, Weinstr. 12. [762

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark ¼ Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co., Biesenthal I (Mark).** [763

Vogelfutter [764
für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Ameisenpuppen
täglich frisch, à Liter M. 2,30 franko Garantie f. Qualität.
Th. Witte, [765
Niederndodeleben b. Magdeburg.

Ameisenpuppen,
frische, gegen Voreinsendung von 2 M. 1 Liter franko Zusendung.
766] **Tierhandlung**
Max Kleinert
Berlin NO 18, Strausberger Str. 13.
Fernruf Alexander 3313.

Täglich
frische Ameiseneier
Versand Liter 2.— M.
Mehlwürmer Pfd. 6.— M.
Spezial-Geschäft für Weichfresser
Fritz Sterling, Berlin NW 5
Perleberger Str. 35. Moabit 4733. [767

Mehlwürmer [768
jedes Quantum, 1 Pfd. 4.50 M., Porto u. Verp. extra. ¼ Pfd. 1,50 M. franko, bei Nachn. 20 Pf. mehr. 5 oder 6 Pfd. franko u. Verpack. frei (Dringend Eilboten). **Händler und Vereine sowie Großabnehmer erhalten hohen Rabatt bei Abnahme von 5—6 Pfd.**
Karl Claus, Mutterstadt 2, Hauptbahnhof.

Jeder Vogelliebhaber
verlange **Preisliste** über **Vogelfutter, Utensilien** und **Bedarfsartikel** zur Zucht und Pflege der Vögel. [769
Hermann Sievers, Hannover, Inselstr. 2.

Enchyträen
(siehe Heft 22)
in Zuchtkisten mit genauer Zuchtanweisung, das beste lebende Futter für Weichfresser, gibt ab zu 10 M. [770
H. v. d. Höh, Köln, Ulrichgasse 19.

Züchterkollegen!
Wer seine Nachzucht gesund erhalten will, der befolge nachstehenden Wink:
Jungvögeln im Fluge verabreiche man guten Rübsen zur Genüge und „L.K." trocken, soviel sie fressen mögen. Gekochtes Ei verursacht Krankheiten und ist deshalb die Verabreichung zu vermeiden.
Lorenz, Dresden
Drehgasse 5. [771

Züchter-Urteile:
Bitte um sofortige Zustellung eines Postkolli Rübsen per Nachnahme. War sehr zufrieden mit Ihrer Aufmerksamkeit und Reellität. Hoffe auch, daß Sie mich weiter so bedienen.
Venusberg, 21. 5. 25. Paul Uhlig.

Senden Sie mir bitte wieder 1 Kilo „L. K." per Nachnahme. Senden Sie bitte sofort, da das letzte schon bald verbraucht ist. Ich bin mit Ihrer „L. K." sehr zufrieden.
Ahlen i. Westf., 22. 5. 25.
Joh. Schwing.

Senden Sie bitte gegen Nachnahme 2 Pakete „L. K." Die Nahrung gefällt mir sehr gut. Habe noch keine Verluste gehabt.
Höltinghausen, 26. 5. 25.
Gg. Hövelkamp.

Bitte senden Sie mir so bald wie möglich 10 Pfd. von Ihrer „L. K.-Nahrung" und wieder per Nachnahme, denn die letzte Sendung ist schon wieder alle u. Zwieback wollen die Vögel nicht. Bitte nochmals, senden Sie dieselbe recht bald, da ich sie nicht entbehren kann.
Saalfeld, 26. 5. 25. Ernst Müller.

Senden Sie mir bitte sofort ein 2½ Kilo-Paket verbesserte „L. K.". Hat sich vorzüglich bewährt.
Neugersdorf i. S., 26. 5. 25.
Reinh. Fünfstück.

Ich bitte um sofortige Zusendung von 4 Kilo (8 Pak.) „L. K.-Nahrung." Die vorjährige Sendung ist vergriffen und hat mir tadellos gefallen. „L. K.-N." ist das Beste, was auf diesem Gebiet geschaffen wurde. Ich bitte, das Paket sofort auf den Weg bringen zu wollen, da ich darauf warte.
Bordesholm, 27. 5. 25. O. Blöcker.

Lorenz, Dresden
Drehgasse 5.
Die Originale obiger Zuschriften haben uns vorgelegen. Die Schriftleitung der „Kanaria". [772

Mehlwürmer
veget. gez., ¼ Liter franko gegen Voreinsendung von Mark 2.—. [773
Bonitas-Versand, Rostock i. M. 5.

Wellensittich-Nistkasten
das Beste, was es gibt, per Stück 2 ℳ, gebrauchte Stück 1,10 ℳ, gibt ab [774
Frau Klara Neugebauer, Deutsch-Lissa.

Vogel-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50. **Schlagnetze** f. kl. schädl. Vögel M. 2,80, f. gr. M. 2,50 u. 2,80. **Katalog gratis. J. Tannen, Gronau 58,** Westf. [775

Verkaufe dauernd junge Wellensittiche la befiedert, kerngesund, i. Freiflug gezüchtet, grün u. gelb, à 5 M.
Saller, Planegg bei München, Hofmarkstraße 8. [776

1,1 jap. Mövchen
tadelloses Zuchtpaar, 12 M., **1,0 jap. Mövchen,** 5 M., verkauft [777
Frau E. Birkner, Crimmitschau, Annenstraße 38.

Gelbnacken-Amazonen,
herrl. Vögel, etwas sprechend, 65 M., **Blaustirn-Amazonen,** etwas sprech., 45 M., **Gelbkopf-Amazonen,** 40 M., **Rhesusaffen,** 50 M, offeriert [778
Carl Willer, Altona,
Kirchenstraße 34.

Zu jeder Vogelhaltung notwendig ist guter Sand. [779
Ia (Rhein) Fluß-Sand
in 5-kg-Säckchen liefert gegen Voreinsend. von 1.50 RM. inkl. Porto u. Verpack.
Siegfried Halm, Mainz
Postscheckkonto 60 923 Frankfurt/M.

Kreuzschnäbel
schön ausgefärbte Männch. sowie Zuchtpärchen habe laufend abzugeben. In Tausch nehme Kanarien, Exoten sowie Vogelfuttersämereien. [780
Arno Jahn, Großbreitenbach Thüringen.

Tausche
Sperbergrasmücke oder Stieglitz od. laut. Wipfelrotkehlchen gegen richtigen Reitzugfink. Alle 3 laut im Gesang. [781
Riedel, Gittersee, Dresdener Str. 19.

1,1 Goldammer
aufgepäppelt, 1924er, blutsfr., vertausche gegen 1,0 Wellensittich oder ähnliches. Selbstabholer bevorzugt. [782
C. Nürnberger, Mühlhausen Th.
Hoyergasse 2.

Kalifornische Schopfwachteln
u. ähnliche Laufvögel für Freivoliere kauft
Albert Edelmann, Berlin-Friedenau, Elsastraße 4.
Ich gebe evtl. Kanarienvögel, Männchen und Weibchen, im Tausch ab. [783

Wir geben ab: [784
Farben-Wellensittiche
blau, Paar 150.— M., grüne Rückschläge von blauen Eltern (wieder blaue Nachzucht bringend), Paar 60.— M., sonstige blaublütige Paar 40.— M., maigrüne Paar 60.— M., gelbe vorjähr. Zuchtpaare 12.— M. Ferner 1,1 Spitzschwänze 50.— M., 1,2 vorj. weiße bzw. Hermelin-Kanarien 100.— M., 1,0 Alario 15.— M., 1,0 Kurzschnabelgirlitz 10.— M., 2,0 Weißkehlpfäffchen je 10.— M.
Wir suchen: 0,1 Orangeblaufink, 0,1 Schwarzgimpelfink, 0,1 Alario, 1,0 Elfen- u. 1,0 Granatastrild, 0,1 Tigerfink, 2,2 Schönbürzel, 2,2 kl. Kubafinken, 0,1 Goldsperling, 0,2 Hahnschweifwidas.
Stefani u. Sohn, Neuß am Rhein.

Alfred Troschi
Buchhändler und Antiquar
Große
Hannover, Aegidienstraß
Postscheck-Konto: Hannover Nr.
(Cruse's Buchhandlung)
Den vielen Herren Bestellern **Lucanus „Das Leben der Vö** zur Mitteilung, daß das Werk i technischer Verzögerungen erst im erscheinen kann. Vorausbestellunge den weiter schon jetzt entgegenon

Gebe ab
2,2 Grauastrilde à 6 M., 1,1 à 5 M., 1,1 südafrikanische Gold chen (Ia Zuchtpaar) 12 M., 2,2 S schnäbel à 5 M., 1,0 Amarant à 3,5 erprobte Zuchtpaare, alle zusa 40 M. Porto und Verpackung
Notar Schüpf, Boxberg (Ba A.Z.-Mtgl. 343.

Rotköpf. tarant. Bergpapag Zuchtpaare . . . Paar
Molukkenkakadus, erstkl., St.
Weißhaubenkakadus . St.
Kleine weiße Gelbhaubenkakadus . . . St.
Graupapageien . . . St.
Gelbnackenamazonen St.
Blaustirnamazonen, erstkl. St.
Wellensittiche, grüne u. gelbe Zuchtpaare . . . Paar
Junge Wellensittiche Paar
Grauegh. Kardinäle St.
Safranfinken, ausgef., Paar
Reisfinken . . . Paar
Dominikanerwitwen Paar
Zebratäubchen, g. bef., Paar
Königsglanzstare . . St.
Langschw. Glanzstare St.
Chinanachtigallen, Mch., St.
Wch., St.
Schamadrosseln, erstklassige Sänger . . . St.
Schamadrosseln, Weibch. St.
Graydrosseln im Gesang St.
Damadrosseln . . St.
Ganz kl. Java-Äffchen St.
Schwarze Makaken . St.
Kanarien- und Stieglitz-Bastarde, Männchen St.
Div. ind. unbek. **Drosseln** St.
bei Anfragen Rückporto bietet freibleibend an
Tierhandlung
Max Kleiner
Berlin NO 18, Strausberger Str
Fernruf Alexander 3313.

Umständehalber
bin ich gezwungen vorübergehend gr. Voliere aufzugeben. 2,2 grü. W sittiche, 1,0 Rothänfling u. 0,1 Ro mit 2 Jungen, 1,0 Rothänflin 0,1 Kanarie mit befr. Eiern, 1,1 Dom 1,1 Stieglitz, 1,0 Erlenzeisig, 1,0 B zeisig, 1,0 Steinhänfling, 1,0 Buc 1,0 Kreuzschnabel.
Seltenheit
0,1 **gelbe** Weidendrossel, 1,0 Sch drossel, 1,0 l. sing. Rotkehlchen, zusa 70.— Mark.
Richard Bicknäse, Hotel See **Schönbergerstrand** b. Kiel.
1,0 Hahnschweifwida, Pracht Länge d. Schwanz w. üb. 40 cm. 40.-
1,1 Grauedelsänger . . 12.-
1,0 Oryx in Pracht . . 16.-
1,0 Papstfink 16.-
1,0 Blaub. Sperlingspapag 10.-
Jap. Mövchen, garantiert Pä gelb und braundt. . . . 12.-
Gelb. Wellensittiche, garc Pärchen 14.-
Grün. Wellensittiche, garc Pärchen 12.-
1,0 Gestlt. Kanarien, sehr sch 20.-
div. Senegalfinken.
Alle Vögel sind fehlerfrei. Bei An Retourmarke erwünscht.
Max Schimang, Münche Landsberger Str. 169.

Vertausche: Ia Nachtigall 1,1 Wachteln, 1,0 Rot- u. 1,0 kehlchen, beid. laute Ia Säng., **1,0 senpieper, 1,0 Girlitz** gegen **Sprosser u. 1,0 rot. Kardina** alles gegen prima **Schamamänne Ferner:** 1 erstklass. **Nachtigall** geg. 2 Zuchtpaare **grüne Wellensit A. Altenmann, Brieg** (Bez. Bre Fleischergasse 4.

Verkaufe
2,0 Schamadr., erstklassige S kerngesund. . . . . à 55.-
1 Zuchtpaar **jap. Mövchen** 10.-
1 Zuchtpaar **Zebrafinken** 10.-
Ernst Scheide, Osnabrü Spindelstr. 18 b.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 14
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdeb

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 18. Juni 1925 | Heft 25

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Meine Drosseln.

(Aus 50jährigen Erfahrungen.)

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

In den vorstehenden Ausführungen habe ich nur meine Hauptkünstler gezeichnet, gehalten habe ich im Laufe von etwa 40 Jahren mindestens 30 Sing- und Schwarzdrosseln, Wildfänge sowie aufgepäppelte Vögel.

Zum Schlusse möchte ich nun noch auf meine wichtigeren Erfahrungen in der Wartung und Pflege der Drosseln zurückkommen. Zuerst auf die Käfigfrage. In den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts waren wir in Deutschland in der Vogelkäfigfabrikation, namentlich was Käfige für die edleren Weichfresser anbetrifft, noch erheblich im Rückstand, z. B. Österreich gegenüber. Besonders war dies in kleineren und Mittelstädten der Fall. Ich habe meine ersten Drosseln, und auch noch in den neunziger Jahren, in Holzsprossenkäfigen, Harzerart, gehalten, sogenannte Kanarienheckbauer. Die harte Decke schnitt ich heraus und brachte eine Leinwand- oder Wachstuchdecke an. Nur einen besseren Käfig brachte ich mir von Magdeburg mit, es war ein Kistenkäfig. Er war schon recht elegant gearbeitet, derartige Käfige waren mir aber zu teuer. Zum Hinaushängen ins Freie nahm ich größere Kisten, die ich vorn mit einem Holzstabgitter aus sogenannten Wurstpeilern versah. Ein grüner Anstrich gab etwas Aufmachung. Das Futter und Wasser setzte ich in glasierten Blumenuntersätzen in den Käfig auf den Boden. Drei Sitzstangen — zwei unten, eine oben — waren im Innern angebracht. Die Vögel haben sich gerade in diesen Käfigen sehr gut gehalten und viel gesungen. Das Holzstabgitter verhinderte auch bei ärgsten Tobern die Beschädigung des Gefieders. Versucht habe ich es auch mit böhmischen Drosselbauern, wie ich schon oben erwähnte, aber sie waren zu klein. Drosselkäfige müssen mindestens 70 cm lang, 35 cm breit und 45—50 cm hoch sein, sonst hat der Vogel zu wenig Bewegungsfreiheit. Namentlich sind Singdrosseln immer lebhaft, sie müssen genügend Raum dazu zur Verfügung haben, und die Amsel braucht einen solchen ihres langen Schwanzes wegen erst recht. Für meine anderen, kleineren Weichfresser, wie Sprosser, Nachtigall, Schwarzkopf und Rotkehlchen habe ich mir Käfige aus verschiedenen Fabriken kommen lassen, z. B. von Flemming im sächsischen Erzgebirge, von Rausch in Wien usw. Sie waren alle gut und zweckmäßig. Kistenkäfige ziehe ich dabei allerdings vor. Als Sitzstangen für meine Drosselkäfige nehme ich nur Holunderschößlinge, und zwar daumenstark. Sie werden jede Woche gründlich abgewaschen und abgekratzt, alle vier Wochen erneuere ich sie ganz. Die Käfige reinige ich zweimal wöchentlich und versehe sie mit frischem Sand — tunlichst Flußsand.

An Futter verwandte ich in den ersten zehn Jahren nur geriebene Mohrrübe mit Semmelbröseln und etwas Mohnmehl, dazu frische Ebereschen- und Holunderbeeren (schwarze) in Büscheln in den Käfig gehängt, sonst getrocknete zwischen das Futter gemischt. Von Neujahr etwa bis zur Beendigung der Gesangszeit reiche ich Mehlwürmer, etwa bis zehn Stück den Tag. Jetzt füttere ich seit langen Jahren nur geriebene Mohrrübe mit Gerstenschrot und dazu die Beeren, wie ich vorbeschrieb, und die Mehlwürmer in dem gleichen Zeitraum und der gleichen Zahl. Von Spaziergängen bringe ich tunlichst oft Regenwürmer, kleine Schnecken und Käfer mit, die ich als Leckerbissen reiche. Anderes wie das vorbeschriebene Futter erhalten meine Drosseln schon lange nicht mehr, und sie singen dabei prachtvoll sowie fleißig — soweit sie überhaupt etwas können! Kunstfutter, d. h. angepriesenes Mischfutter, habe ich im Laufe der Jahre von allen Sorten versucht, ich ließ es mir von allen Enden und Kanten der Welt kommen; aber meine Erfahrungen damit waren sehr, sehr verschiedener Art: meistens sehr lästiger unangenehmer Geruch des Kotes der Vögel und der Gesang meiner Drosseln war nicht im geringsten besser und fleißiger wie bei meiner Futterweise. Aber jeder mag es halten, wie er will! Das habe ich auch bei allen künstlichen Futtermischungen festgestellt: ohne geriebene Mohrrübenbeimischung fressen die Vögel sie nicht gern. Auch mit Karottengrieß habe ich die Mischungen versucht — aber geriebene frische Möhre bleibt doch das Beste. Natürlich spreche ich hier nur von Drosselfutter, für zartere Weichfresser liegt die Sache anders. Darauf komme ich am passenden Ort später zurück.

Ein Vorkommnis aus dem vergangenen Sommer möchte ich hier noch erwähnen, das auch noch in

das Gebiet der Auffütterung fällt, und das zeigt, daß in manchen Fällen alle Kunst und Erfahrung vergeblich bleibt. Ich fand auf einem der Friedhöfe, wohin ich eines entschlafenen Angehörigen wegen fast täglich komme, in einem mittelgroßen Lebensbaume ein Singdrosselnest mit vier fast flüggen Jungen. Nach einigen Tagen hatten drei Junge das Nest verlassen, das vierte Junge — obwohl ebenfalls flugreif — blieb noch zwei Tage im Nest. Nach seinem Aussehen mußte ich annehmen, daß das Tierchen krank sei, es herrschte sehr kalte, regnerische Witterung. Ich nahm es sorgsam mit nach Hause, um es tunlichst zu retten, und stopfte es, da es nicht sperrte, mit hartgekochten Hühnereiern und Mehlwürmern. Aber das Tierchen spie alles Futter immer wieder aus und ging bald ein. Damit war wohl bewiesen, daß es krankheitshalber das Nest nicht verlassen hatte — jedenfalls hatte es sich erkältet —, denn kranke Vögel speien das Futter wieder aus, während gesunde es trotz des Stopfens verschlucken.

Mögen meine Ausführungen die Bestimmung erreichen, die mir bei ihrer Niederschrift vorschwebt: immer von neuem die Begeisterung für die Vogelliebhaberei wachzuhalten und zu vergrößern! Werden wir doch darin hauptsächlich unterstützt durch den Gedankenaustausch unserer Erlebnisse, und zwar in erster Linie durch eine gut geleitete sachverständige Presse, wie wir sie in unserer geliebten und altbewährten „Gefiederten Welt" finden.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Ein recht selten eingeführter Vogel ist die gleichfalls von Lenger zurzeit in den Handel gebrachte

Bergmerle — Oroscirtetes erythrogaster (*Vig.*).

Der im Besitz von Lenger befindliche Vogel trägt noch das oberseits dunkel quergebänderte olivbraune Jugendkleid und läßt kaum die Farbenschönheit des ausgefärbten Vogels ahnen, dessen prächtiges Kobaltblau des Gefieders der Oberseite auf das angenehmste kontrastiert mit dem satten Kastanienbraun der Unterseite und dem Schwarz an Kopfseiten und Kehle. Sie ist eine Bewohnerin des Hochwaldes und hält sich auch meist in den Zweigen hoher Bäume auf. Nur zur Nahrungssuche kommt sie auf den Erdboden, um hier Insekten zu jagen, die ihre hauptsächlichste Nahrung bilden. In manchen Gegenden ihres Verbreitungsgebietes, welches sich über das Himalajagebiet östlich durch Hinterindien bis ins nordwestliche und südöstliche China erstreckt, ist sie ein häufiger Vogel. Über den Gesang läßt sich bei der geringen Anzahl der bisher eingeführten Stücke kein abschließendes Urteil fällen. Herr Ingenieur Kracht erwähnt wohl den Gesangsfleiß des stets munteren Vogels, beurteilt den Gesang aber wenig günstig. Einige wenige wohlklingende, reinere, flötende Töne, von einem heiseren Geplauder begleitet, war alles, was die von ihm gepflegte Bergmerle hören ließ.

Zu ihrer Beherbergung in der Gefangenschaft dient ein Drosselkäfig. Als Futter erhält sie ein gutes Drosselfutter, das vorwiegend animalische Futterstoffe enthält (Abb. s. S. 280).

Über den

braunrückigen Strauchschmätzer — Thamnobia cambaiensis (*Lath.*),

der in dem indischen Transport Augusts Fockelmanns in zahlreichen Paaren vorhanden war, ist in „Fremdländische Stubenvögel" S. 15 f. das Notwendigste mitgeteilt. Einige Mitteilungen über die Nistweise dieses Vogels mögen hier Platz finden. Das Nest wird gewöhnlich in Höhlungen gebaut, und zwar in Mauer- oder Uferlöchern, in den Nischen an Tempeln und Minarets, unter Regengossen der Häuser usw., auch nicht selten im dichten Gebüsch, zuweilen auch in den Blattscheiden der Yukka. Das Nest variiert entsprechend der Örtlichkeit, an der es gebaut ist, naturgemäß in Gestalt, Größe und Nistbaustoffen. Es ist stets der Gelegenheit und der Örtlichkeit angepaßt. Die in Höhlungen stehenden sind gewöhnlich ziemlich locker, in der Grundform mehr oder weniger rund erbaut. Sie gleichen einem Polster weichen Grases, in dessen Mitte eine Mulde gedrückt ist, die mit Tier-, besonders Pferdehaaren gerundet oder auch mit feinen Wurzeln, Pflanzenfasern, Federn, Pflanzen- und Tierwolle oder irgendwelchen anderen schmiegsamen Stoffen; Fetzen von Schlangenhaut sind häufig mit eingebaut. Von diesen in Höhlen gut geborgen stehenden und ziemlich liederlich und sorglos erbauten Nestern unterscheiden sich die im Gebüsch oder an irgendwie gefährdeten Stellen, wie Gesimsen, Hausdächern usw., stehenden. Sie haben die übliche napfartige Form der Nester und sind auch ziemlich locker gebaut, aber die Niststoffe, besonders Halme und Gräser, sind miteinander doch so fest verwoben, daß das Nest trotz der lockeren Bauart fest genug ist, um der Witterung standzuhalten. Die Auspolsterung der Nestmulde stimmt mit der oben geschilderten Art und Weise überein. Selten werden Nester dicht über dem Boden in Grasbüscheln und dergl. oder auf dem Erdboden selbst vorgefunden. Ein Vogel, dessen Anpassungsfähigkeit im Nestbau so groß ist, neigt natürlich auch dazu, allerlei „merkwürdige Nistplätze" zu benutzen, wie wir das von unserem Rotschwanz kennen, der auch gern in alten Töpfen, Gießkannen und an allen möglichen und unmöglichen Plätzen sein Nest errichtet. Das Gelege besteht aus 3—4, selten 5 Eiern, deren Grundfarbe grünlichweiß ist mit hell rotbraunen Flecken und einigen veilchengrauen Schalenflecken (19×14 mm). In der Brutzeit, welche sich vom März bis in den August erstreckt, werden zwei, häufig drei Bruten gemacht. Für die ganze Brutzeit wird stets dasselbe Nest verwendet. Vor der 2. oder 3. Brut wird es neu ausgepolstert. Häufig wird es 2, selbst 3 Jahre hintereinander verwendet. Hume hat beobachtet, daß dasselbe Nest mehrere Jahre hindurch im ganzen für 8 Bruten benutzt wurde.

Ein in den Buschwalddickichten Südaustraliens gemeiner Vogel, der

gelbbrüstige Dickkopfwürger — Eopsaltria australis *White*,

gelangte in den Besitz eines englischen Vogelliebhabers. Er gehört zu der Untergruppe der etwa 450 Arten umfassenden Familie der Würger, welche Reichenow in „Die Vögel" II S. 293 Dickkopf — Pachycephalinae nennt. Gould beobachtete den Vogel überall in den Gärten Sidneys, aber auch in denen

der Ansiedler im Innern des Landes. In seinen Bewegungen soll der Vogel an unser Rotkehlchen erinnern, z. B. wie er den Schwanz nach oben schlägt und in der munter lebhaften Art, sich überhaupt zu bewegen. Nach Goulds Beobachtungen ist der Vogel nicht scheu. Gould sah ihn auf Gartenwegen und an Zäunen Insekten jagen, ohne die Anwesenheit von Menschen irgendwie zu beachten. Trotz der langen Flügel, welche angelegt die Schwanzmitte überragen, ist sein Flugvermögen nicht sehr groß, und nur selten sieht man ihn weiter fliegen als von Busch zu Busch, von Zweig zu Zweig. Es scheint, daß er Insekten, seine ausschließliche Nahrung, nur vom Boden, selten von den Zweigen nimmt. Über seinen Gesang wird leider nichts mitgeteilt. Er brütet im September und Oktober. Sein Nest ist ein schöner, fester, napfförmiger Bau aus schmalen Rindenbaststreifen, zähen Wurzelfasern und unter Umständen auch aus Gras. Das Ganze wird außen mit Tiergespinsten umwoben und zusammengehalten. An diese sind Stücke von Flechten und Baumrinde hier und da lose angeheftet. Die innere Mulde ist gewöhnlich mit Blättern ausgelegt, gelegentlich auch mit Stücken von breiten Grasblättern. Gewöhnlich steht es in der Astgabel eines kleinen Baumes an einer lichten Stelle des Buschwalddickichts oder auf überragenden Zweigen eines Busches. Es ist ein sehr hübsch gebautes Nest, das zuweilen äußerlich dem Stamm des Baumes, auf welchem es steht, so ähnlich ist, daß es kaum entdeckt wird. Das Gelege besteht meist aus zwei Eiern von grünlicher Grundfarbe mit zahlreichen rostbraunen und weniger sichtbaren braunschwarzen Sprenkeln (18×15 mm).

Gefiederbeschreibung: ♂ Kopf, Oberseite mit Ausnahme des Bürzels, welcher leuchtend gelb ist, Flügel, Schwanz grau; Kinn weiß, übrige Unterseite gelb; Auge, Schnabel, Füße schwarz; Lg 160, Fl. 85. ♀ kleiner, Bürzel olivgelb. (Forts. folgt.)

unermüdlichen Gesang bekunden trotz der sie umgebenden Menschenmasse. Wohl der beste Beweis mit, daß es sich bei der Stubenvogelhaltung nicht um bedauernswerte trauernde Gefangene handelt, sondern um lebensfrohe Bewohner der Käfige. Der Versuch, unsere Lieblinge in vollster Gesangsentfaltung dem staunenden Publikum vorzuführen, ist nicht nur den Erwartungen nach gelungen, sondern hat dieselben noch weit übertroffen. Wer es nicht mit eigenen Ohren gehört, kann sich dieses Durcheinander von jubelnden Vogelstimmen nicht vorstellen. Hier übte sich eine Amsel in ihren flötenden Tönen, gleich nebenan arbeitet eine Singdrossel mit einer Stimmgewalt und wirklich schönen Touren, Buchfinken schmetterten



Gelbbrüstiger Dickkopfwürger.

ihren lebensfrohen Schlag, daß es nur so in den Ohren gellte, Schwarzplättchen ließen dazwischen ihren jauchzenden Überschlag mit einer solchen Unermüdlichkeit hören, daß man, wollte man vom Chor der übrigen Sängerschar Genüsse ernten, an jeden Käfig einzeln herantreten mußte. Hier gab es auch reichlich Gelegenheit, Blaukehlchen im lauten feurigen Gesange zu hören, Rotkehlchens bescheidene feierliche Weisen klangen dazwischen, das Gewelsche der Grasmücken verschmolz das Stimmengewirr zu einem Summen und Schwirren, in dem sich selbst der Vogelstimmenkundige nur noch schwer zurechtfand. Das anmutige süße, wie Glockentöne klingende Lullen von Heidelerchen, das überstürzende, in froher Lebenslust aus fleißigen Kehlen hervorsprudelnde Kauderwelsch der Gelbspötter, dazu das Gesinge und Geklirre von Zeisig, Stieglitz, Hänfling und Girlitz, wirklich manchmal ein unlösbarer Knoten von Vogelgesängen. Und gab es einmal eine Atempause in den schier ohne Ende hervorquellenden Vogelgesängen, so traten einzelne Arten in recht angenehmer Weise hervor, besonders die zwei Nachtigallen gaben ab und zu Proben ihrer Gesangeskunst. Wie im Traume fühlte

Die Tage von Leipzig.

Von J. Birk, Leipzig.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Die Abteilung Vogelliebhaberei erweckte natürlich das Hauptinteresse der Besucher, schon beim Aufgang zu den Ausstellungsräumen wurde man von einem Gewirr jubelnder Vogelstimmen, unter dem die Jodler der Schwarzplättchen scharf hervortraten, begrüßt, und man sah es den die Ausstellung betretenden Personen an, wie sie hell aufhorchten, wie die Augen aufleuchteten bei einem solchen wie lachender Frühling anmutenden Vogelkonzert. Bei dem Plan der Ausstellungsveranstaltung wurde ein besonderes Gewicht darauf gelegt, den für eine Ausstellung von einheimischen Sängern günstigsten Zeitpunkt zu wählen, um nicht nur zeigen zu können, wie wohl im Aussehen unsere gefiederten Lieblinge in praktischen Käfigen sich befinden, sondern auch einmal dem großen Publikum vor Augen führen zu können, wie sachgemäß verpflegte Stubenvögel ihr Wohlbefinden durch

man sich auf die mit Kieferbeständen umsäumte dürre Waldblöße versetzt, und man sah ihm im Geiste, wie er im Fluge steigend und fallend sein bescheidenes, aber wohlklingendes Liedchen herunterleiert, unseren Baumpieper, denn ebenso unermüdlich tat er es im Ausstellungssaal von seiner hohen Warte herab. Man fühlte den Hauch der Vorfrühlingszeit, den des noch ziemlich unbelaubten Waldes, wenn der Fitislaubsänger mit seinem lieblichen Liedchen aufwartete, und wiederum in scharfen Kontrast wurde man versetzt, wenn gleich nebenan der kleine Knirps, der Zaunkönig, sein zeterndes, keck herausforderndes Lied vom Stapel ließ, als wollte er damit beweisen, daß er auch hier herrschen will als Stimmgewaltiger wie in dem im Winterschlaf träumenden Wald bei Eis und Schnee er dies zu tun gewohnt ist.

Wir Vogelliebhaber wissen ja, daß jeder Stubenvogel seine Geschichte hat, jeder erzählt dem Pfleger etwas anderes, z. B. wo stammt er her, wie lange ist er im Käfig, wie ist er gesanglich, welche individuelle Veranlagung ist ihm eigen, hat er normal oder überhaupt gemausert, und noch verschiedene andere Eigenschaften, die diesen oder jenen zu wirklichen Sorgenkindern machen, ließen sich anführen. Nun, für den Beschauer gibt es nur den sangesfrohen Käfigbewohner, und es ist auch gut, daß die Besucher einer Ausstellung nur die Freuden und nicht auch die Leiden, die uns die Stubenvogelliebhaberei bringt, kennen. Der Liebhaber weiß es hingegen voll und ganz zu würdigen, denn er kennt die schwierigen Hindernisse, die es mit großer Kenntnis zu nehmen gilt, will man solches einwandfreies zur Schau bringen. Alle hätten es verdient, sowohl jeder Pfleger, sowie jeder Verpflegte, daß von den vorhergegangenen Ereignissen in dem stillen Winkel der Vogelstube hier geplaudert würde, denn da gab es wissenswerten Stoff von Erfolgen, oder auch von zeitweisen Mißerfolgen, kurz, für den wissensbegierigen Leser gäbe es wohl keine bessere Schule als die Geschichte jedes auf einer Vogelschau vertretenen Vogels. Wer den im schmucken, tadellosen Gefieder prangenden rotrückigen Würger betrachtet und selbst schon manchen Würger gekäfigt hat, der konnte ermessen, welch wertvolles Kleinod ein sich so natürlich im Gefieder haltender Würger bedeutet, er wird sich auch bewußt werden, daß wohl jeden Tag früh der erste Blick des Besitzers sorgenvoll dem Gefieder gegolten hat, und noch dazu wenn man weiß, im kommenden April ist Vogelschau. Und so ist es wohl allen gegangen, die ihre Lieblinge zur Schau bringen wollten. Ebenso sorgenvoll musterten täglich die Liebhaber den Verlauf des Federwechsels bei den „Frühjahrsmauserern", werden sie noch fertig die Sumpfrohrsänger, Gelbspötter, Sperber- und Gartengrasmücken, so hat noch kein Vogelpfleger das Wachstum des Gefieders beobachtet, wie angesichts einer bevorstehenden Mauser. Bei dem im Herbst käuflich erstandenen, noch im Jugendkleid befindlichen Steinrötel war es unbedingt nötig, daß er sich im schmucken männlichen Kleide präsentiert, nur sein vorhergegangener Besitzer wußte es ja, daß es ein Männchen war, denn 35 Mark, da kann man schon ein solches verlangen, und leise sang es auch, und trotz des guten Glaubens brachte das neue Gefieder eine Enttäuschung — ein Weibchen. Ganz besonders was die Zeit der Käfigung anbetrifft, waren die meisten bereits langjährig überwinterte Vögel wie Nachtigallen, Sprosser, Gelbspötter, Mönchs-, Garten- und Sperbergrasmücken usw. Am deutlichsten wirkte der Kontrast unter den vorhandenen 21 Blaukehlchen, da war das herrliche tiefe Blau einiger Frühjahrsfrischfänge, das verblaßte mehrmals überwinterter Vögel, ebenso war auch ein sogenanntes Wolfsches Blaukehlchen ohne weißen Stern zu sehen, überhaupt gab es reichlich Gelegenheit, an dem Benehmen und speziell dem lauten Gesang der diversen Blaukehlchen Studien zu machen. Ein paar liederpfeifende und sprechende Stare bildeten in dem Glanz ihres sauberen Gefieders ein herrliches Bild, ebenso konnte man sich nicht an der Schönheit einiger Rotkehlchen und Dompfaffen sattsehen, welcher Vogelpfleger kennt nicht speziell beim Rotkehlchen die Individualität in der Haltung und dem Benehmen, ein zu reizendes Bild, wenn es die Flügelspitzen hängen lassend und schnickernd seine Bücklinge macht. Welch buntes Leben entwickelte sich vor den Augen der Besucher in den Gesellschaftskäfigen, wie anmutig stolzierte die Schafstelze durch das Wasser, die weiße Bachstelze war ein zu unfriedlicher Gast und mußte die Ausstellungstage in Einzelhaft verbringen, um das friedliche Bild nicht dauernd durch hartnäckige Zänkereien zu stören. Zierlichkeit und Anmut verkörperten in den Wiesenpiepern, von denen sich einer liebreizend ausnahm in der bunten Volierengesellschaft. In einem anderen Gesellschaftskäfig zierte das buntfarbige Allerlei in auffallender Weise ein nordischer Gast, der Seidenschwanz; von anderen nordischen Gästen waren noch Bergfinken vertreten, deren schönes Gefieder sie dem Volierenliebhaber begehrenswert machen. Auch der nordische Vetter des Erlenzeisigs, der Birken- oder Leinzeisig, gehörte mit zu den für die Besucher seltener zu Gesicht kommenden Vögeln. Eigentlich gehörten einige Fremdlinge, wie Schamadrossel und Sonnenvogel, nicht in den Raum der einheimischen Ornis, sondern hinaus ins Zimmer der exotischen Gäste, aber sie sollten nun einmal eingereiht bleiben in der Kollektion ihres Besitzers. Das stets bewegliche, lebensfrohe Völkchen der Meisen verkörperten im Spielraum einer großen Voliere in anmutigster Weise eine Schwanz-, eine Blau- und eine Tannenmeise, ihre leise Stimmchen schmiegten sich bescheiden, kaum vernehmbar, dem vielstimmigen Gesang ihrer Volierenmitbewohner an.

Herrliche Bilder ließen sich noch entwerfen von all dem Gesehenen und Gehörten, doch die Feder ist zu schwach, um wirklich ein Gesamtbild solch eines, im wahrsten Sinne des Wortes veranstalteten Sängerwettstreites einigermaßen verständlich vor Augen zu führen. Hierin lag der Haupterfolg der Ausstellung, lebensfrohe, gesunde, im natürlichen Gefieder prangende, stets sangesfleißige Vögel zeigen zu können, dies ist das von allen Besuchern den Leipziger Vogelliebhabern ausgestellte, aber auch wohl verdiente Lob, dies ist der schönste Dank für die Aufregungen, Mühe und Arbeit einer Ausstellung. Wenn man bedenkt, daß dieses in seiner Kostbarkeit nur dem Vogelpfleger verständliche wertvolle Vogelmaterial von nur 26 Ausstellern gezeigt werden konnte, so erscheint

diese Leistung in einem noch günstigeren Lichte. Zählt man die schwach vertretenen exotischen Fremdlinge, wie Schamadrossel, Sonnenvogel, Sittiche, Weber und andere Ausländer mit ein in den Artenreichtum, so kommen reichlich über 50 Arten zusammen, die das Gros der Sängerschar bildeten. Vertreten waren von einheimischen Arten: 3 Nachtigallen, 3 Sprosser, 21 Blaukehlchen, 18 Schwarzplättchen, 7 Gartengrasmücken, 4 Sperbergrasmücken, 2 Zaungrasmücken, 1 Dorngrasmücke, 5 Gelbspötter, 13 Rotkehlchen, 3 Singdrosseln, 2 Stare, 1 Weibchen Steinrötel, 2 Heckenbraunellen, 2 Zaunkönige, 1 rotrückiger Würger, 1 Amsel, 1 Fitislaubsänger, 1 Baumpieper, 3 Wiesenpieper, 2 Feld-, 5 Heide- und 5 Haubenlerchen, 1 Bachstelze, 1 Schafstelze, 1 Gartenrotschwanz, 1 Trauerfliegenschnäpper, 1 Blau-, 1 Schwanz- und 1 Tannenmeise, 3 Dompfaffen, 9 Buchfinken, 2 Kiefernkreuzschnäbel, 4 Bergfinken, 4 Grünfinken, 2 Rohrammern, 1 Goldammer, 3 sibir. Braunkopfammern, 9 Erlenzeisige, 13 Stieglitze, 10 Bluthänflinge, 1 Leinzeisig, 3 Girlitze, 1 Kirschkernbeißer, 1 Seidenschwanz, 1 Stieglitzbastard, sowie 1 Steinkauz. Fehlt auch noch mancher Vertreter unserer heimischen Vogelwelt, so muß entschuldigend ins Feld geführt werden, daß es sich hier nicht um eine alle Arten umfassende Schaustellung eines Vogelhändlerverbandes, eines Zoologischen Gartens oder sonstiger zu diesem Zweck zusammengestellter Kollektionen, sondern nur um eine Ausstellung des in jahrelanger sorgsamer Pflege geschaffenen Vogelbestandes einer kleinen Schar von Vogelliebhabern, dies verdient Anerkennung und entschuldigt gleichzeitig manche nur für den Fachmann fühlbar gewesene Lücke. Wir Vogelliebhaber wissen zur Genüge, daß noch mancher seltene Käfiggast, wie Sumpfrohrsänger, Teichrohrsänger, Kuckuck usw. im trauten Heim dieses oder jenen Liebhabers ein sangesfrohes Leben führt, die aber wegen Gefiederdefektes, um keinen unästhetischen, sondern einen natürlichen Anblick beim Beschauer zu erwecken, der Vogelschau fernbleiben mußten. Diese seltenen Pfleglinge zu sehen wäre wohl für den die Ursache des defekten Gefieders kennenden Liebhaber ein Genuß, niemals aber für die kritischen Augen der Allgemeinheit von Vorteil gewesen. Jeder eine Ausstellung veranstaltende Verein sollte, um das Vorurteil gewisser Schichten gegen die Stubenvogelliebhaberei nicht noch mehr zu hegen, von einer Beschickung mit im Gefieder beschädigten oder gar fußkranken Vögeln unbedingt absehen, denn solche, dem Liebhaber wohl vertrauten Erscheinungen gehören nicht vor die Augen Nichtsachverständiger, denn auch auf einer Vogelausstellung verhilft nicht die Quantität, sondern die Qualität des zu zeigenden Materials zum vollen Erfolg.

Ein mißlicher Umstand, der der Leipziger Vogelschau am besten gefehlt hätte, waren die für die Menge des Materials etwas beschränkten Räume, denn trotzdem vier Räume zur Verfügung standen, würde der Effekt der Aufmachung anders auf den Beschauer gewirkt haben, wenn die Käfige auf den sonst sehr praktischen, eine volle Übersicht gestattenden Regalen nicht so gedrängt zu stehen brauchten. Trotz alledem war aber der erste Eindruck für den den großen Saal betretenden Besucher ein überwältigender, denn die in ihrer ziemlichen Gleichmäßigkeit sehr harmonisch wirkenden langen Käfigreihen zeigten kein planloses, das Auge beleidigendes Anordnungssystem. Lobend müssen noch die von Herrn Ungebauer und Otto ausgestellten sogenannten „Leipziger Originalkäfige" hervorgehoben werden, denn allgemein war das Lob der auswärtigen Liebhaber für die Brauchbarkeit und exakte Arbeit dieses Käfigsystems, der beste Beweis ist ihre Einführung bei den Leipziger Liebhabern, ebenso auch das Interesse, welches die auswärtigen Herren denselben entgegenbrachten.

Ansicht von der Leipziger Vogelschau.

Wenn wir auf die Leipziger Ausstellung zurückblicken und auf das, was mit ihr verbunden war, wie vier Lichtbildervorträge über unsere einheimischen Singvögel, ein Rundfunkvortrag über „Vogelschutz und -liebhaberei", die Jahresversammlung der Vereinigung der Vogelliebhaber, Landesverband Sachsen und Großthüringen, so können wir Leipziger ohne Überhebung uns dem Urteil unserer Gäste anschließen, indem wir auch sagen: Die Tage von Leipzig waren ein voller Erfolg, sie zeigten von Neuem die Berechtigung der Stubenvogelliebhaberei, das Zusammengehörigkeitsgefühl aller in Leipzigs Mauern weilenden Vogelliebhaber kam in glänzender Art und Weise zum Ausdruck, kurz gesagt, die Tage von Leipzig, sie werden allen unvergeßlich bleiben, die sie mit erleben durften, sie werden auch einen weiteren Gedenkstein bilden in der Geschichte und Organisationstätigkeit der deutschen Vogelliebhaber. Mögen solche Tagungen der deutschen Vogelliebhaber noch öfter das Organisationsbedürfnis wecken, denn wirklich ein ganz reger Zusammenschluß aller deutschen Vogelliebhaber zu einer Interessentenvertretung und festgefügten Kampforganisation tut dringend not, um die Angriffe unserer hartnäckigen Gegner jederzeit parieren

zu können. Daß sie am Werke sind und momentan wieder bereit sind, zur Niederschlagung der Stubenvogelliebhaberei auszuholen, beweist am drastischsten ein einstimmiger Beschluß des Tierschutzverbandes auf dem Verbandstage der Tierschutzvereine in München: Es wurde beschlossen, der Reichsregierung das Gesuch zu unterbreiten, das Herstellen und Feilhalten von Vogelleim und Vogelfanggeräten zu verbieten. Mit Mehrheit sprach sich die Versammlung sodann dafür aus, daß das Halten einheimischer Singvögel untersagt werden soll. Vogelliebhaber, darum aufgewacht, organisiert euch in einem Landesverband oder einem dem Reichsverband der deutschen Vogelliebhaber direkt angeschlossenen Verein. Ist dies nicht möglich, so werdet Einzelmitglied des Reichsverbandes, denn nur wenn wir festgefügt stehen wie Mauern, wenn wir eine Geschlossenheit zeigen, wie eine solche die Tage von Leipzig offenbarten, dann können wir dem sachlichen Kampf mit Siegeszuversicht entgegensehen, denn nur in der „Einigkeit liegt die Stärke und in der Stärke die Macht". Das Gelöbnis der Treue und des Kampfesmutes, möge es noch recht oft und allerorts so ehrlich und offen zum Ausdruck kommen wie an den Tagen von Leipzig, dann edle deutsche Stubenvogelliebhaberei wirst du als Erbgut unserer Väter festgewurzelt weiterblühen tief im Herzen und Volksgemüt aller Deutschen, und dann werden wir uns auch öfter noch wiedersehen zu den „Tagen von Leipzig".

Meine gefiederten Sänger.

Briefliche Mitteilungen von Prof. Dr. O. Fehringer (von Dezember 1924).

(Nachdruck verboten.)

Da ich zurzeit krank zu Hause liege, habe ich wunderbare Zeit zum Anhören meiner gefiederten Schar! Ein junger Gelbspötter singt seit dem 5. November, setzte dann einige Tage aus, als er sich einen neuen Schwanz zulegte und singt jetzt am 15. Dezember wieder ganz laut, nachdem er durch eine teilweise Mauser sich ein prachtvolles Gefieder verschafft hat. Er hängt am Fenster und läßt sich fleißig von der Sonne bescheinen. Sein Gesang ist aber nicht sehr erbauend, denn er ist etwas abgehackt. Es fehlen die bezaubernden Übergänge. Ein alter Spötter dagegen singt jetzt seit dem 15. Dezember ganz hervorragend. Er singt abends solange ich beleuchte, was oft bis 12 Uhr geschieht. Er ist heute 3 Tage nach Beginn schon dreiviertel laut! Der Sumpfrohrsänger hat heute am 18. Dezember begonnen. Er dringt natürlich noch nicht durch, so daß ich über seine Qualität noch nichts sagen kann. 1 Nachtigall und 1 Sprosser haben miteinander am 21. November angefangen. Da diese beiden in der vorigen Gesangszeit so zeitig aufhörten (schon Anfang April), so gebe ich vorläufig diesen beiden gar keine Mehlwürmer. Sie singen jetzt schon halblaut und recht fleißig. Die andern Sprosser markieren vorläufig noch würdige Standbilder und sind wie fast alle meine Vögel ziemlich fett. Eine graue Grasmücke, die damals durch die Ausstellung ihren lauten Gesang unterbrach, ist jetzt wieder völlig auf der Höhe und orgelt unermüdlich drauf los. Sie hat jetzt ihren Fettbauch schon soweit wieder abgesungen, daß sie ohne Gefahr wieder durchmausert, wobei sie kaum einen Tag mit dem Gesang aussetzt. So hielt sie es im vorigen Winter und so wird sie es hoffentlich wieder machen. Dorngrasmücke, Schwarzköpfe und Sperbergrasmücke singen fleißig. Die Drosseln sind jetzt fürs Zimmer schon zu laut. Ich werde sie demnächst umquartieren. Sie lassen die besseren Sachen nicht mehr richtig aufkommen. Dagegen ist das alte Steinrötel unermüdlich von morgens bis in die Nacht und benutzt so nett die Pausen, um sich zu Gehör zu bringen. Der Pirol ist dumm und schweigt. Er hat mir das Ausstellen sehr übel genommen; ich mußte ihn hinterher 8 Tage lang stopfen, da er keinerlei Nahrung zu sich nahm. Sehr merkwürdig hört sich der Gesang der jungen Rotkopfwürger an. Ein aufgepäppelter singt unermüdlich und ein Wildfang bemüht sich, ihm gleichzukommen. Wenn Sie aber erst den Gesang meines Raubwürgers hören könnten, so müßten Sie oft laut lachen! Er flötet einzelne signalartige Rufe von Singdrosselstärke. Dazwischen macht er einen derart merkwürdigen Zwischengesang, daß ich ihn nicht zu beschreiben vermag. Es klingt direkt exotisch. Dabei balzt er mich an, breitet den Schwanz aus und dreht mir den Rücken zu, oder stellt sich senkrecht aufgerichtet ganz dünn auf, oder legt sich auf den Boden und drückt den gefächerten Schwanz auf den Sand. Wenn ich mit ihm spiele, so legt er sich auch auf den Rücken und greift mit seinen Krallen nach meinen Fingern. Er ist ein reizender Geselle und ein liebenswürdiger Kamerad. Er will aber, daß man sich um ihn kümmert und versteht es meisterhaft, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Die Wachtel hat jetzt nach vollendeter Totalmauser ihren Schlag aufgenommen. Ich hörte ihn zuerst am 10. Dezember. Mit Ausnahme vom Pirol und einigen Sprossern und Spöttern ist fast alles im Gesang, viele schon vollkommen laut. Dabei „treibe" ich keineswegs. Spötter, Sumpfrohrsänger, Pirol und die Würger erhalten natürlich Mehlwürmer. Die andern aber erhalten keine, besonders die fetten Sprosser dürfen diesmal lange auf diese fettbildende Gabe warten. Sie haben ganz recht, wenn Sie sagen, mein Futter sei beinahe zu gut. Dafür aber füttere ich sehr sparsam. Es nährt sehr stark, ohne den Magen zu sehr zu belasten. Jedenfalls bin ich mit dem Erfolg sehr zufrieden. Wer will, mag ja ein solches Futter mit Zwieback oder dgl. strecken. Bei mir wird alles fett oder wenigstens rundlich. Davor habe ich weniger Angst als vor zu großer Magerkeit. Die beiden jetzt schon singenden Spötter und Sprosser sind gerade die fettesten ihrer Art. Genau so war es mit der grauen Grasmücke. Meine Käfige stehen jetzt ringsum an den Wänden auf den Gestellen. Es macht jetzt alles einen angenehmen und sauberen Eindruck. Mitten drin sitze ich und arbeite am Schreibtisch. Wen sein Weg einmal zufällig nach Heidelberg führt, der ist hiermit eingeladen, meine Vogelstube zu besichtigen. Mittags zwischen 2 und 3 Uhr bin ich fast immer zu Hause. Nur Sonntags bin ich auf meiner Jagd. Gegen vorherige Anmeldung kann aber jedermann stets meine Vogelstube besichtigen.

Nächtliches Toben unserer einheimischen Weichfresser.

Von Oskar Stauder, Ulm a. d. Donau.

(Nachdruck verboten.)

Der Monat April gibt mir Veranlassung, zu dem nächtlichen Poltern unserer einheimischen Weichfresser Stellung zu nehmen. Ich will zwar kein Kritiker sein, doch ist in den vergangenen Wintermonaten einigemal behauptet worden, Vögel mit bestoßenem Gefieder seien Ausnahmen. Ich will kein Anhänger von Herrn Nieselt sein, manchmal komme ich aber verdammt auch auf den Gedanken, die Vögel über die Nacht in Säckchen zu sperren.

Wer im Frühjahr und Herbst, das heißt in den Zugzeiten, sein Nachtlager in der Nähe seiner Vögel hat, der wird mir recht geben, wenn ich behaupte, daß es unmöglich ist, unter solchen Umständen in den Schlaf zu kommen. Wäre die Liebhaberei nicht so groß, der ganze Sport könnte einem da manchmal entleiden. Von meinen vier Vögeln, die ich zurzeit käfige, Garten-, Sperber-, Dorngrasmücke und Schwarzplatte, fällt es mir schwer, zu behaupten, welcher von den Vieren der größte Polterer ist. Diese vier Vögel machen wirklich die ganze Nacht hindurch einen derartigen Krach, daß man glaubt, die wildesten Raubvögel vor sich zu haben. Ich staune blos, daß stärkere Beschädigungen dabei nicht vorkommen. Der Grund ist wohl in dem gewohnten Sprung zu suchen?

Im wesentlichen möchte ich die Beschädigung des Gefieders hervorheben. Von Gelbspötter, Pirolen und Gartengrasmücken ist man es ja im allgemeinen gewohnt, und das Bestoßen des Gefieders ist keine Überraschung mehr. Ausnahmen gibt es natürlich auch hier. Mag mancher Liebhaber das Glück haben, das ganze Jahr hindurch einen schön befiederten Spötter zu haben, mir ist es bis jetzt in meiner langjährigen Liebhaberei noch nie geglückt. Jedem gewissenhaften Pfleger ist es doch sicher sehr daran gelegen, schön befiederte Exemplare zu käfigen. Ich habe schon viele Jahre hindurch Gelbspötter, manchen Winter 4—5 Stück, mit Erfolg gekäfigt und alle tadellos durch die Mauser gebracht. Doch jedes Jahr hatten alle meine Spötter bis Anfang Mai das Gefieder bestoßen. Dadurch bin ich tatsächlich soweit gekommen, die Pflege des Spötters vollständig aufzugeben. Nach der Mauser machten mir die Vögel jedesmal Spaß, alle sahen aus wie aus dem Ei geschlüpft, vier Wochen darauf hatte ich die reinsten Jammergestalten vor mir. Welchem Liebhaber ist es nicht schon ebenso ergangen? Dieser Umstand hat mich schon manchmal dazu bewogen, die Flinte ins Korn zu werfen. Es ist Tatsache, daß von dem Liebhaber hohe Anforderungen, viel Liebe und Geduld verlangt werden.

Was nun die eigentliche Schuld ist, vermag ich nicht zu sagen. In erster Linie kommt der natürliche Zug in Frage. Mittel, dem entgegenzuwirken, gibt es kaum. Oft hatte ich schon den Wunsch, könnte der Zug nicht vor die Mauser fallen, nur um das Gefieder zu erhalten. An den Käfigen mag es kaum liegen, ich beherberge meine Vögel in den bekannten Flemming-Weichfresserkäfigen mit weicher Decke. Kistenkäfige mögen den Vorzug haben, daß die Vögel sich an dem Gitter und an den offenen Schmalseiten nicht so leicht beschädigen können, doch haben die letzteren den Nachteil, daß sie nicht überall aufgestellt werden können. Außerdem spielt bei jedem Liebhaber die Wohnung, nachts einfallendes Licht, Nähe von Bahnhöfen usw. eine große Rolle. Während meines Aufenthaltes in Berlin wohnte ich an einer Straßenbahnhaltestelle. Trotzdem ich damals nur einige Finken käfigte, konnte ich nachts jedesmal beobachten, daß bei dem Anfahren der „Elektrischen" und des damit einfallenden Lichtes sämtliche Vögel von den Stangen fielen.



Ansicht von der Leipziger Vogelschau.

Eines steht fest, würde ich z. B. bei meinen Vögeln die ganze Nacht hindurch das Licht brennen lassen, wäre dem Toben ein Ende gemacht (das heißt natürlich nur in der Zugzeit). Ich kann nachts aufbleiben, so lange ich will, beim Licht rührt sich keiner. Welcher Liebhaber kann sich aber diesen Luxus leisten, etwa vier Wochen lang das Licht nachts 7—8 Stunden brennen zu lassen? Mit einer ganz schwachkerzigen Birne könnte man sich eventuell diese Ausgaben leisten.

Unter den obengenannten Umständen ist es mir rätselhaft, wie manche Liebhaber über diese Zeiten hindurch im Gefieder unbeschädigte Vögel durchbringen. Ausgenommen seien Vögel, die schon drei bis vier Jahre und noch länger gekäfigt werden. Am besten halten sich noch die Schwarzplatten. Erwähnen möchte ich noch, daß ich nur altgefangene Wildfänge käfige. Um mich nun davon zu überzeugen, legte ich mir vor einigen Jahren eine junge Gartengrasmücke zu, in der Absicht, einen befiederten Vogel zu haben.

Ich wurde eines andern belehrt, auch diese hat sich in der dreijährigen Käfigung den Schwanz kurz nach der Mauser abgestoßen. Da der Vogel gesanglich minderwertig war, gab ich denselben nach meiner Erfahrung weiter.

Obige Angaben sollen aber keine Kritik sein, auch will ich damit nicht behaupten, daß jeder Liebhaber das gleiche Glück oder Unglück hat. Ausnahmen gibt es überall.

Zum Schluß noch einiges über das Eingewöhnen der Frühjahrswildfänge. Seit Kriegsende befasse ich mich öfters mit dem Eingewöhnen von deutschen Nachtigallen. Ich hatte es da auch schon mit fürchterlichen Tobern zu tun. Nicht selten kam es vor, daß sich ein Vogel durch das schreckliche Poltern eine Zehe abgerissen oder zum mindesten die Schnabelwurzel beschädigt hatte. Ich machte mir alle möglichen Gedanken, wie diesem Übel am besten abzuhelfen wäre. Ich kam zu folgendem Entschluß. Den ganzen Käfig verkleidete ich innen mit starken Lagen Zeitungspapier, auch die vordere Schmalseite bis zur Hälfte. Der Erfolg ist nicht ausgeblieben. Die Nachtigallen beschädigten sich in einem solchen Käfig nicht mehr. Die offenen Gitterkäfige haben für die Eingewöhnung der Weichfresser manchen Nachteil, auch wenn dieselben ganz verhüllt sind. Morgens in der Dämmerung springen die meisten Wildfänge und an den Gitterwänden hat sich schon mancher edle Sänger beschädigt.

Vergangenes Frühjahr gelangte ich in den Besitz von drei deutschen Nachtigallen (Wildfänge), zwei davon hatten die Oberschnabelspitze abgebrochen und bei einer fehlte eine Hinterzehe. Durch diese Nachteile war ich gezwungen, zwei dieser Vögel wieder weiterzugeben. Auch das waren Beispiele einer schlechten Eingewöhnung.

Vieles ließe sich darüber noch sagen. Doch für heute von den Mängeln genug. Glücklich derjenige Liebhaber, dem diese Übel noch nie begegnet sind. Denjenigen Liebhabern, die schon von dem gleichen Unheil betroffen wurden wie ich, seien diese Worte ein Trost.

Rotschwänze — Phoenicurus *(Forst.)*.

Eine Monographie von John Kuntzendorff.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Der graublaue Wasserrotschwanz — Chaimarrhornis fuliginosa fuliginosa *(Vig.)*.

In Gestalt und Wesen den anderen Chaimarrhornis-Arten völlig ähnlich, in Gefiederfärbung der letztgenannten gleichkommend, ist Chaimarrhornis fuliginosa fuliginosa. In der Gefiederfärbung von Ch. leucocephala ist er durch das Fehlen der weißen Färbung und durch Ersetzen der schwarzen durch die graublaue Farbe, von Ch. f. affinis durch das Fehlen der weißen Zeichnung an den Flügeldecken unterschiedlich.

♂ ad. Das ganze Gefieder graublau, Zügel und vordere Stirn etwas dunkler; hinterer Teil des Unterkörpers etwas blasser; hinterer Teil des Bürzels röstlichen verwaschen, zum Schwanze hin rostbraun; hinterster Teil des Unterleibes zu den Unterschwanzdecken hin die Spitzen der Federn rostbraun, daher rostbräunlich scheinend; Ober- und Unterschwanzdecken kastanienbraun; Schwingen düster schwarzbraun, außen düster graublau schmal gesäumt, Flügeldecken schwarzbraun, an Außenfahne schmal graublau gerandet, große Flügeldecken ohne weißen Fleck in der Mitte der Federspitze; Schwanzfedern kastanienbraun mit undeutlicher Andeutung einer braunen



Schwarzohrkardinal (s. S. 295).

Endzeichnung; Auge dunkelbraun, Schnabel schwarz, Füße braun, an der Hinterseite heller. Bei einem männlichen Balg waren die Oberschwanzdecken reinweiß, die Federn an der Spitze schmal dunkel sandfarbig gesäumt; somit wäre dieser Vogel partiell hennenfiedig gefärbt. ♀ ad. Oberseite düster aschgrau, vordere Stirnfedern und Ohrdecken bräunlich; Ober- und Unterschwanzdecken weiß; ganze Unterseite heller aschgrau, jede Feder weiß längsgefleckt und ganz hellaschgrau gerandet und gespitzt; Schwingen tiefbraun mit helleren Außensäumen; Schulterfedern und Oberflügeldecken dunkelgrau, jede Feder an der Spitze mit einem weißen Fleck, große Flügeldecken mit weißen Endsäumen; Schwanzfedern dunkelbraun, mittelstes Paar etwa ein Drittel von der Wurzel ab weiß, jedes folgende Paar immer mehr weißer, so daß das äußerste Paar ganz weiß ist mit braunem Außensaum, braunem Spitzensaum und an der Innenfahne mit länglichem, braunem Saumfleck an der Spitze; Spitzensaum und Saumfleck variieren in der Ausdehnung oder fallen auch ganz fort. ♂ Jugendkleid ähnelt dem des ♀, ist aber ober- wie unterseits bräunlicher; äußerste Schwanzfedern reinweiß — bei einem Balg wie beim ♀. Jerdon gibt als Maße an: Fl. 75—82, Schw. 55—60, Lf. 22—24.5 mm.

Das Verbreitungsgebiet des Chaimarrhornis fuliginosa fuliginosa ist ein äußerst ausgedehntes, da er im ganzen Himalaja von Kaschmir bis zum Brahmaputra, in Assam, sowie in den chinesischen Provinzen Setschwan, Kansu, Schensi (Tsin-ling-schau-Gebirge) und von Kwangtung und Fokien bis nach Schantung vorkommt. Die nordchinesischen Vögel scheinen öfters größere Flügellänge und stärkeren Schnabel zu haben, doch sind diese Unterschiede nicht konstant genug, um sie von den übrigen abzuzweigen. In Südchina ist er gewöhnlicher Wintervogel, im Nordgebiet gleichfalls gemein. Vereinzelt brütet er auch in den Südprovinzen — Weibchen mit flugfähigen Jungen sind dort festgestellt worden. Er lebt hauptsächlich an reißenden Flüssen und Gebirgsbächen, deren Ufer felsig sind, sonnige Stellen aufweisen und mit Wald oder Buschwerk bestanden sind. Ins Gebirge geht er nicht so sehr hoch hinauf, wie Ch. leucocephala, jedoch immerhin zu der respektablen Höhe von 4000 m. Mit Vorliebe sucht er nasse Felsstücke auf und watet, gleich jenem, von dem einen zum anderen. Sein Nest legt er in Vertiefungen der Uferwände und Felsen an, baut es aus Moos, Wurzeln und Bast und polstert es mit Haaren und Wolle aus. Das Gelege besteht aus 4—5 Eiern von grünlich weißer Farbe, die fahl rotbraun und lila gefleckt sind. Die Brut findet im Mai und im Juni statt.

Junger Kuckuck beim Verlassen des Nestes.

Wenngleich der graublaue Wasserrotschwanz sich vom weißköpfigen Wasserrotschwanz in der Gefiederfärbung unterscheidet, so gleicht er ihm in seinem Wesen und in seiner Lebensweise vollkommen. Auf diese will ich später eingehen und jetzt auf die Schwanzbewegungen und den Gesang zu sprechen kommen. Die Schwanzbewegungen hat er mit Ch. leucocephala gemeinsam. Es ist das gleiche kraftvolle Auf- und Niederschlagen, verbunden mit ein- oder beidseitigem Schwanzfederspreizen. Es fehlt also auch bei ihm das die Rotschwänze so charakterisierende Schwanzzittern. In der Erregung werden die Schwanzbewegungen schneller und kräftiger ausgeführt, wobei der Schwanz oben wie unten eine zum Körper beinahe senkrechte Stellung einnimmt. Im Käfig benimmt er sich wie der eingangs erwähnte Vogel; er ist lebhaft und ständig in Bewegung, ohne dabei aber einem auf die Nerven zu fallen. Wie jener verfolgt er aufmerksam alles, was in der Vogelstube vorgeht, besonders die Handlungen des Pflegers. Bei seiner Ankunft war er weder scheu noch stürmisch, und er wurde in der Folgezeit so zahm, daß er nicht nur die Mehlwürmer aus der Hand nahm, sondern sofort beim Betreten der Vogelstube anfing, nach Leckerbissen zu betteln, indem er entweder wie nicht recht gescheit von einem Sprungholz zum anderen sprang oder auf dem einen unter gewandten Kehrwendungen nach rechts und nach links hüpfte, bis man ihm seinen Willen erfüllte. Seine Eingewöhnung verursachte überhaupt keine Schwierigkeiten, da er sofort an das ihm gereichte Mischfutter ging. Dies wird wohl ein Ausnahmefall sein, doch glaube ich, dadurch berechtigt zu sein, annehmen zu dürfen, daß die Eingewöhnung mit Hilfe von frischen Ameiseneiern, im Notfalle auch mit angefeuchteten, getrockneten stets ohne Zwischenfälle vonstatten gehen wird. Das Mischfutter war dasselbe, das den Rotschwänzen gereicht wurde, mit einer Zugabe von zirka 5 Mehlwürmern pro Tag. Der Gesang klingt rotkehlchenartig und wirkt mit den ihn durchsetzenden Trillern sehr angenehm und melodiös. Trotzdem er nicht sehr vielseitig ist, kann man den graublauen Wasserrotschwanz den besseren Sängern zuzählen. Der Gesang ist nicht besonders laut, aber im Vogelchore herauszuhören.

Im Flugraum kann man erst recht die Wesensgleichheit mit dem weißköpfigen Wasserrotschwanz feststellen. Sein Flug ist schnell, gewandt und wellenförmig. Gleich den Fliegenschnäppern fängt er Insekten in der Luft, indem er von seiner Beobachtungswarte sich auf die fliegende Beute stürzt; andererseits aber sucht er auch seine Nahrung vom Boden auf. Wie sein weißköpfiger Verwandter hält er sich vorzugsweise auf dem Gestein auf, auf welchem er sich mit großer Gewandtheit zu bewegen weiß, und nur zeitweise benutzt er freistehende Zweige und Äste als Sitzgelegenheit; Dickichte und dichteres Gebüsch meidet er prinzipiell. Neben den Rotschwänzen und dem weißköpfigen Wasserrotschwanz ist er derjenige Vogel, der die Felspartie am meisten benutzt. Auf dem Boden bewegt er sich teils hüpfend, teils schrittweise laufend, wobei er ab und zu stehen bleibt, sich verbeugt und mit dem Schwanz wippt oder ihn spreizt. Sein Trink- und Badebedürfnis ist ein großes, meist badet er in der Weise, daß er gänzlich durchnäßt ist; gewöhnlich badet er mehrmals am Tage, zum mindesten aber morgens und abends. Auf den im Wasserbassin befindlichen Steinen verweilt er gerne, auch watet er mit Vorliebe im Becken umher. Mit den anderen Vögeln verträgt er sich sehr gut, Streitigkeiten, auch mit weißköpfigem Wasserrotschwanz, kommen nicht vor. Dagegen ist er ein kleiner dreister und frecher Geselle, der gern allerhand unschuldigen Schabernack mit seinen Volierengenossen treibt. So z. B. ist er schnell bei der Hand, wenn es gilt, einen anderen Vogel den fetten Bissen zu entreißen. Wie der Wind ist er auf den Vogel zugeflogen, ein schnelles Zupacken, und schwupp, der Wurm ist jenem aus dem Schnabel gezogen und im Handumdrehen ist er verschlungen. Dabei ist es ihm ganz gleich, ob sein Widersacher ein kleiner oder ein größerer Vogel ist und gar zu spaßig sieht es aus, wenn der größere Vogel mit dem Wurm zugleich auch den ganzen Wasserrotschwanz hinter

sich herzieht. Bei guter wie bei schlechter Witterung hält er sich im Außenflugraum auf und kommt in die Innenvoliere fast nur bei Ausübung seiner Flugkünste oder um seinen Hunger zu stillen. Zum nächtlichen Ruheplatz hat der Vogel, gleich seinem Verwandten, ein geschütztes Plätzchen auf dem Dach eines Nistkastens an der Wand des Außenflugraumes sich ausgesucht. Auch er gehört zu den am frühesten erwachenden und am spätesten sich zur Ruhe begebenden Vögeln.

Bisher ist er leider nur in einem männlichen Exemplar eingeführt worden, dieses kam in meinen Besitz und habe ich es zweieinhalb Jahre, zuerst im Käfig, dann im Vogelhaus verpflegt. Eine weitere Einführung ist dieser ersten bedauerlicherweise nicht gefolgt.

Junger Kuckuck im Nest.

Mein Kuckuck Max.

Von W. Blohm.

(Nachdruck verboten.)

Nun geht es mir an meinem neuen Wirkungskreis Nusse, einem lübischen Dorf bei Mölln in Lauenburg, schon ebenso wie früher in Lübeck: alles Getier, das tot oder lebend in die Hände der An- und Umwohner gerät, wird mir gebracht — mit Ausnahme der Jagdtiere, sofern sie noch für den menschlichen Genuß geeignet sind. Schade! — Aber mancher Vogel, der im unvorsichtigem Fluge gegen einen Leitungsdraht flog, verklammte Fledermäuse, die irgendwo auf der Diele lagen, Ratten und Mäuse, — alles dieses landet bei mir.

Am 24. Juni 1924 klopfte es an meiner Klassentür, und als ich öffne, stehen zwei Knaben da, die mir einen schönen Gruß von dem Lehrer eines Nachbardorfes bestellen und „er schicke mir anbei einen jungen Kuckuck, der aus einem Fliegenschnäppernest gefallen und von den Pflegeeltern nicht wieder angenommen worden sei". —

So! sehr freundlich, lieber Amtsbruder aus dem Lauenburgischen! Du weißt wohl nicht, was du mir antust! Hast du schon einmal einen jungen Kuckuck gefüttert? Nein? Hast du nicht in meinem Buche „Natur — mein Leben" gelesen, wie oft ich's schon versucht habe, so einen Nimmersatt durchzubringen, und wie es mir immer mißlungen ist? Aber du magst das arme Vögelchen nicht töten — ganz einfach schickst du es zu mir, und nu sitt ick dor mit an!

Daß ich am Teich schon einen Fresser, den Fischreiher Fedor, hatte, konnte der Kollege nicht wissen. Aber einem Menschen einen jungen Kuckuck schenken, das ist schon allerlei! Und meine Gedanken flogen. Schule halten, Fischreiher füttern, Kuckuck füttern, Fische füttern, und in drei Tagen ist unser Schulfest. das dauert den ganzen Tag, und ein junger Kuckuck will mindestens alle zwei, am liebsten jede Stunde was zu fressen haben . . .

„Also Jungens, grüßt euren Lehrer recht schön von mir und bestellt, ich hätte mich sehr gefreut. Es ist gut, daß ihr mir den kleinen Burschen schnellstens mit dem Fahrrade überbracht habt; dem lange hungern darf er nicht. Ich will ihn schon großziehen. Auf Wiedersehen!"

Da saß er nun vor dem Fenster im Schulzimmer, zur großen Freude meiner Kinder. Wie es gekommen ist, weiß ich nicht, ohne viel Förmlichkeit hatte er den Namen Max erhalten.

Max war gut und sauber befiedert, aber noch vollkommen ohne Schwanz; an Fliegen war gar nicht zu denken. Er hockte auf einem faustgroßen Stein. Dort saß er besser als auf dem bloßen Fensterbrett. Ein paarmal flatterte er gegen die Scheibe und versuchte mit seinem dicken Kopf das Glas durchzudrücken. Bald hatte er gelernt, daß das nicht möglich sei, und so ergab er sich in sein Schicksal.

Bald darauf läutete es zur Pause, und da nahm ich den Max denn mit auf den Schulhof, um ihn allen Kindern zu zeigen. Dort saß er auf einem Staketpfahl und wurde gebührend bewundert.

„Kinder, das ist ein junger Kuckuck, der frißt Insekten, massenhaft; geht und fangt mir welche!" so rief ich mit lauter Stimme in den Volkshaufen hinein. Dabei schwenkte ich einen kleinen Marmeladeneimer, der die Nahrungstiere aufnehmen sollte. Da stoben sie von dannen, und bald fielen die erbeuteten Fliegen und Brummer, Spinnen und Raupen in das Sammelgefäß. Ich faßte ein Insekt nach dem andern mit einer Pinzette und hielt es dem Max vor. Na, den Kuckuck möchte ich sehen, der dann nicht sein Riesenmaul aufreißt und sich die Nahrung in den blutroten Rachen stecken läßt! Zum Glück fanden die Kinder in den Ritzen einer Planke die dicken Larven der Schlammfliege. Das waren fette Happen — die Fliegen hätten für einen Kuckucksmagen nicht viel ausgemacht. — Wirklich, wir kriegten den Max satt. Ja, einmal; wie würde sich die Sache weiter entwickeln? In zwei Stunden war wieder Pause, und da konnte nochmals gesammelt werden. Aber heute nachmittag? Und morgen? Und in drei Tagen ist Schulfest, was dann? Wer Kinder kennt, der weiß auch, wie schnell der Eifer erlahmt. Ist es mir als Kind trotz aller Liebe zu den Tieren nicht ebenso ergangen? Wenn es hieß: „Haben deine Kaninchen schon frisches Futter bekommen?" mußte ich dann nicht oftmals beschämt hinausgehen und schleunigst den Korb nehmen, um Grünzeug zu holen? Und das war leichter zu bekommen als Tausende von Insekten für einen solchen Nimmersatt. — Hatte ich nit meinen Kuckucken nicht die traurigsten Erfahrungen gemacht? — Sollte ich den armen Vogel, so niedlich er auch war, nicht schleunigst töten? Wäre das nicht besser, als ihn langsam umkommen zu lassen? Ich konnte mich nicht entschließen. Diesmal wollte ich es noch versuchen, einen Kuckuck durchzubringen. Wenn es absolut nicht gehen wollte, dann konnte ich ihn immer noch rechtzeitig abtun. Manchen Vorteil hatte ich jetzt für mich: ich war auf dem Lande, früher in der Stadt. Ich hatte Landkinder zur Verfügung, über hundert! Sollte es nicht gehen?

(Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Auslandsbericht. Über den Schwarzohrkardinal (s. Abb. S. 292) (Paroaria nigrigenis) schreibt im Märzheft des „L'Oiseau" Herr A. Decoux, dem zum erstenmal die Zucht dieses schönen Kardinals gelang. Ihm wurde dafür von der Société d'Acclimatation de France in diesem Jahre die silberne Medaille verliehen. Er weist einleitend auf die Erfahrungen hin, die der „Alte Vogelliebhaber" in der „Ges. Welt" 1913, S. 188 ff. bezüglich dieses Vogels veröffentlichte und die mit den seinen nicht übereinstimmen. Der dänische Autor bezog kurz hintereinander vom Londoner Zoo zwei Männchen, die trotz sorgfältigster Pflege (siehe „Ges. Welt" 1913) nach einigen Wochen eingingen. Decoux erhielt 1922 von Herrn Delacour, der zirka zwanzig Stück dieser Vögel aus Venezuela mitbrachte, zwei Männchen und ein Weibchen, die zuerst recht gut miteinander auskamen. Aber im Frühjahr 1924 wurde das ältere Männchen gegen alle Mitinsassen des Flugraums sehr angriffslustig und tötete unter anderen seinen jüngeren Rivalen. Im Juni baute das Paar ein sehr liederliches Nest über der Volierentür und das Weibchen erbrütete hier drei Eier in 18 Tagen. Weitere 18 Tage später flogen die Jungen aus. Die Alten ernährten ihre Brut ausschließlich mit lebenden Ameisen und deren Puppen. Die Schwarzohrzeichnung fehlt bei den Jungen noch vollkommen. Im selben Sommer wurden noch zwei weitere Nachkommen großgezogen. Die Geschlechtsunterschiede sind so gering, daß Decoux unter den 20 Vögeln dieser Art, die er besitzt, nicht mit Sicherheit die Geschlechter unterscheiden kann. Zu diesen Angaben gibt J. Delacour, der die Vögel aus Amerika herüberbrachte, einige geographische Ergänzungen. Nur am Orinoco und seinen Nebenflüssen fand er den Schwarzohrkardinal. Im Jahre 1921 kam er nach Camaguan am Rio Portuguesa, einem Nebenfluß des Orinoco. Während er bis dahin nirgend einen derartigen Kardinal in Venezuela erblickt hatte, sah er in Camaguan die Vögel so zahlreich und gemein wie bei uns die Spatzen; sie leben in den Gärten der Stadt, brüten dort in den Hecken und Gebüschen und ernähren sich von Samen und Insekten und großenteils von dem Küchenabfall der Bewohner. Sie fliegen sogar in die Häuser und holen sich die Krumen vom Tisch. Ein Sammelpunkt ist das Schlachthaus, wo sie gierig hinter den Fleisch- und Blutabfällen her sind. Da das Wohngebiet von der Küste sehr abgelegen ist, erklärt es sich, daß dieser so schmucke Vogel so selten nach Europa importiert wird. Die Venezulaner nennen ihn Gorro colorado. Zum erstenmal brachte ihn M. Pams im Jahre 1911 nach Europa; er gelangte im selben Jahr in den Berliner zoolog. Garten. In England hat sich ein neuer Verein gegründet, der den Zweck hat, die Zucht, Ausstellung und Entwicklung der Farbenspielarten des Wellensittichs besonders zu pflegen. Es werden eigene Regeln und Standards für Form und Farbe dieser Tiere aufgestellt, nach denen der Wert auf Ausstellungen beurteilt werden soll.

Dr. Luig, Brüssel.

Vom Storch, der in den Schornstein fiel. Eine ebenso rührende wie tragische Storchengeschichte hat sich vor kurzem in einem mecklenburgischen Städtchen zugetragen. Der Schornstein einer dortigen Molkerei war wegen seiner etwas außergewöhnlichen Höhe ein besonders beliebter Ruheplatz für die Mitglieder einer im Städtchen beheimateten Storchenkolonie geworden. Besonders einer der Störche konnte sich absolut nicht von dem Standpunkt trennen und suchte ihn immer wieder in kurzen Zeitabständen auf. Er mußte aber dabei erfahren, daß es nicht nur unter den Menschen neidische Gemüter gibt. Ein neiderfüllter und unzufriedener Storchkollege kam eines Tages plötzlich angeflogen und wollte den braven Adebar von seinem hohen Sitz verdrängen. Obwohl genügend Platz für beide war, entstand doch zwischen ihnen ein heftiger Streit, der schließlich in Tätlichkeiten ausartete (bei Menschen kommen solche Platzstreitigkeiten bekanntlich niemals vor). Die Folgen des Kampfes blieben nicht aus. Der neidische Verdränger tat nämlich einen Fehltritt und stürzte in den schwarzen Schornstein hinab. Ein Molkereigehilfe, der den Kampf beobachtet hatte, bemühte sich sofort um die Rettung des Abgestürzten. Er kroch in den unteren Teil des Schornsteins und Mann und Storch kamen pechschwarz wieder zum Vorschein. Der neidische Vogel gab aber nur noch schwache Lebenszeichen von sich und Wiederbelebungsversuche mit künstlicher Atmung hatten keinen Erfolg mehr. Fünfzehn Störche umkreisten während der Rettungsaktion den Schornstein. Der neidische Adebar aber kehrte nicht zurück und mußte begraben werden. So geht es, wenn man neidisch auf fremde Schornsteinplätze ist.

Bücher und Zeitschriften.

Der kleine Brockhaus, das Handbuch des Wissens in einem Band, beginnt soeben zu erscheinen. Die Kunst, Handbücher des Wissens in Formen zu bringen, wie sie das deutsche Volk entsprechend dem Fortschreiten von Wissen

und Können nötig hat, ist gewissermaßen ein altes Erbteil der Firma F. A. Brockhaus in Leipzig. Deren Gründer hat vor mehr als hundert Jahren das erste allgemein brauchbare Werk dieser Art geschaffen, das man damals langatmig Konversationslexikon nannte. Heute ist das Werk in aller Welt als „Der Brockhaus" bekannt und geschätzt. Gleich nach dem Krieg erschien der „Neue Brockhaus", das Handbuch des Wissens in vier Bänden; er erwies sich rasch als eine unerschöpfliche und unentbehrliche Wissensquelle. Aber die Gegenwart mit ihren nervenaufreibenden Forderungen zwingt jeden, Zeit und Geld auf das wirtschaftlichste auszunützen. Für alle, die die Ausgabe für ein vierbändiges Werk scheuen, ist der Einbänder entstanden, der Kleine Brockhaus. Die uns vorliegende erste Lieferung umfaßt mit den Stichwörtern A—Bolschewismus eine überreiche Fülle von Stichwörtern aller Art und ist geschmückt mit vielen wertvollen und lehrreichen Bildertafeln und Karten, in und außer dem Text; auch prächtige bunte Bilder sind dabei. Außerdem enthalten die 80 Seiten der ersten Lieferung nicht weniger als 443 klar ausgeführte Textabbildungen. Zu unserer Freude sehen wir, daß der Kleine Brockhaus sich erstmalig einer neuen Aussprachebezeichnung befleißigt, der eine leichtverständliche Schreibung zugrunde gelegt ist. Nur mit Hilfe eines geschickt ausgedachten Systems schnell einzuprägender Abkürzungen und Zeichen ist es möglich geworden, die unglaubliche Zahl von Angaben unterzubringen; wie leicht verständlich und schnell unterrichtend ist z. B. der Verweisungspfeil (→) statt des bisherigen „siehe"! Besonders aufmerksam machen möchten wir auf die Diagramme, die wirtschaftliche Verhältnisse darstellen, z. B. die Arbeitslosigkeit und Auswanderung mit dem stürmischen Auf und Ab ihrer Linien. Die Lieferung kostet nur 1,90 M., und ungefähr aller vierzehn Tage soll eine neue Lieferung erscheinen bis zur zehnten, mit der das Werk abschließt. Wir möchten nicht verfehlen, unsere Leser sowohl auf den billigen Subskriptionspreis, der baldige Bestellung nahelegt, als auch auf das auf dem Umschlag der ersten Lieferung enthaltene verlockende Preisausschreiben aufmerksam zu machen.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnitz, Merveldstr. 39. Verbandsorgan: „Die Ges. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

An alle Vogelliebhaber!

Ein Rauschen geht durch den Blätterwald unserer Liebhaberzeitschriften, es wetterleuchtet in der Ferne und bald auch wird der Sturm hereinbrechen. Dem Liebhaber will man an den Kragen, ihm sein ideales Gut streitig machen. Und warum? Weil Menschen aus vogelkundlicher Unkenntnis, im widernatürlichen Eifer, das Allheilmittel, unsere heimische Vogelwelt zu schützen und zu mehren, in einem Käfigungsverbot erblicken. Ohne hier mit schlagenden Beweisen unserer besten Fachleute, der Wissenschaft und den eigenen Erfahrungen über den Nutzen und Schaden der Vogelhaltung aufzuwarten, sei aber gesagt, daß wir dem angesagten Kampfe nicht tatenlos gegenüberstehen. Wir nehmen an, daß diese Versicherung der Unruhe, die sich in Veröffentlichungen der Zeitschriften widerspiegelt, einen Damm setzt.

Wenn wir auch außerordentlich dankbar sind für jedwede Anregung zur Entwaffnung unserer Gegner, für jeden Bericht über Vorgänge im gegnerischen Lager, soweit sie uns betreffen, glauben wir wohl darauf hinweisen zu dürfen, daß uns mit diesen Anregungen, die von uns übrigens unserer organisierten Liebhaberschaft schon längst zur Pflicht gemacht worden sind, nicht allein gedient ist. Eine erste Voraussetzung zum günstigen Abschluß eines Kampfes ist immer die Stärke. Das sollten und möchten die Liebhaber erkennen, die ihre ganze Hoffnung auf den Reichsverband setzen, ihn zur Wachsamkeit anregen, ihm aber nicht angehören. Sie erkennen wohl, wenn das Schifflein in Not gerät, aber dem nutzenbringenden Entschluß, sich anzuschließen, stehen sie unschlüssig gegenüber. Wir wissen sehr wohl, daß es auch unter den Vogelliebhabern Nutznießer gibt wie überall, auch für diese Liebhaber wird unsere Organisation nach ihren Kräften sorgen, die Kastanien aus dem Feuer holen und erhofft dafür nach Beseitigung der Gefahr das weitere Abseitsstehen.

An alle denkenden und die Gefahr erkennenden Liebhaber aber richten wir die Bitte, schenken auch Sie uns Ihr Vertrauen, Ihre Kraft und Unterstützung. Erkennen Sie, die drohende Gefahr ist groß, der bevorstehende Kampf erbittert, ein Beitritt zum Reichsverband stärkt und nützt unserer Sache. Und an die Vorsitzenden unserer Ortsgruppen richten wir, wie früher schon, die Bitte, die kleinste Gelegenheit zu nützen, um für ihren Reichsverband und die Sache der Liebhaber zu werben in Wort und Schrift, er stellt jederzeit Material zur Verfügung. Es gilt, die Tagespresse zur Aufklärung über die Sache der Liebhaber zu benutzen, diese Kleinarbeit kann nur von unseren Ortsgruppen aus erledigt werden. Wir erwarten ganz bestimmt ein intensives Mitarbeiten im vorstehenden Sinne und Tätigkeitsberichte hierüber, weiter auch die fernere Beobachtung der Tätigkeit unserer Gegner. Die Berichterstattung, wie sie einzelne rührige Ortsgruppenvorsitzende üben, bitten wir, sich allgemein zu eigen zu machen. J. A.: Petters.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Max Kleinert, Berlin NO 18, Strausberger Str. 13: tarant. Bergpapageien, Molukkenkakadus, Weißhaubenkakadus, Königsglanzstare, langschw. Glanzstare, Graydrosseln, Damadrosseln.

Max Schimang, München, Landsberger Str. 169: 1,0 Hahnschweifwida.

Stefani u. Sohn, Neuß am Rhein: Wellensittiche, blau, grüne Rückschläge von blauen Eltern, blaublütige, maigrüne, 1,1 Spitzschwänze, 1,2 weiße Kanarien, 1,0 Alario, 1,0 Kurzschnabelgirlitz.



Herrn W. A., Bergedorf. Die zurzeit im Handel befindlichen Ameisenpuppen werden von Finnland ausgeliefert. Rußland ist seit dem Kriege an diesen Lieferungen nicht mehr beteiligt. Die Namen der Firmen sind mir unbekannt. Die Absicht, in Deutschland ein Unternehmen zur Trocknung von Ameisenpuppen ins Leben zu rufen, halte ich für aussichtslos, da es nicht möglich ist, die genügende Menge frischer Ameisenpuppen zu erhalten. Die Ameisen unterstehen in Deutschland dem Forstschutz und die Ausbeutung der Ameisenbauten ist verboten.

Herrn K. L., Gera. Das beste Mittel, die auf den Vogelkäfigen hausenden Milben zu vertilgen, ist das Seifenwasserbad. Es darf nur bei gesunden, nicht in der Mauser befindlichen Vögeln angewandt werden. An einem recht warmen Tag macht man in einer Schüssel ein lauwarmes, mäßig starkes Seifenwasserbad zurecht, in einer zweiten Schüssel hält man etwas wärmeres, reines Wasser bereit. Man ergreift den zu badenden Vogel und übergießt ihn gründlich mit dem Seifenwasser so, daß davon nichts in Schnabel und Augen gelangen kann, und spült ihn dann mit dem reinen Wasser gründlich ab. Danach trocknet man das Gefieder mit weichen, etwas erwärmten Tüchern, indem man das Gefieder in der Richtung des Federwachstums bestreicht. Man läßt ihn dann an zugfreiem Ort, möglichst in der Sonne, vollends trocknen. Statt des Seifenwassers kann auch Lysoformwasser (1,5 Lysoform : 100 Wasser) verwendet werden. Sonst ist das Verfahren das gleiche. Daneben muß mit dem Ausbrühen der Käfige usw. fortgefahren werden.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

rgang 54 18. Juni 1925 Heft 25

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Meine Drosseln. (Aus 50jährigen Erfahrungen.) (Schluß.)
Neueinführungen und Seltenheiten. Von K. Neunzig. (Forts.)
Die Tage von Leipzig. Von J. Birk, Leipzig. (Schluß.)
Meine gefiederten Sänger. Briefliche Mitteilungen von Prof. Dr. O. Fehringer.
Nächtliches Toben unserer einheimischen Weichfresser. Von Oskar Stauder, Ulm a. d. Donau.
Rotschwänze — Phoenicurus *(Forst.)*. Eine Monographie von John Kuntzendorff. (Schluß.)
Mein Kuckuck Max. Von W. Blohm.
Kleine Mitteilungen – Bücher und Zeitschriften – Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig – Vom Vogelmarkt – Redaktionsbriefkasten – Ausstellung – Aus den Verbänden – Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

utz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellung.

Der Verein der Vogel- und Aquarienliebhaber Herne i. Westf. veranstaltet in der Zeit vom 11. bis 21. Juni d. Js. im Saale des Herrn Eduard Lobeck zu Herne, Neustraße 67, eine Ausstellung. Ausgestellt werden einheimische und fremdländische Zier- und Singvögel, Zierfische und Reptilien, Hilfsmittel zur Haltung und Pflege, Präparate usw. Wie in früheren Jahren, werden die Mitglieder des Vereins auch in diesem Jahre bemüht sein, den Besuchern eine interessante und reichhaltige Schau zu bieten, damit die seither als mustergültig bekannten Ausstellungen des Herner Vereins ihre alte Anziehungskraft behalten. Die Ausstellung ist geöffnet von morgens 9 Uhr bis abends 9 Uhr. Ein Besuch ist sehr zu empfehlen.

Aus den Verbänden.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10. — Angemeldet ist Herr Ing. Hans Lohmar, Köln a. Rh., Blumenstr. 1. Bei Vermittlungsgesuchen in Streitfällen u. dergl. wird um Beifügung rechtsgültiger Unterlagen gebeten. A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. — Am 19. März 1925 hielt die „Aegintha" ihre Generalversammlung ab. Aus dem Jahresbericht des 1. Schriftführers sei folgendes angeführt. Es fanden im verflossenen Vereinsjahr 17 Vereinssitzungen und 1 Generalversammlung statt. In den verschiedenen Sitzungen fanden ganz interessante Vorträge statt und in den übrigen Sitzungen war Herr Dr. Heinroth, unser Ehrenmitglied, so liebenswürdig, uns die Abende durch Vorführung und Besprechung seiner Studienobjekte oder durch Besprechung der neuesten ornithologischen Literatur lehrreich und unterhaltend zu gestalten. Auch Frau Dr. Heinroth sei an dieser Stelle dankend gedacht, welche ihren Gatten bei der Vorführung seiner Studienobjekte hilfreich unterstützte. An Vorträgen wurden folgende gehalten: Es sprachen: am 3. April Herr Gumprich über den Virol, am 17. April Herr Prof. Müller Kaempf über Würger, am 19. Juni Herr Dr. Heinroth über die Sitzung der Ornithologischen Gesellschaft in Bremen und anschließenden Ausflug, am 4. September Herr Dr. Heinroth über „Abessinische Vögel", am 2. Oktober Herr Hermann über „den Vogel in Sage und Geschichte", am 23. Oktober Herr Prof. Müller Kaempf über seine „Harzreise", am 4. Dezember Herr Wilke über „Vogelleben an der Nordseeküste", am 8. Januar Herr Dr. Heinroth über „Besuch süddeutscher Tiersammlungen". Es wurden einige Tagespartien und eine Nachtpartie nach Fürstenberg-Neustrelitz veranstaltet. Es traten dem Verein einige Mitglieder bei und einige traten aus, so daß wir mit 1 Ehrenmitglied und 64 ordentlichen Mitgliedern ins neue Vereinsjahr traten. Zu erwähnen wäre noch die Ausstellung des Preuß. Landesverbandes, an welcher sich die Aegintha allerdings nur mit einem Mitglied beteiligte, welches sich dann auch den ersten Preis der Ausstellung holte. Dafür waren aber mehrere Herren im Arbeitsausschuß der Ausstellung tätig, und besonders der 1. Vorsitzende des Vereins opferte der Ausstellung als Leiter viel Zeit und Mühe. Aus dem Kassenbericht des Kassierers sei folgendes entnommen: Wir hatten eine Einnahme von 379,70 M., der an Ausgaben 257,59 M. gegenüberstehen. Es bleibt somit ein Kassenbestand von 122,11 M. Außerdem stehen noch 215,— M. an Beiträgen aus. Herr Gumprich erstattete dann den Revisionsbericht. Er hat die Kasse in mustergültiger Ordnung gefunden und bittet, dem Kassierer sowie dem Gesamtvorstande die verdiente Entlastung zu erteilen. Dieses geschieht. Es wurde dann zur Neuwahl des Vorstandes geschritten. Durch Zuruf wurde Herr Gumprich zum Alterspräsiden bestimmt. Herr Gumprich nahm an und leitete dann die Wahl. Es wurden die Hauptämter als 1. und 2. Vorsitzender, 1. Schriftführer und Kassierer durch Zettel gewählt, die übrigen Ämter durch Handaufheben. Es wurden gewählt zum 1. Vorsitzenden Herr Gottschlag, zum 2. Vorsitzenden Herr Gumprich, zum 1. Schriftführer Herr Vorbrodt, zum 2. Schriftführer Herr Wilke, zum Kassierer Herr Zimmermann, zum Bücherwart Herr Hammer, zu Revisoren die Herren Karbe und Kann, in die Winterfütterungs- und Besiedlungskommission die Herren Kann, Noack, Kaminski, Kirstein und Herr Vorbrodt als Obmann. In den Vergnügungsausschuß die Herren Dähnicke, Hammer, Kirstein, Vorbrodt. Als Ausflugsführer wurden die Herren Noack und Wilke gewählt. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen. J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Vogelschutz und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke, Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Vereinsl.: Karl Röhr, Heiligerweg 28. Versammlung jeden 2. u. 4. Sonntag im Monat, nachmittags 5 Uhr. Liebhaber herzlich willkommen. J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung Freitags, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Blasewitzer Hof". Liebhaber willk. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Rietschelhof", Rietschelstr. 19. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinslokal „Parkhotel", Epinaystr. 1, Versammlung. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an. Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 7. Juli. A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber. Nächste Veranstaltungen: Donnerstag, den 18. Juni: Vereinsabend im Landesheim, 8¼ Uhr, Vortrag Böneker: „Australische Körnerfresser". Donnerstag, den 9. Juli: Vereinsabend im Landesheim, 8¼ Uhr, Vortrag Klocke: „Mimikry". Alle Mitglieder werden herzlich gebeten, möglichst an allen Veranstaltungen teilzunehmen. — 53. Mitgliederversammlung, am 28. Mai 1925, im Landesheim, Volgersweg. Anwesend 26 Personen. Neu eingetreten: Nr. 109 Ranke, Gustav, Arbeiter; Nr. 159 Schütz, Ernst. Ornithologe; Nr. 161 Almstedt, Th., Kaufmann; Nr. 158 Heinroth, Dr., Dir. d. Aquariums; Nr. 160 Wolf, R. B., Kaufmann, London S. B. 19. Wie üblich, werden eine Menge von Eingängen besprochen, wird beschlossen, der süddeutschen Vogelwarte beizutreten und dem Reichsverband erneut mitzuteilen, daß wir keinen Kopfbeitrag von 1.— M. bezahlen können, aber mit einer festen Summe Mitglied des Verbandes bleiben wollen. — Eine lange Auseinandersetzung entspinnt sich über die Gewinnung der Laubengärtner und Siedler für angewandten Vogelschutz. Vor

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

dem Kriege hat man trübe Erfahrungen gemacht. Es soll aber durch Aufsätze in Tageszeitungen und Gärtner-Fachblättern, die Dr. Weigold verfassen wird, und durch Vorträge in den Laubengärtner- und Siedlervereinen, die im Herbst Herr Schüg halten wird, in unserem Sinne gearbeitet werden. — Herrn Dr. Weigold wird der lebhafte Dank aller hannoverschen Naturfreunde dafür ausgesprochen, daß es seiner unermüdlichen Zähigkeit und Geschicklichkeit gelungen ist, den Bau eines Naturmuseums durchzusetzen. Er bittet um rege Mithilfe aller Mitglieder durch Lieferung oder Nachweisung von Nestern und anderen Darstellungsmitteln, die aus der Natur möglichst unverändert in das Museum geschafft werden können. — Der Vorsitzende erzählt, daß er auf einer Reise an die Bergstraße mit Herrn Troschütz zusammen dort ein außerordentlich reges Vogelleben, vor allem eine Menge von Grasmücken aller Arten, angetroffen hat. — Unser Mitglied Troschütz läßt eine Reihe von neuen Büchern und Zeitschriften mit wertvollen Aufsätzen über unsere Liebhaberei und über naturwissenschaftliche Fragen im allgemeinen herumgehen. Den Hauptteil des Abends bildet ein sehr wertvoller Vortrag unseres Mitgliedes Dr. Neuwerth über die richtige Zusammensetzung des Weichfutters im allgemeinen und über den Zusatz von Möhren im besonderen. Er führt aus, daß man den Weichfressern, vor allem im Sommer, ein Futter geben muß, das einen möglichst vollgültigen Ersatz für die frische Insektennahrung darstellt. Als wertvollster Bestand zum Mischen eines solchen Futters hat sich nach Versuchen von Wissenschaftlern und Vogelwirten die Möhre bewährt. Bedingung ist nur, daß die Möhren völlig gesund sind, und daß das Futter mit dem besonders wertvollen Saft richtig vermengt wird. Nimmt man 3 Teile Möhren, 2 Teile Ameisenpuppen und einen Teil Weißwurm, so bekommt mit solcher Mischung der Vogel vollen Ersatz für Insektennahrung. Zur Bindung kann man soviel Zwiebackmehl hinzusetzen, daß die richtige, krümelige Futterform erzielt wird. Der Vortragende berichtet sehr fesselnd über die Fortschritte der Vitaminen-Forschung und zeigt, was wir als Vogelhalter daraus lernen müssen. Sein Aufsatz soll vervielfältigt und allen Mitgliedern zugänglich gemacht werden. Appel.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste willk. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig. Vereinssitzungen jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat im Vereinslokal „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 18. Juni 1925. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Normast im „Kaiser Friedrich", Breslauerstr. 50. Liebhaber willkommen. J. A.: Friedrich.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Vereinsabend regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends um 8 Uhr) beim 1. Vors., Herrn Jahn, Feodorastr. 7. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. A. Voigt.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Tage im „Goldenen Falken" Versammlung; nächste Freitag, den 26. Juni. Liebhaber willk. Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Versammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Liebhaber willk. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebenda. R. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

e viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per ief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

ogel-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50.
Hlagnetze f. kl. schädl. Vögel M. 2,30,
r. M. 2,50 u. 2,80. Katalog gratis.
Tannen, Gronau 58, Westf. [792

ieder Vogelliebhaber
lange Preisliste über Vogelfutter,
enfilien und Bedarfsartikel zur
Zucht und Pflege der Vögel. [793
Hermann Sievers,
annover, Inselstr. 2.

Mehlwürmer
i. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd.
nko versend. D. Waschinski & Co.,
Biesenthal I (Mark). [794

Mehlwürmer
à Pfund 4.50 M, bei 6 Pfund Porto und Verpackung frei. „Händler Rabatt".
Ia Ameiseneier
Pfund 6.50 M.
Ia Weißwurm . . . à Pfd. 5 M
Ia Muska-Zecken . . à „ 2,50
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen . . . . à Pfd. 0,75
Ia Garnelen, gem. à Pfd. 0,40 M
Ia Universalfutter
Alleckwa I für Nachtigallen 2.— M
„ II für Grasmücken 1.80 M
„ III für Drosseln . 1.50 M
Proben und Analysen zur Verfügung. Vertreter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [7
Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
A. Eckrich II, Waldsee (Pfalz).

Danksagung.

Für die überaus zahlreiche Beteiligung und die rege Anteilnahme, die uns beim Heimgange unseres lieben Schwiegervaters und Großvaters, des Radlermeisters [796

Paul Schindler

zuteil wurde, sagen wir allen Freunden und Bekannten unsern herzlichsten Dank.

Ww. Berta Schindler, geb. Elsner
und Kinder.

2 Weichfresserkäfige

Original Schindler f. Nachtig.—Sprosser, gut erhalt., f. à 15.— M. zu verkaufen.
Völker, Stettin, Schnellstr. 7. [797

Zerlegbarer Käfig gesucht!

[798 Erbitte Angebot über Größe, Beschaffenheit usw. an
A. Schiebe, Zschopau i. Sachs.,
Marienstr. 17. A. Z.-Mtgl. 282.

799] **Mehlwürmer,** reine Ware, gegen Eins. von 1.75 ℳ 1/4 Pfd. franko.
Th. Witte, Niederndodeleben b. Magd.

Ameisenpuppen

täglich frisch, à Liter M. 2,30 franko Garantie f. Qualität.
Th. Witte, [800
Niederndodeleben b. Magdeburg.

Vogelfutter [801

für **Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser.** Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.
W. Göpel, Leipzig,
Trönblinring 1. Telephon 14958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

802] **Täglich frische Ameiseneier**
Versand Liter 2.— M.
Mehlwürmer Pfd. 6.— M.
Spezial-Geschäft für Weichfresser
Fritz Sterling, Berlin NW 5
Perleberger Str. 35. Moabit 4733. [767

Mehlwürmer pr. rein Pfd. 4.50 (6 Pfd. 27 ℳ. fr.)
1/4 Pfd. 1.50 M. fr. Voreinsend.
Jeitner, Breslau, Weinstr. 12. [803

Ameiseneier

prima saubere frische Ware, à Ltr. 2 ℳ. Bei Einsendung v. 2.30 ℳ à Ltr. postfrei.
Karl Edel, Würzburg,
Augustinerstr. 13. [804

Welcher ehrliche Liebhaber gibt mir sechs Liter Ameisenpuppen (frische, geschwelkte oder gedörrte) für eine gute Schwarzplatte, Gartengrasmücke und Dorngrasmücke. Gefällige Angebote sind zu richten an [805
Oskar Stauder, Ulm a. d. Donau
(Württemberg), Grüner Hof 2.

Vögel

Kreuzschnäbel

schön ausgefärbte Männch. sowie Zuchtpärchen habe laufend abzugeben. In Tausch nehme Kanarien, Exoten sowie Vogelfutterfämereien. [806
Arno Jahn, Großbreitenbach
Thüringen.

Züchterkollegen!

Wer seine Nachzucht gesund erhalten will, der befolge nachstehenden Wink: **Jungvögeln im Fluge verabreiche man guten Rübsen zur Genüge und „L.K." trocken, soviel sie fressen mögen. Gekochtes Ei verursacht Krankheiten und ist deshalb die Verabreichung zu vermeiden.**
Lorenz, Dresden
Drehgasse 5. [807

1 Blutschnabelweber, 1 Feuerweber, 1 Dominikaner-Kardinal owie **1 Schwarzdrossel** im Gesang, zusammen für 20 Mark zu verkaufen.
Josef Perner, Strasburg (Uckermark),
808] Lindenstraße 6.

„ORNIS" Freie Bezugsvereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands.

Gegründet 1912 ∴ Fernsprecher 4198 [809

Fachgemäße Belieferung d. Mitglieder m. Vogelfutter, nach Angaben des Herrn Apotheker **Adalbert, Jena.** („Reform-Normal", individuelle Zusammensetzung b. restlosem Verbrauch; stets frisch gemischt). Mitglieder u. Vereine Vorzugspreise. Hunderte von Liebhabern füttern seit über einem Jahrzehnt mit bestem Erfolg nur „Reform-Normal".

Reform-Normal-Käfige Mod. ORNIS 1925, neue Preisliste erschienen. — Modern eingerichtete Käfig-Bauanstalt mit elektrisch. Betrieb. —

Neuanmeldungen frei, bei gleichzeitiger Bestellung Zusendung des **Ornis-Buches** (90 Seiten). Geschäftsjahr ab 1. Oktober, **Beitrag** und **Ornis-Nadel** 2.— M.

Auskunftei: Jede gewünschte Auskunft wird gern erteilt. Prompte und gewissenhafte Erledigung aller Bestellungen. Leiter langjährig. Fachmann.

Anschrift: Ornis-Haus, Halle-Saale. Der Geschäftsführer: Martin **Sperling.**

Mehlwürmer [810

jedes Quantum, 1 Pfd. 4.50 M., Porto u. Verp. extra. 1/4 Pfd. 1,50 M. franko, bei Nachn. 20 Pf. mehr. 5 oder 6 Pfd. franko u. Verpack. frei (Dringend Eilboten). **Händler und Vereine sowie Großabnehmer erhalten hohen Rabatt bei Abnahme von 5—6 Pfd.**
Karl Claus, Mutterstadt 2, Hauptbahnhof.

Wir geben ab: [811

Farben-Wellensittiche

blau, Paar 150.— M., grüne Rückschläge von blauen Eltern (wieder blaue Nachzucht bringend), Paar 60.— M., sonstige blaublütige Paar 40.— M., maigrüne Paar 60.— M., gelbe vorjähr. Zuchtpaare 12.— M. Ferner **1,1 Spitzschwänze** 50.— M., **1,2** vorj. weiße bzw. **Hermelin-Kanarien** 100.— M., **1,0 Alario** 15.— M., **1,0 Kurzschnabelgirlitz** 10.— M., **2,0 Weißkehlpfäffchen** je 10.— M.
Wir suchen: **0,1 Orangeblaufink, 0,1 Schwarzgimpelfink, 0,1 Alario, 1,0 Elfen- u. 1,0 Granatastrild, 0,1 Tigerfink, 2,2 Schönbürzel, 2,2 rl. Kubafinken, 0,1 Goldsperling, 0,2 Hahnschweifwidas.**
Stefani Sohn, Neuß am Rhein.

Suche [812

0,2 Zebrafinkenweibch.
Alfred Fichtner, Oetzsch b. Leipzig.

Tausche: 1,0 Stieglitz, 1,0 Zeisig, 1,0 Zitronfink, sämtlich 1 Jahr gekäf., flott i. Ges., geg. 1,0 Blaukehlchen, 1,0 Schwarzpl. od. 1,0 Gartengrasm. Sende nicht zuerst. [813
H. Fehrenbach, Unter-Eisenbach,
Amt Neustadt, Schwarzwald.

Suche zuchtfähiges 0,1 Zebrafink und 0,1 jap. Mövchen.

Gebe ab:
1 Zuchtpaar Tarantiner 25 Mark, tausche auch auf Sperlingspapageien.
Edwin Pangritz, Zittau i. Sachs.
A. Z.-Mtgl. 383. [814

Rot- u. schwarzköpfige Goulds,

einzeln und in Paaren, gesucht, evtl. auch Jungtiere. [815
A. Schiebe, Zschopau i. Sachs.,
Marienstr. 17. A. Z.-Mtgl. 282.

Gebe ab:

Laut. Wipfel-Rotkehlch., Schwarzkopf, Sperbergrasm., Stieglitz, Rothänfling, alles singende Männch., gegen Schama-Männchen.
Riedel, Gittersee-Dresden,
816 Dresdner Str. 19.

Verkaufe dauernd junge Wellensittiche la befiedert, kerngesund, i. Freiflug gezüchtet, grün u. gelb, à 5 M.
Saller, Planegg bei München,
Hofmarkstraße 8. [817

Zahme und sprechende Graupapageien, Blaustirn-, Gelbkopf-, Surinam-, Neuholländer-, Diadem-, Rotstirn-, Blaukronen-Amazonen, Kakadus, prachtvolle fingerzahme, gutsprechende Aras, zahme Spielaffen, Silberfüchse, Nasenbär, junge, echte reinweiße u. farbige Angorakätzchen verkauft **A. Stober, Altona a. d. E.,**
818 Gr. Rosenstraße 126.

Inserate

für das am 25. Juni 1925 zur Ausgabe gelangende Heft 26 der Gef. Welt erbitten bis 20. Juni

Bestellungen für Juli sofort der Post übergeben!
Bestellzettel für Deutschland.

Postbestellzettel.

Hiermit bestelle ich für den Monat **Juli 1925**
1 „Die Gefiederte Welt"
(eventuell mit Nachlieferung). — **Erscheinungsort Burg Bz. Mgdb.**

Name: .....

Wohnung: .....

Postquittung: ..... Mk. ..... Pf. sind heute bezahlt worden.

Ort: ..... den .....

Postannahme

.....

1 Paar Orangeblaufinken
1 „ Papstfinken
1 „ Mövchen
1 „ Mexikanische Blutfinken
1 „ Kaptäubchen
1 ff. Schwarzplatte mit Ueberschla
1 ff. Gartengrasmücke
(alle Vögel sind gut im Gefieder u. Gesang sofort billig a. liebsten a. Platz zu verkaufen
Osthenner, Berlin W,
Blumenthalstr. 17. [81

Tausche

reinrassige **Zwergrehpinscher,** Rüden und Hündinnen, schwarz mit braun 5 Monate u. 2 Jahre alte, gegen **Papageien** oder **Prachtfinken.** [82
Jacob Baron,
Hambach bei Neustadt-Haard
(Rheinpfalz).

Verkaufe, weil überzählig:
1,0 Taranta . . . . . 10.— M
4,0 Rotkopfamadinen . à 4.— M
3,2 Mövchen . . . . à 5.— M
1,1 Wellensittich . . . 12.— M
Männchen grün, Weibchen gelb, erprobt Zuchtpaar, alles eingewöhnte Tiere. [82
Tausche auch gegen andere Exoten.
Eugen Müller, Küllstedt, A. Z. 65

1 Paar Schopfwachtel legend, [82

verkauft einschließlich Korb für 35.— M
E. Stümcke, Vegesack (Bremen)

Krankheitshalber

b. gezwungen Rest m. Vögel zu verkaufen
1 Glanzstar, tadellos . . 18.— M
1 Reisstar, tadellos . . 15.— M
1 Textorweber Männch. i. v. Prach 10.— M., Porto extra.
2 Graudrosseln i. voll. Gesang, versch gegen **Schwarzplatte** oder **Girlitz Dompfaff** oder sonstige Vögel. [82
Off. u. **A. H.** Exped. d. Ges. Welt.

Kaufe [82

jungen diesjährigen **Eichelhäher,** geb event. frische **Ameiseneier** in Tausch
K. Edel, Würzburg, Augustinerstr. 1

Verkaufe [82

0,1 roten Kardinal,
Ges. Welt 1882/87. **C. Balser, Fulda**

4 junge Wellensittich-Weibchen
Febr.-Brut 1925, gesunde kräftige Tier à 6.50 M., zus. 25.— M. verkäuflich
Ph. Zinn, Darmstadt,
Ludwigsplatz 7. [8

Suche

Heide- oder Feldlerch
Ia Sänger. [8
A. Lieb, Bonn am Rhein,
Welschenonnenstr. 14.

Suche zu kaufen: Naumann, Vög Bd. III u. ältere Jahrg. d. Ges. We
C. Voigt, Leutzsch-Leipzig,
Bahnhofstr. 40. [8

5,2 Zebrafinken

importiert, gut eingewöhntes Paar 20.— 2 Männchen haben Beinfehler, daher n 8.— M. d. Stck. Tausche: 24er Welle sittich-Weibchen (grün), blaue Welle u. Nymphens. (Zuchtpaare). Gebe a Junge, **fingerzahme Wellensittich**
Frau **Klara Neugebauer,**
Deutsch-Lissa.
Wellensittich-Züchterei. [8

Preisliste [8

über **Affen, Papageien, Senega vögel gratis.**
Carl Willer's Zoo,
Altona, Kirchenstr. 34.

Mandrill, g. zahm, **Blaustirn-, Gel nack.-, Doppelgelbkopf- u. Mohre kopfpapageien, Elfenbein- u. Feue flügelsittiche** zu verkaufen. [8
A. Fluck, Bremen, Knoopstr.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 25. Juni 1925 | Heft 26

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Von meinen Vögeln.

Von Fritz Braun.

(Nachdruck verboten.)

Manche Besprechungen meines Buchs über „Die Grundlagen der Vogelhaltung" zeigten mir wieder, wieviel Menschen sich noch immer gemüßigt fühlen, den Liebhabern das Recht abzusprechen, Singvögel im Käfig zu verpflegen. In der Regel führen diese Gegner der Vogelliebhaberei etwa folgendes aus: Die Liebhaberei ist letzten Endes ganz überflüssig. Wer gerade den Singvögeln seine Teilnahme schenkt, mag sie im Freien beobachten. Im Kampf gegen diese Ansicht suchen dann die Liebhaber zu beweisen, daß zahllose Menschen, die ihr Beruf ans Zimmer bannt, dazu nicht imstande sind. Ihnen solle man es darum vergönnen, die gefiederten Bewohner der Wälder und Triften in ihrer Wohnung zu halten.

Meiner Meinung nach sind die einen wie die andern auf dem Holzweg. Ob wohl der Indianer des brasilianischen Urwaldes, der den Arara, den Sittich in seine Hütte holt, diese Gefangenen hält, um sich eine Art Ersatz für die Beobachtung der freilebenden Vögel zu verschaffen? Ich selbst würde Stubenvögel auch dann verpflegen, wenn ich in einem Gelände wohnte, das zum Beobachten der Vögel so günstig läge wie nur möglich, und mir gestattete, mit dem denkbar geringsten Zeitaufwand die Sänger der Gärten, der Triften und des Röhrichts zu beobachten. Solchem Ideal kam beispielsweise meine Wohnung in Dt.-Eylau so nahe, wie ich mir das nur wünschen konnte.

Schon der Naturmensch hält aber seine gefiederten Freunde ganz gewiß nicht deshalb, um an ihnen festzustellen, wie sich das Leben einer bestimmten Vogelart unter normalen Verhältnissen abspielt. Was ihn reizt, ist das Geheimnis des Lebens überhaupt, das Wunder der seelischen Lebensäußerung bei dem hochstehenden Tier, das bezüglich des Trieb- und Affektlebens dem Vetter Mensch so verzweifelt ähnlich sieht. Je zahmer der Pflegling wird, je näher er sich an seinen Herrn anschließt, desto teurer wird er dem. Nicht das Streben nach Erkenntnis macht ihn dem Besitzer wert, sondern die Fäden, die sich von Seele zu Seele spinnen und dem Menschen zeigen, daß in dem bunten Federwisch etwas lebt, das da liebt und haßt, trauert und sich des Lebens freut gerade so wie der stolze Herr der Erde selber.

Wenigstens muß ich selber gestehen, daß ich über diesen Standpunkt kaum hinausgekommen bin, so befremdlich das auch manchem stolzen „Wissenschaftler" erscheinen mag, der lächend auf alle Fachgenossen herabblickt, die sich nicht aus irgendeinem Handbuch eingepaukt haben, wie es sich mit den Längenverhältnissen der Schwingen bei den Laubvogelarten verhält und wie die Jugend- und Jahreszeitkleider unserer Strandvögel aussehen. Was ich jederzeit in meiner Vogelstube studierte, ist das Leben, vor allem das Seelenleben, das mir tausendfach verschieden, artlich und individuell verschieden, aus den Augen meiner Pfleglinge entgegenschaute, um so verständlicher, je zahmer sie geworden waren, je mehr sie erkannt hatten, daß Fritz Braun nicht als der Todfeind Mensch, sondern als ein wohlwollendes Geschöpf zu betrachten sei.

Diesen Bestrebungen verdanke ich in geistiger Hinsicht wohl den besten Inhalt meines Lebens, so eifrig ich mich auch auf anderen Wissensgebieten, wie namentlich dem der Erdkunde, betätigen mochte. Vielleicht gerade deshalb, weil ich von Anfang an meine eigenen Wege ging, selber sah und selber deutete, selber beobachtete und selber schloß, so daß der ganze Kreis dieser geistigen Tätigkeit eigene Angelegenheit des Empfängers war. Was das bedeuten will, brauche ich dem nicht lange auseinanderzusetzen, der selber an hohen Schulen und Universitatibus erfahren hat, wie oft dort alle Arbeit nur ein Fahren in dem Geleise bedeutet, das der betreffende Fachlehrer ausgefahren hat, dem seine erfolgreiche Forschung ein Vertrauen sichert, welches doch keine Gewähr bietet, daß seine Schüler zu gleicher Arbeit vorausbestimmt seien.

Nirgends im Leben erfreute ich mich ähnlicher geistiger Selbständigkeit wie in meiner Vogelstube, nirgends sprach Natur so unmittelbar zu mir, nirgends war Erkenntnis so innig mit Freude verbunden, mit jener hohen Freude, die jeden überkommt, der sich mit suchender Liebe in die unerschöpfliche Mannigfaltigkeit tierischen Lebens vertieft. Darin, daß selbst der schlichte Waldarbeiter, der einfache Handwerker, der sich mit Stubenvögeln umgibt, etwas von dieser Freude verspürt, von dieser Lust an fremdem Leben,

dem er sich von Jahr zu Jahr näher verwandt fühlt, besteht der Adel unserer Liebhaberei, den uns solche Gelehrte, die mit der Bestimmungstabelle und dem Seziermesser arbeiten, nicht herabsetzen sollen. Wenn sie übersehen, daß wir uns andere Ziele gesteckt haben als sie, ist das nur ein Beweis ihrer eigenen Kurzsichtigkeit. Jedenfalls befinden sie sich auf einem logischen Irrweg, wenn sie dem Liebhaber sagen: „Laß die Vögel fliegen und beobachte im Freien!" Was der sucht, ist da nicht zu finden.

Diese Beweisführung stammt von einem Manne, der sich zeitlebens bemühte, in allen geistigen Dingen die größte Duldsamkeit zu üben, der zu jeder Zeit bereit war, dem denkenden Balgornithologen, dem vergleichenden Faunisten dieselbe ehrliche Anerkennung zu zollen wie den Fachgenossen, die sich seinem Sonderfach, der Erforschung des tierischen Seelenlebens, verschrieben haben. Er glaubte aber, doch einmal auf diese Dinge eingehen zu müssen, weil er wieder und wieder annahm, daß naheliegende Irrtümer das Urteil über die Vogelliebhaberei bedauerlich trüben sollten.

Doch genug davon, und von der nicht immer „grauen" Theorie mitten hinein in das grüne Leben! Jeder, selbst der nebensächlichste Zufall hat ja für den erfahrenen Vogelliebhaber wesenhafte Bedeutung, wie er ihn auf Grund seiner Erfahrungen im größeren Zusammenhange zu rücken vermag.

Als ich gestern nach Hause kam, war ein Orangeweber aus einem Flugkäfig entwichen, dessen Schiebetür ich nach der Käfigreinigung nicht geschlossen hatte. Dabei fiel mir nun so manches auf. Erstens wunderte ich mich, daß der Weber überhaupt den Weg ins Zimmer gefunden hatte, denn die Schiebetür war dem Fenster abgekehrt. Daß ein Entweichen gar nicht so nahe lag, bewies schon, daß er der einzige Insasse des Bauers war, der sich diesen Zufall zunutze gemacht hatte. Das zeugte von einer gewissen Klugheit, die gerade einem Weber zuzubilligen, ich nicht von vornherein geneigt gewesen wäre. Wäre der Vogel noch wild gewesen, so hätte ich mich über sein Entweichen weniger gewundert, weil solche Tiere bei ihrem unruhigen Hin und Her allen möglichen Flugbahnen folgen, die sie dann wohl auch einmal durch solche kleine Öffnungen führen. Jener Weber ist aber ein zahmer, ruhiger Vogel, der sonst ganz bestimmte Wege einhält, in die jene Tür nicht eingeschaltet ist. Für seine Klugheit sprach auch der Umstand, daß er nicht gegen die Scheiben getobt hatte, sondern sie klüglich zu meiden wußte. Würde ich ihn bei meiner Rückkehr tot auf dem Boden gefunden haben, so hätte ich mich, weiß Gott, nicht gewundert, sondern wohl nur gesagt: „Na, es ist ja ein Weber, der muß sich doch den Kopf an den Fenstern einrennen."

Was sollte ich nun tun? Den Vogel fangen? Dabei hätte ich vermutlich alle Gefiederten in arge Unruhe gebracht und den Flüchtling selber vielleicht noch schwer verletzt. Darum sagte ich mir nun: „Der Weber hat seine Klugheit schon erwiesen; er wird ihr wohl auch weiterhin Ehre machen."

So begann ich denn ruhig die Käfige zu reinigen und ihre Insassen mit Futter zu versehen. Es dauerte denn auch gar nicht lange, so saß der Weber auch schon auf dem Käfig, der seinen Behälter trägt. Als ich nun in dem das Futter erneuerte und er sah, wie sich seine Käfiggenossen darüber hermachten, hatte er auch schon eins, zwei, drei die offene Schiebetür gefunden und war dergestalt besorgt und aufgehoben.

Schlußfolgerung: Fangt nicht jeden Vogel, der aus seinem Käfig entwichen ist, sondern fragt euch erst: ist nach der Art und nach der individuellen Veranlagung des Flüchtlings zu erwarten, daß er von selber in den Käfig zurückkehrt? Man darf seine Erwartungen in der Hinsicht getrost hochspannen, ist es mir doch schon wiederholt vorgekommen, daß frischgefangene Rothänflinge in einem kapellenartig großen und hohen Bodenraum ganz von selbst in ihren winzigen Käfig zurückkehrten. Jedenfalls berührt es auch immer komisch, wenn ich höre, in irgendeiner befreundeten Familie sei Bruder Ernst und Karl, der Vater und noch die Küchenfee Marie aufgeboten worden, um einen Zeisig oder Stieglitz zu fangen, der nach einem Stündchen schon ganz zweifellos aus eigenem Antrieb in seinen Käfig zurückgekehrt wäre.

Der wackere Weber war also bei seinem Ausflug nicht zu Schaden gekommen, wohl aber ein biederer Dompfaff. Auf den machte die Tatsache, daß der Weber sich auf seinen Käfig setzte, einen so furchtbaren Eindruck, daß er sich eilends alle Schwungfedern ausschlug.

Wieder einmal! Denn dieser Gimpel gehört zu den Unglücksvögeln, die alle paar Wochen einmal ordentlich toben müssen. Dies Mal ist der Mondschein daran schuld, nächstes Mal der Rosakakadu, der nächtlicherweile seine Flügel ordentlich ausstäubte, und dann wieder ein Leinfink, der in dem Dunkel, das für ihn noch keine undurchdringliche Finsternis bedeutet, hin- und herzufliegen begann.

Für mich gibt es keine ärgerlichere Begebenheit, als das Zerflattern meiner Pfleglinge. Darum wundere ich mich immer wieder, in Fachzeitschriften so wenig davon zu lesen, zumal ich bei meinen ornithologischen Freunden immer wieder Zeuge des gleichen Mißgeschicks werde. So fasse ich mir denn gar nicht so selten an den Kopf und frage mich: Bist du denn wirklich solch ein Esel, daß du allein in einem Menschenalter keine Abhilfe für das Ungemach fandest?

Die Liebhaber, die zwei oder drei Pfleglinge betreuen, sind ja in der Hinsicht sehr viel besser daran. Sie können ihre Vögel zur Nacht gut zudecken, wodurch die Gefahr nächtlichen Tobens sehr verringert wird. Bei meinen zwanzig Käfigen, kleinen und größeren und recht großen, läßt sich das aber nicht gut durchführen, fällt es mir doch schon sowieso schwer genug, meinen Berufspflichten und anderen Obliegenheiten Zeit abzuringen, während deren mich meine Gefiederten schlechterdings beanspruchen müssen.

Dafür besitze ich aber in dieser Hinsicht auch so viel Erfahrung, daß es mir ein leichtes ist, jene Vögel, die zur Nachtzeit toben, in eine bestimmte Reihenfolge, eine Art von Rangordnung, zu bringen. Am schlimmsten treiben es die Gimpel, dann kommen Zeisige, Stieglitze, Buchfinken und Hänflinge. Auch alle fremdländischen Verwandten des Zeisigs und Girlitzes sind in der Beziehung mehr oder

minder belastet. Dagegen macht man nur sehr selten die Erfahrung, daß gesellig siedelnde Prachtfinken, Weber und ähnliche mehr auf die Weise zu Schaden kommen. Ob wir das daraus erklären dürfen, daß sie auch im Freileben an Störungen gewöhnt sind?

Dies nächtliche Toben wird auch durchaus nicht durch jede Störung ausgelöst. Es tritt nur dann ein, wenn die Vögel erschreckt werden und der Reiz die Reflexbewegung ohne jede Kontrolle auslöst. Erscheine ich in dem Zimmer mit einer brennenden Lampe, um längere Zeit an den Bücherregalen zu

Königswitwe.

hantieren, so darf ich in den allermeisten Fällen mit dem Bewußtsein hinausgehen, es werde schon nichts geschehen, da die Vögel geistig Herr der Lage blieben. Löste sich dagegen die Sitzstange eines Papageis aus ihrem Verbande, so daß der Vogel flügelschlagend aus dem Schlafe auffuhr, so kann ich mich auf etwas Schlimmes gefaßt machen.

Zu guter Letzt möchte ich noch ein Kapitel berühren, das die Vogelliebhaber besonders zu beschäftigen pflegt, das Kapitel: Vogelhändler. Es gibt wohl wenig Menschen, auf die soviel geschimpft wird, und doch kann ich mich des Mitgefühls mit ihnen nicht entschlagen, sage ich mir doch bei solchen Vorwürfen immer wieder: Das ist ja alles recht gut, aber ich selber möchte auch nicht Vogelhändler sein. Gerade in dieser Zeit machte ich wieder die Erfahrung, daß vieles, was man ihnen zur Last legt, letzten Endes an den Verhältnissen liegt. Wieviel Vogelarten gibt es nicht, auch unter den Ausländern, die sich gar nicht allzu schwer eingewöhnen lassen, ohne doch recht zu dauern. Wenn der Vogelhändler sie abgibt, sehen sie noch ganz lebensfähig aus, aber in sieben, acht Wochen ist ihre Lebensuhr abgelaufen. Sie würde stillstehen, ob sie bei dem Händler oder bei dem Liebhaber weitergegangen wäre? Sollte nun der Händler solche Stücke zurückhalten, weil er das selber ganz genau weiß? Das wäre doch sicherlich etwas viel verlangt. Ich persönlich bin davon überzeugt, daß manche Transporte fremdländischer Kleinvögel, die bestimmten Arten angehören, mitunter schon nach einem Jahr aus dem Buch der Lebenden gestrichen sind.

Nicht zu billigen ist es aber, daß die Verkäufer oft bewußterweise Schein und Wesen miteinander verwechseln, von dem ersten viel Wesens machen, das letztere aber kaum beachten. Wer hätte es nicht schon erlebt, daß ein Händler ihm nach der Bestellung noch eigens darauf aufmerksam machte, die gewünschten Vögel hätten keinen Schwanz oder besäßen kahle Kopfstellen, während ihm in anderen Fällen solche Tiere ohne Bedenken zugesandt wurden, denen auch ein Laie ansehen mußte, daß sie einem Magen-Darmkatarrh verfallen seien, der ihren Tod in Kürze herbeiführen werde, oder daß sie sich im Anfangsstadium der Auszehrung befänden, gegen die auch kein Kraut gewachsen ist. Solches Gebahren ist doch sinnlos, denn ein gesunder Vogel ohne Schwanz- oder Kopffedern ist immerhin ein wesenhafter Besitz, während jene Tiere trotz ihres vollständigen Gefieders nur für den Bedeutung haben, der auf ihre Bälge ausgeht.

Jedenfalls würde das Verhältnis zwischen Liebhaber und Vogelhändler sich wohl bedeutend bessern lassen, wenn auch die Käufer einsehen wollten, mit welchen Schwierigkeiten man bei dem Vertrieb so leicht verletzlicher, nur allzu sterblicher Waren rechnen muß. Sie würden dann nicht in jedem Einzelfall schon von vornherein den Gedanken ablehnen, Verluste tragen zu helfen, die das unvermeidliche Los eines Handelsstandes sind, ohne den wir uns doch schlechterdings nicht behelfen können.

Vogelbilder aus Transvaal.

Von F. E. O. Mörs.

(Nachdruck verboten.)

Königswitwe und Granatastrild.

In meinen Mitteilungen über die Dominikanerwitwe in Heft 15 habe ich es unterlassen, das Jugendgefieder des Helenafasänchens und der Dominikanerwitwe näher zu beschreiben. Ich will zunächst das Versäumte nachholen.

Das Gefieder des jungen Helenafasänchens ist dunkelgraubraun ohne Wellenzeichnung und ohne das Rot am Unterkörper. Die Unterschwanzdeckfedern, die beim alten Männchen schwarz und beim alten Weibchen braungrau sind, zeigen bei allen Jungen ohne Unterschied des Geschlechtes eine gleichmäßige dunkelgraue Färbung. Der Schnabel ist schwarz, die Wachshaut mit den Wachshautdrüsen ist weiß.

Das Gefieder der jungen Dominikanerwitwen ist dem der jungen Helenafasänchen beinahe gleich, da auch ihre Färbung dunkel braungrau ist. Schnabel und Wachshaut stimmen mit dem der jungen Helenafasänchen völlig überein. Der kurze Schwanz ist bei beiden Arten wie rechtwinklig abgeschnitten.

Die jungen Dominikanerwitwen sind von den jungen Helenafasänchen anfänglich nur an den dickeren Köpfen zu unterscheiden, bis mit zunehmendem Alter die bekannte Färbung jeder Art immer mehr hervortritt.

Die Züchtung von Dominikanerwitwen in der Gefangenschaft ist wohl kaum möglich, da es sehr schwer sein wird, den Helenafasänchen eine ihrer Natur entsprechende Nistgelegenheit zu beschaffen.

Die Nester der Granatastrilde stehen gewöhnlich 5—6 Fuß (1,25—1,50 m) hoch über dem Boden in dicht belaubten Büschen. Meist wird die Sonnenseite von einzeln- oder freistehenden Büschen zur Anlage des Nestes gewählt. Das Nest selbst ist aus feinen Gräsern überwölbt gebaut, im Innern mit feinen Wurzelfasern weiter ausgebaut und mit einigen Federn ausgepolstert. Die Eier sind weiß, in der Form denen des Helenafasänchens gleich, aber sie sind etwas größer, während die Eier der Königswitwe, welche in den Nestern der Granatastrilde vorkommen, etwas runder sind, also nicht die spitze Eiform der Granatastrildeier haben. Die flüggen Jungen beider Arten zeigen die gleiche Gefiederfärbung. Die ganze Unterseite ist braungelb, die Oberseite braun, Schnabel und Füße sind schwarz. Bei beiden Arten ist die Wachshaut mit den Wachshautdrüsen hell kornblumenblau. Der kurze Schwanz ist auch bei diesen beiden Arten wie rechtwinklig abgeschnitten.

Die jungen Königswitwen sind nur an der aufrechteren Haltung und den dickeren Köpfen zu erkennen, und sie erscheinen durch die dichtere Befiederung etwas größer als junge Granatastrilde.

Die Verfärbung geht nach dem Flüggewerden schnell vor sich und sie gleichen dann im Gefieder ganz dem Weibchen der Königswitwe. Die Züchtung der Granatastrilde und der Königswitwe müßte in der Gefangenschaft schon eher möglich sein, da eine größere Voliere leicht den Bedürfnissen dieser Vögel entsprechend eingerichtet werden kann.

Ich möchte auch ein paar Worte über die Fütterung dieser Vögel in der Gefangenschaft sagen. Nach meiner Ansicht ist die Verfütterung der in Deutschland käuflichen „japanesischen" Hirse ganz ungeeignet. Importierte Vögel wollen auch mit den Sämereien ernährt werden, die in der Heimat ihre Nahrung bilden und dort gewachsen sind, da diese Sämereien die Bestandteile und Salze enthalten, welche die Vögel benötigen. Für südafrikanische Vögel ist südafrikanische Hirse, hier im Lande „Manna" genannt, nötig. Als Insektenfutter gibt man am besten ein Gemisch von hartgekochtem, feingehacktem Hühnerei und Heuschreckenmehl zu gleichen Teilen. Wenn dieses Gemisch zweimal in der Woche mit einer Prise Kalkphosphat und Eisenphosphat bestreut wird, gedeihen die Vögel vorzüglich.

Photographische Vogelstudien.

Von G. Wolff-Schötmar.

(Mit 4 Abbildungen, nach phot. Aufnahmen des Verfassers.)

(Nachdruck verboten.)

Seitdem uns Schillings gelehrt hat, Wild in freier Bahn, inmitten der Natur im photographischen Bilde festzuhalten, hat die Naturphotographie mächtigen Aufschwung genommen. Zahlreiche, seitdem erschienene Bücher sind mit Bildern nach photographischen Aufnahmen geschmückt. Über die Bedeutung des photographischen Naturbildes braucht an dieser Stelle kein Wort verloren zu werden. Ebenso wichtig wie die photographische Aufnahme irgendeines Naturobjektes muß aber für den Photographen die Beobachtung derselben sein.

Von allen photographischen Naturstudien dürfte aber keines so interessant und lehrreich sein, wie das der heimatlichen Vogelwelt. Reichlich 20 Jahre befasse ich mich in meinen Mußestunden nicht nur mit der Beobachtung, sondern auch mit der photographischen Aufnahme hiesiger Vögel. Ein paar Proben meiner Tätigkeit möchte ich hier niederlegen, eine große Anzahl weiterer Aufnahmen findet der interessierte Leser in meinem Büchlein: „Vögel der Heimat", mit 66 Naturaufnahmen (Verlag G. Schade, Bad Sulzuflen). — Ich will an dieser Stelle nicht ermüden mit Schilderungen all' der Mühen und Beschwerden, all' der Enttäuschungen und Zufälligkeiten, die der photographischen Aufnahme unserer allezeit allzu lebendigen Vogelwelt entgegenstehen. Nur das eine sei hier gesagt, wer nicht jene, alle Hindernisse überwindende Liebe und Geduld mitbringt, wird schwerlich in die tiefsten Geheimnisse des Vogellebens eindringen und zu befriedigenden Ergebnissen in der photographischen Tätigkeit gelangen. Allerdings ist das Verhalten der einzelnen Vögel wie ganzer Arten dem Beobachter und Photographen gegenüber recht verschieden, und von vornherein läßt sich keinesfalls mit Bestimmtheit sagen, so oder so wird sich der Vogel betragen. Unsere Amseln z. B., die an sich gewiß doch keineswegs scheu sind, benehmen sich am Nest dem Beobachter und seiner Kamera gegenüber oft derartig ängstlich und besorgt, daß man annehmen muß, sie würden eher bereit sein, die Brut zu verlassen, als sich dem Objektiv gegenüber halbwegs still zu verhalten. Wieder andere Amseln lassen sich weder durch den dicht vor ihrem Nest offen aufgestellten Apparat noch den unverdeckt daneben sitzenden Beobachter irgendwie in ihrem Brut- bzw. Fütterungsgeschäft stören.

Wie verschieden benehmen sich gar unsere Rotkehlchen! Was gehört bei manchen Pärchen dazu, ihre übergroße Ängstlichkeit zu überwinden. Mit lautem „Schnickern" fliegen sie dauernd in der Umgebung des Nestes umher, suchen am Boden eine fette Raupe, tragen sie eine Weile im Schnabel herum, fliegen mit der Beute fort, verzehren sie und schauen aus größerer Ferne prüfend zu ihrem Nest hinüber. Wie ganz anders verhielt sich ein Rotkehlchenpärchen, das im hiesigen Park in kaum 1 m Höhe in einer Baumhöhlung ein Nest voll Junge zu betreuen hatte. Weder kümmerten sich die alten

Vögel um den in $1^1/_2$ m Entfernung am Nest frei aufgestellten Apparat, noch fragten sie etwas nach meiner Gegenwart, auch meine Bewegungen und Hantierungen waren für sie keine Veranlassung, vom Nestrand fortzufliegen. Selbst die nach dem Vogel ausgestreckte Hand konnte kaum eine Veränderung in der Stellung bewirken. — In den letzten Jahren nisteten wiederholt Rotkehlchen in Mauerlöchern des hiesigen Parks und gaben mir Gelegenheit, sie beim Fütterungsgeschäft im Bilde festzuhalten. Auch hier erlebte ich immer wieder, wie verschieden doch die fütternden Vögel in ihrem Benehmen sein können, ohne daß es mir gelungen wäre, die Ursachen für das verschiedenartige Verhalten anders als mit dem verschiedenen „Charakter" der Vögel zu erklären.

Als ich eines Tages noch damit beschäftigt war, meinen Apparat in der Nähe eines Rotkehlchennestes aufzustellen, kamen schon die alten Vögel mit Futter im Schnabel herbeigeeilt, setzten sich ohne Bedenken auf den äußeren Nestrand und reichten den Jungen das Futter dar. Die sich krümmenden dicken grünen und braunen Raupen im Schnabel haltend, so saßen die alten Vögel dicht vor mir, bald auf mich und das große Auge der Kamera, bald dagegen auf die bettelnden zarten Jungen blickend. Unter diesen Umständen bot natürlich die photographische Aufnahme der Vögel keine Schwierigkeit (Abb. nebenstehend). Die Dreistigkeit der Vögel veranlaßte mich, einen Schritt zu tun, der an sich natürlich kaum gutzuheißen ist. Mit einem platten Steine verdeckte ich bis auf einer kleinen Öffnung den Zugang zum Neste. Der fütternde Vogel kam angeflogen, stutzte einen Augenblick und rüttelte vor dem Nistplatze. Plötzlich entdeckte er die schmale Spalte, schlüpfte hindurch und füttert von nun ab unbekümmert die Jungen weiter.

Rotkehlchen am Nest mit Jungen.

Als ich vor Jahren in einem Treibhause in einer Platane das Nest eines Zaunkönigs mit Jungen fand, beschloß ich, mein Heil zu versuchen. Ein paar der langen Blätter der Pflanze bedeckten die Öffnung des Nestes, ich bog sie sorgsam zurück, um so besser mit dem Objektiv in das Nest blicken zu können. Es schien äußerst schwierig, den Apparat selbst zu verbergen, während ich hoffte, von einem sicheren Versteck aus den Fernauslöser benutzen zu können. Noch war ich am Überlegen, als plötzlich ein Zaunkönig in der Türöffnung erschien, auf die nächste Pflanze flog und dann geradeswegs auf das Nest zueilte und fütterte. Kaum war der Vogel fortgeflogen, da stellte ich in Eile meinen Apparat auf, befestigte den Auslöser, schon erschien ein zweiter Zaunkönig und eilte ebenso unbekümmert zum Nest, von dem ich höchstens 2 m entfernt stand. So war die photographische Aufnahme nicht sehr schwer, es galt nur, den auf den Nestrand fliegenden Vogel so früh im Bilde festzuhalten, ehe er teilweise in dem großen Nest verschwand (Abb. S. 302). Nach ein paar, wie ich glaubte, gelungenen Aufnahmen zündete ich mir in aller Seelenruhe eine Zigarre an, rief den Gärtner herbei, reichte auch ihm eine Zigarre und beide standen wir an dem freistehenden Apparat dicht bei dem Nest. Die alten Vögel nahmen anscheinend wenig oder gar keine Notiz von uns. — Daß sich auch Zaunkönige anders verhalten, habe ich wiederholt erfahren und noch im letzten Sommer zu beobachten Gelegenheit gehabt. Als ich versuchte, Zaunkönige bei der Fütterung zu beobachten und zu photographieren, war ich gezwungen, die Kamera durch Zweige und Blattwerk vollständig zu verdecken und unter Gebüsch zu verstecken. Aber auch jetzt nahten die Vögel nur unter größter Vorsicht und mit äußerster Scheu dem Neste, das in einer Baumhöhlung unter Efeugerank versteckt war. Die Vögel flogen den Baum von der Rückseite an, schlüpften behend um den Baum durchs Gerank und Blattwerk und verschwanden urplötzlich im Nestloch. Da die Nisthöhle nicht sehr günstig belichtet war, mußte ich schließlich auf eine gute Aufnahme völlig verzichten. Nach dem Füttern flogen die Zaunkönige stets auf den Boden und suchten unter dem Laubwerk nach kleinem Getier, um mit diesem auf dem geschilderten Wege unter größter Vorsicht und Zurückhaltung zu dem Neste zu fliegen.

Jedem aufmerksamen Beobachter der Vogelwelt ist das sonderbare Gebahren bekannt, das unsere Grasmücken zeigen, wenn man sich dem Nest mit Jungen nähert. Sie stürzen sich aus dem Gebüsch dicht vor unsere Füße, laufen wie gelähmt am Boden umher, sonderbar klagende Töne erklingen lassend, und das alles zu dem Zweck, den Störenfried von dem Neste fortzuziehen. Nicht selten locken die Grasmücken durch ihr Klagegeschrei, wenn sie ihre Brut bedroht wähnen, alle benachbarten Vögel herbei, um so den Störenfried leichter abwehren zu können. Ganz im Gegensatz zu dem hier geschilderten Verhalten steht, was ich vor einer Reihe von Jahren an dem Nest einer Zaungrasmücke beobachtete. Ein Nest mit Jungen stand in dem dürren Gezweig

einer von Efeugerank umschlungenen Tanne ein paar Fuß hoch vom Boden und etwa $1^1/_2$ m weit von einer hohen Drahtumzäunung. Nur mit vieler Mühe konnte ich den photographischen Apparat wegen des beschränkten Raumes aufstellen, für mich blieb zur Beobachtung und Bedienung der Kamera kein anderer Platz als am Boden zwischen den Beinen des Stativs. Zu meinem größten Erstaunen und meiner nicht geringen Freude kamen die alten Grasmücken bald von rechts, bald von links mit Futter im Schnabel heran und reichten es den Jungen (Abb. S. 304), ließen sich dicht am Nest nieder, um die Kotballen der Kleinen aufzusuchen, sie zu verschlucken oder auch fortzutragen, und längere Zeit ließ sich das Weibchen dicht vor mir auf den Jungen nieder, um sie zu wärmen. Eine solche Vertrautheit von Grasmücken habe ich allerdings in vieljähriger Beobachtungszeit nicht wieder erlebt.

Zaunkönig auf dem Nestrand vor der Fütterung (s. S. 301).

Am nahen Ufer der Boga, im hohen Schilf und dichten Weidengestrüpp geben alljährlich eine größere Anzahl Sumpf- und Teichrohrsänger ihr munteres Konzert zum besten, und manche Stunde verbringe ich alljährlich in ihrer Nähe, zieht mich doch das Leben und Treiben, der eigenartige Gesang und vor allem das Brut- und Fütterungsgeschäft immer wieder von neuem an. Dabei kommen nicht nur Auge und Ohr fast stets auf ihre Kosten, sondern auch manches Bild konnte ich auf der Platte festhalten. Besonders angetan hat es mir stets der reizende Teichrohrsänger mit seinem lustigen Spottgesange und seinem tiefnapfigen Nest, an ein paar Rohrstengeln über dem Wasser hängend. Bald hängt der fütternde Vogel mit weit gespreizten Beinen an einem Halme und reicht das Futter hastig hernieder, bald sitzt der Vogel behäbig auf dem Nestrande (Abb. S. 305) und schaut beruhigt auf die Kleinen in der Mulde, bald erscheinen beide alte Vögel, fast gleichzeitig von verschiedenen Seiten kommend, zur Fütterung, bald läßt sich das Weibchen auf den wärmebedürftigen Jungen nieder. Währenddessen erscheint das Männchen mit Futter und reicht es dem Weibchen, das sich wenig erhebt und sie den Jungen beut.

Immer neue, abwechslungsreiche und reizende Bilder boten sich dem Auge dar, wenn ich mich dem Studium der Vogelwelt widmete, und manche gute photographische Aufnahme aus dem intimsten Leben der Vögel konnte ich gleichzeitig mit nach Hause tragen.

Inmitten der Stadt Frankfurt a. M. brütende grünfüßige Teichhühner (Gallinula chloropus *(L.)*) und andere Vögel.

Von Wilhelm Schreitmüller.

(Nachdruck verboten.)

Es ist Tatsache, daß manche Vogelarten, die in früherer Zeit die Anlagen und Gärten der Städte, u. a. in der Nähe menschlicher Wohnungen liegende Plätze, stets streng gemieden haben, d. h. an solchen Orten nie brüteten, sich im Laufe der Jahre doch dazu bequemten und sich den gegebenen Verhältnissen anpaßten, um sich auch an solchen Orten Nistplätze auszusuchen und daselbst zur Fortpflanzung zu schreiten.

So beobachte ich z. B. seit dem Jahre 1919 am Teich in den Hohenzollernanlagen, jetzt „Platz der Republik" zu Frankfurt a. M. ein Paar grünfüßige Teichhühner (Rotbläßchen) (Gallinula chloropus *(L.)*), welches daselbst regelmäßig alljährlich Junge erbrütet und aufzieht. Die alten Vögel führen während des Sommers ihre kleinen, schwarzen Kinder auf dem Teiche umher, wo letztere öfter auf den Algenwatten und Wasserrosenblättern umhertrippeln. Die Mutter zieht dabei ganze Büschel Algen, Hornkraut u. a. Wasserpflanzen nach oben auf das Wasser und wendet diese nach allen Seiten hin um, während die Jungen die dadurch zum Vorschein kommenden Libellen-, Wasserkäfer-, Mücken- u. a. Larven, Insekten, Würmer, Egel, Schnecken u. a. Getier geschickt fortpicken. Daß das „Rotbläßchen" sich auch an kleineren Anlagenteichen inmitten großer Städte niederläßt und daselbst zur Fortpflanzung schreitet, dürfte wohl nicht zu den häufigsten Fällen zählen*).

Im übrigen sind diese Teichhühner absolut nicht scheu (ebenso wie die Stockenten), ja sie holen ihnen zugeworfenes Futter sofort weg, wobei sie bis auf wenige Meter Entfernung an das Publikum herankommen.

Ein anderer, seltener Brutvogel inmitten von Städten ist der hübsche Teichrohrsänger (Acrocephalus streperus *Vieill.)*, welcher für gewöhnlich Teichränder mit Schilfbestand u. dgl. einsame und ungestörte Orte zum Aufenthalt und Anlage seines Nestes wählt. Auch dieser Vogel wird in hiesiger Gegend immer mehr „Anlagen- und Gartenvogel". So brütete beispielsweise ein Paar dieser Art seit 1922 ständig in den Anlagen des hiesigen zoologischen Gartens, wo es sein Nest jedesmal in einer etwa 30 Meter vom Teich entfernten, dichten Gruppe von Bambusa medake errichtet hatte, von wo aus es ständig seinen Gesang ertönen ließ.

Auch der Zaunkönig (Anorthura troglodytes *(L.)*) ist in Frankfurt am M. häufiger Anlagen- und Parkbrüter. So beobachtete ich im zoologischen Garten verschiedene Nester dieser Art, ein solches auch im sogenannten Futterhof desselben Institutes, wo dieses in dem Gestänge einer halbverfallenen

*) Dieses Jahr sind die Teichhühner bisher nicht eingetroffen, anscheinend abgeschossen worden. Der Verf.

Holzlaube saß, vor welcher ein großer Haufen dürres Reisig lag. Ich habe mich längere Zeit an den ausgeflogenen Jungen erfreut, welche den Reisighaufen späterhin als Nachtquartier benutzten.

Auch in einer Steingrotte am Teich der Hohenzollernanlage habe ich die Art brütend angetroffen. (1922). usw.

Stockenten (Anas boschas (*L.*)) sind in Frankfurt a. M. bekannte Brutvögel der Anlagenteiche u. a. Gewässer. Ich beobachtete brutführende Tiere dieser Art wiederholt im Palmengarten, Hohenzollernanlage (Teich) und auf dem Teich in den Osthafenanlagen usw.

Die hübsche, kleine Zwergrohrdommel (Ardetta minuta (*L.*)) hat sich während der letzten Jahre an der Peripherie Frankfurt a. M. ebenfalls eingefunden und gebrütet. So konnte Dr. Schnurre-Frankfurt a. M. wiederholt Nester dieses Vogels auf der Insel im Teich der Osthafenanlagen feststellen und die Jungtiere beringen. Wie mir betr. Herr mitteilte, hat er daselbst auch ein Nest dieser Art, in einem Busch von Forsythia suspensa angetroffen, was als anormal zu gelten hat.

Im Jahre 1923 brachten zweimal Leute junge Zwergrohrdommeln (die von Dr. Schnurre beringt worden waren), welche sie in den Osthafenanlagen gefunden hatten, nach dem zoolog. Garten.

Im Jahre 1922 konnte ich ferner in den Hohenzollernanlagen auch den Wendehals (Jynx torquilla (*L.*)) als Brutvogel feststellen. Das betr. Paar brütete in einem Nistkasten, welcher auf einer Robinie (fälschlich „Akazie" genannt) angebracht war. Ich konnte beobachten, daß die betr. Brut auch hochkam und ausflog. Schon vor der Brutzeit ließ das Männchen tagsüber oft seinen monotonen Ruf erschallen, so daß ich auf das Paar aufmerksam wurde. Die Vögel blieben während der folgenden Jahre jedoch weg*).

Auch die Amsel (Turdus merula *L.*) und die Singdrossel (Turdus musicus (*Rchw.*)) sind häufige Brutvögel in den Anlagen Frankfurts a. M. Namentlich letztere hat während der letzten 10 Jahre als Brutvogel in den Anlagen, Gärten und Parks entschieden zugenommen, während erstere schon früher häufig als solcher auftrat.

Anscheinend nistet auch die Weidenmeise (Parus salicarius (*Brehm.*)) vereinzelt in hiesiger Gegend, denn ich sah vor einigen Jahren nahe Frankfurt a. M.-Rödelheim ein Pärchen dieser Art, welches sich mit seinen flüggen Jungen auf Bäumen und Sträucher an der Nidda (Fluß) umhertrieb. Außer im genannten Falle habe ich die Weidenmeise in nächster Nähe Frankfurts a. M. nicht beobachtet; wohl aber sah ich im Jahre 1916 diese Art in den Schilfbeständen zu Kempten a. Rhein, wo ebenfalls alte Vögel mit ihren flüggen, noch nicht ausgefärbten Jungen öfter zu beobachten waren.

Das Rotkehlchen (Erithacus rubecula (*L.*)), welches in Frankfurt a. M. häufig überwintert, habe ich verschiedentlich brütend angetroffen. So war mir 3 Jahre nacheinander in einer mit Brom-

*) Dieses Jahr (1925) wieder eingetroffen (zwei Paare). Der Verf.

beer- u. a. Gesträuch bestandenen Felsengrotte am Teich der Hohenzollernanlagen der Nistplatz eines Pärchens bekannt. Auch zwischen den Felsenpartien des Aquariums (außen) des „Zoo" zu Frankfurt a. M. brütete während der Jahre 1922 und 1923 ein Paar dieser Art regelmäßig. Weitere Brutplätze fand ich im hiesigen Palmengarten und auf einem Friedhof vor.

Den Gimpel (Pyrrhula pyrrhula germanica (*Brehm.*)) traf ich nur vereinzelt als Brutvogel an. Ein Nest fand ich 1913 in einem Busch im hiesigen Palmengarten, das aber leider geräubert wurde. Im anderen Falle stellte ich ein brütendes ♀ im Jahre 1922 auf einem Ahornbaum unweit der Zeppelinallee fest. Die Jungen dieser Brut kamen glücklich zur Entwicklung und flogen auch aus.

Der Weidenlaubvogel (Phylloscopus rufus (*L.*)) ist hier ebenfalls ziemlich häufiger Brutvogel. Im zoolog. Garten, Palmengarten, Hohenzollernanlagen auf Friedhöfen ist er ständig anzutreffen.

Zum Schluß möchte ich noch den Girlitz (Serinus canaria serinus (*L.*)) erwähnen, den ich seit 1910 ebenfalls verschiedentlich als Brutvogel antraf. Brutplätze: Hohenzollernanlagen (auf Fliederbusch), in einem Vorgarten der Rheinstraße (auf Weißdornbusch), im Palmengarten (auf Prunus padus *L.*). Im zoolog. Garten sah ich ferner im Jahre 1923 ein Pärchen, welches vier ausgeflogene Junge fütterte, die wohl auch daselbst erbrütet worden waren. Im übrigen tritt diese Art als Brutvogel in hiesiger Gegend häufiger auf, als vielfach wohl angenommen wird. Ich habe im vorstehenden nur solche Brutvögel angeführt, welche für gewöhnlich inmitten großer Städte nur selten beobachtet werden (außer Amsel, Drossel und Laubvogel).

Mein Kuckuck Max.

Von W. Blohm.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Die Pause war zu Ende, und Max saß wieder auf seinem Stein vor dem Fenster. Er hatte die Geschichte mit dem Fensterglas vergessen und mußte von neuem lernen.

„Also Kinder, hört mal zu! Max frißt unheimlich viel; ihr müßt mir alle mithelfen! Fangt mir heute nachmittag Fliegen, drückt sie tot und bringt sie morgen in kleinen Schachteln mit! Das könnt ihr Mädels gut machen. Und ihr Jungens, ihr sucht die Knicks ab. Dort findet ihr an Schlehen große Raupennester. Schneidet die Zweige ab und bringt mir morgen die ganzen Nester mit, hört Ihr wohl? Sonst muß ich den Max totmachen!"

„Nein, nicht totmachen, wir bringen morgen ganz gewiß Fliegen mit", versprechen die Mädchen, und: „Ich weiß Raupen, an Crugmann seinem Knick", „Ich an unserer Hauskoppel", so riefen die Jungens. Na ja, die Aussichten waren gut. Vorsichtshalber ging ich noch in die beiden oberen Klassen und bot auch da alles auf. Meine Zehnjährigen fragten noch: „Was machst du nun, wenn du heute nachmittag an den Teich fährst?"

„Dann nehme ich den Max mit!"

„Und morgen? Bringst du ihn auch wieder mit?"

„Ganz gewiß!"

„Und wenn wir Schulfest haben?"

„Wenn er noch lebt, dann kommt er mit zum Schulfest!"

„O, dann laß mich ihn tragen, laß mich ihn tragen!"

„Ich trag den Eimer; ich, ich, ich!"

„Das wollen wir schon sehen! Jetzt wird erst mal gerechnet!"

Und während die Kinder arbeiten, schiebe ich dem Max schon wieder Fliegen und Larven in den Rachen, den er unter lautem Gezwitscher, wie es junge Singvögel hören lassen, aufreißt.

Nach Schulschluß besorgte ich mir einen kleinen Korb, der mit einem Stück Gardinenstoff zugebunden wurde. Darin verpackt kam Max in den Rucksack und wanderte mit zum Teich. Die Dose mit dem noch vorhandenen Futter kam natürlich auch mit. Als ich in meiner Fischerhütte angelangt war, war das erste, den Max zu füttern.

Zaungrasmücke füttert die Jungen (s. S. 302).

Der Vorrat war bald aufgezehrt, und nun konnte ich selber auf die Suche nach Atzung gehen. Vorher aber richtete ich dem Vogel eine hübsche Buchenlaube vor dem Fenster meiner Werkstatt her; und als er hier ebenfalls die Undurchdringlichkeit der dünnen Scheibe erkannt hatte, machte er sich's auf einem Stück Feuerholz bequem; denn dünne Äste waren noch keine Sitzgelegenheit für ihn.

Bald hatte ich eine Anzahl Raupen zusammen; aber Kinners und Leute, wenn das so weitergehen soll, dann weiß ich das Ende voraus. — Dabei sitzt auf der Insel auch noch einer auf der Lauer und wartet auf mich. Nachdem der Kuckuck zufriedengestellt war, mußte ich schon wieder auf den Froschfang, dann die feinmaschigen Kästen aufnehmen, um zu sehen, was sich an Stichlingen gefangen hatte. Für mich selber hatte ich noch keine Minute erübrigen können.

O, ihr lieben „Stubengelehrten", die ihr sorgfältig das „Material" sichtet, um hernach alles sauber zusammenstellen zu können: dort steht das und das von dem und dem Tier, der hat die Erfahrungen gemacht usw., ihr habt keine Ahnung, wie viel Plage man hat, wenn man selber sehen will. Aber ich gönne euch eure Gelehrsamkeit von Herzen und steure meinen Kahn zu meinem Fedor hinüber, wenn auch mit hungrigem Magen . . .

Als ich zurückkomme, schreit Max schon wieder; Himmel, kann der einpacken! Und das geht bis in den Abend hinein, und der Tag ist im Juni so endlos lang! . . .

Am nächsten Morgen bin ich rechtzeitig in der Schule. Tatsächlich bringen einige Mädel Streichholzschachteln mit, in denen ein Dutzend und mehr toter Stubenfliegen untergebracht sind. Das ist für den Max ein Happs. Doch da kommen meine Jungens auch schon mit Raupennestern. Zum Glück sind in diesem Jahre die Raupen vom Ringelspinner recht häufig. Im vorigen Jahre waren alle Büsche des Spindelbaumes mit der Evonymellaraupe derart besetzt, daß sämtliche Sträucher kahl waren und nach der Theorie in diesem Jahre tot sein mußten. — — Hat sich was mit der Theorie! In der Praxis hatte der Spindelbaum in diesem Jahre nicht eine Raupe, sah frischgrün aus und hat einen Fruchtansatz, daß die Büsche blutrot aus unseren Knicks hervorleuchten, die Natur weiß es doch noch immer besser als alle Gelehrten zusammen . . .

Wohin nun mit den Raupennestern? Kurz entschlossen schmückte ich ein Fenster der Klasse damit, schickte meinen Guschi aus, daß er mir noch schnell vor Schulanfang frische Zweige vom Schwarzdorn hole; denn die Raupen wollten doch auch fressen, bis sie verfüttert wurden.

Das Ganze sah sehr hübsch aus: zwischen dem grünen Gezweig die silberfarbenen Nester mit den Raupen vom Ringelspinner, und in der Mitte, auf einem Stein mit dem Abdruck eines Ammoniten, wie sie häufiger in der nahen Kiesgrube im Nachbardorfe Ritzerau gefunden werden, thronte der Kuckuck Max. Meine Kinder fanden das höchst interessant; was meine hochlöbliche Behörde gesagt hätte, wenn sie gerade einmal zu einer Besichtigung gekommen wäre, weiß ich nicht. —

Nun mal schnell füttern; denn Max verfolgt alle meine Bewegungen höchst teilnahmsvoll durch Drehen des Kopfes und Öffnen des Schnabels. Ohne Frage, er kennt mich schon und weiß, daß sein Leben von meiner Hand abhängt. Da nähert sie sich mit der Pinzette, die eine Raupe gepackt hält. Piep, piep, rin in den Schnabel! Eins, zwei, drei — meine Kinder zählen alle mit —, vier, fünf, sechs, sieben . . . noch mehr? O weh, o weh, zwanzig fast ausgewachsene rauhbehaarte Raupen sind nötig, bis er die Nahrungsaufnahme durch Schlenkern mit dem Kopfe verweigert, so daß Nummer einundzwanzig gegen die Scheibe fliegt. „Junge, der kann aber freeten!" meint entsetzt die Jugend, und die Jungens berechnen wohl schon im stillen, wie viel Raupen sie noch heranschleppen müssen, um das Todesurteil von dem geliebten Max abzuwenden. „So, nun mal erst singen und beten, und dann von Jakob und Esau erzählen und nicht mehr nach dem Max hingeschaut!" — Als aber Esau bei dem Linsengericht sitzt und Jakob die Hofstelle mit allem toten und lebenden Inventar auf Handschlag zugesichert bekommen hat, ist auch Max wieder hungrig, und statt einer Linsensuppe heimst er nach knapp einer Stunde abermals seine 20 Raupen ein!

Daß wir den Kuckuck in den Kreis unserer wissenschaftlichen Betrachtungen, nicht nur der biologischen,

hineinziehen, versteht sich für einen Schulmann von selbst. Als da ist: „Max frißt jede Stunde 20 Raupen; wieviel Raupen hat er bis Schulschluß gefressen? Das können schon die Kleinen der zweiten Abteilung herausfinden. Für die Großen: Max bekommt von morgens 6 Uhr an bis abends 7 Uhr stündlich 20 Raupen, dreimal jedoch nur 15 Stück. Wieviele Raupen braucht er am Tag? wieviel in der Woche? oder gar im Monat? Wenn der alte Kuckuck ebensoviel frißt und fünf Monate bei uns bleibt, wieviele Raupen hat er dann gefressen? Hieraus aber den Nutzen des Kuckucks zu berechnen, wäre ein Trugschluß, wie wir noch erfahren werden.

Nachmittags kommt Max wieder mit zum Teich und sitzt in der Buchenlaube; und am andern Morgen sind schon 30 Raupen nötig, um seinen Hunger zu stillen. Die Büsche am Fenster sind kahlgefressen und müssen durch neue ersetzt werden. Einige Raupennester werden wieder angebracht; aber es kommen auch schon Entschuldigungen: „Ich weiß noch eins, aber ich kann da nicht ankommen". „Ich mußte Kühe hüten, und da waren keine" usw.

Teichrohrsänger nach der Fütterung (s. S. 302).

So kommt das Schulfest heran. Nachdem Max tüchtig gefressen hat, wandert er in seinen Korb, dessen Papiereinlage aus praktischen Gründen schon oft erneuert worden ist. Auch die Fensterbank hat seit gestern papierne Kindertücher erhalten. — Ich sammle die Futterdose voll Raupen, und unter den Klängen eines Marsches wandert Max mit hinaus zum Festplatz. Regelmäßig bekommt er sein Futter und geht abends wohlgenährt wieder mit ins Dorf zurück.

Das Schulzimmer bot am andern Morgen ein fesselndes Bild. Die Raupen hatten sämtliche Zweige am Fenster kahl gefressen, und das wenige Laub, das nicht verzehrt war, hing vertrocknet an den Zweigen. Da waren denn die Raupen ausgewandert und hatten den ganzen Klassenraum durchzogen. Viele aber hingen matt oder tot an den Zweigen. Das waren die, in deren Innern die Larven der Schlupfwespen lebten. Es war eine große Anzahl. Da konnte ich meine Betrachtungen über die Nützlichkeit der Vögel anstellen. Unendlich viele Ichneumonidenlarven werden eben durch die Vögel, die die Raupen samt deren Schmarotzern vertilgen, getötet. Max hatte gewiß schon Tausende nützlicher Schlupfwespen vernichtet, indem er Hunderte schädlicher Raupen verzehrte. Seine Artgenossen im grünen Walde hatten es ebenso gemacht. Die Natur sorgt wohlweislich dafür, daß eine Art nicht überhand nimmt. Ich glaube, die Vogelfanatiker lassen diese Tatsache oft aus dem Auge. Doch ich soll ja von Max und seinem Schicksal erzählen!

Vorläufig mußten alle Kinder auf die Raupenjagd gehen; denn an allen Bänken, Schränken, Wänden, Fenstern usw. kroch es voll von ihnen. Guschi und Heine holten schnell grüne Zweige, damit die lebenden, gesunden Raupen Nahrung bekamen; und Max fraß die matten und toten, in deren Eingeweiden die Schmarotzer wühlten; er erlöste viele von einem qualvollen Dasein. Heute waren keine neuen Raupennester mitgebracht, wie sollte auch wohl! Und ich sah betrübt in die Zukunft. So viel Sorge um einen einzigen jungen Kuckuck! Lieber Leser, nun denke einmal an den Leiter eines zoologischen Gartens, der da ein ausländisches Tier zugeschickt bekommt, von dem er nicht so recht weiß, womit er es füttern, wie er es unterbringen und pflegen soll. Du stehst vor dem Käfig und denkst vielleicht: „Nein, wie niedlich!" oder gehst gar gedankenlos an diesem oder jenem Tier vorüber. Wie viel Mühe, wie viel Arbeit haben die Tiergärtner, um deine Schaulust zu befriedigen! Hast du daran schon einmal gedacht? — —

(Forts. folgt.)

Nach Tagebuchaufzeichnungen von 1921.

Von Adolf Günther, Lommatzsch.

(Nachdruck verboten.)

Kollege Kretzschmar erzählt mir, daß ihm sowie auch seiner Frau freilebende Kohlmeisen zerkleinerte Erdnüsse aus der Hand nehmen. Sie halten die Hand zum Fenster hinaus, und die Vorführung beginnt. Die Vögel sitzen dabei auf einem Draht. Am 22. 2. flötet ein Hänfling, in der ersten Märzwoche ruft wie immer die Singdrossel, am 20. 3. meldet sich der Hausrotschwanz, am 22. 3. die Ringeltaube. In einer Bienenzeitung lese ich die betrübliche Kunde, daß Kröte und Kohlmeise Bienenräuber sind. Die arme Kröte! —

Die Finkenschnäbel färben sich wieder blau. Ist dieser Vorgang eigentlich hinreichend erforscht? Von einer Abreibung wie bei den Federn kann da wohl nicht gesprochen werden. Und diese Abreibung — ich frage wieder einmal — ist sie wirklich die Ursache der Gefiederverfärbung? Gerade jetzt fällt mir ein Zeitungsausschnitt in die Hände, wo es heißt: In früherer Zeit war die Ansicht vorherrschend, daß der Farbenwechsel einfach durch Mauserung vor sich gehe. Schon Schlegel widerlegte diese Meinung, und Gätke bestätigte Schlegels Überzeugung, daß die herrlichen Farbensinfonien zur Zeit der Paarung weniger der Mauserung als einem Verfärben des bleibenden Gefieders ihr Entstehen verdanken.

Wer hat recht? Oder ist das Rätsel noch nicht gelöst? Wie so oft schon, stimmt mich das Gebaren meines Langschanhahnes nachdenklich, der einer Henne unter artigem Zuspruch ein schönes Plätzchen zum Eierlegen zeigt und zurechtpaddelt. Ihr gefällt das alte Nest nicht mehr. Woher weiß er das eigentlich? Man lernt mit der Zeit die Sprache der

die Vögel recht gut verstehen. Ich brauche nicht mehr mit den Augen zu suchen, wenn ein Hahn in irgend einem Winkel ein Nest zurechtkratzt. Seine Sprache verrät mir's sofort, genau so, wie das bekannte Gackern der Henne die Geburt des Eies kündet, und wieder ganz andere Töne den fremden Eindringling in Hof und Garten melden, vielleicht den Hund, die Katze, den Igel, das Wiesel, den Raubvogel. Ein geschultes Ohr vermag sofort annähernd festzustellen, was die Vogelseele beschäftigt. Mit den geringen Stimmmitteln, die ihm die Natur verlieh, bettelt, lockt, warnt, grollt, zürnt, beruhigt der Vogel.

Und dort mein Gänserich, der mit gellendem Triumphgeschmetter von den fliehenden Kindern zurückkommt. Jeder Zoll ein Sieger. Wie gravitätisch er schreitet, wie er den langen Hals streckt und biegt und dabei der Gattin über seine Heldentat berichtet! Ob das wirklich alles bewußtlos geschieht? Ich glaub's nicht.

Und zuletzt, wenn man solche Tiere zusehen läßt beim Töten ihrer Gefährten. Quillt nicht stummes Entsetzen aus den Augen der Zeugen? Oder sehe ich Qual, wo keine ist? Ich lasse kein höher entwickeltes Tier mehr zusehen, wenn seinesgleichen geschlachtet wird.

Soldatenstärling.

Am 10. 4. ist eine Rauchschwalbe gesehen worden, am 11. 4. singt der Girlitz, am 21. klappert das Müllerchen, am 22. ruft der Wendehals und am 25. der Kuckuck. Am 27. meldet sich das Gartenrötel. Am 3. 5. schießt der Turmsegler wieder durch die Lüfte, am 6. jodelt ein Schwarzplattl mit meinem Käfigvogel um die Wette, am 20. 5. höre ich von einem fliegenden Kuckuck die neue Strophe, die ich schon in früheren Berichten erwähnte. Ist es der Kuckuck, oder irre ich? In Frage könnte nur noch kommen der Ziegenmelker. Ruft er anhaltend am Tage?

Zum ersten Male werden meine reifenden Julibirnen von Staren geplündert.

Drei meiner Bienenvölker kommen nicht vorwärts. Weisellos? Ich nehme sie auseinander: etwas verdeckelte Brut, keine Made, kein Ei, kein Tropfen Honig, und zuletzt sehe ich die schöne kräftige Königin. Also weiselrichtig! Es stimmt, was jeder erfahrene Bienenzüchter weiß. Sobald es an Futter fehlt, stellt die Königin ihre Tätigkeit ein. Ich rate jedem Imker, bei der Herbstfütterung ja nicht zu knickern. Übertriebene Sparsamkeit kommt in der Regel teuer zu stehen. Man vergesse nie die zwei Verschen:

Soll rasch der Bien' die Höh' erklimmen,
Im Lenz muß er im Futter schwimmen.
Selbst wenn im Überfluß sie schwimmt,
Die Bien' genügsam Nahrung nimmt.

Von meinem Garten aus höre ich wieder einmal Wachtelruf. Lang, lang ists her, daß ich die erste Wachtel samt einem Wachtelhäuschen erwarb, ein liebes Tierchen, das in meiner Erinnerung fortlebt. Hielt ich die mit Hanf gefüllte Hand in den vor dem Häuschen stehenden Laufkäfig, so ging's im Laufschritt einige Male über die Hand hin und zurück, sicher ein Ausdruck gehobener Stimmung. Erst dann setzte es sich auf die Hand und ließ sich die leckere Kost schmecken. — „Da fuhr aus der Wind vom Herrn und ließ Wachteln kommen vom Meer und streute sie über das Lager her, 2 Ellen hoch über der Erde. Da machte sich das Volk auf denselben ganzen Tag und die ganze Nacht und den andern ganzen Tag und sammelte Wachteln, und welcher am wenigsten sammelte, der sammelte 10 Homer (1 H. = 364 Liter), und sie hängten sie um das Lager her. Da aber das Fleisch noch unter ihren Zähnen war, da ergrimmte der Zorn des Herrn wider das Volk, und er schlug sie mit einer sehr großen Plage. Daher heißt diese Stätte Lustgräber, darum, daß man daselbst das lüsterne Volk begrub." Also der biblische Bericht.

Solches „Sammeln" liegt um Jahrtausende zurück, und noch heute soll es alljährlich auf afrikanischem Boden betrieben werden. Kein Wunder, daß der Wachtelruf zur seltenen Musik in unseren Feldern geworden ist.

Von solchem Massensterben, infolge übermäßigen Fleischgenusses nach langem Hungern, führt die Geschichte noch mehr Beispiele auf.

Ende August beobachten wir ein mittelgroßes Wiesel im Garten. Ein reizendes Bild, der männchenmachende Zwergmarder mit dem reinweißen Brustlatz. Husch ist er weg in ein Mäuseloch. Gleich darauf beobachtet mein Sohn seinen Kampf mit einer Maus.

Am 11. 9. beginnt der Rotkehlchenzug. Am 2. 10. erlegt mein Nachbar aus einem Volke von zehn bis zwölf Stück einen Goldregenpfeifer im Felde. Am 5. 10. wird mir eine Singdrossel mit zerrissenem rechten Flügel zugetragen. Ich schneide das hängende Stück mit einer Schere ab. Der Vogel zuckt nicht einmal. Ich habe ihn noch. Was er als Sänger wert ist, weiß ich noch nicht (1925). Bisher wurde er immer von einem sehr lauten Schwarzplättchen buchstäblich niedergeschrien. Nun habe ich es weitergegeben und die Drossel wird allmählich lauter. Merkwürdigerweise nahm sie im Anfange ihres Käiglebens keinen Mehlwurm, sehr gern aber schwarze Holunderbeeren. Ich habe überhaupt die Beobachtung gemacht, daß von allen Beeren die schwarzen Holunderbeeren am liebsten genommen werden, und zwar von allen beerenfressenden Vögeln.

Ein vom elektrischen Strom getöteter Star wird mir aufs Pult gelegt. Die Schwingen sind an der Unterseite versengt, vom Fersengelenk an fehlt das Fleisch, nur kahle Knochen sind übrig. Die Zehen sind zusammengekrallt, ein Füßchen bricht ab. Der Schnabel ist weit geöffnet.

Am 9. 10. singt bei prachtvollem Sommerwetter ein Rotkehlchen wie im Frühling, vier Tage lang höre ich es, am 17. 10. wieder eins ebenso laut.

Kleine Mitteilungen.

Etwas vom Sprechen der Wellensittiche. In dem sehr interessanten Aufsatz des Herrn Fr. v. Lucanus „Über die künstliche Aufzucht junger Papageien" in Heft 4 und 5 des laufenden Jahrganges der „Gef. Welt" heißt es unter anderem von Wellensittichen: „Gelehrig sind aber nur die Männchen, weniger die Weibchen." Weil mir nun ein Fall bekannt geworden ist, daß auch ein Weibchen, und zwar ein nicht aufgepäppeltes, gut sprechen gelernt hat, will ich — keineswegs um den Erfahrungen des Herrn Fr. v. L. zu widersprechen — den Fall mitteilen. Die Ausnahmen bestätigen wie bekannt die Regel, und schließlich mag wohl doch die Gelehrigkeit sehr individuell sein. Der Besitzer des Vogels schreibt mir wie folgt: „Den Vogel kaufte ich im Mai 1903 und habe ihn aus etwa 10 Köpfen in der Hecke des Herrn Professor G. v. W. ausgewählt. Nach Angabe war der Vogel im April geschlüpft. Ich wollte gerade ein Weibchen haben; aber weil die Wachshaut bei so jungen Vögeln noch nicht ausgefärbt ist, war es ein schwieriges Unternehmen. Ein Bekannter von mir nahm bei derselben Gelegenheit einen ganz gleichen Vogel, bekam aber, wie es sich später zeigte, ein Männchen. Dieser, obschon allein im Käfig gehalten und obgleich sein Besitzer sich sehr viel mit ihm beschäftigte, lernte nie ein Wort sprechen. Mein Vogel war in der Tat ein Weibchen. Ich hielt ihn allein in einem Käfig von 49 × 27 × 35 cm. Es wurde nichts Außergewöhnliches getan, um ihn zu zähmen. Dennoch wurde er ziemlich bald so zahm, daß er auf meine Schulter kam, mich ins Ohr kniff, auf den Kopf kletterte und sehr gern in meinen Haaren wühlte. Zum ersten Male kam er auf meine Schulter, als er lange im Zimmer umhergeflogen und sehr ermüdet war. Seitdem wagte er es öfter. Wenn er im Käfig saß und man ihm Worte, besonders in der Abenddämmerung, wenn er etwas schläfrig war, Silbe für Silbe vorsprach, bemerkte man sogleich ganz deutlich, daß er allmählich sie nachzuahmen versuchte. Schon im nächsten Herbst, als er 5 Monate alt war, lernte er sein erstes Wort deutlich sprechen. Das war sein eigener Name „Puke". Im Laufe der Jahre lernte er dann, gewöhnlich mit leiser Stimme, aber auch laut schreiend, folgende Worte (in der finnischen Sprache) sagen: Puke — Schöne Puke — Weikki (der Schmeichelname seines Besitzers) — Mama — Tag — Guten Tag — Wie geht's — Gar nichts (und noch ein paar unübersetzbare Worte). Außerdem konnte er herzliches Lachen und Husten nachahmen. Schon ehe er sprechen lernte, lernte er pfeifen, und zwar das Pfeifen der Lokomotive, täuschend wiederzugeben. Später lernte er noch einige kurze Bruchstücke von Liedern nachpfeifen. Der Vogel ging im Jahre 1914 an einer Geschwulst im Halse zugrunde. — — — Auf Grund eigener Erfahrung bin ich der Meinung, daß diese Vögel, so scheu sie sich auch im Anfang zeigen, sich doch zähmen lassen, wenn man sich nur sehr viel mit ihnen beschäftigt und mit ihnen spricht."

A. Munsterhjelm.

Bücher und Zeitschriften.

Deutsche Übersetzungen russischer ornithologischer Werke. Wenn man die deutschsprachliche ornithologische Literatur in Augenschein nimmt, so kommt man bedauerlicherweise zu dem Resultat, daß wir in Beziehung auf außereuropäische Landesteile, um nicht deutsche zu sagen, nur zu oft auf fremdsprachliche Werke angewiesen sind, die in der Mehrzahl dem größten Teil der sich dafür Interessierenden aus dem Grunde der Unkenntnis der betreffenden Sprache nicht benutzbar sind. Der Hauptteil z. B. der zahlreichen in russischer Sprache verfaßten Literatur geht aus diesem Grunde dem allergrößten Teil der deutschen Ornithologen verloren und es ist daher von besonderem Wert, daß sich ein namhafter, der russischen Sprache mächtiger Vogelkenner, wie Herr Hermann Grote, der Mühe unterzogen hat, ornithologische Werke bekannter Russen ins Deutsche zu übersetzen, um sie so dem deutschen Wissenschaftler und Vogelliebhaber zugänglich zu machen. Was aber von ebenso großem Wert ist, ist, daß Herr Dr. Otto Kleinschmidt, nachdem Herr Grote die Drucklegung einesteils der Übersetzungen selbst gesichert hatte, die der übrigen Manuskripte übernommen hat. Es handelt sich bei allen diesen um Werke, die sich mit der paläarktischen Avifauna befassen, wertvolles Material behandeln und eine Fülle biologischer und geographischer Mitteilungen enthalten. Während seiner Kriegsgefangenschaftsjahre hat Herr Grote sich in dankenswerter Weise der Mühe unterzogen, auch das Werk A. Tugarinows und S. Buturlins „Material über die Vögel des Jenisseischen Gouvernements" zu übersetzen. Als umfangreicher Auszug von 252 Seiten liegt diese Übersetzung, die im Februar dieses Jahres unter dem Titel „Aus der Ornithologischen Literatur Rußlands. Berichte und Übersetzungen. Von Hermann Grote. Band V" als Sonderheft zu „Falco" erschienen ist, nun vor und ist durch Herrn Pfarrer Dr. O. Kleinschmidt, Duderstedt, Bez. Halle zu beziehen. Die Autoren behandeln ein immenses, in der Hauptsache die Flußgebiete des Jenissei und der Chatanga umfassendes Gebiet, einschließlich das ihrer Nebenflüsse — werchnaja und nischnaja Tungunska jedoch nur zu etwa einem Drittel resp. der Hälfte ihres Stromlaufes — ein Gebiet, daß sich in der Nord-Südrichtung in einer Ausdehnung von etwa 2900 km erstreckt. Dieser Landstrich grenzt im Süden mit dem Sajanskij-Gebirge an die Mongolei, im Westen in seiner ganzen Ausdehnung an die Gouvernements Tomsk und Tobolsk, im Osten an das Gouvernement Jakutsk und im Norden begrenzt das sibirische Eismeer seine Küsten, deren nördlichste sich in Gestalt der beiden Taimyr-Halbinseln bis über den 77° n. Br. erstrecken. Mit einem Vorwort des Übersetzers versehen, besteht das Werk aus zwei sich ergänzenden Teilen: dem allgemeinen und dem speziellen Teil. Im ersteren wird gleichsam in kurzen Zügen der riesige Komplex des sich von Nord nach Süd erstreckenden Gebietes nach und nach in seiner geographischen, botanischen und ornithologischen Gestaltung vor unseren Augen in eindrucksvollen Schilderungen in seiner Gesamtheit aufgebaut. Im zweiten werden die einzelnen Vogelarten nicht in nüchterner Angabe hintereinander gereiht, sondern dieser bietet dem Leser in seiner fließenden, interessanten, kurzen und doch sachlichen Schilderung zugleich

auch Einblick in das Vogelleben der weit ausgedehnten, sibirischen Einöde. Gerade das letztere, die Beschreibung des Lebens der leider uns nur zu oft nicht erreichbaren Vogelarten in eingehender Form macht diese Schrift besonders wertvoll, sieht man doch vor seinem geistigen Auge das Leben und Treiben der gefiederten Bewohner dieser Gegenden sozusagen erstehen und sich selbst in die Gebirgszonen, in die Steppe, in finstere Urwälder und in die Tundra versetzt. 285 Arten sind hier aufgezählt und sachlich behandelt, in einem Nachtrag werden noch 6 Vogelarten angeführt und anschließend zweier anderer, in russischer Sprache verfaßter Arbeiten Erwähnung getan, die eine Ergänzung der vorliegenden Arbeit bilden. Durch eingehendes Studium kommt man zur Erkenntnis, daß diese Groteske Übersetzung der Tugarinowschen und Buturlinschen Arbeit viel wesentlich Neues in Hinsicht auf die Lebensweise und die Verbreitung vieler Sibirier zur Kenntnis bringt. Was die äußere Ausstattung des Werkes anbetrifft, so fällt das gute Papier und der große, leicht leserliche Druck, wie auch der in wohltuender Farbtönung gehaltene Umschlag des broschürten Bandes auf. Diese vorliegende Arbeit ist eine wertvolle Ergänzung der vorhandenen Literatur über die paläarktische Avifauna und damit haben sich Übersetzer wie Herausgeber einen großen Verdienst um die Vogelkunde erworben. John Kuntzendorff.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnitz, Merveldstr. 39. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

Zur Kenntnis unserer Mitglieder!

Die Geschäftsstelle hat für jedes angeschlossene Vereins- und Einzelmitglied Mitgliedskarten ausgestellt und zur Verteilung gebracht. Soweit nun noch angeschlossene Vereine und Einzelmitglieder vorhanden sein sollten, die nicht in den Besitz einer Mitgliedskarte sind, bitten wir um kurze Nachricht.

Die Mitgliedskarten sind nummeriert. Die Nummern sind unveränderlich, d. h. jedes Mitglied behält dauernd seine Nummer. In Mitteilungen und Schreiben irgendwelcher Art bitten wir sie anzugeben. J. A.: Petters.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

A. Fluck, Bremen, Knoopstr. 39: Gelbnacken-, Doppelgelbkopf-, Mohrenkopfpapageien, Elfenbein-, Feuerflügelsittiche.

Osthenner, Berlin W, Blumenthalstr. 17: 1 Paar Orangeblaufinken.

Stefani u. Sohn, Neuß am Rhein: Wellensittiche, blau, grüne Rückschläge von blauen Eltern, sonstige blaublütige, maigrüne, 1,1 Spitzschwänze, 1,2 vorj. weiße bezw. Hermelin-Kanarien, 1,0 Alario, 1,0 Kurzschnabelgirlitz, 2,0 Weißkehlpfäffchen.

A. Stober, Altona a. d. E., Gr. Rosenstraße 126: Gelbkopf-, Surinam-, Neuholländer-, Diadem-, Rotstirn-, Blaukronenamazonen.

E. Stümcke, Vegesack (Bremen): 1 Paar Schopfwachteln.

Herrn K. Z., Nauen. Automatische Futtergefäße haben den Nachteil, daß der Pfleger leicht sorglos wird und glaubt, seine Pfleglinge wären für längere Zeit gut versorgt, während es vorkommen kann, daß die Sämereien nicht nachfallen und die Vögel dann nichts zu fressen haben. Es muß doch täglich nachgesehen werden, ob das Futtergefäß auch seinen Zweck erfüllt. Da in dem Außenflugraum doch 20 bis 30 Vögel verschiedener Arten beherbergt werden, müßte das automatische Futtergefäß sehr groß sein. Solche Gefäße sind im Handel nicht erhältlich und müßten angefertigt werden. Abbildungen sind in den verschiedenen Büchern vorhanden, nach denen die Herstellung vorgenommen werden könnte. Ein weiterer Nachteil ist, daß futterneidische Vögel jeden anderen leicht an der Futteraufnahme verhindern können. Dem müßte durch Aufstellen von Futtergefäßen an verschiedenen Stellen des Flugraumes vorgebeugt werden. In dem Flugraum könnten 20 bis 30 Vögel untergebracht werden, und zwar alle unsere heimischen Körnerfresser paarweise, vielleicht mit Ausnahme des Bergfinken, der häufig sehr angriffslustig ist.

Herrn A. J., Görlitz. Der mexikanische Blauspötter steht der amerikanischen Spottdrossel nahe und ist etwa ebenso groß wie diese. Er bedarf als lebhafter langschwänziger Vogel eines geräumigen Drosselkäfigs. Die Färbung ist ein schönes Graublau, das an manchen Stellen des Gefieders unter gewissem Lichteinfall lebhafter blau erscheint. Kopfseiten, Kinn sind schwarz. Der Gesang wird nicht allzu laut vorgetragen, ist wechselreich und melodisch. Zuweilen werden auch schöne klare Rufe gebracht, die in der Erregung zuweilen etwas scharf sind. Er soll Lieder anderer Vögel nachahmen. Als Nahrung erhält er ein gutes Drosselfutter mit Beigabe von rohem feingewiegtem Fleisch, Stücken Vogelbiskuit, Obst (Sultaninen, Apfel, Apfelsinen, Weinbeeren usw.), lebenden Insekten und etwa 10—12 Mehlwürmern täglich.

Herrn K. Z. Das Geschlecht der Drossel ist, ohne den Vogel gesehen zu haben, nicht zu bestimmen. Daß der Vogel bis vor kurzem schlecht im Gefieder war und dauernd einzelne Federn verlor, deutet darauf hin, daß er im Vorjahr nicht gut vermausert hat. Hierin ist der Grund seines Schweigens zu suchen. Eine Singdrossel, welche zahm ist wie die des Fragestellers, hält, falls sie völlig gesund ist und sachgemäß behandelt und ernährt wird, in der Regel nicht mit dem Gesang zurück. Um im nächsten Jahr Gesang von ihr zu haben, ist es notwendig, daß der Vogel jetzt (Juli, August) das Gefieder gut und vollständig erneuert. Er wird das tun, wenn er jetzt reichlich mit frischen Ameisenpuppen gefüttert wird.

Frau M. E., Königsberg; Herrn A. St., Neuß: ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn H. W., Lübeck; Herrn A. A., Stockholm; Herrn K. S., Askona; Herrn M. Sch., Madrid: Beiträge dankend erhalten.

Frau Dr. Sch., Berlin-Grunewald. Wellensittiche sind sehr temperamentvolle, leicht erregbare Vögel. Es ist möglich, daß sich ein W., der in neue Verhältnisse gebracht wird, so erregt, daß er einem epileptischen oder ähnlichen Anfall erliegt. Möglich ist auch, daß er sich bei dem unsinnigen Umhertoben schon im Transportkasten eine Beschädigung des Schädels zugezogen hat, die solche Anfälle zur Folge haben kann. Große Ruhe und völliges Ungestörtsein ist zur Heilung eines derartig Erkrankten notwendig, andere Mittel zur Heilung sind nicht anwendbar.

Herrn Gg. N., Ludwigshafen. Es ist anzunehmen, daß die N. bei dem gereichten Futter, besonders wenn es möglich ist, die dort nicht regelmäßig zu erhaltenden frischen Ameisenpuppen möglichst oft zu reichen, mit dem Gesang beginnt. Die Güte des Gesanges und der Gesangsfleiß steigern sich mit zunehmendem Alter. Dem jetzt schweigenden Vogel anreizende Futtermittel, wie hartgekochtes Ei, Mehlwürmer und dergl., regelmäßig zu geben, ist nicht zu empfehlen. Aber eine Gabe von 2—3 Mehlwürmen kann, ab und zu als Leckerbissen gereicht, nicht schaden.

Herrn W. G., Danzig. Genannte Vögel vertragen sich in der Regel miteinander, ganz gleich, ob sie paarweise gehalten werden oder nur in einzelnen Männchen. Es gibt aber bei allen Arten auch Raufbolde, welche aus einem Gesellschaftskäfig entfernt werden müssen. — Bei vielen in der Gefangenschaft gehaltenen Orangewebern verblaßt allmählich das feurige Rot des Gefieders und geht mehr in Orangerot bis Orangegelb über. In hellen, sonnigen Räumen erhält sich die Gefiederfarbe meist gut.

Frl. A. G., Berlin. Zucker, Kaffee, Salz sind keine Nährmittel für Papageien. So harte Vögel wie Mönchsittiche bleiben bei richtiger Ernährung (Spitzsamen, Hirse, Hanf, Hafer, Grünkraut, frische Zweige) ohne weitere Beigaben gesund. Menschliche Nahrungs- und Genußmittel bleiben ganz fort.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

rgang 54 25. Juni 1925 Heft 26

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Von meinen Vögeln. Von Fritz Braun.

Vogelbilder aus Transvaal. Von F. E. O. Mörs.

Photographische Vogelstudien. Von G. Wolff, Schötmar.

Inmitten der Stadt Frankfurt am Main brütende grünfüßige Teichhühner (Gallinula chloropus) *(L.)* und andere Vögel. Von Wilhelm Schreitmüller.

Mein Kuckuck Max. Von W. Blohm. (Forts.)

Nach Tagebuchaufzeichnungen von 1921. Von Adolf Günther, Lommatzsch.

Kleine Mitteilungen - Bücher- und Zeitschriftenschau - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf. vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

ußʼsche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Anschrift: H. Höhne, Leipzig-Vo., Eisenbahnstr. 84. — Unsere Vorstandssitzung am 17. Juni hat sich in Anbetracht der Eigenart unseres engeren Vaterlandes mit seiner außerordentlichen Verbreitung der Vogelliebhaberei mit der Bildung von Bezirksverbänden (entsprechend Kreishauptmannschaften) befaßt. Es läßt sich in dieser Form eine wertvolle Fühlungnahme der Mitglieder untereinander erreichen, und außerdem dürfte die Werbetätigkeit wirksam sein, zumal die immerhin geringen verfügbaren Mittel uns jede Ersparnis zur Pflicht machen. Aus diesen beachtenswerten Gründen haben wir in Aussicht genommen, unseren Landesverband in Bezirke einzuteilen. Wir bitten unsere Mitglieder, die Angelegenheit zu prüfen und uns ihre Auffassung darüber mitzuteilen. Unsere nächste Vorstandssitzung findet am 29. Juli statt. Bis dahin erwarten wir einen Überblick zu haben, um entsprechende Beschlüsse fassen zu können. Wir machen darauf aufmerksam, daß eine Erhöhung der Beiträge nicht in Frage kommt. Gleichzeitig bitten wir um Abführung der Beiträge. Auch Teilbeiträge sind willkommen. Um eine Verzinsung der einlaufenden Gelder und damit einen gewissen finanziellen Vorteil zu erreichen, haben wir ein Giro-Konto angelegt. Dasselbe führt die Nummer 6317. Sämtliche Beiträge sind in Zukunft an dasselbe abzuführen.

Der Vorstand. J. A.: Hunger, Schriftführer.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.

J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke, Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Protokoll der Generalversammlung vom 7. Juni 1925 Vereinslokal Restaurant Karl Röhr, Dortmund, Heligerweg 28. Da unser Vorsitzender zur Generalversammlung nicht erscheinen konnte und entschuldigt war, so wurde dieselbe durch den Schriftführer 6^{15} Uhr eröffnet. In der Eröffnungsrede dankte insbesondere der Schriftführer im Namen des Vorstandes sämtlichen Mitgliedern für das feste und treue Zusammenarbeiten in unserer edlen Liebhaberei. Auf der Tagesordnung stand: 1. Vereinsvotum; 2. Vereinsbericht; 3. Kassenbericht; 4. Bücherrevision; 5. Neuwahl; 6. Zahlung der Beiträge; 7. Verschiedenes. Zu Punkt 1 bekundete der Schriftführer, daß noch ein engeres Zusammenarbeiten unter den Vorstandsmitgliedern stattfindet, wenn Vorstandssitzungen abgehalten werden. An der Vergrößerung unseres Vereins muß mit allen Mitteln gearbeitet werden, denn es gibt Hunderte von Waldvogelliebhabern in Dortmund, die noch abseitsstehen. Punkt 2 Vereinsbericht konnte nicht erstattet werden, da sich sämtliche Protokollbücher beim Vorsitzenden befänden zwecks Aufsetzung des Jahresberichts. Punkt 3: Der Kassierer erstattete den Kassenbericht. Derselbe wurde von den beiden Kassenrevisoren für richtig befunden. Die Jahreseinnahme des Vereins war sehr hoch und dennoch überstiegen die Ausgaben die Einnahmen um 2,90 M. Der Kassierer begrüßte, daß die Beiträge um 1/3 erhöht worden sind. Punkt 4: Die Bücherrevision konnte ebenfalls nicht erfolgen, da der Schlüssel sich beim Vorsitzenden befand. Punkt 5: Die Neuwahl wurde durch Stimmzettel vollzogen. Mitglied Emil Lappe wurde zum 1. Vorsitzenden, Mitglied Franz Düchting zum 2. Vorsitzenden gewählt. Zum 1. Schriftführer wurde Mitglied Stawitzki, zum 2. Schriftführer wurde Mitglied Hantschel, zum 1. Kassierer wurde Mitglied Hornig, zum 2. Kassierer wurde Mitglied Pistor, zum Bücherwart wurde Mitglied Spauke, zum Beisitzmann wurde Mitglied Wenke gewählt. Weiter wurde noch beschlossen, auf je 10 weitere Mitglieder einen Beisitzmann zu wählen. Punkt 6: Die Beitragszahlung ging glatt vonstatten. Punkt 7: Zunächst erhielt Kollege Hantschel das Wort. Dieser erklärte sich in der vorletzten Versammlung bereit, Naturnistkästchen für unsere Höhlenbrüter in den städtischen Anlagen anzufertigen. Ein hiesiger Förster stiftet passendes Holz hierzu, aber erst im Herbste. Im voraus sagen wir im Namen unseres Vereins unsern herzlichsten Dank. a) Kollege Stawitzki stellt den Antrag, daß der neue Vorstand dafür Sorge tragen möge, daß die Mindestmaße für Käfige, die vom Landesverband angegeben worden sind, in unserem Verein innegehalten werden. Eine Kommission aus Vorstandsmitgliedern soll monatlich einmal sämtliche Mitglieder besuchen und etwaige Fehler abstellen. Es wurde beschlossen, Ende September eine Herbstausstellung stattfinden zu lassen. Ferner sollen Frauen zu den Sitzungen eingeladen werden, damit sie durch Gedankenaustausch noch mehr für unsere edle Liebhaberei interessiert werden. b) Mitglied Düchting regt an, daß jedes Mitglied moralisch verpflichtet sei, bis zum 1. Oktober 1925 einen Vogelliebhaber in unsern Verein einzuführen. Dieser Antrag wurde von sämtlichen Mitgliedern sehr begrüßt. c) Mitglied Spauke stellt einen Antrag, in jedem Monat zwei Versammlungen abzuhalten. Es wurde demgemäß beschlossen, so daß jetzt jeden 2. Sonntag im Monat, nachmittags 5 Uhr, eine Zusammenkunft stattfindet zwecks Unterhaltung über Vogelkunde. An jedem 4. Sonntag im Monat nachmittags 5 Uhr findet die Monatsversammlung statt. d) Mitglied Pistor stellt den Antrag auf nochmalige Buchfinkenprüfung im Verein, welche kommenden Sonntag stattfindet. e) Mitglied Friese regt einen Meinungsaustausch über Futterqualitäten an. Zum Schluß wurde noch die Lokalfrage erörtert. Es solle ein Lokal gewählt werden, in welchem auch unsere Ausstellungen stattfinden können. Sämtliche Mitglieder einigten sich dahin, als Vereinslokal Restaurant „Zum Löwentor", Königswahl 75, zu wählen. Ab 14. Juni tagt unser Verein in diesem neuen Lokal. Da sich niemand weiter zum Wort meldete, schloß der 1. Vorsitzende um 10^{30} Uhr die Generalversammlung. Hierauf folgte ein gemütliches Zusammensein.

J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung Freitags, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Blasewitzer Hof". Liebhaber willk. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Rietschelhof", Rietschelstr. 19. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinslokal „Parkhotel", Epinaystr. 1, Versammlung. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an. Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 7. Juli. A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber. Nächste Veranstaltungen: Donnerstag, den 9. Juli: Vereinsabend im Landesheim, 8¼ Uhr, Vortrag Klocke: „Mimikry". Alle Mitglieder werden herzlich gebeten, möglichst an allen Veranstaltungen teilzunehmen. Appel.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste willk. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Vereinsabend regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends um 8 Uhr) beim 1. Vors., Herrn Jahn, Feodorastr. 7. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. A. Voigt.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thiebolbsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 2. Juli. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Normast im „Kaiser Friedrich", Breslauerstr. 50. Liebhaber willkommen. J. A.: Friedrich.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorfstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wst., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Tage im „Goldenen Falken" Versammlung; nächste Freitag, den 26. Juni. Liebhaber willk. Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Versammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Liebhaber willk. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebenda. R. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Nachnahme ef od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

äfige u. Gerätschaften

gel-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50. Klagnetze f. kl. schädl. Vögel M. 2,30, . M. 2,50 u. 2,80. Katalog gratis. Lannen, Gronau 58, Westf. [832

Futtermittel

Mehlwürmer

à fund 4.50 ℳ, bei 6 Pfund Porto und packung frei. Händler Rabatt.

Ia Ameiseneier
Pfund 6.50 M.

Weißwurm . . . à Pfd. 5 ℳ
Puska-Zecken . . à „ 2,50
Seidenraupenpuppen, gemahlen . . . . à Pfd. 0,75
Garnelen, gem. à Pfd. 0,40 ℳ

Ia Universalfutter

Mischung I für Nachtigallen 2.— ℳ
„ II für Grasmücken 1.80 ℳ
„ III für Drosseln . 1.50 ℳ

Proben und Analysen zur Verfügung. Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [833

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
Schrich II, Waldsee (Pfalz).

Mehlwürmer

Einsend. v. 1.50 Rentenmark ¼ Pfd. versend. D. Waschinski & Co.. Biesenthal I (Mark). [834

„ORNIS" Freie Bezugsvereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands.

Gegründet 1912 .·. Fernsprecher 4198 [835

Fachgemäße Belieferung d. Mitglieder m. Vogelfutter, nach Angaben des Herrn Apotheker **Adalbert, Jena.** („Reform-Normal", individuelle Zusammensetzung b. restlosem Verbrauch; stets frisch gemischt). Mitglieder u. Vereine Vorzugspreise. Hunderte von Liebhabern füttern seit über einem Jahrzehnt mit bestem Erfolg nur „Reform-Normal".

Reform-Normal-Käfige Mod. ORNIS 1925, neue Preisliste erschienen. — Modern eingerichtete Käfig-Bauanstalt mit elektrisch. Betrieb. —

Neuanmeldungen frei, bei gleichzeitiger Bestellung Zusendung des **Ornis-Buches** (90 Seiten). Geschäftsjahr ab 1. Oktober, **Beitrag** und **Ornis-Nadel** 2.— M.

Auskunftei: Jede gewünschte Auskunft wird gern erteilt. Prompte und gewissenhafte Erledigung aller Bestellungen. Leiter langjährig. Fachmann.

Anschrift: Ornis-Haus, Halle-Saale. Der Geschäftsführer: Martin **Sperling.**

Qualitätsware

Sommer-Rübsen „Züchterstolz"

Postkolli Mk. 5.50 ausschl. Porto und Verpackung.
Prämiiert mit dem I. Preis, Erfurt, Kanarienausstellung 1920.

Sämtliche andere Vogelfutterarten für Singvögel
lose und in Original-Packungen zu den jeweils billigsten Tagespreisen.
Kanarienzüchter-Vereine
erhalten bei geschlossenem Bezuge Preißermäßigung.

Hermann Schmitt, Erfurt, Samengroßhandlung,
836] **Abt.: Vogelfutter.**

Anzeigen in der Gef. Welt haben guten Erfolg

837] **Mehlwürmer,** reine Ware, gegen Einf. von 1.75 ℳ ¼ Pfd. franko. **Th. Witte,** Niederndodeleben b. Magd.

Mehlwürmer pr. rein Pfd. 4.50 (6 Pfd. 27 ℳ fr.) ¼ Pfd. 1.50 M. fr. Voreinsend. **Jeitner, Breslau,** Weinstr. 12. [838

Muska
839] **beziehen Sie billig von H. Pullich, Langen** b. Frankf./M. 8.

Ameisenpuppen
täglich frisch, à Liter M. 2,30 franko Garantie f. Qualität.
Th. Witte, [840
Niederndodeleben b. Magdeburg.

Getrocknete
Deutsche Ameisenpuppen
(einige Kilo sofort) zu kaufen gesucht. Bemusterte Offerte an
Eduard Schütte, Eystrup (Weser), A.-Z.-Mtgl. 171. [841

Vogelfutter [842
für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 18 über Vogelfutter umsonst.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Züchterkollegen!

Wer seine Nachzucht gesund erhalten will, der befolge nachstehenden Wink: **Jungvögeln im Fluge verabreiche man guten Rübsen zur Genüge und „L.K." trocken, soviel sie fressen mögen. Gekochtes Ei verursacht Krankheiten und ist deshalb die Verabreichung zu vermeiden.**

Lorenz, Dresden
Drehgasse 5. [843

Vögel

Schneeweiße Kanarien
gibt ab
C. Balser, Fulda. [844

Kreuzschnäbel

schön ausgefärbte Männch. sowie Zuchtpärchen habe laufend abzugeben. In Tausch nehme Kanarien, Exoten sowie Vogelfuttersämereien. [845
Arno Jahn, Großbreitenbach
Thüringen.

Verkaufe dauernd junge
Wellensittiche Ia befiedert, kerngesund, in Freiflug gezüchtet, grün und gelb, pro Paar 8.— Mark.
Saller, Planegg bei München, Hofmarkstraße 8. [846

Verkaufe

847] **4 Stück 12 Wochen alte**
tar. Unzertrennliche
W. Reitzig, Berlin N 39,
Reinickendorfer Str. 109.

1,0 Kaprötel, 1,0 Drongo à 40 M., **1,0 orangeroter Trupial** 25 M. u. **1,0 Gartengrasmücke** 10 M. zu verkaufen. Off. unter **W. H. B.** an die Exped. der „Gefied. Welt" erbeten. [848

1,1 Feuerflügelsittiche,
gar. richtiges Paar, ges. u. fehlerfrei, abgehärtet, in Freivol. gehalt. ♀ legte verg. Jahr 2 Eier, weg. Platzm. abzugeb. zu 50.—
1 Paar Dominikanerkardinäle, gesund und fehlerfrei . . . . 16.—,
Wellensittiche, ausgef. Paar 15.—, zum Teil ausgef. . . . . Paar 12.—.
A. Mertes, Mainz,
Wallaustr. 62. [849

Verkaufe:

Ia import. Schamamännch. 55 M. **1,1 fast 6 Monate alte feinste deutsche Schäferhunde** mit prima Stammb. Beide Eltern auf Siegerschau mit „Vorzüglich" bewertet, à Stück 200.— M. Für d. Deckrüden wurden 15 000 M. geboten.
Direktor Wucherpfennig, Artern i. Thür. [850

Zebrafinken

import., gut eingewöhnt u. sehr nistlustig, auch einzelne Männchen.
Junger zahmer
Wellensittich
grün, kein Beißer, auf dem Finger sitzend, frei ins Haus 15 M. (j. zahm. Wellensittiche lernen leicht sprechen).

Nistkasten

für Wellens. u. and. Höhlenbrüter, das beste, was es gibt, von erfahrenen Züchtern empfohlen, seit 20 Jahr. i. eig. Züchterei erprobt, Stück 2 M.
Suche oder tausche: blaue Wellens., grüne Wellensittichweibchen, Nymphens.
Frau Klara Neugebauer, Deutsch-Lissa. [851

Himmelblaue, kobaltblaue, malvenfarbige und weiße **Wellensittiche** liefert **C. Balser, Fulda.** [852

Mehlwürmer

[853
jedes Quantum, 1 Pfd. 4.50 M., Porto u. Verp. extra. ¼ Pfd. 1,50 M. franko, bei Nachn. 20 Pf. mehr. 5 oder 6 Pfd. franko u. Verpack. frei (Dringend Eilboten). **Händler und Vereine sowie Großabnehmer erhalten hohen Rabatt bei Abnahme von 5—6 Pfd.**
Karl Claus, Mutterstadt 2, Hauptbahnhof.

Offeriere in gesunden Exemplaren: [854

Junge Graupapageien	à	120.—	
dito, helläugige	à	130.—	
Blaustirnamazonen, zahm	à	60.—	
dito, nicht zahm	à	40.—	
Surinamamazonen, zahm	à	45.—	
dito, nicht zahm	à	35.—	
Rotrückenamazone, zahm	à	50.—	
Kleine Gelbkopfamazone	à	35.—	
Rotmaskenamazone, zahm	à	50.—	
Venezuelaamazone	à	35.—	
Zwergara sprechend, zahm	à	65.—	
dito, Marakana, zahm	à	30.—	
Kleiner Gelbhaubenkakadu	à	38.—	
Mamosettäffchen, zahm	à	30.—	
dito, ½ Jahr hier, zahm	à	40.—	

1 Paar fingerzahme Grünsittiche (holochlorus) . . . . . 50.—
1 Paar Katharinasittiche . . . 25.—
1 Paar Grassittiche . . . . . 20.—
Tarantiner Bergpapagei . Paar 18.—
Fingerzahme Feuerflügelsittiche à 20.—
Blaubürzl. Sperlingspapag. Paar 12.—
Dominikaner-Kardinäle . . à 6.—
Kaptäubchen . . . . . Paar 6.—
Mex. Wachteln . . . . . Paar 22.—
Graue Reisfinken . . . Paar 5.—
Reellste Bedienung zugesichert.
Porto u. Verp. 3.50 M., als Dring. 6.50 M.
Frische Ameiseneier . . à Liter 2.—
Weißwurm . . . . . à Pfund 5.—
Paul Tzornack, Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189, Tel. Humboldt 2063.

Bei Anfragen und Bestellungen bitten wir, sich auf die „Gef. Welt" zu berufen

Wo?

kann ich die besten jungen
Graupapageien kaufen?
Am liebsten von einem Schiffer. Bitte um Adresse an
Karl Hafner, Bonn,
Eifelstr. 90. [855

„Gefiederte Welt"

Jahrg. 1897—1906, sämtlich im Originaleinbd., tadell. erhalten, p. Jahrg. 4.— M., ausschl. Porto, verkauft [856
Walter Schenck, Lebus
Bez. Frankfurt a. d. Oder.

Vertausche:

prima Blaudrossel, Steinrötel, Kalanderlerche, Davidsprosser, Nachtigall, Sperbergrasmücke, Sumpfrohrsänger gegen Graupapagei od. Schama und andere Exoten. [857
O. Reupert, Breslau, Kospothstr. 21.

Abzugeben

2,2 grüne, 1,1 gelbe Wellensittiche Mark 35.—
1,1 blaub. Sperlingspapageien Mk. 20, zusammen Mk. 50 ab hier.
858] **Dr. Kirn, Heilbronn a. N.**

Suche: 0,1 Zebrafink, zuchtfähig.
Gebe ab: 1,1 Wellens., grün M. 12.50
1,0 „ gelb „ 7.—
Jos. Porzelt, München,
Klarastr. 3. [859

Schamadrosseln

prima Sänger 60.— M.

Schamaweibchen		50.—
Rötelmerle (Oroscirtetes erythrogaster)		80.—
Blauroischwanz (Phoenicurus frontalis)		80.—
Weißbrüstiger bl. Waldschmätzer (Tarsiger rufilata)		85.—
Klarino		40.—
Indische Bergmeise		30.—
Maskenwürger (Lanius vittatus)		20.—
Grauwürger (Lanius lathora)		20.—
Flötenwürger (Laniarius rufiventris)		30.—
Würgerschnäpper		20.—
Borstenhäherling (Janthocincla lineatum)		20.—
Blauspötter (Melanotis caerulescens)		35.—
Graublauer Fliegenschnäpper		50.—
Reisfinken	Paar	5.—
Schwarzkopfnonnen	Paar	4.50
Safrankfinken	Paar	8.—
Weißkehlpfäffchen	Paar	10.—
Grau- u. Schwarzkappenpfäffchen		10.—
Kronfinken	Paar	15.—

Yarellszeisige	Stück	12.—
Kapkanarien	Stück	15.—
Angolagirlitze	Paar	15.—
Mossambikzeisige v. Kap	Paar	18.—
Königswitwen	Stück	12.—
Schnurrbärtchen	Paar	15.—
Blauastrilde	Paar	10 —
Elfenastrilde	Paar	22.—
Wachtelastrilde	Paar	36.—
Granatastrilde	Paar	50.—
Weißwangenlerchen	Stück	2.50
Schmetterlingsfinken	Paar	2.50
Orangebäckchen	Paar	2.50
Bandfinken	Paar	2.50
Grauastrilde, Amaranten, Webervögel	Paar	2.00
Atlasfinken	Paar	2.00
Silberschnäbel	Paar	2.30
Schönbürzelchen	Paar	4.00
Kleine Elsterchen	Paar	4.00
Grauedelsänger, o. Garantie,	Stück	2.00
Grassittiche	Paar	12.—
Wellensittiche, grün u. gelb,	Paar	12.—
Katharinasittiche	Paar	28.—
Pavuasittiche	Paar	40.—
Feuerflügelsittiche	Paar	40.—
Sperlingspapageien	Paar	15.—
Blaustirnamazonen	Stück	60.—
Graupapageien	Stück	120.—
Kleiner Gelbhaubenkakadu,	Stück	50.—

Porto u. Verpackung M. 3.50, als Dringend M. 6.50, Versand p. Nachnahme. [860

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a.

Papage

(Blaustirnamazone), jung, zahm, l. Gefieder, bereits ganze Sätze sprech. Preis geg. Nachnahme 75 M., abzuge.
L. Berghold, Hildburghause.
Häfenmarkt 9. [
Tausche evtl. geg. nur erstklas.
Schamadrosse.

1,1 Grauedelsänger, Anf. 24 eing. für M. 8, **1,0 Indigofink,** April eingef., für M. 10, tadellos in j. Hinf. möglichst zusammen abzugeben. Verp. einschl., Porto extra. [
Karl Steinhäuser, Darmstad.
Mathildenstr. 52.

Junge grüne
Wellensittiche
im Freiflug gezüchtet, blutsfremd, kräftig, à 5.— M. [
R. Huth, Perleberg.

Zu verkaufen:
Blaustirnamazonen-Papagei
Preis 200.— M. mit Bauer, kein Bei und Schreier, fingerzahm, spricht, sin pfeift u. lacht. Kleiner Krallenfehler. [
Reinh. Oehler, Lugknitz O.-L.

Suche zu kaufen **prima Amer. Spottdrossel. Tausche** eventl. auch mit **prima Schama.** [
Wilh. Pfistner, Ludwigsbur.
Karlstr. 40.

Verkaufe: roten Kardin. gesund. . 20.—
Vert.: Rotkehlchen geg. and. Vö.
Oskar Sprewitz, Torgau,
Schloßstraße 12. [

Tausche

reinrassige **Zwergrehpinscher,** RM. und Hündinnen, schwarz mit bra. 5 Monate u. 2 Jahre alte, gegen **Pa.geien** oder **Prachtfinken.** [
Jacob Baron,
Hambach bei Neustadt-Haa.
(Rheinpfalz).

Tausche!

1 Zuchtpaar gr. Wellensittiche 0,1 gelbe Wellensittiche gegen prima Schwarzplättchen, ebensolche Feldlerche oder an. gutsingenden Weichfutterfres.
F. Breitfeld, Gera-R.
Nordstr. 15. [

Inserate

für das am 2. Juli 1925 z. Ausgabe gelangende Heft 27 i. Gef. Welt erbitten bis 27. Ju.

Beschwerden wegen Nichtzustellung der „Ge.fiederten Welt" sind bei zuständigen Postamt a. zubringen.

Undeutlich

geschriebene Inserat.

Nach einer Entscheidung des Rei. gerichts braucht für Fehler in einer A. zeige, welche infolge unleserlich od. undeu. geschriebenen Manuskriptes entstan. sind, keinerlei Ersatz geleistet zu werd. Das Reichsgericht ging hierbei von der A. sicht aus, daß Anzeigen, welche man e. Zeitung zusendet, **deutlich** geschrie. sein müssen.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 2. Juli 1925 | Heft 27

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Vogelliebhaber in China*).

Von Dr. Hugo Weigold**), Direktor der Naturwissensch. Abtlg. am Provinzial-Museum zu Hannover.

(Nachdruck verboten.)

Müde und unlustig stolperte ich nun schon den achten Tag auf den steinbelegten Fußwegen durch den östlichen Teil Szetschwans, der reichsten Provinz des fernen inneren, unendlichen China. Da klingt plötzlich von einem kleinen Tempel auf einem Hügel links von mir ein eigentümliches Schwirren und Klingen herüber, über das ich mir gar nicht klar werden kann. Trotz aller Müdigkeit muß ich da doch einmal nachsehen und gehe hinüber. Mit mir kommt ein gutgekleideter Chinese, der einen großen hohen Vogelkäfig trägt, mit Tuch überzogen. Wir treten ein durch das Tor und ein toller Lärm empfängt uns. Freilich hätte ich all den verzückt lauschenden würdigen und wohlhabenden Herren, die da herumsaßen und standen, von „Lärm" geredet, sie hätten mich für den schlimmsten Banausen der Welt gehalten und sicher hätten sie gesagt: „Na ja, von einem solchen Barbaren von jenseits des Meeres kann man es ja nicht besser erwarten."

Ringsherum im Tempelhof hingen und standen Dutzende von Bambuskäfigen, und in jedem mühte sich eine Brillenlachdrossel (Janthocincla oder Trochalopteron canorum oder fausta, wie man sie bei den ewig wechselnden Namen nun nennen will (Abb. S. 311)), ihre vielen Konkurrenten zu übertrumpfen mit immer lauteren jauchzenden Rufen. Und wenn eine einmal vor lauter Anstrengung nicht mehr japsen konnte, so kam der Herr, um ihren und seinen Ruhm besorgt, und reizte sie durch zischende und schwirrende Geräusche von neuem zum Singen an.

Ich war in ein Wettsingen geraten, veranstaltet von den zahlreichen Liebhabern der „Hoa-méi" (fast wie Hwa-mi zu sprechen), die in Mittelchina der beliebteste aller Käfigvögel ist. Schade, daß ich keine Zeit hatte, bei dieser sympathischen Feier länger zu verweilen.

Ähnliches kann einem in China öfters begegnen. Zum mindesten sieht man in Nordchina bei den großen Städten an schönen Tagen überall Chinesen, die in Ausgehkleidern spazieren gehen, in der Hand den Käfig mit ihrem Lieblingsvogel oder gar mit diesem Liebling frei auf einem in der Hand getragenen Stäbchen. Dieser Anblick des lustwandelnden Chinesen, besonders des besseren Herrn, mit seinem sorgsam umhüteten Vogelbauer, ist schon sprichwörtlich geworden, und man kann sich in der Tat kaum anders einen spazierenden Chinesen vorstellen. Denn sonst liegt ja dem Chinesen alter Art körperliche Anstrengung, also auch das Spazierengehen, fern. Nur um seines geliebten Piepmatzes willen tut man es.

Lebhaft steht mir noch eine Szene aus Peking in der Erinnerung. Es war am 25. Januar. Ein sonniger, stiller und warmer Tag, der ins Freie lockte. Ich machte einen Spaziergang innen an der Mauer der „Tartarenstadt" entlang und kam dabei in die Südostecke, wo es große freie Plätze gibt. Hier sieht man immer zahlreiche Vogelliebhaber bei der Abrichtung ihrer Frischfänge. Fast jeder Chinese hier ist ja Liebhaber, aber sehr verschieden ist das Geschick, die Tiere zu halten. Die meisten kaufen sich für wenige Kupferstücke einen oder ein Paar Vögel in der Zugzeit, wo es im Gegensatz zu der sonst im Winter und Sommer herrschenden Öde von wandernden Vögeln wimmelt. Wer irgend kann, versucht sich auch selber im Fang, der ja bei der Nahrungsarmut dieses im Frühling noch wüstenhaften Landes leicht ist, denn die hungrigen Vögel fallen leicht auf den Köder. Aber gewöhnlich dauert die Freude des unverständigen Vogelhalters nicht lange, dann ist das arme Tierchen tot. Am besten halten sich natürlich die reinen Körnerfresser und Lerchen. Wenn man auch alles mögliche gelegentlich im Käfig sieht, so herrschen doch einige Arten ebenso vor wie bei uns Kanarienvögel, Stieglitz und Zeisig. Hier in Peking hat man es am meisten auf freifliegende Kernbeißer abgesehen, meist die großen Eophona oder Maskenkernbeißer mit ihrem klobigen Schnabel, aber auch unseren kleineren gemeinen Kernbeißer.

Man legt diesen Vögeln nach dem Fang ein weites Halsband aus Garn um, das an der Brust in einem Schnurendchen mit einem ganz feinen Haken oder einer Öse endet. Da das Halsband vollständig

*) Originalbeitrag für das 5. Jahrbuch der A. Z.

**) Mit Erlaubnis des Herrn Verfassers zum Abdruck i. d. „Gef. Welt".

unsichtbar unter dem Gefieder verschwindet, guckt nur dieser Metallhaken unten aus dem Brustgefieder heraus, und es sieht genau so aus, als ob der Haken unmittelbar durch das Brustbein gestoßen wäre. Welch entrüstete Ausbrüche über die grausamen Chinesen habe ich dabei erlebt! Sogar ich konnte mir zunächst keine andere Deutung denken. An diesem Häkchen wird nun die Dressurschnur befestigt, die mit ihrem anderen Ende an dem Sitzstäbchen des Vogels in des Meisters Hand befestigt ist. Man wirft nun den Vogel öfters durch eine leichte Bewegung des Stäbchens in die Luft, er flattert soweit es ihm die mehr oder weniger lange leichte Schnur aus Seide gestattet, und kehrt dann auf den Pfiff des Herrn zur Hand oder auf das Stäbchen zurück, wo er unweigerlich und sofort ein Korn bekommt. Glaubt man, seines Vogels ganz sicher zu sein, so daß er auf den Pfiff sofort zur Hand und zu seinem Belohnungskorn zurückkehrt, so läßt man die Schnur ganz weg. Die Vögel einer ganzen Menge der dort versammelten Liebhaber saßen hoch auf den kahlen Pappeln.

Da erschien plötzlich in der Luft ein Sperber. Jeder Vogelhalter hatte ihn sofort bemerkt, alles pfiff und mit verblüffender Gewissenhaftigkeit stürzten sich sofort alle Eophona und Kernbeißer hinunter auf die Hände und Stäbchen ihrer Herren, noch ehe der Räuber seinen Vorteil gewahrt hatte. —

Im Bauer hält man in Nordchina weitaus am meisten die Bailing, die Mongolen-Kalanderlerche (Melanocorypha mongolica). „Hundert Melodien" nennt sie der Chinese wegen ihres fabelhaften Talentes, die Stimmen anderer Vögel aufs Getreueste anzunehmen. Der Vogel hat zwar einen eigenen recht netten Lerchengesang, aber den kann er nur instinktiv produzieren, weil er, zu Hunderten zusammen in je einem Korb, als Flaumjunges oder halbflügge in der mongolischen Steppe jenseits von Kalgan dem Nest entnommen wurde und an der Tragstange des Kulis hängend nach China hereintransportiert wurde. Es fehlen ihnen allen also die Vorsänger, und so nehmen sie unweigerlich an, was sie während ihres Aufwachsens hören. Der gute Vogelhalter, der etwas davon versteht, hängt die junge Bailing natürlich neben seine liebsten Sänger, damit sie deren Weisen annehme. Der gewöhnliche Mann aber hat meist keine Vorsänger zur Verfügung, bei ihm hängt die Lerche im Bauer über dem Ladentisch des offenen Verkaufsstandes oder in der offenen Werkstatt, wo sie allen Straßenlärm hört. Und siehe, es dauert nicht lange, so kann die Lerche wunderbar quietschen, genau so gut wie das nie geschmierte Rad des mit vier ausgewachsenen Schweinen belasteten Schubkarrens auf der Straße. Dann folgt das Krähen des Gockels von nebenan und das Miauen der Katze. Kurz, lauter dummes Zeug, aber alles mit solcher Meisterschaft nachgeahmt und jedes für sich absolut rein und niemals vermischt vorgetragen, so daß man sich sagt: was gäbe ich drum, wenn ich eine solche halbflügge Mongolenlerche zu Hause hätte, ehe sie all diese dummen Alltagsgeräusche lernt!

So eine junge Mongolenlerche neben eine Nachtigall hängen und dann neben ein Rotkehlchen, dann neben ein Schwarzplättchen, dann neben einen Zeisig, und dann und dann . . . Ich glaube, wenn sie auch nicht gerade 100 Weisen lernen könnte, so doch ein halbes oder ganzes Dutzend. Das wäre dann wunderbar: viele Monate lang könnte man dann all diese herrlichen Gesänge, sauber, rein, glockenklar aus einem einzigen Schnäbelchen hören, einem Schnäbelchen, das sich mit Zwieback, Sämereien und gelegentlich etwas hartgekochtem Ei (chinesische Fütterung!) viel müheloser und billiger halten ließe als das ganze Orchester der Weichfresser.

Mag ja sein, daß ich der kleinen Kehle an Stimmumfang gar zu viel zutraue, aber das steht eben fest, daß sie ganz erstaunliche Fähigkeiten in sich birgt. Hören wir, was ich von solch einem Vogel ins Tagebuch schrieb: „Es ist einfach fabelhaft, wie echt alles herauskommt: das Miauen der Katze, das Schackern der Elster nnd das Schelten der Spatzen, der Schwunsch des Grünlings und sein Klirren, der Schlag der rubinkehligen Nachtigall von nebenan, das Plaudern der Stare oder der frohlockende Ruf des Waldwasserläufers, der ein paarmal rufend vorbeigeflogen ist. Eine Grenze für ihr Talent scheint es nicht zu geben. Das Schönste aber bei ihr ist, daß sie niemals mischt, wie etwa die Würger das tun: wahrhaftig sie ist ein idealer Spötter!"

Es müßte gar nicht schwierig sein, von irgend einer mandschurischen Station der Sibirischen Bahn einen Korb voll nestjunger Vögel mitzubringen. In acht Tagen könnte er in Deutschland sein, ehe die Jungvögel allzuviel Unfug gelernt haben. In Peking kostet eine junge Mongolenlerche von 50 Pf. bis 2 M. als Nestling, viele Dollar aber als ausgewachsener Vogel. Der Preis richtet sich natürlich nach den Vorsängern, deren Stimmen der Vogel angenommen hat. In Peking ist ein großes Angebot von Zehntausenden, aber die Nachfrage scheint noch größer zu sein.

Im Großpäppeln von Nestjungen sind die chinesischen Vogelliebhaber sehr groß. Ich sah sie bei allen möglichen Arten an der Arbeit, aber meist überschätzen sie doch ihre Fähigkeiten und die armen Insektenfresser gehen meist zugrunde.

Glücklich großgewordene oder alt gefangene Insektenfresser füttert man gern mit Heuhüpfern, die man auch Staren usw. als Zukost gibt. Es ist immer eine kleine Armee von Jungens unterwegs in China, am frühesten Morgen meist, wenn der Tau die Insekten langsam macht, um Heuhüpfer und andere Kerse und Spinnen zu fangen, die dann auf den Vogelmarkt kommen.

In Mittelchina, wo er zu Hause ist, und selbst bis in die Provinz Tschili nach Norden exportiert, ist der Bürstenschnabelstar (Acridotheres cristatellus), der Liu-go der Chinesen, wohl der gemeinste Käfigvogel. Nicht daß er besonders hervorragend sänge — halb Star, halb Amsel —, aber er ist billig, da gemein, leicht zu ernähren und immer lustig anzuhören und anzusehen. Meisen sah ich nie im Bauer, wohl aber im Süden sehr oft die „Liebessehnsucht", den Brillenvogel, (Zosterops palpeprosa simplex *Sw.*). Es scheint, daß dieser süße winzige Kerl sich gar nicht so schwer halten läßt, als man denken sollte. Wahrscheinlich wird es mit Feigen

erreicht. Würger, meist Lanius cristatus isabellinus, werden leicht gefangen und als Käfigvogel geschätzt, auch Seidenschwänze sieht man im Norden gelegentlich.

An die Haltung von Fliegenschnäppern traut man sich nicht oft heran, obgleich es sowohl äußerste Farbenpracht als auch herrliche Sänger bei ihnen gibt. Ja, ich bin noch immer der Meinung, daß jenes Exemplar des kleinen blauroten Muscicapa tickelliae whitei, das ich am heiligen Berg Omêi in der Provinz Szetschwan im subtropischen Hangwalddschungel stundenlang verhörte, alles übertrumpfte, was ich in meinem Leben an Vogelgesang gehört habe. Freilich, über Vogelgesänge kann man ja die verschiedensten Meinungen haben, auch ist man dabei selber sehr abhängig von seiner augenblicklichen Stimmung wie überhaupt bei der Musik. Aber ein derartiger Born immer neuer Melodien, unerschöpflich sprudelnd, ohne Pause dichtend, immer neu, immer schön, ohne einen Mißklang, jetzt süß innig wie das Schluchzen der sanftesten Nachtigallstrophe, jetzt wieder jubelnd und frohlockend, nun das allersüßeste Rohrsängerliedchen, das man sich denken kann, und immer wieder Neues, immer wieder Überraschendes! — — Wie schade, daß sich diese halbtropischen Fliegenschnäpper bei uns nicht wohl fühlen, um dieses Gold ihrer Kehle sprudeln zu lassen. Es werden immer wieder indische Blauschnäpper aus dieser Familie eingeführt, aber erstens sind die Formen schwer auseinander zu halten, zweitens sind die Gesänge der einzelnen Arten wohl noch kaum bekannt, drittens wollen sie bei uns nicht recht singen und viertens leben sie selten lange. Es scheint auch, daß bei ganz nahe verwandten Arten die allergrößten Unterschiede in der sanglichen Begabung bestehen.

Unter den Timalien, jener ungeheuren nichtssagenden Zusammenraffung tropischer Bambus- und Dschungelvögel, gibt es eine Fülle der niedlichsten Kerlchen, ungemein zutraulich oft, wie es Dickichtvögel von Natur aus sind, keine großen Sänger, aber wirklich „süß" mit ihrem strahlig lockeren Gefieder und den großen Rotkehlchenaugen. Ich denke vor allem an die verschiedensten Proparus-Arten. Nur schade, daß diese Vögel als Bewohner der wildesten Winkel Chinas bei den Chinesen selber wenig bekannt und beliebt sind. So wird man sie auch schwer durch sie beziehen können. Zu fangen müssen sie leicht sein. Einen von dieser Gesellschaft freilich bekommen wir sehr oft zu sehen: die sog. Chinesische Nachtigall (Liothrix lutea), die natürlich mit einer Nachtigall gar nichts zu tun hat.

Dagegen ist eine echte Nachtigall, das Rubinkehlchen (Luscinia calliope *Pallas*), in China ein sehr beliebter Käfigvogel und seltener sieht man auch die Blaunachtigall (Luscinia cyane).

Sehr mit Recht ist auch der schwarzweiße Hüttensänger (Copsychus saularis) im Süden Chinas äußerst beliebt. Er ist zutraulich, singt schön und erfreut das Auge. Er wird auch für uns leicht zu beschaffen sein, verträgt aber nicht viel Kälte.

Am häufigsten und geradezu typisch für die chinesische Vogelliebhaberei ist und bleibt aber eben die Brillen-Lachdrossel, die Hoa-mêi, Chinas Liebling, mit dem jede Plauderei über Chinas Vogelhaltung beginnen und schließen muß.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Unter den Neueinführungen des Berliner Zoologischen Gartens sind besonders auffallende Erscheinungen einiger Papageien, die bisher noch nicht in den Zoologischen Gärten vorhanden waren. Zwei Arten Breitschwanzloris, darunter eine bisher noch

Augenbrauenheherling (s. S. 309).

unbekannte Art und ein prächtig gefärbter Fledermauspapagei, sollen uns zunächst beschäftigen.

Die außerordentlich farbenprächtigen und in der Gefangenschaft so munteren und bewegungslustigen Loris finden stets das Interesse der Vogelliebhaber. Sie werden auffallend schnell zahm und zutraulich, sind keine starken Nager, viele unter ihnen haben die Fähigkeit, Worte nachsprechen zu lernen und verschiedene Arten sind geneigt, in der Gefangenschaft zur Fortpflanzung zu schreiten. Trotz dieser großen Vorzüge haben sie in den Kreisen der Vogelliebhaber doch nicht so viele Pfleger gefunden, wie man erwarten sollte. Das ist verständlich, weil die Loris bei ihrer seltenen Einführung ziemlich hoch im Preise stehen und die frisch eingeführten Vögel dieser Gruppe doch häufig sehr hinfällig sind. Dr. O. Heinroth führt diese Hinfälligkeit der frisch eingeführten auf die niedrige Temperatur unseres Klimas, auf Wärmemangel, zurück, den die in einer Durchschnittswärme von + 26— + 32° C. lebenden Loris nicht vertragen. „Die gefangenen Loris sind an Ort und Stelle durchaus nicht die hinfälligen Vögel, wie wir

sie hier zu sehen gewöhnt sind. Der Malaie oder Chinese schützt sie weder ängstlich vor Aufregung, noch füttert er sie besonders sorgfältig, und doch halten sie sich gut.“ Es ist zweifellos nötig, frisch eingeführte Loris in höherer Wärme zu halten, wie das ja auch erfahrungsgemäß bei fast allen anderen Papageien, welche aus heißen Landstrichen zu uns kommen, z. B. den frisch eingeführten Graupapageien geschieht und sie allmählich an das Ertragen niederer Wärmegrade zu gewöhnen. Daß das mit gutem Erfolg möglich, haben viele lange Zeit in der Gefangenschaft lebende und manche in unseren Sommermonaten in Außenvolieren zur Fortpflanzung schreitende Loris bewiesen.

Ein anderer Übelstand ist die Ernährung der Loris. Sie sind im allgemeinen Fruchtfresser. Der Schnabel der Loris ist nicht für das Verzehren von harten Sämereien geeignet. Die Innenfläche der Oberschnabelspitze ist glatt, ohne Feilkerben, welche den Samen fressenden Papageien das Zerkleinern harter Körner ermöglicht oder wenigstens erleichtert. Auch fehlt dem schmalen Schnabel der Loris ein ausgesprochener Zahnausschnitt. Ihre Zunge ist mit faserigen Papillen besetzt, so recht geeignet Blütenhonig und Baumsaft aufzufangen, die neben saftigen weichen Früchten ihre Nahrung bilden. Daß man den Loris in der Gefangenschaft ein Fruchtfutter bieten muß, ist selbstverständlich. Aber bei allen Fruchtfressern ist die übelste Seite ihrer Haltung die arge Schmutzerei durch die häufigen und dünnflüssigen Entleerungen. Um der argen Schmutzerei dieser Fruchtfresser vorzubeugen, hat man es versucht, und in manchen Fällen mit Erfolg, sie an die Annahme von harten Samen zu gewöhnen, welche sie dann später als Hauptfutter erhielten, während Obst nur nebenbei oder als Leckerbissen gereicht wurde. Die Annahme, welche auch jetzt noch vielfach verbreitet ist, daß ein Lori erst als eingewöhnt zu betrachten sei, wenn er harten Samen verzehrt, ist durchaus irrig. Der Schnabelbau und der ganze Verdauungstraktus ist der von Fruchtfressern, von Vögeln, welche auf die Annahme weicher, flüssiger oder doch wenigstens sehr saftreicher Nahrung angewiesen sind. Eine derartige Nahrung ist naturgemäß auch den Loris zu reichen. Bei der Ernährung der Loris ist die Hauptsache, „daß das Futter recht wässerig sei und leckend verzehrt werden kann“ (Heinroth). Man reicht ihnen ein Gemisch von erweichtem Weizengebäck, etwas gekochtem Reis, Ameisenpuppen mit Kochzucker überstreut, dazu zuweilen auch etwas feingewiegtes hartgekochtes Ei, rohes Gelbei mit Honig vermengt, auch gute kondensierte Milch mit Honig, dazu aber stets reichlich frische oder auch getrocknete Früchte und Beeren aller Art, ganz oder in Stücke geschnitten. Gern werden frische Weiden- und Obstbaumzweige benagt. Manche, besonders die Keilschwanzloris, fressen nebenbei auch einmal einige Samen wie Hirse, Spitzsamen, Hafer, halbreifen oder erweichten Mais.

Die Stimme der Loris ist nicht gerade angenehm. Besonders die Keilschwanzloris, welche meist in Flugräumen gehalten werden, zeichnen sich durch laute, kreischende Rufe aus, die aber die Breitschwanzloris, zu denen auch der neueingeführte

Salvadoris Breitschwanzlori — Lorius salvadorii *Meyer*

gehört (s. Abb. S. 313), bei der schnellen Zunahme ihrer Zahmheit und bei ihrem sanften Wesen kaum noch hören lassen. Salvadoris Lori ist dem bekannten Frauenlori ähnlich, anscheinend auch im Wesen. Der Frauenlori ist auch in seiner Heimat, dem nordwestlichen Neuguinea und einigen benachbarten Inseln, ein beliebter Käfigvogel, dessen anschmiegsames Wesen auch von den deutschen Liebhabern, welche ihn pflegten, gerühmt wird. Ein Vogel dieser Art im Besitz eines bekannten Liebhabers sprach ziemlich viel, besonders des Abends und war auch geneigt, Lieder nachzupfeifen zu lernen. Sie sind für Flugräume weniger geeignet. Ihr ganzes Wesen macht sie zu angenehmen Gesellschaftern ihres Pflegers, ähnlich wie Amazonen und Graupapageien.

Gefiederbeschreibung: Kopfplatte schwarz; Kopfseiten, Kehle, Brust, Bauchseiten, Hinterrücken, Bürzel, Oberschwanzdecken rot; Genickband, Band über den Vorderrücken heller rot; Hinterhals sich halsbandartig auf die Halsseiten ausdehnend, Vorderrücken schwarz mit veilchenblauem Schimmer; Bauchmitte, Unterschwanzdecken, Schenkel leuchtend blau, letztere mit Grün gemischt; Flügel grün, einige Federn goldigoliv verwachsen; kleine Unterflügeldecken blau, die größten schwarz, mehr oder weniger mit Gelb am Grunde; Schwanzfedern am Grunde dunkelrot, in der Mitte grün, Spitzenhälfte dunkelblau; Schnabel rot; Auge hellgelb; Füße schwarz; Lg. 290—300, Fl. 155 bis 157; Schw. 100 mm.

Das Wohngebiet von Salvadoris Lori ist die Astrolabebai im nordwestlichen Neuguinea.

Im Jahre 1922 befanden sich im Vogelhaus des Berliner Zoologischen Gartens ein Paar Loris, welche sich durch einen weißen Nackenfleck von den verwandten Arten unterschieden. Sie wurden damals nicht als besondere Art erkannt. Lord Rothschild-London erhielt im vorigen Jahre eine Reihe von Bälgen dieser Vögel, die er Domicella albidinucha — Weißnackenlori benannte. Die Vögel wurden in dem Gebirge an der Südwestküste Neu-Mecklenburgs erlegt. Beschreibung und Abbildung dieser Vögel folgt.

Ein recht merkwürdiger Papagei ist in den letzten Jahren das erstemal nach Europa, und zwar in den Besitz eines englischen Vogelliebhabers gelangt, der auf S. 315 abgebildete

Borstenkopf — Dasyptilus pesqueti *(Less.)*.

Die Einreihung dieses Vogels in das wissenschaftliche System hat den Gelehrten viele Schwierigkeiten gemacht. Wagler stellte ihn zu den Ararakakadus, Salvadori im Katalog des Brit. Museums reiht ihn den Vasapapageien an, Schlegel und auch Reichenow stellt ihn zu den Nestorpapageien. Reichenow charakterisiert ihn aber als „abweichende Form mit nackten Kopfseiten, deren Stellung in der Gruppe der Nestoriden noch nicht einwandfrei ist“. Charakteristisch für den kräftigen etwa krähengroßen Vogel ist die Befiederung des Kopfes. Stirn, Vorderkopf, Zügel, Wangen, Augengegend und Oberkehle sind nackt und nur mit einzelnen borstenartigen, starren Federschäften besetzt; die langen, aber nicht spitzen Flügel haben lange auffallend breite Handschwingen. Das Gefieder ist derb, breit und abgestutzt, an Hinterkopf und Ohrgegend befinden sich harte steife Borstenfedern. Der Schnabel ist ähnlich dem der Graupapageien, aber niedriger und gestreckter, die Füße

sind sehr kräftig. Die Heimat des Vogels ist Neuguinea.

Nach A. B. Meyers Mitteilungen kommt der Vogel so selten vor, daß ihn ein ganzer Sagenkreis umgibt. Im Walde trifft man sie meist nur einzeln sagt derselbe Forscher, während Beccari sie meist pärchenweise traf oder in Familien von drei bis fünf Vögeln und D'Albertis eine Schar von etwa 50 Vögeln beobachtete, welche sich abends auf einem sehr hohen Baume zur Nachtruhe versammelten, um sich am Morgen, bald nach Sonnenaufgang, gemeinsam zu erheben. In ihrem Wesen sollen sie außerordentlich scheu sein und rastlos umherstreifen. Ihre Rufe sind rauh und so laut, daß man sie weithin hören kann. Über die Nahrung sagt Beccari: „Diese Vögel leben von Früchten, oder vielmehr von den Samen, deren Fruchtkapseln sie zerreißen."

Die Eingeborenen, welche die Seltenheit dieses Papageis bekannt ist, treiben mit ihren Bälgen ebenso Handel, wie mit den Paradiesvogelbälgen, mit denen sie ungefähr gleich hoch bewertet werden. Man findet aber auch zuweilen lebende Borstenköpfe bei den Papuas. Diese werden mit Bananen ernährt, von denen sie große Mengen verzehren. Lange ertragen diese Papageien die Gefangenschaft nicht. „An ein rastloses Leben gewöhnt, lag in der Gefangenschaft allein schon eine genügende Ursache für das Ableben", sagt Dr. A. B. Meyer. Daß er mit dieser Annahme nicht Recht hat, beweisen die schon mehrfach von Liebhabern in Neuguinea, Indien und neuerdings in England gehaltenen Borstenköpfe.

Gefiederbeschreibung: Schwanz, Brustfedern braungrau gesäumt; Bauch, Seiten, Ober- und Unterschwanzdecken, rot; Stirn, Kopfseiten, Kehle mit wenigen borstenartigen Federn; Federn auf Scheitel und Nacken schmal, zugespitzt; mittlere Flügeldecken, Außenfahne der Armschwingen, Unterflügeldecken rot; Schwanz schwarz; Schnabel, Füße schwarz; Auge kastanienbraun; Lg. 500—525, Fl. 300, Schw. 175 mm.

(Forts. folgt.)

Etwas über die Ernährung zarter Weichfresser.

Von Karl Finck, Neukölln.

(Nachdruck verboten.)

Die Pflege des Zaunkönigs, Sprachmeisters, Sumpfrohrsängers, der Goldhähnchen usw. ist ungemein mühevoll. Jedenfalls vermochten viele Besucher der schönen zweiten großen Vogelschau, welche die Vereinigung der Vogelliebhaber (Landesverband Preußen) vom 19.—23. November 1924 in Berlin veranstalteten, das bedeutende Können, die unsere Liebhaberei erfordert, kaum halbwegs richtig einzuschätzen.

Die Vogelliebhaberei liegt von alters her dem deutschen Volke im Blute; sie fördert ungemein den Naturssinn und löst bei geeigneter Anleitung einen tiefen, reinen Idealismus aus.

Salvadoriëlori (s. S. 312).

Warmherzige Naturschwärmer, wozu vor allen Dingen auch echte Vogelfreunde gehören, verstehen sich immer. Im geselligen Verkehr kommen die sozialen Unterschiede kaum zur Geltung, weil eben die Begeisterung schnell alle Gegensätze überbrückt. Selbstverständlich bilden einschneidende Meinungsverschiedenheiten keineswegs Seltenheiten. Solche treten namentlich hervor, wenn die leidliche Fütterungsfrage angeschnitten wird. Anfänger werden häufig vollständig mutlos, sobald sie derartige Debatten mit anhören. Natürlich lobt jeder Vogelpfleger seine Methode über Gebühr und will damit stets die besten Erfahrungen gemacht haben.

Nun führen viele Wege nach Rom. Recht haben fast alle, obwohl nur mit gewissen Einschränkungen. Freilich ist es oft schwierig, aus den vielen Behauptungen und angeblichen Beobachtungen den wahren Kern der Sache herauszuschälen.

Wo aber die Auflösung gelingt, findet man regelmäßig, daß in erfolgreichen Fällen die Naturgesetze, woran auch das Leben der Vögel gebunden ist, zielbewußt oder zufällig mehr und minder zur Anwendung gelangten.

Herr Linke, unser früherer Vorsitzender, der der „Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin“ angehört, hielt vor dem Kriege Nachtigallen, Sprosser, Graudrosseln, Rotkehlchen, Gelbspötter und Grasmücken einzeln in Flugkäfigen, fütterte im Winter vorzugsweise trockene Ameisenpuppen, selten mit etwas Mohrrübe angefeuchtet, und gab sogar in der Ruhezeit reichlich Mehlwürmer. Seine Pfleglinge sangen trotzdem im Frühjahr laut und fleißig.

Nicht oft hörte ich bei Vogelfreunden einen derart vielseitigen, wunderbaren Gesang.

Konservative alte Wiener, die für jede Vogelart nur eine bestimmte Käfiggröße gelten lassen, selbst die kleinste Abweichung in der Fütterung verwerfen, hätten sicher vor Erstaunen oder Entrüstung die Sprache verloren.

Das System fand selbstverständlich Nachahmer. Aber bei den anderen Liebhabern wurden die Vögel schnell übermäßig fett; es entstanden wahre Prachtexemplare — für jede Mastviehausstellung geeignet.

Die Erklärung der so verschiedenen Resultate bei vollständig gleichartiger Fütterungsweise verursachte hier kaum Umstände.

Herr Linke war tagsüber wenig zu Hause, die Vogelstube wurde nur mäßig erwärmt und abends selten beleuchtet. Die Vögel mußten an den kurzen Tagen reichlich gehaltvolleres Futter aufnehmen, zumal sich jedes Tier in einem verhältnismäßig großen Käfig befand.

Machte sich dennoch bei einem Vogel Fettsucht bemerkbar, dann entfernte der Pfleger einfach das mittlere Sprungholz, und die vermehrte Fluggymnastik führte schnell einen genügenden Ausgleich herbei.

Im Sommer gab es vorwiegend frische Ameisenpuppen. Die Gesangsperiode setzte zwar verhältnismäßig spät ein, dauerte jedoch dafür um so länger.

Das geschilderte System war den Verhältnissen angepaßt und versagte natürlich, wo andere Lebensbedingungen vorlagen.

Ich dagegen konnte meinen Lieblingen nur kleinere Käfige bieten. Außerdem brannte in der bewohnten, daher bedeutend wärmeren Stube an den Abenden lange Licht.

Um krankhafte Verfettung zu vermeiden, blieb mir weiter nichts übrig, als das tägliche Futter, welches vorzugsweise aus trockenen, mit Möhren- oder Obstsaft angefeuchteten Ameiseneiern und Insektenschrot bestand, in zwei bis drei Gaben zu reichen, zwar derart, daß zwischen den Mahlzeiten immer eine ein- bis eineinhalbstündige Fastenperiode lag.

Die Vögel begannen regelmäßig frühzeitig mit ihrem Gesang und jubelten bis in den Juli hinein laut und feurig. Aber nicht aus Hunger, wie mir häufig vorgeworfen wurde, sondern weil sich die Tiere in einem normalen Ernährungszustande befanden und ihre volle Lebenskraft besaßen.

Im Sommer verabfolgte ich viel frische Puppen, ebenso allerlei lebende Insekten.

Schließlich versuchten auch andere Vogelfreunde die geteilte Fütterungsweise und wohl meistens mit Erfolg. Bei einem Bekannten schlug die Nachtigall in diesem Jahre (1924) acht volle Monate buchstäblich den ganzen Tag. Der ununterbrochene Schlag war mit der Zeit den Familienmitgliedern lästig.

Dergleichen Ergebnisse lassen sich unschwer erreichen. Allerdings gehört Umsicht dazu.

Ameisenpuppen, Weißwurm und sonstige Futtermittel stehen hoch im Preise. Mancher Liebhaber sieht besorgt in die Zukunft und muß mit betrübtem Herzen seinen Vogelbestand verringern.

Die Ernährung der zartesten Weichfresser ist bekanntlich ungemein schwierig. Erschwert wird die Aufgabe noch, wenn die leidige Geldfrage berücksichtigt werden muß.

Eine bedeutende Verbilligung liegt jedoch im Bereich der Möglichkeit, sobald man in der warmen Jahreszeit geeignete lebende Insekten im ausgedehnten Maße verfüttert. Viele Kerfe bilden getrocknet außerdem ein vorzügliches Winterfutter.

Zur leichteren Erläuterung des weiten, nach meiner Ansicht ungemein interessanten Gebietes, unternimmt vielleicht der freundliche Leser im Geiste mit mir einige Spaziergänge, bleibt doch die Natur unsere beste Lehrmeisterin.

Die wenigen sonnigen Tage im März haben die Sehnsucht nach dem Frühling nur vermehrt. Obwohl Felder und Wiesen noch winterlich öde liegen, scheint die Sonne heute wenigstens warm, schon ganz lenzfroh. Das goldene Licht erweckt Leben. Einzelne Buchfinken schlagen bereits voll, andere üben noch, finden keinen Schluß. Im Villenpark klirren Grünhänflinge und flötet eine Amsel ihr schwermütiges, seeliges Auferstehungslied. Auf den Rüstern der Landstraße sitzen mehrere Stare, zischen, pfeifen und plaudern um die Wette.

Links dehnt sich eine große Gemüse-, Blumen-, Obst- und Beerengärtnerei aus. Vor dem Hause blühen die ersten Krokuspflanzen, nicken Schneeglöckchen, schimmern die geschützt stehenden Stachelbeerbüsche schon grünlich.

Wir wollen zunächst die Anlagen durchqueren, da das vielseitig bepflanzte Gelände zahlreiche Vögel beherbergt.

Die Erdbeerbeete sind gereinigt und sauber gehackt. Stare zirkeln emsig zwischen den Stauden, ziehen dabei fortwährend aus der Erde mittelgroße Engerlinge des Junikäfers (Rhizotrogus solstitialis) und die mißfarbene, fettglänzende Erdraupe der Wintersaateule (Agrotis segetum *Hb.*). Der Besitzer, den ich gut kenne, tritt hinzu und meint: „Das muntere Starvolk säubert vorzüglich die Erdbeerkulturen. Freilich plündert die Bande während der Fruchtreife ganz unverschämt, aber ihre Abhaltung ist in der Praxis wenigstens durchführbar, dagegen kann man die Wurzelschädlinge kaum vernichten. Im Frühherbst haben Drahtwürmer, Engerlinge und Erdraupen beinahe sämtliche Neupflanzungen zerstört.“

„Möchte nur wissen, wie die Starmätze in den frisch gelockerten Boden das mehrere Zentimeter tief sitzende Gewürm finden?“ so fuhr der Mann fort.

Tatsächlich sehen wir um manche Stauden zahlreiche glatte Stoßlöcher, dagegen ließen die Vögel andere Pflanzen unbeachtet.

An den Wurzeln der ausgehobenen Senker hängen mehrere Engerlinge und Drahtwürmer.

Über uns, in den Zweigen eines Pflaumenbaumes, lachen fröhlich zwei Sumpfmeischen. Das herzige Pack hat einige Eierringe des Ringelspinners

(Malacosoma neustria *L.*) entdeckt und hämmert emsig die aufgequollenen, zäh verbundenen Schmetterlingseier ab.

Im anliegenden Obstgarten geht es fröhlich zu. Hell locken Kohlmeisen; sie zerreißen immer wieder zum Ärger des Gärtners die Klebegürtel, um das darunter befindliche Ungeziefer zu erbeuten, verzehren auch im Vorwinter die angeklebten, unbeflügelten Weibchen des kleinen und großen Frostspanners (Cheimatobia brumata und Hibernia defoliaria *Cl.*), sofern solche Kerfe nicht so sehr mit Leim beschmutzt sind. Muntere Blaumeisen, keck und ständig zänkisch, suchen emsig in Rindenspalten die länglichen Eierhäufchen der verschiedenen Motten, finden dann

Borstenkopf (s. S. 312).

n Gespinsten noch rötlichgelbe Puppen, zerfetzen Eierschwämme des Schwammspinners (Lymantria dispar *L.*), fangen dazwischen Mücken oder die ersten Fliegen und flattern mit lautem Getriller weiter.

Nur wenige Schritte von den ersten Gewächshäusern geistert im Buschwerk ein Rotkehlchen. Die südliche Sonne hat das sonst schöne Rot seiner Brust ziemlich ausgebleicht. Vor einigen Tagen durchzog das Vögelchen noch die sonnigen Gestade des Mittelmeeres, hält nun ohne Schaden die bitterkalten Nächte aus und singt, wenn das Wetter einigermaßen günstig und der böse Hunger halbwegs gestillt ist, schon laut sein silberklares Lied. (Forts. folgt.)

Moearah-Tjiassem.

29. Mai 1916 bis 2. Juni 1916.

Von August Spennemann.

(Nachdruck verboten.)

Die letzten Mai- und ersten Junitage des Jahres 1916 verbrachte ich an der Mündung des Tjiassem.

Da dieser Teil von Javas Nordküste glücklich noch sehr wenig von Europäern besucht wird und hier infolgedessen noch nicht viel geknallt und noch nicht auf alles kriechende, laufende und fliegende Getier der Finger krumm gemacht und jedes lebende Wesen erbarmungslos niedergeschossen wird, sind die meisten Vögel hier nicht sehr scheu und lassen den vorsichtigen Beobachter bis auf einen verhältnismäßig kleinen Abstand an sich herankommen und in aller Ruhe mit dem Glase beobachten. Auch das Gelände ist ein wahres Dorado für Vögel und Vogelfreunde.

An der rechten Seite der Flußmündung hat sich ein kleiner Strand von zirka 30 m im Geviert gebildet. Hier steht unsere Hütte, einfach gebaut aus einigen Djatibalken und Planken, mit geflochtenen Bambuswänden und bedeckt mit einem Strohdach aus Alang-alang.

Zwischen dem schlammigen und moddrigen Watt und dem Mangrovewald zieht sich ein grauschwarzer Sandstreifen hin, der während der Ebbezeit trocken liegt und worauf das angeworfene Geäst und Reisig den höchsten Wasserstand der letzten Flut angibt. Nicht nur der Sandstreifen wird bei Ebbe trocken gelegt, auch das Watt in einer Breite von vielleicht, schätzungsweise, 50 bis 100 Meter. Hier ist während der Ebbezeit immer alles mögliche zu finden. Nur schade, daß es selbst, wenn man nur mit Badehose bekleidet ist, so sehr mühsam und schwierig ist, hier spazieren zu gehen, der zähe Schlick, in den man bis zu den Knien, ja wohl auch bis über die Hüften einsinkt, ist schwer zu durchwaten und saugt sich dermaßen an die Beine fest, daß sie nur mit Mühe jedes Mal wieder herauszuziehen sind. Die Vögel jedoch haben von all' diesen Mühsalen nichts zu leiden, und ihnen ist auch nach jeder Flut der Tisch auf Watt und Strand reich und reichhaltig neu gedeckt.

Einer der am Watt und im Api-apibusch am meisten auffallenden und am wenigsten scheuen Vögel ist ein prächtiger, großer Eisvogel, der Storchschnabel (Pelargopsis leucocephalus *Gm.*), mit ockergelbem Kopf und ockergelber Unterseite, rotem Schnabel und blaßblauen Flügeln.

Er ist hier ohne Zweifel der häufigste seiner Sippe, manchmal kann man bis zu sechs Stück dieser stattlichen Vögel an verschiedenen Stellen des Watts zu gleicher Zeit sehen. Mit Vorliebe setzen sie sich bei Ebbe auf die Pfähle, die die Fischer für ihre Reusen und ihre Netze in den Schlick gerammt haben oder auch auf die aufrecht hervorstehenden Zinken der hier vielfach angeschwemmten Baumstämme und Wurzelgerippe.

Eichelhäher.

Bei Ebbe findet man auf dem Watt überall die kleinen, bis zu 30 cm langen Schlammfische (Periophtalmus; Fam. Gobiidae) mit ihren dschunkensegel-ähnlichen Rückenflossen. Interessant zu sehen ist es, wenn über eine solche Gesellschaft, die da in Schlamm und Sonne am Spielen ist, wobei sie ihre Rückenflossen mit den zwei oder drei langen, peitschenartig gebogenen Fäden häufig auf und zu klappen, plötzlich ein großer Eisvogel oder irgendein langbeiniger Reiher angeflogen kommt. Im Nu spritzt dann die ganze Gesellschaft auseinander, vergräbt sich, wenn sie gerade weichen Schlamm unter sich hat, an Ort und Stelle, oder sucht unter Zuhilfenahme der beiden Bauchflossen so schnell wie möglich, ruckweise vorwärts schießend, eine geeignete Stelle zu finden. Und der Platz, wo vor einem Augenblick noch eitel Leben und fröhliches Spiel war, ist nun tot und mäuschenstill. Nur der Reiher sieht sich wie ein verlassener König verdutzt um, oder auf einem einsamen Pfahl sitzt sein großer, gelbköpfiger Eisvogel, der mit seinem dicken, roten Schnabel nach der Stelle zeigt, die jetzt verlassen und noch vor einem Augenblick so voll Leben war.

Ist Flut, dann fällt ihm die Jagd leichter. Dann sitzt er gerne auf die Spitze eines Pfahls auf der Lauer. Plötzlich stößt er sich ab, klatscht 15 m weiter in die heranrollenden Wellen und kommt mit einem Fisch im Schnabel wieder hoch, kehrt zu seinem Platz zurück, schlägt den Fisch, wenn es ein großer ist, mindestens 20 mal mit dem Kopf gegen den Pfahl und verschlingt ihn dann mit dem Kopfe voran. Häufig habe ich jedoch in diesen Tagen auch gesehen, daß sie mit ihrer Beute in den Api-apibusch flogen. Vielleicht haben sie augenblicklich Junge.

Als frühesten Morgensänger notierte ich hier Copsychus musicus, diese Drossel war schon um 5,15 Uhr laut. Dann hörte ich Caprimulgus affinis. Um $^1/_2$6 Uhr kreist schon der rotbraune Houlang mit der weißen Brust und dem weißen Kopf (Haliastur intermedius) am Himmel und kurz darauf ziehen zwei Schwärme Nachtreiher (Nycticorax nycticorax), einer von 8 und einer von 2 Stück vorüber, dann meldet sich Pelargopsis und um 5,45 Uhr Aegithina scapularis.

Mit beinahe gleichen Flügelschlägen, dicht übereinander schwebend, flatternd und segelnd, spielen zwei Nachtschwalben in der Luft herum und verschwinden dann im Mangrovebusch.

Plötzlich durchpeitscht der scharfprahlende Schrei des Gabelschwanzhuhns (Gallus varius; sund. tjangegar) die Morgensinfonie. Er will gehört werden und er wird gehört; was hilft es dem Pirol, daß er nun seine schönsten Flötentouren zum besten gibt, der Hahn überschreit sie, man achtet da gar nicht drauf, ebenso wie man nicht auf das sanfte Gebrause der anrollenden Wellen achtet. Man hört nur den Hahn, den herrischen Ruf des Hahns.

Erst kräht er schnell hintereinander, lauter zwei silbige scharfe Rufe, die wie: kökröh! kökröh! kökröh! klingen, und danach läßt er sich mehr Zeit, in Zwischenpausen von $^1/_2$ bis 1 Minute ruft er dreisilbig: köreköh! Aber immer ist der Ton auf der letzten Silbe.

(Schluß folgt.)

Mein Kuckuck Max.

Von W. Blohm.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Max war in diesen paar Tagen zusehends gewachsen. Es zeigte sich schon ein Schwänzchen, auch die Flügel waren größer geworden — und sein Appetit. Vierzig Raupen! Mir wurde der Arm lahm beim Füttern. Ich sah ein, mit Raupen allein würde ich es nicht schaffen. Ab und zu hatte ich schon ein Stückchen rohes Fleisch mit eingeschmuggelt hauptsächlich nachmittags am Teich, aber viel durfte ich ihm nicht zumuten, ich hatte früher schlechte Erfahrungen gemacht, und Max verweigerte auch einfach den dritten oder vierten Happen — er wußte schon, was ihm gut tat und was nicht.

Ich wollte es mit Regenwürmern versuchen. In der Pause ließ ich mir einige holen. Max nahm sie, aber gern tat er es nicht, das sah ich ihm an. Was

nun noch? Da fragte ein Junge, ob Max nicht kleine Frösche fräße, davon gäbe es doch so viele am See. — Frösche? Hm, die paßten nun nach meiner Meinung ganz und gar nicht für einen Kuckucksmagen, aber immerhin! Wenn der Teufel in der Not sogar Fliegen fressen soll, so kann ein Kuckuck, wenn er, oder vielmehr ich, in Verlegenheit ist oder bin, auch Frösche fressen. Zwei Kundschafter werden ausgesandt und kehren schon nach kurzer Zeit mit einer ganzen Anzahl eben entwickelter Frösche zurück. Heureka! Das geht! Gierig verschlingt Max den ersten kleinen Frosch; ich biete ihm sofort den zweiten. Weg damit! Weiter gefüttert! Zwei auf einmal faßt die Pinzette. Hinunter in den Schlund! Mehr! Fünfundzwanzig Stück! Meine Kinder sind Zeugen; ich habe Tagebuch geführt, es liegt vor mir, ihm folge ich. Unterm 1. Juli habe ich notiert: Morgens $6\frac{1}{2}$ Uhr: 30 Frösche, $8\frac{1}{2}$ Uhr: 50 Frösche, 9 Uhr: 20 Raupen. „Wie ist das möglich?“ werden meine Leser fragen. Ich kann's nicht ändern, es ist wahr! Leider hatte ich vergessen, das Gewicht des Kuckucks sofort nach seiner Einlieferung festzustellen. Ich holte mir die Briefwage und setzte den Vogel auf die genau eingestellte Schale: 75 Gramm! 50 Frösche wogen 6 Gramm. Also zu einer Mahlzeit verzehrte Max genau den $6\frac{1}{4}$ Teil seines Körpergewichts. Wollen wir das einmal auf den Menschen übertragen, so müßten wir zu einer Mahlzeit ungefähr 20 Pfund Nahrungsmittel zu uns nehmen, oder anders: bis zum Abend hätten wir gut soviel verzehrt, wie wir selber wiegen. Gott sei Dank, daß wir mit etwas weniger auskommen! Der Kuckuck kann sich also mit dem Maulwurf voll und ganz messen in Punkto Freßgier. Ob der ausgewachsene Vogel ebenso viele Nahrung nötig hat, weiß ich nicht. Max wuchs aber auch zusehends. Er konnte schon auf dem Stocke oder auch auf dem Finger sitzen. Ich ließ ihn in den nächsten Tagen Flugversuche machen. Zuerst flog er zwei Meter; bald legte er schon vier, dann sechs Meter glatt zurück. Er landete genau auf seinem Stein vor dem Fenster.

Oft waren Fremde am Teich; die mußten den Kuckuck sehen und seine Freßlust bewundern. Einst kamen zwei Wandervögel, während ich gerade Frösche suchte. Als sie nach dem Zwecke meines Beginnens fragten, erzählte ich ihnen von dem Kuckuck Max.

„Wissen Sie auch, warum der Kuckuck seine Eier in fremde Nester legt?“ fragten sie mich.

„Nein,“ antwortete ich bescheiden, „das weiß ich nicht; wissen Sie es?“

„Ja, wir haben es in Dr. Th. Zells Schriften gelesen!“

Das konnte ich mir denken; Zell weiß alles, Zell kann die ganze Natur deuten und versteht ihren Zusammenhang aus dem Effeff. In vielen Schriften hat er es uns kundgetan. Ich habe ihn stets bewundert. Mir ist kein anderer Naturschriftsteller bekannt, der so viel blühenden Unsinn in die Welt hinausgeschickt hat, wie Dr. Th. Zell. Man lese nur einmal sein Werk: „Neue Tierbeobachtungen“. Der „Kosmos“ hat's herausgegeben. Die Jagdzeitungen hatten den Zell nach einigen Proben abgewiesen; der Kosmos brachte weiter Beiträge von ihm, und die Berliner Illustrierte... (Ich weiß, Zell hat als Erster auf die „Nasen- und Augentiere“ aufmerksam gemacht, auch auf die „Post“ der Tiere; das ist sein Verdienst).

„Also, was sagt denn Dr. Th. Zell über diese merkwürdige Tatsache?“ fragte ich.

„Zell schreibt, der alte Kuckuck frißt behaarte Raupen. Da aber der junge Vogel die noch nicht vertragen kann, so legt das Weibchen seine Eier in die Nester anderer Vögel, die ihre Jungen mit unbehaarten Raupen und anderen Insekten zu füttern gewohnt sind!“

Stieglitz im Jugendkleid.

So, nun wußte ich's! — O, du armer Zell! Wenn die Natur den körnerfressenden Vögeln die Gabe verleiht, ihre Jungen zunächst mit weichen Insekten zu versorgen, hätte sie dann nicht auch den Kuckuckseltern eingeben können, ihre Sprößlinge mit ebensolchen Tieren zu füttern? Und war es denn so schwer, die Probe aufs Exempel zu machen und einen jungen Kuckuck mit behaarten Raupen zu füttern? Oder hat Zell nie einen jungen Kuckuck besessen? —

Zu meinen Wandervögeln aber sagte ich: „Na, dann kommen Sie mal mit!“ Und ich fütterte meinen Max vor ihren Augen mit 20 behaarten Raupen....

Anfang Juli bekam ich Gäste am Teich; und so beschloß ich, Max ganz dorthin überzusiedeln. Meine Gäste waren sehr tierliebend; möchten sie also die Ernährung übernehmen. Max fraß auch schon manches Häppchen allein. Während er in der ersten Zeit den Raupen um sich herum keine Beachtung geschenkt hatte, so pickte er jetzt diese oder jene auf, wenn sie ihm gerade vor den Schnabel kam. Als ich wieder zum Teich fahren wollte, eröffnete ich den Kindern, daß ich Max dort lassen würde. Betrübt nahmen sie Abschied von ihm.

Um die schönen Raupen nicht im Stiche zu lassen, steckte ich die vorhandenen Nester, die die Kinder immer fleißig anbrachten, in den Rucksack; Max kam in seinen Korb, und so radelte ich los. Unterwegs fühle ich ein Krabbeln am Halse, greife danach und fasse eine Raupe vom Ringelspinner. Rin in die Tasche! Doch schon krabbelt es wieder. Auch in die Tasche! Während der ganzen Fahrt hatte ich das Vergnügen, mir Raupen vom Halse abzusammeln; und als ich bei meiner Hütte anlange und den Rucksack herunternehme, da wimmelt er außen voll Raupen. Auch mein Anzug sitzt voll von den Dingern. Da gab's Arbeit, die Wanderlustigen wieder zusammenzusuchen. Statt der Buchenlaube wurde jetzt eine von Schlehenzweigen errichtet und mit Raupen geschmückt. Dahinein kam Max. Er saß keck auf den Zweigen und holte sich bald manchen Leckerbissen herunter. Daneben wurde er noch fleißig mit frischen gestopft, denn die waren am Teich reichlich vorhanden.

Als meine Freunde das erstemal sahen, wie ich dem Kuckuck 60 „Padden", wie sie die kleinen Frösche nannten, in den Hals stopfte, riefen sie entsetzt: „Onkel Blohm, das geht nicht, er platzt, er platzt!" Ich ließ mich nicht stören und stopfte immer fleißig die zappelnden Padden in den roten Rachen. Max ist mir nicht ein einziges Mal geplatzt.

Rotkopfwidafink
(s. S. 320).

Die Fröschchen konnte ich nicht frei hüpfen lassen. Um ihn auf diese Nahrung selbständig zu machen, tötete ich eine Anzahl und legte sie auf ein Brettchen. Max begriff leicht und holte sie sich fort.

Nun sollte der Vogel an die Freiheit gewöhnt werden, denn käfigen wollte ich ihn auf keinen Fall. Wenn mein Max auch recht zahm war und mir entgegenflog, wenn ich ihn füttern wollte, so hatte er doch oftmals Tobsuchtsanfälle. Lange Zeit saß er friedlich auf seinem Zweig, dann, ganz plötzlich, packte ihn das Verlangen nach der goldenen Freiheit, und mit einem Male flog er gegen die Fensterscheiben, die er doch schon lange als undurchlässig erkannt hatte. „Der Kuckuck gehört dem grünen Walde, nicht dem engen Käfig an", schrieb ich schon im erwähnten Buch.

Am 5. Juli nachmittags setzte ich den Max in einen Johannisbeerbusch vor dem Hause. Lange Zeit saß er da und hielt Umschau. Ich stellte den Photoapparat auf und bannte ihn auf die Platte. Der Leser sieht, es war schon ein stattlicher Vogel geworden mit schönem, langem Schwanz. Mein Freund, der ihn liebevoll mit Futter versorgt hatte, hielt ihm mit der Pinzette einen Frosch hin. Max nahm ihn. Leider ist das Bild undeutlich geworden. Geraume Zeit stehen wir und beobachten den Vogel. Bilden wir es uns beide ein, oder ist es Tatsache, sein Blick wird anders; er erkennt, daß nichts Fesselnde mehr um ihn ist; und plötzlich streift er davon, gan gewandt im Fluge, hinein in den grünen Wald! Sofort sind die Bachstelzen, die im Eulenloche am Hause nisteten, und auch einige Meisen mit lautem Gezwitscher hinter ihm her. Sie verraten uns seinen Aufenthalt leicht. Wir legen uns auf die Lauer. Sollten sie ihn wohl füttern? Wir haben es nicht beobachten können und nehmen fest an, daß es nicht geschehen ist. Wohl läßt er seine Stimme, d. h. ei Zwitschern, ertönen, ähnlich dem junger, ausgeflogene Bachstelzen; aber dennoch verlassen ihn die Vögel bald und gehen ihren eigenen Geschäften nach. Mo erhebt sich und fliegt über das Wasser, das hier etwa 60 m breit ist. Woran erinnert mich sein Flug? Nicht an den eines ausgewachsenen Kuckucks. Lange grübele ich; denn einem bestimmten Vogel ähnelt das Bild. Halt, ich hab's! So fliegt der Ziegenmelker, die Nachtschwalbe, ganz gewiß!

Wir machen uns nun doch Sorgen, ob er wohl durchkommen wird. Wir suchen ihn jenseits des Teiches. Seine Stimme ertönt aus einer große Eiche; aber sehen können wir ihn nicht. — Gegen 6 Uhr hören wir plötzlich den Max wieder im Garten; und richtig, da sitzt er auf der Einfriedigung. Als wir uns vorsichtig nähern, fliegt er davon. Am nächsten Morgen, einem Sonntag, öffne ich die Hoftür, und — vor mir sitzt Max! Da ich zu plötzlich erschienen bin, streicht er ab. Wir haben auf den Teich zu tun, und als wir zurückkommen — sitzt Max wieder in seiner Laube in der Werkstatt. Die Frau meines Freundes erzählt, Max hätte auf dem Rasen an der Seite des Hauses gesessen; bei dem Versuch, ihn zu fangen, sei er gegen das Fenster geflogen

und sie hätte ihn gegriffen. Schnell reichen wir ihm eine gehörige Mahlzeit Frösche, die er gierig nimmt. Nun beschließen wir, ihm im Freien einen Käfig aus Netzwerk zu errichten und eine flache Schale mit Fröschen hineinzustellen, um ihn langsam an das Finden auf dem Erdboden zu gewöhnen; denn wir überlegen, daß er in den Zweigen kaum soviel Raupen und Insekten, wie 60 Frösche ausmachen, fangen kann. Leider gingen wir nicht behutsam genug zuwege; der Käfig war nicht dicht; und um 4 Uhr war Max entwichen, unbekannten Aufenthalts. Zwei Stunden später aber ist unser Max wieder da und läßt sich von meinem Freunde füttern, das heißt, er nimmt eine Raupe, schluckt sie und streicht eilends davon. Wir lassen während der Nacht die Tür zur Werkstatt offen in der Hoffnung, Max solle hineinfliegen. Morgens sitzt er auf dem Haublock vor der Tür; aber er kommt nicht ins Haus. Er läßt uns bis auf Armeslänge herankommen, schnappt auch einmal nach dem mit der Pinzette hingehaltenen Frosch, faßt ihn aber nicht und streicht davon. Wieder kann ich die Ähnlichkeit mit dem Ziegenmelker feststellen. Noch oft hören wir die Stimme des Vogels, noch ein paarmal sitzt er im Garten, setzt meistens an der Erde, aber herankommen läßt er uns nicht mehr.

Am nächsten Tage haben wir Max nicht wiedergesehen, auch nicht gehört. —

Ist er durchgekommen?

Holte ihn ein Sperber?

Ich fürchte es!

Kleine Mitteilungen.

Abweichende Färbung bei Masken-, Spitzschwanz- und Gouldsamadinen. Die Mitteilung des Herrn Horst Wagner in Heft 14, Seite 164, über die abweichende Färbung der in letzter Zeit in Handel gekommenen Maskenamadinen ermutigt mich, auf einige weitere Abweichungen aufmerksam zu machen. Auch mir fiel bei den erwähnten Maskenamadinen sofort bei Erhalt der helle, bernsteingelbe Schnabel auf, ferner auch die intensiv roten Füße, beides Färbungsmerkmale, die mich im ersten Augenblick daran denken ließen, Weißohramadinen, statt der Maskenamadinen, vor mir zu haben. Auch in der Größe waren diese Vögel beträchtlich kleiner, als die Maskenamadinen, welche ich in früheren Zeiten besessen hatte. Von weißen Wangen jedoch war bei ihnen nichts zu sehen, und da ich nicht mehr als ein einziges Paar zu Gesicht bekommen hatte, wagte ich es nicht, diesen Färbungsabweichungen eine andere Bedeutung, als die einer individuellen Variation beizulegen. Nach der Mitteilung des Herrn Horst Wagner, nach welcher alle in letzter Zeit eingeführten Maskenamadinen einen bernsteingelben Schnabel besitzen, dürfte es aber kaum zweifelhaft sein, daß wir eine besondere Form derselben vor uns haben. Allerdings keine neue „Art", denn hierzu sind die Unterschiede doch zu gering, wohl aber eine konstante, geographische Unterart (Subspecies) der Poëphila personata *I. Gd.* Offenbar gelangten die Vögel aus einer Gegend Australiens (wahrscheinlich Nordaustraliens) zu uns, von welcher aus bisher noch keine Importe stattgefunden hatten. Nun ist es aber sehr interessant festzustellen, daß auch andere australische Prachtfinken, wie Spitzschwanzamadinen und vielleicht Gouldsamadinen, welche gleichzeitig mit den gelbschnäbeligen Maskenamadinen und sehr wahrscheinlich aus dem gleichen Fanggebiete eingeführt wurden, ebenfalls einige Abweichungen in ihrer Färbung aufweisen. Auffällig sind diese bei den Spitzschwänzen, welche angeblich alle zu P. acuticauda *I. Gd.*, der gelbschnäbeligen Art, gehören sollen. So wie nun die neueingeführten Maskenamadinen deutliche Übergänge zur Weißohramadine zeigen, weisen die neueingeführten Spitzschwänze solche zur rotschnäbeligen Heckschen Spitzschwanzamadine auf. Mir ist vor allem aufgefallen, daß sie wie diese schön korallrote Beine und Füße besitzen, ferner ist der Schnabel nicht „gelb", sondern orangegelb bis rotgelb. Was endlich die Gouldsamadinen anbetrifft, so ist mir bei vier Männchen der rotköpfigen Varietät aufgefallen, daß sie die so charakteristische und auffallende, leuchtend rote aber feine Begrenzungslinie zwischen violettem Brustfeld und gelbem Bauchfeld gar nicht besaßen. Es handelte sich bei allen um gänzlich ausgefärbte Tiere. Bei beiden Varietäten, sowohl der schwarzköpfigen wie auch der rotköpfigen, scheint mir ferner der grüne Farbton des Rückens dunkler, bläulicher zu sein, nicht mit dem Stich ins gelbgrüne, wie bei den Vögeln, die ich in früheren Jahren besaß, wie denn auch das blaue Band hinter der Kopfmaske viel breiter zu sein scheint. Auch ist das Blau des Bürzels heller, einzelne Federn direkt weißlich gespitzt. Ein weißbrüstiger Schilffink, den ich noch besitze und der wohl ebenfalls den gleichen Importen entstammt, weist ebenfalls einige geringfügige Abweichungen von den Beschreibungen und Abbildungen auf, doch mag ich nicht darauf näher eingehen, da diese Art für mich neu ist und ich aus eigener Anschauung keinen Vergleich mit den früher importierten Vögeln ziehen kann. Wissenschaftliche Bedeutung könnte allen diesen Abänderungen zugesprochen werden, falls sie wirklich konstant bei einer und derselben Form auftreten (was im vorliegenden Fall für die Maskenamadinen und Spitzschwänze wirklich der Fall zu sein scheint) und falls man noch genau die Fundstelle dieser Lokalformen feststellen könnte. Dr. H. Steiner, Zürich.

Nur nicht schüchtern! In der Nähe des Soltauer Kaliwerkes ist ein ausgestopfter Strohmann als Vogelscheuche aufgestellt. In dieser Strohpuppe hat sich nun ein Vogelehepaar häuslich niedergelassen und hat darin sein Nest gebaut. Durch den Hosenschlitz, den der unanständige junge Strohmann nicht zugeknöpft hat, fliegt nun das gefiederte Elternpaar ein und aus und füttert seine Jungen. „Hann. Kurier."

Schwetzingen. Im südlichen Zirkelbau des Schlosses wurde vor kurzem eine Ausstellung für Vogelschutz eröffnet. Es ist dies die erste derartige Ausstellung, die in Baden stattfindet. Im Ausstellungsraum, der durch Baumgruppen und geschickte Gestaltung der natürlichen Umwelt in einen schönen, großen Hain verwandelt wurde, waren in höchst anschaulicher Weise unsere heimischen Vögel ausgestellt. Der Heidelberger Ornithologe Prof. Dr. Fehringer hatte mit Hingabe eine sehenswerte Vogelschau zusammengestellt, die Niststätten der verschiedenen Vögel getreulich in die Ausstellung verpflanzt, Musterschutzgehölze und vorbildliche Futter- und Tränkplätze geschaffen. An den Wänden hingen Bilder des Pforzheimer Tiermalers O. Aichele, die wegen ihrer Naturtreue und oft entzückenden farbigen Lösung ebenfalls großes Interesse fanden. Während der Dauer der Ausstellung, die bis zum 18. Juni geöffnet war, hielt Prof. Dr. Fehringer im Neuen Lichtspieltheater in Schwetzingen noch mehrere Lichtbildervorträge über Vogelschutz, wobei auch ein Naturfilm des Schutzgebietes auf der Ostseeinsel Hiddensee vorgeführt wurde, der die trefflichen Lichtbilder mit herrlichen Aufnahmen landschaftlicher und ornithologischer Seltenheiten ergänzte. Mit dieser Ausstellung für Vogelschutz ist ein Stück wertvoller Kulturarbeit geleistet worden.

Sprechsaal.

Frage 14. Ich besitze seit einigen Jahren eine Nachtigall, die die scheußliche Gewohnheit hat, sich das Kleingefieder an Bauch und Brust, soweit sie dasselbe erreichen kann, auszurupfen, so daß der Vogel dann aussieht wie eine gerupfte Gans und einen tollen Anblick bietet. Dabei ist das Tier sonst anscheinend völlig gesund, denn es befindet sich in ordnungsgemäßem Körperzustand und hat fleißig geschlagen vom Januar bis vor kurzem. Ich füttere diesem Tier, wie allen meinen Weichfressern, ein gutes Futtergemisch, welches ich teilweise kaufe, teilweise selbst zusammenstelle und welches sich bewährt hat und aus den bekannten Futterteilen besteht. Gegenwärtig bekommt der Vogel frische

Puppen in der Hauptsache. Die N. scheint mit der Mauser beginnen zu wollen, fängt aber schon wieder an und rupft die frisch sprießenden Federchen heraus. Da es sich um einen guten Schläger handelt, möchte ich ihn auch in ordentlichem Gefieder im Käfig haben und bitte um Ratschlag, wie ich wohl dem Übel steuern kann. Äußerliche Ursachen scheinen nicht der Grund zu sein, meine Tiere werden tadellos sauber gehalten und sind milbenfrei. In der einschlägigen Literatur finde ich keinen Hinweis, da Federrupfen bei Weichfressern doch auch sehr selten vorkommt.

Alfred Völker.

Volksverdummung oder Aufklärung! Unter dieser Überschrift hat Heinrich Groebel in Nr. 22 der „Ges. Welt" einige recht drastische Beispiele angeführt, in welch unglaublich leichtfertiger Weise in Tageszeitungen mit naturwissenschaftlichen Dingen umgesprungen wird. Jeder, der mit Aufmerksamkeit auch den Unterhaltungsteil der Zeitungen zu lesen gewohnt ist, wird solche Beispiele selbst in großen Zeitungen nicht allzu selten finden. Die Schuld daran trifft aber häufig weniger den Schriftleiter der betreffenden Zeitung (die Vorbildung der Schriftleiter ist ja zumeist eine andere, naturwissenschaftliche Kenntnisse sind hier im allgemeinen recht selten), als die Nachrichtenstellen — zeitungstechnisch gesprochen —, die Korrespondenzen, die ohne jedes Verantwortungsbewußtsein nicht von Fachleuten verfaßte Aufsätze mit dem tollsten Unsinn verzapfen. Der Allgemeinheit gegenüber blamiert ist da aber natürlich allein die Zeitung! Diese schwer daniederliegende Berichterstattung der deutschen Tagespresse in naturwissenschaftlichen Dingen hat mich veranlaßt, vor sechs Jahren eine „Naturwissenschaftliche Korrespondenz" (München, Habsburgerplatz 2) ins Leben zu rufen, mittels der ich heute rund 100 deutsche Tageszeitungen mit einwandfreiem, den neuesten Forschungen entsprechendem naturwissenschaftlichen Aufsatzmaterial versehe. Daß ich hierin als alter Vogelfreund und Vogelpfleger unserer Vogelkunde ausführlich gedenke, ist selbstverständlich. Viele Zeitungen freilich wissen offenbar noch nichts von dieser Handhabe, die ihnen gutes naturwissenschaftliches Material bieten will, und deshalb möchte ich diesen kurzen Hinweis mit einer Bitte an alle Leser der „Ges. Welt" schließen: Machen Sie in allen Fällen, in denen Sie ähnliche Erfahrungen machen müssen, wie die eingangs geschilderten, die betreffenden Redaktionen auf meine Korrespondenz aufmerksam. Geht die Zeitung auf Ihre Anregung ein, so werden bald die Angaben in ihr verschwinden, die mit Recht Ihren Ärger erregten.

Dr. H. W. Frickhinger, München,
A.Z.-Mitglied Nr. 387.

In der Arbeit „**Aus dem Vogelhause des Berliner Zoologischen Gartens**" haben einige Namen der in den Flugräumen lebenden Vögel Anlaß zu Zweifeln und Fragen von seiten der Pfleger von Webervögeln und Webefinken gegeben. Besonders sind es die Bezeichnungen „Rotstrichastrilde" und „Breitschwanzweber". Erstere Bezeichnung ist auch von anderen Mitarbeitern schon für den Zügelastrild — Estrilda rhodopyga *Sund.* gebraucht. Beide Namen sind nicht sehr glücklich, da ja der rote Zügel und der rote Strich durchs Auge fast allen Verwandten des Vogels (Wellenastrild, Grauastrild) eigen, beide Bezeichnungen für den Vogel also nicht besonders kennzeichnend sind. Die Anwendung des Namens „Breitschwanzweber" für den Rotscheitelwidafink (s. Abb. S. 318) ist wenig glücklich. Für die Angehörigen der Gattung Colius passer — Plattschweifwidafink ist von jeher die Bezeichnung Widafinken oder Witwen üblich und kennzeichnend. Brehm in „Gefangene Vögel" nennt den Vogel „Breitschwanzwida" und Reichenbach gebraucht die Bezeichnung „Breitschwänzige Trauerwitwe". Daß man bei Vulgärnamen einen Vogel nach seinem Entdecker benennt, ist üblich. Es ist daher nichts dagegen einzuwenden, wenn der nordöstliche Bandfink „Neumanns Bandfink" genannt wird, wenn auch Prof. Neumann den Vogel Amadina alexanderi, also „Alexanders Amadine", genannt hat. N.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

C. Balser, Fulda: Schneeweiße Kanarien.

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a: Schamaweibchen, Rötelmerle (Oroscirtetes erythrogaster), Blaurotschwanz (Phoenicurus frontalis), Weißbrüstiger blauer Waldschmätzer (Tarsiger rufilata), Klarino, indische Bergmeise, Maskenwürger (Lanius vittatus), Grauwürger (Lanius lathora), Flötenwürger (Laniarius rufiventris), Würgerschnäpper, Borstenhäherling (Janthocincla lineatum), Blauspötter (Melanotis caerulescens), graublauer Fliegenschnäpper, Weißkehlpfäffchen, Grau- u. Schwarzkappenpfäffchen, Kronfinken, Yarellszeisige, Kapkanarien, Angolagirlitze, Mossambikzeisige vom Kap, Königswitwen, Schnurrbärtchen, Elfenastrilde, Wachtelastrilde, Granatastrilde, Weißwangenlerchen, Katharinasittiche, Pavuasittiche, Feuerflügelsittiche.

A. Mertens, Mainz, Wallaustr. 62: 1,1 Feuerflügelsittiche, ♀ legte verg. Jahr 2 Eier, 1 Paar Dominikanerkardinäle.

W. Reitzig, Berlin N 39, Reinickendorfer Str. 109: 4 Stück 12 Wochen alte tar. Unzertrennliche.

Paul Tzornack, Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189, Tel. Humboldt 2063: Surinamamazone, Rotrückenamazone, kleine Gelbkopfamazone, Rotmaskenamazone, Venezuelaamazone, Zwergara, Marakana, 1 Paar Grünsittiche (holochlorus), 1 Paar Katharinasittiche, tarantiner Bergpapagei, fingerzahme Feuerflügelsittiche, Dominikanerkardinäle, Kaptäubchen, mex. Wachteln.

Offerten unter W. H. B. an die Exped. der „Ges. Welt" erbeten: 1,0 Kaprötel, 1,0 Drongo, 1,0 orangeroter Trupial.



Herrn E. S., Arnsfelde. Der Sonnenvogel ist einer Lungenentzündung erlegen. Neben dem gereichten Futter sollten Obst und Beeren, täglich 3—4 Mehlwürmer und auch etwas Hirse gereicht werden, die gern von den S. gefressen wird. — Die Massenawachtel ist bisher noch nicht gezüchtet. Sie baut ihr Nest im Schutze überhängender Zweige von Laub- und Nadelhölzern im hohen Grase, das unter den Bäumen wächst, so daß das Nest auch durch die überhängenden Gräser geschützt ist. Eine solche Nistgelegenheit läßt sich in einem Außenflugraum leicht herstellen, wenn man eine Fichte oder Kiefer mit recht niederen Zweigen einpflanzt und den Boden darunter und ringsherum mit Grasplatten belegt. Vielleicht würden sie auch mit einem Haufen Heu unter den Zweigen vorliebnehmen. Die M. bewohnt recht heiße Gegenden, allerdings in großen Höhen, ähnlich wie die kalifornische Schopfwachtel. Letztere verträgt unsern Winter sehr gut, wenn ihr zum Übernachten ein vorn offenes Schutzhäuschen gegeben wird. Ob es sich mit der M. ebenso verhält, könnte nur ein Versuch zeigen, zu dem ich aber nicht rate, da es wohl möglich ist, daß die Wachteln darunter leiden.

Herrn A. B., Jena; Herrn P. A., Hannover; Herrn K. R., Darmstadt; Herrn A. E., Lunzenau; Herrn C. B., Fulda: Beiträge dankend erhalten.

Herrn R. G., Saalfeld. Der junge Kanarienvogel war ein sehr schwächliches Tier, blutarm und sehr mager. Es ist nicht anzunehmen, daß das Offenstehen des Fensters während der Nacht irgendwelchen Einfluß auf seinen Gesundheitszustand ausgeübt hat. Er ist infolge allgemeiner Lebensschwäche eingegangen.

Herrn H. G., Forst i. L. Es wäre gerade zur Herbeiführung und glatten Erledigung der Mauser notwendig, dem Vogel frische Ameisenpuppen zu reichen. Wenn es unmöglich ist, diese in gutem Zustand zu erhalten, muß eben in der bisherigen Fütterungsart fortgefahren werden, wobei zu berücksichtigen ist, daß dem nicht singenden Vogel eine so große Zahl von Mehlwürmern, wie angegeben, nicht gereicht werden darf. Die Hälfte der Menge ist schon sehr reichlich.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

Jahrgang 54 2. Juli 1925 Heft 27

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Vogelliebhaber in China. Von Dr. Hugo Weigold, Hannover.
Neueinführungen und Seltenheiten. Von K. Neunzig. (Forts.)
Etwas über die Ernährung zarter Weichfresser. Von Karl Finck, Neukölln.
Moearah-Tjiassem. Von August Spennemann.
Mein Kuckuck Max. Von W. Blohm. (Schluß)
Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Anschrift: H. Höhne, Leipzig-Vo., Eisenbahnstr. 84. — Unsere Vorstandssitzung am 17. Juni hat sich in Anbetracht der Eigenart unseres engeren Vaterlandes mit seiner außerordentlichen Verbreitung der Vogelliebhaberei mit der Bildung von Bezirksverbänden (entsprechend Kreishauptmannschaften) befaßt. Es läßt sich in dieser Form eine wertvolle Fühlungnahme der Mitglieder untereinander erreichen, und außerdem dürfte die Werbetätigkeit wirksam sein, zumal die immerhin geringen verfügbaren Mittel uns jede Ersparnis zur Pflicht machen. Aus diesen beachtenswerten Gründen haben wir in Aussicht genommen, unseren Landesverband in Bezirke einzuteilen. Wir bitten unsere Mitglieder, die Angelegenheit zu prüfen und uns ihre Auffassung darüber mitzuteilen. Unsere nächste Vorstandssitzung findet am 29. Juli statt. Bis dahin erwarten wir einen Überblick zu haben, um entsprechende Beschlüsse fassen zu können. Wir machen darauf aufmerksam, daß eine Erhöhung der Beiträge nicht in Frage kommt. Gleichzeitig bitten wir um Abführung der Beiträge. Auch Teilbeiträge sind willkommen. Um eine Verzinsung der einlaufenden Gelder und damit einen gewissen finanziellen Vorteil zu erreichen, haben wir ein Giro-Konto angelegt. Dasselbe führt die Nummer 6317. Sämtliche Beiträge sind in Zukunft an dasselbe abzuführen.

Der Vorstand. J. A.: Hunger, Schriftführer.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.



Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10. — Aufgenommen ist unter Mitglied-Nr. 136 n Herr Ing. Hans Lohmar in Köln a. Rh., Blumenstr. 1. — Mitglied-Nr. 325 wohnt jetzt Helsingfors, Bangatan Nr. 3.

A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37 a. Gäste stets willkommen.

J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke, Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Restaurant „Zum Löwentor", Königswall 75.

J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung Freitags, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Blasewitzer Hof". Liebhaber willk. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Rietschelhof", Rietschelstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinslokal „Parkhotel", Espanyastr. 1, Versammlung. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an. Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 7. Juli.
A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber. Nächste Veranstaltungen: Donnerstag, den 9. Juli: Vereinsabend im Landesheim, 8¼ Uhr, Vortrag Klocke: „Mimikry". Alle Mitglieder werden herzlich gebeten, möglichst an allen Veranstaltungen teilzunehmen. — 54. Mitgliederversammlung am 18. Juni 1925, im Landesheim. Anwesend 16 Personen Neu aufgenommen: Nr. 162 Frau von Osterley, Nr. 164 Hugo Purrucker, Bankdirektor, Nr. 164 Dr. M. Paul, Generalagent, Nr. 165 Karl Bente, Damenschneider. Nach Erledigung und Besprechung von allerlei Eingängen, Futterfragen und Fragen über Vogelhaltung hält unser Mitglied Böneker einen sehr kenntnisreichen Vortrag über australische Körnerfresser. Er spricht zunächst über Land und Leute, dann über die besonderen Lebensbedingungen dieses Erdteils. Die ganz ausgeprägte bunte, und zum Teil merkwürdige Vogelwelt, ist gebunden an einen eigenartigen Pflanzenwuchs, vor allem an allerlei Stachelgewächse, die undurchdringliche Gestrüppe bilden. Australien hat eine Vogelwelt für sich, zum Teil unwahrscheinlich bunte Tierchen, und das Merkwürdige an diesem Lande ist, daß seit einigen Jahren ein unbedingtes Vogelausfuhrgesetz besteht; nur Sittiche, von denen es Unmengen gibt, dürfen ausgeführt werden, und dabei glückt es dann den Händlern hin und wieder den einen oder anderen Vogel mit durchzuschmuggeln, sonst würden australische Vögel überhaupt nicht im Handel zu haben sein. Sie sind ihrer Farbenpracht und dieses Ausfuhrverbotes wegen selten und kostbar. Mit die seltensten, von denen der Vortragende ein vorzüglich gepflegtes Paar in herrlichen Farben aus seinem Besitz lebend vorführte, die Gouldsamadinen, kosten z. B. etwa 200 M. das Stück, und dabei herrscht mehr Nachfrage als Angebot. Wenn wir erwähnten, daß dieses Ausfuhrverbot seltsam ist, so ist dabei zu berücksichtigen, daß die Einwohner von Australien, als aus der ehemaligen Sträflingskolonie von England stammend, als die unempfindlichsten, rohesten und gemütsärmsten auf Weißen der Welt gelten. Dieses unbedingte Vogelausfuhrgesetz ist daher besonders anerkennenswert und von uns nachahmenswert. Auf verbotene Ausfuhr steht Gefängnisstrafe. Überhaupt scheint der Naturschutz eine besondere Pflegestätte in Australien zu finden, indem z. B. das Vernichten von Mückenlarven durch Ölaufgießen auf stehende Gewässer verboten ist. Man hat sich gegen die Plage durch Einführung geeigneter Fische und Vögel erfolgreich gewehrt. — Die meisten australischen Amadinen, Finken und andere bunte Vögel haben keinen besonderen Gesang, eine Ausnahme bilden auch hier wieder die oben erwähnten Goulds, die prächtig klirrend singen. In der folgenden Aussprache wurde allerlei Fesselndes behandelt. Die meisten Anwesenden einigten sich auf die Ansicht, daß es den Vögeln schädlich wäre, nur die üblichen dicken Sitzstangen im Bauer zu haben, es müssen genügend dünne Stangen, Zweiglein oder kahle Bäume eingefügt sein, wenn der Vogel an den Füßen gesund bleiben will. Eine Aussprache über das Fehlen von Sperlingen in manchen Gebirgsorten führt zu dem Schluß, daß dafür wohl mehrere Gründe anzuführen seien: 1. der Mangel an Ackerland, 2. das Nichtvorhandensein von Pferden, die ja die Hauptnahrungsspender sind, 3. das Überwiegen von Buchfinken, die ja kräftiger und frecher als ihre Vettern, die Spatzen, sind und diese daher vertreiben. — Unser neues Mitglied, Herr Ornithologe Schütz, hat in der Nähe Hannovers, im Langenhagener Moor, das für uns seltene Schwarzkehlchen beobachtet und mitten in der Stadt, über dem Theater einen Wanderfalken fliegen sehen, begleitet von einem Schwarm von Mauerseglern.

Appel.

(Fortsetzung auf der 8. Umschlagseite.)

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft den 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste ilk. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Vereinsabend gelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends um 8 Uhr) beim 1. Vors., errn Jahn, Feodorastr. 7. Jena besuchende Vogelfreunde effen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodoraraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen ogelstube herzlichst eingeladen. A. Voigt.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierruben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend ach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal Goldener Adler". Bang, 1. Vors.t.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. ritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Bollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden . und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt euch im nteresse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung den Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 2. Juli. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Normast im „Kaiser Friedrich", Breslauerstr. 50. Liebhaber willkommen. J. A.: Friedrich.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße.
gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Tage im „Goldenen Falken" Versammlung; nächste Freitag, den 26. Juni. Liebhaber willk. Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Versammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Liebhaber willk. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebenda. R. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

ergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per d. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

ige u. Gerätschaften

-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50.
netze f. a. schädl. Vögel M. 2,30,
. 2,50 u. 2,80. Katalog gratis.
nen, Gronau 58, Westf. [869

Futtermittel

ehlwürmer
d 5.— ℳ, bei 6 Pfund Porto und ung frei. Händler Rabatt.

a Ameiseneier
Pfund 6.50 M.
eißwurm . . . à Pfd. 5 ℳ
aska-Zecken . . à „ 2,50
idenraupenpuppen,
nahlen . . . . à Pfd. 0,75
rnelen, gem. à Pfd. 0,40 ℳ

Universalfutter
ba I für Nachtigallen 2.— ℳ
II für Grasmücken 1.80 ℳ
III für Drosseln . 1.50 ℳ
und Analysen zur Verfügung.
er oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [870

ezialvogelfutterhaus für Weichfresser
chrich II, Waldsee (Pfalz).

Mehlwürmer
send. v. 1.50 Rentenmark ¼ Pfd.
versend. D. Waschinski & Co., Biesenthal I (Mark). [871

lwürmer Ia Pfd. 4.— ℳ (6 Pfd. 24 ℳ fr.)
. 2.50 ℳ frk. Voreinsend.
er, Breslau, Weinstr. 12. [872

Wer
in der „Gefiederten Welt" inseriert,
hat Erfolg!

Vogelfutter [873
für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Ameiseneier
täglich frisch, Lit. 2.30 M. franko.
Mehlwürmer
gegen Einsendung von Mk. 1.50 ¼ Pfund franko. [874
Th. Witte, Niederndodeleben bei Magdeburg.

Suche:
Trockene deutsche prima
Ameiseneier.
Muster erbeten. [875
Verkaufe:
Einige Wellensittiche, Weibchen, ca. 1 Jahr alt, blau u. blaublütig.
Rich. Heydenreich,
Bad Suderode. Harz.

Bitte!

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß

a) **alle für die Redaktion** der „Gefiederten Welt" bestimmten **Zuschriften** (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten, Vereinsnachrichten usw.) und **Sendungen** (tote Vögel, Manuskripte) nur an **Herrn Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf,** Neue Bismarckstr.,

b) **alle Bestellungen** auf **Abonnements, auch vom Ausland, nur durch die Post,**

c) **Inserate** und dergl. Geschäftliches nur an die **Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,** Postschließfach 148,

zu richten sind.

Beschwerden wegen Nichtzustellung der „Gefiederten Welt" sind beim zuständigen Postamt anzubringen.

Sämtliche
Vogelsaaten
in [876
hervorragender Beschaffenheit
liefert zu vorteilhaften Preisen in großen und kleinen Posten

Hugo Schütze,
Eystrup (Weser)
Fernruf: Eystrup Nr. 1 u. 23,
Postscheck-Konto 5715 Hannover.

Preisliste verlangen.

Züchterkollegen!
Wer seine Nachzucht gesund erhalten will, der befolge nachstehenden Wink: **Jungvögeln im Fluge verabreiche man guten Rübsen zur Genüge und „L.K." trocken, soviel sie fressen mögen. Gekochtes Ei verursacht Krankheiten und ist deshalb die Verabreichung zu vermeiden.**

Lorenz, Dresden
Drehgasse 5. [877

Vögel
Junge grüne
Wellensittiche!
im Freiflug gezüchtet, blutsfremd und kräftig, à 5.— M. [878
R. Huth, Perleberg.

Verkaufe meine
Blaustirn-Amazone,
Ia im Gefieder.

Fingerzahm, 20 bis 30 Worte sprechend, 3 Lieder singend, flötet, läuft frei herum, für 120.— Mark. [879
Richter, Kfm., Hamburg,
Butterohstr. 87.

Großer Gelbnacken
junges, kerngesundes Prachtexemplar, zahm, intelligent, einige Worte sprechend, zu verkaufen oder zu tauschen, gegen sehr gut sprechenden jungen
Graupapagei
zahle gerne zu. [880
Adolf Kohues, Celle,
Rundestraße 12.

1,1 rotstirn. Zwergpapagei v. Abessinien, Männchen etwas kahl am Kopf, zus. 50.— M., **1,0 Pflaumkopfsittich** 25.— M., **1,0 rot. Kardinal** 30.— M., **1,0 Dominikan. Kardinal** 15.— M., **1,0 Schamadrossel** 75.— M., letztere drei in vollem Gesang, **3 jap. Mövchen** à 8.— M., Versand per Nachnahme, Anfragen nur gegen Rückporto [881
Moritz Zeise, Gera-R. j. L.

Mehlwürmer [882
1 Pfund 5.— Mark, Porto und Verpackung extra. ¼ Pfund 2.— Mark, Nachnahme 0.20 Mark mehr. Postscheckkonto: 6196 Ludwigshafen a. Rhein.
Händler Vorzugspreise.
Karl Claus, Mutterstadt 2, Hauptbahnhof.

Elster
spricht alles, lacht, pfeift, gackert, verkauft umständehalber, Preis 35.— Mark. [883
Max Ehlert, Demmin,
Wilhelmstr. 10.

Umständehalber zu verkaufen: 1 Blaustirnamazone, zirka 20 Worte spr., selt. schöner groß. Vogel 75.— M., 1 fingerzahm. Alexandersittich 25.— M., 1,1 Kakatusittich 15.— M., 1,0 grauer Kardinal 10.— M., 3,2 Jap. Mövchen 25.— M. 0,1 blaubürzl. Sperlingspapagei 12.— M. Einige Paare Schmetterlingsfink., Grauedelsänger, Amaranten, 1 Aquarium 80×40×40 cm, 1 Eichhörnchen. [884
Anfragen Rückporto.
G. Haase, Grohn bei Vegesack,
A. Z. Mitgl. 385. Langestr. 82.

Nymphen
4 Stück aus meiner Zucht gebe noch ab. Bei Anfragen Rückporto erbeten. [885
Dr. Bilfinger,
Schwenningen a. Neckar (Württ.).

Californ. Schopfwachteln,
Wachtelastrilden, Weißstirnamazonen u. alle anderen Arten exotische Vögel hat abzugeben. [886
Zoologische Großhdlg. H. Ditzell,
(Inh. Jul. Schmidt), **Leipzig,**
Wilhelmstr. 68, Telefon 52275.

0,1 Singsittich,
zuchtfähig und vollkommen gesund, zu kaufen gesucht, oder gebe tadelloses importiertes **1,0** dafür. Suche auch **0,1 Tarantinischen Zwergpapagei.**
Gustav Rambausek, Wien, XVIII.,
Martinstr. 88/4. [887

Gebe ab [888
sehr junge, gut sperr. **3 Sperber, 3 Bussarde, Gef. Welt,** 1909—1916, ungebund., à 5.— M., Rückporto erbeten.
Rendant Walter, Eilenburg.

Tausche: 2 Hänfl., 1 Rotkehlchen, 1 Gartengrasm. (evtl. auch Nachtigall). Alles 2 Jahre gekäf. Ia Vögel, gegen Steindrossel od. amerik. Spottdrossel und chin. Nachtigall. Sende nicht zuerst. [889
Werner Biel, Gera-R., Steinstr. 14.

Sprech. Graupapageien,
Blaustirn-, Gelbkopf-, Surinam- u. Diadem-Amazonen etc., Spiel-, Dressur- u. Zwergaffen. Reizende Angorakätzchen, billig. [890
Carl Willers, Zool. Handlung,
Altona, Kirchenstraße 34.

Tausche
wegen Zeitmangel zur Pflege meine Sammlung (20 Stück) überwinterter einheimischer Weichfutter- u. Körnerfresser, alles gute, ausgewählte Ia Sänger, gegen **Ia Schama,** gesunden, jungen, gelehrigen **Graupapagei** oder **Doppelgelbkopf,** gut im Gefied., evtl. mit Käfig. Nehme auch schöne, bessere Zimmerpflanzen in Tausch. Eine Anzahl gebrauchter, gut erhaltener Flemmingscher Weichfresser- und Körnerfresserkäfige preiswert abzugeben. [891
Paul Blödner, Ruhla i. Thür.

Vertausche
lautsingenden braunbrüstigen Blauschnäpper [892
gegen 0,1 Gouldamadine.
Dr. Rauchbaar, Oelzschau b. Leipzig.

Für Freunde der heimischen Vogelwelt

Die deutsche Vogelwelt nach ihrem Standort.
Ein Beitrag zur Zoogeographie Deutschlands und zugleich ein Exkursionsbuch zum Kennenlernen der Vögel. Von Werner Hagen. Mit 74 Abbildungen und 4 Schwarzdrucktafeln. Kart. 3.— M.

Die einheimischen Stubenvögel,
ihre Naturgeschichte und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 6. Auflage des Dr. Karl Ruß'schen Handbuchs für Vogelliebhaber Band II.) Mit 22 Farbentafeln und 188 Textabbildungen. Geh. 14.—, geb. 17.— M.

Die gefiederten Sängerfürsten des europäisch. Festlandes,
ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Matthias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln und 16 Textabbildungen. Kart. 3.— M.

Die Hauptregeln der Sprosserpflege.
Scherzreime von Oskar M. Kisch. Mit 2 Abbildungen. 1.— M.

Der Dompfaff,
seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Zucht. Auf Grund 54jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8. bis 10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Kart. 1.— M.

Die deutschen Sumpf- und Strandvögel.
Von Dr. Kurt Floericke. Mit ca. 44 Abb. auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.

Die deutschen Schwimm- und Wasservögel.
Von Dr. Kurt Floericke. Mit ca. 45 Abb. auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.

Die mitteleuropäischen Vögel.
Von Dr. E. Bade. Band 1. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Tafeln in Photographiedruck und 144 Textabbild. von Nestern, Eiern u. Vogelteilen. Geb. in Ganzleinen 5.— M.

Allerlei sprechendes gefiedertes Volk
(Raben- und Krähenvögel, Starvögel usw.). Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Kart. 3.— M.

Gefiederte Hausfreunde I.
Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung üb. d. Pflege heimischer Stubenvögel. Kart. 1.— M.

Die Fänge der Raubvögel Mitteleuropas.
Von Prof. Dr. Carl R. Hennicke. Mit 33 lithogr. Tafeln. Kart. 5.— M.

Für Vogelschutz

Handbuch des Vogelschutzes.
Von Prof. Dr. C. Hennicke. Mit 9 Doppeltontaf., 1 Karte u. mehr als 200 Textabbild. Geh. 8, geb. 10 M.

Gebe ab:

1 Indische Graumeise (Neu... rung Fockelmann) M. 25.–
1 Indische Bergmeise M. ...
Beide gut eingewöhnt.
Porto und Verpackung beson...
A. Troschütz,
Hannover, Große Aegidien...

1,1 Ringelastrilde,
1,1 Binsenastrilde,
1,1 Auroraastrilde,
1,0 schwarzkehlig. Laufhüh... zu kaufen gesucht. Evtl. Tausch **Elfen-, Wachtel- od. and. ... Astrilde.**
Eduard Schütze, Eystrup (...
A. Z.-Mitgl. 171.

Schmetterlingsfinken, Amaranten, Astrilden, Or... bäckchen, Schönbürzel, Ma... bitzeisige, Edelsänger, Reb... astrilde, Wellensittiche, Rotw... würger, Ia Sänger mit 20 ... denen Touren, **2 Kibitze.** Stet... wahl in- und ausländischer Vöge... Preisliste kostenlos.
E. Schönbube, Berlin ...
Elisabethkirchstr. 1.

In gute Hände abzuge...
1 Jaco, 5 Monate bei mir, ... sprechend, 100 Mark, schwar...
1 Jaco, 30—40 Worte sprechend ... 5 Jahre alt, 150 Mark. Beide ... kerngesund, gelehrig, ausgesp... Damenvögel.
S. Lichtenstaedt,
Berlin-Friedenau,
896] Kaiser-Allee 137.

Kaufe: Gefied. Welt, nur ... mögl. ungebund. Jahrgänge 18... 1911, 1916, 1917; sowie die H... bis 42, 44, 47, 48, 50, 52,/190... 23/1922, 36/1914, 13 bis 18/19... bis 45/1924. — **Farbentafeln** ... Neunzig, a. d. Gefied. Welt, nur t... 3, 4, 7, 9, 12, 15, 20, 25, 32, ... Neunzigs Fremdl. Stubenvögel:/ ... 30×21. — **In Tausch gebe/:... verkaufe:/: 1 Schamakäfig** 7... ×35, samt 90 cm hoch. Tisch, Flem... inkl. Porto, Packg., für 7 Jahrgär... **1 Flugkäfig** 65×48×35, inkl. ... Packg., für 3 Jahrge; — **1 P... Univ. Kanar. Gesangs-Tro... Käfig** 28×30×31, Flemming, ... neu, inkl. Porto, Packg., für 3 3... — **20 Nistkästen/:** f. Astrilde, ... u. Sittiche:/ inkl. Porto, Packg... 2 Jahrge; — **30 Farbentaf...** Exoten:/ v. K. Neunzig a. d. G... vollk. tad., neu, für 4 Jahrge; — ... **gang 1919** kompl., für 1 Jahr... **Die Tierwelt 1913/:** Wien:/ ... gebund., — **20 Hefte Wochen...** **1924/:** O. Ludwig:/; — **Hef...** 1912, 33, 51/1914, 12/1920, 18/1... 10/1925 d. Gefied. — und die ir... 12/1925 ausgebotene prachtv. **S... volière** verk. od. vertausche. ... genaue Angebote. Doppelk.
Louis Szlachovics, Privatb...
Wien XVI., Seebödg. 36, II...
Mitgl. 26. d. A. Z.

Undeutlic...
geschriebene Inser...

Nach einer Entscheidung des ... gerichts braucht für Fehler in ein... zeige, welche infolge unleserlich od. u... geschriebenen Manuskripte ent... sind, keinerlei Ersatz geleistet zu w... Das Reichsgericht ging hierbei von ... sicht aus, daß Anzeigen, welche ma... Zeitung zusendet, **deutlich** gesc... sein müssen.

Inserate
für das am 9. Juli 1925...
Ausgabe gelangende Heft 2...
Gef. Welt erbitten bis 4...

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 14
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 9. Juli 1925 | Heft 28

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Die verd ..... Lauheit.

Von Arnold Weber, Hamburg.

(Nachdruck verboten.)

So jemand den Vorsitz eines Vereins oder einer sonstigen Körperschaft übernimmt, so muß er sich auch bewußt sein, was für Pflichten und Verbindlichkeiten er bei ehrlichem Streben durch die Übernahme dieses Postens auf sich ladet.

Manch einer, welcher den ihm angebotenen Posten übernimmt, ist für diesen damit noch lange nicht geeignet, und darum ist es stets verdammte Pflicht und Schuldigkeit des Betreffenden, sich nicht durch die ihm erwiesene Ehre und das ihm erwiesene Vertrauen einschmeicheln zu lassen, sondern in sich zu gehen und sich dem Posten mit eiserner Energie zu widmen. Als erste und vornehmste Eigenschaft eines Vorsitzenden ist es nötig, daß der Betreffende vor allem diese Energie auch besitzt und sich nicht wie ein altes Waschweib den Posten aufdrängeln läßt, um nachher vollkommen zu versagen und nichts mehr für die Interessen des von ihm vertretenen Vereins zu tun. Er hat sich bereit erklärt, den ihm angetragenen Posten zu übernehmen, und somit, wenn er ein ganzer Kerl ist, auf das energischste die Interessen seiner Körperschaft zu wahren und zu fördern.

Haben wir aber wie so oft die traurige Tatsache vor uns, daß nicht nur der Vorstand, sondern auch der Kreis der Mitglieder lau und energielos ist, so kann sich der gesamte „Prachtverein" begraben lassen. Jedenfalls wird unser altbewährter Schriftführer des Reichsverbandes, Herr Petters, auf seine Bekanntmachungen in den Fachzeitschriften nicht allzu viel von diesem Verein zu hören bekommen, geschweige denn die Mitgliederlisten oder gar die Beiträge erhalten. Denn was für eine unerhörte „Pferdearbeit" ist es für einen solchen „Halbvorstand", in seinem Mitgliederkreise die Reichsverbandsbeiträge einzukassieren, und nun gar noch die Zumutung, nach mühevoller Ausfertigung einer Postanweisung das Geld an den Reichsverband auch abzuschicken.

Die Bekanntmachungen und Ersuchen des Reichsverbandes in den Fachzeitungen werden wohlwollend gelesen, dann aber nach erfolgtem Durchlesen des interessanteren Teiles mit dem Hefte beiseite gelegt und somit nicht weiter beachtet. Andere Herren nehmen sich vor, die Angelegenheiten des Reichsverbandes in den nächsten Tagen zu erledigen, verschieben dieses aber immer wieder auf den nächsten Tag und, energielos, wie diese Herren sind, unterbleibt eine Erledigung schließlich ganz.

Ja, meine Herren, so kommen wir aber nicht weiter! Der Reichsverband ist schließlich kein Vogelverein, welcher sich nicht den Luxus erlauben kann, sich an diesem mustergültigen Verhalten anderer Vereine mit ihren energielosen Vorstandschaften ein Beispiel zu nehmen. Was aber dem einen recht ist, ist dem anderen billig. Was würden aber wohl die Landesverbände und Lokalvereine für Gesichter machen, wenn eine solche Mißwirtschaft oder, besser gesagt, Mistwirtschaft beim Reichsverbande der Deutschen Vogelliebhaber herrschen würde. Wie unendlich lächerlich stände in solchem Falle der Reichsverband da.

Nein, meine Herren, ein solcher Schlendrian herrscht Gott sei Dank nicht in unserer Hauptorganisation, sondern an der Spitze des Reichsverbandes stehen andere Männer und Liebhaber als beispielsweise bisher an der Spitze des Landesverbandes Preußen! Die Angelegenheiten dieses Landesverbandes sind ja nunmehr seit seiner letzten Generalversammlung außerordentlich glücklich geregelt, und ich bin der festen Überzeugung, daß der Vorsitz desselben in keine berufeneren Hände gelegt werden konnte als in die des allgemein verehrten Herrn Gumprichs.

Meine sehr verehrten Leser, es ist endlich mal Zeit, daß das Wirken des Reichsverbandsvorstandes in den Fachzeitschriften lobend hervorgehoben wird, nur bedaure ich herzhaft, daß dieses bisher noch nicht von berufenerer Seite erfolgte. Wenn die Vorstände derjenigen Vereine, welche trotz wiederholter Aufforderungen dem Reichsverbande einfach nicht antworten, das Schaffen und Wirken unseres allgemein hochgeehrten und beliebten Herrn Petters in seinem unverwüstlichen Schaffensdrang einmal näher kennenlernen würden, so würden sie Herrn Petters mit den Reichsverbandsangelegenheiten nicht im Stiche lassen, sondern würden sich als reuige Sünder vor die Brust schlagen und sich in bester Selbsterkenntnis selber Besserung versprechen.

Und wo diese Besserung nicht zu merken ist, da, meine Herren Vereinsmitglieder, erteilt eurem Vorstande ein strenges Mißtrauensvotum, setzt ihn ab

und wählt euch einen anderen und besseren. Seid ihr wenigstens energisch!

„Lest die Bekanntmachungen des Reichsverbandes und stellt auf euren Vereinssitzungen stets die Anfragen, wie und ob die Ersuchen des Reichsverbandes in der letzten Nummer der und der Zeitschrift erledigt worden sind und wenn nicht, warum nicht, und wann diese Angelegenheiten denn erledigt werden sollen. Und auf der nächsten Sitzung stellt dieselben Fragen, vergeßt aber nicht über die Erledigung der alten auch die neuen Reichsverbandsbekanntmachungen."

Dazu seid ihr Vereinsmitglieder da und dafür habt ihr ein jeder Sitz und Stimme. Also kontrolliert eure Vorstände, daß euch beim Verlesen der Aus- und Eingänge nichts entgeht und nichts unterschlagen wird, damit die augenblicklich noch herrschende Mißwirtschaft, alias Lauheit, nicht weiter einreißt, sondern gebessert wird, damit unsere schöne Zentralorganisation in ihrem Bestreben, wie es sich gehört, von allen Seiten unterstützt wird und die Herren an der Spitze des Reichsverbandes Freude am Arbeiten haben!

Nur so kommen wir weiter, und darum mal mit aller Energie ran an die Erledigung der Vereinsinteressen und fort mit der bisher geübten, unserer schönen Liebhaberei so schädlichen Lauheit!

Der Steinrötel und die Blaudrossel.

Von J. Birk, Leipzig.

(Nachdruck verboten.)

Wenn ich heute Gelegenheit nehme, um zwei weniger bekannten Drosselarten einige Zeilen zu widmen, so tue ich dies, um diese beiden Vögel, die in der Vorkriegszeit häufiger in den Käfigen der Liebhaber anzutreffen waren, auch den Vogelliebhabern der Jetztzeit in empfehlende Erinnerung zu bringen, denn nicht nur ihre Schönheit, sondern auch ihr Gesang sowie die sonstigen Eigenschaften, wie anspruchslose Pflege und längere Lebensdauer im Käfig, machen sie zu geeigneten und begehrenswerten Stubenvögeln. In der Vorkriegszeit waren die Stein- und Blaudrossel, speziell die erstere, in den Käfigen der Liebhaber, auch in denen der Leipziger, öfter anzutreffen, ihre Beschaffung war in gewisser Beziehung auch eine leichtere, denn das Angebot war ein viel häufigeres als heute, ebenso auch der Preis ein angemessener. Den sich in der Vogelpflege erst kürzere Zeit betätigenden Liebhabern sind diese beiden einsamen Gebirgsbewohner sicher noch unbekannte Gäste in der Vogelstube. Sie auf die Stein- und Blaudrossel aufmerksam zu machen und das Interesse für ihre Haltung als Stubenvögel zu wecken, soll in erster Linie der Zweck der heutigen Abhandlung sein. Da ich leider bei meinem Verweilen in Gebirgsgegenden noch niemals das Glück hatte, eine der beiden Drosselarten in ihrem Freileben zu beobachten, so muß ich mich in dieser Beziehung auf die einschlägige Literatur stützen, im Käfigleben habe ich diesen Sängern schon einiges abgelauscht, was geeignet ist, sie als Stubenvögel begehrenswert zu machen.

Die Steindrossel (Monticola saxatilis (*L.*)), besser bekannt unter dem Namen Steinrötel, führt auch noch andere Namen im Volksmunde, wie Steinmerle, Steinamsel, Felsschmätzer, Gebirgsamsel, großer Rotschwanz, ein Beweis, daß sie in der Gegend ihres Vorkommens, trotz ihres versteckten Lebens in stiller Gebirgseinsamkeit, ein bekannter Vogel ist. Der Steinrötel, wie wir ihn wegen des in Liebhaberkreisen geläufigeren Namens auch fernerhin nennen wollen, ist ein ausgesprochener Gebirgsvogel, der in ganz Südeuropa, vereinzelter auch in Mitteleuropa, ferner auch in Gegenden Asiens vorkommt. In unserer engeren deutschen Heimat dürfte er nur noch im bayerischen Alpengebiet vorkommen. Die Literatur weist ihn bis 1900 am Rhein nach, ferner im Harz und in den Vogesen. In den Schweizer und Tiroler Bergen, überhaupt in Österreich, vor allem in Dalmatien sowie in den Karpathen, soll er nicht selten sein. In der Ebene ist er als Brutvogel wohl niemals anzutreffen, denn Felsen sind ihm ein Lebensbedürfnis, vor allem sind sonnig gelegene, zerklüftete kahle Felsenwände die bevorzugtesten Plätze; er nimmt auch mit Ruinen und sonstigem alten Gemäuer ab und zu vorlieb. An seinem Brutplatz ist ihm nicht so leicht beizukommen, denn er hält sich mit Vorliebe auf schwer zugänglichen Stellen auf und bevorzugt diese auch zur Anlage seines Nestes. Als Zugvogel kehrt er im April in sein Brutgebiet zurück und zeitigt im Mai sein meistens aus vier bis fünf Eiern bestehendes Gelege. Selbiges ähnelt im Ton dem Gelege der Singdrossel, variiert aber in Form und Fleckenzeichnung wie viele Gelege anderer Vögel. Sehr interessant soll der dem Männchen eigene Balzflug sein, indem es sich, ähnlich wie Baumpieper, Dorngrasmücke, bis zu einer gewissen Höhe erhebt, um dann in gaukelndem Fluge singend an den Ort des Auffluges zurückzukehren. Ein Beweis, daß wir es mit einem wetterharten Vogel zu tun haben, ist, daß er im Hochsommer bis zu 2000 m vorkommt, ja in wärmeren Gebirgszügen meistens nicht unter 1000 m als Brutvogel oder dann doch seltener anzutreffen ist. Dies dürfte wohl auch der Grund sein, wenn der Steinrötel im Handel nicht so häufig ist, und vor allem, daß alte Wildfänge selten angeboten werden. Zu Rauschs Zeiten war es nicht schwer, in den Besitz von Steinröteln zu gelangen; auch wir Leipziger Vogelliebhaber hatten verläßliche Quellen für derlei Seltenheiten wie Steinrötel, Blaudrossel und Orpheusgrasmücke; aber es war einmal, denn der Krieg hat auch diese Fäden zerrissen, ebenso ist auch die Ausfuhr lebender Vögel aus den für den Bezug dieser Vögel für uns am nächsten liegenden Staaten mit anderen Schwierigkeiten verbunden wie früher. Vielleicht regen diese Zeilen dazu an, daß sich der Vogelhandel wieder den Bezug von derlei in Deutschland selten erhältlichen Vögeln mehr angelegen sein läßt, speziell auch der Preisfrage eine reduzierende Wendung angedeihen läßt, damit nicht nur der bemittelte, sondern auch der weniger bemittelte Vogelliebhaber wieder seine Freude haben kann an dem Benehmen, der Schönheit und dem Gesang der beiden Einsiedler unserer Gebirgszüge. Wenn man den Steinrötel in seinem Benehmen, speziell in seinen Bewegungen beobachtet, weiß man nicht gleich, wo man ihn hintun soll, zu den Schmätzern, zu den Rotschwänzen oder zu den Drosseln. Zu letzteren gehört er unstreitig, denn die Eigenheiten dieser Vogelart treten am augenschein-

lichsten bei ihm hervor, auch die Nahrungsbedürfnisse sowie die Pflege im Käfig, ferner die Ausdauer als Käfigvogel sprechen dafür, daß wir es mit einer Drossel zu tun haben.

Ein männlicher Steinrötel im Sommerkleid ist eine Augenweide. Der, je nach dem Alter, in verschiedenen Nuancen vom Taubengrau bis zum Hell- oder Dunkelgraublau variierende Nacken, Kopf und Kehle, der lichtbraungraue Rücken mit einem sanften Hauch von Blau, der weiße Bürzel, die mattgelblich gesäumten schwärzlich dunkelbraunen Flügel, der rostrote, von zwei dunkelbraunen Federn in der Mitte geteilte Schwanz sowie die rostrote Unterseite machen den Steinrötel mit zu einem unserer farbenprächtigsten Vögel. Das Jugendgefieder gleicht annähernd dem des Weibchens, das im Vergleich zum Männchen an

Steinrötel.

dem graubraunen Rücken, Kopf und Hals mit dunklen Strichen und lichten Punkten bedeckt ist, die Seiten des Kopfes und der Vorderhals sind ein verschwommenes Weiß mit zarten dunklen Strichen, die Unterseite ist braun mit einem leichtgelblichen Ton, überflogen von schuppenartig gruppierten dunklen zarten Flecken, der Schwanz ist mehr braunrostrot. Im Frühjahrskleid sind beide Geschlechter nicht zu verwechseln, leichter ist dies schon bei Jungen im Nestgefieder. Doch auch da treten die Farben beim Männchen schon lebhafter hervor, auch zeigt der Kopf schon einen leisen Anflug von Blaugrau. An den mir bis jetzt zu Gesicht gekommenen Steinrötelmännchen konnte ich feststellen, daß, was leuchtende Farben und scharf abgegrenzte Verteilung derselben anbetrifft, gewisse Variationen vorkommen, sicher sind die farbenprächtigsten ältere, öfter vermauserte Vögel, hingegen die mit weniger intensiver Farbenpracht jüngere Exemplare. Es wäre auch nicht von der Hand zu weisen, daß eventuell auch beim Steinrötel wie bei verschiedenen anderen Vogelarten in dieser Hinsicht der Ort ihres Vorkommens mitbestimmend wäre, eine Frage, zu der mir die nötige Kenntnis, also auch ein Urteil fehlt. Ein Irrtum im Geschlecht ist also ausgeschlossen, man lasse sich aber bei jungen Vögeln nicht durch einen leisen Gesang auf den Gedanken bringen, daß der betreffende Vogel auch ein sicheres Männchen sein muß, denn hier kommt es ebenso vor, daß Weibchen leise singen, wie bei anderen Vogelarten, wie Singdrossel, Rotkehlchen usw. Leider ist es für den Liebhaber sehr schwer, einen Steinrötelwildfang zu erhalten, denn sein herrlicher Naturgesang hebt ihn sehr hoch in die Reihe unserer besten Sänger. Darum ist dem Liebhaber nur zu raten, nach einem Frühjahrsfang Umschau zu halten, sind sie auch im Preise viel höher, so läuft er dabei auch nicht Gefahr, für teures Geld einen minderwertigen Stümper zu erhalten. Doch auch ein Frühjahrswildfang hat seine Schattenseiten. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß nicht auch unter Herbstfrischfängen gute Vögel sind, im Gegenteil, die Herbstfänge sind ebenso gut, ja in gewisser Beziehung noch besser, denn da bietet sich Gelegenheit, ein junges Männchen zu erhalten, das bereits im Freien seinen Naturgesang erlernt hat, und diese jungen Vögel sind die als Käfigvögel geeignetsten. Bekanntlich sind alte Steinrötelwildfänge wohl gute Sänger, aber haben ein solch stürmisches, scheues Wesen, daß sie dem Pfleger damit keine Freude bereiten, noch dazu, da sie mit dem Gesang oft sehr lange zurückhalten, überhaupt niemals die jungen Vögeln dieser Art eigentümliche Anhänglichkeit und Zutraulichkeit dem Pfleger gegenüber zeigen. Warum wir im Herbst leider auch sehr viele stümperhafte Sänger in die Käfige bekommen, hat seinen Grund darin, daß die meisten im Herbst in den Handel kommenden Steinrötel jung dem Neste entnommene aufgepäppelte Vögel sind, die vom Naturgesang herzlich wenig

mitbringen, die höchstens noch, wenn sie in den Bestand verschiedenartiger guter Sänger eingereiht werden, als Imitatoren ihren Platz im Käfig ausfüllen. Gerade das dem Steinrötel in reichlichem Maße eigene Imitationstalent wirkt, wenn er nur Gutes zu hören bekommt, begeisternd auf seinen Pfleger, verbindet hingegen ein Steinrötel die sich angeeigneten Imitationen mit seinem melodischen Naturgesang, so ist er am wertvollsten. Darum halte ich für die Käfigung für am vorteilhaftesten jüngere weniger stürmische Vögel. Trotzdem muß ausdrücklich betont werden, daß neben den vorstehend angeführten Gründen die Gesangsleistung auch auf individueller Veranlagung des Vogels beruht, eine Tatsache, die jedem Vogelwirt längst bekannt sein dürfte. Ebenso wie man in der Vogelhaltung niemals nach einem Schema arbeiten kann, sondern in Käfigung und Pflege nicht nur der Art, sondern auch dem Individuum gerecht zu werden versuchen muß, ebenso müssen wir uns bei jedem Vogel auf eine individuelle Gesangsleistung, die günstig oder ungünstig von uns gewertet werden muß, einstellen. Wenn ich davon rede, daß ich schon wirklich armselige gesangliche Stümper gehört habe, so muß ich auch lobend hervorheben daß mir auch Steinrötelgesang bekannt ist, der jeden Gesangsliebhaber befriedigen dürfte. Mein Wunsch ist es längst, einen derartigen Meister seines Gesanges zu erhalten, doch ist dies für die Liebhaber, die nicht in dem Brutgebiet der Steinrötel selbst auswählen können, nur ein Glücksspiel mit der Aussicht auf einen Treffer. Vor allem muß versucht werden, den Vogelhandel in Deutschland sowie die Liebhaber wieder mehr für den Steinrötel zu interessieren, denn dieser Vogel verdient es, nicht etwa nur seines Gesanges willen, denn ein wirklich wahrer Vogelliebhaber wird und soll niemals nur ein extremer Gesangsliebhaber sein, sondern wegen der ihm sonst noch anhaftenden guten Eigenschaften eines Käfigvogels, wie Zutraulichkeit, Zahmheit, Schönheit des Gefieders, anspruchslose Pflege sowie langjährige Ausdauer im Käfig, ein häufigerer Gast in der Vogelstube des deutschen Liebhabers zu werden, vorausgesetzt, daß bei ihm der noch viel zu teure Beschaffungspreis sich nicht nach dem Geldbeutel der Besserbemittelten, sondern auch nach dem schwachen Fonds der für ihn ebenso begeisterten weniger bemittelten Liebhaber richtet. Im Käfig ist der Steinrötel wirklich ein anspruchsloser Gast und erfreut seinen Pfleger lange Jahre mit Gesundheit und fleißigem Gesang; selbst beim Lampenlicht der stillen Winterabende verschönert er das Heim des Liebhabers und macht es vertraulich mit seinem stets angenehmen Liedchen. Eine Ausdauer im Käfig bis zu zehn Jahren ist keine Seltenheit bei dem Steinrötel, einen zwölf Jahre im Käfig lebenden kannte auch ich, nicht das geringste verriet sein ansehnliches Käfigalter. Fleißig im Gesang, schön im Gefieder und, was beim Steinrötel mit eine sehr beachtenswerte Bedingung ist, gesund auf den Füßen. Leider macht sich öfter beim Steinrötel im Käfig eine Fußkrankheit bemerkbar, die ich in der Hauptsache, vielleicht auch irrtümlich, auf die widernatürliche Sitzgelegenheit auf Holzsitzstangen zurückführe, trotzdem kann auch die Fütterung mit zu viel Mehlwürmern die Ursache sein. Wir Leipziger Liebhaber früherer Zeiten, denn seit dem Kriege wird bei den mir bekannten Liebhabern nur erst wieder ein Steinrötel gekäfigt, vertreten, und ich denke mit Recht, die Ansicht, daß die Füße des Steinrötels, ebenso auch die der Blaudrossel, eine natürliche Sitzgelegenheit haben müssen, die auf die Füße so kühl wirkt wie das Felsengestein ihres Aufenthaltsortes in der Natur. Den besten Beweis, daß er eine solche Sitzgelegenheit vorzieht, wird man haben, daß, wenn man dem Steinrötel einen faustgroßen runden Stein in den Käfig legt, und dies halte ich sogar für eine dringende Notwendigkeit, er mit Vorliebe die meiste Zeit darauf zubringt. Früher waren auch Sitzstangen aus Ton erhältlich, und auch diese hielten wir Leipziger gut für den Käfig des Steinrötels und der Blaudrossel. Auch mit Gips umzogene Sitzstangen waren gebräuchlich, für jeden Fall halte ich die vorgenannten Tonsitzstangen, deren Herstellung wohl keine allzu großen Schwierigkeiten bieten dürfte, für den sehr zu Fußkrankheiten neigenden Steinrötel für sehr vorteilhaft. Mit einem fußkranken Vogel wird man wenig Freude haben, darum auch hier, verhindern ist leichter als heilen. In der Pflege ist der Steinrötel anspruchslos, er ist mit einem einfachen, aber guten Futter zufrieden, man vermeide bei dessen Zusammenstellung die stark fettbildenden Stoffe, wie Weißwurm, gemahlenen Hanf, zu reichlich zu bemessen, im Gegenteil dürfte sich deren Verwendung erübrigen, da ja Steinrötel meistens viel fressen und daher sehr leicht fett werden. Außerhalb der Gesangszeit sei man mit der Mehlwurmfütterung sehr karg, überhaupt versuche man nicht mit Mitteln, wie Rinderherz, gekochtes Hühnerei usw., außer der Gesangszeit zu treiben, denn erstens sind geschwollene, entzündete Füße eine Folgeerscheinung, ferner fördern sie die Neigung zu krampfartigen Anfällen. Man achte daher auf eine normale Körperbeschaffenheit, da Neigung zur Fettsucht eine Eigentümlichkeit der Art ist. (Forts. folgt.)

Entgegnung zu dem Bericht des Herrn Ludwig Frank.

Von Alb. Freiwald, Hemelingen.

(Nachdruck verboten.)

In Heft 24 der „Ges. Welt" schreibt Herr Ludwig Frank über den Gesang des Nachtigall-Kanarienhahnes, den Herr Reich auf Bitten des Herrn Prof. Dr. Fehringer an diesen Herrn gesandt hatte. Herr Frank schreibt, was wir hörten, war reiner Kanariengesang, mit sehr langen und guten Strophen, die Teile des Gesanges, die an Nachtigallenschlag erinnern sollten, ähneln den Schappertouren der früheren Landkanarien. Der Gesang machte den Eindruck eines guten Kanarienvogels mit Schappertouren. Ich nehme an, daß Herr Frank keine Schappertouren kennt und ihm der häßliche Beigeschmack, den das Wort Schapper für jeden deutschen Züchter hat, unbekannt ist, denn sonst könnte er einen solchen Bericht nicht schreiben. Ich weiß auch nicht, ob Herrn Frank bekannt ist, daß auf Ausstellungen von Edelkanarien Vögel mit Schappertouren nicht zugelassen werden. Denn wäre Herrn Frank dieses bekannt,

dann wäre es, gelinde gesagt, eine Beleidigung des Züchters und der Herren, die die Reichschen Vögel in Mannheim und Dresden mit der großen goldenen Medaille, der höchsten Auszeichnung, die verliehen werden kann, geehrt haben. Daß man im Mai keinen Kanarienvogel abhören kann, ist übrigens jedem Kenner und Züchter bekannt, und ist der Monat Mai die ungünstigste Zeit, einen Kanarienvogel abzuhören, da dann die Vögel in der höchsten Brunst sind und gewöhnlich auf ein paar Touren, und zwar den leichtesten, herumreiten. Darum finden die Ausstellungen der Edelsänger in den Monaten Dezember und Januar statt, da dann die Vögel auf der Höhe ihres Gesanges stehen. Nun zu dem Vogel, den Herr Reich auf Bitten des Herrn Prof. Dr. Fehringer diesen sandte. Ich hatte zufällig Gelegenheit, diesen Vogel des öfteren abzuhören, und kann Herrn Frank verraten, daß der Vogel neben schönen Kanarientouren auch über verschiedene schöne Touren der Nachtigall verfügte. Denn das ist das Charakteristische der Nachtigall-Edelkanarien, daß sie die Touren der Nachtigall stoßend, sich fast überschlagend, und doch mit einem eigenen Schmelz zu Gehör bringen. Das tat der Vogel, den Herr Prof. Dr. Fehringer hatte ausgezeichnet, nur war der Vogel etwas zu hart. Daß Herr Reich nicht einen seiner besten Vögel sandte, lag daran, daß Herr Reich seine Hecke schon im Schwung hatte und dazu selbstverständlich sein bestes Material gebrauchte. Den Schlag der rheinischen Nachtigall in Ehren. Ich kann Herrn Frank versichern, daß wir hier in Norddeutschland ebenso gute Vögel haben, und als alter Nachtigalliebhaber, der über 20 Jahre Nachtigallen pflegt, jedes Jahr vier bis sechs Stück prima Vögel, kann ich Herrn Frank nur raten, den Schlag der rheinischen Nachtigall zu studieren. Wenn er dann die Nachtigalltouren als Schappertouren anspricht, werden die Liebhaber der Sängerin der Nacht nur ein stilles Lächeln dafür haben. Der Vogel, den Herr Prof. Dr. Fehringer im Besitz hatte, gelangte am 31. Mai, also am ersten Pfingsttage, schwerkrank an Herrn Reich zurück, ging bald ein und war nach meiner Meinung schon am 21. Mai krank. Da sonst beim Abhören von wertvollen Vögeln peinlichste Ruhe von jedem Anwesenden gefordert wird, Herr Frank aber selbst schreibt, daß bei dem lauten Stimmengewirr der Besucher die anderen Vögel leider nur wenig abzuhören waren, beleuchtet schon diese Tatsache, daß unter solchen Umständen das sorgfältige Abhören des Kanarienhahnes ausgeschlossen war.

Etwas über die Ernährung zarter Weichfresser.

Von Karl Finck, Neukölln

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Unermüdlich fängt das Rotbrüstchen die winzigen schwarzen Moderfliegen oder erbeutet im eleganten Fluge

Blaudrossel.

einen Brummer, der sich soeben an der beleuchteten Wand sonnte.

Die Tür des Vorraumes eines Gewächshauses steht offen. Auf den Pflanztischen liegen Dahlienknollen ausgebreitet. Der Raum ist ziemlich warm und verschiedene kleine Fliegenarten schwärmen umher. Bei unserem Eintritt huschen zwei Zaunkönige hinaus. Diese Knirpse wissen jede Nahrungsquelle aufzufinden; sie trieben sich den ganzen Winter hier herum, durchstöberten alle Winkel nach überwinterten Mücken, Fliegen und Schmetterlingseiern, verzehrten auch abgestorbene Kerfe, ja selbst die ausgesogenen Bälge in den Spinngeweben, ebenso alle verpilzten, von der Pest abgetöteten Fliegen. Nur die gelben, wollenen, vom Volksmunde „Raupeneier" genannte Kokons der Kohlweißlingsschlupfwespe (Microgaster glomeratus *L*), welche man meistens in unmittelbarer Nähe der abgestorbenen Wirtsraupe findet, blieben unbeachtet. Im allgemeinen nehmen Vögel Raubfliegen, Schlupfwespen und Mordkäfer nicht an. Vor den Schlupfwespen (Ichneumoniden) ist kein Insekt sicher. Auch die zweckmäßigsten und raffi-

nierteſten Schutzmaßnahmen nützen meiſt nicht viel: der furchtbare Legeſtachel des erbarmungsloſen Mordgeſellen ſiegt überall.

Von Raupen, Käfer-, Fliegen-, Mücken- und Blattweſpenartenlarven, die Pflanzen zerſtören, bleiben in manchem Jahre nur wenige Prozente von dem entſetzlichen Schickſal, durch eingeimpfte Schlupfweſpenbrut bei lebendigem Leibe aufgefreſſen zu werden, verſchont. Die Schlupfweſpen und ſonſtige Mordinſekten bilden in der Natur ein unerbittliches Gegengewicht, um Pflanzenſchädlinge und andere Kerfe in Schach zu halten. Aber ſelbſt die Raubinſekten werden wieder von Schmarotzern befallen.

Das Treiben der nützlichen Inſekten iſt wenig bekannt; ſie ſind unſere beſten Mithelfer im Kampfe gegen alle Pflanzenvernichter. Letztere haben aber ebenfalls im Naturhaushalte wichtige Aufgaben zu erfüllen und müſſen nach Erledigung derſelben zum Wohle des Ganzen wieder verſchwinden. Der einſeitige Maſſenanbau einzelner Kulturpflanzen ſchafft für viele Schädlinge ideale Lebensbedingungen und ermöglicht erſt ihr kataſtrophales Auftreten.

Wir verlaſſen nun die Gärtnerei. Über der dürftigen Winterſaat jubilieren Lerchen. Ein Bauer pflügt ſeinen ſandigen Acker um. Hinter ihm, in den offenen Furchen ſchreiten wichtig mit klugen Augen mehrere Nebelkrähen. Jeder freigelegte Wurm wird blitzſchnell ergriffen. Nun ſtreiten zwei Grauröcke krächzend um eine erbeutete Maus. Das arme zappelnde Opfer wird hin und her gezerrt, bis ſchließlich der Sieger mit ſeiner Beute nach dem nächſten Prellſtein fliegt.

Emſig, ein wenig aufgepluſtert, von der weiten beſchwerlichen Reiſe noch angegriffen, laufen weiße Bachſtelzen umher und erbeuteten fortwährend etwas Genießbares.

Zwiſchen Erlen, die im Schmucke bräunlicher Kätzchen ſtehen, und weißſtämmigen Birken blaut ein kleiner Tümpel. Auf dem Waſſer ſchimmern vereinzelt dünne Eisplatten, hart rauſcht das dürre Rohr.

„Ich hab' dich ſo lieb", ſingt im Weidengeſtrüpp ſchwermütig die Goldammer. Der Wind wirft fortwährend Wellen an's Ufer. Wieder feſſelt uns in unmittelbarer Nähe ein Zaunkönig. Durch das Glas kann man deutlich ſehen, wie der Wicht die ausgeſpülten Waſſerflöhe und Mückenlarven aufliest.

Am andern Tag herrſcht trübes, kaltes Wetter. Zeitweiſe ſtrömt Regen herab. Jede Lenzfreude iſt erloſchen. Kein Vogel ſingt mehr. Selbſt die luſtigen Stare ſitzen mißmutig umher. Unſer Rotkehlchen das geſtern ganz frühlingsmäßig flötete, macht bange Augen und bereut ſein zu frühes Kommen.

Gartenarbeiter karren Komposterde aus. Sofort erſcheinen Ackermännchen, Rotkehlchen und Zaunkönige, um die winzigen ſchwarzen Fliegen wegzufangen, die ſchon im zeitigen Frühling in gewaltigen Mengen auftreten, wo pflanzliche Stoffe verzehren.

Aber auch die ſchlimmen Zeiten vergehen. Länger werden die Tage, wärmer ſcheint die Sonne und die Vegetation ſchreitet raſch vorwärts. Berauſchend duftet der Goldlack, die dicken Knoſpen der Fliederbüſche ſpringen auf, Johannis- und Stachelbeerbüſche ſchmücken ſich mit hellem Grün und nach einem lauen Nachtregen ſtehen die Frühkirſchen in voller Pracht. Bald folgen Pflaumen- und Birnbäume. Zwiſchen dem ſchneeigen Weiß erſcheinen überall zarte Blätter.

Die jungen Räupchen der beiden Froſtſpanner und verſchiedener Wicklerarten machen nun großen Schaden. Apfelblüten- und Birnknoſpenſtecher ſind fleißig an der Arbeit. Die Zahl der Obſtbaumſchädlinge vermehrt ſich von Woche zu Woche. Mancher Gärtner ringt verzweiflungsvoll die Hände.

Für die gefiederten Sänger iſt überall reichlich der Tiſch gedeckt. Fleißig läßt der Fitisvogel ſeine Schalmei erklingen und verzehrt eifrig die noch winzigen Blattraupen.

Der Flieder blüt. Überall prunkt holdes Frühlingsleuchten. Sehnſuchtsvoll ſchlägt im Parke die Nachtigall, feurig orgelt die Gartengrasmücke, unaufhörig klappert das Müllerchen, und aus allen Gärten tönt das fröhliche Geplauder des Sprachmeiſters.

Kleine Motten, Mücken, Laubſpinnen, weiche Larven, vor allen Dingen aber glatte, unbehaarte Räupchen bilden nun die Hauptnahrung. Später werden mit Vorliebe Blattläuſe verſpeiſt. Die Gewebe derartiger Inſekten ſind ungemein zart, leicht verdaulich und enthalten 3—5 Prozent Eiweiß. In ihren mit Pflanzenſäften angefüllten Verdauungsorganen, auch in anderen Körperpartien finden ſich zahlreiche Chlorophyllkörper vor, die ohne Zweifel im Vogelorganismus eine Rolle ſpielen, wenigſtens verblaßt beim Gelbſpötter, Fitisvogel uſw. die gelblich-grünliche Farbe in der Gefangenſchaft ſtets, ſobald die Tiere keine grünen Inſekten mehr bekommen.

Die Exkremente der freilebenden Wurmvögel ſind weich, klein, fein umhäutet, niemals maſſig. Auch die empfindlichſten Zärtlinge zeigen Ausdauer, ſo lange ſie die natürliche Nahrung bekommen, welche ſich eben durch keine andere erſetzen läßt. Selbſtverſtändlich muß man die veränderten Lebensbedingungen, wie ſie nun einmal die Gefangenſchaft mit ſich bringt, in Erwägung ziehen. Die vollſtändig naturgemäße Ernährung gehört leider zu den unerreichbaren Idealen, doch iſt nach meinen Verſuchen in allen Fällen ein völlig genügender Ausgleich durchführbar.

Friſche Ameiſeneier erſetzen bis zu einer beſtimmten Grenze das Naturfutter. Die Vorteile der blanken Fütterung dürften jeden Liebhaber bekannt ſein.

Jedenfalls würde die Haltung der zarteſten Wurmvögel im Winter weniger Umſtände machen, wenn man auch um dieſe Zeit friſche Puppen verabfolgen könnte. Leicht abgeſchwelgte Ameiſeneier ſind, wie ich ſchon einmal in der „Geſ. Welt" klargelegt habe, im gefrorenen Zuſtande unbegrenzt haltbar und nach dem Auftauen noch wochenlang verwendbar. Die Aufbewahrung geſchieht am beſten in einer Kühlkammer. Auf dieſe Weiſe laſſen ſich tatſächlich friſche Puppen uſw. für die kalten Monate konſervieren.

Ohne Zweifel hat die Vogelliebhaberei im Laufe der Zeit erhebliche Fortſchritte gemacht. Früher fütterte man, wie noch Bechſtein vorſchreibt, Wurmvögel mit erweichtem, ausgedrücktem Weißbrot, zerſtoßenem Mohn, Fleiſch, Gerſtengrütze uſw. Ameiſenpuppen und Mehlwürmer galten als Leckerbiſſen. Die Reſultate waren freilich mehr als traurig. Beſſere

Erfolge zeitigte die Wiener Methode, weil Ameisenier, Weißwurm und Mehlwürmer zu den Hauptbestandteilen des Mischfutters erhoben wurden und die Vögel nicht vorwiegend naturwidrige Stoffe verzehren mußten.

Ich bin selbst gebürtiger Wiener und kenne das dortige Verfahren seit meiner frühesten Jugend.

Manche Liebhaber befeuchteten damals die trockenen Puppen usw. nur mit wenig fein geriebener fleischiger Möhre. Andere Pfleger vermischten die Grundfutterarten nach altem Brauch mit zwei Teilen geriebener scharf ausgepreßter Mohrrübe. Meistens wurden aber derart große Futtermengen verabfolgt, daß die Vögel doch nur die Ameiseneier, den Weißwurm und das Rinderherz aussuchten. Die Rübenteilchen blieben mehr oder minder eingetrocknet als Rest in den Näpfen zurück. Sobald die Tiere das Rübengemisch dauernd vollständig verzehren mußten, wurden sie unansehnlich und saßen, wie sich die Wiener ausdrückten, tramhappert (traumhaft) umher. Auch in Österreich sah ich viele krankhafte, schlecht gepflegte Vögel.

Im Sommer fütterte man allgemein blank. Die wundervollen Wälder der herrlichen Umgebung lieferten Ameiseneier überreich, und die Kräutersucher boten solche häufig zu wahren Schleuderpreisen an. Diese naturgemäße Ernährung glich entstandene Schäden teilweise wieder aus. Eine geteilte Fütterung war unbekannt. Im Winter gehörte die leidige Verfettung zu den verbreitesten Übeln. (Forts. folgt.)

Moearah-Tjiassem.

29. Mai 1916 bis 2. Juni 1916.

Von August Spennemann.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Von Westen her kommt jetzt ein anderer Gast. Das ist der Woewangkoe, der Seeadler, Pandion leucocephalus. Er fliegt in beträchtlicher Höhe. Plötzlich schießt er ziemlich steil herunter, verschwindet einen Augenblick unter'm Wasser und kommt mit einem Fisch, von vielleicht 25 cm, wieder zum Vorschein. Den Fisch hält er in den Fängen, in der Luft schüttelt er sich das Gefieder trocken, daß die Tropfen nach allen Seiten spritzen, arbeitet sich höher, schlägt wechselseitig die Fänge tiefer in die glatte Beute, schraubt sich noch immer höher und höher, fliegt der Richtung zu, von wannen er kam und verschwindet schließlich meinen Augen über dem Apiapiwalde.

Der rotweiße Schreiseeadler, Haliastur intermedius, fischt ganz anders; er nimmt seine Beute mit Vorliebe von der Oberfläche des Wassers weg. Ganz einerlei, ob es sich um treibenden Abfall oder um untief schwimmende Fische handelt, er greift sie mit den Klauen heraus, d. h. wenn er nicht fehlgreift, was auch häufig genug bei ihm vorkommt So etwas sah ich gestern (31. Mai 1916) noch. Auf dem Wasser trieb ein toter, etwa 10 cm langer Fisch. Ein Schreiseeadler stieß auf ihn und stieß fehl, er strich ab, kam jedoch bald wieder zurück und stieß abermals. Wie ich deutlich mit dem Glase sehen konnte, schlug er seine geöffneten Fänge vor dem Fische ins Wasser. Blitzschnell schlug er jetzt die Läufe zurück und hielt den Fisch in den geschlossenen Fängen. Er flog hiermit dem Apiapiwalde zu. Häufig verzehrt der Heulang seine Beute auch bereits im Fluge. Er bringt dann ruckweise die Beute in den Fängen und den Schnabel während des Fliegens einander entgegen, unterbricht seinen Flug durch sekundenlanges Schweben, reißt und zerrt ein Stück ab und wiederholt das so oft, bis nur noch die Gräten übrig sind, die er fallen läßt. Er begibt sich dann gewöhnlich sofort wieder auf die Jagd.

Es ist jetzt Ebbe, und die Eingeborenen haben den großen mit Bambusgattern umzäunten Platz, den Sèro, leergeholt. Mir hat die Flut diese Nacht

im Sèro ein junges, kaum $^1/_2$ m langes Krokodil zurückgelassen, das jedoch schon ganz infam beißen kann. Zwei große Krähen oder Raben, Corone macrorhyncha, zwei Schreiseeadler, drei Marabus, Leptoptilus javanicus, einige blaue Reiher, Ardea cinerea, halten Nachlese zwischen den Gattern. Am scheuesten sind die blauen Reiher, und am unverschämtesten natürlich die Raben, aber doch lassen sie nie die Vorsicht außer acht. So ein Marabu hinwieder ist die personifizierte Gleichgültigkeit. Kleinen sudanesischen Bengels gegenüber scheint er überhaupt nicht scheu zu sein. Gestern hielten in einem Sèro drei dieser Jungens an der untiefen Landseite Nachlese, während die alten und älteren Leute dies Geschäft in der Mitte und an der tieferen Seeseite besorgten. Mit den Jungens zusammen suchten auch ein halbes Dutzend Kropfstörche das Watt ab; sie kamen oft den Jungens in Greifnähe, aber die beiden so ungleichen Fischer nahmen gar keine Notiz voneinander, weder die boedaks von den bangos, noch diese von den boedaks.

Überall auf dem Watt verbreitet sitzen die kleinen hübschen Rallenreiher, die blekôks oder boeka-oepis (Ardeola speciosa). Und auf den Merkzeichen der Fischer, den Bambusstöcken, sitzen mehrere Halcyon sanctus (Abb. s. unten). Auf dem wagerechten Astzacken einer angeschwemmten Baumruine sitzt der Heulang von soeben, und im seichten Wasser fischt ein Pelikan, Pelecanus philippensis *Gm.* Er scheint sich hier, wo das Wasser größeren Reihern und den Maraboes bis an den Bauch geht, mit Vorliebe aufzuhalten. Beim Fischfang legt er den Kopf so weit wie möglich zurück, so daß der nach dem Wasser zeigende Schnabel mit der Wasseroberfläche beinahe parallel liegt, macht sich so niedrig wie möglich und schwimmt langsam voraus. Ist ein Fisch in seiner Nähe, so stößt er den Schnabel pfeilschnell wie eine Harpune voraus und fängt den Fisch in seinem weiten Kehlsack auf. Größere Fische scheint er sofort zu verschlingen, von den kleineren scheint er erst in seinem Kehlsack eine genügende Menge zu versammeln, um sie dann, einen nach dem anderen, herunterzuschlucken. Häufig hält er mit hochgerecktem Halse längere Zeit Umschau, faßt einen Fleck ins Auge und schwimmt dann in der eben beschriebenen geduckten Haltung darauf zu, stößt plötzlich zu und kommt mit einem Fisch zwischen den Schnabelspitzen wieder zum Vorschein, der ungefähr so lang wie der vierte Teil seines Schnabels ist. Einmal ließ der Pelikan einen so gefangenen Fisch sofort wieder los, aus welchem Grunde, das kann ich leider nicht sagen. Nur zweimal während der vier Tage hatte ich Gelegenheit, die Stimme der Pelikane zu hören. Es war ein lautes „oek dek", wobei der Schnabel ein wenig geöffnet und der Kopf auf eigentümliche Art geschüttelt wurde, so daß der schlapp herunterhängende Sack des Unterschnabels hin- und herwapperte.

In der schon leergeholten Fischreuse (Sèro) sind jetzt 10 Marabus am Nachfischen. Dem einen Pelikan hat sich inzwischen noch ein zweiter zugesellt, und jetzt, es ist $^1/_2$11 Uhr, scheinen die beiden genug gefischt zu haben; sie baden nach Enten- und Gänseart im seichten Wasser, setzen sich dann auf die dicken Äste eines im Wasser liegenden angeschwemmten Baumstammes, lüften die Flügel halb, ordnen mit den unförmlichen Schnäbeln ihr Gefieder, schütteln und schlagen heftig mit den Flügeln und lassen ihre Federn von Wind und Sonne trocknen. Eine viertel Stunde später kommt noch ein Dritter hinzu, der jedoch erst noch fischt. Auch die Marabus in und bei den Fischreusen halten jetzt Siesta. Wie kahlköpfige Weltweise stehen sie auf grüner Landzunge in Gesellschaft einiger Raben, die in kürzeren oder längeren Zwischenpausen ihr gaok! gaok! ertönen lassen, und von einigen großen blauen Reihern, die bald auf dem Bambusgeländer der Fischreusen balancieren, bald gravitätisch durch den Moder marschieren.

Von Westen her kommen jetzt 17 Pelikane angeflogen. Erst halten sie sich niedrig und fliegen etwa 15 m über dem Wasser, bei der Flußmündung jedoch schrauben sie sich höher, nehmen von hier einige Marabus mit, die aber bald wieder einfallen, und ziehen schließlich, weite Kreise beschreibend, ganz langsam schwebend, beinahe ohne jeden Flügelschlag, nach Südosten. Um 11 Uhr sitzen die drei Pelikane noch immer auf dem Baumstamme, um $^1/_2$12 Uhr fischen sie wieder, und eine halbe Stunde später fliegen sie dicht über dem Wasser mit kräftigen, rasch fördernden Flügelschlägen nach Osten.

Dort, wo die Wellen der aufkommenden Flut sich brechen, badet an einer seichten Stelle Haliastur intermedius. Und er badet gründlich. Im Wasser, auf dem Schlick sitzt er und läßt sich die Spritzer auf den Rücken fallen, schlägt dabei kräftig mit den Flügeln, duckt sich, schüttelt sich und scheint sich bis auf die Haut zu durchnässen. Von Zeit zu Zeit fliegt er auf einen angeschwemmten Baumstamm, der vor der Sandbank liegt, sträubt's Gefieder, läßt die Flügel hängen, rüttelt sich und nimmt ein neues Bad, so treibt er es sechsmal. Schließlich läßt er sich auf der Sandbank etwas gründlicher trocknen, macht seine Toilette sorgfältiger und streicht dann dem Mangroven-Walde zu.

Des Morgens um 5 und 6 Uhr segeln regelmäßig die Fischerprauwen hinaus und kommen in



Götzenliest.

den Nachmittagsstunden zwischen 3 und 4 Uhr wieder zurück. Jetzt herrscht reges Leben hier am kleinen Strande. Große Bambuskörbe, gefüllt mit kleinen Fischen, wie tandjan, pepetek, selar und trie werden ausgeladen und die giftigen boenteks, die so auffallend gefärbt sind, weiß mit roten Flecken, werden weggeworfen. Dann kommen aus dem Raume selbst die größeren Fische, wie Kakap-laoet, nanjoen, talang-talang, bambangan (roter Kakap) und andere. Einzelne Haie (tjoetjoet) und Rochen (pé und pé-manoek) sind auch immer dabei. Die Zwischenhändler sind auch schon da, und sofort wird der größte Teil des Fanges verhandelt.

Geradezu unverschämt benehmen sich hier tagtäglich zwei Raben, C. macorrhyncha; aus den Körben, während die Leute dabei sind, stehlen sie die kleinen Fische, beeilen sich auch gar nicht, diese erst zu verschleppen, sondern verzehren sie gleich an Ort und Stelle.

Allmählich ist jetzt die Flut wieder aufgekommen und das Watt ist verlassen von den größeren Vogel-

Ind. Graumeise.

arten. Im Api-apiwalde läßt sich Prinia familiaris und Orthotomus sepium hören; hier streift ein kleiner Schwarm Parus cinereus (s. obenstehende Abb.) und hundert Schritte weiter eine Gesellschaft Zosterops flava umher.

Jyngipicus auritus führt seine drei Jungen spazieren und ein Trupp von sechs Acridotheres javanicus hält kurze Rast auf einem hohen Baume. Und abends, nach dem Einfall der Dämmerung, ziehen wieder die Nachtreiher aus, und derselbe Vogel, Copsychus musicus, der in der Frühe der Sonne den ersten Morgengruß brachte, singt ihr auch am Abend das letzte Abschiedslied.

Finkenmischlinge und anderes.

Von Walter Schmelzer, Madrid.

(Nachdruck verboten.)

Manche interessante und lehrreiche Arbeit über Pflege und Zucht unserer Singvögel wurde in einer langen Reihe von Jahren in unserer „Gef. Welt" gebracht. Ich glaube bestimmt, daß in dieser schönen Zeitschrift der Wunsch eines jeden in unserem großen Liebhaber- und Leserkreis Rechnung getragen wurde. Bringt doch die „Gef. Welt" auch für den verwöhntesten Pfleger schöner Seltlinge seinen Teil. — Mir persönlich gereicht es stets zu besonderem Vergnügen, die jeweiligen Schilderungen über die so interessante Bastardzucht einheimischer, wie auch fremdländischer Finkenvögel in stillen Feierstündchen durchzulesen, da man sich dadurch manchen guten Wink zur praktischen Ausführung solcher Zuchtversuche aneignen kann. Von jeher wurde ja gerade den Blendlingen großes Interesse entgegengebracht, und immer wieder kommen neue Überraschungen auf dem Gebiet der Züchtung dieser Vögel zutage.

So will ich nun heute auch einmal ein wenig von meinen gefiederten Freunden, deren es eine ganze Anzahl gibt, plaudern. — In den ersten Jahren meines Aufenthaltes in Spanien war es mir durch die Verkettung der Verhältnisse leider nicht möglich, im glücklichen Besitze, wie man zu sagen und stets zu wünschen pflegt, einer Vogelstube zu sein. Wohl oder übel mußte ich mich mit mehreren unschönen fertiggekauften Zuchtkäfigen begnügen, worin ich trotz alledem recht nette Zuchtresultate erzielte, auf die ich später noch eingehender zurückkommen werde. Heute ist gottlob alles anders geworden. — Mit großer Geduld habe ich mir mit der Zeit sehr schöne und ebenso praktische Einzelhecken selbst gezimmert, und jetzt bin ich auch glücklicher Besitzer eines sonnigen, wenn auch nicht sehr geräumigen Flugraumes, den ich mit Mandel- und Tannenzweigen und recht viel anderem Grün ausgestattet habe und dessen Baumschmuck ich immer wieder bei Gelegenheit erneuere. Hier in diesem kleinen Paradies tummelt sich eine buntfarbige Finkenschar. Alles, was sich nicht zur Einzelhecke eignet, hält hier seinen Einzug; gewiß nicht zur Unzufriedenheit des Einzelnen. Gar lustig ist die Sängerschar im Sonnengold am drahtvergitterten Balkon. Hier wird bis zum langsamen Hinscheiden der letzten Sonnenstrahlen geschwatzt und gesungen, um sich dann im angenehm kühlen Innenraum munter auszufliegen und meistens im frischen Naß ein erquickendes Bad zu nehmen. Es ist eine wahre Lust mit anzusehen, wie wohlig so sieben, acht Kerlchen auf einmal im großen Badenapf herumplätschern. Hierauf kommt der Dämmerungsschmaus, und bald liegt „Waldfriede" im ruhigen Schlaf.

Manchmal geht es doch nicht ganz ohne Gezänk her. Immer gibt es einen Raufbold, der seine Mitbewohner nicht leicht zur Ruhe kommen läßt, und um ein bevorzugtes Schlafplätzchen wird ein wenig gerauft. Wenn es mit einem dieser Raufgesellchen denn doch zu toll wird, was ja in der Brutzeit nicht ausbleibt, so muß es halt zu seinem Bedauern in Einzelhaft zurück, bis es sich eines Besseren besonnen und wieder Zutritt zum Freiflug bekommen kann. Noch vor wenigen Tagen mußte ich den Buchfink schleunigst absondern, da er es gar zu toll getrieben hat und meinen schönen Grünfinken — Gatte einer Seiferthenne — ganz furchtbar beinahe zu Tode zugerichtet hat. Ich fand den Unglücklichen zusammengeballt und verwundet an der Seite seiner gelbgrünen Gefährtin, die treu auf fünf Eiern im Harzerbauerchen unter einem Zypressenzweig sitzt. Ob dies alles Eifersuchtsszenen gewesen sind, weiß ich nicht. Freilich hatte Freund Buchfink stets ein Auge auf die Gelbschöne, aber nachdem eine wunderschöne Albinospätzin mit ihren schneeweißen Flügeln, Bauch und Schwänzchen, mit grau- und weißgeschupptem Köpfchen und Oberrücken ihren Einzug gehalten, war der Buchfink von solcher Schönheit entzückt und gleich war sie umflogen und umworben mit seinem metallisch klingenden Pink! Pink! Wenn es zu einer wirklichen Ehe gekommen wäre, würde das sehr interessant gewesen sein. Ich bedauere daher umsomehr, wie sie, liebe Mitleserinnen und -leser verstehen werden, daß das Finkchen in Einzelhaft sitzen muß. Übrigens, die Haussspätzin wurde mir vor einem Monat von mir bekannten, typischen Vogelfänger auf mein Anraten hin überbracht. Ich habe nämlich die große „Schneeflocke" zufällig auf einem Sonntagsspaziergang ganz außerhalb Madrids auf einem Gutshofe inmitten ihrer grauen Geschwister beim Schmause auf einem Düngerhaufen beobachtet. Vom Wunsche beseelt, diesen schönen Haussperling-Albino zu besitzen, der übrigens leider keine roten Augen hat, trat ich den Heimweg an und erzählte dem alten Vogelsteller, der in meiner Nähe wohnt, meine Begegnung mit dem seltsamen Spatzenfräulein. Schnell war beschlossen, am darauffolgenden Sonntag mit großem Netz, das zum Fang von Distel- und anderen Finken dient, auszuziehen, um der Spätzin, die sich nach Aussagen eines Knechtes des fraglichen Gutshofes schon lange Zeit dort herumtreibt, habhaft zu werden. Doch leider vergebens harrten wir der Dinge, die da kommen sollten, von sieben Uhr früh bis zwei Uhr mittags. Der Hunger, obwohl wir Proviant mitgenommen hatten, mahnte uns an den Rückweg. Auch hatten wir noch ein ganzes Weilchen zu gehen. Hoffnungslos zogen wir vom Platze, wo sich die Spatzenmaid herumtreibt. — Gewiß war es dem alten Vogelsteller doch um den Verdienst zu tun, und so ging er, ohne mein Wissen, am Montag darauf wieder auf gut Glück und brachte siegesbewußt, vom Glücke begünstigt, die „Weiße Dame" in mein Haus. Ich natürlich war sehr erfreut ob der letzten Neuheit. Heute scheint mir, daß sie ihre furchtbare Scheu im Kreise ihrer bunten Genossen bereits abgelegt hat und manchmal sogar frech zutraulich wird. Aber immer wieder erfreue ich mich an ihrem perlmutterschillernden Glanz und drücke ob ihrer Dreistigkeit ein Auge zu. Ich habe jetzt so viel von einem gewöhnlichen Spatzenfräulein, aber doch so schönen gesprochen und wollte doch gleich eingehend vor meinen Mischlingen erzählen.

Sie werden sich nun fragen, was schwirrt denn eigentlich noch mehr im grünen Raum, nnd so will ich denn auch gleich verraten, was sich da noch seines Lebens erfreut. Als erstes will ich neben dem vorstehend erwähnten, zerzausten Grünfink mit einem prachtvollen Albino dieser Rasse den Reigen eröffnen. Die Farbe des seltenen Vogels ist hellfahlbraun mit den gelben Flügelspiegeln und Schwanzzeichnung seiner Stammesart. Diesen schönen Seltling habe ich in einer hiesigen Vogelhandlung zu verhältnismäßig billigem Preise erstanden. Werde versuchen mit gelber Seifertkanarie von ihm Mischlinge zu züchten, um zu sehen, ob das Albinoblut sich weiter vererbt. An ihn reihen sich die verschiedenen europäischen Finkenarten, wie Stieglitze in mehreren Prachtexemplaren, darunter einer mit rein weißer Kehle; also nur ein halbkreis rotes Kopfband, das sich ganz hübsch ausmacht, 2 Paar Erlenzeisige, 1 Girlitzmännchen mit seiner Girlitzkanarientochter, je 1,0 Bartzeisig, Indigo-, Papst- und Orangeblaufink, brasilianischer Kronfink, 3,0 Bluthänflinge, je 1,0 Magellanzeisigkanarie und Stieglitzkanarie, gewöhnliche Zeichnung, aber guter Sänger, 0,1 Feuerzeisigkanarie, 1,0 Feuerzeisigkanarie × Kanarie, vorjährig und wunderschön goldbraun ausgefärbt, 0,2 Feuerzeisigkanarie × Kanarie × Kanarie, vorjährig. Die eine dieser Mischlinge ist goldgelb mit grüner Kopf- und Flügelzeichnung; die andere trägt fast die genauen Farben der weiblichen Feuerzeisige, abgesehen von dem weißen Schwanz. Letztere ist bereits mit einem Feuerzeisig gepaart, und ich hoffe, daß mir das dreifache Mischlingsweibchen rote Nachkommen bringt, d. h. wenn fruchtbar. Während ich dies schreibe, schnäbelt sich die erstgenannte fleißig mit der schlanken, lustigen Erlenzeisigkanarie. Dieser und seine drei Schwestern, die sich im Flugraum befinden, sind in Farbe und

Harellzeisig.

Äußeres vollständig Erlenzeisig; auch das Benehmen gleicht dem ihres Vaters. Weitere Mitflieger sind: 1,2 Yarellzeisigkanarien, vorjährig und wunderschön ausgefärbt; das Männchen und eine seiner beiden Schwestern sind schön goldgrün mit gelben Flügeln, während das andere Weibchen olivengrün ist. Das schöne Männchen hat bereits sein kleines Vogelherz an eine niedliche Graugirlitzkanarie verloren, und beide haben sich schon ein ganz kunstvolles freistehendes Nestchen im Gezweig gebaut. Weiter befinden sich im Vogelzimmer 2,2 Yarellzeisigkanarie × Kanarie. Recht gute und hübsche Sänger, da ihre Mutter und Großmutter Seiferthennen sind. Eines dieser Männchen ist hellgrün mit gelben Flügeln und Schwanz, während das andere dunkelgrün ohne jegliche gelbe Feder ist. Die beiden Weibchen sonderbarerweise rein tiefgelb. Gestalt dieser anmutigen Vögelchen ganz Kanarienvogel nur bedeutend kleiner; fast die Größe ihres hübschen Großvaters, der mir leider entflogen ist. An einen Ersatz ist wohl kaum zu denken, da der Zeisig (s. S. 330) von einem Spanier aus seiner amerikanischen Heimat mitgebracht wurde. —

(Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Kobaltblaue Wellensittiche. Blaue Wellensittiche, noch vor wenigen Jahren in Deutschland fast unbekannt, haben sich trotz des höheren Preises schnell ein Heimatrecht bei gar manchem Liebhaber erworben. Kein Wunder, denn welch ein entzückendes Bild bieten diese Vögel in ihren zarten Farben. Wir haben diese himmelblaue Spielart, um die es sich im allgemeinen handelt, gerade jetzt in einer Farbentafel von der Künstlerhand Neunzigs in der „Gef. Welt" bewundern können. Eine weitere Abart „kobaltblaue" Wellensittiche ließ ich vergangene Woche im Auftrag eines Liebhabers aus dem Ausland kommen. Das Blau dieser Vögel ist ein viel satteres, etwa wie das bekannte Waschblau der Hausfrau, aber immer noch heller als das dunkle Blau der Bäckchen. Der Unterrücken ist am dunkelsten gefärbt. Als weitere Spielarten kommen noch, wie bereits Herr Stefani im Jahrbuch der A. Z. berichtet hatte, malvenfarbige, mausgraue und weiße vor, welche ich ebenfalls beschreiben werde, sobald solche bei mir eingetroffen sind.

C. Balser, Fulda.

Ein Gartenrotschwanzidyll. Ein Erlebnis von unsagbarem Reiz durften die diesjährigen Feriengäste der Pension Beierlein in Amorbach (Unterfranken) mit nach Hause nehmen. Im Briefkasten, der sich an der Eingangspforte des ganz im Grünen gelegenen Hauses befindet, hatte sich ein Gartenrotschwanzpärchen häuslich eingerichtet und sich während der Brutzeit bis zum völligen Flüggewerden der Jungen in keiner Weise stören lassen, trotz allem Kommen und Gehen von allen möglichen Leuten von morgens früh bis abends spät. Bei meiner Ankunft in Amorbach am 30. Mai, Samstag vor Pfingsten, fand ich von 8 Eiern gerade sechs ausgeschlüpfte junge Rotschwänzchen vor. Das Nest war ziemlich liederlich zusammengetragen. Die Alten fütterten emsig und es war herrlich, zu sehen, wie die Alten fortgesetzt im Briefkasten verschwanden, um alsbald wieder herauszuwitschen. Die Jungen wurden, da die Brutstätte gerade der damals heißen Junisonne ganz und gar ausgesetzt war, ungemein rasch flügge. 4 davon entflogen nach etwa 8 Tagen, die restlichen 2 flogen 2 Tage später beim Öffnen des Briefkastens schnurstracks heraus und verschwanden dann mit den Alten. Die zurückgebliebenen 2 Eier waren blind. Auch im Sommer 1924 wurde der Briefkasten zur Brutstätte benutzt. Karl Reh, Darmstadt.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 14. Welche Beobachtungen haben Liebhaber an Granatastrilden gemacht? Vor allem, sind dieselben auch nach der Eingewöhnung recht weichlich? Im voraus besten Dank. Sch.

Mehlwurmzucht. In Heft 23 dieser Zeitschrift schreibt Herr J. Ruppert, Würzburg, über den Bau von Mehlwurmzuchtkisten. Mit seiner Konstruktion kann ich mich nicht einverstanden erklären, mir ist das zu umständlich, Deckel aufschrauben, Blechzylinder usw., denn wenn der Deckel auf dem Zylinder durch Versehen verschoben wird, so hat man die Würmer und Käfer in der Stube zu laufen. Wie kann man nun selbst eine einfache Zuchtkiste herstellen? Die Größe der Kiste spielt hier ja keine Rolle. Meine Kiste, welche ich früher hatte, war 1 m lang, 50 cm breit und 55 cm hoch Die Innenseiten der Kiste gut gehobelt, in einer Höhe von 50 cm hatte ich nun einen 6 cm breiten Glasstreifen durch Falz wagerecht angebracht, die langen Glasseiten hatte ich nun auf die kurzen gelegt. In den Deckel ein 15 cm großes Loch mit Drahtgaze versehen und selbigen mit Bändern angeschraubt. So konnte ich die Mehlwurmkiste tagelang offen stehen lassen, ohne befürchten zu müssen, daß mir Würmer und Käfer entschlüpfen konnten. Als Nahrung erhielten sie aufgeweichtes Brötchen, gut ausgedrückt, und rote Möhren in Scheiben geschnitten. Außerdem kamen noch, wie bei Herrn J. Ruppert, Pappen hinein.

Alexander Eckhold, Lunzenau.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

Durch den Anschluß der A. Z. an den Reichsverband ergab sich die Notwendigkeit eines weiteren Ausbaues unserer Organisation. In liebenswürdiger Weise hat sich Herr Horst Wagner, Präsident der A. Z., Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32, bereit erklärt, uns in Fragen der Exotenliebhaberei zu unterstützen.

Indem wir auch an dieser Stelle Herrn Wagner bestens danken, verbinden wir die Bitte an unsere Liebhaber, bei Notwendigkeit sich des Rates und des Urteils des Herrn Wagner zu bedienen. J. A.: Petters.

Bericht über das verflossene Geschäftsjahr vom 1. April 1925 bis 31. März 1924.

I.

Wenn wir uns im Zeitenlaufe einen Rückblick gestatten, soweit es sich um die Belange der Vogelliebhaber handelt, so stoßen wir gar bald, es sind nur zwei Jahrzehnte her, auf eine Bewegung unter den Liebhabern, die aus einem gewaltigen Aufwand an Kraft, aus Unwissenheit und widernatürlichen Gefühlsempfindungen unserer Liebhaberei abholder Menschen geboren, zu einem Zusammenschluß einer großen Anzahl Vogelwirte in eine Vereinigung der Vogelliebhaber Deutschlands führte. Ziel und Zweck dieser Vereinigung wird noch vielen Liebhabern unter uns bekannt sein, ein Eingehen auf beide ist daher und aus dem weiteren Grunde nutzlos, weil die genannte Organisation aus verschiedenerlei Ursachen, vornehmlich die des Weltkrieges, nicht mehr besteht. Erst im Jahre 1924, kostbarer Zeit sind wir bis dahin verlustig gegangen, fand sich nach gründlichem Erwägen und mühevoller Vorarbeit die Gelegenheit wieder, eine neue Organisation zu schaffen, in der sich zunächst diejenigen Liebhaber wiederfanden und zusammenschlossen, die durch den früher erbittert geführten Kampf mit den Gegnern unserer Liebhaberei gewitzigt und unbesiegt von der Tatsache überzeugt waren, daß kein Ruhen, sondern nur Vorwärtsschreiten die beste Gewähr sein konnte, überraschenden und vorauszusehenden Unliebsamkeiten vorzubeugen. Groß war das Häuflein Vogelwirte nicht, die am 21. April 1924 in Berlin die Gründung des „Reichsverbandes der Deutschen Vogelliebhaber" vornahm, aber umso überzeugter davon, daß der Zusammenschluß eine dringende Notwendigkeit war und, daß ein Anwachsen dieser für den Einzelnen selbstlosen

Einrichtung zu beachtlicher Stärke kommen würde, wenn das hier und da bestehende Mißtrauen beseitigt werden könnte. In dieser Annahme sind wir nun in keiner Weise getäuscht worden. Erfreulich war es zu sehen, wie im Laufe des hinter uns liegenden Geschäftsjahres langsamsicher, dann offener und mehr und mehr, namentlich im letzten Jahresviertel, Fühler ausgestreckt wurden, wie im Vertrauen auf die Nützlichkeit und Beständigkeit der Verband sich erweiterte und fester verankerte.

Ein Jahr mühseligster Kleinarbeit liegt hinter uns. Die Schwierigkeiten, die sich auf allen Wegen dem Willen des Vorwärtsstrebens hemmend entgegenstemmten, aufzuzählen, kann nicht Aufgabe sein, im heutigen Berichte kurz und klein anzugeben. Der nachstehende Bericht hat nur die Aufgabe, in großen Umrissen ein Bild darzustellen, in welcher Weise die Entwicklung des jungen Verbandes vor sich gegangen ist, während die Ausführlichkeit der nächstjährigen 1. Generalversammlung vorbehalten bleiben muß.

Die kurzen Tätigkeitsberichte in der „Ges. Welt", unserem Verbandsorgan, die zwar nicht von allem Drum und Dran, nicht von all dem erzählen können, was für Arbeit und welche Unternehmungen bis zur Reife jeder Mitteilung, Einrichtung, Anregung und Kenntnisgabe notwendig waren, aber bestätigen, daß der geschäftsführende Vorstand in seinen ihm gezogenen Grenzen doch rührig war, boten bereits der sich interessierenden Liebhaberschaft Gelegenheit zur Orientierung, so daß nachstehende Angaben mehr als Zusammenstellung betrachtet werden möchten.

Mit 14 dem Preuß. Landesverbande, 13 dem Sächs. Landesverbande angehörenden Vereinen, dem Bayerischen Vogelliebhaberverein e. V. in München, dem Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg und dazu 16 Einzelmitgliedern im Preuß. Landesverbande und 16 Einzelmitgliedern im Sächs. Landesverbande, wie sie im vorjährigen Gründungsbericht bereits namentlich mitgeteilt wurden, begann die erste Fahrt ins Leben.

Der vielseitigen Werbearbeit konnte das Augenmerk von unserer Seite nicht allzusehr geschenkt werden, weil die Einrichtung und Organisation, die Festsetzung unserer Satzungen und die Feststellung des Umfanges unseres Arbeitsgebietes eine weit größere Arbeit darstellte, als zunächst angenommen wurde. Der gedeihliche Auf- und Ausbau litt recht sehr unter der Passivität und mangelnden Unterstützung durch den früheren ersten Vorsitzenden des Preuß. Landesverbandes. Nach endlich dreiviertel Jahren war es uns möglich die Eintragung des Verbandes ins Vereinsregister vornehmen zu lassen, die uns erst dann frei von allerlei Hindernissen machte. Was uns in bezug auf Werbung versagt blieb, ließ sich vor allen der Sächs. Landesverband innerhalb seines Gebietes angelegen sein. Das lockere Band der erzgebirgischen Liebhabervereine zum Sächs. Landesverbande festigte sich durch eine ausgesprochene Werbearbeit der Ortsgruppe Zwickau in ganz erfreulichem Maße. Nicht nur darin, daß die erzgebirgischen Vereine sich unverbrüchlich zum Verbande bekannten, äußerte sich die Frucht der Zeit, Geld und Arbeit fordernden Werbung, sondern ebenso im Anschluß bisher abseits stehender Vereine, mit in die Hunderte gehenden Mitgliedern.

Im Vertrauen zur guten Sache mehrte sich die Schar unserer Anhänger noch weiterhin durch Vereine außerhalb Sachsens und Einzelmitglieder, deren Namen wir in unseren Tätigkeitsberichten fortlaufend zur Kenntnis unserer Mitglieder brachten. Ganz besonders war das letzte Viertel unseres Geschäftsjahres für unseren Mitgliederbestand segensreich. Es brachte uns vom Beginn des neuen Geschäftsjahres weitere Vereine und Vereinigungen als Mitglieder, so daß wir im neuen Jahre trotz Abgangs zweier Vereine Seifhennersdorf aufgelöst, Lübeck aus unbekannten Gründen ausgetreten, mit einer wesentlich höheren Anzahl von Vereinen und Einzelmitgliedern als im Vorjahre unser Werk fortzusetzen vermögen. Nach dem schwierigen Auf- und Ausbau wird uns im 2. Jahre unseres Bestehens auch auf dem Gebiete der Mitgliederwerbung Zeit und Gelegenheit geboten sein, die sicher auch neben uns von allen Ortsgruppen und Landesverbänden eifrigst betrieben werden wird.

Zwei der schwierigsten Aufgaben des Verbandes ist der Vorstand vor allem auf den Leib gerückt, und zwar der Ausstellungs- und Käfigfrage, die miteinander innig verbunden sind. Wenn erstere auch noch nicht allgemein befriedigend gelöst ist, so kommt sie doch mehr und mehr dem Ziele zu, nämlich allerorts durch Ausstellungen die Öffentlichkeit zu interessieren, zu überzeugen, welches Ideal wir uns zu eigen machten schon seit Jahrzehnten und vor allem, daß mit dem Stück Natur im Käfig kein Mißbrauch oder Frevel vom Liebhaber getrieben wird. Die Käfigfrage ist vor allem und war der Angriffspunkt unserer Gegnerschaft nicht nur jetzt, sondern auch früher schon gewesen. Nach wochenlanger Kleinarbeit war es möglich, durch das Verbandsorgan unsere Mitglieder davon zu unterrichten, welche Käfigmasse der Verband unbedingt zu fordern gezwungen ist, wenn der Vogel statt eines Marterkastens eine Wohnung haben soll. Der Besuch vieler Ausstellungen unsererseits hat gezeigt, auf welch fruchtbaren Boden unsere Anregung fiel und auch, daß die Liebhaberschaft freudig an die Lösung dieser Aufgabe herangegangen ist. Dieser Besuch hat nicht nur nach dieser einen Seite hin sein nützliches gehabt. Die Gelegenheit wurde vor allem auch dazu genützt, durch kurze Vorträge nnd Besprechungen, auch durch Rundfunk, für den Reichsverband zu werben und sicher haben wir hierin auch Erfolge zu verbuchen gehabt.

(Schluß folgt.)

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Dr. Bilfinger, Schwenningen a. Neckar (Württ.): Nymphen.

H. Ditzell, Zoologische Großhdlg. (Inh. Jul. Schmidt), Leipzig, Wilhelmstr. 68, Telefon 52275: Kalifornische Schopfwachteln, Wachtelastrilden, Weißstirnamazonen.

Gustav Rambausek, Wien, XVIII, Martinstr. 88/4: 0,1 Singsittich.

Dr. Rauchbaar, Oelzschau b. Leipzig: Braunbrüstiger Blauschnäpper.

E. Schöndube, Berlin N, Elisabethkirchstr. 1: Rebhuhnastrilde, Rotrückenwürger, 2 Kiebitze.

A. Troschütz, Hannover, Große Aegidienstr. 4: 1 indische Graumeise, 1 indische Bergmeise.

Moritz Zeise, Gera-R. j. L.: 1,1 rotstirn. Zwergpapagei v. Abessinien, 1,0 Pflaumkopfsittich.



Herrn A. C., Berlin. Wenn Vögeln, wie dem Bischof und Verwandten in einen mit den verschiedensten Vögeln bevölkerter Flugraum alle möglichen Nährmittel zur Verfügung stehen, so fressen sie häufig grade von dem, was ihnen nicht besonders zuträglich ist und werden allmählich sehr fett. Es treten dann auch Krampfanfälle auf, zu denen diese Vögel neigen. Allmählich beginnt dann die durch die bekannte Stoffwechselkrankheit bedingte Abmagerung und Erschöpfung des Vogels, die fast regelmäßig zum Tode führt.

Herrn B. G. G., Djursholm (Schweden). In den im laufenden Jahrgang veröffentlichten Arbeiten über Insektenfresser ist das Thema nächtliche Unruhe, zerstoßenes Gefieder mehrfach erörtert worden. Fragesteller scheint in diesen Punkten aber besonders schlecht abzuschneiden. Es gibt gewisse Arten, bei denen die Erhaltung, besonders des Schwanzgefieders, schwer hält, aber so, daß es überhaupt keinen Vogel gibt, der das ganze Jahr hindurch gut erhaltenes Gefieder trägt, ist es doch nicht. S. z. B. den Bericht über die Leipziger Ausstellung im laufenden Jahrgang, Heidelberger Vogelschau im Jahrgang 1924 usw. Woran es liegt, daß von 13 Insektenfressern keiner gut erhaltenes Gefieder hat und daß sie fast täglich, auch außerhalb der Zugzeit, trotz bester Pflege und völligen Freiseins von Ungeziefer toben, ist von hier aus nicht zu ergründen. Fragesteller sagt nichts über die Art der benutzten Käfige. Vielleicht trägt die Beschaffenheit dieser und deren Einrichtung wenigstens zum Teil die Schuld.

Herrn J. K., Berlin; Herrn Dr. L., Brüssel; Herrn W. R., Berlin N 39; Herrn A. W., Hamburg; Beiträge dankend erhalten.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

Jahrgang 54 9. Juli 1925 Heft 28

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Die verd. . . . . Lauheit. Von Arnold Weber, Hamburg.
Der Steinrötel und die Blaudrossel. Von J. Birk, Leipzig.
Moearah-Tjiassem. Von August Spennemann. (Schluß).
Finkenmischlinge und anderes. Von Walter Schmelzer, Madrid.
Entgegnung zu dem Bericht des Herrn Ludwig Frank. Von Albert Freiwald, Hemelingen.
Etwas über die Ernährung zarter Weichfresser. Von Karl Finck, Neukölln. (Forts.)
Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf. vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

Ruß'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Anschrift: H. Höhne, Leipzig-Vo., Eisenbahnstr. 84. — Unsere Vorstandssitzung am 17. Juni hat sich in Anbetracht der Eigenart unseres engeren Vaterlandes mit seiner außerordentlichen Verbreitung der Vogelliebhaberei mit der Bildung von Bezirksverbänden (entsprechend Kreishauptmannschaften) befaßt. Es läßt sich in dieser Form eine wertvolle Fühlungnahme der Mitglieder untereinander erreichen, und außerdem dürfte die Werbetätigkeit wirksam sein, zumal die immerhin geringen verfügbaren Mittel uns jede Ersparnis zur Pflicht machen. Aus diesen beachtenswerten Gründen haben wir in Aussicht genommen, unseren Landesverband in Bezirke einzuteilen. Wir bitten unsere Mitglieder, die Angelegenheit zu prüfen und uns ihre Auffassung darüber mitzuteilen. Unsere nächste Vorstandssitzung findet am 29. Juli statt. Bis dahin erwarten wir einen Überblick zu haben, um entsprechende Beschlüsse fassen zu können. Wir machen darauf aufmerksam, daß eine Erhöhung der Beiträge nicht in Frage kommt. Gleichzeitig bitten wir um Abführung der Beiträge. Auch Teilbeiträge sind willkommen. Um eine Verzinsung der einlaufenden Gelder und damit einen gewissen finanziellen Vorteil zu erreichen, haben wir ein Giro-Konto angelegt. Dasselbe führt die Nummer 6317. Sämtliche Beiträge sind in Zukunft an dasselbe abzuführen.

Der Vorstand. J. A.: Hunger, Schriftführer.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10. — In Verfügung des Vorstandsbeschlusses ist im Verzeichnis die Mitgl.-Nr. 328 zu streichen.

Aufruf an Vogelliebhaber und -händler!

Die Mißstände der Vorkriegszeit, die sich wieder breit zu machen scheinen, müssen mit allen zu Gebote stehenden Mitteln bekämpft werden. Dazu gehört in erster Linie Einspruch gegen bewußte Täuschung der Käufer von seiten unreeller Händler und „Liebhaber" durch irreführende Bezeichnungen nicht besonders gangbarer Vogelarten, die zumeist in Mengen importiert werden, mit hochtönenden oder wissentlich falschen Namen. Mitglieder, die „rotk. Inseparables" in der Meinung bestellten, daß es sich um orangek. Unzertrennliche oder Inseparables — Agapornis pullarius — handelt, erhielten tarantinische Unzertrennliche — A. taranta —, welche, als sie noch selten waren und hoch im Preise standen, stets richtig bezeichnet wurden. Da der tarantinische Bergpapagei mit dem orangeköpfigen Unzertrennlichen nicht zu verwechseln ist, so kann es sich nur um Lockanpreisungen handeln. Der Vorstand der A. Z. ist fest entschlossen, diesem Unwesen steuern zu helfen und ruft alle Liebhaber und den Verband der Vogelhändler zur Mitarbeit auf, sowohl im Interesse des reellen Handels, als auch der mit vorgenannten Schlichen unkundigen Liebhaber. Grobe Betrugsfälle werden vorkommendenfalls von uns bekanntgegeben. Der Vorstand: J. A.: Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37 a. Gäste stets willkommen.

J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke, Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Restaurant „Zum Löwentor", Königswall 75.

J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung Freitags, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Blasewitzer Hof". Liebhaber willk. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Rietschelhof", Rietschelstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen.

J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinslokal „Parkhotel", Epinaystr. 1, Versammlung. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an. Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 21. Juli. A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber. Nächste Veranstaltungen: Donnerstag, den 9. Juli: Vereinsabend im Landesheim, 8¼ Uhr, Vortrag Klocke: „Mimikry". Alle Mitglieder werden herzlich gebeten, möglichst an allen Veranstaltungen teilzunehmen. Appel.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste willk. Fritz Meyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Vereinsabend regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends um 8 Uhr) beim 1. Vors., Herrn Jahn, Feodorastr. 7. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. A. Voigt.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 16. Juli. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Normast im „Kaiser Friedrich", Breslauerstr. 50. Liebhaber willkommen. J. A.: Friedrich.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorfstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Tage im „Goldenen Falken" Versammlung; nächste Freitag, den 10. Juli. Liebhaber willk. Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Versammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Liebhaber willk. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebenda. R. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Achtung! Am 15. d. M. erhebt die Post die Bezugsgebühr für Aug. Wir bitten den Betrag bereit zu halten, damit die Quittungen beim ersten Vorzeigen eingelöst werden und keine Unterbrechung in der Belieferung eintritt. Wo der Briefträger die Quittungen nicht vorzeigt, ist er daran zu erinnern. Bei Bestellung nach dem 25. erhebt die Post eine Extragebühr von 20 Pfg., die vermieden werden kann, wenn die Zeitschrift rechtzeitig bestellt wird.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Käfige u. Gerätschaften

Vogel-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50. Schlagnetze f. kl. schädl. Vögel M. 2,30, gr. M. 2,50 u. 2,80. Katalog gratis. . Tannen, Gronau 58, Westf. [898

Futtermittel

Mehlwürmer
Pfund 5.— ℳ, bei 6 Pfund Porto und Verpackung frei. Händler Rabatt.

Ia Ameiseneier
Pfund 6.50 M.

Weißwurm . . . à Pfd. 5 ℳ
Muska-Zecken . . à „ 2,50
Seidenraupenpuppen, gemahlen . . . . à Pfd. 0,75
Garnelen, gem. à Pfd. 0,40 ℳ

Ia Universalfutter
Teekwa I für Nachtigallen 2.— ℳ
„ II für Grasmücken 1.80 ℳ
„ III für Drosseln . 1.50 ℳ

Proben und Analysen zur Verfügung. Vertreter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [899

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
A. Eckrich II, Waldsee (Pfalz).

Mehlwürmer
g. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. anko versend. D. Waschinski & Co., Biesenthal I (Mark). [900

Mehlwürmer Ia Pfd. 4.— ℳ (6 Pfd. 24 ℳ fr.) Pfd. 2.50 ℳ frk. Voreinsend. eitner, Breslau, Weinstr. 12. [901

Vogelfutter [902
r Kanarien, Waldvögel, Exoten, apageien, Weichfresser. Anerkannt währteste Mischungen auf Grund langhriger Erfahrung. Liste 18 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,
ndlinring 1. Telephon 14 958.
ei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Mehlwürmer [902
1 Pfund 5.— Mark, Porto und Verpackung extra. 1/4 Pfund 2.— Mark, Nachnahme 0.20 Mark mehr. Postscheckkonto: 6196 Ludwigshafen a. Rhein.
Händler Vorzugspreise.
Karl Claus, Mutterstadt 2, Hauptbahnhof.

Wer
in der „Gefiederten Welt" inseriert,
hat Erfolg!

Bitte!

In eigenem Interesse wollen die pp. Einsender beachten, daß

a) **alle für die Redaktion** der „Gefiederten Welt" bestimmten **Zuschriften** (Sprechsaal-Anfragen und -Antworten, Vereinsnachrichten usw.) und **Sendungen** (tote Vögel, Manuskripte) nur an **Herrn Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf,** Neue Bismarckstr.,

b) **alle Bestellungen** auf **Abonnements, auch vom Ausland, nur durch die Post,**

c) **Inserate** und dergl. Geschäftliches nur an die **Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg,** Postschließfach 148,

zu richten sind.

Ameiseneier
täglich frisch, Ltr. 2.30 M. franko.

Mehlwürmer
gegen Einsendung von Mk. 1.50 1/4 Pfund franko. [903
Th. Witte, Niederndodeleben bei Magdeburg.

Frische Ameisenpuppen
à Liter 2.20 Mark, franko. [904
Josef Ehrlich, Würzburg, Weißenburgstraße.

Ameiseneier
frisch getrocknete, das Ltr. 1,70 M. bei Voreinsendung von 2 M. frk.
Siewer, Brieg, Bz. Breslau, Piastenstr. 3. [905

Ia Drosselfutter,
Marke „Lucullus." [906
(Ameiseneier, Muska, Zwiebackschrot), beziehen Sie vorteilhaft von
H. Pullich, Langen b. Fft. a. M. 8.

Züchterkollegen!
Wer seine Nachzucht gesund erhalten will, der befolge nachstehenden Wink: **Jungvögeln im Fluge verabreiche man guten Rübsen zur Genüge und „L.K." trocken, soviel sie fressen mögen. Gekochtes Ei verursacht Krankheiten und ist deshalb die Verabreichung zu vermeiden.**
Lorenz, Dresden
Drehgasse 5. [907

Beschwerden wegen Nichtzustellung der „Gefiederten Welt" sind beim zuständigen Postamt anzubringen.

Vögel

Blaugelber Arara,

Prachtexemplar,
fingerzahm, sprechend, frei umherlaufend, zu verkaufen.
Bei Anfragen Rückporto. [908
Rechtsanwalt
Th. Cornely, Aachen,
Heinrichsallee 6.

Gr.-Astrilde

Paar 3.— Mark

Orangebäckchen, rote Ameranten, Bandfinken, Silberfasänchen P. 5.— M., Paradieswitwe, außer Farbe, P. 8.— M., Atlasfinken P. 4.— M., Nonnen, schwarzköpfig P. 6.— M., Reisfinken P. 8.— M., Wellensittiche, grüne, P. 15. — M., dito, gelbe, Weibchen St. 12.— M., Orange- u. Napoleonsweber P. 4.— M., Safranfinken P. 10.— M., Kardinal mit roter Haube St. 9.— M., große Gelbhauben-Kakadus St. 70— M., Schamadrosseln, prima, St. 60—70.— M., Sonnenvögel, Doppelschläger, St. 15.— M., dito, Weibchen St. 8.— M., Elstern, Raben, jung, zahm St. 5.— M., Lachtauben P. 10.— M., Jap. Tanzmäuse P. 5.— M., Affen, Papageien, Kanarien, alles sichtbar verpackt, die meisten Vögel sind in freier Voliere gehalten, daher eingewöhnt. [909
Anfragen u. Liste nur gegen Freimarke.
J. Beck, Tierhandlung, **Stuttgart.**

Zu tauschen gesucht:

1 Nachtigall 10.— M., **1 Grasmücke** 8.— M., **1 Schwarzplättchen** 8.— M.
Ernst Meyer, Freiburg i. Br.
Insel 8 II. [910

Beo, fleißig sprechend und gelehrig, 45.— Mark, [911
1 Eichelhäher 6.— M., beide zahm.
Zoo. Frank, Hamburg 27,
Rohrendamm 40.

Abzugeben:

1 Paar Spitzschwanzamadinen 50.— M.
1 Paar Zebrafinken . . . 18.— M.
1 Paar Katharinasittiche . . 25.— M.

Gesucht: [912

1 P. zah. Feuerflügelsittiche, evtl. Tausche.
Eduard Schütze, Eystrup (Weser).
A. Z.-Mtgl. 171.

Junge, grü. Wellensittiche

in Gartenvoliere gezüchtet, blutsfremd, pro Stück 5.— M. dauernd abzugeben.
Verkaufe: [9—
1,0 Weißkopfviehweber . . 10.— M.
1,1 Gelbdotterweber . . . 6.— M.
0,1 Paradieswitwe . . . 2.— M.
ausgefärbt, tadellos glatt im Gefieder, einhalb Jahr schon in Gartenvoliere. [913
R. Huth, Perleberg.

1 Dompfaff,

Männchen, zu erwerben gesucht. [914
Martin Ziegler, Leipzig-Wahren,
Kolonieſtr. 1 II.

Verkaufe!

Wegen Aufgabe meiner **Kanarien-Feinzucht** (Originalstamm Bäcker), am liebsten geschlossen. 2 pr. Vorsänger, 5 Stammblutweibchen, 18 Junghähne. 15 Jungweibch. Preis n. Übereinkunft.
J. Rötzer, Gera-Reuß,
Nordstr. 15. [915

Waldkäuzchen,

fingerzahm, gegen **Blaukehlchen** und **Gartengrasmücke** zu vertauschen.
Für gute Vögel gebe noch 2 Liter Ameiseneier gratis. [916
Carl Schlimm, Düsseldorf,
Karl-Schurz-Str. 21.

Schamadrosseln

prima Sänger 60.— M.

Schamadrosselweibchen		50.—
Rötelmerle (Oroscirtetes erythrogaster)		80.—
Blaurotschwanz (Phoenicurus frontalis)		80.—
Weißbrüstiger bl. Waldschmätzer		85.—
Klarino		40.—
Indische Bergmeise		30.—
Graublauer Fliegenschnäpper		50 —
Sonnenvögel, Männchen		15.—
Safranfinken	Paar	8.—
Reisfinken	Paar	5.—
Weißkopfnonnen	Paar	10.—
Tigerfinken	Paar	8.—
Mövchen	Paar	15.—
Olivgrüne Astrilde (Stictospiza formosa), (Green Amaduvade)	Paar	16.—
Weißkehl-, Grau- und Schwarzkappenpfäffchen	Paar	10.—
Parellszeisige	Stück	12.—
Schnurrbärtchen	Paar	15.—
Angolaschmetterlingfink	Paar	10.—
Mossambikzeisige	Paar	12.—
Kleine Elsterchen	Paar	4.00
Grauedelsänger, o. Garantie,	Stück	2.00
Laufhühnchen	Stück	15.—
Blumenaufsittiche	Paar	12.—
Wellensittiche, grün	Paar	12.—
Pavuasittiche	Paar	40.—
Feuerflügelsittiche	Paar	40.—
Mohrenkopfpapageien	Stück	35.—
Sperlingspapageien	Paar	15.—
Kleiner zahmer Gelbhaubenkakadu		50.—
Blaustirnamazonen	Stück	60.—
Graupapageien, Stück v. 120.— bis		160.—

Porto u. Verpackung M. 3.50, als Dringend M. 6.50, Versand p. Nachnahme. [917
E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a.

Bei Anfragen und Bestellungen bitten wir, sich auf die „Gef. Welt" zu berufen

Carl Hagenbeck's Tierpark

Stellingen bei Hamburg

hat vorrätig und abzugeben: [918

Grünflügel-Aras,
Gelbflügel-Aras,
Ararauna / Gelbbrust-Ara,
Rosa-Kakadus,
Gelbwangen-Kakadus,
Molukken-Kakadus,
Weißhauben-Kakadus,
Blaustirn-Amazonen,
Panama-Amazonen,
Neuguinea-Edelpapageien,
Sperlings-Papageien,
Jakos,
Rotnacken-Loris,
Gelbmantel-Loris,
Schmuck-Loris
Blaunacken-Loris
Rote Loris,
Kapuzen-Loris,
Erzloris,
Loris v. d. blauen Bergen,
Schuppen-Loris,
afrikan. Halsbandsittiche,
indische Halsbandsittiche,
Bartsittiche,
Guyanasittiche,
Goldmaskensittiche,
Mönchssittiche,
Adelaidesittiche,
Nendaysittiche.

Weißkopfnonnen,
Notkopf-Amadinen,
Glanzkuhstärlinge,
Pfäffchen,
Dominikanerwitwen,
Kronfinken,
Purpur-Kronfinken,
Chinesische Nachtigallen,
Blutschnabelweber,
Safrankinken.

Preisliste und Spezialofferte auf Wunsch.
Händler erhalten bei Abnahme größerer Posten Rabatt.

Gebe ab:

1a Stieglitz-Kanarie (Prachtexempl. wunderb. schöner Sänger (unermüdlich Preis 20.— Mark. [9
J. Decker, Oslebshausen.

Junger Kuckuck, an Weichfutter m gewöhnt, **Kaptäubchen** und **Wellensittiche** tauscht in andere **Exoten** od **Papagei.** [9
Lassner, Liegnitz, Volkshaus-Nor

Verk.: 2 fingerzahme **Elstern** 1 dto. **Häher,** fliege frei herum, kommen auf Ruf auf Han à 10 M., 1 zah. **Schleiereule** 12 M 3 zah. **Ringeltauben,** 1 dto. **Eichhörnchen,** fress. aus der Hand, à 5 M
Verpackung frei. [9
Bernh. Barnhorn, Rechterfeld (Oldenburg).

Tausch!

Gebe Nachtigall, 2 Jahr gekäfig gegen gute **schwarzköpf. Grasmück** (Männchen).
H. Mehnert, Fraustadt
bei Glogau in Schlesien. [9

Suche zuchtfähige:
0,2 Zebrafink, 0,1 Mövchen 0,1 Silberschnabel sowie ande **kleine Exoten.** [9
Max Schwinge, Halle a. S.,
Gesenius-Str. 35.

Verkaufe umzugshalber: [9
1 Ia Zuchtpaar Schamadrosseln 80 M
Direktor Wucherpfennig, Artern i. Thü

1,1 Schamadrossel

verk. für 120 Mark oder tauscht gege **Singsittiche oder seltene Exote** (Körnerfresser), **2,1 Kanarien** tausc gegen **1,1 ausgefärbte Zebrafinke od. Wellensittiche, gelb od. an kl. Exoten.** [9
Suche Binsenastrilde.
M. Sachs, Plauen i. Vogtl.,
Mozartstr. 27 II.

Bildertafeln

aus **Naumann, Naturgeschich der Vögel** (449 Tafeln), verkauft geg Höchstgebot, jedoch nicht unter 100 M
Walter Schenck, Lebus
(Bez. Frankfurt a. d. Oder). [9

Für Terrarienfreunde

Deutschlands Amphibien un Reptilien.
Eine Beschreibung und Schilderu sämtlicher in Deutschland und den a grenzenden Gebieten vorkommend Lurche und Kriechtiere. Von Brau Dürigen. Mit 12 Farbentafeln 47 Textabb. Geb. 20 M

Praxis der Terrarienkunde
Terrarium und Terra-Aquariu Von Dr. E. Bade. 2. u. 3. Aufla Mit 2 Farbentafeln, 19 Schwa drucktafeln u. 116 Abbildungen Text. Kart. 5.— M

Katechismus für Terrarie liebhaber.
Fragen und Antworten über E richtung, Besetzung und Pflege Terrariums. Von Hans Gey Kart. ca. 2.50 M

Die Giftschlangen Europa
beschrieben und in ihrer Lebensw geschildert von H. Lachmann. 9 9 Textabbildungen. Geh. 1.— M

Zu beziehen durch:
Creutz'sche Verlagsbuch handlung, Magdebur
Postschließfach 148.

Inserate

für das am 16. Juli 1925 z Ausgabe gelangende Heft 29 d Gef. Welt erbitten bis 11. Ju

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 16. Juli 1925 | Heft 29

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Bevorzugen große, zahme männliche Papageien eine Pflegerin und weibliche einen Pfleger?

Von Emil Kaforke, Berlin.

(Nachdruck verboten.)

Wenn auch ein naturgeschichtlich zoologisches Werk mit der Amöbe beginnen und mit dem Menschen schließen müßte, so ist doch der Abstand zwischen unseren Verwandten und uns derartig groß, daß von einer sinnlich sexuellen Einstellung seitens der Tiere zum Menschen nicht gesprochen werden kann. Die Lebensäußerungen der höheren Tiere gleichen zwar den menschlichen, sind aber in geistiger Beziehung doch bei weitem unvollkommener. Instinktiv wird jede Art von der Paarung mit einer anderen abgestoßen. Als unleugbare Tatsache gilt, daß überall da, wo das Tier in intimste Berührung mit dem Menschen kommt, nur dieser das Geschöpf für seine Bedürfnisse erzieht, vide canem familiarem. Auch Leda hat ihren Schwan eigens abgerichtet, der Vogel selbst verfügt nicht über einen diesbezüglichen Willensprozeß.

Ob eine Pflegerin oder ein Pfleger des Amtes waltet ist ganz gleich, die Zutraulichkeit wird einzig und allein ausgelöst durch die individuelle Behandlung. Jedes hochorganisierte Tier besitzt einen besonderen Charakter, und wer ihn richtig erkennt und bewertet, erwirbt das Vertrauen seines Zöglings. Dompteur und Dompteuse machen keinen Unterschied bei der Dressur von männlichen und weiblichen Raubtieren; sie alle sind für Freundschaft und Wohlwollen zugänglich, nur Begabung und Temperament sind verschieden.

Seit vielen Jahren besitze ich einen Inkakakadu, der dann und wann auf meiner Hand den sexuellen Akt vollzieht, indes jede Dame wütend zu beißen versucht. Alle Bemühungen seitens des zarten Geschlechts, die Gunst des Vogels zu erwerben, haben sich als vergeblich erwiesen. Die längst heimgegangene Frau Risins-Bremerhaven, sandte mir einen weiblichen Inka, der blutbefleckt mit gebrochenem Flügel anlangte und nur von einer, allerdings herzensguten weiblichen Seele behandelt sein wollte. Jede männliche Annäherung begrüßte der Kakadu mit furchtbarem, andauerndem Geschrei; jahrelange liebevolle Versuche vermochten keine Änderung herbeizuführen. Ein ausnahmsweise starker, prächtiger kleiner Gelbhaubenkakadu war den Herren der Schöpfung so abhold, und dem süßen Frauchen so ergeben, daß er nach der bekannten Theorie allgemein für ein Männchen gehalten wurde, bis er eines schönen Tages ein wirkliches Ei legte. Meine beiden Graupapageien, Männchen und Weibchen, lassen sich von mir ohne weiteres in die Manteltasche stecken, während die an sich freundliche, liebenswürdige weibliche Umgebung auf der Hut sein muß, um nicht verletzt zu werden. Am 4. Mai d. J. schrieb mir Herr Fockelmann-Hamburg-Großborstel: „Ich habe mit meinem Brasiltransport zum erstenmal nach dem Kriege einen ganz hervorragend schönen Hyazinth-Arara erhalten. Es ist ein junger Vogel, der vollständig zahm ist. Ich lasse denselben in meiner Wohnung frei umherlaufen. Der Vogel läßt sich wie ein Kind in den Arm legen, läßt sich durchs ganze Zimmer trudeln. Er beißt nie und fühlt sich am wohlsten, wenn man sich mit ihm unterhält." Wer die Konversation führt, ob Dame oder Herr, ist völlig belanglos. Ähnliches kann ich über Loris, Amazonen, sowie manch anderen Krummschnabel berichten; immer dasselbe Bild, das Geschlecht spielt bei der Zähmung keine Rolle, nur die Individualität kommt in Betracht. Damit wäre mein Thema erschöpft. Es sei mir aber gestattet, noch einige Bemerkungen zur Papageienpsyche hinzuzufügen.

Wer sich mit den intellektuellen Fähigkeiten der höheren Tiere vorurteilslos beschäftigt, gelangt sehr bald zu dem Schluß, daß nur die menschliche Fantasie dem Tiere nicht gehörige wundersame seelische Eigenschaften andichtet.

Die Berliner Morgenpost berichtete nach Prager Blättern über den Selbstmord eines Papageis: „Ein großer grüner Papagei wurde nach dem Tode seiner Herrin, als auf seinem gewohnten Ruf keine Antwort erfolgte, still, grub seinen scharfen Schnabel in die Brust und sank tot von der Stange". Nun, daß sehr intelligente Geschöpfe aus Sehnsucht — wie ich bei meinem Graupapagei erlebte — jegliche Nahrung verschmähen und schließlich an Entkräftung eingehen, ist bekannt. Daß aber ein Papagei seinen eigenen Schnabel in die Brust stößt, weil er ohne seine Pflegerin nicht leben will, kann ein kühldenkendes Menschenkind nicht gut glauben. Die geistigen Funktionen in der Tierwelt sind viel zu unvollkommen, um einen

Selbstmord zu bewirken. Wenn wirklich die Schnabelspitze des Vogels in der Brust eingesenkt war, so mag der Vorgang einem Krampfzustande zugeschrieben werden, genau wie sich manche Papageien die Zunge durchbeißen. Eine selbstmörderische Absicht gehört in das Reich der Fabel.

Aus London wurde dem Berliner Lokalanzeiger von seinem Korrespondenten mitgeteilt, daß bei der Vernichtung des Tussandschen Wachskabinetts aus den Ruinen ein Papagei gerettet wurde, dessen Worte, als man ihn aus dem Rauch in Sicherheit gebracht hatte, waren: This is a rotten business, dies ist eine verfluchte Geschichte. Fürwahr, eine treffende Kundgebung des stark geängstigten Tieres nach dem Aufenthalt in Staub und Rauch. Allein, es fragte sich, ob der Ausruf mit oder ohne Überlegung erfolgt. Und das wollte eine kleine Gesellschaft vergnügter Vogelfreunde von mir wissen. Nun, die Antwort war leicht und schnell gegeben, danach hat hier die Gehirnarbeit des Tieres im Vergleich zur menschlichen Auffassung völlig versagt. Der Papagei hat wahrscheinlich in einem Raume gelebt, in dem häufig schwierige Aufgaben gelöst wurden, die der betreffende Arbeiter stets mit jener Äußerung begleitete. Ganz unabhängig von der augenblicklichen Sachlage gab der Gerettete gerade die oft gehörten und gelernten Worte zum besten. Man staunt, wenn Laut und Zeit harmonieren, aber es ist nur Schein, und der trügt.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Eine interessante Tangare, der

Maskenorganist — Procnias tersa *(L.)*

wurde einige Jahre von einem Berliner Vogelliebhaber gepflegt, der sie aus Privathand erhalten hatte. Eine weitere Einführung dieses schönen Vogels ist nicht bekannt geworden. Die Systematiker wußten nicht recht, wo sie den Vogel unterbringen konnten. Illiger stellte ihn zu den Cotingidae, andere brachten ihn wegen seines weiten Rachens und seiner Schnabelform in die Nähe der Schwalben, bis Cabanis nachwies, daß es sich um einen Singvogel handelte, der zu den Tangaren gehöre, obgleich seine Nistweise, er ist Höhlenbrüter, von der aller zur Gruppe der Tangaren gehörenden Vögel abweicht, ebenso die Farbe der Eier, die weiß ist, während alle Tangaren Eier mit farbiger Schale und farbigen Zeichnungen legten. Die Gattung Procnias *Ill.*, deren alleiniger Vertreter der Maskenorganist ist, zeichnet sich durch den flachen, breiten, seitlich ausgeschweiften Schnabel aus, der an der Spitze des Oberschnabels hakig gebogen ist. Die Nasenlöcher liegen in kurzen Röhrenansätzen. Die Flügel, deren erste und zweite Schwinge am längsten sind, sind spitz und ziemlich lang. Der gerade abgeschnittene Schwanz erreicht $^2/_3$ der Flügellänge. Die Verbreitung des Vogels erstreckt sich über das tropische Südamerika. In Brasilien ist der Organist wegen seines schönen Farbenkleides überall bekannt. Burmeister sagt (Systemat. Übers. d. Tiere Brasiliens), daß die Nahrung der Maskenorganisten fleischige Beeren bildeten, während Euler (J. O. 1867) berichtet, daß man den Vogel in der kalten, an Früchten reichen Zeit immer beim Fruchtfressen finde, während die im Oktober und November erlegten Exemplare Magen und Kröpfe mit Insekten angefüllt haben. Im Oktober beobachtete Euler Maskenorganisten mit Nistmaterial im Schnabel, er vermutet, daß diese Vögel zwei Bruten machen. Ende Februar sah er größere Flüge, in welchem alte und junge Vögel vereint umherstrichen. Es ist oben schon darauf hingewiesen, daß der Maskenorganist nicht wie andere Tangaren offene napfförmige Nester im Gebüsch baut, sondern in Höhlen alter Bäume, vorzugsweise in Erdlöchern an Lehmwänden brüte. Anscheinend nimmt der Organist schon vorhandene Erdlöcher an, wie er denn auch Bruthöhlen von Eisvögeln und des Jakamar annimmt. Das Gelege, aus 3—4 weißen Eiern bestehend, wird auf einer mangelhaften Unterlage von Pflanzenstengeln und Wurzeln erbrütet.

Gefiederbeschreibung (s. Abb. S. 335): ♂ leuchtend türkisblau; Stirn, Kopfseiten, Kehle tiefschwarz; Bauchmitte, Steiß weiß; Bauchseite mit schmalen, schwärzlichen Querbändern; die schwarzen Flügel- und Schwanzfedern haben türkisblaue Säume; Schnabel schwarz; Auge dunkel; Füße schwarzbraun; Lg. 150, Fl. 92,5, Schw. 55 mm. ♀ oberseits leuchtend grün, Kehle graubraun; unterseits grün mit schmalen gelblichen Querbinden; Bauchmitte, Steiß hellgelb; Flügel-, Schwanzfedern bräunlichschwarz mit Säumen von der Farbe der Oberseite; Schnabel bleigrau; Füße braun.

Der auf S. 327 abgebildete

Schwalbenglanzstar — Pholia sharpei *(Jacks.)*

ist eine diesjährige Neueinführung der Firma Ruhe, Alfeld. Der Schwalbenglanzstar ist der einzige Vertreter der Gattung, welche sich besonders durch den sehr kurzen, flachen und breiten fliegenschnäpperartigen Schnabel von andern Glanzstaren unterscheidet. Seine Verbreitung erstreckt sich über Ostafrika vom Viktoria- bis zum Nyassasee. Er ist ein Bewohner der Gebirge. Fülleborn fand die Nester an steilen Felswänden, „viele Löcher an einer Stelle, von denen sie in schwalbenartigem Fluge hin- und herflogen und aus- und einschlüpften". Granvik nennt ihn ziemlich gemein in den tiefen und dicht bewaldeten Schluchten der Ostabhänge des Mt. Elgon, wo er sich auf den höchsten Spitzen der Waldbäume aufhält. Während ihn Granvik nur einzeln sah, beobachtete ihn v. Someren als Bewohner der Bambuswälder an den Westabhängen desselben Berges in Flügen von 6—10 Vögeln.

Gefiederbeschreibung: Oberseits glänzend blauschwarz, am Kopf mit schwachem Purpurschimmer, Flügel und Schwanz etwas grünlicher glänzend, Unterflügeldecken schwarz; Vorderhals weiß, ockergelblich verwaschen; Kropfgegend stärker ockergelblich und allmählich in das gelbliche Rostbraun des Unterkörpers übergehend; Auge leuchtend gelb, Schnabel schwarz; Füße schwarzbraun bis schwarz; Lg. 180, Fl. 100, Schw. 65—70, Schn. 11—13, Lf. 21—23 mm.

Nach Reichenow scheint in den Ländern nördlich des Nyassasees und am Tanganjika eine unterseits blassere Form vorzukommen, die Ph. hirundinea *Rchw.* genannt wird.

Leider sind über eine Reihe von Importen ausländischer, besonders indischer und afrikanischer, Vögel keinerlei Nachrichten bis in die Kreise der Liebhaber gelangt, ja z. T. haben Importe deutscher Firmen

Deutschland gar nicht erreicht, sondern sind schon in irgend einem europäischen Hafen, welche das Schiff anlief, nach England verkauft worden, und von solchen, die wirklich in deutsche Hafenstädte gelangten, sind die besten und seltensten Vögel sofort nach Amerika oder England versandt worden. Nur die übliche Handelsware blieb den deutschen Vogelpflegern vorbehalten, die Vögel, von denen man in Händlerkreisen annahm, daß sie auch in Deutschland Absatz finden würden.

Auf den ersten Blick wird man mit dieser Praxis der importierenden Firmen wenig einverstanden sein. Aber wenn man genauer hinsieht, muß man diese Verkäufe billigen. Im laufenden wie im vorigen Jahre gelangten durch die Betriebsamkeit der importierenden Firmen recht viele seltene Vögel fremder Zonen, besonders Weichfresser nach Deutschland und die Vogelhandlungen des Binnenlandes boten diese

Maskenorganist (s. S. 334).

Seltlinge zu annehmbaren Preisen an. Aber fanden sie den erhofften Absatz? Keineswegs. Angebote in den Fachzeitschriften erhöhten den Preis. Monatelang mußten die Vögel, meist Insektenfresser, von den Händlern verpflegt werden. Käufer kamen nur von dem Ausland. Besucht man ab und zu die Vogelhandlungen, so fand man immer noch die am Anfang des Jahres importierten prachtvollen Fliegenschnäpper Indiens, die schönen Timalien, seltene Rotschwänze, die schönen Schmätzerdrosseln Afrikas usw.

Das Angebot ist reichlich, die Absatzmöglichkeiten in Deutschland sind gering. — Sollte wirklich nur die augenblickliche wirtschaftliche Lage an diesen Umständen die Schuld tragen? — Teure Prachtfinken, sprechende Papageien und dgl. finden Käufer. — Warum nicht diese schönen Vögel, denen man z. T. hervorragende gesangliche Qualitäten nachrühmt?

Schmätzerdrosseln (Cossypha) sind in verschiedenen Arten eingeführt. Manche wanderten wohl in die Zoologischen Gärten, kaum einer wurde von einem Vogelliebhaber erstanden. Ihre Verpflegung ist nicht besonders schwierig. Sie werden wie Schamadrosseln gehalten und sind ebenso dauerhafte Vögel wie diese. Ihr Gesang wird von den Reisenden, die sie in der Freiheit hörten, gerühmt. „Liebliche Sänger, welche in der Gefangenschaft sehr zahm werden und in ihrem Wesen sehr anziehend" nennt sie ein Pfleger dieser Vögel, ein anderer sagt von dem neu eingeführten, unten näher beschriebenen

Zweifarbrötel — Cossypha bicolor (*Sparrm.*)
(Abb. S. 337).

„Sein Ruf ist ein weicher, rasselnder Ton, ähnlich dem „P—r—r—r" der Nachtigall und der Gesang ist im Ton außerordentlich angenehm" und Heuglins Rötel — C. Heuglini *Hartl.* wird als ein sehr guter Sänger gerühmt. Emin Pascha sagt von ihm „der Gesang ist sehr reich und voller Abwechselung, jedenfalls einer der besten unserer Vogelgesänge. Jede Strophe ist ein abgeschlossenes Ganzes und jeder Ton klar und laut", und Böhm teilt mit, „daß der im Gebüsch verborgene Vogel sich durch den sehr unschönen, stümperhaft klingenden Lockruf verrate, der aus drei Noten, zwei kürzeren und einer längeren, höheren zusammengesetzt, in eintöniger Weise oft hintereinander wiederholt wird und bei dessen Einsetzen sich der Vogel oft gleichsam verbessert. Um so auffallender steht mit diesen, anscheinend mühsam hervorgebrachten Tönen, der prachtvolle, jubelnde und schmetternde Schlag im Gegensatz, der nur morgens vor und kurz nach Sonnenaufgang und abends im Sonnenuntergang hörbar wird. Beim Singen zeigen sich die Männchen auf hervorragenden Zweigen und suchen, lebhaft mit den Flügeln schlagend und den Schwanz stelzend, sich gegenseitig im Singen zu überbieten". Erlanger bringt folgende Schilderung von dem Gesang einer in Nordostafrika lebenden Art: „Im dichten Wirrwarr des Ufergebüsches weiß er sich gut zu verstecken, dort läßt auch das Männchen seinen schmetternden, schönen Gesang hören, er hat große Ähnlichkeit mit dem unserer Mönchgrasmücke, andere Strophen, die darin abweichen und die man sehr oft hört, lauten etwa:

Ülli—ülli—ülli—ügüdä, oft wiederholt und schnell vorgetragen. Wer nur einmal den Gesang gehört hat, wird ihn stets wieder aus dem hundertstimmigen Konzert einer Flußuferfauna herausfinden". Das Zweifarbenrötel, dessen Verbreitung sich über Südafrika erstreckt, lebt nach Stark im dichten Gebüsch und hat eine laute, kräftige Stimme, auch ahmt der Vogel die verschiedenen Rufe anderer Vögel nach. Nach seinem gewöhnlichen Ruf nennen ihn die Buren „piet myn vrouw" (= Peter, meine Frau).

Gefieder beschreibung: Oberseits schiefergrau, Kopf etwas dunkler, Bürzel rotbraun verwaschen; Kopfseiten schwarz; Halsseiten, Unterseite rotbraun; Flügeldecken, innerste Schwingen schiefergrau, übrige Schwingen grauschwarz; außen grau gerandet; Unterflügeldecken rotbraun; Schwanzfedern bis auf die mittelsten und der Rand der äußersten, welcher schwarzbraun ist, rotbraun; Augen braun; Schnabel schwarz; Füße fleischbraun; Lg. 190—200, Fl. 93—100, Schw. 85—90 mm. (Forts. folgt.)

Etwas über die Ernährung zarter Weichfresser.

Von Karl Finck, Neukölln.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der Vogel ist, was er frißt. Auch die geringste Lebensäußerung verursacht Stoffverluste. Die aufgenommene Nahrung soll einen entsprechenden Ausgleich gewähren. Bei unzulänglicher Zuführung, ebenso wenn krankhafte Funktionsstörungen keine ausreichende Ausnützung ermöglichen, entsteht mit der Zeit eine erhebliche Abmagerung, während übermäßige Aufnahmen zur Fettsucht führen.

Jeder tierische Körper baut sich buchstäblich aus gewissen an- und organischen Verbindungen auf, die im Futter enthalten sind.

Das Baumaterial besteht hauptsächlich aus Eiweißstoffen, Fetten und Kohlenhydraten und bestimmten Salzen, wie Kalium, Natrium, Eisen, Magnesia und Kalk, vielfach in Verbindungen mit Phosphor-, Schwefelsäure und Chlor. Die Eiweißarten sind unter allen Nährstoffen am wichtigsten, da sie allein die im Stoffwechsel verbrauchten Zellbestandteile ersetzen können. In den verschiedensten Abarten bildet Eiweiß immer den Hauptbestandteil aller tierischen Gebilde; es befindet sich in den Muskeln, im Blute, in den Nerven und beinahe in allen Sekreten und kann als einziger stickstoffhaltiger Nährstoff weder durch Kohlenhydrate, Fette oder Nährsalze ersetzt werden. Gleichzeitig dienen Eiweißstoffe auch als Kraftquelle, was namentlich bei reinen Insektenfressern der Fall sein dürfte, deren lebendes Futter wenig, oder gar keine stickstofffreie Verbindungen aufweist. Außerdem vermag der tierische Körper Eiweiß in Fett zu verwandeln. Bei übermäßiger Aufnahme, besonders wenn die Verdauungsorgane überlastet oder erkrankt sind, wird Protein nur unvollkommen abgebaut. Die Zwischenstufen wirken giftig.

Die stickstofffreien Nährverbindungen, also vornehmlich Zucker und Stärke, erzeugen Wärme und Muskelkraft. Außerdem verhindern sie, wie auch die Fette einen zu schnellen Zerfall des Eiweißes. Aus diesem Grunde bleiben selbst empfindliche Wurmvögel sogar bei ganz ungeeigneter Nahrung oft längere Zeit am Leben, sobald das Futter genügend fettreich ist. Kohlenhydrate wirken bekanntlich fettbildend.

Grasmücken werden von zuckerreichen Früchten schnell sehr fett. Die Fette sind ebenfalls Wärmeerzeuger. Der tierische Körper speichert sie mit Vorliebe als Vorrat für schlechte Zeiten auf. Wenn die Nahrungsaufnahme ungenügend ist, ebenso in Krankheitsfällen wird zuerst im Stoffwechsel der Fettbestand verbraucht und erst dann beginnt die Einschmelzung der Gewebe. Fett bewertet man als Bewegungs- und Wärmeenergie $2^1/_2$mal höher als die gleichen Mengen Kohlenhydrate.

Große Bedeutung haben ferner die sogenannten Nährsalze. Fehlt ein notwendiger Aschenbestandteil oder gelangt er wegen Verdauungsstörungen ungenügend zur Aufsaugung, so machen sich bald krankhafte Anzeichen bemerkbar, der Federwechsel wird mangelhaft; es entstehen Erschöpfungszustände, Schwäche, Nervenzerfall und schließlich tritt der Tod ein. Für den Nährwert eines Futtermittels kommen allein dessen verdauliche Bestandteile in Frage. Das Verdauungsvermögen der einzelnen Exemplare innerhalb einer Tierart weist erfahrungsgemäß bedeutende Unterschiede auf. Der Gesundheitszustand einmal, dann aber auch die Entwicklung der Verdauungsorgane, die Zusammensetzung des ganzen Futters, das Verhältnis der einzelnen Nährstoffe zueinander und noch andere Umstände üben auf den Ernährungsprozeß einen erheblichen Einfluß aus.

Bekanntlich ist das Sauerstoffbedürfnis der Vögel außerordentlich groß. Werden frisch gefangene, abgehetzte Singvögel längere Zeit bei unzulänglicher Luftzuführung transportiert, so bleibt in ihrem Körper viel Kohlensäure zurück, die chemische Verbindungen eingeht, welche in Form von kalkigen, dünnen Ausleerungen abgesondert werden. Erhalten solche erschöpfte Tiere noch dazu eine unnatürliche Nahrung, ist die Eingewöhnung nicht sachgemäß, so gehen viele Exemplare ein. Im besten Falle machen sich Schwächezustände und geringes Anpassungsvermögen lange bemerkbar.

Frisch gefangene Zaunkönige, Goldhähnchen, Hauben- und Schwanzmeisen sollen möglichst einzeln in luftigen Beuteln befördert werden. Währt der Transport mehrere Stunden, so muß unterwegs eine Fütterung stattfinden; sie geschieht am besten in der Weise, daß man jedes Vögelchen in die Hand nimmt und dann den weichen Inhalt von geköpften Mehlwürmern an den Schnabel drückt. Die Masse wird meistens ohne Umstände eingesogen, und die Körperfrische bleibt erhalten.

Jeder ermüdete Vogel, mit Ausnahme der Schwanzmeisen und Goldhähnchen, die man nach Bedarf verteilt, kommt in einen gut belichteten kleinen Kistenkäfig. Das Tierchen kann sich darin ausruhen, wieder Kräfte sammeln und wird nicht immer von seinen Genossen mitgerissen.

Im Herbst oder Winter gefangene Haubenmeisen und Zaunkönige nehmen häufig zuerst nur Mehlwürmer an. Man zerschneidet in solchen Fällen die Würmer und vermischt die Teilchen mit geriebenem Eigelb und Ameisenpuppen. Für die empfindliche Schwanzmeise eignen sich frisch gehäutete Würmer am besten, da das Vögelchen sie ganz verschluckt. Fehlen solche, so kocht man ausgewachsene Würmer einige Minuten, saugt das anhaftende Wasser mit

Löschpapier ab, zerkleinert sie und mengt die erwähnten Stoffe dazwischen. Einige junge, lebende Würmer geben genügend Anreiz. Goldhähnchen bekommen zuerst kleines Wurmzeug. Tote oder lebende Fliegen erleichtern ungemein die Eingewöhnung. Bei einiger Umsicht treten selten Verluste ein.

Aber selbst Ende Oktober machen sich in den sonnigen Mittagsstunden überall noch Spinnen und mehrere Fliegenarten bemerkbar. Auch die Raupen der verschiedenen Eulenarten sind manchmal häufig.

Die erwähnten Vögel bekommen im Winter am besten gute trockene Ameisenpuppen, Weißwurm, Insekten und Schmetterlingsschrot. Das Anfeuchten geschieht mit wenig geriebener Möhre oder Obst-

Zweifarbrötel (s. S. 335).

fästen, so daß ein flockiges Gemengsel entsteht. Vorzüglich ernährt ferner hartes Eigelb. Ausgezeichnete Erfahrungen habe ich mit gekochten Mehlwürmern gemacht und damit zahlreiche kranke Insektenfresser geheilt.

Einmal hielt ich in einer großen, schön bepflanzten Gartenvoliere Goldhähnchen, Zaunkönige, Baumläufer, zehn Schwanz- und sechs Haubenmeisen. Meine Pfleglinge rührten im Sommer kaum das angebotene Futter an, sondern verzehrten hauptsächlich freilebende Insekten, die ich nach verschiedenen Methoden anlockte. Kleine durchlöcherte, mit faulendem Fleisch gefüllte Blechschächtelchen waren in der sonnigen Tageszeit ständig von Brummern und Fleischfliegen umschwärmt, während gärender Möhrenbrei, der in flachen, mit Drahtgaze überdeckten Schüsseln aufgestellt wurde, unzählige Moderfliegen anzog. Das muntere Goldhähnchenvolk machte besonders eifrig nach diesen winzigen Insekten Jagd. Verdünntes Apfelgelee übte dagegen auf Nachtschmetterlinge und Motten einen erstaunlichen Einfluß aus.

In unserem Gutspark stand ein großes Gartenhaus, das regelmäßig abends erleuchtet wurde und dessen Türen stets offen standen. Morgens saßen an den Fensterscheiben immer verschiedene Eulenschmetterlinge, Spinner und sonstige Insekten, die für mein gefiedertes Völkchen begehrte Leckerbissen bildeten. Außerdem züchtete ich Seidenraupen. Der weiche Inhalt der zerschnittenen Raupen wurde von den beiden Zaunkönigen und den Haubenmeisen leidenschaftlich gerne verspeist.

Bei genügendem Futter wachsen Seidenraupen, zwar benötigen 1000 Stück bis zu ihrer vollständigen Ausbildung ungefähr 40—50 Pfund Maulbeerbaumblätter, ungemein schnell heran und häuten sich viermal. Man kann im Sommer zwei bis drei Zuchten gewinnen.

Neuerdings werden auch die Blätter der Schwarzwurzel (Scorzonera) als Nahrung für Seidenspinnerraupen empfohlen, doch scheinen die Kokons keine besondere Güte zu besitzen. Aber vielleicht ließe sich auf diese Weise ein billiges, bekömmliches Wurmfutter für empfindliche Weichfresser gewinnen, da die Schwarzwurzel überall gedeiht, bei später Aussaat gut überwintert und frühzeitig Blätter treibt. Zwischen dem Wissen und Können liegt eben das mühsame Probieren.

Ferner legte ich der munteren Gesellschaft allerlei Abschnitte von Ostbäumen vor, und die Tierchen suchten sofort Blattläuse, Insekteneier und Räupchen ab. Die Überwinterung erfolgte im Kalthause.

Jedes Geschöpf kann das genossene Futter nur bis zu einem gewissen Grade verdauen; das übrige

findet sich in den Fäkalien. Aber selbst die unverdaulichen Teile spielen bei dem Ernährungsprozeß keine wichtige Rolle; sie regen die Tätigkeit des Magens, der Gedärme resp. des Kropfes an und verhindern Erschlaffungen.

Häufig habe ich die Nachtigall in den Auwäldern der Donau beobachtet, wie sie mit leicht hängenden Flügeln und wippendem Schwanze allerlei Bodeninsekten auflas oder Mücken, Fliegen und Motten fing. Bekanntlich wird bei diesem Vogel die Nahrung bereits teilweise im Kropfe extrahiert und unverdauliche Reste, z. B. Chitinpanzer, ja selbst die Hülsen trockener Ameiseneier werden zusammengeballt als sogenanntes Gewölle ausgespieen. Solche tierische Gebilde quellen kaum auf und gehen niemals in Gärung über.

Manche Liebhaber mischen dem Futter etwas Weizenkleie oder ähnliche Stoffe bei, um angeblich die Gewöllbildung zu fördern, wodurch jedoch nur das Gegenteil erreicht wird. Kleie enthält 44—47 Proz. stickstoffreie Extraktstoffe, erweicht schnell, passiert unausgenutzt die Därme, reizt deren Schleimhäute und verursacht gefährliche Erweiterungen. Schon die massigen Entleerungen müßten dem Pfleger auffallen. Hierzu kommt noch, daß viele Universalfutterarten zu eiweißreich sind. Die überbürdeten, meistens schon erkrankten Verdauungsorgane können die Arbeit nicht bewältigen, Zwischenstufen des halb abgebauten Eiweißes bleiben im Körper zurück und werden an Stellen deponiert, wo der Blutdruck geringer ist. Solche Gifte verursachen leicht ausgedehnte Entzündungen. Ferner verdaut kein Wurmvogel ausgedrückte Mohrrüben. Die Möhre enthält in 100 Teilen 1,7 Proz. Rohfaser, 1,1 Proz. verdauliches Eiweiß, 0,13 Proz. Fett und 11,4 Proz. stickstofffreie Extraktstoffe. Außerdem kommt darin noch 1 Proz. Zellulose vor, 100 Gramm geriebene frische Rübe gibt beiläufig 45 Gramm ausgepreßte, worin allein schon 1,9 Rohfaser enthalten ist.

In der Landwirtschaft wird nach bestimmten Normen gefüttert. Selbstverständlich können theoretische Berechnungen nur Anhaltspunkte gewähren, schon weil die einzelnen Futtermittel in ihrer chemischen Zusammensetzung bedeutende Abweichungen zeigen, obwohl man den Durchschnitt annimmt. Außerdem ist das Verdauungsvermögen jedes Tieres beinahe verschieden. Eigene Erfahrungen und Beobachtungen lassen sich eben niemals durch Theorien ersetzen, so wertvoll solche auch für den Praktiker sind.

Zarte Wurmvögel nach festgelegten Grundsätzen und Rezepten zu ernähren, ist noch weniger möglich. Einmal werden die verschiedensten Vogelarten gehalten, deren Nahrungsbedürfnis in der Freiheit wir kaum kennen. Außerdem wurden selbst gebräuchliche Futterstoffe noch nicht oder nur vereinzelt chemisch untersucht, so daß kaum brauchbare Durchschnittszahlen ergründbar sind. Ein Vogel soll weder unter-, aber auch nicht überernährt sein; es ist daher nötig von Zeit zu Zeit den Körperzustand festzustellen und die weitere Fütterung nach dem Befund zu richten.

Nur gesunde Exemplare mit normal funktionierenden Verdauungsorganen nützen die aufgenommene Nahrung gut aus. Bei Darmerweiterungen können z. B. die entstehenden Gärungssäuren wichtige anorganische Verbindungen fällen, bzw. umgruppieren und sie unwirksam machen, wodurch häufig der Federwechsel verzögert wird, selbst wenn die notwendigen Stoffe genügend im Futter enthalten sind. Zarte Insektenfresser sollen naturwidrige Zugaben tunlichst wenig bekommen. Übrigens arbeite der Pfleger niemals nach der Schablone und beachte stets die jeweiligen Verhältnisse. Vielleicht geben einige Fälle aus der Praxis wichtige Hinweise. (Fortsetzung folgt.)

Züchtung von Tarantinischen Unzertrennlichen.

Von W. Reitzig.

(Nachdruck verboten.)

Mitte Oktober 1924 kaufte ich bei Herrn Tzornack (Prenzlauer Allee), ein Paar Tarantinische Unzertrennliche. Denselben gab ich ein Bauer in der Größe von 80 × 40 × 50 cm. Der Nistkasten, den ich außen anhängte, ist 25 cm hoch, der Durchmesser beträgt 16 cm.

Schon nach mehreren Tagen merkte ich, daß die Vögel zur Brut schreiten wollten. Ich gab ihnen als Nistmaterial verschiedene feine Wurzeln, Heu und Bastfasern, aber nichts wurde in den Kasten getragen. Was ich von diesem Material in den Nistkasten tat, wurde regelmäßig wieder hinausgeworfen. Eine Schicht Sägespäne, die ich nun hineingab, schien ihnen das Richtige zu sein; denn alsbald hörte man die Vögel scharren und kratzen. Kleine Federn, die ich hineinlegte, lagen aber immer auf dem Käfigboden und wurden nie verwendet.

Am 11. November verließ das Weibchen nur selten den Kasten. Als ich am Abend nachsah, konnte ich das erste Ei feststellen. Am 15. des gleichen Monats waren drei weitere Eier vorhanden. Nach ungefähr 14 Tagen ergab eine Prüfung, daß alle vier befruchtet waren.

Ein leises Piepen am 6. Dezember zeigte mir an, daß das erste Junge gut ausgekommen war. Am 8., 9. und 10. schlüpften die anderen aus. Beide Alten fütterten sehr gut. Am 30. Januar 1925 verließ das älteste der Tierchen zum erstenmal das Nest, verschwand aber nach kurzer Zeit wieder. Nach einer weiteren Woche saßen alle vier wohlbehalten auf der Stange und ließen sich von den Alten füttern.

Vom 26.—29. Januar legte das Weibchen wieder vier Eier, drei waren befruchtet, eins war klar. Am 22. Februar waren die drei Jungen ausgeschlüpft, starben aber kurz nacheinander, weil sie anscheinend nicht gefüttert wurden; denn sie hatten niemals etwas im Kropf.

Ab 17. März wurden sechs Eier gelegt, regelmäßig jeden Tag eins, davon waren jedoch nur vier befruchtet. Die vier Jungen kamen am 10., 11., 12. und 14. April aus. Am 28. Mai sah ich sie zum erstenmal für kurze Zeit auf der Stange. Bei dieser dritten Brut waren die Jungen ungefähr eine Woche früher aus dem Nest, weil sie wahrscheinlich infolge der längeren Tage mehr Futter bekamen und schneller wuchsen, als die im Winter gezogene erste Brut. Ich habe nie beobachtet, daß die Jungen bei Lampenlicht gefüttert wurden.

An Futter erhalten meine Tarant. Unzertrennlichen schwarze und weiße Sonnenblumenkerne, geschälten Hafer, Spitzsamen, weiße Hirse, etwas Hanf, trockene oder frische Ameisenpuppen, ferner in Milch getauchten und ausgedrückten Zwieback. Auch Distelsamen und Negersaat werden gern genommen. Solange es Kürbis gab, erhielten sie mehrmals täglich ein Stückchen desselben. Er wurde süßen Birnen und Äpfeln vorgezogen.

Das gegenseitige Rupfen der Vögel scheint nach meiner Beobachtung eine Eigenart der Tiere zu sein, die in keinem ursächlichen Zusammenhange mit der Brut steht, da die gerupften Federn zum Nestbau usw. nicht verwendet wurden. Bei den von mir beobachteten Paaren waren sowohl Männchen als Weibchen gerupft. Vielleicht ist diese Eigenart auf die mehr oder weniger aggressive Natur des einen oder andern Teils zurückzuführen.

Am 6., 7. und 8. Juni wurde wieder gelegt. Alle drei Eier sind befruchtet, und da das Weibchen weiter gut brütet, kann mit dem guten Auskommen der Jungen gerechnet werden.

Nachtigallkanarien.

Ein an die Schriftleitung gerichteter Brief.

Von Karl Reich.

(Nachdruck verboten.)

In Nummer 24 der „Gef. Welt" finde ich eine Abhandlung von Herrn Ludwig Frank über einen von Herrn Prof. Dr. Fehringer, Heidelberg, von mir erbetenen und ihm zugesandten Nachtigall-Edelkanarienvogel.

Bei der Bedeutung und großen Verbreitung der „Gef. Welt" in allen Weltteilen ist dieser Artikel geeignet, meine züchterischen Arbeiten durch die Bezeichnung der nachtigallähnlichen Touren als „Schappertouren" einen nicht absehbaren Schaden zuzufügen. Wer in der Kanarienwelt steht, weiß, daß die Bezeichnung „Schappertour" die wegwerfendste Bezeichnung ist, die man einem Züchter anhängen kann. Kanarienvögel mit Schappertouren sind von jeder Kanarienausstellung von vornherein ausgeschlossen.

In Dresden und Mannheim wurde meinen Nachtigall-Edelkanarien auf den dortigen großen Bundes-Ausstellungen im vorigen Jahre 1924 von ersten bedeutenden Preisrichtern Deutschlands je die „Große goldene Medaille" zuerkannt. Das beweist, daß die verpönten Schappertouren bei meinen Nachtigall-Edelkanarien nicht vorhanden sind. Ausführungen wie die des Herrn Frank treffen nicht nur mich, sondern auch die Herren Preisrichter meiner

Steinrötelweibchen
(s. Heft 28).

Vögel und alle Anhänger meiner Gesangsrichtung verletzend.

Auf der Großen Jahresversammlung der Preisrichtervereinigung des „Weltbundes" in diesem Jahre 1925 wurden meine Nachtigall-Edelkanarien vorgeführt (zwei Kollektionen). Der Bundesvorsitzende, Herr Hartz, schreibt darüber wörtlich: „Herr Reich führte zwei Kollektionen Nachtigall-Edelkanarien vor. Mit wenigen Ausnahmen waren die Anwesenden entzückt und begeistert von der kleinen Sängerschar. Man war allgemein der Ansicht, daß die Bestrebungen des Herrn Reich und seiner Anhänger gefördert werden müssen." (Zur gefälligen Einsicht füge ich Ihnen ein Exemplar der „Allg. Kanarienzeitung" bei.)

Herr Karl Kastaun schreibt in Nr. 14 der „Allg. Kanarienzeitung": „Nach der Vorführung der Siegerkollektionen um die Weltmeisterschaft führte uns Sportskollege Karl Reich, Bremen, zwei Kollektionen seiner Nachtigall-Edelkanarien vor. Als alter

Natur- und Nachtigallenfreund muß ich sagen, jäh packte es mich, und ich sah es deutlich, auch manchen unter unseren Kameraden hat es gepackt. — War das möglich? — Wirkliche Nachtigallen glaubten wir naturgetreu herauszuhören, so deutlich brachten diese Vögel das Schluchzen und manche andere schönen Touren, die von wirklichen Nachtigallen zu kommen schienen. Diese schönen Touren verbanden sie geschickt mit guten Touren unseres Edelrollers, auch hohle und tiefe gute Glucken brachten sie zu Gehör. Ich muß sagen, als alter Nachtigallenkenner wurde mir das Herz warm, und in der impulsiven Freude, dies zu hören, habe ich aus meinem Herzen keine Mördergrube gemacht und Herrn Reich herzlich zu dieser Sportsleistung beglückwünscht."

Weiter gestatte ich mir Ihnen zur Einsicht einen Brief des Herrn Julius Bartke, Breslau, beizufügen, in welchem dieser Herr wörtlich schreibt: „Zunächst sage ich Ihnen vielen herzlichen Dank für die gute Bedienung; ich habe wirklich die hellste Freude an den gesandten Vögeln. Von den Nachtigalltouren des Hahnes bin ich geradezu entzückt. Daß ich im Besitz von Vögeln Ihres Stammes bin, hat sich schon ziemlich herumgesprochen, und zwar alte Züchter, die mir vorher stets vom Bezuge abgeraten hatten, waren auch verwundert über die Klangreinheit des Gesanges und gaben offen zu, daß sich ihr Vorurteil — Nachtigall-Kanarien seien Schappervögel — hier bei Ihren Vögeln nicht bestätigt. Dieses Urteil ist um so erfreulicher, da beide Züchter jahrelang nur Hohlrollervögel züchten."

Herr Ph. Schäfer, Glanmünchweiler, schreibt: „Die mir gesandten Vögel sind am Freitag gesund und munter angekommen. Ich nahm sie aus ihrem Versandkäfig, und schon ließ das Hähnchen seinen wunderschönen Nachtigallgesang hören, über den ich ganz erstaunt war. Ich züchte ja schon 15 Jahre, aber so was Wunderschönes an Gesang ist mir noch nicht zu Ohren gekommen."

Eine große Anzahl ähnlicher Zuschriften bringen Gleiches zum Ausdruck, doch genügen wohl diese angeführten Äußerungen für die Auffassung weiter Kenner- und Liebhaberkreise hinsichtlich der Gesangstouren der Nachtigall-Edelkanarien, im Gegensatz zu den Ausführungen des Herrn Frank.

Schappertouren sind jedem Züchter edler Gesangskanarien einfach unerträglich, und dürfen solche herabsetzenden Bezeichnungen Vögeln, welche solche nicht bringen, auch nicht vergleichsweise angedichtet werden, um nicht Ungerechtfertigtes von dem Anwurf hängen zu lassen, und auch um nicht eine ungemein schwierige Züchterarbeit unnötig zu diskreditieren.

Finkenmischlinge und anderes.

Von Walter Schmelzer, Madrid.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

„Waldfriede" beherbergt also eine ganze Anzahl schöner und interessanter Vögel.

In Einzelhecken befinden sich:

a) 1,0 Feuerzeisig mit 0,1 Bluthänfling und 0,1 Distelfink. Da diese drei Vögelchen zwecks evtl. Bastardzucht von jeher friedlich in kleinerem Käfig zusammenlebten, übersiedelten sie vor kurzer Zeit in einen großen Heckkäfig (75 × 40 × 50 cm), der mit allerlei Grün und Nestchen aus grünem Schilfrohr ausgestattet ist. Die Hänflingsfrau, zu der ich besonderes Vertrauen habe, hat heute morgen, am 27. April, im selbstgebauten Nest aus Gräsern, Palmenfasern, Wolle usw. das erste Ei gelegt. Farbe reinweiß ohne jegliches Farbenpünktchen. Ob der Kapuzenzeisig seiner ehelichen Pflicht nachgekommen ist, habe ich noch nicht beobachten können. Es heißt eben wie immer, viel Geduld haben. Dieses Hänflingsweibchen, das ich vor drei Jahren für den billigen Preis von 0,25 Centimos erstanden habe, hatte vergangenes Jahr im gleichen Käfig mit einem meiner Indigofinken vier Gelege mit je vier Eiern, die treu und fleißig, aber leier zwecklos, bebrütet wurden, obwohl der Käfig an ziemlich belebter Stelle am Fenster stand. Begattungsversuche habe ich sehr oft beobachtet. Verschiedentlich derartig, daß ich glauben mußte, die Zucht hält guten Verlauf, aber stets wenn ich nach etwa sieben bis acht Tagen die Eier gegens Licht hielt, waren sie klar. Woran das Mißgeschick lag, entzieht sich meiner Beurteilung. Es kann sein, daß der schöne Bläuling zur Zucht schon zu alt war und nicht mehr zeugungsfähig ist. Trotzdem ist er heute wieder zusammen mit vorjährigem Hänflingsweibchen in gleichgroßem Käfig wie oben beschrieben. Dieser blaue, fleißig singende Amerikaner, welchen ich schon vier Jahre besitze, macht der Hänflingsfrau fleißig die Kur, doch sie will noch nichts davon wissen. — Über den Verlauf dieser beiden Bastardzuchtversuche gebe ich, falls es interessiert, später nähere Auskunft in der „Gef. Welt".

b) So hat auch mein zweiter Indigofink, der sich jetzt im Flugraum befindet, eine ganz interessante Vorgeschichte: Ich hielt den schönen Vogel, da man hier leider nicht zu den Weibchen dieser Amerikaner kommen kann, mit 0,1 Braunrückengoldsperling zusammen, da die beiden Vögel äußerlich viel gemeinsam haben. Bald beobachtete ich auch im kleinen Käfig Begattungsversuche. Schleunigst wurde ein großer Käfig mit allerlei Zweigen und Nestern ausgestattet und das erste Zusammentreffen des Pärchens war befriedigend. Es schien, als ob die Afrikanerin Eile hatte, und bald erstand in einem Harzerbauercheu

Feuerzeisig
(s. nebenstehend.)

me Decke ein richtiges Spatzennest, in das das lfahlbraune Weibchen stets von oben hineinschlüpfte. ines Tages, als ich die Spätzin nicht mehr ausfliegen h, fand ich bei späterem Nachsehen meine Ver- utung bestätigt und zwei Eier, weiß mit kleinen ünktchen am stumpfen Ende, lagen im Nest, die h jedoch nach längerem Bebrüten leider als taub wiesen. Zu einem weiteren Gelege kam es leider cht mehr, und zu meinem großen Bedauern ging e schmucke Afrikanerin, die mir, wie auch der Indigo- k, stets die Fliegen aus der Hand nahm, plötzlich n. Zuerst glaubte ich an Legenot, doch erwies ch nach Verenden im Hinterleib eine harte Knorpel- schwulst, so dick wie ein Fingerglied. Das war s Ende meiner beabsichtigten Indigofink × Braun- ckengoldsperlingzucht.

c) Einzelhecken 50 × 35 × 40 cm:

1. Feuerzeisig × blaßgelbe Seifert- narie. Von diesem Paar besitze ich reits sieben diesjährige Mischlinge. Drei s erster Brut, die jedoch von zwei an- ren Müttern ausgebrütet und erzogen urden, da die eigentliche Mutter an- heinend noch keine richtige Liebe zu ihrem elege hatte und sich oft im Käfig herum- ieb. So habe ich also kurz entschlossen e vier Eier anderweitig untergelegt. Das erte Ei, das sich ebenfalls als befruchtet wies, verunglückte mit weiteren vier be- uchteten Eiern einer anderen Kanarie. ie vorerwähnte Kapuzenzeisig-Misch- ngsmutter befand sich innerhalb zehn Tagen ieder auf vier Eiern und brachte die vier Misch- nge heute so weit, daß sie sich schon munter mit rem kleinen, tiefroten Vater im Käfig herum- ummeln, während die Mutter zum dritten Gelege ie Vorbereitungen trifft. Übrigens, dieses Weibchen t Mutter meiner 5,0 vorjährigen Magellanzeisig- astarden.

2. Feuerzeisig (s. Abb. S. 340) (× Feuerzeisigkanarie < Kanarie × Kanarie). Obwohl beide sehr brutlustig nd, ist es jedoch noch nicht zum Eierlegen gekom- en. Da der weibliche dreifache Mischling immer- in noch Zeisigblut in sich hat, was seine schon orbeschriebene Farbe zeigt, hoffe ich, daß hier die so hr begehrten roten Mischlinge hervorgebracht werden, lls das Weibchen sich als fruchtbar erweist.

3. Graugirlitzkanarie × reingelber Seiferthenne. Dieser herrliche, gut singende Mischling trägt die arben seines afrikanischen Vaters, also ohne jede elbe oder grüne Feder, die seine Abkunft vom anarienvogel verraten könnte. Seine Mutter war rauweißgelb gescheckt. Er, sowie seine beiden Schwestern, elch letztere sich im Flugraum befinden, sind völlig ahm und kommen mir auf Hand und Schulter, um ch ein Weilchen mit mir zu beschäftigen. Ich habe iese drei Mischlinge vergangenes Jahr selbst auf- äppeln müssen, weil sie von ihrer Rabenmutter schlecht ehandelt wurden. Das Männchen ist mit seiner Gelben" heuer zweimal zur Brut geschritten, doch ie zwei aus je fünf Eiern bestehenden Gelege erwiesen ch resultatlos. Im ersten Gelege wurde einer der orgenannten Feuerzeisigbastarde erbrütet und unter iel Liebe der Stiefeltern zum kräftigen Männchen erzogen, das bereits leisen Gesang hören läßt. Die Seifertmutter beschäftigt sich mit dem dritten Gelege. Ob sie mir nun einen Doppelmischling bringen wird?

4. Magellanzeisig (Abb. s. unten) × Kanarie, grünbunt. Das Männchen befindet sich bereits drei Jahre in meinem Besitz und hat mir voriges Jahr die vorerwähnten fünf Mischlinge gebracht, welche olivgelb gefärbt sind; einer davon mit schwarzer Kopf- und Kehlzeichnung. Alle fünf sind ausgezeich- nete Sänger. Zwei habe ich an Bekannte abge- geben, während die restlichen drei noch in meinem Besitz sind. Einer von diesen hat sich bereits mit gelber Kanarie im Flugraum gepaart.

Das erste diesjährige Gelege des obigen Pärchens war taub, aber es hat zwei Feuerzeisigmischlinge groß gezogen. Die Henne ist Mutter von 4,2 Yarell-

Magellanzeisig.

zeisigkanarien, 1,1 Feuerzeisigkanarie × Kanarie und 1,0 Distelfinkkanarie aus den Jahren 1922—1924. Heute ist dieses Weibchen schon Urgroßmutter.

Das zweite Gelege ist vom Magellanzeisig be- fruchtet, wie ich heute morgen, am 28. April, fest- gestellt habe.

5. Yarallzeisigkanarie × Kanarie, grünbunt. Er- zogen 1924, 4,7 Doppelmischlinge, wovon ein Weibchen als Jungvogel einging. Farbe des Vaters oberhalb olivgrün mit dunkelbraunen Flügel- und Schwanz- federn, ganze Unterseite lebhaft zitronengelb. Die Nachkommen dieses Vogels sind in Farbe grün und goldgelb, herrliche Vögelchen und bringen fast reinen Kanariengesang. Heute befindet sich wieder ein fast flügger Doppelmischling im Nest. Die restlichen vier sind leider im Ei abgestorben, d. h. eins von diesen fand ich morgens nach dem Ausschlüpfen leider tot im Käfig. Es scheint, daß jener neue „Weltbürger" eine andere Gefiederfarbe hat; mehr gleicht er den Nestjungen der Feuerzeisigkanarien. Also weder grün noch gelb.

6. Yarellzeisigkanarie × Kanarie × Kanarie, grünbunt. Der Doppelmischling ist dunkel olivgrün und wurde am 26. April Vater von fünf dreifachen Mischlingen, welche nunmehr die Urenkel der obengenannten Kanarie des Magellanzeisigs sind.

7. (Yarellzeisigkanarie × Kanarie ×) Kanarien, braunbunt. Dieser Doppelmischling ist Bruder des vorgenannten, ein ganz prächtig gefärbtes Vögelchen. Rücken und Brust hellgrün, übrige Köperteile tief goldgelb. Erstes Gelege von sechs Eiern unbefruchtet. Weibchen hat den zweiten Nestbau beendet. Heute, 28. April, das erste Ei.

8. In Reserve befinden sich noch: 1,0 Yarellzeisigkanarie mit 0,1 Distelfink und 1,0 Erlenzeisig mit 0,1 Distelfink. Diese beiden Paare halte ich gesondert, um sie in große Heckkäfige zu werfen, sobald ich Liebeslust beobachte. Der zweijährige Yarellzeisigmischling, Onkel der Doppelmischlinge, füttert bereits seine Distelfinkin, die 1924 mit einem Papstfinken ein Ei gelegt hat. Trotzdem sie das Nestchen im Harzerbauerchen schön geformt hatte, fand ich das Eichen zerbrochen am Käfigboden. Dadurch konnte ich nicht feststellen, ob das Ei befruchtet war. Ich glaube es kaum, da der Papstfink, den ich als Jungvogel — eigentlich als Weibchen — gekauft die Distelfinkin nicht begattet hat. Sonderbarerweise hat dieser fleißig singende Vogel, der sich seit der Mauser schon im Einzelbauer befindet, beim Ablegen seines Jugendgefieders fast die schöne rote Farbe des Wildlings erhalten, während der im Flugraum sich befindende nur eine tief orangefarbene Brust hat, aber sich neben seinen Vettern, Indigo- und Orangeblaufink, gut ausmacht. Was ich sehr bedauere, ist, daß die entsprechenden Weibchen dieser prachtvollen amerikanischen Blaufinken hier nicht eingeführt werden. Ebenso kann ich hier nicht in den Besitz von Dompfaffen, und wiederum von diesen die vorgezogenen sogenannten kleinen Heidedompfäffchen kommen, um mit ihnen Bastardzucht versuchen zu können. Jedenfalls ist der Dompfaff in Spanien nicht beheimatet, weil ich ihn hier niemals zum Verkauf angeboten finde. Die Vogelsteller kennen ihn auch gar nicht.

Zum Schlusse will ich noch meinem schönsten Mischling einige Worte widmen. Er ist ein Kanarien-distelfink, also die Mutter war ein Stieglitzweibchen. Der Vogel hat die Gestalt der Mutter und ist rein schneeweiß mit tief goldgelben Flügeln. Auf dem Rücken einen kleinen silbergrauen Fleck; ein wirklich wunderhübsches Vögelchen, welches stets aalglatt im Gefieder ist, als ob es sich seiner Schönheit bewußt sei, und seinen reinen, aber viel lauteren Stieglitzgesang fleißig vorträgt. Schnabel und Beine blaßrosafleischfarben. Auge dunkel. Das Tierchen wird sorgfältigst im Einzelkäfig gehalten und macht mir durch seine außerordentliche Zahmheit viel Freude. Besonders, wenn ich an seinen Käfig komme, um ihn einige Hanfkörner zu geben, die von der Hand genommen werden unter vielen Drehungen, die dem Stieglitz eigen sind.

So könnte ich noch seitenlang von meinen „Finkenmischlingen und anderes" erzählen, doch es würde für heute zu weit führen. So Gott will, werde ich demnächst ein wenig über Spaniens Vogelliebhaberei berichten.

Kleine Mitteilungen.

Auslandsbericht. Avic.-Magazine, Juniheft 25: Aus dem Tanganjikagebiet kamen kürzlich, wie D. Seth-Smith berichtet, zwei sehr seltene Unzertrennliche nach London, und zwar Agapornis personata und Agapornis fischeri. Sie waren in etwa 6000 Fuß Höhe erbeutet und in mehrtägiger Auto- und Bootfahrt zur Küste gebracht. Infolge der Strapazen kamen nur vier Stück lebend bis London. Das charakteristische der A. personata ist ein breites, gelbes Band um Nacken und Kehle; im übrigen zeigt das Gefieder folgende Färbung: Kopf schwarzbraun, Oberseite olivbraun, Vorderbrust rot-orange, Flügel grün, Oberschwanzdecken hellultramarinblau, mittlere Schwanzfedern grün, die anderen orange an der Wurzel, grün in der Mitte, dann ein schwarzes Band und gelbe Spitzen. Iris braun, Schnabel korallrot; nackter Augenring weiß. Es besteht also eine gewisse Ähnlichkeit mit dem bekannten Rußköpfchen. Von A. fischeri kam nur ein Exemplar lebend an. Es ähnelt dem Rosenpapagei, soll aber noch schöner sein. Die Vögel gingen nach Amerika. Beide Arten sind im Journal für Ornithologie 1887 von Reichenow beschrieben; Bälge sind in Museen nur ganz vereinzelt zu finden. Außerdem gelangte nach London in wenigen Exemplaren ein ebenfalls selten eingeführter Helmvogel: Turacus donaldsoni, einer der schönsten seiner Gattung. Turacus sind zweimal bei Liebhabern gezüchtet, und zwar der Kammturako von Mrs Johnstone in England und der Gemeine Turako, T. persa in drei Generationen von J. Delacour in Frankreich (L'Oiseau, 1925, Nr. 4). Bei Astley in England brüteten Weißhaubenturako und der Rotschopfturako, doch gingen die Jungen leider ein. Einige Anweisungen gibt im selben Heft Tavistock über die Haltung empfindlicher Sittiche. Der Feinsittich (Neophema venusta) bedarf besonderer Wartung seiner Schönheit und seines drohenden Aussterbens wegen. Die Decke des Käfigs muß aus Tuch sein, da der Vogel sehr schreckhaft ist und sich sonst unfehlbar den Schädel an einer harten Decke einrennt; auch neigt er leicht zu Hitzschlag; daher Bedecken des Flugraumgitters mit belaubten Ästen im Hochsommer; er kann nicht, wie viele andere Sittiche, im Freien überwintert werden. Die Blaufärbung ist beim Weibchen auffallend blasser. — Der Bergsittich (Polytelis melanura) hält sich auf die Dauer nur in einem großen Flugraum, dessen Boden reichlich mit Gras bepflanzt ist und jährlich erneuert wird. Im Anfang gegen Kälte sehr empfindlich; nach der ersten Mauser aber wetterfest. Beim Männchen werden die Schwanzfedern blauschwarz, während beim Weibchen dieselben dauernd die grüne Farbe beibehalten. — Der Gelbbauchsittich (Platycerc. flaviventris) ist sehr empfindlich für Nässe und Kälte und erliegt leicht tuberkulösen Erkrankungen. Nahrung wie Rosella; liebt sehr Mehlwürmer. Die Färbung der Geschlechter zeigt keinen Unterschied, doch ist beim Weibchen Kopf und Schnabel auffallend kleiner. Letztgenannte Sittiche wurden mir und auch anderen Liebhabern von London aus für 20 Pfund das Paar angeboten. In der Zeitschrift The Emu, dem Organ der Australischen Gesellschaft für Ornithologie, ist der Bericht der Jahresversammlung dieses Vereins ausführlich wiedergegeben. Unter anderem wird die Regierung darauf aufmerksam gemacht, daß trotz des Ausfuhrverbotes immer noch die Ankunft australischer Vögel in englischen Zeitschriften angezeigt wird; sie wird aufgefordert, die Häfen strenger zu überwachen und die Ausfuhr ganz zu unterbinden. Über kurz oder lang werden wir also mit dem gänzlichen Ausbleiben australischen Imports zu rechnen haben, was vom Standpunkt des Liebhabers gewiß sehr zu bedauern ist. Ein großes Werk über die australische Vogelwelt wird seit 1906 von Gregory Mathews bearbeitet und in etwa zwei Jahren druckfertig erscheinen. Die früheren erschienenen Werke sind zurzeit vergriffen und im Handel nur zufällig zu erlangen. The Emu ist eine ganz erstklassige Zeitschrift, sowohl was Inhalt als auch Ausstattung anbelangt; das Januarheft ist 80 Seiten stark mit 22 photographischen und farbigen Tafeln. Der Jahresbericht läßt erkennen, daß das Interesse für die Vogelwelt und der heimatliche Naturschutz in Australien in hoher Blüte steht und sich der lebhaften Unterstützung durch die Regierung erfreuen.

Jeden Wellensittichliebhaber dürften die Angaben interessieren, die J. Bailly-Maitre im Maiheft des „L'Oiseau

über die Wellensittichzüchtereien in Toulouse veröffentlicht. Toulouse, die „Stadt der Veilchen", könnte ebenso die Stadt der Wellensittiche genannt werden, denn in manchen Jahren sind dort über Hunderttausend der so schönen Vögel gezüchtet worden. Bis 1880 wurde die Zucht im großen fast nur in Belgien betrieben. Dann fing Herr M. Bastide in Toulouse an, neben seinem Beruf, Vögel auf Jahrmärkten feil zu bieten; später verlegte er sich ausschließlich auf die Zucht von Wellensittichen. Schon im Jahre 1888 besaß er 48 Flugräume, jeder 4 Meter breit, 6 Meter tief und 3 Meter hoch, die in zwei Reihen übereinander lagen. In den unteren befanden sich die Zuchttiere 60—80 Paar, in den oberen die Jungen und zwar in jedem Raum 400—500, zusammen also zirka 15000 Stück. Im Jahre 1913 betrug die Zahl der Volieren 112; heute sind es 290! Zwischen jeder Flugraumreihe befindet sich ein freier grünbepflanzter Raum, der der großen Masse ein freundliches Aussehen verleiht. Die Söhne des Herrn Bastide haben das Werk des Vaters fortgesetzt und sind heute die Leiter des großzügigen Unternehmens. Die Durchschnittszahl der gekäfigten Wellensittiche beträgt 80—100000 Stück. Von der gewaltigen Ausdehnung dieses Geschäftes zeugen die Unterhaltungskosten. Alle zwei bis drei Monate werden durchschnittlich 1000 Sack Hirse verfüttert, was einer Jahresausgabe von zirka 360000 Franken entspricht. Zählt man dazu noch die Personalunkosten und die Zinsen des Betriebskapitals, so kann man sich vorstellen, wieviel an Tieren erzeugt und verkauft werden muß, um bei Jahresabschluß nicht vor einem Defizit zu stehen. Durch den Krieg hat das Unternehmen, wie viele andere, außerordentlich gelitten. Die besten Abnehmer waren England, Deutschland und Rußland. Mit einem Schlage waren diese Absatzgebiete verschlossen. August 1914 mußte das Haus sich daher entschließen, 120000 Wellensittiche kurzerhand zu vernichten! Ohne Absatz war das Weiterfüttern der Tiere eine Unmöglichkeit geworden. Während des Krieges blieb die Anstalt geschlossen. Heute steht sie fast wieder auf der Höhe der Vorkriegszeit, nachdem ein Vermögen für Neuanschaffungen geopfert wurde. Ein zweites weltbekanntes Haus in Toulouse ist das von Blanchard. Es wurde 1886 gegründet und züchtet heute jährlich mehrere zehntausend Stück Wellensittiche. Während aber die Firma Bastide bis heute sich ausschließlich mit der Zucht der grünen und gelben Art befaßt, verlegt sich Blanchard seit einer Reihe von Jahren auf die Entwicklung der verschiedenen Farbenvarietäten. Er ist nicht nur Händler sondern auch Liebhaber. So züchtet er zurzeit hunderte von blauen Wellensittichen. Einige seiner Flugräume beherbergen nur olivenfarbige Vögel, deren Schöpfer er übrigens ist. In anderen züchtet er zahlreich jedefarbige, die Herr Stefani, Neuß, mit dem deutschen Ausdruck „maigrün" belegt, in anderen die satinglänzenden. Herrn Blanchards eifriges Streben geht jetzt dahin, reinweiße Vögel zu erzielen. Seine letzten Erzeugnisse sind der malvenfarbige und der graue Wellensittich. Eine dem Heft beigegebene Farbentafel zeigt den grünen, gelben, malvenfarbigen, olivenfarbigen, grauen und weißen Wellensittich. Dr. Luig, Brüssel.

Bücher und Zeitschriften.

Kleiner Brockhaus, Handbuch des Wissens in einem Band. 2. Lieferung. Die beiden Tafeln Nahrungsmittel sind dadurch besonders wertvoll, daß sie die wichtigsten Bestandteile der menschlichen Nahrung nach ihrer Zusammensetzung aus Grundstoffen, ihrem Kaloriengehalt und, als etwas ganz Neues, auch den Gehalt an Vitaminen in einer übersichtlichen graphischen Darstellung zeigen. Die Vitamine sind, wie man neuestens kennengelernt hat, für die Erhaltung des menschlichen Lebens außerordentlich wichtig und dürfen in der Nahrung nicht fehlen. Wie zeitgemäß der Kleine Brockhaus auch sonst ist, zeigen z. B. die beiden Tafeln Leibesübungen. Die fünf Textbogen der zweiten Lieferung bringen das Ende des „Bolschewismus" und schließen mit dem Stichwort „Druck"; sie umfassen über 300 Textbilder und Übersichten, wie Botanik, Buchhaltung, Chemische Elemente; sie alle beweisen, daß der Kleine Brockhaus ein wertvolles Hilfsmittel ist, das alle in unserer Zeit erforderlichen Kenntnisse in nutzbarer gedrängtester Form vereinigt.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

Bereits heute schon geben wir allen unseren Mitgliedern zur Kenntnis, daß die nach den Verbandssatzungen im nächsten Jahre abzuhaltende Generalversammlung des Reichsverbandes vom 4. bis 6. April 1926 stattfindet. Alle näheren Angaben werden später rechtzeitig veröffentlicht.
J. A.: Petters.

Bericht über das verflossene Geschäftsjahr vom 1. April 1924 bis 31. März 1925. (Schluß.)

Auf vielseitige Wünsche hat der Verband im Jahreslaufe Einrichtungen geschaffen, die unseren Mitgliedern Möglichkeiten zu Vogelkäufen und -tauschen boten. Die Verhandlungen über erstere zogen sich ohne unser Verschulden nahezu ein halbes Jahr hin und als sie zu einem Abschluß gebracht waren, konnte die Einrichtung infolge entgegenstehender gesetzlicher Bestimmungen für das Sommerhalbjahr nicht in Tätigkeit treten. Anders verhielt es sich hingegen mit der Tauschvermittlung. Im Jahreslaufe ergaben sich 76 Tauschgesuche. Rund die Hälfte fand seine befriedigende Lösung, während der überbleibende Teil durch Angebotsmangel leider nicht erfüllt werden konnte.

Ebensowenig wie bei allen übrigen Angelegenheiten haben wir uns die Arbeit und Mühe gespart, der Liebhaberschaft preiswerte und billige Futtermittel zu verschaffen. Dem kürzlichen Angebote an Ameisenpuppen ist jedoch nicht die nötige Beachtung geschenkt worden, weil von ihm so gut wie kein Gebrauch gemacht wurde. Wenn wir hiergegen die öfteren Beschwerden über die nicht selten schlechte Futterbeschaffenheit im Handel zum Vergleich ziehen, mutet die Nichtbeachtung unseres Angebots eigentümlich an und läßt den Schluß zu, daß ein Bedürfnis zur Beschaffung von Spezialfuttermitteln doch nicht vorliegt.

Die außerhalb der organisatorischen Tätigkeit des Verbandes liegende Hauptarbeit verursachte zahlreiche Beschwerden. Sie bietet ein Bild dafür, welchen Ungewissenhaftigkeiten der Liebhaber noch immer im Vogel- und Futterhandel begegnet und begegnen kann, wie Liebhaber untereinander vor Betrügereien nicht geschützt sind und auch welcher Vertrauensseligkeit noch recht oft begegnet wird. Weitere Beschwerden lagen vor über polizeiliche Maßnahmen, die sich als ungerechtfertigt erwiesen und solche, die mangels einwandfreier Unterlagen nicht verfolgt werden konnten. Selbstverständlich hat der Verband, soweit Unzuverlässigkeiten im Vogel- und Futterhandel zu vertreten waren, wenn sie erbeten wurde, seine Hilfe nicht versagt und darüber hinaus auch seine Mitglieder im gesetzlich zulässigen Maße gewarnt. Bedauerlicherweise genießen aber die Händler trotz nachgewiesener Unreellität noch den gesetzlichen Schutz gegen die Verbreitung der Warnungen. Eine Überführung wegen Betrugs gelingt in den seltensten Fällen.

Eins der Ziele des Verbandes ist und war von jeher das, die Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen über den Vogelschutz in allen Ländern des Reiches einheitlich geregelt zu wissen. Soweit der Zeitpunkt für geeignet erachtet wurde, wie in Sachsen, sind auch geeignete Schritte unternommen worden. Der Erfolg in der Sächs. Angelegenheit steht allerdings noch aus und dürfte auch noch nicht sogleich zu erwarten sein, weil die Arbeiten der Sächs. Regierung sich immer noch im vorbereitenden Stadium befinden. Bei dieser Gelegenheit wollen wir aber nicht zu erwähnen vergessen, daß uns die Wissenschaft in dieser Angelegenheit freundlichst mit Gutachten unterstützt hat und weiterhin auch ihre Unterstützung zugesichert hat.

Angriffe unserer Gegner waren nur im letzten Vierteljahr zu begegnen. Die Wühlarbeit machte sich, soweit uns zur Kenntnis gekommen ist, hauptsächlich in Thüringen

breit. Unter Benutzung derselben Tagespresse, die den Angriff brachte, wiesen wir die unsachlich entwickelten Gedanken zurück. Die weiterhin vom Verbande der Tierschutzvereine unternommenen Schritte und die auch von weiteren Gegnern für Juli-August in Aussicht stehenden Angriffe werden uns auch auf dem Posten finden. Es darf nicht verkannt werden, daß die Schwere des begonnenen Kampfes von einer großen Zahl angeschlossener, mehr noch außerstehender Liebhaber verkannt zu werden scheint. Wir möchten aber nicht unterlassen darauf hinzuweisen, dieses Unternehmen nicht zu unterschätzen.

Unser Versuch, die Portosätze für den Versand von Vögeln herabzumindern, ist leider nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Nachdem das Reichspostministerium zu erkennen gab, den Versand ev. der Eisenbahn zu übertragen, wäre uns mit weiteren Schritten keinesfalls gedient gewesen; alles weitere hätte die Angelegenheit nur verschlimmert anstatt verbessert. Aus diesem Grunde empfahl es sich, spätere günstigere Gelegenheiten zu erfassen, um diese Angelegenheit vielleicht doch noch in erträglichere Bahnen zu lenken.

Weitere Arbeit, die unserem Verbande nur von Nutzen sein konnten, sind bis heute, trotz der Länge der Zeit, noch nicht zum Abschluß gekommen. Hier handelt es sich 1. um die Verbandsabzeichenfrage. Es haben sich über die Zustimmung oder Ablehnung der angeregten Abzeichenfrage noch nicht alle Vereine und Einzelmitglieder geäußert. Uns wäre es sehr erwünscht, wenn das noch recht bald nachgeholt, würde. 2. Um das Ersuchen des Verbandes, um Überlassung örtlicher und landesgesetzlicher Vogelschutzbestimmungen. Hierauf ist von keiner Seite etwas unternommen worden, vielleicht aber nehmen sich unsere Ortsgruppen auch dieser Angelegenheit einmal an 3. Nicht minder wichtig um die Vereinssatzungen für unsere Bibliothek. An diese Satzungen, soweit sie noch nicht eingereicht sind, möchten wir doch nochmals erinnern mit dem Hinweis, daß sie uns wichtiges Bearbeitungsmaterial darstellen. Hierher gehört auch noch der Hinweis auf unsere Bibliothek, die wir eingerichtet haben und allen Liebhabern zur Unterstützung empfehlen. Über die uns zugedachten Zuwendungen haben wir in unseren Veröffentlichungen berichtet, vielleicht bedarf es nur wieder einmal einer Anregung, um weitere Unterstützung zu finden.

II.

Auf- und Ausbau irgendwelcher Unternehmungen setzt nicht allein Arbeit, sondern auch Mittel voraus, die so bemessen sein müssen, daß das unbedingt nötige nicht entbehrt zu werden braucht, wenn ein Beginnen nicht von vornherein zum Stillstand — Stillstand bedeutet Rückgang — verurteilt sein soll. In bezug auf diese Voraussetzung sind wir nicht auf Rosen gebettet gewesen und nur mit persönlichen Opfern an Geld und Gut, mit freiwilligen geldlichen und materiellen Unterstützungen seitens einzelner Mitglieder und Vereine sind wir vorwärtsgekommen. Nicht unerwähnt darf hier bleiben, daß vornehmlich der Hamburger, Zwickauer und Leipziger Verein bis zum menschenmöglichen für die Sache eintraten und diesen nacheifernd die Notwendigkeit unsere erzgebirgischen Vereine und einige Einzelmitglieder erkannten. Diesen nur ist es zu verdanken, daß wir das erreichen konnten, was wir erreicht haben, nämlich, ohne Schuldenlast ins zweite Geschäftsjahr einzutreten. Aus der finanziellen Not heraus riefen wir die Hilfe unserer Mitglieder an — s. „Gef. Welt" Nr. 45, Jahrgang 24 — sie kam uns nur von den oben erwähnten Vereinen und Einzelmitgliedern, während die übrigen Vereine mit ihren Mitgliedern kein Verständnis für unsere Not zeigten. Erst nahe dem Ende des ersten Geschäftsjahres besserte sich unsere schwierige Lage, als die Beiträge, die am Jahresanfang zahlbar waren, eingingen.

Über die Einnahmen und Ausgaben im einzelnen zu berichten, ist ein Ding der Unmöglichkeit solange, als uns die Unterlagen hierzu fehlen. Zur Erkennung der Ursachen des Mangels gestatten wir uns auf unseren Bericht unter I betr. Werbearbeit zu beziehen. Unsere tatsächlichen Einnahmen betrugen am Jahresende 234,60 M. Die Ausgaben einschl. freiwilliger geldlicher Unterstützung 228,15 M., so daß ein Kassenbestand von zusammen 6,45 M. vorhanden ist. Die rechnerische Richtigkeit der Einnahmesumme wird gewährleistet, hingegen kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beitragsleistung erst dann versichert werden, wenn die erschöpfenden Unterlagen — Mitgliederlisten — des Preuß. Landesverbandes vorliegen.

Diese Darlegung der Kassenverhältnisse entwickelt ein ganz trauriges Bild. Zwei Drittel des Solls waren bis zum Ende des ersten Geschäftsjahres ungedeckt. Die Frage: was soll werden, wenn die Unterstützung des Verbandes durch seine Mitglieder weiterhin eine so intensive bleibt, wollen wir gern unbeantwortet lassen. Aber fordern müssen wir, daß die Pflicht, den Verband zu unterstützen, wenn er kampfkräftig werden und bleiben soll, peinlichst erfüllt werden muß. Der geschäftsführende Vorstand ist nicht in der Lage, mit Nichts etwas zu schaffen, wir bitten uns die restlichen und die Beiträge des Jahres nicht solange vorenthalten zu wollen.

Die Ausgaben setzen sich in der Hauptsache aus Beträgen für Drucksachen, Porto und in geringer Höhe für notwendige Reisen zusammen. Die rechnerische Richtigkeit und Vollständigkeit wird bestätigt.

III.

Mit dem vorstehend Gesagten erschöpft sich unser Bericht, wenn an der Kürze festgehalten werden soll. Wir glauben in der Annahme nicht fehl zu gehen, daß all die angeführten Angelegenheiten Zeugnis abzulegen vermögen, daß und wie der geschäftsführende Vorstand seine ihm übertragenen Aufgaben gelöst hat, insbesondere, daß das erwiesene Vertrauen nicht mißbraucht worden ist zum Schaden der Organisation, der Liebhaber und uns selbst. So soll es künftig bleiben.

Leipzig, am 31. März 1925.

Der geschäftsführende Vorstand des Reichsverbandes.

Joh. Birk, 1. Vors. Rudolf Petters, 1. Schriftf.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

J. Beck, Tierhandlung, Stuttgart: Napoleonsweber.

Frank, Zoo., Hamburg 27, Rohrendamm 40: Beo.

Carl Hagenbecks Tierpark, Stellingen bei Hamburg: Grünflügel-Aras, Weißhauben-Kakadus, Panama-Amazonen, Neuguinea-Edelpapageien, Rotnacken-, Gelbmantel-, Schmuck-, Blaunacken-, Kapuzen-, Erz-, rote Loris, Loris v. d. blauen Bergen, Schuppen-Loris, afrikan. Halsband-, Bart-, Guyana-, Goldmasken-, Adelaide-, Nendaysittiche, Kronfinken, Purpur-Kronfinken.

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a: Schamadrosseln, prima Sänger, Rötelmerle (Oroscirtetes erythrogaster), Blaurotschwanz (Phoenicurus frontalis), weißbrüstiger blauer Waldschmätzer, Klarino, indische Bergmeise, graublauer Fliegenschnäpper, olivgrüne Astrilde (Stictospiza formosa) (Green Amaduvade), Weißkehl-, Grau- und Schwarzkappenpfäffchen, Yarellszeisige, Schnurrbärtchen, Angolaschmetterlingsfink, Laufhühnchen, Blaumenau-, Papua-, Feuerflügelsittiche.

Eduard Schütze, Eystrup (Weser), A. Z.-Mtgl. 171: 1 Paar Spitzschwanzamadinen, 1 Paar Katharinasittiche.

Herrn F. R., Sulingen. Die Brutdauer beträgt bei Schopfwachteln 21—23 Tage. Zur Aufzucht der Jungen dienen frische, wenn nicht vorhanden, gequollene, trockene Ameisenpuppen, von Sämereien, die sofort gereicht werden, geschälte Hirse, die auch leicht gequollen verabreicht werden kann, daneben auch das Futter, mit dem die Alten ernährt werden.

Herrn P. L., Hörde. Die Frage kann ich in der „Gef. Welt" nicht veröffentlichen, wohl aber an dieser Stelle beantworten: Es gibt derartiges bei den Vereinen nicht.

Herrn A. F., Hemelingen; Herrn K. Z., Öhringen (Württemberg) ist brieflich geantwortet.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

Jahrgang 54 16. Juli 1925 Heft 29

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Bevorzugen große, zahme männliche Papageien eine Pflegerin und weibliche einen Pfleger? Von Emil Kaforke, Berlin.

Neueinführungen und Seltenheiten. Von K. Neunzig. (Forts.)

Etwas über die Ernährung zarter Weichfresser. Von Karl Finck, Neukölln. (Forts.)

Züchtung von Tarantinischen Unzertrennlichen. Von W. Reitzig.

Nachtigallkanarien. Von Karl Reich.

Finkenmischlinge und anderes. Von Walter Schmelzer, Madrid. (Schluß.)

Kleine Mitteilungen - Bücher und Zeitschriften - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Anschrift: H. Höhne, Leipzig-Vo., Eisenbahnstr. 84. — Unsere Vorstandssitzung am 17. Juni hat sich in Anbetracht der Eigenart unseres engeren Vaterlandes mit seiner außerordentlichen Verbreitung der Vogelliebhaberei mit der Bildung von Bezirksverbänden (entsprechend Kreishauptmannschaften) befaßt. Es läßt sich in dieser Form eine wertvolle Fühlungnahme der Mitglieder untereinander erreichen, und außerdem dürfte die Werbetätigkeit wirksam sein, zumal die immerhin geringen verfügbaren Mittel uns jede Ersparnis zur Pflicht machen. Aus diesen beachtenswerten Gründen haben wir in Aussicht genommen, unseren Landesverband in Bezirke einzuteilen. Wir bitten unsere Mitglieder, die Angelegenheit zu prüfen und uns ihre Auffassung darüber mitzuteilen. Unsere nächste Vorstandssitzung findet am 29. Juli statt. Bis dahin erwarten wir einen Überblick zu haben, um entsprechende Beschlüsse fassen zu können. Wir machen darauf aufmerksam, daß eine Erhöhung der Beiträge nicht in Frage kommt. Gleichzeitig bitten wir um Abführung der Beiträge. Auch Teilbeiträge sind willkommen. Um eine Verzinsung der einlaufenden Gelder und damit einen gewissen finanziellen Vorteil zu erreichen, haben wir ein Giro-Konto angelegt. Dasselbe führt die Nummer 6317. Sämtliche Beiträge sind in Zukunft an dasselbe abzuführen.

Der Vorstand. J. A.: Hunger, Schriftführer.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Landesverband Sachsen und Großthüringen. Bezirk Erzgebirge, Sitz Aue i. Erz. Einladung zu der am Sonntag, den 19. Juli 1925, nachmittags 2 Uhr im Restaurant Zentralhalle in Schneeberg i. Erz., Nähe Marktplatz, stattfindenden Bezirkskonferenz. Tagesordnung: 1. Tätigkeitsbericht a) des Vositzenden, b) des Kassierers. 2. Stellungnahme zu unserem Organisattonsverhältnis. — Reichs-, Landes-, Bezirksverband. 3. Betrachtung über die getätigten Ausstellungen. 4. Aus- und Eingänge. In Anbetracht der Wichtigkeit der Tagesordnung ist es Pflicht eines jeden organisierten Vogelliebhabers diese Versammlung zu besuchen. Im besonderen, da die Frage Reichs-, Landes- und Bezirksverband eine gründliche Regelung erfahren dürfte. Ferner verweisen wir darauf, daß der Landesverbandsvorsitzende Herr Hermann Höhne-Leipzig anwesend ist.

J. A.: Albin Pollmer, Vorsitzender.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.

J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke, Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Restaurant „Zum Löwentor", Königswall 75.

J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung Freitags, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Blasewitzer Hof". Liebhaber willk. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Rietschelhof", Rietschelstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinslokal „Parkhotel", Epinaystr. 1, Versammlung. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an. Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 21. Juli. A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Der hannoversche Vogelschutzverein zu Hannover, gegründet 1881, wirkt mit sichtbarem und anerkanntem Erfolge für Vermehrung und den Schutz der Vogelwelt bei Hannover mit Aufhängen von jährlich einigen Hundert Nistkästen aller Art, durch Erweckung von Interesse und Liebe für die Vogelwelt, mit monatlich, zur Gesangszeit wöchentlich, stattfindenden Belehrungsspaziergängen und durch Vorträge in den jedem zweiten Dienstag der Monate im Landesheim stattfindenden Vereinsversammlungen. Seine Bestrebungen dienen also lediglich gemeinnützigen Zwecken. Mitgliederzahl rund 1200, jährlicher Beitrag nur 1 Mark. Meldungen an den Vorsitzenden Herrn Fritz Becker, Hannover, (Boedekerstr. 1 F). Nächster Spaziergang am Sonntag, den 19. Juli, 9½ Uhr in die Eilenriede, Treffpunkt „Kriegerdenkmal". Becker.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste willk. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Vereinsabend regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends um 8 Uhr) beim 1. Vors., Herrn Jahn, Feodorastr. 7. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. A. Voigt.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln. Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung eden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Ver=einslokal „Kaiser=Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 16. Juli. M. Roth, Schriftf., L.=Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.=Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Mon=ag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.=Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versamm=ung beim Mitglied Herrn Normast im „Kaiser Friedrich", Breslauerstr. 50. Liebhaber willkommen. J. A.: Friedrich.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zu=ammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. ieg. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Steverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. An=schriften an K. Albrecht, Mgdbg.=Wsl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Tage im „Goldenen Falken" Versammlung; nächste Freitag, den 24. Juli. Liebhaber willk. Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Versammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Liebhaber willk. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebenda. R. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.=Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste will=kommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Achtung! Am 15. d. M. erhebt die Post die Bezugsgebühr für Aug. Wir bitten den Betrag bereit zu halten, damit die Quittungen beim ersten Vorzeigen eingelöst werden und keine Unterbrechung in der Belieferung eintritt. Wo der Briefträger die Quittungen nicht vorzeigt, ist er daran zu erinnern. Bei Bestellung nach dem 25. erhebt die Post eine Extra=gebühr von 20 Pfg., die vermieden werden kann, wenn die Zeitschrift rechtzeitig bestellt wird.

Anzeigenteil

iergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

fige u. Gerätschaften

l-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50. gnetze f. kl. schädl. Vögel M. 2,30, M. 2,50 u. 2,80. Katalog gratis. nnen, Gronau 58, Westf. [927

Futtermittel

lehlwürmer
nd 5.— M, bei 6 Pfund Porto und kung frei. Händler Rabatt.

a Ameiseneier
Pfund 6.50 M.
eistwurm . . . à Pfd. 5 M
uska-Zecken . . à „ 2,50
idenraupenpuppen,
mahlen . . . à Pfd. 0,75
rnelen, gem. à Pfd. 0,40 M

Universalfutter
va I für Nachtigallen 2.— M
II für Grasmücken 1.80 M
III für Drosseln . 1.50 M
und Analysen zur Verfügung.
ter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [928
ezialvogelfutterhaus für Weichfresser
Schrich II, Waldsee (Pfalz).

Ein Versuch
igt jeden von der Güte meines rsalfutters. Preis 2 M. p. Pfd. che Futtersorten für Exoten, und Kanarienvögel zu billigsten reisen. Versand geg. Nachnahme. kung und Porto werden billigst berechnet. [929
H. Kirsten, Leipzig 3, Str. 53. Fernruf 31445.

Drosselfutter,
Marke „Lucullus." [930
eier, Muska, Zwiebackschrot), ziehen Sie vorteilhaft von illich, Langen b. Fft. a. M. 6. 932]

Mehlwürmer [931
1 Pfund 5.— Mark, Porto und Verpackung extra. 1/4 Pfund 2.— Mark, Nachnahme 0.20 Mark mehr. Postscheckkonto: 6196 Ludwigshafen a. Rhein.
Händler Vorzugspreise.
Karl Claus, Mutterstadt 2, Hauptbahnhof.

Versäumen Sie nicht das Abonnement der „Gefiederten Welt" zu erneuern!

Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig

Soeben erscheint
In siebenter, neubearbeiteter Auflage:

MEYERS LEXIKON

12 Halblederbände
Über 160000 Artikel auf 20000 Spalten Text, rund 5000 Abbildungen und Karten im Text, fast 800 z. T. farbige Bildertafeln und Karten, über 200 Textbeilagen
Die Bände I und II kosten je 30 Mark

Sie beziehen das Werk
durch jede gute Buchhandlung
und erhalten dort auch kostenfrei
ausführliche Ankündigungen

Frische Ameisenpuppen
à Liter 2.30 Mark, franko.

Getrock. Ameisenpuppen
à Liter 1,60 Mark, I. Qualität.

Mehlwürmer
gegen Einsendung von Mk. 1.50 1/4 Pfund franko. [932a
Th. Witte, Niederndodeleben bei Magdeburg.

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. D. Waschinski & Co., Biesenthal I (Mark). [933

Mehlwürmer I a Pfd. 4.— M (6 Pfd. 24 M fr.)
1/2 Pfd. 2.50 M frk. Voreinsend.
Jeitner, Breslau, Weinstr. 12. [934

Vogelfutter [935
für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund lang=jähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogel=futter umsonst.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Ameiseneier,
frisch, Liter 2,00 Mk.,
trockene (diesjähr.) Kilo 10.00 Mk.
verkauft Tierausstopferei und Gerberei
G. Brachmann, Kiel,
Wörthstr. 1. [936

Frische Ameisenpuppen
à Liter 2,20 Mark franko gegen Voreinsendung des Betrages.
Josef Ehrlich, Würzburg, Weißenburgstraße. [937

Sämtliche Vogelsaaten

in [938

hervorragender Beschaffenheit

liefert zu vorteilhaften Preisen in großen und kleinen Posten

Hugo Schütze, Eystrup (Weser)

Fernruf: Eystrup Nr. 1 u. 23, Postscheck-Konto 5715 Hannover.

Preisliste verlangen.

Vögel

Molukkenkakadu

Stück 220.—

Kleine Gelbhaubenkakadus	Stck.	45.—
Rosa-Kakadus	„	35.—
Graupapageien	Stck.	90—120.—
Blaustirnamazonen, sehr schön, fingerzahm und sprechend	Stck.	65.—
dito sehr schön und noch nicht sprechend	„	55.—
dito jüngere	„	45.—
Gelbstirnamazonen, sehr schön	„	50.—
Doppelgelbköpfe, fingerzahm	„	65.—
Tovi-Sittiche	Paar	25.—
Feuerflügelsittiche	„	45.—
Tarant. Bergpapageien, Zuchtpaare		18.—
Grüne u. gelbe Wellensittiche, erstklassige Zuchtpaare		15.—
Junge Wellensittiche		11.—
Schamadrossel, Ia Sänger	Stck.	65.—
Weibchen	„	50.
Königsglanzstare	„	90.—
Langschwänzige Glanzstare	„	10.—
Rotgehäubte Kardinäle	„	8.—
Safranfinken, Männchen	„	6.—
Zebratauben	Paar	6.—
Reisfinken	„	5.—
Kanarienroller	Stck.	10—15.—
dito Brut 1925	Stck.	7.—
Elster ganz zahm	„	8.—
Saatkrähe, zahm	„	8.—
Javaaffen, klein u. zahm	„	60.—
Kapuziner, „ „ „	„	90.—
1 dressierter Rhesusaffe		75.—
Schwarze Makaken	Stck.	60.—

offeriert freibleibend [939

Tierhandlung

Max Kleinert, Berlin NO 18,

Strausberger Straße 13.
Fernruf Alexander 3313.
Bei Anfragen Rückporto.

Goulds, rot- u. schwarzk., Spitzschwanzamadinen u. Maskengrasfinken, desgl. seltenere Astrilde einzeln oder in Paaren zu kaufen gesucht. [940

E. Thieß, Zwenkau.

Himmelblaue Wellensittiche,

diesjährige Jungtiere, vollständig fluggewandt, mit weißen Köpfen, keine Nachtitiker, lebende Ankunft garantiert, per Stück 65.— Mark. [941

Norbert Grasl, Wien XXI/5, Öst. Telegr.-Zeugverwltg. A.Z.-Mtgl. 41.

Rosa-Kakadus,

schöne, junge Vögel Stck. 40 Mk., extra ausgesuchte, zahme 50 Mk.

Kleine Gelbhauben-Kakadus,
40 Mk., bei 5 Stck. 35 Mk., ganz fingerzahme 55 Mk.

Blaustirn-Amazonen,
fingerzahm, sprechend 50—60 Mk. Gelbkopf-Amazonen, fast zahm, schöne Vögel 40—60 Mk. Rhesus-Affen Stck. 50 Mk.

Rotstirnige Zwergpapageien,
sogen. Tarantinische Berg-Papageien, Paar 18 Mk., 5 Paar 75 Mk.

Bombay-Tigerfinken, [942
halbrot, Paar 8 Mk., 10 Paar 66 Mk. Grüne Tigerfinken Paar 14 Mk. Nachnahme. Lebende Ankunft garantiert. Preislisten umsonst.

Gustav Müller, Vogel-Großhandlung,
Hamburg 31, Langenfelderdamm 27. Fernspr. Vulkan 7141.

Bei Anfragen und Bestellungen bitten wir, sich auf die „Gef. Welt" zu berufen

Doppel-Gelbkopf-Amazone

prächtig im Gefieder, großer Vogel, fingerzahm, spricht, lacht, sehr gelehrig, fehlerfrei, verk. mit **neuem** Käfig für nur 110 M., ohne Käfig 90 M., per Nachnahme. [943

W. Müller, Obstplantage, **Friedersdorf,** Kreis Beeskow.

Gebe ab:

1,1 kl. Kubafink, vorjährig		18.—
1,1 Zebrafink, diesjährig		15.—
1,1 Silberschnabel, diesjährig		3.50
1,0 Orangebäckchen		2.—

Walter Voigt, Jena,
Feodorastraße 13. [944
Rückporto erbeten!

Umzugshalber verkaufe

Klarino, Kaprötel, Orangekehlfliegenfänger je 60 M.
Etwa 15 Schindlerkäfige, Näheres auf Anfrage. [945

Kracht, Duisburg, Bechemstr. 10.

Vertausche

einen jungen Eichelhäher gegen ein Paar Kaptäubchen oder and. Täubchen, gebe noch ab einen Bluthänfling, einwandfrei zum Fang., Garantie, und 1,0 jap. Möwchen gegen 0,1 jap. Möwchen und 0,1 Silberschnäbelchen. Vögel sind Ia im Gefieder. Nur Reell kommt in Frage.

Reinhard Störr, Zschopau,
Anlagen 14. [946

Tarantinische rotstirnige Zwergpapageien, P. 16 M., Ia Wellensittiche, grüne und gelbe, ausgefärbte Zuchtp., 14 M., Amaranten, Astrilde, Atlasfinken, Bandfinken, Feuerweber P. 3 M., Orangebäckchen, Elsterchen, Silberschnabel P. 4 M., jg. Blaustirn-Amazonen, schöne Vögel, à 40 M., Kaptäubchen à 4 M., gar. leb Ank. [947

J. Horn, Bremen, Fedelhören 101.

Himmelblaue Wellensittiche

1,0, 1 Jahr alt, tadellos im Gef., 75 M., in Kürze Junge und **blaubl.** Junge (Geschw. reinblau). [948

A. Mertes, Mainz, Wallaustr. 62.

Versäumen Sie nicht das Abonnement der „Gefiederten Welt" zu erneuern!

Bestellungen für August sofort der Post übergeben!
Bestellzettel für Deutschland.

Postbestellzettel.

Hiermit bestelle ich für den Monat August 1925
1 „Die Gefiederte Welt"
(eventuell mit Nachlieferung). — **Erscheinungsort Burg Bz. Mgdb.**

Name: .....

Wohnung: .....

Postquittung: .....Mk. .....Pf. sind heute bezahlt worden.

Ort: ..... den .....

Postannahme

.....

Zebrafinken

sehr nistlustig, auch einzelne Männ... billig abzugeben oder gegen Sitt... tauschen.

Frau Klara Neugebaue... Deutsch-Lissa.

J. fingerzahme Wellensittich

frei Haus 15 Mk., tausche gegen S... Wellensittich-Nistkasten seit 20 Jah... eig. Züchterei u. von vielen Lieb... als Beste erprobt, Stück 2 Mk.

Wellensittich-Züchterei, Deutsch-Lissa.

Tausche Kuckuck und Kiel...

auf Exoten gleich welcher Art... Ruß, Fremdländ. Stubenv...
Laßner, Liegnitz, Volkshaus Glogauer Straße 20.

Verkaufe

einen hübschen Zwergaffen, allerl... Tierchen, für nur 45 M., 1 Rhesu... 60 M., 1 sprechend. Amazonen-P... 50 M. Tiere sind gesund u. fehl...

Kaufe Sittiche aller Art. Tier-Export, Hamburg ... Kampstraße 16, H 6.

Vertausch...

liederpfeifenden Dompfaff, gegen Schamadrossel.

L. Bollmann, Mühlhausen i. ... Karlstr. 80.

Seltenheit!

Silberschn. × Zebraf. 8 M., wund... Waldohreule, spielt wie ein Affe ... 10 M.) im Tausch gegen Kampfl... Rotschenkel u. ähnl. Sumpf- u. S... vögel, junger Sperber 5 M., an B... gebe noch ab oder tausche gegen ... Brehm: Leben d. Vögel, Glogau ... 27 Taf., geb. 12 M. (gesucht!), B... Gefangene Vögel, I. Teil, 1872, ... (fleckig), 10 M., Brehm, Tierleben, ... Band II, 1893, m. vielen Farbe... (Papageien usw.), Halbleder 10... Brehm, Tierleben, Säugetiere Bd ... 1914, wie oben, 10 M., Schuster: ... schätzung der Vögel (1906) m. 6 Ta... brosch. 1.20, Ad. u. Karl Müller ... fangenleben der besten einheim. ... vögel, geb., 1871, 1.50 M., G... Systematik der Vögel, Halbleder, ... 10 M., Aquila (Zeitschrift), 1904, ... gang 11, 10 M., brosch., Ruß ... Prachtfinken, 2. Aufl., 1898, brosch. ... Ruß: Lehrbuch der Stubenvogel... geb., 1888, 25 M., Reichenow ... Vögel, 2 Bde., 1913/14, Orig.-... 30 M., Erlanger: Beiträge zur ... fauna N.-O.-Afrikas, 1. u. 2. Bd., ... 27 Taf. u. Kart., 15 M.

Ich suche zu kaufen einzeln o... Paaren: Goulds (rotk. und schw... Binsen-, Granat-, Bunt-, Ringel-, ... Aurora-Astrilde, Diamantfinken, P... Kronfinken, Kapuzenzeisige, P... amadinen, ausländ. Stare sowie ... seltene Vögel.

Hermann Bauer, Münch... Westendstraße 139.

Chinchilla

Alte und Junge, kauft zu ... Preisen, wenn reinrassig,
Paul Ahrens, Lübeck, Königst...

Fuchs

lebend, halbjährig, schön im Fell, ... 28 Mark, verkauft

Willy Schwer, Brieg Bz. B... Piastenstr. 3.

Inserate

für das am 23. Juli 1925 ... Ausgabe gelangende Heft 3 ...
Gef. Welt erbitten bis 18. ...

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 14
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 23. Juli 1925 | Heft 30

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Zur Pflege der Körnerfresser.

Von Adolf Voigt, Jena.

(Nachdruck verboten.)

„Wie keimen Sie Hirse und ähnliche Sämereien" — so lauten Anfragen, die immer wieder an mich gerichtet werden. Und ich freue mich darüber, daß meine erste Arbeit über die Verpflegung körnerfressender Exoten Aufmerksamkeit fand, wie mir auch der Artikel des Herrn Dr. Wagner und die Zuschriften von Herrn Adlersparre bestätigen. Ich habe die Stubenvogelpflege immer ernst genommen und mir immer gesagt: Wenn du dir das Recht nimmst, einen Vogel zu käfigen, so hast du auch ihm gegenüber Pflichten! Und so gebietet vor allem die sittliche Pflicht, nicht schematisch einfach Freß- und Saufnapf zu füllen, sondern einmal darüber nachzudenken, gibst du dem Vogel auch das, was du ihm durch die Entziehung der Freiheit nimmst? Von der Käfigfrage bis zur Fütterungsfrage sollte es nie einen Stillstand geben (und es gibt ja auch keinen, wie die immer wiederkehrenden Artikel darüber beweisen). Schwer ist es, gegen alte Vorurteile anzukommen, in der Käfigfrage sowohl als auch in der Futterfrage. Man mache nur einmal einem Thüringer Wäldler klar, daß sich sein Zeisig oder Kreuzschnabel in einem größeren Käfig wohler fühlen muß — stundenlang kann man da predigen —, aber der Vogel bleibt trotzdem in seinem kleinen Käfig, der kaum dreimal so groß ist als der Vogel selbst. Will man ihm nun erst erzählen, daß Hanf als alleinige Nahrung vom Übel sei, so findet man nur ein ungläubiges Lächeln. Es hat mich aufrichtig gefreut, daß der Reichsverband in der Käfigfrage vorging. Ich glaube, es ist dem Vorsitzenden, unserem allverehrten Herrn Birk, nicht leicht gewesen, sich mit dieser Idee zum Beispiel im Erzgebirge durchzusetzen. Ich wünschte nur, es wäre möglich, auch die Vogler des Thüringer Waldes so intensiv zu „bearbeiten", wie dies im Erzgebirge geschieht. Aber leider findet sich dort niemand, der sich der Käfigfrage annimmt und da kommen dann übereifrige Vogelschützler und schütten das Kind mit dem Bade aus, indem sie jegliches Vogelhalten verboten wissen wollen, statt nur die Auswüchse zu beseitigen und gerade die Vogelliebhaber zu rechten Vogelschützern heranzuziehen. Mir persönlich sind selbst die vom Reichsverband angegebenen Käfigmaße noch zu gering. Mein Schwarzplättchen befindet sich in einem selbstgefertigten 76 cm langen Käfig, der mir eigentlich auch noch zu klein vorkommt! Welch ungleich schöneres Bild bieten da die Zimmervolieren und die Vogelstube! Da ist der Vogel jeder Art am besten untergebracht, wenn man sich für den Sommer keine Gartenvoliere leisten kann. Selbstverständlich ist es nötig, auch auf die Verträglichkeit der Vögel untereinander zu achten. Hält man aber seine Lieblinge in kleinen Käfigen, so sollte man doch dafür sorgen, daß sie täglich im Zimmer eine Zeitlang herumfliegen können. Mein sprechender Wellensittich hat auch nur ein kleines Gelaß von 40 cm Länge, aber er ist alle Tage mindestens 4—5 Stunden draußen im Zimmer, hier turnt und fliegt er nach Belieben umher.

Genau so steht es mit der Fütterung. Seit Jahrzehnten immer dasselbe: Fertige Futtergemische, von denen oft die Vögel nur das fressen, was ihnen besonders mundet, dazu Wasser aus der Wasserleitung, hier in Jena durch Chlor keimfrei gemacht. Einfach und bequem, aber gedanken- und gewissenlos! Vor allem: Man halte nie mehr Vögel, besonders in Einzelkäfigen, als man bequem in der arbeitsfreien Zeit verpflegen kann. Leider wird hiergegen oft gesündigt. Selbstverständlich ist es viel weniger zeitraubend, 100 Vögel in einer Vogelstube zu verpflegen, als ein Dutzend in Einzelkäfigen, und dann spielt die Geldfrage eine große Rolle. Ich kenne Vogelpfleger, die sich sonst nichts gönnen, für ihre Vögel aber alles übrig haben, und das sind die Schlechtesten nicht. Das größte Opfer aber, das die Vögel von uns fordern, ist das Opfer an Zeit! Wer dies nicht bringen kann oder will, der ist ein schlechter Vogelliebhaber und lasse die Hände von der Vogelhaltung im größeren Maße.

Was braucht der Vogelkörper zur Ernährung? „Eiweiß, Fett, Kohlehydrate", damit war man früher fertig, und Tabellen, die den Gehalt der einzelnen Bestandteile der Futtermittel anzeigten, fanden sich in allen Fachzeitungen. Die Wissenschaft ist auch hier nicht stehen geblieben, wie die Aufsätze von Herrn Adlersparre uns kund tun. Von überall dringen die Forschungsergebnisse zu uns Laien und fordern Beachtung auch durch die Vogelpfleger. Dem freilebenden Vogel steht ja alles zur Verfügung, was er

zum Leben gebraucht. Wie steht es aber mit den gefangenen? Getrocknete Körner, getrocknete Beeren, getrocknete Insekten, vergiftetes oder keimfreies Wasser, das ist oft der Lebensunterhalt der gekäfigten Vögel. Handelt es sich um alt eingefangene, so mag dies noch hingehen, zur Zucht und vor allem zur Erzielung lebensfähigen, wüchsigen Nachwuchses reicht dies nicht aus. Man gab, unbewußt warum, den Insektenfressern im Sommer frische Ameisenpuppen, frische Beeren, im Winter Möhrensaft und Mehlwürmer. Und man gab den Körnerfressern Salat, ein wenig gekochte Kartoffeln und Eigelb an die Stäbe des Käfigs gesteckt, und man tat wohl damit.

1910 brachte ich meine Vögel, die bisher in Flugkäfigen im Zimmer gehalten worden waren, in Gartenvolieren. Es wurden sehr viel Unkräuter und halbreife Sämereien gefüttert und alle Körnerfresser zogen diese halbreifen Sämereien den trockenen Körnern vor. Die durch die Vögel verstreuten Körner keimten am Volierenboden, Mohn, Glanz, Hirse und Hafer wurden so in allen Keimungsstadien gern vom Boden aufgenommen, obgleich doch trockene Körner reichlich vorhanden waren, und prächtig gediehen die Vögel dabei, auch die Nachkommen der Nistenden. Diese Erfahrungstatsache wurde durch exakte Forschung bestätigt. Mit aufrichtiger Freude las ich dann davon an dieser Stelle und bin den Herren Wissenschaftlern dankbar für ihre wertvollen Arbeiten. Praxis und Forschung sollen sich ergänzen, darin gebe ich Herrn Dr. Wagner recht.

Seit zwei Jahren unterhalte ich mit meinem Sohne eine Vogelstube, die in der Hauptsache mit Prachtfinken zu Zuchtzwecken besetzt ist. Auch hier reichen wir sehr viel Salat, Spinat, halbreife Samen von Gräsern neben Regenwasser — nie Leitungswasser —, auch in automatischen Trinkgefäßen einen dünnen Tee aus Pfefferminze und Kamille. Dem Wasser wird ab und zu frischer Zitronensaft zugesetzt, dem Eifutter (Eigelb und Weiß fein gehackt), welches stets gereicht wird, einige Tropfen Dorschlebertran. Herr Adlersparre hatte die Liebenswürdigkeit, mir eine Probe seines Erbsmehlbrotes zu schicken. Es wurde gerieben zwischen das Eifutter gehackt und von allen Vögeln gefressen. Es hat den ganz besonderen Vorzug, auch bei starker Hitze im Sommer nicht zu säuern. Mein Bruder ist Mühlenbesitzer und hat nach meinen Angaben einen Erbsmehlschrot hergestellt, das ich verbacken will, um namentlich für den Winter für die Vögel ein äußerst wertvolles und billiges Futter mehr zu haben.

Aber die gekeimten Körner aus der Gartenvoliere fehlten. Wie soll das Keimen im Zimmer im größeren Maßstabe und am bequemsten geschehen? Dies war die Frage, die mein Sohn durch praktische Versuche löste. Das Keimen im nassen Sande wurde verworfen, die Körner keimten darin ungleichmäßig, auch war das Verfüttern derselben unzweckmäßig. Das Keimen zwischen Tüchern erwies sich auch als zu unpraktisch, da die Kontrolle darüber, wie die Keimung vorgeschritten, nicht so leicht durchzuführen war. Jetzt benutzen wir gut glasierte Blumenuntersetzer, füllen sie $^3/_4$ mit Körnern: allen Hirsearten, Glanz, Mohn, jedoch jede Art in einem besonderen Untersetzer. Sind die Körner sehr staubig, was auch bei doppelt gereinigten leider vorkommt, werden sie in einer Schüssel mit Wasser gewaschen. Nun kommt Wasser darauf, und zwar so viel, daß ein gut feuchter Brei entsteht, und eine gut schließende Glasplatte wird aufgedeckt. Nach etwa acht Stunden wird umgerührt, überschüssiges Wasser abgegossen und etwa fehlendes nachgefüllt, es muß also immer genügend Feuchtigkeit zum Keimen vorhanden sein, allzufeucht ist jedoch bei der Verfütterung unzweckmäßig. Die Untersetzer, mit der Glasplatte bedeckt, werden an einen warmen Ort gebracht. Wir benutzen im Sommer hierzu die Grude und im Winter den Kachelofen, und zwar stellen wir dann die Untersetzer auf die Kacheln zwischen Wand und Ofen, zu hohe Hitzegrade sind jedoch zu vermeiden. Je nach dem Alter, dem Reifezustand und der Wärme keimt die Hirse beispielsweise in 18—24 Stunden so weit, daß eben die Keime durchbrechen (1 mm lang), dann werden die Näpfe kühl gestellt und die Körner verfüttert. Wir werfen sie naß in den Sand oder reichen sie naß in Blumenuntersetzern (d. h. ohne sie vorher abzutrocknen). Haben sich die Vögel erst daran gewöhnt, so wird sie von allen gern gefressen, trocknet sie im Sande nach einigen Stunden ab, wird sie weniger gern genommen. Sind die Keime einmal zu lang geworden, so fressen die Vögel meist nur die Keimlinge, nicht die Körner selbst. Wir kontrollieren mit der Nase, malziger Geruch muß vorhanden sein. Diese gekeimten Körner fressen die Alten und die Jungen, eben selbständig werdenden Vögel neben trockenen und halbreifen Sämereien jahraus jahrein. Beim Einkauf von Hafer, Hirse, Glanz und Mohn achten wir stets auf die Keimfähigkeit. Wir entnehmen erst kleinere Mengen, keimen sie und achten darauf, daß die Sämereien möglichst schnell keimen, ohne zu schimmeln. Ein geringer Zusatz von Salzsäure, wie ihn Herr Dr. Wagner empfahl, kann dem Wasser zugesetzt werden. Haben sich trotz aller Vorsicht einige Schimmelpilze gebildet, so werden sie sorgfältig entfernt. Gefäße müssen sofort nach Gebrauch sauber gewaschen werden, um Sauerwerden zu verhüten.

Da die Keimdauer recht verschieden ist, ist es zweckmäßig für den Laien, sie mit dem Auge festzustellen, d. h. zu warten, bis die Keime eben durchbrechen. Übrigens fressen auch meine Haushühner angekeimte Körner (Hafer, Gerste und Weizen) und ich bin mit dem Eierertrage außerordentlich zufrieden.

Recht unsicher sind die Angaben, die man über Nährsalzgehalte der Futterstoffe findet. Ich vermute fast, der von Dr. Otto angegebene und von Herrn Dr. Wagner jüngst kritisierte Nährsalzgehalt der Vogelmiere bezieht sich auf die Samenkapseln dieser Pflanze. Jedenfalls werden gerade die Samen der Vogelmiere von allen Körnerfressern den Blättern dieser Pflanze vorgezogen.

Der Sommer bietet so vieles für unsere Pflegebefohlenen, was ohne besondere Mühe zu beschaffen ist, man nutze nur seine Spaziergänge gehörig aus! Nur der Winter ist die kritische Zeit! Da heißt es, beizeiten Vorsorge treffen, zumal der Winter für die Prachtfinken oft die Zeit der Brutperiode ist.

Im August d. J. werden von uns etwa 15 Töpfe mit Tradeskantia, ebensoviel mit Vogelmiere und

etwa 25 mit Gras (Poa annua) bepflanzt, ein Mistbeet wird mit Pflücksalat besät, Spinat und Wintersalat kommt auf die Gartenbeete. Er kann durch vorsichtiges Decken mit Reisig im Winter so geschützt werden, daß wir bei nicht allzu großem Schnee dazu gelangen können.

So hoffen wir unsern Pfleglingen alles zu bieten, was zu ihrem Wohlbefinden beiträgt, und wir sind sicher, sie lohnen es uns.

Der Steinrötel und die Blaudrossel.

Von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung und Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Am besten bietet man neben einem aus geriebener Möhre, ebensolcher Semmel, aus etwas gemahlenem Hanf, Käfer- oder Garnelenschrot, getrockneten Ameisenpuppen und Quark bestehenden Futter, noch Obst und Beeren, jedoch vermeide man die fettbildenden Arten wie Birnen, Bananen, Feigen, Rosinen und Korinthen; am besten sind geriebene Äpfel, auch gebratene, und schwarze und rote Holunderbeeren. Ist wider Erwarten der Vogel doch etwas zu fett geworden, so streue man ihm täglich ein Teil getrockneter Ameisenpuppen aufs Trinkwasser und lasse gemahlenen Hanf und Quark einstweilen ganz beiseite. Sonst kann man sowohl den Steinrötel als auch die Blaudrossel in der Hauptsache wie andere Drosseln behandeln, was besagt, daß beide Arten nicht schwierig zu halten sind, im Gegenteil als harte Stubenvögel gelten, wenn man die wenigen in Erscheinung tretenden Arteigentümlichkeiten berücksichtigt.

Der Käfig für beide Drosseln sei nicht unter 60 cm, am besten 70—75 cm, denn ein praktischer Drosselkäfig muß mindestens eine solche Länge haben, wenn man die Größe und Beweglichkeit dieser Vogelarten in Betracht zieht. Als Bodenbelag nehme man niemals Sand, da sich der Steinrötel öfters auch auf dem Boden aufhält und seine empfindlichen Füße vor Schmutz und Sand möglichst bewahrt werden müssen, am vorteilhaftesten ist auch, wie bei unseren übrigen Weichfressern als Käfigbelag täglich erneuertes Papier, davon am billigsten Zeitungspapier. Wie bei allen Arten unserer heimischen Weichfresser halte ich einen Kistenkäfig, selbstverständlich mit weicher Decke, auch hierfür am praktischsten.

Der Steinrötel mausert zweimal im Jahre, im Juli bis August und im Februar bis März das Kleingefieder, nach letzterer prangt er im Sommer-, dem sogenannten Hochzeitskleid. Die Mauser geht, wenn die nötigen Vorbedingungen, wie normale Körperbeschaffenheit und gleichmäßige Zimmertemperatur vorhanden sind, ohne Schwierigkeit vonstatten. Außer im ersten Jahre der Käfigung als stürmische Wildfänge halten sich Steinrötel sonst meistens gut im Gefieder und präsentieren sich immer als schmucke im Gefieder glatte Vögel. Die Größenunterschiede sind oft sehr auffallend, was wir ja auch bei anderen Vögeln kennen, doch hat dies auf den Gesangswert keinerlei Einfluß. Meiner Ansicht nach kann das eine Eigentümlichkeit der verschiedenen Örtlichkeitsrassen sein, ein Urteil darüber fehlt mir, ebenso wie mir überhaupt die Kenntnis des Freilebens von Stein- und Blaudrossel aus eigener Anschauung und Beobachtung fehlt. Trotzdem der Steinrötel als Frischfang ein stürmischer Gast ist und im ersten Jahre seines Käfiglebens meistens nicht in natürlicher Gefiederform prangt, so muß gesagt werden, daß er doch mit der Zeit ein ruhiger, zahmer Vogel wird, der seinen Pfleger genau kennt. Wenn ich manchen Vogelliebhaber sagen höre: Dieser oder jener Vogel ist ganz zahm, er nimmt sogar die Würmer aus der Hand, so muß ich immer wieder

Gelbschopfspecht.

sagen, daß ich unter einem zahmen Vogel doch etwas anderes verstehe als einen nach Futter bettelnden Vogel. Denn nicht der Pfleger ist das begehrte Objekt der Zutraulichkeit, sondern der aus seinen mit bestimmter Sicherheit kommende Mehlwurm läßt die falsche Meinung von der Zahmheit gegenüber dem Pfleger aufkommen. Geduld und ein stets ruhiges Benehmen den Vögeln gegenüber bringen mit der Zeit den stürmischsten Burschen zu der Erkenntnis, daß ihm vonseiten seines Pflegers keine Gefahr droht. Bei mir erhält kein Vogel den Mehlwurm aus der Hand, erstens aus vorstehend angeführtem Grunde, zweitens um ja nicht weich zu werden und dem so flehentlich

bettelnden Nimmersatt, gerührt von dessen ausdauernder Hartnäckigkeit einen Mehlwurm nach dem anderen zu spenden, mehr meistens als ihm dienlich ist. Ferner will ich meine Vögel in einem unbeeinflußten Benehmen sehen, mich an ihren Bewegungen, ihrer stolzen Haltung, ihrem Gesang erfreuen, denn stets wird ein solcher Vogel, der in seinem Pfleger nur einen Leckerbissenspender sieht, bei dessen Anblick alles andere vergessen, auch den Gesang, nur nicht sein mit Erfüllung seines Wunsches endendes Bitten und Betteln. Darum fort mit der eines ernsten Vogelpflegers unwürdigen, sentimentalen Spielerei im Verkehr von Vogel und Pfleger. Auch der Steinrötel ist in dieser Hinsicht sehr empfänglich, ebenso wie viele unserer gefiederten Stubengenossen hierin gar zu leicht zu verwöhnen sind und wirklich aufdringliche Bettler werden.

Der Gesang des Steinrötel ist eine harmonische Mischung melodischer, flötender Töne, angenehm bereichert durch Imitationen von Strophen aus anderen Vogelgesängen, kurz es ist ein Gesang, der im Zimmer niemals lästig fällt im Vergleich zum Gesang anderer Drosseln. Alte Wildfänge leisten wohl in der Meisterschaft ihres Naturgesanges vollkommenes, weniger sind diesen noch die Nachahmungen von Teilen anderer Vogelgesänge in dem Maße eigen, wie jungen, im ersten Lebensjahr in Gefangenschaft geratenen Steinröteln. Denn letztere lernen im Chor anderer gefiederter Stubengenossen immer wieder Neues hinzu. Auch jung aufgepäppelte Steinrötel sind für Nachahmungen ebenso, ja vielleicht noch empfänglicher, doch bleiben sie betreffs Naturgesang Stümper und haben sie obendrein nicht einmal zur Erfassung von Imitationen andere Sänger als Lehrmeister, so ist ihr Gesangswert gleich Null. Die besten und daher begehrtesten Käfigvögel sind meiner Auffassung nach junge, im Herbst erlangte Wildfänge, denn erstens sind sie lange nicht so stürmisch und im Gesang zurückhaltend wie alte Wildfänge und zweitens verbinden sie den in der Freiheit erlernten und von dort mitgebrachten Naturgesang leichter mit Imitationen als alte Wildfänge, da ja junge Vögel dem Nachahmungstalent immer mehr freien Lauf lassen, beim Steinrötel zum Vorteil, bei manchen Vogelarten aber auch zum Nachteil ihres Gesanges. Ferner bilden sich junge Vögel viel leichter zu fleißigen Lichtsängern, kurz gesagt, sie werden im wahrsten Sinne des Wortes die für den Käfig geeignetsten Vögel. Aus diesem Grunde ist mir bei jeder Vogelart ein jüngerer Vogel als Stubenvogel viel lieber als ein so hartgesottener, schier unverbesserlicher, stürmischer Bursche, der schon seine Zahl Jahre aus der Freiheit mitbringt. Natürlich geht dies bei Vogelarten, denen nur ein Originalgesang eigen ist, meistens auf Kosten der Gesangsgüte, womit aber nicht gesagt sein soll, daß das immer der Fall ist, denn die Art und das Maß guter oder schlechter Eigenschaften, sowohl im Gesang, sowie im übrigen Benehmen, ist auch vielfach die Wiederspiegelung der individuellen Veranlagung. Damit soll gesagt sein, daß auch alte Wildfänge schlechte, ebenso wie jüngere Vögel, gute Sänger in ihren Reihen haben, eine individuelle Veranlagung durch Vererbung oder Förderung eines ausgeprägten Talentes durch gute Vorsänger.

Die Blaudrossel (Monticola cyanus *(L.)*) auch Blaumerle, einsamer Spatz, Blauamsel genannt, kommt in Deutschland noch seltener vor als die Steindrossel. Sie bewohnt ganz Südeuropa, einen Teil von Asien und dringt als Zugvogel nach Nordafrika vor, in den wärmeren Mittelmeerländern halten manche das ganze Jahr stand, die weiter südwärts gezogenen kehren im April an ihre Brutplätze zurück. Als Irrgast dürfte sie wohl im südlichen Deutschland ab und zu vorkommen, als Brutvogel scheint dies nach der Literatur ausgeschlossen. Ihr Aufenthaltsort gleicht dem des Steinrötels, denn auch sie ist in der Hauptsache ein ausgesprochener Felsenbewohner, doch geht sie auch tiefer in die Täler als der Steinrötel und nimmt auch mit Ruinen, Türmen, Mauern usw. als Aufenthalts- und Nistort vorlieb. Auch sie unternimmt, ebenso wie der Steinrötel, ganz gegen die Art der Drosseln, einen von Gesang begleiteten Balzflug. Ihr weniger kunstfertiges Nest bringt sie in Felsen- und Mauerspalten, Löchern usw. an und belegt es im Mai mit vier bis sechs schwach glänzenden, einfarbig hellgrün gefärbten, mit wenigen violett- und rötlichgrauen Flecken bedeckten Eiern. Ihre Natur, überhaupt ihre einsame Lebensweise deckt sich in vielem mit dem des Steinrötels, nur im Gefieder macht sie eine auffallende Ausnahme. Wie ja schon ihr Name sagt, herrscht die blaue Farbe vor, das Männchen ist in der Hauptsache schön schieferblau, Flügel und Schwanz schwarz mit blaugesäumten Federn. Manche Männchen, ich nehme an ältere, sind wie mit einem reinen Himmelblau überflogen, die Weibchen hingegen sind leicht zu unterscheiden, denn sie sind mehr bräunlichgrau mit dunkelbrauner Fleckenzeichnung, ähnlich einem Amselweibchen, Junge im Nestgefieder sind gescheckt durch gelblich braunweißliche Schaftflecke, im ganzen auch lichter gefärbt als die Weibchen.

Im Frei- sowie im Käfigleben ähnelt die Blaudrossel in sehr vielem dem Steinrötel. Als Käfigvogel ziehe ich den Steinrötel vor. Es mag meinerseits ein Vorurteil sein, weil ich noch keine Gelegenheit hatte, mir ein abschließendes Urteil über den Wert des Gesanges der Blaudrossel zu bilden, denn ich habe nur einige Exemplare im Käfig singen hören und die untrüglichen Beobachtungsstudien in der Freiheit fehlen mir. Sicher waren die von mir gehörten Blaudrosseln, jung dem Nest entnommene, aufgepäppelte Vögel, denn ihr Gesang war wirklich minderwertig, damit soll aber nicht gesagt sein, daß sich derartige minderwertige Sänger, die keinen Naturgesang mitbringen, nicht in einem vielseitigen Vogelbestande gute Sänger werden, denn auch der Blaudrossel ist ein Imitationstalent eigen wie dem Steinrötel. Den von mir gehörten Vögeln fehlte die Abwechslung, sie waren tourenarm und wiederholten ihre Strophen öfters, auch fehlten die weichen, melodischen Töne. Besonders rauhe Töne traten auffallend hervor. Dieses mein Urteil soll aber kein allgemeines, der ganzen Art zur Last liegendes sein, im Gegenteil habe ich von Liebhabern, die Blaudrosseln, alte sowie auch junge, längere Jahre gekäfigt haben, ein sehr günstigs Urteil über den Wert ihres Gesanges erhalten und diesem Urteil möchte ich voll und ganz beipflichten, denn auch die Literatur läßt sich

ganz zufriedenstellend über den Gesang der Blaudrossel aus. Um sich in irgendwelchen Dingen, sei es im Frei- oder Käfigleben eines Vogels ein unanfechtbares Urteil erlauben zu können, genügt es nicht, einzelne Individuums gekäfigt oder in der Freiheit beobachtet zu haben, dazu gehört ein intensives Studium und Beobachten, jahrelange Käfigung möglichst vieler Exemplare aller Altersstufen. Ein Krebsschaden der Vogelliebhaberei ist es, daß viele Vogelpfleger nach Haltung von einigen Exemplaren mit einem abschließenden Urteil über Gesang und sonstige Eigenschaften zu schnell bei der Hand sind, dazu gehört etwas mehr als die Bekanntschaft mit einigen Vertretern ihrer Art. Meiner Ansicht nach legt der größte Teil der Vogelliebhaber das Schwergewicht in der Beurteilung einer Vogelart in der Eignung als Käfigvogel viel zu sehr auf den Gesang und übersieht das Liebliche und Angenehme im Benehmen, überhaupt die vorteilhafte Äußerung anderer, zugunsten der Art und des Individuums sprechender, sonstiger Lebensreflexe. Auch der Blaudrossel muß ich, nicht gestützt auf meine Beobachtungen, sondern auf die anderer Liebhaber und auf das günstige Urteil der Fachliteratur, als Käfigvogel eine Lanze brechen. Bedauerlich ist es nur, ebenso wie beim Steinrötel, daß die Seltenheit des Angebots und der enorme Anschaffungspreis zum Leidwesen des wissensbegierigen Vogelpflegers sich die Wage halten. Was die Fütterung anbetrifft, so deckt sich dieselbe mit der des Steinrötels vollkommen, ebenso auch die Empfindlichkeit und Neigung der Füße zu Krankheiten hat sie mit ihm gemein. Ferner verträgt sie auch in der gesangslosen Zeit keine reichliche Mehlwurmgabe, ja am liebsten vermeide man während derselben eine solche ganz, auch sonstige reizbare Futtermittel führen neben Fußkrankheiten zu Krämpfen oder Schlaganfall. Ebenso ist auch ihr, wie dem Steinrötel, ein mäßig marmer, gleichmäßig temperierter Aufenthaltsort viel dienlicher als eine zu hohe Zimmerwärme, ferner beansprucht auch ihr Käfig die Größe eines Drosselkäfigs, da sie ein sehr lebhafter Vogel ist, auch die Ausschmückung mit einigen Steinen und eventuell tönernen oder vergipsten Sitzstangen erfordert die Rücksicht auf die Gesundhaltung der Füße. Nach der Literatur soll sie wohl nur einmal, und zwar im Herbst resp. im August, mausern. Die Züchtung sowohl von Steinrötel wie von Blaudrossel ist einigen, mit Ernst und Sorgfalt arbeitenden Liebhabern in freistehenden, großen Volieren erfolgreich gelungen.

Wenn wir alle Vorteile, sowie auch Nachteile in den Eigenschaften beider Vögel zusammenziehen, um ein Urteil zu bilden, ob die Vor- oder die Nachteile überwiegen, so wird das Resultat ein günstiges sein, das dahin lautet, daß Stein- sowie Blaudrossel empfehlenswerte Käfigvögel sind, vorausgesetzt, daß wir uns mit den sonstigen Begleiterscheinungen einer solchen Käfigung im voraus vertraut machen, dies als eine bestehende Tatsache hinnehmen und mit diesen gleich von Anfang an rechnen. Wenn wir von dem angenehmen, im Zimmer niemals, wie vielfach andere Drosselgesänge lästig fallenden Gesang absehen, so bieten uns Stein- und Blaudrossel infolge ihres ästhetischen Anblickes wirklich ein begehrenswertes Objekt zur Befriedigung unserer Liebhaberbedürfnisse und ich möchte behaupten, wären diese einsamen Gebirgsbewohner für uns deutsche Liebhaber, infolge ihres seltenen und leider auch viel zu teueren Angebotes nicht so schwer erschwinglich, so würden diese beiden Drosselarten sicherlich eine häufigere Zierde im Vogelbestande des sich nicht nur für angenehmen Gesang, sondern auch für die Schönheit des Gefieders, die bewegliche, stolze Haltung und das lebhafte Benehmen eines Vogels interessierenden Liebhabers bilden. Der Hauptzweck dieses kurzen Hinweises auf die vorwiegend guten Eigenschaften dieser beiden Drosseln als Käfigvögel sollte der sein, nicht nur die dankbare Pflege besonders hervorzuheben, sondern auch insbesondere dahingehend anzuregen, daß sich die leider meist festzustellende Tatsache, sich nur mit den hauptsächlichst wegen ihres

Steinrötelnest.

Gesangswertes gehaltenen Vögel, wie Sprosser, Nachtigall, Grasmücken, Gelbspötter usw., zu beschäftigen und selbige ständig zu käfigen, sondern auch seltener angebotene, wie Stein- und Blaudrossel sowie auch im Gesang minderwertigen Vögel, wie Stelzen, Ammern, Piepern usw., die Käfige der Liebhaber zum Einzug zu öffnen. Wer wirklich reine Freude und vollkommene innere Befriedigung seiner Herzensneigung für gefiederte Freunde als Zimmergenossen im rauhen, harten Kampf ums Dasein empfinden will, wer sie alle kennen lernen will, besonders die Vogelarten im kurzen Leben seiner Liebhaberlaufbahn, die sich bei verständnisinniger Pflege eng anzuschmiegen verstehen an ein trautes Verhältnis zum Pfleger, der soll nicht achtlos vorübergehen, vorausgesetzt, daß es seine Verhältnisse erlauben, an den beiden stillen Einsiedlern unserer schönen Gebirgslandschaft, der Stein- und Blaudrossel.

Der Rotwangensäbler — Pomatorhinus erythrogenys (*Vig.*)

Von J. Kuntzendorff, Berlin.

(Nachdruck verboten.)

Angeregt durch die Beschreibung dieses Vogels in Nr. 21 dieser Zeitschrift von Herrn Neunzig, sein Leben in der Heimat, im Himalajagebiet, betreffend, will ich meine Erfahrungen, die ich mit ieser Sichelschnabeltimalie gemacht habe, zur Kenntnis bringen.

Es ist verständlich, daß der Liebhaber fremdländischer Vögel seinem Verlangen, diese in möglichst großer Anzahl kennen zu lernen und verpflegen zu können, falls es die Verhältnisse erlauben, gerne und oft nachgibt, um auf diese Weise sein Wissen zu vergrößern und seiner Liebhaberei Genüge zu tun. Dieses war auch bei mir damals der Fall, als ich im Jahre 1908 mir durch Götz, Neu-Ulm, den Rotwangensäbler kommen ließ. Um vorweg zu nehmen, es ist dies ein Vogel, der durch sein Wesen und sein Verhalten nicht gerade meine Sympathie erwarb. Aber trotzdem habe ich ihn vier Jahre verpflegt, erst $1^1/_2$ Jahre im Käfig, dann in der Voliere und hernach wieder im Käfig. Bei seiner Ankunft überwies ich ihm als Behausung einen Schamakäfig. Für diesen Vogel ist ein großes Bauer unbedingtes Bedürfnis, da er wegen seiner ausnehmenden Beweglichkeit großen Raum beansprucht, dem man ihm auch schon seiner Größe wegen, 22 cm, überlassen müßte. Er ist, wie gesagt, im Käfig sehr beweglich zu nennen, doch diese Beweglichkeit macht auf den Beschauer einen eigentümlichen Eindruck. Seine Haltung, die besonders zutage tritt, wenn er gespannt etwas beobachtet oder irgendeine Gefahr vermutet, ist unbedingt eine geduckte, lauernde zu nennen, und zwar ist sie derart, daß man bei dem Vogel eine so große Hochläufigkeit, der Lauf mißt 3,6 cm, nicht vermutet. Dieses abwartende, sozusagen hinterhältige Verhalten des Rotwangensäblers ist naturgemäß dem Menschen unsympathisch, vermutet man doch, daß auch der Charakter des Vogels ein heimtückischer ist. Daß solches der Fall ist, davon konnte ich mich in späteren Zeiten überzeugen.

Die erwähnte Hochläufigkeit tritt so recht zutage, wenn der Säbler, sich behaglich reckend, seine Beine streckt und seinen Körper, einem Katzenbuckel ähnlich, krümmt. Unversehens ist das Tier dann um einige mm sozusagen gewachsen. Seine Beweglichkeit tut sich in großen Sprüngen kund, mit denen er von Stange zu Stange oder auch zum Gitter hüpft, welch letzteres besonders der Fall ist, wenn es etwas Außergewöhnliches zu beobachten gibt, die eine gewisse Gelenkigkeit und Gewandtheit in seinem Wesen in der freien Natur vermuten lassen. Wenig scheu von Anfang an, wurde er in kurzer Zeit nicht gerade das, was man zahm nennt, aber doch in der Weise nicht ängstlich, daß man ruhig an seinem Käfig herumhantieren konnte, ohne daß ihn diese Tätigkeit in Aufregung versetzte. Zahm im wahren Sinne des Wortes wurde diese Sichelschnabeltimalie während der ganzen vier Jahre nicht, denn das Mißtrauen, das er dem Menschen, auch dem Pfleger, entgegenbrachte, war nicht zu bezwingen und blieb während der ganzen langen Käfigungszeit das gleiche. Dieser mißtrauische Wesenszug ist im übrigen mit dem sonstigen Benehmen des Vogels völlig in Einklang zu bringen, was in folgendem bewiesen wird. Trefflich passend zu seinem Charakter ist der beobachtende, lauernde Ausdruck des scharfblickenden Auges, und es wird das ganze Aussehen des Rotwangensäblers durch den eigenartig gestalteten, kräftigen und säbelförmig gebogenen Schnabel noch unterstrichen, der wahrlich keine zu verachtende Waffe darstellt. Kurz, auf mich machte er den Eindruck eines richtigen Strauchritters, der die anderen, beschaulich ihres Weges kommenden, im Hinterhalte auflauert. Verwundern mag es freilich manchen, daß ich den Vogel trotz dieses eigentlich recht absprechenden Urteils vier Jahre lang verpflegte. Aber müssen es denn immer die einem genehmen Vögel sein, die einem Interesse abgewinnen, können nicht auch die nicht sympathischen in hohem Grade interessant sein? Und dieses war der Vogel trotz alledem sogar sehr. Allerdings kam dieses bei der Käfighaltung weniger zur Geltung als bei seiner Unterbringung im Flugraum.

Wenn ich mir durch mein Urteil über diesen Vogel von vornherein sagen mußte, daß er für die Voliere, wo er mit kleinen, zarten Vögeln zusammenleben sollte, unbrauchbar sein dürfte, so wollte ich es doch auf einen Versuch ankommen lassen und ich wagte es, ihn zugleich mit meinen anderen Pfleglingen, nach Fertigstellung des Vogelhauses, in demselben fliegen zu lassen. Entsprechend seinem Benehmen im Käfig zeigte er hier, daß er sich im Gezweige der Gebüsche des Innen- und Außenflugraumes gewandt zu bewegen wußte und sein Flug war hurtig und gerade. Den Eindruck, den er im Käfig auf mich gemacht hatte, bestätigte er auch in der Voliere. Dasselbe hinterhaltige Wesen, dasselbe Mißtrauen gegen Menschen und alles ihm verfänglich Erscheinende zeigte er auch hier. Selbstverständlich war es, daß meine Aufmerksamkeit besonders ihm galt. Aber nichts für die anderen Vögel Nachteiliges ereignete sich, wohl gingen ihm die übrigen Volierenbewohner, scheinbar wohlweislich, geflissentlich aus dem Wege, aber es herrschte im Flugraum eitel Friede, so sehr ich auch meine Beobachtung vergrößerte. Dieses war sehr erfreulich, und so ist es auch verständlich, daß mit der Zeit mein Mißtrauen schwand und die Beaufsichtigung allmählich nachließ.

Zu dieser Zeit hielt auch der Rotkopfstärling — Amblyrhamphus holosericeus (*Scop.*) — seinen Einzug ins Vogelhaus und mit dem Moment schien es mit der dominierenden Stellung des Rotwangensäblers aus zu sein. Wenigstens respektierte dieser den vorher erwähnten in einer Weise, daß man sich des Eindrucks nicht erwehren konnte, daß jener jetzt der Beherrscher der Voliere war. Und dann kam die Zeit, in der neben meinem Mennigvogel — Pericrocotus speciosus (*Lath.*) — auch noch andere ihr Leben lassen mußten und der Rotkopfstärling wanderte wieder in seinen Käfig. Sei es nun, daß die Missetaten dieses die Ursache des Ausbruchs des eigentlichen Temperaments des Säblers waren, sei es, daß anderes die Ursache dazu war, seit dem Entfernen des Stärlings entpuppte sich die Sichelschnabeltimalie geradezu als ein Tyrann, vor dessen Verfolgung kein Vogel sicher war. Gewitzt durch die erlittenen Verluste durch den Stärling fing ich

den nunmehr sich als Strauchritter entpuppenden Säbler, der heimtückisch die anderen Vögel aus dem Hinterhalte zu überfallen versuchte, die sich aber bisher durch rasche Flucht und gewandten Fluges seinen Verfolgungen zu entziehen wußten, und so wanderte er wieder in seinen Schamakäfig. Nach meinen Erfahrungen an diesem Vogel müßte man ihn nur mit gleichgroßen oder größeren Vögeln zusammenhalten.

Während des Umherkletterns in den Zweigen ließ er gewöhnlich seinen teils schwatzenden, teils aus voll klingenden Rufen bestehenden Gesang hören, der jedoch nicht schön zu nennen ist. Auf dem Boden, wo er sich sehr oft aufhielt, bewegte er sich in großen, ziemlich hochbogigen Sprüngen hüpfend, wobei er die Schwanzfedern stets etwas gespreizt hielt. Bei diesen Sprüngen entwickelte er zeitweise eine recht große Schnelligkeit. In der Ernährung bereitet der Rotwangensäbler keine großen Schwierigkeiten; ein gutes Insektenfuttergemisch, vermischt mit etwas Eierbiskuit, war seine Nahrung, an die er von vornherein ohne jede Eingewöhnung ging, dazu noch einige Mehlwürmer und im Sommer frische Ameiseneier. Die Angabe jedoch, diese Vogelart ernähre sich ausschließlich von Kerbtieren, ist nach meinen Erfahrungen unzutreffend. Denn bei mir nahm der Vogel auch mancherlei Früchte an, wie weiche Äpfel, Birnen oder Bananen, von denen er mittels seines starken, gebogenen Schnabels verhältnismäßig große Stückchen absäbelte. Auch in der Voliere, wo ihm Futter in mancherlei Gestalt zur Verfügung stand, hat er stets auch Obst gefressen. Mithin dürfte die Behauptung, er ernähre sich ausschließlich von Kerfen, widerlegt sein, besonders als auch das im Berliner zoologischen Garten befindliche Stück Obst zu sich nimmt („Gef. Welt" Nr. 21 S. 244). Bemerkenswert ist sein Verhalten am Boden, hier stochert er, hin- und herhüpfend, mit seinem langen Schnabel in dem den Bodenbelag bildenden Torfmull herum, des öfteren einen bei der Mehlwurmfütterung übersehenen und sich in dem Torf verkrochenen Wurm aufstöbernd. Das Badebedürfnis ist ziemlich rege; das das Badebassin umgebende Gesteinsmassiv wird so gut wie nicht benutzt.

Noch lange Zeit habe ich den Strauchritter bei mir verpflegt und trotz des ziemlich unsympathischen Wesens mich immer für sein eigenartiges Benehmen interessiert. Vor meiner Übersiedelung nach Frohnau verkaufte ich ihn mit einer größeren Anzahl anderer Vögel an Herrn Faßbender, St. Gallen, der hoffentlich wie ich auch Freude an dem eigenartigen Benehmen des Vogels finden wird. Ich bin überzeugt, daß man bei einer Unterbringung des Rotwangensäblers mit großen, ihm mindestens ebenbürtigen Vögeln Freude an ihm erleben wird, mit kleineren ihn zusammenzuhalten, rate ich entschieden ab, da es nur zu leicht zu Verlusten führen könnte. Über sein Freileben hat Herr Neunzig in Nr. 21 S. 243/244 ausführlich berichtet, so daß sich eine Wiederholung erübrigt. Der Vollständigkeit halber lasse ich nur noch die Gefiederbeschreibung folgen: ♂♀ olivbraun, leicht grau überhaucht; Stirn, Kopfseiten rostfarben, auf dem Zügel ein weißer Fleck; Bartstreif dunkelgrau, Vorderhals Mitte der Unterseite weiß; Federn der unteren Kehle häufig mit grauer Spitze; Hals-, Körperseiten, Unterschwanzdecken, Schenkel rostfarben; Flügel dunkler braun, Armschwingen von der Farbe des Rückens gesäumt; Schwanz wie Rücken; Auge weiß, gelblich- oder grünlichweiß (bei meinem Stück hellgelb); Schnabel hellgelblich hornfarben, oben am Grunde dunkler; Füße bräunlich fleischfarben; Lg. 220, Fl. 98—101, Schw. 100—105, Schn. 35—36, Lf. 36 mm. Jugendkleid: Rötlichbraun, Kehle weiß.

Etwas über die Ernährung zarter Weichfresser.

Von Karl Finck, Neukölln.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Die Ernährung der Grasmückenarten ist verhältnismäßig leicht, weil diese Vögel sowohl Insekten- als auch Fruchtfresser sind, und man ihnen sogar im Winter teilweise die natürliche Nahrung in Form

Steinrötel, brütend.

von saftigen, frischen Früchten reichen kann. Allerdings muß der Pfleger die leidliche Verfettung zu vermeiden wissen, wozu sämtliche Grasmücken, deren Appetit erstaunlich ist, sehr neigen.

Erweichte Feigen, Datteln und Rosinen sind viel zu zuckerreich. Auch von getrockneten Beeren bin ich kein besonderer Freund, da solche nur unvollkommen anquellen und stark die Verdauungsorgane belasten. Warum Liebhaber überhaupt Trockenfrüchte verabfolgen, ist mir unverständlich, zumal es noch im Januar und Februar verschiedene frische Obstsorten gibt. Mürbe Äpfel, süße Birnen, Bananen, ganz oder zerkleinert, ebenso zerschnittene Weinbeeren und Apfelsinen werden geradezu leidenschaftlich gerne verzehrt. Dazu gibt es noch gute, trockene Ameiseneier, die, was erwähnt werden soll, ungefähr drei- bis viermal so viel Eiweiß als frische aufweisen. Macht sich Fettsucht bemerkbar, so werden die eiweiß- und zuckerreichen Beigaben nach Bedarf vermindert und das verringerte Futterquantum in zwei bis drei Gaben gereicht, damit kurze Leerpausen dazwischen liegen. Aber niemals darf eine Grasmücke die langen Winternächte hungrig verbringen. Sehr nachteilig wirken übermäßige Möhrenbeimischungen. Ein Be-

kannter gab seinen Schwarzplatten, Garten-, Orpheus-, Sperber-, Zaun- und Dorngrasmücken im Winter viel erweichte Feigen. Die Tiere wurden in kurzer Zeit wahre Fettklumpen. Um einen baldigen Ausgleich herbeizuführen, vermischte der Herr nun die Ameisenpuppen reichlich mit ausgedrückter Mohrrübe und gab kleine Futtermengen. Die Vögel magerten zwar überraschend schnell ab, bekamen aber alle Darmentzündung. Als ich die Tiere sah, waren viele dem Tode nahe. Gekochte Mehlwürmer, zer-



Großer Buntspecht.

riebene Ameiseneier, Schmetterlingsschrot, mit etwas Bananenfrucht angefeuchtet und hartes Eigelb hoben schnell wieder den Ernährungszustand. Im Sommer bekommen Grasmücken selbverständlich auch frische Puppen bei der üblichen vorsichtigen Angewöhnung. Außerdem reiche man möglichst lange Fliegen, Spinnen, Schmetterlinge, glatte Raupen und sonstige Insekten.

Werden diese Hinweise halbwegs beachtet, versteht der Besitzer die Fettsucht zu vermeiden, dann verläuft der Federwechsel stets rasch, und die Grasmücken singen im Käfig noch fleißiger und länger als in der Freiheit. Mein Gärtner wurde 18 Jahre alt und jubelte bis zu seinem plötzlichen Ende.

Am schwierigsten ist die Ernährung des Gelbspötters, Sumpfrohr- und Teichrohrsängers usw. Wildfänge sehen, solange sie mit frischen Ameisenpuppen gefüttert werden, aalglatt aus. Erst mit dem Ersatzfutter beginnt der Jammer. Wohl die meisten Exemplare kommen nicht in die Mauser und gehen ein.

Sehr empfindlich sind ferner Fliegenschnäpper, Fitis und Weidenlaubvogel.

Noch vor dem völligen Aufhören der frischen Puppen muß eine vorsichtige, allmähliche Überleitung zum Winterfutter beginnen, dessen eigentliche Grundlage aus den besten, trockenen Ameiseneiern bestehen soll. Leider erfolgt das Abtrocknen meistens bei zu hohen Temperaturen. Durch den Röstprozeß werden wichtige, wertvolle Verbindungen zerstört. Grüne Ameisenpuppen erhitzt man vor dem Dörren erst, damit die Lebenskraft der Keime vernichtet wird, worauf das weitere Trocknen am besten bei einer Wärme von 40 ° R geschieht. Die Kerne bleiben weiß und erweichen schnell. Ein erfahrener Pfleger zarter Wurmvögel schwelgt rechtzeitig Ameiseneier in größeren Mengen. Das Welkgut hält sich in kühlen Räumen, flach ausgebreitet, mehrere Wochen. Solange das Protoplasma noch nicht vollständig eingetrocknet ist, ziehen derartige Puppen und auch getötete Kerfe auf nasser Leinewand schnell wieder Wasser an, das ursprüngliche Verhältnis wird hergestellt, und sie bilden dann ein wertvolles, leicht verdauliches Futtter. Man kann auf diese Weise die angeführten Zärtlinge bedeutend länger naturgemäß ernähren, was von erheblicher Bedeutung ist.

Auch nach dem Aufhören der blanken Fütterung gebe der Liebhaber reichlich Fliegen, Motten, Spinnen, glatte Raupen, zerschnittene Schmetterlinge und die weichen Hinterleiber der Heuschrecken.

Rausch und seine Anhänger verdammen zwar derartige Zugaben, aber ich fand stets, daß empfindliche Insektenfresser besser durch den Winter kamen, früher und schneller mauserten, wenn sie, solange es eben durchführbar war, nebenbei ihre natürliche Nahrung erhielten. Nachteile entstehen niemals.

(Fortsetzung folgt.)

Von einigen seltener in der Gefangenschaft gehaltenen einheimischen Vögeln.

Von W. R.

(Nachdruck verboten.)

1. Der große Buntspecht.

In den Käfigen der Vogelliebhaber sind häufig immer wieder dieselben Vögel zu finden. Der hält nur heimische Körnerfresser, der andere wieder nur heimische Sänger. Das richtet sich ja schließlich nach dem Geschmack und Empfinden des einzelnen. Ich fand immer eine besondere Vorliebe, mich mit der Pflege heimischer Vögel abzugeben, die selten in die Käfige der Liebhaber gelangen. So versuchte ich es trotz Abratens von verschiedenen Seiten einmal mit der Pflege von Spechten. Trotz der vielen Arbeit, die sie manches Mal verursachen, hat es mich nie gereut. Sondern ich fand großes Gefallen an den bunten Gesellen und ihrem eigentümlichen Leben, in das sie mir einen Einblick gaben.

Bevor ich zum Erwerb von Spechten schritt, richtete ich zunächst zwei größere feste Käfige her, die ihnen zum Aufenthalt dienen sollten. Die Rück-

wand der Käfige wurde mit Rinde von Birke und Kiefer bekleidet; einige starke Kieferäste sollten ihnen Sitz- und Klettergelegenheit bieten. Ein dicker, etwas morscher Baumstumpf wurde auf den Käfigboden gestellt. Die tiefen Zinkkästen des Käfigs erhielten als Bodenbelag Torfmull, da dieser die Exkremente dieser verhältnismäßig großen Vögel leichter aufsaugt, und so ein unangenehmer Geruch, besonders im Sommer, leichter vermieden werden konnte. Einen Spechtkäfig kann man recht hübsch einrichten, indem man recht knorrige und dicke Äste auswählt.

Nachdem nun alles für den Empfang der begehrten Pfleglinge hergerichtet war, wurden diese von einem Händler erworben. Es waren zwei junge

Kleinspecht.

aufgezogene große Buntspechte, ein Männchen und ein Weibchen. Die Vögel waren und blieben recht zahm. Sie nahmen frische Ameisenpuppen sofort aus der Hand, d. h. sie leckten sie mittels ihrer langen und klebrigen Zunge auf. Sie kamen auf die Hand und behämmerten sie, was recht schmerzhaft sein konnte. Ja, sie kletterten den Rockärmel hinauf und bearbeiteten den Stoff, vom Arm gelangten sie auf Brust oder Rücken und untersuchten alles auf ihre Art. Besonders schmerzhaft war es stets, wenn sie auf den Kopf gelangten und ihn behämmerten. Nachdem sie einige Zeit friedlich beisammen in einem Käfig lebten, war ich gezwungen, sie zu trennen, da sie anfingen sich gegenseitig zu verfolgen. Der eine erhielt nun den zweiten bereitgehaltenen Käfig, den er von Anfang an beziehen sollte. Sie zeigten so recht ihr natürliches Wesen. Die Rinde der Rückwände und die Kiefernäste mußten bald erneuert werden. Sie waren zu Kleinholz verarbeitet worden.

Holzspäne und Torfmull flogen an den drei offenen, mit Drahtgeflecht versehenen Seiten heraus, so daß die Umgebung der Käfige stets unsauber aussah. Diesem Übelstand wurde durch Anbringen von breiten Glasstreifen längs der Käfigseiten abgeholfen. Am besten sind wohl für Spechte an drei Seiten geschlossene Kistenkäfige, deren innere Seiten mit Zinkblech beschlagen sind, dadurch wird noch einem weiteren Übelstande abgeholfen. Die Vögel zeigen häufig die üble Gewohnheit, an dem Käfiggitter entlangzuklettern und ihre Exkremente nach außen zu entleeren. Das tun sie besonders, wenn man in ihrer Nähe ist, und sie glauben, einen Leckerbissen zu erhalten. Dann lassen sie auch ihre eigentümlichen Rufe recht häufig hören. Die Pflege dieser Spechte und ebensowohl der größeren Arten verursacht, besonders wenn nicht geeignete Käfige zur Verfügung stehen, viel Arbeit und Ärger mit der Hausfrau. Trotz alledem fand ich an diesen hübschen und eigenartigen Vögeln viel Gefallen. Ihre Ernährung macht wenig Schwierigkeiten. Ein gutes Futtergemisch, wie es für Drosseln verwendet wird, mit Ameisenpuppen und abgetöteten oder getrockneten Ameisen versehen, sagt ihnen sehr zu. Doch hatte ich den Eindruck, daß ihnen ein gutes, gehaltvolles und in der Qualität besseres Futter bekömmlicher ist, als große Quantitäten schlechteren Futters.

Daneben reichte ich ihnen stets etwas Hanf und Kiefernsamen. Mehlwürmer und andere Insekten sind für sie Leckerbissen. Die Spechte fressen verhältnismäßig viel, und ihre Verdauung ist dementsprechend. Eine Reinigung ihrer Käfige ist des öfteren notwendig. Ich hatte eine Zeitlang versucht, Zeitungs-

papier als Bodenbelag zu benutzen, welches aber von den Insassen bald zerfetzt wurde.

Außer den oben erwähnten Futterstoffen erhalten meine Spechte stets Kiefernzapfen, die sie sehr gern aufhämmerten und den darin enthaltenen Samen verzehrten.

Die Pflege der Spechte war mir stets sehr unterhaltsam, zumal man doch einen kleinen Einblick in das Leben dieser eigenartigen Vogelgruppe erhält. Nur ist es notwendig, Spechte stets in geeigneten Käfigen zu halten, da sie sonst sehr viel Schmutzerei und Arbeit verursachen, und so mancher vor ihrer Pflege und Haltung zurückschrecken würde.

2. Der Kleinspecht.

Für den Vogelwirt weit einfacher unterzubringen ist der kleine Buntspecht, ein allerliebster Kerl, welcher

Wendehals.

lange nicht die Arbeit verursacht wie sein großer Verwandter. Leider sind diese reizenden Vögel recht selten erhältlich und finden wohl auch wenige Pfleger. Für sie genügt ein Käfig, wie er für Drosseln üblich ist. Auch für ihn ist ein Kistenkäfig notwendig, da er sich dann weit sicherer fühlt, und auch die üble Gewohnheit, an dem Käfiggitter herumzuturnen, wobei sie sich besonders die Schwanzfedern zerstoßen, weit weniger in Erscheinung treten kann. Für den Kleinspecht kann man ohne weiteres einen aus Hartholz angefertigten Käfig verwenden, da er nicht imstande ist, mit seinem kleinen Schnabel das harte Holz zu zerhämmern. Innerhalb des Käfigs werden einige dickere Äste von Kiefer und Birke in verschiedener Lage angebracht. Einige frische Kiefernzweige in einer Käfigecke angebracht, dienen ihm als Versteck.

Frisch eingefangene Kleinspechte werden bald zahm und zutraulich. Sie gehen meist bald an das dargebotene Futter, Mehlwürmer oder frische Ameisenpuppen, und fügen sich schnell in die Gefangenschaft. Verweigert ein Vogel beständig die Futterannahme, so gibt man ihm am besten die Freiheit wieder. Mittels zerschnittener Mehlwürmer und frischen Ameisenpuppen im Sommer sind sie durch die bekannte Art an ein gutes Futtergemisch zu gewöhnen, wie es für zarte Weichfresser verwendet wird. Im Sommer frische Ameisenpuppen, im Winter getrocknete und Mehlwürmer sollen ein Hauptbestandteil des Futters sein. Meine Kleinspechte verzehren stets gern gehacktes hartgekochtes Ei, das sie öfter als Zugabe erhielten.

Der Kleinspecht richtet an den Sitz- und Kletterstangen wenig Schaden an, da er sie nicht in dem Maßstab wie der große Buntspecht bearbeiten kann. Zu diesem Zwecke erhielt er ein Stück morsches Holz von irgendeiner Baumart, Kiefer oder Birke oder anderes. Bald lernen sie ihren Pfleger kennen und und begrüßen ihn mit den der Art eigentümlichen Rufen, zumal wenn der Futternapf am Morgen leer ist und der Hunger sich regt. Sie kommen dann an das vordere Käfiggitter und warten bis der Futternapf in den Käfig gestellt ist. Da verschwinden dann zuerst Mehlwürmer und frische Ameisenpuppen.

Mit anderen Vögeln, wie Sumpf-, Hauben- und Tannenmeisen kann der Kleinspecht zusammengehalten werden, da er recht harmlos ist, und, soweit ich beobachten konnte, keinen Vogel angreift. Bei mir lebte ein Kleinspecht längere Zeit mit einer Haubenmeise friedlich zusammen; das heißt, sie kümmerten sich nicht umeinander und jeder suchte den Futternapf nur dann auf, wenn der andere nicht da war. Bei dem Kleinspecht fiel es mir stets auf, daß er an den langen

Sommertagen ziemlich früh, schon am hellen Tage zur Ruhe ging und wie ein kleiner Federball meist auf einem Birkenstamm saß.

Im Gegensatz zu seinen großen Verwandten verursacht er lange nicht die Unsauberkeit und Arbeit wie diese, zumal er schon von seinem meißelartigen Schnabel wenig Gebrauch macht. Er hält sich meist auf den Ästen auf und untersucht die Risse der Baumrinde nach kleinen Insekten und deren Eiern, die er auch in der Gefangenschaft am Holz zu finden glaubt.

3. Der Wendehals.

Wiederholt gelangte ich in den Besitz von jungen Wendehälsen, die gerade in dem Entwicklungsstadium waren, in welchem sie wie kleine Stachelschweine aussahen. Stets zeigten die jungen Kerle schon das Benehmen alter Wendehälse. Sie suchten durch ihre eigentümlichen Bewegungen, Verdrehen des Halses und durch ihre summenden Laute den vermeintlichen Gegner zu erschrecken. Schon bei Annährung an ein Nest des Wendehalses hört man an der Nisthöhle das Summen der Jungen, das dem eines Bienenschwarmes gleichkommt. Im Laufe der Jahre hatte ich Gelegenheit, eine Anzahl von Wendehalsnestern zu untersuchen, die stets sauber waren und keinen Kot, von den Jungen herrührend, enthielten.

Junge Wendehälse nehmen bald das dargereichte Futter, frische Ameisenpuppen, von dem Pinsel oder der Pinzette ab. Sie lecken es mit ihrer langen klebrigen Zunge nach Art der Spechte ab. Die Jungen setzte ich meist in einen Blumentopf, in den ich als Unterlage ein altes Nest legte. Bei halbstündlicher Fütterung mit frischen Ameisenpuppen, getöteten Ameisen und kleinen frischen Fleischstückchen gediehen sie gut und zusehends. Mit zunehmendem Alter wurden sie auch zahm und zutraulich und zeigten vor dem Menschen keine Scheu, den sie wohl als den alten Wendehals betrachteten.

Allmählich begannen sie allein zu fressen, sie nahmen die Ameisenpuppen aus dem Futternapf an. Sobald sie nun einigermaßen erwachsen waren, bezogen sie einen größeren Käfig und lernten hier selbst fressen, was meist schnell und ohne Schwierigkeiten vor sich ging. Allmählich gelang dann auch die Gewöhnung an ein Futtergemisch, welches zunächst hauptsächlich aus Ameisenpuppen bestand, die allmählich weniger wurden, bis das Futtergemisch im Übergewicht war. Die Übergewöhnung an das endgültige Futter ging stets ohne Schwierigkeiten vor sich. Um ihnen mehr eine natürliche Ernährung zu bieten, fing ich Ameisen und verfütterte diese im toten Zustande.

Die jungen vollentwickelten Wendehälse, die den Alten in der Gefiederfärbung sehr ähnlich sind, zeigten später niemals bei meiner Annäherung die eigenartige Abwehrstellung. Dies geschah später nur höchst selten, bei Annäherung von Damen in weißen Kleidern oder ihnen fremden Gegenständen, wie eine ausgestopfte Eule u. a. In einem großen Käfig fühlten sie sich sehr wohl, was sie mir durch ihre Munterkeit und ihren gesunden Appetit bewiesen. Sie kamen, sobald ich die Käfigtür öffnete, sofort auf meine Hand oder Schulter geflogen und ließen sich ruhig greifen.

Alteingefangene Wendehälse sind ganz das Gegenteil von jung aufgezogenen. Sie sind unbändig scheu und werden wohl kaum zahm. Ich kam wiederholt in den Besitz alter Vögel, die ich stets sofort oder nach wenigen Tagen wieder fliegen ließ. Sie weigerten sich häufig, Nahrung anzunehmen, und wären bei Mehlwürmern und lebenden Ameisen verhungert.

Die Wendehälse zeigten sich in meinen Käfigen stets harmlos. Eine Zeitlang hielt ich vier von ihnen mit ebenso vielen Trauerfliegenschnäppern zusammen, die ebenfalls aufgezogen waren. Auch diese Fliegenschnäpper sind nette und zutrauliche Zimmergenossen, die ihren Pfleger kennen und sich mit ihm sehr befreunden.

Im Laufe der Jahre bewohnten eine Anzahl interessanter Vögel meine Käfige und Flugräume. Unter ihnen befand sich noch mancher Pflegling, der nur selten in den Käfig gelangt. Über einen Teil derselben will ich später berichten und hier nur noch einiges über die beiden europäischen Braunellenarten mitteilen.

4. Die Alpen- und Heckenbraunelle.

Über die Alpenbraunelle berichtete bereits im vorigen Jahrgang Herr Troschütz eingehend. Ich kann mich nur diesen Ausführungen anschließen. Meine Braunellen bewohnten anfangs einen Käfig allein, da sie zunächst scheu und stürmisch waren. Später bezogen sie einen Flugraum und lebten hier in Gemeinschaft mit einheimischen Finkenvögeln. Ihr Aufenthaltsort war, solange sie sich unbeobachtet glaubten, das Fensterbrett, während sie sonst Gebüsch vorzogen.

Die Ernährung der Braunellen bietet keine Schwierigkeiten. Neben einem Weichfuttergemisch erhalten sie Sämereien, wie Mohnsaat, Rübsen, Spitzsaat, Samen der Nachtkerze u. a. Mehlwürmer und Ameisenpuppen lieben sie sehr. Auch an den halbreifen Samen und auch den grünen Blättern der Vogelmiere tun sie sich gütlich.

Weit flinker in den Bewegungen und auch scheuer als die Alpenbraunelle scheint ihre Verwandte aus dem Tiefland, die Heckenbraunelle, zu sein. Mir bereitete die Pflege beider Arten viel Genuß. Zumal sie durch ihre eigenartige und schlichte Gefiederfärbung und ihr nettes harmloses Wesen auffallen. Gesanglich gehören sie ja nicht zu den guten Sängern wie Nachtigall und Grasmücken, doch ist ihr Liedchen auch nicht zu verachten. Das Wesen und die Eigenart dieser Vögel kommt im Flugkäfig oder Vogelstube zur Geltung. Im kleinen Käfig gehalten büßen sie viel ein. Es sind Vögel, die viel Bewegung haben müssen und dann erst richtig zur Geltung kommen. Meine Vogelstube bewohnten etliche Braunellen, die sich stets harmlos und friedfertig zeigten. Zu ihrem Wohlbefinden gehören einige Gebüsche, die sie gerne durchstreifen, wobei häufig das Männchen singt. Im Gegensatz zur Alpenbraunelle scheint die Heckenbraunelle das Gebüsch noch mehr vorzuziehen. Während erstere, wie schon erwähnt, bei Annäherung unbekannter Personen oder aus Furcht vor irgend etwas Fremdem das Gebüsch aufsuchten und sich sonst mehr außerhalb desselben aufhielten, trieben sich die Heckenbraunellen meist im Gesträuch umher.

Die Hitze des Sommers überstanden meine Alpenbraunellen gut und zeigten sich nicht empfindlich dagegen.

So bietet die Pflege unserer heimischen Vogelwelt viel des Beachtenswerten, zumal wenn es glückt, ein und die andere Art zur Fortpflanzung zu bringen. Ich kann nur jeden Pfleger heimischer Vögel empfehlen, sich nicht nur auf die Pflege unserer Körnerfresser oder der Sängerfürsten zu beschränken, sondern ruhig einmal den Stieglitz oder Hänfling oder die Mönchgrasmücke wegzugeben und dafür einen anderen Vogel zu pflegen und zu beobachten. Vor allen Dingen sollten die Vogelpfleger, denen Flugräume zur Verfügung stehen, sich weit mehr, als es geschieht, mit der Pflege im Hinblick auf Zuchtversuche befassen. Es gibt viele heimische Vogelarten, die selten verpflegt und die noch nicht in der Gefangenschaft zur Brut geschritten sind. Da lassen sich viele neue Beobachtungen machen und das Wissen wird bereichert, wenn sie unserer Zeitschrift zugänglich gemacht werden.

Kleine Mitteilungen.

Der Kuckuck in der Konservenbüchse. Ein interessantes und wohl einzig dastehendes Vogelnest wurde von einem Jagdaufseher in Schnelsen bei Altona entdeckt. Ein Rotschwänzchenpaar hatte sich in einer geräumigen, aber nur mit einer kleinen Öffnung versehenen Konservenbüchse eingenistet. Diese Wohnung hatte auch einem Kuckuck gefallen, denn durch Hinzutun eines Eies trug er zur Vervollständigung des Hausstandes hilfreich bei. Das Rotschwänzchenpaar hat dieses Ei ausgebrütet und das ausgeschlüpfte Junge großgezogen. Wie groß war aber der Schrecken der Stiefeltern, als das untergeschobene Kind wegen seiner außergewöhnlichen Größe nicht durch die Öffnung schlüpfen, also nicht ausfliegen konnte. Wohl oder übel mußten sie den in der Blechdose gefangen sitzenden Stiefsohn weiter füttern, so daß durch diese Art von Mästung das Wachstum derart zugenommen hatte, daß der junge Kuckuck schon die ganze Dose ausfüllte, als der Jagdaufseher ihn fand und durch ein paar Scherenschnitte aus seiner bedrängten Lage befreite.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 15: Kann mir ein in Bastardzucht erfahrener Liebhaber an dieser Stelle vielleicht mitteilen, was für einen Vorfänger man Bastardkanarien gibt, oder ob sie den Gesang von selbst lernen? Im voraus besten Dank. J. Wiener.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Norbert Grasl, Wien XXI/5, Öst. Telegr.-Zeugverwltg., A. Z.-Mtgl. 41: Himmelblaue Wellensittiche.

Max Kleinert, Tierhandlung, Berlin NO 18, Strausberger Str. 13, Fernruf Alexander 3313: Gelbstirnamazonen, Doppelgelbköpfe, Tovi-Sittiche, Feuerflügelsittiche, Königsglanzstare, langschwänzige Glanzstare.

Kracht, Duisburg, Bechemstr. 10: Klarino, Kaprötel, Orangekehlfliegenfänger.

A. Mertes, Mainz, Wallaustr. 62: Himmelbaue Wellensittiche.

Gustav Müller, Hamburg 31, Langenfelder Damm 27: Olivgrüne Astrilde.

W. Müller, Obstplantage, Friedersdorf, Kreis Beeskow: Doppel-Gelbkopf-Amazone.

Walter Voigt, Jena, Feodorastr. 13: 1,1 kleiner Kubafink, vorjährig.



Herrn E. B., Stettin. Das Verbreitungsgebiet des Indigofinken erstreckt sich durchdas östlicheNordamerika von Kanada bis nach Panama in Mittelamerika. Im nördlichen Teil des Verbreitungsgebietes ist er nur Brutvogel und wandert im Herbst nach Süden, im Süden ist er Jahresvogel. Die Brutzeiten und damit die Mauserzeit ist bei einem Vogel, der ein so großes Verbreitungsgebiet mit verschiedenen Klimaten bewohnt, nicht überall dieselbe. Da wir meist über die Herkunft der in den Käfigen gehaltenen Vögel nicht unterrichtet sind, ist es kaum möglich anzugeben, wann der Vogel normalerweise mausern wird. Bei den aus den nördlichen Brutgebieten stammenden Indigofinken würde die Mauser wie bei unseren Finken in die Spätsommermonate oder in die ersten Herbstmonate fallen.

Herrn A. T., Hannover. Die Bengalenpitta litt an einer heftigen Darmentzündung.

Frl. F. L., Oberkirch, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Frau F. B., Friemersheim. Die Farbentafeln liegen stets der vorletzten Nummer des Vierteljahres bei.

Herrn K. M., Aschersleben. Der Mohrenkopf ist einer Darmentzündung erlegen. Die Ursache der Erkrankung konnte nicht ermittelt werden.

Herrn A. T., Hannover. Der Vogel war der Gelbschultertrupial — Icterus tibialis *Sw.* aus Ostbrasilien.

Herrn A. E., Lunzenau/Mulde. Die gestellte Frage im Sprechsaal zu veröffentlichen wäre zwecklos, da Zebrafinken zu den bekanntesten Prachtfinken gehören. Ich beantworte die Frage deshalb an dieser Stelle. 1. Ein Züchtungskäfig für ein paar Zebrafinken muß mindestens 50×30|40 cm sein. 2. Das Männchen ist sehr leicht vom Weibchen durch seine prächtige Befiederung, seidenglänzende, hell kastanienbraune Kopfseiten, beim Weibchen grau, durch die ebenso gefärbte mit weißen Tropfenflecken versehene Befiederung der Weichen, beim Weibchen grau, zu unterscheiden. Zebrafinken messen von Schnabel- bis Schwanzspitze 105 mm. 3. Weiße Hirse, Senegalhirse, Spitzsamen, Grünkraut (Vogelmiere), halbreifen Grassamen, ab und zu ein Mehlwurm oder etwas hartgekochtes, kleingewiegtes Ei mit Ameisenpuppen und Vogelbiskuit. 4. Zebrafinken gehören zu den härtesten Prachtfinken. 5. Der Gesang ist nicht kunstvoll; bauchrednerisch erklingende, schnatternde und trompetende Töne hört man recht fleißig vom Männchen. 6. Sind sehr häufig gezüchtet. 7. Bezugsquellen kann ich nicht angeben. Diese Vögel sind nicht immer erhältlich. Man muß sie kaufen, wenn sie gerade angeboten werden (s. Inseratenteil).

Herrn Prof. F. B., Danzig-Langfuhr; Herrn F. D., Berlin; Herrn A., Hannover; Herrn F. B., Leipzig-Mockau; Herrn W. S., Speyer; Herrn A. L., Pfarrkirchen; Herrn K. K., Göttingen; Herrn A. P., Aue im Erzgeb.; Herrn St., Lößnig; Herrn Dr. A. Sch., Budapest; M. H., Leipzig-Gohlis; Herrn E. R., Bernstadt: Beiträge dankend erhalten.

Herrn H. B., Lippstadt. Der Vogel ist infolge einer Zerreißung der stark vergrößerten und mürben Leber eingegangen.

Herrn A. Sch., Zschopau. Die Mitteilung werde ich gern veröffentlichen. ♀♀ Gouldamadinen werden sehr schwer zu beschaffen sein. Bei den im Besitz von R. befindlichen Gouldamadinen ist Legenot nicht eingetreten. Wir sind geneigt, diesen Umstand auf die Beigabe von Lebertran zurückzuführen. Die Eier sind stets befruchtet und werden auch erbrütet, aber es hapert am Auffüttern. Diesem Übelstand wäre abzuhelfen, wenn es zuverlässig nistende Mövchen gäbe. Wenn es gerade so paßt, sollten die Eier Silberschnäbelchen untergelegt werden.

Berichtigung.

Heft 29, S. 338, linke Spalte, Z. 1—3 v. o. muß es heißen: „Aber selbst die unverdaulichen Teile spielen bei dem Ernährungsprozeß eine wichtige Rolle", statt „kein wichtige Rolle".

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

hrgang 54 23. Juli 1925 Heft 30

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Zur Pflege der Körnerfresser. Von Adolf Voigt, Jena.

Der Steinrötel und die Blaudrossel. Von J. Birk, Leipzig. (Forts. und Schluß.)

Der Rotwangensäbler — Pomatorhinus erythrogenys *(Vig.)* Von J. Kuntzendorff, Berlin.

Etwas über die Ernährung zarter Weichfresser. Von Karl Finck, Neukölln. (Forts.)

Von einigen seltener in der Gefangenschaft gehaltenen einheimischen Vögeln. Von W. R.

Kleine Mitteilungen – Sprechsaal – Vom Vogelmarkt – Redaktionsbriefkasten – Berichtigung – Aus den Verbänden – Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Sitz Leipzig. 1. Vors. Hermann Höhne, Leipzig-Volkmarsdorf, Eisenbahnstraße 84 IV. 1. Schriftf. Max Hunger, Leipzig-Gohlis, Polizeigebäude Zimmer 196. Kassierer Ludwig Böttcher, Leipzig, Inselstr. 17 II. — In unserer letzten Veröffentlichung hatten sich verschiedene Fehler eingeschlichen, die das neu angelegte „Giro-Konto des Landesverbandes betrafen und deren Richtigstellung hiermit erfolgt. Sämtliche dem Landesverband angeschlossenen Vereine wollen in Zukunft ihre Einzahlungen an die Giro-Kasse Leipzig Nr. 6318 bewirken. Wir müssen immer wieder darauf hinweisen, daß die Beiträge sehr, sehr spärlich eingehen. Bisher ist nur der Zwickauer Verein seinen Verpflichtungen in anerkennenswerter Weise voll und ganz nachgekommen. Die Vereine mögen es sich angelegen sein lassen, diesem Punkte eine intensivere Beachtung als bisher zu schenken. Auf die Abführung in Teilbeträgen wird nochmals hingewiesen. Der Vorstand. J. A.: Hunger, Schriftf.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Reichsausschuß der Zoologischen Berufe. Erwiderung zum Aufruf der A. Z. In Nr. 13 vom 1. Juli des Zoologischen Zentral-Anzeigers habe ich zur Ermahnung und Belehrung des Händlerberufes folgenden Bericht ergehen lassen. Der Obmann: E. W. Lenger.

„Inserierende Vogelhändler und Bezeichnung der Vogelarten. Aha — werden die Leser sagen, dieses Thema kennen wir von Friedenszeiten her. Ja, sie haben recht, und mit ihnen die Kollegen, die da sagen, diese geschäftlichen Ausartungen der den Versand nach auswärts betätigenden Händler dürfen jetzt und in Zukunft keinen Anlaß zu Beanstandungen der gutgläubigen Käufer geben. Es ist ohne weiteres zuzugeben, daß im Vogelhandel leicht irrtümliche Angaben von Vogelarten-Namen vorkommen können, aber ebenso leicht wird man auch guten Glauben und Böswilligkeit unterscheiden können.

Was man andern Handelszweigen ohne weiteres bis zu einer gewissen Grenze allgemein zugesteht, nämlich eine das Maß nicht überschreitende Übertreibung in der geschäftlichen Propaganda, was hierzulande unter der Bezeichnung amerikanischer Reklame herumläuft, die Ausnützung dieses zweifellos geschäftlichen Vorteils müssen sich die Angehörigen des Vogelhandels versagen. Warum? Weil sie eingedenk sein müssen, daß die Augen der Liebhaberwelt, ja, die Augen der Gegner der Stubenvogelliebhaber überhaupt, in Luchsesart auf den Vogelhandel, im besonderen auf den inserierenden, gerichtet sind. Und mit welcher Freude wird gerade von der letzteren Seite jede Unaufmerksamkeit seitens der Gewerbetreibenden festgestellt, registriert, um zu gelegener Zeit das Nichtbeil für den Vogelhandel damit schärfen zu können.

Die Ansprüche, die die Allgemeinheit in dieser Beziehung an die Geradheit, Aufrichtigkeit, ja, an die wissenschaftliche Zuverlässigkeit unserer Gewerbetreibenden stellt, ist eine ungleich höhere als die, welche man von anderen Gewerben fordert. Diese Tatsache darf niemand bei seinen geschäftlichen Maßnahmen unbeachtet lassen.

Nun werden die freundlichen Leser fragen, was hat denn Anlaß zu diesen Mahnworten gegeben? Gibt's denn unter uns schon wieder jemand, der sich seiner Verantwortung, der gewiß nicht leicht zu nehmenden, gegenüber der ganzen Kollegenschaft nicht bewußt ist? Darauf zur Antwort: Nichts so Prägnantes, nichts so Ungeheuerliches, und dennoch ein genügendes Vorkommnis, das einen Münchener Liebhaber veranlaßt, an den Vorstand des Verbandes der Vogelhändler die Bitte zu richten, für richtige Bezeichnung der offerierten Vogelarten seitens der Händler Sorge tragen zu wollen.

Wir geben dieses Ersuchen nachstehend im Wortlaut wieder, das ja zweifellos seine Wirkungen im Sinne unserer Ausführungen nicht verfehlen wird:

Veranlaßt durch nachstehend angeführte Fälle, möchte ich Sie bitten, bei Ihrem Verbande (Vogelhändler-Verband) doch dahin zu wirken, daß jeder Händler verpflichtet wird, in seinen Angeboten auf Preislisten oder in Zeitschriften die Vögel mit ihren richtigen Namen (nach Neunzig, Fremdländische Stubenvögel) zu offerieren und nicht mit irreführenden Phantasie-Namen. — Ich will mich jeder Kritik hierüber enthalten, glaube vielmehr, daß es genügt, wenn ich Sie darauf hinweise, daß dies doch auch im Interesse des reellen Vogelhandels, zu dem der größte Teil der Vogelhändler zu zählen ist, gelegen ist! —

Eingesandt.

In letzter Zeit wurden „rotköpfige Inseparables" angeboten — zuerst von M. in H., dem ich schrieb, falls es sich um den Unzertrennlichen mit orangerotem Gesicht (lt. Neunzig, Seite 714—715) handle, würde ich welche kaufen — worauf ich keine Antwort und auch keine Vögel erhielt! —

Dann offerierte mir B. in B. „rotköpfige Inseparables", bei dem ich ein Paar bestellte und dafür ein Paar Bergpapageien (Tarantinische Unzertrennliche) erhielt.

Mit der französischen Bezeichnung Inseparables gibt es nur einen Vogel, und dies ist eben. lt. Neunzig, Seite 714, der orangegesichtige Unzertrennliche, was aber mit der Bezeichnung „rotköpfige Inseparables" jetzt angeboten wird, sind tarantinische Bergpapageien. Es handelt sich scheinbar darum, diese Vögel unter besserklingenden Namen an den Mann zu bringen! —

B. schreibt mir, ich solle ihm die „Inseparables" zurücksenden!

Ich habe die Sache auch der A. Z. überwiesen! —

Jos. Porzelt, A. Z.-Mitglied."

Aus den Vereinen.

Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10.

An Lungenentzündung verschied unser Mitglied Nr. 90, Herr

C. O. Freytag

in Wiesbaden. Wir stehen trauernd an der Bahre dieses idealen Vogelliebhabers mit wahrhaft vornehmer Gesinnung. Wir alle, die mit dem Dahingeschiedenen in Verkehr gestanden haben, empfinden tief den schweren Verlust und werden dem in der Blüte seiner Jahre Dahingerafften wehmütig ein treues Andenken bewahren.

Der Vorstand. J. A.: A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37 a. Gäste stets willkommen.

J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke, Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Restaurant „Zum Löwentor", Königswall 75.
J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung Freitags, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Blasewitzer Hof". Liebhaber willk. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Eliesenhof", Eliesenstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelliebhaber und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinslokal „Parkhotel", Spinnstr. 1, Versammlung. — Vogelliebhaber Mittelthüringens, schließt Euch unserem Verein an. Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 4. August. A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Der hannoversche Vogelschutzverein zu Hannover, gegründet 1881, wirkt mit sichtbarem und anerkanntem Erfolge für Vermehrung und den Schutz der Vogelwelt bei Hannover mit Aufhängen von jährlich einigen Hundert Nistkästen aller Art, durch Erweckung von Interesse und Liebe für die Vogelwelt, mit monatlich, zur Gefangszeit wöchentlich, stattfindenden Belehrungsspaziergängen und durch Vorträge in den jeden zweiten Dienstag der Monate im Landesheim stattfindenden Vereinsversammlungen. Seine Bestrebungen dienen also lediglich gemeinnützigen Zwecken. Mitgliederzahl rund 1200, jährlicher Beitrag nur 1 Mark. Meldungen an den Vorsitzenden Herrn Fritz Becker, Hannover, (Boedekerstr. 1 F). Becker.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um 8 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste willk. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Vereinsabend regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends um 8 Uhr) beim 1. Vors., Herrn Jahn, Feodorastr. 7. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. A. Voigt.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 6. August. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Normast im „Kaiser Friedrich", Breslauerstr. 50. Liebhaber willkommen. J. A.: Friedrich.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße.
gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wsl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Tage im „Goldenen Falken" Versammlung; nächste Freitag, den 24. Juli. Liebhaber willk. Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Versammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Liebhaber willk. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebenda. R. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

iergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

sige u. Gerätschaften

l-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50, gnete f. kl. schädl. Vögel M. 2,30, M. 2,50 u. 2,80. Katalog gratis. mnen, Gronau 58, Westf. [957

Mistelleim

tbgr., lief. i. anerkannt vorzügl. Güte Kirschner, Arnsdorf-Haida (Böhmen), Roseggerstr. [958

Futtermittel

lwürmer Ia Pfd. 4.— ℳ (6 Pfd. 24 ℳ fr.) d. 2.50 ℳ frk. Voreinsend. ner, Breslau, Weinstr. 12. [959

Bekanntmachung!

Infolge andauernder Steigerung der Rohstoffe bin ich gezwungen, den Preis meiner „L. K. N." vom 1. 8. ab pro ½ Kilo auf M. 1.50 zu erhöhen. [960

Lorenz, Dresden, Drehgasse 5.

Deutsche Waldameiseneier,

prima, Ernte 1926, à Pfund 8 M., empfiehlt in altbekannter Güte [961

Frd. Gust. Müller, Berlin SW 61 Blücherstraße 61.

Ameiseneier,

frisch, Liter 2,00 Mk., trockene (diesjähr.) Kilo 10.00 Mk. verkauft Tierausstopferei und Gerberei

G. Brachmann, Kiel,

Wörthstr. 1. [962

Vogelfutter [963

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 18 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,

Tröndlinring 1. Telephon 14 958.

Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Ein Versuch

überzeugt jeden von der Güte meines **Universalfutters.** Preis 2 M. p. Pfd. Sämtliche Futtersorten für Exoten, Wald- und Kanarienvögel zu billigsten Tagespreisen. Versand geg. Nachnahme. Verpackung und Porto werden billigst berechnet. [964

P. H. Kirsten, Leipzig 3,

Zeitzer Str. 53. Fernruf 31445.

Ia Drosselfutter,
Marke „Cuculus.“ [965
(Ameiseneier, Muska, Zwiebackschrot), beziehen Sie vorteilhaft von
H. Pullich, Langen b. Fft. a. M. 8.

Frische Ameisenpuppen
à Liter 2.30 Mark, franko.
Getrock. Ameisenpuppen
à Liter 1,60 Mark, I. Qualität.
Mehlwürmer
gegen Einsendung von Mk. 1.50 ¼ Pfund franko. [966
Th. Witte, Niederndodeleben bei Magdeburg.

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark ¼ Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [967

Mehlwürmer
ausverkauft bis Oktober.
Ia Ameiseneier
Pfund 6.00 M.

Ia Weißwurm . . .	à Pfd. 5 M
Ia Muska-Zecken . .	à „ 2,50
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen . . .	à Pfd. 0,75
Ia Garneelen, gem.	à Pfd. 0,40 M

Ia Universalfutter
Allerbeste I für Nachtigallen 2.— M
„ II für Grasmücken 2.— M
„ III für Drosseln . 1.50 M
Proben und Analysen zur Verfügung. Vertreter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [968
Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
A. Eckrich II, Waldsee (Pfalz).

Vögel

Molukkenkakadu
Stück 220.—

Kleine Gelbhaubenkakadus	Stck. 45.—
Rosa-Kakadus	„ 35.—
Graupapageien	Stck. 90—120.—
Blaustirnamazonen, sehr schön, fingerzahm und sprechend	Stck. 65.—
ditto sehr schön und noch nicht sprechend	„ 55.—
ditto jüngere	„ 45.—
Gelbstirnamazonen, sehr schön	„ 50.—
Doppelgelbköpfe, fingerzahm	„ 65.—
Tovi-Sittiche	Paar 25.—
Feuerflügelsittiche	„ 45.—
Tarant. Bergpapageien, Zuchtpaare	18.—
Grüne u. gelbe Wellensittiche, erstklassige Zuchtpaare	15.—
Junge Wellensittiche	11.—
Schamadrossel, Ia Sänger	Stck. 65.—
„ „ Weibchen	„ 50.
Königsglanzstare	„ 90.—
Langschwänzige Glanzstare	„ 10.—
Rotgehäubte Kardinäle	„ 8.—
Safranfinken, Männchen	„ 6.—
Zebratauben	Paar 6.—
Reisfinken	„ 5.—
Kanarienroller	Stck. 10—15.—
ditto Brut 1925	Stck. 7.—
Elster ganz zahm	„ 8.—
Saatkrähe, zahm	„ 8.—
Javaaffen, klein u. zahm	„ 60.—
Kapuziner, „ „	„ 90.—
1 dressierter Rhesusaffe	„ 75.—
Schwarze Makaken	Stck. 60.—

offeriert freibleibend [969
Tierhandlung
Max Kleinert,
Berlin NO 18,
Strausberger Straße 13.
Fernruf Alexander 3313.
Bei Anfragen Rückporto.

Amerik. Wanderdrossel
fleißig singend, umstandshalber zu ver-
970] kaufen. Preis 20 M.
Wilhelm Pfisterer, Ludwigsburg, Karlstraße 40.

Rosa-Kakadus
schöne, junge Vögel, Stck. 40 Mk.
Kleine Gelbhauben-Kakadus 40 M., ditto ganz zahme Stück 55 M.
Feuerflügelsittiche, ganz fingerzahm, Paar 50 M.
Rotstirnige Zwergpapageien, ganz grün, sogen. Tarantinische Bergpapageien, Paar 18 M., 5 Paar 75 M., 10 Paar 140 M. **Rote Kardinäle, Ia,** Stück 25 M., **Trupiale** Stück 35 M.
Bombay-Tigerfinken, schöne Vögel, etwas in Farbe, Paar 8 M., 5 Paar 37.50 M.
Afrikan. Glanzstare, schöne Sänger, Stck. 15 M. Lebende Ankunft garant. Nachnahme. Preislisten über Affen, Papageien, Käfige umsonst. Gegr. 1892.
Gustav Müller, Vogel-Großhandlung,
Hamburg 31, Langenfelderdamm 27. Fernspr. Vulkan 7141. [971

Gebe ab:
1,1 tarant. Unzertrennliche, tadellos und gut eingewöhnt . 18 M.
1,1 Möwchen . . . . . 8 M.
0,1 Zebrafink . . . . . 8 M.
1,0 Kanarie . . . . . 12 M.
Reinhard Hücker, [972
Marburg (Lahn), Grün 58.

Jungen Kiebitz, Kaptäubchen, ¾ jähr. **Wellensittiche** tausche auf andere Exoten. 1,1 14 Wochen alte **Rottweiler** mit Stamb. verkauft [973
Walter Leßner, Liegnitz, Volkshaus Nord, Glaugauer Str. 20.

Stahlfleckentäubchen vom Senegal . . . . à Stück 4 M. [974
0,1 Ringeltaube, 2 3er Z. à 6 M.
Grünfüß. Teichhühner à . 6 M.
Gelbe Girlitze . . . . à 4 M.
Eduard Lobeck, Restaurant, **Herne.**
NB. **Tausche auch Fasanen ein.**

Wegen Wohnungsveränderung muß ich abgeben:
4 sehr gute Zuchtpaare prima **Wellensittiche,** erfolgreich gebrütet, 1½—2 Jahre alt, je 15.— M. Bei Abnahme im ganzen 60.— M. einschließlich Verpackung. [975
Dr. Stoltze, Böblingen, Walddurgstr. 86.

Versäumen Sie nicht das Abonnement der „Gefiederten Welt“ zu erneuern!

“KAPPEL“

Schreibmaschine

Erstklassiges Erzeugnis ∴ ∴ Strapaziermaschine

Letzte Neuerung:
Geräuschloser
Wagenrücklauf

Maschinenfabrik Kappel A.-G.
Chemnitz-Kappel

Papageie

Graupapageien	
Blaustirnpapageien	
Gelbnackenpapageien	
Guatemalapapageien	

Albert Ramsperge
Bremen
Steffensweg 48—50.
Tierimport.

Junge Graupapage
sprechend, sehr gelehrig, schwarzäug.
ditto hellängig, 150.— und
Junge Amazonen, plapp. 50.— u.
Junge gr. weiße Gelbhaubenkakadus
Feuerflügelsittiche . . . Paar
Pit Pitts-D. cayana (L) . „
Blaukappentangare . . „
Violettbl. Organisten . . „
Siebenfarben-Tangare, Männchen
Waglers Trupial . . „
Schamadrossel . . . „
Dayaldrossel . . . . „
Rote Kardinäle . . . „
Chin. Nachtigallen . . „
Indigo- u. gr. Kubafinken je Paar
Atlasfinken i. voll. Pracht. Männch.
reizende, zahme Pinselläffchen
und vieles andere. Anfrage Rück
beilegen.
Kaufe
0,1 rote u. schwarzköpf. Gouldsamad
Friedrich Frank, Münche
Gabelsbergerstr. 9.

Verkaufe
1 Ia gelb. Wellensittich-Zuchtweibch.
Otto Nitsche, Ronneburg (Th

Weiße Kanarienhähne . .
weißbl., gelb od. gesch. 15—
Papstfinken . . . . à Paar
Zebrafinken . . . . à Paar
Möwchen . . . . . à Paar
Silberschnäbelchen . à Paar
Orangebäckchen . . à Paar
Tigerfink., Amaranten, Astril
Schmetterlingsfinken à Paar
Grauedelsänger . . . Stück
Kl. Kubaweibchen . . . .
Karl Gruber, Wiesba
Westendstraße 36.

Gebe ab:
eine Ia Schamadrossel, erstkl
Sänger und Spötter, 24er Import
glatt im Gefieder, zu 60 M., evtl.
Tausch (der Hälfte des Betrages) a
getrocknete diesjähr. Ameiseneier
ältere Jahrgänge der Gefiederten
ferner vertausche eine **Feldlerche,**
Sänger, gegen 4 Liter frische od
trocknete Ameiseneier.
Oswald Saurbier, Arnsta
Holzmarkt 11.

Tier-Liebhab
langjährig. Tierpfleger mit Ia Refere
sucht Stellung als Inspektor oder F
meister in Zoologischem Garten,
größerer Tierimportfirma evtl. mit
seereisetätigkeit oder bei vermöge
Liebhaber im In- und Ausland.
Angebote unt. **K. K. T.** a. die „Gef. W

Chinchilla
Alte und Junge, kauft zu
Preisen, wenn reinrassig,
Paul Ahrens, Lübeck, Königstr

Wir machen unsere Leser au
der heutigen Nr. beilege
Prospekt der Maschinenfa
Kappel A.-G., Chemnitz-Ka
besonders aufmerksam.

Inserate
für das am 30. Juli 1925
Ausgabe gelangende Heft 3
Ges. Welt erbitten bis 25.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 14
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 30. Juli 1925 | Heft 31

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Von meinen Grauedelsängern und anderes.

Von Fritz Braun.

(Nachdruck verboten.)

Mit den ersten Grauedelsängern, die ich seinerzeit verpflegte, war nicht viel los; sie waren stumm wie die Fische. Der eine von ihnen sang späterhin, aber nur, wenn ich ein Männchen der gleichen Art zu ihm setzte. Das verfolgte er dann aber so ingrimmig, daß man es schleunigst in Sicherheit bringen mußte.

Jedoch gerade solche Mißerfolge pflegten meinen Eigensinn immer anzustacheln. Daher ruhte ich nicht eher, als bis ich einen Grauedelsänger erhielt, der den begeisterten Schilderungen, die ich in der Literatur von dieser Art gefunden hatte, durchaus entsprach. Dieser kleine Kerl schnatterte schon in dem Versandkäfig, in dem der Postbote ihn zu mir brachte. Das war lange vor dem Weltkrieg, und doch ist dieser Zwerg auch heute noch frisch und munter, obgleich er ein halbes Menschenalter lang eigentlich nur Hirse, Glanz, Mohn und Vogelmiere erhalten hat. Bei so einfacher Kost sang er das ganze Jahr hindurch. Zum mindesten ließ er frühmorgens, gleich bei dem Erwachen, zwei-, dreimal seinen hellen Schlag hören, so daß man gerade bei ihm in bezug auf den Gesang von einer bestimmten „Weckhelligkeit" reden könnte. Ebenso begann er ganz sicherlich zu singen, wenn ich ihm einen kleinen Käfig vorhielt, in dem irgendein Singvogelmännchen darin saß.

Von Anfang an war dieser Grauedelsänger ziemlich träge und bewegte sich eigentlich nur, wenn er zum Futter oder Wasser wollte. Schon nach kurzer Zeit durfte ich die Türe seines Behälters getrost sperrangelweit auflassen; er dachte nicht ans Entweichen. Bei diesem geregelten Leben wurde er recht schreckhaft; kam ihm etwas befremdlich vor, so verfiel er in Schrecklähmung. Anfangs jagte auch mir das einen gehörigen Schreck ein; bald nahm ich aber diese offenbar ganz harmlosen Erscheinungen nicht mehr tragisch. Mitunter sah dieser Vogel recht jämmerlich aus; sein Hinterkopf war kahl und leise gerötet, seine Augen waren leicht geschwollen und seine Schwungfedern so starr gewachsen, daß die Flügel wie Bretter vom Leibe abstanden. Aber merkwürdigerweise beeinflußte alles das kaum seine Spannkraft. Er blieb nach wie vor im Gesang, und wenn die Mauser kam, konnte er sich in Kürze wieder in anmutigerer Tracht vorstellen. Immer wieder war ich geneigt, die geschilderten Gebrechen für Alterserscheinungen zu halten, aber immer wieder sah ich meinen Irrtum ein. Die brünstige Erregung, die diesem Vogel noch heute beim Anblick eines anderen Männchens überkommt, läßt mich vermuten, daß er auch als Gatte seine Pflicht noch vollauf erfüllen könnte. Eines ähnlichen Falles von Langlebigkeit allerkleinster Finkenvögel weiß ich mich wirklich nicht zu entsinnen.

Weil ich mir aber trotz alledem sagen muß, auch dieser Vogel könne nicht unsterblich sein, sah ich mich seit dem letzten Herbst nach anderen Edelsängern um. Dabei erlebte ich viel Tragikomisches. Die Gatten des zuerst erstandenen Pärchens sind zwar mitunter sehr zärtlich, aber abgesehen von dem kosenden Gewisper, das es in den seltenen Schäferstunden hören läßt, hat das Männchen bisher unbeirrt geschwiegen, selbst dann, wenn mein temperamentvoller Greis beständig drauflosschmettert. Als ich dann die nächsten Edelsänger bestellte, erhielt ich die Antwort, die vorhandenen Vögel hätten sämtlich kahle Köpfe. Trotzdem ließ ich mir ein paar Männchen schicken. Das eine hatte sich unterwegs wohl erkältet und ging bald darauf ein. Der überlebende Edelsänger sah anfänglich aus wie eine Mumie; seine Flügel ähnelten fast denen einer Kohlmeisenmumie, die mir neulich zugetragen wurde, weil sie in einem Nest brütend dasaß, das Hummeln mit ihrem Staat umbaut hatten. Heute hat dieser Edelsänger neue Kopffedern und sieht auch sonst schon etwas erträglicher aus; er läßt aber keinen Laut hören. Ähnlich ging es mir bei der nächsten Sendung. Aber ich dachte: nur nicht nachlassen! und bestellte wieder neue Edelsänger. Nun erhielt ich neben einem erkälteten, hustenden Vogel, der schon nach 24 Stunden tot war, ein auffällig kräftiges Männchen, das aber zu meinem Erstaunen immer auf einem Bein saß. Weil ich dachte, es hätte sich unterwegs irgendwie verletzt, fing ich es heraus und stellte fest, daß der Vogel keine Spur eines zweiten Schenkelstumpfs besaß. Ich nehme an, daß es sich um einen Vogel handelt, der schon als Einbein geboren ist. Dafür spricht auch der Umstand, daß dieser Krüppel sich mit einer Sicherheit bewegt, die man bei einbeinigen Vögeln

sonst nicht wahrnimmt. Vermutlich ist auch der Händler auf diesen Fehler gar nicht aufmerksam geworden.

Weil ich annahm, daß die Vögel empfindlich seien — mehrere starben ja gleich nach der Ankunft an Krankheiten der Atmungsorgane —, ließ ich sie einzeln in den ringsum geschützten Versandkäfigen weiter hausen, die ich zu einem hohen Käfigprisma übereinanderstellte. Da sitzen sie nun und schweigen um die Wette. Ich aber laufe mit dem Käfigstapel jedem Sonnenstrahl nach, der meine Wohnung trifft, ohne das Geringste zu erzielen, so daß ich schon den Spott meines Sohnes herausforderte, der mir zurief: „Vater, setz' doch lieber Springhähne in die Springhahnhäuser! Die singen doch wenigstens." Nach der Größe und den dunkeln Schaftflecken zu urteilen, sind mindestens die meisten dieser Vögel Männchen, sicherlich z. B. das große Einbein. Trotzdem locken sie nicht einmal. Schon wieder hatte ich mir neue Edelsänger bestellt, da widerrief ich doch noch den Auftrag, denn einmal duldet das schon sowieso lächerlich wirkende Käfigprisma keine weitere Erhöhung, und zum anderen gelangte ich schließlich doch zu der Erkenntnis, die Tücke des Objekts möchte noch größer sein als meine Zähigkeit.

Demzufolge kann ich allen denen, die sich einen Grauedelsänger kaufen wollen, nur den guten Rat geben, diesen Plan nur in dem Fall zu verwirklichen, wenn sie den Vogel bei dem Händler schon selber früher singen hörten. An sich kann man ihre Absicht ja nur billigen; habe ich selbst doch nur an wenig Vögeln mehr Freude erlebt als an dem einzigen Senior meiner Vogelstube. Sollte der Sänger, den sie in der Handlung entdeckt haben, nebenbei einen kahlen Kopf besitzen, so macht das nicht viel aus; jedenfalls darf es nicht als Zeichen geminderter Lebenskraft angesehen werden.

Trotzdem habe ich mir schon lange darüber den Kopf zerbrochen, woran es nur liegen möge, daß gerade diese Vogelart fast durchgängig kahlköpfig wird und sich uns bei den Händlern immer wieder in so brüchigem Gefieder zeigt, als hätten die Tiere mehrere Tage in trockener Erde gelegen. Gerupft sind solche Kahlköpfe nicht — mein Greis war zeitlebens in Einzelhaft, und bestoßen haben sie sich auch nicht; dazu sind z. B. die Bewegungen meiner Pfleglinge in ihren winzigen Gelassen gar nicht ungestüm genug, und doch ist ein auf die Dauer voll befiederter Edelsänger geradezu als Ausnahme zu bezeichnen. Der eine badet und wird kahl, der andere badet nicht und wird auch kahl; mancher sieht aus wie ein Strauchdieb und singt doch, wie mein Vogelgreis, aus vollstem Hals. Wie reimt sich das alles zusammen? Ganz unwillkürlich denke ich dabei an die Sumpfmeisen, die sich in der Gefangenschaft fast regelmäßig kahl rupfen; im warmen Zimmer ebenso gut wie in der schattigen, kühlen Kammer; bei Weichfutter und animalischer Kost genau so wie bei reinem Körnerfutter. Auch hinsichtlich dieser Tierchen habe ich mir schon Jahr und Tag über die Ursachen solchen Treibens den Kopf zerbrochen, ohne doch über recht fragwürdige Annahmen hinauszukommen.

Befremdlich genug ist ja auch der Umstand, daß so viele Edelsängermännchen nicht singen, obgleich ihnen ersichtlich nichts Besonderes fehlt. Aber verhält es sich bei unseren Grünfinken nicht ähnlich? Wieviel gesunde Männchen besaß ich nicht schon, die jahraus, jahrein keinen Ton hören ließen, während andere trotz dem fleißigsten Kanarienvogel schmetterten und rollten. —

Ein Teil meiner Vögel überwinterte heuer in einem großen, hellen Zimmer, an dessen Wänden immer wieder Schimmelpilze wuchsen. Bei der lichten Weite des ansehnlichen Raumes nahm ich dann keinen Anstoß, bis sich Krankheitserscheinungen einstellten, die ich nun doch auf das ungesunde Zimmer zurückführen möchte. Die betreffenden Vögel — 1 Berghänfling, 1 Stieglitz, 1 Dompfaff — erkrankten an einem Darmkatarrh, der ihre Sangeslust weniger beeinträchtigte als ihre Beweglichkeit. Sie bewegten sich so steif und hölzern, als ob sie verspakt wären, und eines schönen Morgens sah ich, daß der Stieglitz — das liegt nun schon wochenlang zurück — die nur spannhoch vom Käfigboden entfernten Sitzstangen nicht mehr erreichen konnte. Nun schaute ich jeden Morgen neugierig nach dem Vogel hin, in der Erwartung, ihn als Leiche wiederzufinden. Aber er saß Tag für Tag in alter Weise da. Als dann die Sonnentage des April kamen, trug ich die Vögel, denen ich sonst als Heilmittel nur Opiumtinktur gab (5 Tropfen auf 1 Liter Wasser), jedem Sonnenstrahl nach. Der Dompfaff ist heute gesund, der Berghänfling würde trotz seiner spitzen Brust jedem Laien so erscheinen, und der Stieglitz vermag schon wieder ganz erträglich zu fliegen. Und doch gelten sie mir alle drei als unsichere Kantonisten; übers Jahr werde ich in jenem Zimmer wenigstens so viel heizen lassen, daß die Schimmelbildung verhindert wird, denn ich glaube noch immer, das Leiden der Vögel muß damit ursächlich zusammenhängen.

Was meine Wahrnehmungen an freilebenden Vögeln anlangt, so habe ich noch keinen so vogelarmen Winter erlebt wie den milden Winter 1924/25. Das kann nicht nur daran liegen, daß die Gefiederten heuer ihren Standorten in Wald und Feld treu blieben und jede Annäherung an die menschlichen Wohnstätten unterließen. Vermutlich müssen wir dafür auch den Umstand verantwortlich machen, daß in dem harten Winter 1923/24 fast alle überwinternden Vögel bei uns zugrunde gingen, so daß bei allen den Arten, die gleichzeitig Zug-, Strich- und Standvögel aufweisen, nur die Angehörigen der ersten Gruppen übrigblieben. Bis sich von denen wieder Standvögel abgezweigt haben, dürfte wohl noch einige Zeit dauern.

Nordische Zugvögel ließen sich wohl schon vor den Schneefällen im November sehen (Leinfinken), verschwanden dann aber gänzlich, um erst wieder vor den gewaltigen Niederschlägen im März in größerer Anzahl aufzutauchen. Nun konnte ich allerdings noch, gewissermaßen in letzter Stunde, Schwärme von Seidenschwänzen beobachten, die wohl nach Hunderten zählten und den ganzen geräumigen Hochwaldpark der Königstaler Blindenanstalt in eine von Vögeln wimmelnde Voliere verwandelten. Auch an Bergfinken war jetzt kein Mangel. Dagegen ist es recht auffällig, daß ich heuer keinen Berghänfling und keinen großen Gimpel zu Gesicht bekam.

Erst als die Zugzeit unserer Landsleute einsetzte, gab es wieder mehr Vögel zu sehen. Jetzt erst, fast ist es komisch, das zu berichten, schwebten wieder Haubenlerchen über unseren Kiesgruben, Haubenlerchen, die sich im Winter 1923/24 zu Dutzenden auf den Müllabladeplätzen herumtrieben, nun erst hörte man wieder den Lockruf der Buchfinken, jener Art, von der im vorletzten Winter starke Schwärme in den Meldedickichten am Rande unseres Hochschulsportplatzes durch Kälte, Katzen und Hunger — das Schlimmste nenne ich wohl zuletzt — aufgerieben wurden.

Erst gegen Ende des März begannen unsere Vogelfänger, auch außer Erlenzeisigen noch ein paar Gefiederte zu berücken. Da trat ich wieder meine Rundgänge zu ihnen an, obgleich ich mir sagte, es sei eigentlich der hellste Blödsinn, noch mehr Vögel zu erwerben, weil ich die vorhandenen schon beim besten Willen nicht mehr recht unterbringen konnte.

Aber Vogelliebhabern soll man nicht viel von der Vernunft reden; die sind eben besessen. Ging ich dann mit einem Päckchen winziger Lockvogelkäfige, in deren jedem ein neuer Piepmatz steckte, gemächlich nach Hause, so zerbrach ich mir ganz gehörig den Kopf, wie ich durch allerlei gewagten Wohnungstausch Unterkunft für die neuen Pfleglinge gewinnen könnte. Und das war trotzdem schwer genug. Neulich mußte ich durch große Pappscheiben einen geräumigen Käfig dreifach teilen, um frisch erstandene Bergfinken unterzubringen, die mir in den Gesellschaftsbauern allsogleich ihre Genossen am Kopf kriegten, daß die Federn nur so stoben. Und meine Frau sagte: „Fritz, wozu brauchst du nur ausgerechnet Bergfinken? An denen wirst du doch nicht mehr viel lernen!“ Aber die schwarzköpfigen Quäker sahen doch so wunderschön aus, und mit dem Lernenkönnen ist es auch solche Sache; in meinem Schlafzimmer hängt augenblicklich ein ganz gewöhnlicher Zeisig im Einzelbauer, der sich wieder einmal aus (X × I) Vogelliedern seinen Singsang zusammengestellt hat. Von wem könnte man nicht lernen? — Selbstverständlich hat meine Frau recht, aber ich selbst auf meine Art doch auch, denn hätte ich anders gekonnt, so würde ich heute wohl kaum auf einen ähnlichen Schatz von Erfahrungen zurückblicken.

Eisvogel.

Der Eisvogel.

Von P. Arens, Hannover.

(Nachdruck verboten.)

Es gibt kaum einen Vogel, welcher widersprechender beurteilt wird, als der „Eisvogel (siehe obenstehende Abbildung). Hermann Loens nannte ihn: „den Schönsten von allen“, „das Juwel der Vogelwelt“. Nach ihm nimmt er nur ab und zu ein Fischchen, nährt sich hauptsächlich von Insekten. Die Fischzüchter hassen ihn von Grund ihrer Seelen ob seiner notorischen Räubereien, für sie ist er nicht besser aufgehoben, als auf dem Hute der Fischmeisterfrau. Sie meinen, keine Ursache zu haben, einen so ausgesprochenen Schädling bloß deshalb zu schonen, weil er sein sträfliches Handwerk in einem buntschillernden Kleide ausübt.

Wie sind solche widersprechenden Beurteilungen zu vereinen? Zur Lösung dieser Frage sollen die folgenden Ausführungen beitragen. Als Legitimation für die Eignung, eine solche Streitfrage sachgemäß beleuchten zu können, möchte ich mich einerseits als überzeugten „Natur-, im besonderen Vogelfreund“ vorstellen, dem das Bestreben, durch eigene Beobachtungen hinter die Zusammenhänge und Geheimnisse der Natur zu kommen, seine liebste Beschäftigung ist, andererseits aber auch als „Jäger“ und, was für die vorliegende Frage die Hauptsache ist, als früheren langjährigen „Forellenzüchter“. Demnach sind in mir Seelen vereint, die mich sehr wohl befähigen, in der vorliegenden Frage beiden Seiten gerecht zu werden.

Tatsächlich ist es ein herrlicher Anblick, bei hellem Sonnenschein den Eisvogel wie einen Pfeil die Gewässerstrecke entlang schießen oder gar den Beobachter in einem scheuen Bogen umfliegen zu sehen. Es scheint dann ein in smaragdenen Farben glänzender Edelstein Leben bekommen zu haben und durch seinen Anblick erfreuen zu wollen. Jedem Beobachter drängt sich da die Frage auf: „Weshalb hat man so einen Anblick so selten?“

Die Naturschützer machen sich die Beantwortung dieser Frage leicht, indem sie „behaupten"! „Weil der Eisvogel durch die Verfolgung der Fischzüchter so gut wie ausgerottet ist". Weit gefehlt! Er ist tatsächlich keineswegs so selten, wie gemeinhin angenommen wird, es gehört aber eine gewisse Kenntnis seiner heimlichen Lebensgewohnheiten dazu, um ihn, wie alle Vögel einseitiger Lebensbedingungen, auffinden und sichten zu können, namentlich nachdem er um so mehr auf abseits liegende Gewässer gedrängt ist, nachdem die allgemeine Begradigung der Flüsse und Bäche, das Umwandeln von Altwässern und Schlenken zu Ackerland und ähnliches seine Lebensbedingungen arg beschnitten haben. Wer es aber versteht, die wegelosen, heimlichen, versteckten und einsamen Gewässer mit offenem und vor allem jederzeit aufnahmefähigem Auge und mit Vorsicht zu begehen, namentlich da, wo sich Jungfische aufzuhalten und anzusammeln pflegen, der hat den Genuß, das Juwel der Vogelwelt sichten zu können, weit öfter, als er denkt, wenn das auch früher, wo die Kultur noch nicht so weit vorgeschritten war, noch nicht jedes Fleckchen der Hervorbringung menschlicher Nahrung hat dienen müssen, viel leichter glückte.

Unbeweglich, in stoischer Ruhe, wie es einem Anstandsjäger geziemt, sitzt er auf einem über das Wasser ragenden Zweige eines Busches, mit nach unten gerichtetem Blicke auf kleine Fische, auch im Wasser lebende Käfer- und Libellenlarven spähend, die er dann mit plötzlichem bis ½ Meter tiefen Stoßtauchen erbeutet, solche in einer Länge bis 4 Zentimeter sofort kröpfend, größere durch Schlagen gegen seinen Sitz erst tötend. Seine breiten Schultern, der dicke und schwere Kopf, der lange Schnabel, umgekehrt der schmale Hinterkörper, die schwachen Beinchen und Füßchen, welche nicht zum Gehen oder Hüpfen, sondern nur zum Sitzen eingerichtet sind, rücken den Schwerpunkt seines Körpers weit nach vorn, wodurch ihm das Stoßtauchen sehr erleichtert wird. Ist nun ein so gebauter Vogel ein „Insektenfänger", zu dem ihn Löns und nach ihm sogar ernst zu nehmende naturwissenschaftliche Werke stempeln? Ganz abgesehen von dem vor sichtbaren Augen vorgehenden steten Erbeuten kleiner Fische beweisen die kalkstriezigen, denen der Reiher gleichenden Exkremente, die er vielfach beim Abstreichen von sich gibt, hinreichend den Fischfresser, ebenso die zahlreichen Mageninhaltsuntersuchungen der Wissenschaftler. Zu dem Märchen, daß der Eisvogel sich vorherrschend von Insekten nähre, hat hauptsächlich der Umstand beigetragen, daß in seinen an senkrechten Uferwänden in ½ bis ¾ Meter tiefen Löchern befindlichen Nestern mitunter Libellenflügel und -Reste gefunden sind, die er ganz gelegentlich beim Vorüberfliegen an seinem Sitzorte mühelos erbeutet und seinen Jungen zugetragen hat, während die aus Gewöllen stammenden Fischreste, Schuppen und starke Gräten, die obendrein die Hauptunterlage des Nestes bilden, unerwähnt bleiben. Seine nicht abzuleugnenden, tatsächlich die Hauptnahrung bildenden „Fischfänge", um im Sinne der Fischzüchter zu sagen „Fischräubereien" sollen weiter unten noch ausführlicher in das rechte Licht gerückt werden. Vorerst sind noch weitere besondere Eigenschaften des Eisvogels zu besprechen, noch dazu da diese auch einiges naturwissenschaftliches Interesse bieten.

Wenn ein Vogel, wie es beim Eisvogel der Fall ist, auf der Oberseite grünschillernd, an der Unterseite dagegen ziegelrot gefärbt ist, so muß das von vornherein zu bedenken geben und fordert heraus, dem Zwecke dieses auffälligen Unterschiedes nachzuspüren. Nun mit seiner grünschillernden Oberseite geht der Eisvogel in dem Blättergewirre des Busches, auf dessen hervorragenden Zweigen oder unter dem er seinen Ansitz ausübt, noch mehr in dessen glitzerndem Wasserspiegelbilde vollständig auf. Mit solchem Kleide ist er also gegen Sicht von oben gedeckt, nicht bloß vor dem Auge des Menschen, sondern erfahrungsmäßig auch vor dem der Raubvögel, namentlich dem des Sperbers, der mit Vorliebe die Zäune und Bachufer absucht. Das ist aber auch notwendig, denn er kann sich bei seinem nach unten, auf Erspähung von Beute gerichteten Blicke nicht auch zu gleicher Zeit noch nach oben sichern, wie es beispielsweise die Schnepfe beim Würmen kann, deren Augen sich behufs dessen hoch oben am Kopfe befinden, dafür aber der Stecher an der Spitze mit einem feinen Gefühle für passende Nahrung ausgerüstet ist, sie also nicht, wie der Eisvogel, notwendig auf sie nach unten zu blicken braucht. Eine Parallele, welche so recht zeigt, daß die so vielfach angefeindeten zu- und abgeleugneten Zweckeinrichtungen in der Natur doch vorhanden sind. Wie alle auf diese Weise gegen Sicht geschützten Tiere verläßt sich auch der Eisvogel gern auf diese Deckfarbe, bleibt einfach sitzen, wenn er sich unbemerkt glaubt. Dies Vertrauen ist aber ebenso wie beispielsweise beim Hasen mit größter Scheuheit gepaart. Wenn ihm interessiertes oder gar unvorsichtiges Benehmen des Beobachters nicht geheuer vorkommt, so veranlaßt ihn das, sein Heil in rechtzeitigem Abstreichen zu suchen. Jedem, dem sein schriller Pfiff nicht bekannt ist, den er beim Abstreichen, gewissermaßen „höhnend", sehr oft hören läßt, der weiß gar nicht, daß er sich in der Nähe eines Eisvogels befunden hat. (Fortsetzung folgt.)

Etwas über die Ernährung zarter Weichfresser.

Von Karl Finck, Neukölln.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Selbstverständlich darf man derartige Leckerbissen nur zu bestimmten Zeiten reichen, sonst gewöhnen sich die Tiere das lästige Betteln an. Ein umsichtiger Wirt läßt außerdem lebende Insekten tagelang weg, damit sich die Vögel im Notfalle auch mit dem anderen Futter begnügen.

Frische Ameisenpuppen stehen uns meistens vom Mai bis August, also nur drei bis vier Monate zur Verfügung, während geeignete Kerfe über ein dreiviertel Jahr aufzutreiben sind. Zarte Wurmvögel lassen sich ohne besondere Mühe die längste Zeit des Jahres naturgemäß ernähren. Auch die Winterfütterung wird durch selbst getrocknete Insekten ungemein erleichtert.

Der Insektenfang ist mit geeigneten Vorrichtungen durchaus nicht schwierig und sehr ergiebig. Die

Sache muß nur praktisch angefaßt werden. Der Liebhaber braucht keineswegs täglich stundenlang anstrengende Jagden betreiben, sondern er kann auf seinen sonntäglichen Spaziergängen genügend lebendes Futter für die ganze Woche gewinnen.

Abgetötete Kerfe halten sich, flach ausgelegt, ziemlich lange. Selbst halb eingetrocknete Raupen, Schmetterlinge, Käfer usw. erweichen auf nasser Unterlage schnell wieder.

Alle Wurmvögel nehmen auch größere Schmetterlinge, fein zerschnitten, ohne weiteres an und solche bilden getrocknet für empfindliche Arten ein wertvolles, unentbehrliches Winterfutter.

In meinem Würgeraufsatze (Heft 40, 41 und 42 1924) habe ich verschiedene Fangarten erwähnt; es gibt aber noch andere lohnende Methoden, deren Mitteilung bei Beginn der Vegetation erfolgen soll.

Neue, gangbare, praktisch erprobte Wege müssen zum Wohle unserer schönen Liebhaberei größere Verbreitung finden, schon damit überall das Verständnis für die herrliche deutsche Ornis geweckt wird.

Gewiß werden im Frühjahre verschiedene Vogelpfleger mit der Verfütterung lebender Insekten Versuche anstellen, ebenso die einzelnen Fangweisen erproben, und ich möchte sie jetzt schon bitten, gemachte Erfahrungen dann in der „Ges. Welt" zu veröffentlichen.

Festbegründete Urteile sind eben nur bei reichem, vielseitigem Material möglich.

Die Erbeutung der beweglichen Tagesschmetterlinge mit einem Netz ist umständlich, namentlich erfordert die Herausnahme viel Zeit. Einfacher, dabei viel lohnender ist das Abstippen im ruhenden Zustande mit einer Leimspindel. Dazu eignet sich jeder trockene Grashalm, dessen eines Ende wenig umgebogen wird. Die Bugstelle bestreicht man ganz dünn mit eingedicktem Leinöl. Selbstverständlich muß der Klebestoff zeitweise erneuert werden. Doch soll der Aufstrich stets mäßig sein, damit Schmetterlinge und sonstige Insekten nicht beschmutzt werden. Bei einiger Erfahrung und Übung ist die Ausbeutung häufig erstaunlich. Gefangene Falter werden durch kräftiges Eindrücken des Brustkorbes getötet. Stark verleimte Stellen sind zu entfernen.

In manchen Sommern treten bei uns der große Kohlweißling (Pieris brassicae *L.*), sein kleinerer Vetter (Pieris rapae *L.*), der Rübensaatweißling (Pieris napi *L.*) und noch andere Schmetterlinge massenhaft auf.

Der Kiefernspinner (Gastropacha pini), die Nonne (Liparis monacha) und Kieferneule kommen z. B. periodenweise häufig vor. Von den beiden zuerst erwähnten Spinnern sitzen die trägen Weibchen tagsüber an den Baumstämmen, und der Vogelfreund kann sie ohne Umstände einsammeln.

Bei trübem Wetter, ebenso in der heißen Mittagszeit, hocken träumerisch auf Blumen verschiedene Cheloniarier, Eulen, Spinner, manchmal auch Zünsler und Wickler.

Der Baumweißling gehört wieder in Niederösterreich, Steiermark und Süddeutschland strichweise keineswegs zu den Seltenheiten.

Überschüssige Schmetterlinge werden für den Winter abgetrocknet; es geschieht am besten in der Weise, daß man die Falter mit einer Schere klein schneidet und zwischen den Teilchen trockene Ameisenpuppen mischt. Das Gemengsel trocknet ziemlich schnell.

Der Sumpfrohr-, Teichrohr- und der große Rohrsänger (Rohrdrossel) fangen mit Vorliebe die unansehnlichen Schmetterlinge der Rohreulen, wovon ich nur die gemeine Rohrkolbeneule (Nonagria typhae) erwähnen möchte. Die schmutzig fleischfarbene Raupe lebt in den beiden Rohrkolbenarten. Auch die Raupe der Graseule (Charaeas graminis) und die der Queckeneule (Hadena basilinea) findet man vielfach auf Sumpfgräsern.

Ebenso werden Spannräupchen, Spinnen, Fliegen, Mücken, Motten, zartere Käferchen usw. erbeutet.

Besonders scheinen die kleinen Rohrsänger, Laubvögel und der Gelbspötter grüne Blattläuse zu lieben, während die schwarzgefärbten Sorten weniger Beachtung finden. Anscheinend wird der Geschmack durch die Wirtspflanze beeinflußt, so wurde z. B.

Sporenkiebitz (s. S. 362).
(Aufnahme des Zoologischen Gartens Berlin).

die Mohnblattlaus (Aphis papaveris *Fb.*) von Mohn und Puffbohnen nicht genommen, dagegen aber, wenn sie auf Schwarzwurzel, Kerbel, Melde usw. sitzt.

Man lernt eigentlich nie aus. In der harten Kriegszeit wurden die verschiedensten Ersatzfuttermittel verwendet.

Der Samen aller Lupinensorten (Lupinus) enthält außer Alkaloide noch ein anderes Gift, das sogenannte Iktrogen, die beide schädlich wirken und bei Schafen, Rindern usw. gefährliche Krankheiten verursachen.

Aus diesem Grunde müssen Lupinenkörner vor der Verfütterung entbittert werden, was durch längeres Auslaugen im Wasser geschieht.

Hühner beachten nicht Lupinen, nehmen aber entgiftete, wieder getrocknete Körner begierig an, obwohl sich solche äußerlich von unbehandelten Samenkörnern nicht unterscheiden.

Wiederholt habe ich die gleiche Anzahl un- und entbitterten Lupinen gemischt. Stets blieben die bitteren Körner zurück. Das genaue Nachzählen schloß jeden Irrtum aus.

Diese Beobachtung veranlaßte mich auch gewisse Insekten, die sonst von Wurmvögeln verschmäht werden,

kürzere oder längere Zeit auszuwässern, und ich habe damit ganz eigenartige, vorzügliche Erfahrungen gemacht.

Jedenfalls können wir zarte Insektenfresser billig und beinahe das ganze Jahr hindurch naturgemäß ernähren.

Im Frühjahr werde ich die Versuche fortsetzen und genaue, vergleichende Resultate bekannt geben.

Grüne Raupen verlieren, wenn sie einen Tag hungern müssen, oftmals ein Drittel des Gewichtes. Der Abgang ist hauptsächlich auf Konto des wegfallenden Magen- und Darminhaltes zu setzen, der aus teilweise schon halbverdauten Pflanzensäften resp. Geweben besteht.

Wurmvögel nehmen im gewissen Sinne auf Umwegen etwas pflanzliche Nahrung zu sich, die allerdings chemisch bereits aufgeschlossen oder umgruppiert ist. Dieses eigenartige Verhältnis läßt sich durch kein künstliches Futter ersetzen. (Schluß folgt.)

Bewaffnete Vögel.

Von Ingo Krumbiegel, Dresden.

(Nachdruck verboten.)

Was wir Großstädter so für gewöhnlich an gefiedertem Volke zu Gesicht bekommen, verkörpert uns eigentlich die Unschuld und Wehrlosigkeit selbst. Spatzen, die auf der Straße um Brotkrumen streiten, Buchfinken und Meisen in den Anlagen, und der Kanarienvogel zu Hause im Bauer, sie sind samt und sonders wehrlose Gesellen. Auch wenn wir weitergehen, und uns das ganze Vogelreich anschauen, wird sich dieses Bild nur wenig ändern, und wir müssen schon die echten Raubvögel betrachten, wenn wir streitbare und wehrhafte Gestalten sehen wollen. Aber auch bei diesen sind die Waffen weniger zur Verteidigung als zum Nahrungserwerb da, einem Angreifer weicht der Raubvogel im allgemeinen aus, und nur, wo er in die Enge getrieben ist, stellt er nachdrücklich seinen Mann. Man kann gut und gern sagen, daß die gefiederte Welt mehr durch Schnelligkeit und Behendigkeit beim Ausreißen, als durch Waffen am eigenen Körper geschützt ist, die Vögel sind „Fluchttiere", wie wir sie bei den Säugetieren z. B. im Pferde vor uns haben. Wenn Wildpferde ihr Fohlen mit den Hufen verteidigen, so sind das Ausnahmezustände, sonst aber ist das Pferd seiner ganzen Organisation nach ein typisches Steppentier, und als solches auf das Dahinrasen über die unermeßliche Steppe eingestellt. Ähnlich liegen die Dinge bei den Vögeln als „Ausreißtiere". Wenn sie sich verteidigen müssen, so stehen ihnen nur wenige Waffen zur Verfügung. Ob ein eingefangener Waldkauz die Fänge in seinen Gegner zu schlagen trachtet und wie rasend um sich beißt, oder ein in Wut gebrachter Hahn mit den Sporen zuschlägt, immer sind es nur zwei Körperteile, die zu Waffen umgestaltet sind, nämlich Schnabel und Fuß. Und sicher ist es interessant, auch einmal von Vögeln zu hören, die noch an einer dritten Körperstelle eine ganz seltsame Waffe besitzen. Bekannt ist es ja, daß Schwäne ihre Brut mit Flügelschlägen verteidigen, die einem Schuljungen den Arm brechen können. Und bei manchen anderen Wasservögeln ist das Prinzip der Flügelverteidigung noch viel raffinierter ausgebaut, nämlich bei den Charadriiden, den Regenpfeifern. Wenn wir etwa einen afrikanischen Sarciophorus-Kiebitz vornehmen, dann sehen, oder besser fühlen wir vorn am Flügelbug einen ganz merkwürdigen kleinen Höcker, dessen Zweck für den Vogel uns nicht so recht einleuchten will. Aber interessant wird die Sache schon bei dem japanischen Microsarcops-Kiebitz: da hat der kleine Höcker vorn eine feine Zuspitzung erfahren, und noch schöner wird die Sache bei den echten Spornkiebitzen (s. Abb. S. 361), der Gattung Hoplopterus, die in mehreren Arten auch in Afrika, sowie in Südeuropa vorkommen. Noch länger und spitzer ist die Waffe bei dem afrikanischen Lappenkiebitz (Lobivanellus) geworden, und bei dem gleichfalls afrikanischen „Schwertflügel", wie man den Namen Xiphidiopterus übersetzen kann, endlich schaut ein richtiges Taschenmesser vorn an der Schulter heraus, an welchem man sich bei unvorsichtigem Hantieren mit dem ausgestopften Vogel ganz gehörig verletzen kann. Es ist recht interessant, daß gerade in Afrika eine verhältnismäßig sehr große Anzahl von solchen schwertbewaffneten Vögeln, auch aus anderen Familien als der der Regenpfeifer, vorkommt, eine Tatsache, die sicher näherer Untersuchungen wert wäre.

Die genannten Regenpfeifer gehören ja verwandtschaftlich alle ziemlich eng zusammen, aber nun wird unsere Betrachtung dadurch interessant, daß die Natur dieses Messer am Flügel gleichsam an mehreren Stellen ihres weiten Reiches gleichzeitig und unabhängig voneinander gemacht hat. Auch da wieder ein Anfang und ein Fortschreiten bis zur Vervollkommnung. Die tropischen, weit verbreiteten Blatthühnchen (Metopidius) haben einen stumpfen Höcker am Flügel; und die sog. Fasanenralle (Hydrophasianus) aus Südasien besitzt einen ganz scharfen, langen Flügelsporn, obgleich die ganze Gesellschaft mit der Sippe der Regenpfeifer blutwenig zu tun hat! Das Messer ist so stark entwickelt, daß der Vogel von den Zoologen mit dem Artnamen chirurgus bedacht wurde, weil seine Waffe einem richtigen Chirurgenmesser gleicht. — Sogar unsere allbekannte Gänsefamilie hat solche Dolchvögel in ihrer Mitte. Die afrikanischen Sporngänse (Plectropterus) (s. Abb. S. 364) haben ein stattliches Messer, aber eine andere Gans hat eine noch viel fortgeschrittenere Waffe, nämlich die südafrikanische Fuchsgans (Casarca cana), bei der zwei Messer hintereinander stehen, so daß eine Doppelwaffe zustande kommt; und diese Doppelwaffe führt uns zu der schönsten und höchstentwickelten Waffe, die in dieser Hinsicht im ganzen Vogelreich vorkommt. Eigentlich ist man gern geneigt, die Messerchen so kleiner Vögel wie der Regenpfeifer usw. für eine Art Spiegelfechterei zu halten, für eine Überproduktion der Natur, für eine Waffe, die theoretisch gut ausgedacht war, aber praktisch nicht all zu viel Nutzen bringen konnte, weil die also bedachten Vögel viel zu klein waren, um damit nachdrücklich auftreten zu können. Indessen, wenn man sieht, wie viele gerade von kleinen und kleinsten Arten sich diese Schutzwehr angeeignet haben, dann muß man doch von einem Nutzen gegen kleinere tierische Feinde

reden; und daß ein Vogel von der Größe und Stärke einer tüchtigen Gans auch schon gegen einen größeren Nesträuber losgehen kann, läßt sich sehr leicht denken. In den Arten, die erst stumpfe Höcker besitzen, müssen wir zweifellos werdende Schwertvögel erblicken, bei denen die Bewaffnung erst im Anfangsstadium vorhanden ist. Aber nun kommen noch einige Arten, bei denen der Begriff „Waffe" auch durch die Größe des ganzen Vogels selbst nachdrücklich unterstrichen wird — unter Umständen sogar dem Menschen gegenüber. Es handelt sich um Südamerikaner, die Palamedeiden oder Wehrvögel, Kerle, die einem in ausgewachsenen Exemplaren bis weit über die Knie reichen können. Die eine Gattung, Palamedea, bietet des Interessanten viel, indem ihr vorn auf der Stirn ein nach vorn geneigter Hornstab herausschaut, für dessen Zweck und Sinn man noch nicht die geringste Erklärung hat (s. Abb. S. 366). Als seltener Gast ist der stattliche Vogel zurzeit im Stelzvogelhaus des Berliner Zoologischen Gartens zu sehen. Von der anderen Gattung der Wehrvögel, Chauna (s. Abb. S. 365), kennt man zwei Arten: den Weißwangenchauna und den einfarbigen, letzterer ebenfalls Zooinsasse. Und nun zu der seltsamen Waffe dieser Vögel! Für gewöhnlich ist sie unter den Federn verborgen, so daß die Masse der vorüberströmenden Besucher keine Ahnung von der Bewaffnung dieser seltsamen Vögel hat. Wenn man sich aber einmal die Mühe nimmt, die Tiere länger zu beobachten, dann kann man wohl einmal die Messer zu Gesicht bekommen, wenn der Vogel seine Flügel lüftet. An dem Skelettbild sieht man sehr schön die mächtige Entwicklung der beiden Sporen am Flügelbug und am Mittelhandknochen (s. nebenstehende Abbildung).

Die Wehrvögel sind ganz besonders interessant dadurch, daß sie, wie nicht allgemein bekannt ist, wegen ihrer Wehrhaftigkeit in Südamerika als „gefiederte Hofhunde" verwendet werden, nämlich zur Bewachung des Hühnerhofes. Wenn man namentlich den Chaunavogel auf seinen kolossalen, stämmigen roten Beinen gravitätisch herumstolzieren sieht, dann kann man sich ausmalen, daß er einem Geflügeldieb unter Umständen gehörig eins auswischen kann, wenn er auf ihn losstürzt und ihn mit seinen haarscharfen und immerhin fingergliedlangen Dolchen bearbeitet.

Nochmals melanotische Stieglitze.

Von Wilhelm Schreitmüller, Frankfurt a. M.

(Nachdruck verboten.)

Bereits in einem der letzten Hefte der „Gef. Welt" 1925 berichtete ich über Fälle von Melanismus bei Gimpeln, Stieglitzen und Feldlerchen, wobei es sich um Vögel handelte, welche vor dem Auftreten der Schwarzfärbung normal gefärbt waren, also um Tiere, welche erst durch Einfluß nicht genau bekannter Ursachen letztere Färbung annahmen, deren Entstehung angenommener Vermutungen zufolge durch unnatürliche, nicht dem Zweck entsprechende Ernährung, Haltung und Pflege hervorgerufen oder infolge hohen Alters der Vögel erst nach längeren Jahren ihrer Gefangenschaft zum Auftreten des Melanismus Veranlassung gab.

Daß auch Fälle vorkommen, welche, durch ausschließliche Grünzeugfütterung erzeugt, dieselben Erscheinungen hervorrufen können, beweist eine Veröffentlichung von J. Spalinger, Winterthur i. d. Schweiz, welcher über das „Sichschwarzfärben" jung aufgezogener Distelfinken wie folgt berichtet:

. . . „An einem Frühlingsmorgen, es war im Jahre 1899, entdeckte ich, daß an einem prächtigen Roßkastanienbaum unserer Schulhausanlagen einer der stärksten Äste heruntergerissen war. Während ich so da stand und mich über die Freveltat ärgerte, sah ich auf dem nächst oberen Ast ein Distelfinknest mit ordentlich entwickelten Jungen. Es war also wohl auf diese abgesehen gewesen, und das Mißgeschick mit dem Ast hatte wohl den Vogelfänger dann vertrieben. Das Nest lag vollständig bloß und jedermanns Blicken zugänglich. Überzeugt, daß es über die Mittagsstunde verschwinden werde, nahm ich dasselbe herunter, steckte es in einen Baseler Käfig und placierte diesen vor mein Fenster. Die beiden Alten, welche dem ganzen Vorgang zugesehen hatten, fütterten ohne alle Umstände die Jungen, und zwar anfangs sehr fleißig. Aber schon am dritten

Handskelett eines Wehrvogels (nach Reichenow, „Die Vögel").

Tag ließen die Eltern in ihrer Fürsorge für die Nachkommen merklich nach, trotzdem sie weder Grünzeug noch andere Futterstoffe annahmen und fortwährend bettelten. Aus dem Käfig in das Zimmer gelassen, zeigte sich, daß die Kleinen noch nicht flugfähig waren. An ein Aussetzen konnte ich also nicht denken, und so war guter Rat teuer.

Kurz entschlossen fing ich auch die beiden alten Vögel ein, zuerst das Weibchen und spät am Nachmittag auch das Männchen. Die ganze Gesellschaft, zwei alte und sechs hoffnungsvolle junge Vögel, kam in einen meterlangen und entsprechend hohen und tiefen Käfig. An Futter wurde ein reichliches Quantum von gewissen Sämereien in niederer Glasschale, damit die Stoffe besser gesehen wurden, mitten auf den Käfigboden gestellt, aber — die Alten fütterten nicht, sie verschmähten selbst die Nahrung. Als ich am anderen Morgen früh vor den Käfig trat, sah ich zu meinem Schrecken, daß jung und alt mit gesträubtem Gefieder und halb geschlossenen Augen am Boden herumhockte, völlig teilnahmslos bei meinem Erscheinen. Das kleinste Tierchen lag tot in einer Ecke — ein Bild des Jammers.

Über das Unglück der Vogelfamilie fast verzweifelnd, wollte ich noch den Versuch mit Grünzeug machen. Ich erinnerte mich, daß links und rechts von meinem Wege in brachliegendem Ackerfeld massenhaft die Ackermilch-, Gänse- oder Matt-

distel (Sonchus oleraceus *L.*) wuchs. Eiligst holte ich ein tüchtiges Bündel von dem sonst so lästigen Unkraut herbei, und noch hatte ich die Falltür zum Käfig nicht ganz aufgezogen, so erschienen die alten Vögel in der Öffnung, hingen sich an die Disteln und fingen eifrig zu fressen an. Nach etwelcher Sättigung wurden auch die Jungen gefüttert, und die siebenköpfige Familie war gerettet.

Da die gewöhnlichen Sämereien in der Folgezeit kaum beachtet wurden, trug ich die Milchdistel in ganzen Haufen zu, und diese lieferte fast ausschließlich fast die ganze Nahrung für die Vögel. Die Nachzucht war nach wenigen Tagen selbständig, so daß ich die Eltern in Freiheit setzen konnte.

Während des raschen Wachstums ging nun bei meinen Finken eine eigentümliche Veränderung in der Körperform vor sich. Dem Umstande, daß nur halbreife, daher weiche Samen zur Verfütterung kamen, ist es jedenfalls zuzuschreiben, daß die Schnäbel etwa $^1/_2$ cm länger wurden als gewöhnlich; es war namentlich der Teil von der Mitte aus, welcher besonders sich in die Länge zog. Alle Vögel wiesen bedeutendere Körperlängen auf, und die Form des Rumpfes war stark abweichend von der Norm; er zeigte von oben wie von der Seite gesehen einen langgestreckten Keil, wie dies beim ausgesprochenen Berner Kanarienvogel der Fall ist.

Noch merkwürdiger waren die Veränderungen des Gefieders während der Mauser, welche einen ganz normalen Verlauf nahm. Die Schwungfedern, die bekanntlich bei der ersten Mauser nicht wechseln, zeigten eine auffallend tiefschwarze Färbung, von der sich das leuchtende Gelb der Spiegel gar prächtig abhob. Die hellen Flecken an den Enden der Armschwingen waren mattschwarz und kaum zu sehen. Das blasse Rot der Maske, auf das ich recht begierig wartete, blieb gänzlich aus, und statt dessen erschien ein mattes Schwarz, das Weiß der Schläfengegend schimmerte schwach durch und die schwarze Kopfzeichnung stach nur wenig davon ab; die sonst weißliche Unterseite war fast schwarz. Unter den fünf Vögeln befand sich ein einziges Weibchen von etwas geringerer Größe. — Gerade dieser Vogel war mit Ausnahme der leuchtenden Spiegel rein schwarz, nirgends schimmerte ein lichter Farbenton durch, und der sonderbar gefärbte Distelfink wurde von den Vereinsmitgliedern, welche das Wesen zu Gesicht bekamen, durchweg als Exote mit Distelflügeln angesehen. Jetzt bedauere ich, daß ich die alten Vögel so früh fliegen ließ; gar interessant wäre es gewesen, zu konstatieren, ob bei diesen durch die besondere Fütterungsweise ebenfalls eine Verfärbung des Gefieders hätte eintreten müssen.

Als der Spätsommer ins Land zog, war die Gänsedistel nicht mehr aufzutreiben, und ich ging zur gewöhnlichen Körnerfütterung über. Im Frühjahr wurden die Äcker, welche mir das Grünzeug geliefert hatten, in Pünten umgewandelt und abgebaut; alles Unkraut verschwand. Es anderswo aufzutreiben, war mir zu umständlich, und so wurden meine Versuche abgebrochen. Bis zur zweiten Mauser behielt das Gefieder meiner Vögel natürlich die dunkle Färbung bei, da jede Vogelfeder nach vollem Auswachsen nur noch durch Abnützung ihr Aussehen verändert, weil sie tot, d. h. keine farbenbildenden Stoffe mehr aufnehmen kann. Bei der Mauser verlor sich die dunkle Farbe der Distel so ziemlich; die helle Kopfzeichnung blieb schmutziggrau, und die dunkelbraunen Brustfedern verzogen sich gegen den Bauch hin. Ein Rest des dunklen Farbstoffes war auch jetzt noch im Blute zurückgeblieben."

Aus diesen Darlegungen Spalingers ist also zu ersehen, daß Melanismus bei Vögeln auch künstlich hervorgerufen werden kann.

Wie steht es aber nun mit den von mir beschriebenen Fällen, bei welchen die Schwarzfärbung

Sporngans (s. S. 362).
(Aufnahme des Zoologischen Gartens Berlin.)

der Tiere erst nach vielen Jahren ihrer Gefangenschaft, ohne daß sie mit Gänsedisteln oder anderem Grünzeug gefüttert wurden, auftrat, und die auch trotz wiederholter Mauser den Melanismus beibehielten bis zu ihrem Ende? — Bei diesen Vögeln lagen doch eigentlich gerade die umgekehrten Verhältnisse wie bei den von Spalinger beschriebenen zugrunde; da sie nur ausschließlich blanke Körnerfütterung (viel Hanf) ohne jede Beikost von Obst, Beeren, Grünzeug und Insektennahrung (Ameisenpuppen usw.) erhielten, sie wenig oder fast gar nicht der Sonne und frischen Luft ausgesetzt waren und im übrigen fast ständig unter nicht normalen, ihnen nicht zusagenden Verhältnissen gehalten wurden. — Hier wie da ist aber (auch im Falle Spalinger) zwischen dem durch Milchdistelfütterung erzeugten Melanismus einerseits und angeborener sowie erst später entstandener Schwarzfärbung andererseits ein himmelweiter Unterschied vorhanden. Bei angeborener Schwarzfärbung ändert sich die Färbung der be-

reffenden Vögel ebensowenig wieder zur Normalfärbung um, wie in den von mir beschriebenen, erst später entstandenen Fällen von Melanismus. Es liegen hier natürlich gänzlich verschiedene Ursachen, welche die Schwarzfärbung der Tiere hervorriefen, zugrunde, als bei Vögeln, die von Jugend an nur mit Milchdisteln gefüttert wurden, und die infolge der chemischen Bestandteile dieser Pflanzen eine — vorübergehende — Umfärbung ihres Gefieders erfuhren. Auf jeden Fall sind die Versuche Spalingers äußerst interessant und lehrreich, sie sind sicherlich dazu angetan, in solchen Fällen durch konsequent und zielbewußt weitergeführte Zuchtversuche zu schönen Resultaten und Erfolgen zu führen.

Auf ähnliche Weise, wie es bei den schwarzen Stieglitzen Spalingers der Fall ist, sind vielleicht(?) auch die in letzter Zeit in London gezüchteten „schwarzen Kanarienvögel" entstanden(?).

Die Lehre von der Ernährung und ihre Anwendbarkeit bei der Fütterung unserer Stubenvögel.

Vortrag gehalten im „Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln" vom Mitgliede Herrn Dr. Stehle.

(Nachdruck verboten.)

Meine Damen und Herren!

Einer Aufforderung unseres 1. Vorsitzenden Folge leistend, spreche ich heute abend über genanntes Thema zu Ihnen. Die Lehre der Ernährung beschäftigt sich 1. mit den Stoffen, die uns als Nahrung dienen und 2. mit ihrer Verarbeitung durch den Organismus. Die Aufnahme von Nahrung ist für den Organismus nötig 1. um das Körpermaterial zu erhalten und verloren gegangenes zu ersetzen, 2. um für die Lebensäußerungen nötigen Energien zu liefern. Schon seit längerer Zeit erkannte man, daß für den Organismus Wasser, Salze, Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß nötig sind; im großen und ganzen gilt diese Einteilung auch heute noch. Wasser ist in unserer Nahrung stets sehr reichlich vorhanden: Fleisch 70%, Gemüse, Obst bis 95%, Kartoffeln 80%. Als Salze benötigen wir Verbindungen der Elemente: Na (Natrium), Chlor, Ca Calcium, Kalium, P (Phosphor), Jod, Fe (Eisen), S (Schwefel), Magnesium, von den genannten setzen wir aber bewußt nur das Kochsalz, Natriumchlorid, unseren Speisen zu, während die übrigen sich in meist genügender Menge in den Nahrungsmitteln befinden; eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Eisen zu, da es in einer Eiweißverbindung das Hämoglobin, den Blutfarbstoff bildet. Welche Wichtigkeit einem anderen Element in äußerst geringen Mengen zukommt, möchte ich Ihnen an einem Beispiel aus der praktischen Medizin erläutern: es ist eine bekannte Tatsache, daß der Kropf, eine krankhafte Vergrößerung der Schilddrüse, im Gebirge sehr häufig ist, während er an den Küsten fast völlig fehlt; die Schilddrüse bildet eine jodhaltige Eiweißverbindung, die sie an das Blut abgibt; seit langem weiß man, daß bei Jodmangel die Drüse zu wuchern beginnt und zum Kropf wird; eine neuere Theorie glaubt annehmen zu dürfen, daß in Gebirgsgegenden das Jod durch Niederschläge aus dem Boden ausgewaschen wurde und sich im Flachland ansammelte und macht diese Jodarmut des Bodens für die Kropfbildung verantwortlich; das Beispiel zeigt uns aber auch, daß nur eine Krankheit uns auf die Wichtigkeit eines Stoffes aufmerksam machen konnte. Die genannten Elemente finden sich in der Asche des pflanzlichen und tierischen Körpers; sie spielen eine große Rolle beim Aufbau des tierischen Stützgerüstes, besteht doch ein großer Teil unserer Knochen aus phosphor- und kohlensaurem Kalk; als Energiequellen können Salze natürlich nicht in Betracht kommen, um so mehr die nächste Gruppe, die Kohlehydrate. Diese Kohlehydrate

Chauna (s. S. 363).
(Aufnahme des Zoologischen Gartens Berlin.)

stellen Verbindungen dar, bestehend aus Kohlenstoff und Wasser; aus reinem Kohlehydrat besteht z. B. Zucker, Stärke, aus letzterer kann durch Fermentwirkung Zucker hergestellt werden; in unserer Nahrung finden wir Kohlehydrate im Brot, Kartoffeln, Hülsenfrüchten, Zucker; die Kohlehydrate verbrennen im Körper zu Kohlensäure und Wasser, die Endprodukte sind also ganz genau dieselben als ob wir sie im Ofen in einer Flamme verbrennen würden, dabei wird Energie frei und diese Engerie kann z. B. als Muskelarbeit verwandt werden; diese freiwerdende Energie ist genau bestimmt, und zwar gewinnen wir bei der Verbrennung von 1 g KH 4,5 Kal; dabei ist eine Kal diejenige Wärmemenge, die genügt, um einen Liter Wasser von 15° C um 1° zu erwärmen; ob dabei die KH im Organismus verbrennen oder im Ofen ist ganz gleichgültig, denn da die Endprodukte dieselben sind, müssen sich auch die freiwerdenden Energiemengen gleichen. Die doppelte Zahl von Kal wird frei bei der Verbrennung von Fetten, die auch aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff, doch in einem anderen Mengenverhältnis wie die Kohlehydrate, bestehen.

1 g Fett liefert nämlich 9 Kal; Fette genießen wir in der Butter, tierischem Fett, Ölen, Margarine, Kokosfett; auch sie verbrennen zu Kohlensäure und Wasser, ob wir sie im Organismus oder der Flamme verbrennen. Ganz andere Endprodukte zeigt aber das Eiweiß, dessen Endprodukt im Säugetierkörper hauptsächlich der Harnstoff ist, während es bei den Vögeln und Reptilien als Harnsäure ausgeschieden wird. Charakteristisch für das Eiweißmolekül ist das Vorhandensein von Stickstoff, um den sich noch O (Sauerstoff), H (Wasserstoff) und C (Kohlenstoff) gruppieren. Eiweiß ist enthalten im Fleisch, Ei, Milch (Caseïn), Hülsenfrüchten (Erbsen, Bohnen); 1 g liefert bei der Verbrennung 4 Kal. Das sehr kompliziert gebaute Eiweißmolekül zerfällt im Körper in einfachere Bausteine, nämlich über die Peptone und Peptide in die Amine, die ich hier schon jetzt erwähne, um Ihnen von einer erst in den letzten Jahren erforschten Gruppe sprechen zu können, nämlich von den Vitaminen. Was sagt das Wort? Vita heißt lateinisch das Leben; es will also sagen, zum Leben nötige Bausteine des Eiweißes, und zwar Bausteine, die sich der Körper nicht durch Zertrümmern großer Eiweißmoleküle selbst herstellen kann, sondern die ihm als solche von außen zugeführt werden müssen. Diese Vitamine werden eingeteilt in: a) das antirachitische Prinzip, b) das antineuritische Prinzip, c) das antiskorbutische Prinzip, das will sagen: fehlt a, dann erkrankt der Organismus an Rachitis, fehlt b, an Beri-Beri, einer Nervenkrankheit, fehlt c an Skorbut, umgekehrt kann ich Rachitis heilen, wenn ich Lebertran, frisches Gemüse verfüttere, die den Faktor a enthalten, Beri-Beri, wenn ich die Schalen von Reis verfüttere, die den Faktor b enthalten; Skorbut, wenn ich frisches Obst, Gemüse gebe, die den Faktor c enthalten; näheres über die Vitamine wissen wir nicht; wir können sie nicht rein herstellen, nur ihre Wirkungen veranlassen zur Annahme ihrer Existenz; dabei wissen wir noch, daß sie durch eine Reihe von Konservierungsmaßnahmen, wie langes Kochen, Trocknen, Erhitzen, zerstört werden. Wenden wir uns nun dem Schicksal zu, den die Nährstoffe nach Aufnahme in den menschlichen Organismus erleiden; Wasser und Salze bedürfen keiner Verdauung, um von den Zellen des Darmes aufgenommen werden zu können, leicht können sie die Membranen der Darmzellen passieren; denn hierzu sind nur gelöste Körper fähig und so ist es mit eine Hauptaufgabe der Verdauung, unsere ungelöste Nahrung zu lösen und damit die Grundbedingung, Resorbierbarkeit zu erfüllen. Wenden wir uns zunächst den Kohlehydraten, z. B. der Stärke zu; ihre Verdauung beginnt bereits im Mund, wo unter der Einwirkung des Speichels die unlösliche Stärke in löslichen Zucker verwandelt wird, dessen Resorption dann möglich ist; nach Durchwanderung der Darmwand finden wir die Stärke als gelösten Zucker im Blut, in welchem er dann nach der Leber transportiert wird, wo er wieder zu tierischer Stärke oder Glykogen verwandelt wird, dieses wird nach Bedarf wieder zurückverwandelt und den arbeitenden Muskeln zugeführt, wo es dann unter Energieentwicklung in Kohlensäure und Wasser zerfällt. Daß Kohlehydrate im Organismus auch als Fett deponiert werden können, sehen wir bei der Schweinemast mit Kartoffeln, an der Fettleibigkeit der Biertrinker.

Größere Arbeit hat der Körper mit der Verdauung des Fettes, wobei die Galle, das Sekret der Leber, eine große Rolle spielt, sie zersprengt die Fetttröpfchen und -kügelchen in äußerst feine Teilchen, wobei Galle und das Steapsin der Bauchspeicheldrüse gemeinsame Arbeit leisten; dann werden die Fette verseift, d. h. mittels Ca bilden sich die Kalksalze der Fettsäuren, diese können in feinster Verteilung dann die Darmwand passieren; wandert nun der Zucker auf dem Blutweg seinem Bestimmungsort zu, so wandert das Fett auf dem Lymphweg, kommt später aber auch in die Blutbahn und wird an den Fettdepots des Körpers abgelagert oder kommt bei Bedarf zur Verbrennung. Verließe

Aniuma (s. S. 368).
(Aufnahme des Zoologischen Gartens Berlin.)

Kohlehydrate und Fette in kleinen Mengen unausgenützt wieder den Körper, so wird tierisches Eiweiß vom menschlichen Organismus fast völlig ausgenützt. Die Eiweißverdauung beginnt im Magen, wo das Eiweiß durch das Pepsin und die Salzsäure in einfachere Körper, nämlich die Peptone und Peptide gespalten wird; diese werden weiter abgebaut durch das Trypsin der Bauchspeicheldrüse in die Aminosäuren, wobei sich auch noch ein Sekret des Darmes beteiligt; diese gelangen nach Resorption durch die Darmwand in die Blutbahn, auf der sie die Leber erreichen; hier werden sie entweder zu Harnstoff verbrannt oder zum Aufbau des Organismus weitergegeben. Kohlehydrate und Fette konnte der Organismus speichern und bei Bedarf verwerten, Eiweiß kann er nicht speichern, es sei denn in lebender Protoplasmasubstanz und so wird der gesamte Stoffwechsel durch den Genuß von Eiweiß sicher angeregt und gefördert, doch dauert diese Wirkung nur solange als die Verdauung noch nicht beendet ist. Gewisse Eiweißarten, die sogenannten Purinkörper, die in Hir

Milz und anderen blutreichen Organen sich finden, zerfallen im Körper nicht zu Harnstoff, sondern zu Harnsäure, deren Anhäufung an gewissen Körperstellen zu dem Krankheitsbild der Gicht führt. Harnstoff wie Harnsäure werden durch das Blut in die Nieren gebracht und durch diese im Urin ausgeschieden.

Meine Damen und Herren, damit glaube ich, Ihnen einen kleinen Einblick in die Aufgaben, die sich die Ernährungslehre stellt, gegeben zu haben, und wir kämen zur schwierigen Frage: Was des uns zur Verfügung stehenden Wissens können wir praktisch bei der Fütterung unserer gefiederten Freunde verwerten? Eine Futterfrage existiert ja eigentlich nur bei den Weichfressern, bei den Körnerfressern müssen wir nur darauf bedacht sein, dem Vogel die richtigen Salze und Vitamine zuzuführen; beide findet der Vogel wohl in der besten Form im Grünkraut und Obst, deren regelmäßige Verabreichung ich geradeso nötig erachten möchte wie die selbstverständliche Darreichung von frischem Wasser. Die Eingewöhnung der Körnerfresser kann uns Schwierigkeiten bereiten, denn wir müssen uns darüber klar sein, daß eine Mischung von völlig reifen, ausgetrockneten Samen keineswegs das natürliche Futter ist, nur während der Herbst- und Wintermonate stehen sie dem Vogel zur Verfügung, während des übrigen Teils des Jahres dienen ihm halbreife Sämereien, Grünkraut, Baumknospen, Insekten zur Nahrung. Nimmt ein Körnerfresser Insekten dazu, erhält er täglich ein bis zwei Mehlwürmer, evtl. frische Ameiseneier, Weichfutter; sehr wichtig ist auch die dauernde Verabfolgung gestoßener Eierschalen, deren Kalkgehalt zur Erhaltung des Stützgerüstes unentbehrlich ist. Daneben müssen wir dem freilebenden Vogel ablauschen, was wir als Ergänzung dem Gefangenen bieten können; wir sehen, wie die Zeisige an den Erlenzäpfchen turnen, sich der bunte Stieglitz auf Distelköpfen wiegt, der Gimpel die Spiraeen im Herbst heimsucht, ein Flug Kreuzschnäbel lockend in die zapfentragende Fichte einfällt, drum laßt uns immer Passendes unseren Lieblingen als Gruß der überreichen Mutter Natur bringen, sie werden Nährstoffe darin finden, von denen der Gelehrteste der Gelehrten keine Ahnung hat. Wir kommen damit zu einem Punkt, dem ich bei der Ernährung des Vogels und überhaupt vieler freilebender Tiere eine große Bedeutung beimessen möchte, es ist die Gewöhnung des Tieres an eine ganz bestimmte Lebensweise und damit an eine ganz bestimmte Nahrung, es gibt Formen, die es darin fast zum Extrem gebracht haben, ich denke da z. B. an den so innig mit der Baumrinde verwachsenen Baumläufer, dem Eier und Larven einer nur geringen Anzahl von Insekten als Nahrung dienen; an die tauchende, schwimmende, immer lustige Wasseramsel, deren Beute in den reißenden Gebirgsbächen auch nur wenigen Arten von Wasserinsekten angehören kann. Dies ist bei jeder freilebenden Vogelart mehr oder weniger der Fall, und die Schwierigkeit für den Pfleger besteht nur darin, für diese Normalnahrung, wie ich sie nennen möchte, einen Ersatz zu finden. (Schluß folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Zu dem Artikel von Herrn Prof. **Braun** über seine Vögel möchte ich etwas von meinem **Rotkehlchen** erwähnen. Als der Vogel mit der Post ankam, wurde vorsichtig der Leinenstoff entfernt und der Vogel in das Bauer gelassen. Aber kaum hatten wir, mein Vater und ich, das Kästchen von der Käfigtür entfernt, als auch schon das Rotkehlchen entschlüpft war. Er flog auf die Gardinenstange, ordnete sein Gefieder und schaute uns munter an. Nun wurde das ganze Haus aufgeboten, Fenster und Spiegel verhängt, und mit einem Leinentuch ging's auf die Jagd. Wenn wir meinten, wir hätten ihn ganz sicher unter dem Tuch, war er wie eine Maus wieder entschlüpft. Nach langem Hin und Her gelang es uns, ihn hinter den Gardinen zu fangen. Nun wurde er wieder in sein Haus zurückgebracht. Aber als ich die Futternäpfe einstecken wollte, zwängte er sich durch die Finger und war wieder draußen. Ratlos stellte ich die Näpfe auf den Tisch, damit er doch was zu fressen hätte, und ging dann hinaus. Doch als ich hereinkam, war er verschwunden, und erst nach langem Suchen entdeckte ich ihn im Käfig. Das Futter stand auf dem Tisch, folglich hatte ihn nicht der Hunger in den Käfig getrieben, sondern aus freiem Antrieb mußte er hineingegangen sein. Das zeugt doch für eine Intelligenz des Vogels und auch hierfür, daß der Käfig kein Gefängnis für ihn bedeutet, wie die Gegner der Vogelliebhaberei immer wieder wissen wollen. Kurt Zeuner.

Ein **Drama aus der Vogelwelt** schildert der bekannte englische Ornithologe Oliver G. Pike: Vor einigen Tagen beobachtete ich, wie ein Paar Hänflinge ihre Jungen fütterten. Das Männchen war gerade nach Nahrung fortgeflogen, als das Weibchen unterhalb des Nestes eine Bewegung bemerkte. Es erblickte ein Wiesel, das die leckere Beute gewittert und versuchte, durch die Dornen des Busches zu klettern, die das Nest schützten. Die spitzen Stacheln taten ihm aber weh, so daß es nur langsam vorwärts kam. Zitternd vor Schreck deckte das Hänflingsweibchen seine Jungen; aber da es erkannte, daß rasch etwas geschehen müsse, wenn die Kleinen gerettet werden sollten, so stürzte sich das Weibchen todesmutig aus dem Nest auf den Boden herunter. Das Wiesel dachte, daß es nun ein leichtes Spiel habe, aber die Dornen waren ihm doch hinderlich. Unterdessen stieß das Hänflingsweibchen einen Warnruf aus. Dieser hatte eine erstaunliche Wirkung. Obwohl der Warnruf jeder Vogelart verschieden ist, so verstehen ihn doch alle, und so kamen Vögel von allen Richtungen herbei. Das Hänflingsmännchen, das als erstes anlangte, flatterte hilflos um das Nest; eine lärmende Schwarzdrossel folgte, dann erschienen Buchfinken, Sperlinge und Drosseln, und wenn das Wiesel von dem Lärm hätte eingeschüchtert werden können, wäre es geflohen. Immerhin hielten der Lärm und die Unruhe es eine Zeitlang vom Angriff ab. Auf dem Boden sah ich das Hänflingsweibchen von Furcht gelähmt, denn es lag noch immer auf der Erde, mühsam mit den Flügeln schlagend. Das Wiesel änderte nun seine Taktik. Es sprang herunter und auf das Weibchen zu. Aber das war gerade das, was die kleine Heldenmutter gewünscht hatte; sie entwand sich mit geraumer Not dem Angriff des kleinen Raubtieres und flatterte dann schreiend über ihm hin, von den anderen Vögeln gefolgt. Diese lärmende Vogelschar erregte die Aufmerksamkeit eines Sperbers, der gerade vorüberflog. Bei seinem Herannahen stoben die Vögel auseinander; aber der Sperber schoß herab auf das kleine braune Tier, das durch das Gras schlüpfte, packte es mit einem wilden Schrei und das Wiesel war nach kurzem Kampf getötet. Die noch ganz verängstigte Hänflingsmutter flog zu ihrem Nest zurück und fand hier den Gatten, der die Jungen bedeckte. Sie schlüpfte herein und nahm ihren Platz ein. Zwanzig Minuten später war das Männchen wieder mit Nahrung zurück, und das Leben im Nest nahm ungestört seinen Fortgang.

Vom Kuckuck. Bei einem Spaziergange in die freie Natur bemerkte ich, daß auf einem Grabenrande ein kaum ausgeflogener Kuckuck von weißen Bachstelzen eifrig gefüttert wurde, und zwar vorherrschend mit „Grashüpfern", welche die Bachstelzen an der Böschung des Grabens leicht erbeuten konnten. Er machte den Eindruck, als ob er noch wenig flugbar wäre, was den Wunsch erweckte, ihn einzufangen. Das erwies sich aber doch als ein vergebliches Bemühen,

denn er strich unter ängstlichen Warnrufen der Pflegeeltern bei der Annäherung, wenn auch noch etwas schwerfällig, nach einer nahen Maulbeeranpflanzung ab und setzte sich auf die Spitze eines Baumpfahles, der noch die jungen Bäume um einen halben Meter überragte. Nun war für die Stelzen guter Rat teuer, wie ihm zum Füttern beizukommen. Kurz entschlossen setzten sie sich auf seinen breiten Rücken und stopften den behufs dessen ebenfalls auf den Rücken gekehrten, weitgeöffneten, nimmersatten, roten Schlund weiter mit den Grashüpfern. Das zur Lehre genommen, habe auch ich meinen später einmal aus einem Gartenrotschwanznest entnommenen Kuckuck vorherrschend mit Grashüpfern groß gefüttert. Nebenher bekam er aber auch haarige Raupen, die ihm durchaus nichts geschadet haben und später sogar seine Lieblingsspeise waren. Daß er auch kleine Frösche nehmen würde, das ist mir nicht in den Sinn gekommen, sonst wäre die Fütterung leichter gewesen, obwohl auch die Grashüpfer mit einem Gazenetze leicht in Masse zu fangen sind. Mehr gegen den Herbst hin habe ich auch einmal — sieben — Kuckucke in einer von Bärenraupen gesegneten Wiese nicht weit voneinander der Jagd nach diesen obliegen sehen. Das ist wohl ein seltenes und bemerkenswertes Anhäufen von Kuckucken, für das ohne Frage die Bärenraupen die Veranlassung waren. Arens.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Antwort.

Auf Frage 14 (Heft 27). Gegen das Federrupfen gibt es kein anderes Mittel, als durch möglichst naturgemäße Ernährung und Haltung den Organismus des Vogels vollständig wieder zu gesunden. Zweifellos handelt es sich bei den Federrupfern, ganz gleich welcher Art, um einen Krankheitszustand, nicht um eine üble Gewohnheit oder um einen Hautreiz, der durch äußere Umstände herbeigeführt ist. Ich bin der Ansicht, daß die Nachtigall jetzt und solange es ausführbar ist nur mit frischen Ameisenpuppen gefüttert werden und in einem großen Flugkäfig untergebracht werden sollte. Sie wird dann den Federwechsel gut überstehen und wahrscheinlich wird dann auch das Selbstausrupfen der Federn unterbleiben.

P. L., Düsseldorf.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

Vogelliebhaber, organisiert Euch in örtlichen Vereinen, Landesverbänden oder unmittelbar beim Reichsverband!

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Friedrich Frank, München, Gabelsbergerstr. 9: Feuerflügelsittiche, Pit-Pits — D. cayana (L.), Blaukappentangare, Violetibl. Organisten, Siebenfarben-Tangare, Männchen, Waglers Trupial, Dayaldrosseln, große Kubafinken.

Karl Gruber, Wiesbaden, Westendstraße 36: Weiße, weißbl., gelbe oder gesch. Kanarienhähne, kleine Kubaweibchen.

Max Kleinert, Tierhandlung, Berlin NO 18, Straußberger Straße 13, Fernruf Alexander 3313: Doppelgelbköpfe, fingerzahm, Tovi-Sittiche, Feuerflügelsittiche, Königsglanzstare, langschwänzige Glanzstare, Safranfinken.

Walter Leßner, Liegnitz, Volkshaus Nord, Glogauer Str. 20: Junger Kiebitz, Kapiäubchen.

Eduard Lobeck, Restaurant, Herne: Stahlfleckentäubchen, 0,1 Ringeltaube, grünfüßige Teichhühner.

Gustav Müller, Vogel-Großhandlung 31, Hamburg, Langenfelderdamm 27, Fernsprecher Vulkan 7141: Feuerflügelsittiche, ganz fingerzahm, Trupiale, afrikan. Glanzstare.

Wilhelm Pfisterer, Ludwigsburg, Karlstraße 40: Amerik. Wanderdrossel.



Herrn R. B., Duisburg. Krampfartige und ähnliche Zustände sind bei Vögeln schwer zu heilen. Am besten ist es, den Vogel in einem Tag und Nacht gut gelüfteten Raum zu halten, in welchem er ungestört ist. Da jetzt der Federwechsel vor der Tür steht, können frische Ameisenpuppen in größerer Menge, selbst ausschließlich gefüttert werden. Bevor die frischen Ameisenpuppen zur Neige gehen, wird der Vogel ganz allmählich wieder an ein Futtergemisch gewöhnt. Sobald es reife Holunderbeeren gibt, bekommt er diese in ganzen Büscheln. Getrocknet und aufgequollen können diese Beeren auch später dem Mischfutter zugesetzt werden. Das Gemisch, von dem eine Probe beilag, enthielt weder gemahlenen Hanf noch Karottengrieß. Das ist kein Fehler, denn Karottengrieß ist ein schlechter Ersatz für feingeriebene Möhre und längere Zeit aufbewahrter gemahlener Hanf wird ranzig und den Vögeln schädlich. Das Gemisch wird am besten mit wenig fein geriebener Möhre durchgearbeitet oder ab und zu mit grobgehacktem Apfel.

Herrn K. G., Saalfeld. Bei der Bevölkerung von Flugräumen kommt es darauf an, für welche Art von Vögeln sie ihrer Bauart nach geeignet sind, ob es sich lediglich darum handelt, eine bunte Schar von schön gefiederten Vögeln zu beherbergen, ob Züchtungen beabsichtigt sind usw.

Herrn F. L., Bremen. Der Vogel ist der Tonkibülbül. Die Geschlechter sind schwer zu erkennen, das Weibchen soll kleiner sein. Der Gesang besteht aus einer Reihe von 3—4 Tönen, welche er in kurzen Pausen minutenlang immer in derselben Tonlage wiederholt. Darauf bringt er in schnellem Vortrag ähnliche Töne in verschiedener Tonlage. Gegen Einzelhaltung des Vogels liegen keine Bedenken vor. Ernährt wird er mit einem Futtergemisch, wie es die Schamadrossel erhält, als Zugabe ab und zu geschabtes mageres Fleisch, kleingehacktes Ei, Insekten. Täglich muß er Obst oder Beeren erhalten, am besten frisch und kleingeschnitten. Wenn diese nicht erhältlich, reicht man in kleine Stücke geschnittene Rosinen, Korinthen, Sultaninen, Datteln, Feigen.

Herrn P. Sch., Dresden. Die Heidelerche ist infolge von Blutarmut eingegangen. Vermutlich war der Vogel sehr fett und ist schell abgemagert. Nahrung hatte er nicht mehr aufgenommen.

Herrn W. K., Duisburg; Herrn W. B., Heilbronn; Herrn Sch., Halle a. S.: Beiträge dankend erhalten.

Herrn F. F., Altenmarkt a. d. Alp. Zur Beruhigung des Vogels ist entweder der Käfig sehr hoch anzuhängen, oder an den Schmalseiten zu bedecken, oder es sind um den Käfig Gewächse aufzustellen. Wenn das alles nicht hilft, ist der ganze Käfig mit einem gut Licht durchlassenden Stoff zu umhüllen.

Herrn W., Angermünde. Bei der Ernährung des Steinkauzes, wie bei der Ernährung der Raubvögel überhaupt, kommt es wesentlich darauf an, daß im Futter unverdauliche Stoffe enthalten sind zur Bildung des Gewölles. Es ist deshalb sehr zweckmäßig, wenn neben Futtergemisch recht häufig Insekten, besonders Käfer gereicht werden, ab und zu auch mal eine getötete Maus oder ein Sperling. Die bisher gereichte Nahrung ist ausreichend. Wenn die oben genannten Futtermittel nicht zu beschaffen sind, so werden dem Gemisch kleine Federn, kurze Tierhaare, Knochen- oder Insektenschrot, reichlich Insekten beigegeben. Das Mindestmaß für einen für den Steinkauz bestimmten Käfig ist 75 × 40 ⊥ 60 cm.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

rgang 54 30. Juli 1925 Heft 31

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Von meinen Grauedelsängern und anderes. Von Fritz Braun.

Der Eisvogel. Von P. Arens, Hannover.

Etwas über die Ernährung zarter Weichfresser. Von Karl Finck, Neukölln. (Forts.)

Bewaffnete Vögel. Von Ingo Krumbiegel, Dresden.

Nochmals melanotische Stieglitze. Von Wilhelm Schreitmüller, Frankfurt a. M.

Die Lehre von der Ernährung und ihre Anwendbarkeit bei der Fütterung unserer Stubenvögel. Von Dr. Stehle.

Kleine Mitteilungen – Sprechsaal – Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.) Sitz Leipzig – Vom Vogelmarkt – Redaktionsbriefkasten – Aus den Verbänden – Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

utz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Sitz Leipzig. 1. Vors. Hermann Höhne, Leipzig-Volkmarsdorf, Eisenbahnstraße 84 IV. 1. Schriftf. Max Hunger, Leipzig-Gohlis, Polizeigebäude Zimmer 196. Kassierer Ludwig Böttcher, Leipzig, Inselstr. 17 II. — In unserer letzten Veröffentlichung hatten sich verschiedene Fehler eingeschlichen, die das neu angelegte „Giro-Konto" des Landesverbandes betrafen und deren Richtigstellung hiermit erfolgt. Sämtliche dem Landesverband angeschlossenen Vereine wollen in Zukunft ihre Einzahlungen an die Giro-Kasse Leipzig Nr. 6317 (nicht 6318) bewirken. Wir müssen immer wieder darauf hinweisen, daß die Beiträge sehr, sehr spärlich eingehen. Bisher ist nur der Zwickauer Verein seinen Verpflichtungen in anerkennenswerter Weise voll und ganz nachgekommen. Die Vereine mögen es sich angelegen sein lassen, diesem Punkte eine intensivere Beachtung als bisher zu schenken. Auf die Abführung in Teilbeträgen wird nochmals hingewiesen.
Der Vorstand. J. A.: Hunger, Schriftf.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10.

Angemeldet ist Herr Dr. Seelmann, Berlin-Zehlendorf-West, Prinz-Friedrich-Karl-Str. 34. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37 a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke, Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Restaurant „Zum Löwentor", Königswall 75.
J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung Freitags, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Blasewitzer Hof". Liebhaber willk. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Eliesenhof", Eliesenstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelliebhaberei und Vogelschutz Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Versammlung jeden 2. Mittwoch im Monat in den Vereinslokalen „Parkhotel", Epinaystr. 1, und jeden letzt. Sonnabend im Monat in „Stadt Chemnitz" Thomasstr. 57. Näh. Auskunft erteilt Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 4. August.
A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber. 55. Mitglieder-Versammlung am 9. Juli im Landesheim, Volgersweg. In Abwesenheit des 1. Vorsitzenden eröffnet Herr Klocke die Versammlung. Anwesend sind 18 Personen. Die neuen Hefte des „Journal für Ornithologie", der „Ornithologischen Monatsberichte", des „Naturschutz" und der „Gefiederten Welt" gelangen zum Umlauf. Auf die ganz vorzüglichen Beobachtungen von E. Christoleit über die Bartmeise in Ostpreußen (im „Journ. für Ornith.) wird besonders hingewiesen. Eine Bemerkung des Verfassers, „wie wenig unter Umständen die Gefangenhaltung eines Vogels zur Kenntnis seines Wesens verhilft", hat aber nur für die Pflege im Käfig seine Berechtigung. Dafür eignet sie sich m. E. nicht. In der Vogelstube kommt ihr eigenartiges Wesen, ihre Schönheit und ihre Ausdauer voll zur Geltung. Zutraulich wird sie nie, hat nichts von dem kecken Wesen der anderen Meisen, vergesellschaftet sich nicht mit diesen, aber Männchen und Weibchen leben nebeneinander mit inniger Zärtlichkeit. Das seidenweiche Gefieder in seiner prachtvoll abgestuften Färbung ist stets tadellos imstande, stets wie geleckt. Die Haltbarkeit in der Vogelstube umfaßt nach meinen Erfahrungen etwa 10 Jahre. Über „Fütterungsfragen" entspann sich eine sehr ausgedehnte und lebhafte Unterhaltung. Die frischen Ameiseneier bekommen wir in Hannover in ganz mangelhafter Beschaffenheit. Grund: ungenügende Sorgfalt bei der Ernte und auf dem Transport. Aus Berlin, besonders aber aus Magdeburg (von Seyfert) kommen solche in bester Ware und zu demselben Preise. — Ende Juli wollen wir wieder finnische Ameiseneier, 25er Ernte, getrocknet, kommen lassen. Gutes Körnerfutter ist zum Preise von 40 Pfg. das Pfund da. Mit dem Weichfutter der Fa. Eckrich-Waldsee soll ein Versuch gemacht werden. Herr Schnetter macht den Vorschlag, frische Ameisenpuppen, um sie 14 Tage lang haltbar zu machen, abzuschwelgen, d. h. sie ausgebreitet 1—2 Minuten in den Bratofen zu bringen. Der Wintervorrat ist einzuwecken. Das geschieht nach dem Abschwelgen durch Einfüllung in Weckgläser und 2—3 Minuten kochen. Die Verfütterung der Drohnen aus den Bienenwaben empfiehlt der Unterzeichnete. Der Imker schneidet diese Waben heraus und wirft sie weg. Für den Vogelpfleger geben sie ein sehr nahrhaftes Futter, das nicht im Übermaß gereicht werden darf, aber leider nicht lange haltbar ist. Die Aufbewahrung geschieht durch Aufhängen an Drähten in frischer Luft. Gereicht werden sie in flachen Näpfen. Ist eine Seite ausgehöhlt, wird umgedreht. Leidenschaftlich sind Meisen, Kleiber, hetmische und fremdländische Fliegenschnäpper und Schmätzer, Schama, Zaunkönig und andere dahinterher. Auf ein anderes Beifutter macht Herr Determann aufmerksam. In größeren alten Pilzen finden sich oft Mengen von Maden und Würmern. Die Pilze werden über ein Kästchen auf einen Drahtrost gelegt, die Würmer gelangen in das Kästchen und können leicht verfüttert werden. Daß Finkenvögel neben dem Körnerfutter auch solches für Weichfresser bevorzugen, erwähnt Herr Brittner, gibt auch seine Erfahrungen mit der Eingewöhnung im Herbst gefangener Stieglitze bekannt. Der Hauptinhalt des Abends war Herrn Klockes Vortrag über „Mimikry". Mit wissenschaftlicher Gründlichkeit, aus dem Schatze seiner reichen, zoologischen Kenntnisse, gab er das Wissenswerteste über die „Anpassung der Tiere an Form und Farbe der Umgebung" bekannt, schilderte lebhaft und lebendig auch Vorkommnisse, wo aus der Ähnlichkeit ein Nutzen für die betr. Tiere nicht vorhanden ist, berichtigt irrtümliche Auffassungen der Zuhörer und bereitete den Mitgliedern eine Stunde reicher Unterhaltung und Belehrung. A. Troschütz.

Der Hannoversche Vogelschutzverein zu Hannover, gegr. 1881, wirkt mit sichtbarem und anerkanntem Erfolge für Vermehrung und Schutz der Vogelwelt bei Hannover mit Aufhängen von jährlich einigen hundert Nistkästen aller Art, durch Erweckung von Interesse und Liebe für die Vogelwelt mit monatlich, zur Gesangszeit wöchentlich stattfindenden Belehrungsspaziergängen und durch Vorträge in den jeden 2. Dienstag der Monate im Landesheim stattfindenden Vereinsversammlungen. Seine Bestrebungen dienen also lediglich gemeinnützigen Zwecken. Mitgliederzahl rund 1200, jährlicher Beitrag nur 1 M. Meldungen an den Vorsitzenden Herrn Fritz Becker, Hannover, Boedekerstr. 1 F.

(Fortsetzung auf der 8. Umschlagseite.)

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft den 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um 8 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste willk. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Vereinsabend regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends um 8 Uhr) beim 1. Vors., Herrn Jahn, Feodorastr. 7. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodoraraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. A. Voigt.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Bollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 3. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 6. August. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Normast im „Kaiser Friedrich", Breslauerstr. 50. Liebhaber willkommen. J. A.: Friedrich.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorfstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wst., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Tage im „Goldenen Falken" Versammlung; nächste Freitag, den 7. August. Liebhaber willk. Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Versammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Liebhaber willk. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebenda. R. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

---

ergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per d. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50. netze f. kl. schädl. Vögel M. 2,30, f. 2,50 u. 2,80. Katalog gratis. nen, Gronau 58, Westf. [988

Mistelleim
gr., lief. i. anerkannt vorzügl. Güte Kirschner, Arnsdorf-Haida (Böhmen), Roseggerstr. [984

lwürmer Ia Pfd. 5.— M (ohne Spesen) . 3.— M frk. Voreinsend. er, Breslau, Weinstr. 12. [985

Mehlwürmer
send. v. 2.—Rentenmark ¼ Pfd. versend. D. Waschinski & Co., Biesenthal I (Mark). [986

che Ameisenpuppen
ter 2.80 Mark, franko.
toc. Ameisenpuppen
r 1,60 Mark, I. Qualität.
Mehlwürmer
Einsendung von Mk. 1.50 ¼ Pfund franko. [987
Witte, Niederndodeleben bei Magdeburg.

lehlwürmer
sverkauft bis Oktober.
a Ameiseneier
Pfund 6.00 M.
eißwurm . . . à Pfd. 5 M
uska-Zecken . . à „ 2,50
idenraupenpuppen, nahlen . . . à Pfd. 0,75
rnelen, gem. à Pfd. 0,40 M
Universalfutter
a I für Nachtigallen 2.— M
II für Grasmücken 2.— M
III für Drosseln . 1.50 M
. und Analysen zur Verfügung. er oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [988
ezialvogelfutterhaus für Weichfresser
Bärich II, Waldsee (Pfalz).

Bekanntmachung!
Infolge andauernder Steigerung der Rohstoffe bin ich gezwungen, den Preis meiner „L. K. N." vom 1. 8. ab pro ½ Kilo auf M. 1.50 zu erhöhen. [989
Lorenz, Dresden, Drehgasse 5.

Schamadrosseln
prima Sänger 60.— M.

Schamadrosselweibchen		50.—
Rötelmerle (Oroscirtetes erythrogaster)		80.—
Blaurotschwanz (Phoenicurus frontalis)		80.—
Weißbrüstiger bl. Waldschmätzer		85.—
Klarino		40.—
Indische Bergmeise		30.—
Graublauer Fliegenschnäpper		50.—
Sonnenvögel, Männchen		15.—
Safranfinken	Paar	8.—
Reisfinken	Paar	5.—
Weißkopfnonnen	Paar	10.—
Tigerfinken	Paar	8.—
Möwchen	Paar	15.—
Olivgrüne Astrilde (Stictospiza formosa) (Green Amaduvade)	Paar	16.—
Weißkehlpfäffchen	Paar	10.—
Schnurrbärtchen	Paar	10.—
Angolaschmetterlingsfink.	Paar	10.—
Mossambikzeisige	Paar	12.—
Kleine Elsterchen	Paar	4.00
Grauedelsänger, o. Garantie,	Stück	2.00
Laufhühnchen	Stück	15.—
Papst-, Indigo-, liebliche Papstfinken (Lazalifinken), Orangeblaufinken, Mexikan. Zeisige		
1 Paar Orangegesichtige Unzertrennliche (Flügel etwas beschnitten)		80.—
St.-Thomas-Sittiche (C. pertinax)	Paar	40.—
Tovisittiche	Paar	20.
Elfenbeinsittiche Stck. 20.—,	Paar	40.—
1 Orangestirnsittich		10.—
Wellensittiche, grün	Paar	12.—
Pavuasittiche	Paar	40.—
Feuerflügelsittiche	Paar	40.—
Mohrenkopfpapageien	Stück	35.—
Sperlingspapageien	Paar	15.—
Kleiner zahmer Gelbhaubenkakadu		50.—
Blaustirnamazonen	Stück	60.—
Graupapageien, Stück v.	120.— bis	160.—
1 Benguela-Papagei, zahm, sprechend		150.—
1 Korallenschnabel-Papagei (Pionis corallines)		80.—
Chines. Schildkröten (Damonia reevesi)	Stück	1,50

Porto u. Verpackung M. 3.50, als Dringend M. 6.50, Versand p. Nachnahme. [990
E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a.

Ia Drosselfutter,
Marke „Lucullus." [991
(Ameiseneier, Muska, Zwiebackschrot), beziehen Sie vorteilhaft von
H. Pullich, Langen b. Fft. a. M. 8.

Jungen Star (Mai 25)
fleißig studierend, vertausche.
992] **B. Mütz,**
Aulendorf, Waldseer Str. 288 (Wttbg.)

Vogelfutter [993
für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Ein Versuch
überzeugt jeden von der Güte meines Universalfutters. Preis 2 M. p. Pfd. Sämtliche Futtersorten für Exoten, Wald- und Kanarienvögel zu billigsten Tagespreisen. Versand geg. Nachnahme. Verpackung und Porto werden billigst berechnet. [994
P. H. Kirsten, Leipzig 3,
Zeitzer Str. 53. Fernruf 31445.

Fortzugshalber vertausche ich
Rotkehlchen, Mönchsgrasmücke, Rotrückenwürger u. v. a. Vögel, Weichfresserkäfige, Mehlwurmhecke und 3 Tellereisen zum Fischefangen gegen getragene Kleidungsstücke. Sämtliche Vögel sind gut im Gesang und Gefieder. [995
Karl Abel, Oberschweizer, **Bühne,** Post Borgentreich (Westfalen).

Kalifornische Schopfwachteln Paar 45 M.
Rote Kardinäle, Männ., Stck. 25 M.
Papstfinken, Männchen (hat fast alle Farben), Stck. 22 M.
Mexikanische Karmingimpel, Männchen, Stck. 10 M.
Safranfinken, Männch., Stck. 9 M.
Versand per Nachnahme, Porto extra.
Max Kunze, Freiberg i. Sa., Tierhandlung, Pfarrgasse 32. [996

Gebe ab:
1 Elfenbeinsittich, fingerzahmes ♂, gutes Gefieder, RM. 20.—.
A. Brandt, Berlin-Grunewald, 997] Im Eichkamp 12.

Sämtliche Vogelsaaten

in [998

hervorragender Beschaffenheit

liefert zu vorteilhaften Preisen in großen und kleinen Posten

Hugo Schütze,
Eystrup (Weser)

Fernruf: Eystrup Nr. 1 u. 23, Postscheck-Konto 5715 Hannover.

Preisliste verlangen.

Offeriere freibleibend:

Molukkenkakadus

Stück 222.—

Graupapageien, fingerzahm u. sprechend . . . Stck. 95—100.—
Ausgefärbte zahme Doppelgelbköpfe . . . . . Stck. 75.—
Diademamazonen, zahm u. sprechend . . . . . Stck. 58.—
Mülleramazonen . . . . Stck. 60.—
Blaustirnamazonen, zahm u. sprechend . . . . Stck. 50—60.—
dto. noch nicht sprechend . Stck. 44.—
Gelbstirnamazonen . . . Stck. 45.—
Grillenamazonen . . . . Stck. 75.—
Kleine weiße Gelbhaubenkakadus, sehr schön . . Stck. 45.—
Tarant. rotköpfige Bergpapageien . . . . . Paar 18.—
bei 5 Paar 75.—
Grüne u. gelbe Wellensittiche, alte Zuchtpaare . . . Paar 15.—
Junge Wellensittiche . . . Paar 12.—
Tovisittiche . . . . . Paar 25.—
Feuerflügelsittiche, fingerz. Paar 40.—
Schamadrossel, Männchen . Stck. 65.—
„ „ Weibchen . Stck. 50.—
Königglanzstare . . . . Stck. 100.—
Langschwanzglanzstare . . Stck. 10.—
Rotgehäubte Kardinäle . . Stck. 8.50
Safranfinken, ausgefärbte Männchen . . . . . Stck. 6.—
Zebrataubchen . . . . . Paar 6.50
Reisfinken . . . . . Paar 5.50
Tigerfinken, halbausgefärbte Paar 5.—
Senegalfinken, gemischt . . Paar 3.50
Kanarienrollen, Brut 1924 Stck. 12—15.—
Kanarienrollen, Brut 1925 Stck. 7.50
Kleine handzahme Java-Spieläffchen . . . . Stck. 70.—
Kleine sehr zahme Hutäffchen Stck. 55.—
Drillaffen, zahm . . . Stck. 125.—
Schmuckloris, fingerzahm u. eingewöhnt . . . . Stck. 100.—

999] **Tierhandlung**

Max Kleinert,
Berlin NO 18,
Strausberger Straße 13.
Fernruf Alexander 8313.

Heft 4 u. 6 der Gefiederten Welt 1925

kaufen wir für je 0,50 M. zurück.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

1000] Postschließfach 148.

Südd. Vogelexporthaus

J. Götz, Neuulm (Bayern)

bietet freibleibend an: [1001

Blaukappentangaren Paar 60 M., Siebenfarbentangaren Stck. 38 M., violettblaue Organisten Paar 28 M., 1 Blaunackenorganist 28 M., 1 braunbäuchiger Organist 25 M., grüne Zuckervögel Stck. 28 M., blaue Honigsauger Stck. 20 M., Vielfarbenfink 42 M., lieblicher Papstfink Stck. 25 M., Papstfinken, ausgefärbte Männchen, Stck. 20 M., Indigofinken, ausgefärbte Männchen, Stck. 18 M., Orangeblaufinken, Männchen, Stck. 25 M, mexikan. Trauerzeisige, Männchen, Stck. 17 M., große Kubafinken, Männchen, Stck. 7 M., Dominikanerwitwen in Pracht Paar 7 M., Mossambikzeisige Paar 6 M., Grauedelsänger, abgehörte Männchen Stck. 8 M., Weibchen 2 M., Braunkappenamaranten Paar 7 M., Goldbrüstchen Paar 4,50 M., Orangebäckchen Paar 4 M., Grauastrilden Paar 3 M., Amaranten Paar 4 M., Bombay-Tigerfinken, unausgefärbt, Paar 4,50 M., Muskatfinken, desgl., Paar 4,50 M., Elsterchen Paar 5 M., Möwchen Paar 12 M., Lerchenfinken Stck. 7 M., Swainsonsperlinge Stck. 3 M., Gangesbrillenvögel Stck. 25 M., braune Zwergtimalien Stck. 35 M., braunköpfige Timalien Stck. 35 M., Caprötel Stck. 80 M., Streifentruptiale Stck. 25 M., afrikan. Glanzstare Stck. 10 M., Langschwanzglanzstare Stck. 1 M., Dajaldrossel, Männchen, 60 M., Sonnenvögel, Weibchen, Stck. 4 M., Halsbandtäubchen, Palm- oder Senegaltäubchen, Kaptäubchen je Paar 8 M., weiße Lachtauben Paar 15 M., gelbe Lachtauben Paar 7 M., Alexandersittiche Paar 20 M., Feuerflügelsittiche Paar 40 M., Tovisittiche Paar 25 M., gelbe Wellensittiche Paar 16 M., desgl. grüne, unausgefärbt, Paar 12 M., blauflügel. Sperlingspapageien Paar 15 M., Rote Kardinäle Stck. 25 M., rotgehäubte Kardinäle Stck. 8 M., Neuholländer Amazonenpapageien, jung, Stck. 39 M., Blaustirnamazonen Stck. 60 M., Graupapageien, schon einige Worte sprechend, seit 3 Monaten hier, Stck. 120 M., kleine Gelbhaubkakadus, etwas zahm, Stck. 45 M., Müllers Edelpapagei Stck. 45 M.

Jeder, auch der kleinste Auftrag wird auf das sorgfältigste ausgeführt. Auch liefere ich alle Futtersorten in einwandfreier Beschaffenheit zu den billigsten Tagespreisen sowie alle Bedarfsartikel für Zucht und Pflege.

---

2 Gartengrasmücken zu vertauschen.
J. Dreves, Köln,
Siebenburgen 57, II. [1002

Verkaufe

junge Zebrafinken à Paar 15 M.
Hoffmann, Magdeburg,
Steverstorstraße 42. [1003

Tausche: 1,1 grüne Wellensittiche, 1,1 Kanarien, mittellauter Sänger, 1,0 Dompfaff, 1,0 Zeisig, 0,1 Girlitz, 1 Prachtfink, alles gesund u. gut befiedert, gegen einen fingerzahmen **Papagei,** gesund und kein Schreier.

Angebote erbittet **Siegfr. Halm, Mainz,** Kirschgarten 11. [1004

„KAPPEL"

Schreibmaschine

Erstklassiges Erzeugnis ∴ ∴ Strapaziermaschine

Letzte Neuerung:
Geräuschloser Wagenrücklauf

Maschinenfabrik Kappel A.-G.
Chemnitz-Kappel

Verkaufe weil überzäl

1,0 **Rotkardinal** . . . . zu
1,0 **Taranta** . . . . zu
1,1 **Schnurrbärtchen,** gutes Zuchtpaar . . zu
1,1 **Wellensittich.** gelb und grün, gutes Zuchtpaar zu
10 **Junge dto.,** gelb u. grün a
1,0 **Paradieswida,** halbe Pracht . . . . zu
1,0 **Oryxweber,** halbe Pracht zu
0,1 **kl. Flammenweber** . zu
4,0 **Rotkopfamadinen** . a
3 **Reisfinken** . . . . a
1 **Weberart unbekannt** . a
1,0 **Goldstirnblattvogel,** Ia Sänger . . . . zu

Alles Ia eingewöhnte Tiere

Eugen Müller, Küll im Et
A. Z.-Mtgl. 65.
Bei größerer Abnahme evtl. fra

Wellensittich Züchterei Deutsch-Liss

züchtet grüne Wellensittich großen Volieren im Freien gibt ab:

Junge Wellensittic
Stück 6 M.,
junge fingerzahme dto.
Stück 12 M., frei ins Haus
(junge zahme Wellensittiche lerne sprechen).

Ideale Wellensitti Nistkasten!

Das Beste, was es gibt, kein F fallen der Jungen möglich, seit 20 in eigener Züchterei u. v. vielen Z erprobt (auch für andere Höhlenb
Stück 2 M.

Wellensittich-Futt
Pfund 45 Pf.

Sittiche werden in Zahlung geno
Anfragen Rückporto.

Wegen Wohnungswechsels ich meine Vogelstube auf vertausche:

2 Singdrosseln, 1 Gimpel (Männ
1 Goldammer, 2 Zeisige, 1
1 Grünhänfling, 2 Reisfinken, 1
fink, 1 Rothänfling, 1 sprech.
3 Stieglitze, 1 Kreuzschnabel, 2 Ka
hähne und 8 Kanarienweibchen,
gute Sänger, gegen 2 gutspr
Papageien oder einige ander
sprechende Vögel.

Gefl. Angebote erbitte baldigst
A. Weber, Görlitz, Cottbuser

Wegen Überfüllung m. V gebe ich ab:

1—2 Männchen Königs-S
eig. Zucht 1922, vollf. ausgefär
zuchtfähig, je Stück 200 M. (ev
Bezugsquelle f. Wbch. aus Englan
1,1 Blumenau-Sittch. } seit üb
1,1 Jendaya-Sitt. } in m.
Jendaya-Männchen, etwas defekt
fieder, je Paar 20 M.,
ferner grüne und gelbe
Wellensittiche.
kräft. Vögel aus m. Freivoliere
jährige, sofort zur Brut schreite
Paar 15 M., diesjährige je Paar
Fabrikdirektor Aumüll,
Delitzsch.

Chinchilla

Alte und Junge, kauft zu
Preisen, wenn reinrassig,
Paul Ahrens, Lübeck, König

Inserate

für das am 6. August 19
Ausgabe gelangende Heft
Gef. Welt erbitten bis 1. 2

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 1
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Alfred Brehm

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 6. August 1925 | Heft 32

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Alfred Edmund Brehm*).

Wer kennt ihn nicht, von dem wir heute berichten wollen, den einst so bekannten und berühmten Verfasser des „Tierlebens", Alfred Edmund Brehm? Gewiß ein jeder. Und nicht nur dem Namen nach! Insbesondere den Älteren von uns sind seine Schriften noch gut im Gedächtnis. Von den Ältesten unter uns hat ihn vielleicht der oder jener sogar noch von Angesicht zu Angesicht gekannt, hat ihm und seiner begeisternden Rede gelauscht. Aber unsere Zeit lebt rasch. Und da möchte es vielleicht geschehen, daß das einst so glänzende Bild zu verblassen beginnt, daß über den einst so Berühmten, von aller Mund Genannten sich mehr und mehr die Schleier des Vergessenwerdens breiten. Er verdient solch Schicksal nicht. Er ist vielmehr wert, daß er nicht vergessen wird im Kreise derjenigen, welche die Liebe zur gefiederten Welt als unveräußerliches Besitztum im Herzen tragen.

Und darum sei es versucht, heute nochmals in Kürze das Bild Alfred Edmund Brehms in flüchtigen Umrissen zu zeichnen, wie es uns seine Zeitgenossen überliefert haben. Den Älteren zur Wiedererinnerung, den Jüngeren zur Kenntnis und Nacheiferung.

Es müßte ja sonderbar zugegangen sein, wenn der Sohn des Pfarrers Christian Ludwig Brehm in Unter-Renthendorf im „waldgrünen Thüringland" nicht ein Freund der Tiere, ein Erforscher der Natur geworden wäre! Was ging denn um den am 2. Februar 1829 geborenen kleinen Alfred herum vor? Er hatte einen Vater, den er auf seinen Streif- und Jagdzügen begleiten durfte; er erlernte von ihm die Kunst des Balgens und Herrichtens der erlegten Vögel; er sah die Sammlung dieser wissenschaftlich höchst wertvollen Vogelbälge heranwachsen bis zur Größe von 9000 Stück. Und während abends am Familientische der Vater Brehm die Bälge mit kunstfertiger, liebevoller Hand zubereitete und die Stücke und Reihen miteinander verglich, da las die Mutter, die als heitere und lebensfrohe Frau geschildert wird, den Kindern aus Goethe und Schiller vor und prägte unmerklich und unwillkürlich dem Ohre der Lauschenden die unvergleichliche Kraft Goethes ein, das Wesentliche des Gegenstandes klar darzustellen, und Schillers wunderbare Gabe, der Fülle der inneren Gesichte in leidenschaftlichem, dichterischem Schwunge rhythmischen Ausdruck zu verleihen. Das so in die Seele des lauschenden Knaben gesenkte Samenkorn sollte sich zum prächtigen Baume entfalten.

Zunächst schien es allerdings nicht zu keimen. Denn, so sonderbar es klingt, der junge Alfred widmete sich vorerst nicht der Naturwissenschaft, sondern — der Baukunst. Vier Jahre lang. Da aber bot sich ihm im Jahre 1847 plötzlich die Gelegenheit, fremde Länder selbst kennenzulernen. Der württembergische Baron John Wilhelm Müller, der Enkel eines in Südafrika reichgewordenen Mannes, der selbst über achtunggebietende zoologische Kenntnisse verfügte, schlug ihm vor, sich an einer Forschungsreise nach Afrika zu beteiligen. Alfred Brehm willigte ein. Dieser Entschluß wurde der Wendepunkt im Leben des erst Achtzehnjährigen! Die Reise, oder richtiger das Ende dieser Reise fiel nicht glücklich aus. Baron Müller kehrte, nachdem er mit Brehm insbesondere den Nil bis zu den Negerländern hinaufgefahren war, im Januar 1849 in die Heimat zurück; Brehm blieb auf afrikanischem Boden und rüstete sich zu einer zweiten Reise nach dem Innern des schwarzen Erdteils. Im November 1849 gesellten sich ihm sein Stiefbruder Oskar und Dr. Vierthaler zu. Nun aber kam Unglück auf Unglück: Oskar Brehm ertrank bei einem Bad im Nil im Mai 1850 und im März 1851 erhielt Alfred Brehm die böse Nachricht, daß Baron Müller bankerott geworden sei. Brehm hat über den bankerotten Mann sehr harte und heftige Worte, und zwar in aller Öffentlichkeit, nämlich in einer seiner Schriften, gesprochen. Er ist damit zweifellos zu weit gegangen. Er hätte bedenken müssen, daß doch eben der Bankerotteur es gewesen ist, der Brehms Begabung und Eigenart erkannt und ihm den Weg in die Weite erschlossen hatte.

Zur äußeren mißlichen Lage Brehms kam noch Krankheit, heftiges Fieber. Aber er setzte sich durch und kam im Oktober 1851 wieder in Kairo an, wo er mit dem Württemberger Theodor Heuglin zusammentraf, mit dem er Jagdausflüge nach dem Roten Meer und dem Sinai unternahm. Er erholte sich von den Fieberanfällen und im Frühjahr 1852 konnte er nach fünfjähriger Abwesenheit wieder in die Heimat zurückkehren. In Altenburg wohnte der eben Angekommene der 6. deutschen Ornithologen-

*) Das dieser Nummer beigefügte Bild von Alfred Brehm entnehmen wir seinem Buche „Kleine Schriften" im Verlage des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

versammlung bei und entzückte die Teilnehmer durch seine lebensfrischen Schilderungen über Afrikas Land, Leute und Tierwelt. Der Dreiundzwanzigjährige war ein berühmter Mann geworden!

Auch in der Folgezeit mochte sich der Reiselustige und Reiseerfahrene nicht an die Scholle fesseln lassen. Zunächst besuchte er die hohe Schule in Jena, wo er unter dem Namen „Pharao" bekannt war und Aufsehen erregte durch die Menge afrikanischer Tiere, die er auf seiner Studentenbude pflegte. Im Jahre 1856 bereiste er mit seinem Bruder Reinhold Spanien, 1862 im Gefolge des Herzogs Ernst II. von Sachsen-Coburg-Gotha Habesch. Das Jahr 1876 führte unsern Forscher mit Otto Finsch und Graf Carl von Waldburg-Zeil-Trauchburg nach Westsibirien bis an die chinesische Grenze. Im Jahre 1877 war Brehm längere Zeit Gast des Kronprinzen Rudolf von Österreich, der bekanntlich selbst ein kenntnisreicher Ornithologe und erfolgreicher Jäger war, auf dem Hradschin in Prag und begleitete diesen mit Eugen von Homeyer im Jahre 1878 nach Ungarn an die mittere Donau und 1879 nach Spanien, hauptsächlich um größere Raubvögel am Horste zu beobachten und zu erlegen.

Im Jahre 1858 hatte Brehm seinen Wohnsitz in Leipzig genommen, wo er Unterricht am Gymnasium in Geographie und Naturwissenschaft erteilte. In die Leipziger Zeit fällt seine Verheiratung mit Mathilde Reiz, die ihn auf der Reise nach Abessinien begleitete. Im Jahre 1863 übernahm er die Leitung des Zoologischen Gartens in Hamburg; 1866 gab er diese Stellung auf und übersiedelte nach Berlin, um dort das Aquarium zu gründen, das 1869 eröffnet und bis 1874 von ihm geleitet wurde. Aber auch hier kam es, wie in Hamburg, zu Reibungen. Und so gab er auch diese Stellung auf, um fortan als freier Schriftsteller sich seiner Lebensaufgabe voll widmen zu können.

Diese sah und fand er darin, die Lebensäußerungen der uns umgebenden Tierwelt bis in ihre feinsten Verästelungen zu erforschen und der gebildeten Welt darzustellen. Dazu befähigte unsern A. E. Brehm in hervorragendem Maße die angeborene Begabung, die ausgezeichnete Anleitung, die er vom Vater erhalten hatte, die ausgedehnten Reisen mit ihren vielseitigen Eindrücken und Erfahrungen, und vor allem die unendliche Liebe zu Gottes Geschöpfen aller Tierklassen. Daß in diesen die Vögel wieder die hervorragendste Stelle einnahmen, liegt bei dem Sohne Christian Ludwigs auf der Hand. Endlich befähigte ihn zur Erfüllung seiner Lebensaufgabe die ungewöhnliche Leichtigkeit wissenschaftlichen und künstlerischen Schaffens, die vollkommene Beherrschung des Schrifttums und die Gewandtheit seiner Feder. Alfred Edmund Brehm war ein begnadeter Schriftsteller. Er schrieb eine Prosa von vollendeter Reinheit und Schönheit, die er zuweilen mit dem Purpurmantel des Dichters umkleidete. Er war auch ein Meister des gesprochenen Wortes. Unvergeßlich sind jedem, wie sich der Verfasser dieser Zeilen erzählen ließ, die Vorträge, die Alfred Brehm landauf landab in den größeren Städten Deutschlands gehalten hat. „Wie schön verstand er es", schreibt Rudolf Blasius von diesen Vorträgen, „uns die unzähligen Vogelscharen auf Lapplands Vogelbergen zu schildern; man glaubte, das Geschwirr und Getöse der tausend und abertausend aufgescheuchten Möwen und Alken zu hören; wie wußte er uns das Leben der asiatischen Steppenbewohner auszumalen, die rote Zunge des Kirgisen, die nicht still steht, nachzuahmen; wie fühlten wir uns in den Urwald der Tropen hingezogen; wie entzückend schön malte er uns die Liebe und Ehe der Vögel, wie öde und doch so großartig erschien uns die Tundra und ihre Tierwelt." Sein Sohn Dr. Horst Brehm hat diese Vorträge unter dem Titel „Vom Nordpol zum Aquator" mit Bildschmuck von Friese, Mützel, Fr. Specht und anderen (Union Deutsche Verlagsanstalt) herausgegeben und er durfte mit vollem Rechte im Vorwort sagen: „gerade in den Vorträgen meines Vaters zeigt sich wie kaum irgend sonst in seinen Werken die Mannigfaltigkeit seiner Erlebnisse und Erfahrungen, die Vielseitigkeit seines Wissens, seine meisterhafte Beobachtungs- und Darstellungsgabe, und nicht zum letzten die seinem tief dichterisch veranlagten Gemüte eigene Art der Auffassung belebter und unbelebter Natur, wie auch seine sinnige, herzerfreuende Laune".

Die tiefste und nachhaltigste Wirkung Alfred Edmund Brehms ist aber nicht von diesen seinen Vorträgen, sondern von seinen Schriften ausgegangen. Die Zahl der von ihm veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten erreicht — ohne die gedruckten Vorträge — die stattliche Zahl 181. Darunter befindet sich das Werk, das seinen Namen in aller Welt bekannt gemacht hat, das „Illustrierte Tierleben", von dem der erste Band im Jahre 1863, im Jahre 1869 der letzte, sechste Band erschienen ist. Schon die 2. Auflage umfaßte zehn Bände. Die dritte wurde von Dr. Pechuel-Loesche bearbeitet*). Das mit reichem Bildschmuck versehene Werk wurde in verschiedene Sprachen übersetzt, auch eine dreibändige Volksausgabe davon veranstaltet.

Mag auch in zoologischen Kreisen die Forschungsweise Brehms nicht immer und nicht rückhaltlos gebilligt worden sein, so darf man nicht vergessen, daß die tierkundliche Wissenschaft selbst im Laufe der Zeit mannigfache Wandlungen erfahren hat. Wenn zu Zeiten nur das Anerkennung gefunden hat, was das Seziermesser des Anatomen herauspräparierte, so hatte zu anderen Zeiten nur Gültigkeit, was das Mikroskop dem staunenden Auge offenbarte. Brehm hat keine dieser Arten der Wissenschaft mißachtet, aber sie lagen ihm nicht; sein Feld war ein anderes. Es ist sein ewiges Verdienst, daß er das Tier der gebildeten Welt näher brachte, daß er in Tausenden und Abertausenden, die ansonst achtlos an den Lebewesen vorübergegangen waren, Sinn und Liebe für die Tierwelt, für das Schöne, Fesselnde, Gemütvolle, das im Verkehr mit ihr umschlossen ist, weckte, förderte und erhielt. Mag er nach unserem heutigen Empfinden manches, namentlich bei den hochstehenden Tieren, allzusehr vermenschlicht haben — was schadet es! Wir wissen, wie und warum solches geschah: aus tiefer Liebe zum Tier, wie sie dem deutschen Gemüte eignet.

*) Neuerdings ist eine 4. Auflage des Werkes in 13 Bänden erschienen, herausgegeben von Professor Dr. Zur Straßen (Leipzig, Bibliographisches Institut). Das Werk wurde dem jetzigen Stand der Naturforschung angepaßt.

Weitere größere Werke, die insbesondere für uns Vogelfreunde und -liebhaber von Belang sind, sind „Das Leben der Vögel" (1859 bis 1861), (neuerdings wieder neu herausgegeben in Reclams Universalbibliothek) und namentlich das großangelegte, leider nicht vollendete Werk „Gefangene Vögel, Ein Hand- und Lehrbuch für Liebhaber und Pfleger einheimischer und fremder Käfigvögel", das in den Jahren 1872—1876 unter Mitarbeit der angesehensten damaligen Ornithologen, wie Baldamus, Bodinus, Bolle, Cabanis, Finsch, Girtanner, A. von Homeyer, Liebe, Rey und vielen anderen erschien. Die beiden Bände des ersten Teils: Pfleger und Pfleglinge, Sittiche und Körnerfresser und Weichfresser bilden auch jetzt noch eine Fundgrube für den Vogelliebhaber. Sie sind heute nur noch antiquarisch zu haben.

Schwere Schicksalsschläge sind Alfred Edmund Brehm nicht erspart geblieben: im Jahre 1878 starb seine Frau, „die Sonne seines Lebens", bei der Geburt eines Söhnchens; im Jahre 1883 verlor er dieses selbst, als er eben in den Vereinigten Staaten von Nordamerika angelangt war, um dort eine Reihe von Vorträgen zu halten. Tieferschüttert durch diese Nachricht und geschwächt durch diesen Schlag erkrankte er noch dazu im Mississippigebiete an Malaria. Der „in seiner Blütezeit schön gewachsene, kräftige Mann mit breiter, hoher Stirn, kräftiger Nase, grau-blauen Augen, dunklem Vollbart und langem, nach hinten getragenem Haupthaar, das ihm ein apostelartiges Aussehen gab", der Mann mit der warmen, weichen, den Zuhörer bestrickenden, klangvollen Baritonstimme, war über Nacht ein gebrochener, stiller Greis geworden. Müde kehrte er in die Heimat zurück. In Unter-Renthendorf, wo seine Wiege gestanden hatte und wohin er sich alljährlich zur Erholung ins eigene, von ihm selbst erbaute Haus einige Wochen zurückzuziehen pflegte, ist er am 11. November 1884 einer Nierenerkrankung, erst 55jährig, erlegen. An der Seite seines Vaters, der ein langes, ehrenfestes Leben kaum über sein Pfarrdorf hinausgekommen war, fand der berühmtere, weitgereiste Sohn die letzte Ruhestätte.

W. Bacmeister.

Der Eisvogel.

Von P. Arens, Hannover.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Wenn nun so dargelegt ist, daß die schillernde Oberseite des Eisvogels eine augenscheinliche Schutzfärbung gegen Sicht von oben bildet, auf die vertrauend er sorglos den Blick nach unten richtet, so begegnet die ziegelrote Unterseite in der Hinsicht weit schwierigerer Deutung. Vielfach ist diese, selbst von urteilsfähigen Naturforschern, für die Nachahmung eines abgestorbenen Blattes gehalten, das ist aber höchst unwahrscheinlich, denn inmitten eines grünen Busches würde solches rote Blatt um so mehr auffallen und den Blick auf sich ziehen. Die rote Farbe der Unterseite des Eisvogels hat vielmehr eine ganz andere Erklärung. Eine bemerkenswerte Parallele bilden die in klaren Gewässern lebenden Fische, wie Forellen und Saiblinge, selbst der amerikanische Bachsaibling nicht ausgenommen, die zwar an der Oberseite unbestimmte, braune und grüne, dagegen am Bauche von aller Umgebung abstechende gelbe und rote Farben tragen. Diese Gleichartigkeit mit dem Eisvogel läßt vermuten, daß das seinen übereinstimmenden Grund habe. Um die Erklärung für diese auffällige Übereinstimmung klare Gewässer bewohnender Tiere zu finden, muß vorerst auf eine physikalische Eigenschaft der Farben hingewiesen werden, die darin besteht, daß die kurzwelligen, also die blauen und grünen von kleinen, ihrer Wellenlänge nahekommenden Verunreinigungen zurückgeworfen werden, während die langwelligen Farben, wie rote und gelbe, einfach zwischen diesen hindurchgehen. Daher erscheinen auch klare, d. h. nur minimale Beimischungen enthaltende Gewässer im Aufblicke, also



Bild von der Zwickauer Ausstellung. Heimische Vögel in Kollektionen.

im zurückgeworfenen Lichte „grün“, sogar mitunter „blau“. Selbst die Bläue des Himmels und die Abend- und Morgenröte wird vielfach hierauf zurückgeführt. Mit einer gelben Brille kann man in Nebel gehüllte Landschaften viel weiter und deutlicher durchblicken als ohne sie. Die meisten Vögel haben auf den Zäpfchen ihrer Netzhaut gelbe Fetttröpfchen, deshalb sehen die Raubvögel aus großer Höhe durch die gelbe Brille ihre Beute auf der dunstigen Oberfläche der Erde zu unserer menschlichen Verwunderung unerwartet deutlich. Zugvögel können sich aus demselben Grunde viel leichter zurechtfinden, weil auch für sie vermöge der gelben Fetttröpfchen alle Dunsthüllen besser aufgehellt sind. Sie vermögen über das Mittelmeer hinweg Einzelheiten der jenseitigen in Nebel gehüllten Küsten schon von weitem deutlich zu unterscheiden und die Richtung ihres Fluges danach einzurichten usw. Ein einfacher Zimmerversuch bestätigt die betonten physikalischen Eigenschaften der einschlägigen Farben. Man träufele in ein Glas klares Wasser einige Tropfen Milch, verunreinige es also dadurch in geringer und äußerst feinverteilter Weise, halte dann das Glas nach der dunklen Seite des Zimmers, also in zurückgeworfenes Licht, so sieht das Wasser bläulich aus, dagegen gelblich und in dickeren Schichten orangerot, wenn man es nach dem hellerleuchteten Fenster zu, also in durchscheinendes Licht hält. Also an den minimalen, durch die Milch verursachten Verunreinigungen wird die kurzwellige blaue Farbe zurückgeworfen, während die langwellige gelbe und rote glatt durch diese hindurchgeht, und zwar wächst, nebenbei bemerkt, diese Durchlässigkeit obendrein mit der vierten Potenz der Wellenlänge, also im hohen Grade. Von dem Zutreffen dieser physikalischen Eigenschaften kann man sich nun auch schon durch einen rein mechanischen Versuch überzeugen. Stellt man einen Lattenzaun in einen stehenden Teich und erregt durch langsames und tiefes Plantschen lange Wellen, so gehen diese einfach durch das Gitter und setzen sich auf der anderen Seite fort, erregt man aber kurze, zittrige Wellen, so werden sie von dem Lattenzaune zurückgeworfen. Diese Eigenschaft der langwelligen roten Farbe hat die Folge, daß in klarem Wasser und durchscheinendem Lichte die Fische den Eisvogel in einem roten Felde sehen, er ihnen also mit seiner roten Unterseite nicht auffällt, ebenso wie die an der Bauchseite roten und gelben Fische von unten vor Sicht durch ihre Feinde geschützt sind, wohlgemerkt, nur in klarem Wasser, in dem die Beimischungen höchst fein, fast kolloidal verteilt sind. Dieser Deutung der Unterseite der Eisvögel wird gern entgegengehalten, die Fische seien ja aller Wahrscheinlichkeit nach „farbenblind“. Das entkräftet aber diese Deutung nicht, denn für die obendrein sehr problematische Farbenblindheit treten dann mit gleicher Wirkung die verschiedenen Helligkeitsgrade ein. Alles das sind nun Eigenschaften, welche unseren Freund „Eisvogel“ einesteils „interessant“ machen, andernteils aber eben die Ursache sind, daß recht viele von ihnen ungesehen bleiben. Dazu kommt dann noch seine Stummheit! Jeder, wer Vogelbeobachtungen macht, weiß, daß man viel mehr Vögel hört als sieht, ja daß es oft recht schwierig ist, einen ganz in der Nähe laut werdenden Vogel zu sichten. Bei unpassender Witterung, namentlich bei starkem Winde pflegen die Beobachtungsspaziergänge kärgliche Erfolge zu haben und den Unerfahrenen dazu zu verleiten, anzunehmen, die Vogelwelt habe abgenommen, während es eben lediglich ihr Verschweigen ist, was zu dieser falschen Annahme Veranlassung gibt. Nur der Eisvogel macht sich nicht durch Töne bemerkbar, außer bei seinem Abstreichen, und dadurch ist sein Sichten weiter erschwert. Also alles in allem: es ist eine gewisse Kunst, den Eisvogel zu Gesicht zu bekommen, und keineswegs darf man aus seinem seltenen Anblicke auch auf seltenes Vorkommen oder gar auf „Ausgerottetsein“ schließen. Den Zweiflern ist zu raten, gerade jetzt im Juli unter Beachtung der erwähnten Vorsichtsmaßregeln passende Gewässer fleißig abzugehen, dann wird er nicht selten die Freude haben, sogar eine Anzahl unserer Lieblinge hintereinander anzutreffen, wo die Jungen ausgeflogen sind und sich noch längere Zeit mit ihren Eltern an der Gewässerstrecke ihrer Geburt beieinander aufzuhalten pflegen. Einen ganz besonders überzeugenden Beweis für ihr unerwartet häufiges Vorkommen bringen Zeiten, in denen starke Regengüsse und namentlich plötzliche Schneeschmelzen einen erheblichen Teil der Gewässer stark getrübt haben und dadurch die Eisvögel behufs Nahrungsaufnahme auf die wenigen klargebliebenen Strecken gedrängt werden. Dort findet man zu seiner Verwunderung dann oft eine weit größere Anzahl nicht weit voneinander, wie man sie der Gegend gar nicht zugetraut hat. Freilich darf man die in solchen Zeiten herrschenden schlechten Witterungen und nasse Füße nicht scheuen, über die meist nur passionierte Vogelbeobachter hinwegzusehen pflegen.

Nun mögen auch die „Fischzüchter“ zu Worte kommen. Diese sehen den Eisvogel allerdings mit ganz anderen Augen an als die Naturfreunde oder gar die eingefleischten Naturschützer, aber bei näherem Zusehen liegt die Sache doch auch da ganz anders, als sie namentlich von den letzteren in tendenziöser Weise dargestellt und der Öffentlichkeit glauben gemacht wird. (Fortsetzung folgt.)

Die Zwickauer Ausstellung.

Von J. Birk, Leipzig.

(Nachdruck verboten.)

Wenn man von einer Ausstellung einen Bericht gibt, der Anspruch auf eine unparteiische Kritik erheben will, so sollte man eigentlich bis in die kleinsten Details alles anführen, was Lobens- und was Tadelswertes gezeigt wurde. Wenn man aber die Ehre hatte, das Amt eines Preisrichters auf der zu besprechenden Ausstellung zu bekleiden, so darf man nicht alles das berichten, was das Auge des Preisrichters zu sehen hat, denn sonst würde das Gesamtbild einer Ausstellung unnötig in einem anderen Lichte erscheinen, als es in Wirklichkeit der Fall war. Daher will ich mich auch im nachstehenden Bericht befleißigen, wohl die Wahrheit über die vorhandenen Mängel, aber in einer, zum weiteren Fortschreiten auf dem Wege zur Besserung anregenden Form, zu sagen. Der Verein für Vogelschutz und -liebhaberei

zu Zwickau (früher Zoologischer Verein) ist nach meinem jahrelangen Zusammenarbeiten mit demselben im Landesverband Sachsen und Großthüringen einer der rührigsten Vereine, der stets bestrebt war, auf dem Gebiete der modernen Stubenvogelpflege Anregung zu suchen und sich auch die gewonnenen Eindrücke anderer Ausstellungen zu eigen zu machen. Der Zwickauer Verein, und dies kann ich mit freudigem Stolz berichten, fehlte niemals, wenn es galt, eine Leipziger Ausstellung zu besuchen, bei der Gründung des Landesverbandes und den Tagungen desselben, selbst bei der Reichsverbandsgründung in Berlin war dessen rühriger Vorsitzende H. Schmidt delegiert, Beweis genug, daß Zwickau den Gedanken und die Notwendigkeit der Organisation sofort erfaßt hatte. Dies muß ich vorausschicken, um zu zeigen, daß, wenn ich auch von Mängeln der Zwickauer Ausstellung sprechen muß, es nicht etwa an der Rückschrittlichkeit der Vereinsleitung, sondern einzig und allein an der Tatsache liegt, daß Zwickau als vorgeschobenster Posten an der Grenze des Erzgebirges auch mit den in dieser Gegend eingebürgerten und nicht von heute auf morgen auszurottenden Gepflogenheiten liegt. Unseren Erzgebirglern, ein biederes, arbeitsames, naturliebendes Volk, darf man nicht kurzerhand den guten Willen zur Bekehrung zu einer modernen Vogelpflege absprechen, im Gegenteil, der gute Wille scheitert leider an der wirtschaftlichen Lage dieser Gebirgsbewohner. Der Anfang ist gemacht und das Versprechen unserer Erzgebirgler, in Punkt Käfigfrage etwas großzügiger zu werden, wird zum Teil von verschiedenen erzgebirgischen Vereinen, wenn auch langsam, so doch sicher bereits in die Tat umgesetzt. Aus der nahen Nachbarschaft des Erzgebirges wurde man auf der Zwickauer Ausstellung, was Käfigmaße anbetraf, nichts mehr gewahr, ja im Gegenteil, es waren Kollektionen Käfige zu sehen, die man sofort als Früchte vom öfteren Besuche in Leipzig ansprechen mußte. Daß Zwickau nicht auf halbem Wege stehen bleibt und nicht rastet, bis auch der letzte nicht mehr vorschriftsmäßige Käfig von seinen Ausstellungen verschwindet, dessen bin ich mir gewiß, nur Geduld muß man haben, denn von den Vätern Ererbtes wirft man nicht voreilig beiseite.

Der Gesamteindruck der Zwickauer Ausstellung war ein sehr guter, ja ich muß es hier offen aussprechen, daß ich meine Erwartungen eigentlich bescheidener gestellt hatte, denn fast jeder Ort hat eine eigentümliche Einstellung in der Ausübung der Stubenvogelliebhaberei, und diese muß man berücksichtigen, wenn man das Gesamtbild auf sich einwirken läßt.

Um in dem Bericht nicht das Wertvollste einer Ausstellung, das lebende Material, die gekäfigten Vögel, in bezug auf das sonst noch zur Schau Gestellte verblassen zu lassen, will ich die Zahlen und Arten selbst reden lassen. Die Kollektion der einheimischen Vögel setzte sich aus nachstehenden Arten zusammen: 1 Sprosser, 1 Nachtigall, 12 Rotkehlchen, 5 Blaukehlchen, 6 Schwarzplättchen, 5 Gartengrasmücken, 1 Heide-, 1 Hauben-, 2 Feldlerchen, 1 Rotdrossel, 1 Bachstelze, 1 Kleiber, 9 Tannenmeisen, 7 Blaumeisen, 3 Kohlmeisen, 1 Heckenbraunelle, 1 Baumpieper, 1 Sumpfmeise, 1 Seidenschwanz, 2 Gartenrotschwänze, 2 Amseln, 3 Singdrosseln, 1 Star, 21 Zeisige, 20 Hänflinge, 2 Girlitze, 3 Grünfinken, 21 Stieglitze, 4 Kreuzschnäbel, 5 Buchfinken, 8 Dompfaffen, 1 Kirschkernbeißer, 2 Leinzeisige, 2 Bergfinken, 2 sibir. Braunkopfammern, 1 Stieglitz-Kanarien-Bastard.

Die Abteilung Exoten war verhältnismäßig ebenso reichhaltig; ausgestellt waren: 2 dreifarbige Nonnen, 2 kleine Elsterchen, 2 Hartlaubszeisige, 3 Schönbürzel,



Tigerfinken.

6 jap. Möwchen, 6 Bandfinken, 7 Schmetterlingsfinken, 2 rote Amaranten, 2 Atlasfinken, 19 Wellensittiche (grüne und gelbe), 4 Rotkopfamadinen, 2 Silberschnäbel, 1 Tigerfink, 1 Graugirlitz, 3 Grauastrilden, 4 Silberfasänchen, 2 Zebrafinken, 2 Mossambikzeisige, 5 Schwarzkopfammern, 4 graue Reisfinken, 2 blaubürzl. Zwergpapageien, 1 roter Kardinal, 1 Papstfink, 2 Oryxweber, 2 Mönchsittiche, 2 Singsittiche, 1 Gelbhaubenkakadu, 1 Kubaamazone.

Vorstehende Kollektion heimischer und fremdländischer Vögel sagt mehr als Worte, die Beschickung der Zwickauer Ausstellung nach Arten und deren Zahl war eine über alle Erwartung gute, ein Beweis, daß der Zwickauer Verein eifrige Liebhaber zu seinen Mitgliedern zählt.

Auch was sonst noch gezeigt wurde, was nicht mit der Stubenvogelpflege, wohl aber mit der Naturliebhaberei verknüpft war, wie eine sehr reichhaltige Eiersammlung europäischer und exotischer Vogelarten in 15 Glaskästen, ebenso eine mit viel Mühe und Fleiß zusammengestellte Schmetterlings-, Raupen- und Käfersammlung in 25 Glaskästen, bildete einen Hauptanziehungspunkt der Ausstellungsbesucher. An präparierten Vögeln waren Raub- und Singvogelarten in 250 Exemplaren zur Schau gestellt, zum Teil in einer wirklich sinnreichen Gruppierung indem neben den Vogelarten noch eine schöne Reh-

gruppe (Bock, Ricke mit Jungen) eingefügt war; 2 Prachtexemplare Wildkatzen legten Zeugnis ab von dem Vorkommen dieser aussterbenden Räuber in dortiger Gegend. Ebenso bildeten 3 präparierte Fische die Erinnerung, daß auch dereinst in der Zwickauer Mulde Fische vorkamen; denn diese 3 Belegstücke waren die letzten, die noch in dem, jetzt von Fabrikabwässern vergifteten, jetzt fischlosen Flusse vorkamen. Ein wirklich mustergültig eingerichtetes und besetztes Aquarium und Terrarium beherrschten ein anderes Gebiet der Naturliebhaberei. Die Firma Schindler, Zwickau, wohl die bedeutendste Vogelhandlung am Platze, hatte sämtliche Futtersorten in einwandfreier Qualität ausgestellt, ebenso auch Käfigmaterial. Leider waren es nur die sogenannten Salonblechkäfige, die praktischen Körner- und Weichfresserkäfige fehlten leider. Für Belustigung von groß und klein sorgten ein paar Äffchen; sie bildeten ein stark belagertes Schauobjekt. (Schluß folgt.)

Etwas über die Ernährung zarter Weichfresser.

Von Karl Finck, Neukölln.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Schon aus diesem Grunde sollten Laubvögel, Gelbspötter, Zaunkönig, Rohrsänger, Goldhähnchen usw. möglichst lange lebende Insekten bekommen.

Noch gegen Ende Oktober fing ich mit der Leimspindel an einem sonnigen Vormittag in kurzer Zeit über 30 Schmetterlinge und eine Unzahl Fliegen.

Auch die Raupen der verschiedensten Eulenschmetterlinge waren noch zahlreich vorhanden; sie saßen halb erstarrt mit Vorliebe an den Ranken der Kapuzinerkresse (Tropaeolum) und fielen beim Lüften der Pflanzen sofort auf den Boden. Sehr häufig sind ferner oft noch im Spätherbst die graugrünen Scheinraupen der Rübenblattwespe (Athalia spinarum).

Ebenso weben im September und Oktober viele Spinnen ihre Netze, von wo sich die Tiere unschwer in ein Fangglas klopfen lassen, das mit einem weitrohrigen Trichter abgedeckt ist. Die Tötung geschieht durch heißes Wasser. Selbst die Gewinnung der Blattläuse ist möglich. Diese Schädlinge bedecken nicht selten die Triebspitzen der Rosen und Edelpflaumen, besonders in sandigen, trockenen Lagen.

Mirabellen, die große, grüne Reineclaude und Königin Viktoria sind Pflaumensorten, welche in manchen Gärten auffallend unter der Läuseplage zu leiden haben. Man schneidet stark befallene Zweige ab oder streift die winzigen Schädlinge mit einem Pinsel in ein Gefäß, worin sich etwas Wasser befindet.

Mit der Leimspindel können die verschiedensten Laubinsekten schnell gefangen werden.

Für schwächere Arten genügen wasserlösliche Klebestoffe. Diese sind abwaschbar und schon deshalb empfehlenswert. Ein Zusatz von Glyzerin oder Chlorcalcium ($CaCl^2$) verhindert das schnelle Eintrocknen.

Rohrsänger verspeisen gerne kleingeschnittene Wasserlibellen. In den ungarischen Donauniederungen bilden streckenweise dichte Weidendickungen, sumpfige, buschreiche Wiesen und unermeßliche, bodenlose Schilfflächen eine bunte, parkartige Landschaft.

Zu meiner Zeit lebten in diesem Gebiete ungestört Reiher, Kraniche, Rohrdommeln, Wildgänse, verschiedene Entenarten, Pelikane, Regenpfeifer, Beutelmeisen, Rallen, Teichhühner, Eisvögel usw. in unglaublicher Zahl. Aber auch Sprosser, den großen Rohr-, Teich- und Sumpfrohrsänger hörte man überall.

Einmal hatte ich in einem Niederungsdörfchen geschäftlich zu tun und machte dabei die Bekanntschaft des dortigen Pfarrers. Im Laufe der Unterhaltung merkte ich, daß der liebenswürdige Herr außerordentlich gut die Ornis, die Flora und Insektenwelt des Bezirkes kannte.

Gerne nahm ich die Einladung an. Zu meiner größten Überraschung fand ich in dem schmucklosen Pfarrhause eine reichhalige Weichfresserssammlung vor.

Sprosser, Nachtigall, die verschiedensten Grasmücken, sämtliche Lerchen, Beutelmeisen, Zaunkönige, Gelbspötter, Sumpf- und Teichrohrsänger waren vorhanden, selbst der Flußrohrsänger fehlte nicht.

Dabei sahen alle Vögel glatt und munter aus, obwohl viele nach Angaben sich schon jahrelang im Käfig befanden.

Der Herr Pfarrer fütterte im Sommer Ameisenpuppen, Theißblüte (Palingenia longicauda), eine Ephemerenart, Schmetterlinge, ebenso Mücken. Letztere wurden mit Lichtfallen massenhaft erbeutet und teilweise abgetrocknet.

Das Winterfutter bestand hauptsächlich aus trockenen Ameisenpuppen, Weißwurm (Theißblüte), Mücken und Eigelb. Die Anfeuchtung geschah mit wenig geriebener Mohrrübe. Nebenbei gab es selbstverständlich auch Mehlwürmer. Sämtliche Grasmücken erhielten Obst.

Wintermauserer, z. B. Gelbspötter und die Rohrsängerarten, bekamen in der Zeit des Federwechsels noch gekochtes Fischfleisch. Ellritzen, Gründlinge wurden getötet, abgebrüht und in einer Reibschale mit Gräten und Schuppen fein zerstampft, worauf ein Zusatz ($^1/_2$) von Milch erfolgte. Dadurch wurde der Eiweißgehalt auf ungefähr 9—10 Prozent herabgedrückt und der Kalkbestand erhöht.

Von dem breiigen Gemisch erhielt jeder Vogel täglich eine Messerspitze voll; es sollte ungemein den Mauserprozeß fördern.

Die Vermutung kann stimmen. Hühnerküken mausern überraschend schnell, wenn die Tierchen frische Fische erhalten. Bei der Stubenkückenzucht rechnet man pro Kopf täglich 15 Gramm.

Würgern reichte ich im Winter oftmals kleine Fischchen. Anscheinend mit vorzüglichem Erfolg.

Wenn ich in der „Gef. Welt" die schönen Aufsätze von Max Rendle las, fiel mir immer der stille, freundliche Pfarrherr des ungarischen Dörfchens ein, der so fein die Natur beobachten konnte.

Die Ernährung der Gelbspötter, Zaunkönig, Sumpf- und Teichrohrsänger, der Laubvögel usw. sollte nach folgenden Grundsätzen geschehen:

1. Im Frühjahre, Sommer und Herbst bekommen die Gefangenen vorwiegend frische Ameisenpuppen, glatte Raupen, Fliegen, zerschnittene Schmetterlinge, Spinnen, die Weichteile von Heuschrecken und Käfern.

2. Das Winterfutter besteht am besten aus trockenen Ameiseneiern, Weißwurm (sehr eiweißreich),

Hühnerei, Schmetterlings- und Insektenschrot. Die Anfeuchtung geschieht mit wenig geriebener Möhre oder Obstsäften.

Mehlwürmer, deutsche Schwaben (Blatta germanica) und Küchenschwaben (Periplaneta orientalis) ergänzen den Küchenzettel.

Die beiden letzten Kerfen nähren nicht so intensiv wie der Mehlwurm, dürfen aber aus keinen Räumlichkeiten stammen, wo Gift gelegt wurde.

3. Die Fütterung muß sich nach dem Körperbefunde richten, der ständig zu kontrollieren ist.

4. Ein zu einseitiges Nährstoffverhältnis wirkt schädlich. Bei zu reicher Eiweißaufnahme, namentlich wenn Verdauungsschwächen vorhanden sind, wird der Harnsäuregehalt des Blutes vermehrt. Die harnsauren Kristalle werden in den Eingeweiden und Gelenken abgelagert, wo sie starke Reize verursachen.

Das Allgemeinbefinden leidet immer mehr, Bein- und Darmkrankheiten stellen sich ein, und schließlich verursachen erschöpfende Durchfälle den Tod.

Die Gicht, deren eigentliche Auslösungsmomente noch unbekannt ist, kommt unter dem Geflügel häufig vor und bildet auch die verbreitetste Stoffwechselkrankheit unserer Stubenvögel.

Jedenfalls sollten zarte Insektenfresser niemals Fisch- und Fleischmehl erhalten, die außerdem durch Fettsäuren schädlich wirken.

In 100 Teilen	Verdauliche Nährstoffe		
	Eiweiß	Fett	stickstofffreie Extraktstoffe
Fischfuttermehl	47	10,2	—
Fleischfuttermehl	65,2	12,5	—
Hühnerei, ganz	12,6	12,2	0,6
Maikäfer, lebend	13	3,2	—
Maikäfer, getrocknet	37	9,5	—
Kalbfleisch, roh	15	1,3	—
Eigelb	16,3	31,5	—
Weißbrot	9,1	1	59,5

Mehlhaltige Beimischungen (Weißbrot usw.) bleiben am besten ebenfalls weg. Leider stehen uns im Winter keine grünen Raupen zur Verfügung. Hält man jedoch Mehlwürmer längere Zeit trocken, so verzehren sie sofort zerquetschte Vogelmiere, und ihre Verdauungsorgane füllen sich rasch mit Pflanzensäften an. Ob derart gefütterte, grünlich aussehende Würmer zur Gefiederfärbung des Sprachmeisters ausreichen, möge dahingestellt bleiben. Versuchsweise gab ich Wurmvögeln zarte Spinatblätter, die einige Minuten in kochendes Wasser, worin zur Erhaltung des Blattgrüns ganz winzige Mengen doppelkohlensaures Natrium ($NaHCO_3$) aufgelöst waren, getaucht und hierauf vollständig zerrieben, mit hartem Eigelb und Ameisenpuppen vermischt wurden. Abgeschlossene Erfahrungen liegen noch nicht vor.

Kolkrabe badend (s. S. 379).

Ein Versuch von Brillenvögelzüchtung.

Von Dr. A. Schmitt, Budapest.

(Nachdruck verboten.)

Im Herbst des Jahres 1912 bestellte ich infolge eines Inserates der „Ges. Welt" aus Triest (von Privathänden) ein Zuchtpaar Japanische Brillenvögel. Sie kamen glücklich an, aber waren keinesfalls Japanische, sondern eine solche Art, die nach Ruß, „Fremdl. Stubenvögel" (kleine Ausgabe, 1901) gar nicht zu bestimmen war. Bis jetzt waren in meinem Besitze nur Zosterops japonica, Z. palpebrosa und Z. capensis, aber meine neuen Brillenvögel waren auffallend kleiner wie die erwähnten und auch anders gefärbt. Zufällig fand ich in dem „Journal für Ornithologie" 1865 Nr. 73 einen monographischen Versuch über die Gattung Zosterops von Dr. G. Hartlaub. In dieser Abhandlung sind 52 Arten beschrieben und die unter den asiatischen Arten mit dem Namen „Zosterops lateralis" bezeichnete Art schien mir mit den Neulingen sehr übereinzustimmen. Ich zitiere hier wörtlich, was von „Zosterops lateralis" in der Monographie steht.

Zosterops lateralis, *Temm.* Supra saturate flavescente-viridis; supracaudalibus flavioribus; remigibus nigris, dorsi colore marginatis; cauda nigra; annulo periophtbalmico albo, infra nigro-circumdato; gula citrina; pectore et abdomine dilute plumbeis, medio longitudinaliter flavis; cruribus et subcaudalibus saturate flavis; subalaribus albis, flavido variis; rostro brevi, recto, nigricante. — Fem. vix diversa. Zahlreiche Exemplare von Java und Sumatra in der Leidener Sammlung usw.

Ich muß noch zugeben, daß den gelben Streif „longitudinaliter" am Bauch nur das Männchen hatte, sonst waren beide Geschlechter ganz übereinstimmend.

Im Frühjahr 1913 setzte ich das Pärchen im Freien auf einer großen Terrasse in einen kaum 2 m langen, 1 m breiten und 2 m hohen Flugkäfig, wo auch andere friedliche Exoten beisammen waren. Im Laufe dieses Jahres bemerkte ich keine besondere Neigung zum Nisten. Sie wurden in der Wohnstube in einem Gesellschaftskäfig mit den anderen Vögeln überwintert. Ihr Benehmen war, wie es im allgemeinen bei den Brillenvogelarten der Fall ist, höchst anziehend. Sie waren durchaus friedlich, immer munter, sehr zutraulich und klug. Ihr leiser grasmückenartiger Gesang wurde oft vorgetragen. Ein Paar Mausvögel (Colius striatus) waren auch dabei, und diese waren die größten, friedlichsten und zugleich die furchtsamsten Gesellen. Wenn die „Mäuse" fraßen, waren die „Brillen" gleich dort, die Futterreste von dem Schnabel der Mausvögel abzupicken. Oft kletterten die kleinen Grünlinge auf den langen Schwanz der Mausvögel ganz gemütlich auf, was diese gar nicht übelnahmen.

In dem erinnerungsvollen Jahre 1914 wurden sie auf dem früheren Platz, aber in einer geräumigeren Voliere untergebracht. Es waren ungefähr 15 Stück gut zusammengewöhnte, friedliche Exoten beisammen. Die Voliere war mit verschiedenen Nistgelegenheiten und künstlichen Dickichten gut eingerichtet.

Im April wurde das Männchen sehr unruhig: mit Kokosfasern im Schnabel flog es herum und jagte die in den Weg kommenden Vögel immer fort. Wo sie nisten wollten, konnte ich noch nicht feststellen. Ich hatte sehr wenig Hoffnung, daß diese Aufregung ernstere Folgen haben würde, jedoch wollte ich ihre schlauen Beschäftigungen mit längerem Fixieren nicht stören. Nach einigen Tagen aber sah ich nur das Männchen, wie es von einer gewissen Stelle die anderen Vögel forttrieb, und das Weibchen war nirgends zu sehen. Hier muß doch etwas geschehen sein, dachte ich und versuchte, sie genauer zu beobachten. Bald erschien auch das Weibchen, aber von wo, das war nicht bemerkbar —, und saßen alle beide ganz ruhig auf einem Zweige, als wenn sie dächten: „Brauchst gar nicht so neugierig zu sein, es ist noch nichts geschehen." Nach kurzer Zeit verschwand das Weibchen wiederum. Nächsten Tag sah ich das Weibchen selten und ich wurde so neugierig, daß ich mich ernstlich entschloß, die Geheimnisse aufzudecken . . .! Ich fand das Nest in einem künstlichen Dickicht. Es war kugelrund aus Kokosfasern, mit kleiner seitlicher Öffnung. Dieses Schlupfloch war so klein und das Nest so verborgen, daß ich es innen nicht ausspähen konnte. Aber ich meinte: wenn ich schon so weit bin, versuche ich wenigstens mit meinen Fingern hineinzugreifen, und welche Überraschung! — ein Ei war darin, und zwar lichtgrün und ziemlich groß. Vorsichtig legte ich das Ei zurück und habe erwartungsvoll beobachtet, was jetzt — nach diesem Attentat — geschieht? Kaum einige Minuten, und das Weibchen verschwand wieder und saß fest weiter.

Es waren vier Eier gelegt und das Weibchen brütete allein, das Männchen nur, wenn das Weibchen zum Fressen auf kurze Zeit hinausflog. Sonst hielt es sich immer in der Nähe des Nestes auf und vertrieb hurtig die anderen Vögel, sogar auch die größeren. Bösartig war es nie, aber in engerem Raum wäre es in der Brutzeit kaum verträglich. Brutdauer war ungefähr 12 Tage.

Junge Raben (s. S. 379).

Vier Junge sind ausgeschlüpft. Zur Aufzucht legte ich alles mögliche vor. Von den kleinen frischen Ameisenpuppen schälte ich die Hülsen ab, reichte Blattläuse und ganz kleine Obstwürmer. Die Blattläuse verzehrten die Alten selbst, aber die Jungen fütterten sie gar nicht mit diesen, nur mit den Ameisenpuppen und mit dem inneren Teil der Mehlwürmer. Nämlich, sie saugten es selbst aus meiner Hand, wie ich es ihnen hinreichte, und trugen es hinein in das Nest. Sie suchten aber fortwährend noch etwas anderes, besonders am Boden, wo Sand, Walderde und Rasenstücke waren. Besonders nach dem dritten bis vierten Tag nach dem Ausschlüpfen bemerkte ich oft, wie die Alten einen Teil Ameisenpuppen in das Nest hineintrugen, aber sofort waren sie mit den Puppen wieder draußen und flogen damit überall herum in der Voliere, als wenn dazu noch etwas fehlte. Wie sie dieses Ding vergebens suchten, schlüpften sie wieder in das Nest. Überdies bemerkte ich noch öfters, daß sie zu Ameisenpuppen ein kleines Stück Erde nahmen oder pulverisiertes Hühnerei.

Die Voliere war auf der Terrasse mit vielen verschiedenen Blumen ganz umgeben, also viele kleine,

lebende Insekten waren vorhanden; darum meinte ich, daß sie auch solche selbst fangen werden. Mir scheint aber, daß es nicht oder sehr selten geschehen ist. — Sie entbehrten sicherlich einen gewissen mineralischen Stoff, der gar nicht zu finden war. Sie fütterten die Jungen doch fleißig mit geschälten Ameisenpuppen und mit dem weichen Teil der Mehlwürmer, aber — leider — es war alles vergebens. — Nach 7—8 Tagen waren die Jungen tot und die Alten warfen sie heraus aus dem Nest. Die Kröpfe der Jungen waren mit dem erwähnten Futter ganz vollgestopft, das sie nicht verdauen konnten.

In demselben Jahre nisteten sie noch zweimal, also „dreimal" nacheinander. Bei der ersten Brut — wie erwähnte — wurden vier und dann bei der zweiten und dritten je drei Junge ausgebrütet, zusammen zehn Junge. — Die Aufzucht ist auch bei der zweiten und dritten Brut nicht gelungen.

Das ergrauende Granatastrildmännchen von vorne, ergrauendes Blauastrildweibchen von hinten. Aufnahme in der Zimmervoliere von A. Adlersparre (s. S. 379).

Im Monat August (1914) mußte ich zum Militärdienst einrücken und von meinem Heim abreisen. Infolgedessen gab ich einen Teil meines Vogelbestandes schnell weg. Die Brillenvogelarten behielt ich vorläufig und diese lebten noch einige Jahre. Sogar im Jahre 1916 paarte sich ein ♀ Japanischer Brillenvogel mit einem Kap-Brillenvogel (freifliegend in dem Wohnzimmer) und legte mehrere Eier, aber ein Mexikaner Gimpel×Kanarien-Bastard hat alle Eier zugrunde gerichtet. Das ♀ ertrank später in einem Wassereimer in meiner primitiven Militärwohnung. So haben sie, die lieben kleinen Zosterops-Arten, wegen der schlechten Ernährung usw. nacheinander von dem Leben Abschied genommen, und seit der Zeit, infolge der sehr schweren Zeiten, die wir durchlebten, war ich noch nicht in der Lage, mit meinen kleinen Brillenvögelchen weiter experimentieren zu können.

Es tut mir sehr leid, daß ich verschiedene, mit hartgekochtem Eigelb kombinierte Weichfutter nicht ausprobieren konnte, zum Beispiel ein Gemisch von dem inneren Teil der Ameisenpuppen oder Mehlwürmer mit Eigelb usw. — Aber es ist selbstverständlich, daß solche Leckerbissen auch die anderen Insassen der Voliere gern vertilgen, darum halte ich für sehr ratsam, solche kleinen Weichfresser — während der Züchtung — in einem ganz separaten Raum zu halten oder nur mit wenigen und kleineren Arten, weil sonst die anderen oder größeren Vögel die nicht für sie bestimmteu Futtergemische sogleich verzehren.

Die Lehre von der Ernährung und ihre Anwendbarkeit bei der Fütterung unserer Stubenvögel.

Vortrag gehalten im „Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln" vom Mitgliede Herrn Dr. Stehle.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Meine Damen und Herren, wir haben auch in der Medizin manchmal einen Organismus zu ernähren, für den es nur eine Normalnahrung gibt, nämlich den Säugling, seine Normalnahrung ist Frauenmilch; ist er gesund, so wird er bei der Normalnahrung gesund bleiben und sich normal entwickeln; dagegen können leichte Änderungen in der Ernährung, wie z. B. die Milch eines anderen Säugetieres, ihm in kurzer Zeit sehr verhängnisvoll werden. Welche Wege stehen uns bei der Ernährung dieses Organismus offen? 1. Verabreichung der Normalnahrung, der der Organismus auf das innigste angepaßt ist, sie ist und bleibt das Ideal, 2. Verabreichung einer der Normalnahrung möglichst nahekommenden Mischung, es handelt sich um ein mit Zucker- und Wasserzusatz korrigiertes Kuhmilchgemisch, 3. Verabreichung von empirisch gebundenen Nährmitteln, deren gute Erfolge für ihre Verwendbarkeit sprechen, z. B. gelöste Malzpräparate, auf die eigentlich der Säuglingsmagen gar nicht abgestimmt zu sein scheint, die ihm aber erfahrungsgemäß doch gut bekommen. Ich glaube, die Fütterung unserer Weichfresser dürfen wir hiermit in Parallele setzen; das Idealfutter, auf das der Organismus völlig abgestimmt ist, werden wir ihnen in der Gefangenschaft

nie genügend bieten können, es bestünde in einem Gemisch verschiedener frischer Insekten. Der zweite Weg bestünde in einer Fütterung, die sich an das Normalfutter möglichst anzulehnen bestrebt, hierzu möchte ich frische und getrocknete Ameisenpuppen, Muska, Weißwurm, Mehlwürmer rechnen. Der dritte Weg bestünde in der Fütterung von Stoffen, die mit der natürlichen Nahrung des Vogels eigentlich gar nichts zu tun haben, von denen aber die Erfahrung lehrte, daß sie der Vogel, daran gewöhnt, mit Appetit frißt und daß sie ihm gut bekommen; hierzu gehört: gekochtes Hühnerei, Fleisch, Möhre, Weißbrot. Gingen wir bei der Fütterung unserer Weichfresser einzig von dem Nährgehalt der Nahrungsmittel aus, so müßten sie sich bei einem Gemisch von Ei, gehacktem Fleisch und Weißbrot sehr wohlfühlen, doch haben wir dabei ganz unberücksichtigt gelassen, daß der Geschmack dem Vogel in der Natur als Wegweiser der aufzunehmenden Nahrung dient, daher müssen wir von einem Futter in erster Linie verlangen, daß es dem Vogel schmeckt, denn nur dann bekommt es ihm. Eine große Rolle spielt sicherlich auch die Konsistenz der Nahrung, man denke an die reichlichen Chitinpanzer, Flügel usw., die jeden Insektenkörper einhüllen, wodurch auch eine größere Menge von Insekten doch eine sehr lockere Masse darstellt, worin sich die Nährstoffe zwischen viel Unverdaulichem befinden; diese physikalische Eigenschaft des Gemenges trachten wir ja bei der Herstellung unseres Universalfutters nachzuahmen; die nährenden Fleisch- und Eibröcklein finden sich zwischen großen Mengen unverdaulicher Möhrenzellulose, Käferflügeldecken können wir vielleicht durch die Schalen von gequetschtem Hanf vortäuschen. Die im Futter vorhandenen trockenen Ameisenpuppen, Muska dienen wohl mehr zur Anregung des Appetits wie als Nahrungsmittel. Vitamine und Salze erhält der Vogel wohl genügend im frischen Möhrensaft und in den Mehlwürmern, von denen ich dauernd mindestens zwei Stück darzureichen für nützlich halte. Um das Vorhandensein der anderen Nährstoffe, wie Eiweiß, Fett, Kohlehydrate, brauchen wir uns wohl kaum zu sorgen, denn schmeckt das Futter dem Vogel, dann verzehrt er solche Mengen, daß sein Bedarf gedeckt wird. Ja ich möchte sagen, manchmal straft der Vogel unsere ganze Wissenschaft mit Verachtung, indem ihm ein Futter, das recht wenig der angeführten Nährstoffe enthält, ganz ausgezeichnet bekommt. Ich denke dabei vor allem an die frischen Ameisenpuppen, die 75% Wasser enthalten, an die Beerennahrung im Herbst, die außer etwas Zucker und Fruchtsäure nur aus Wasser besteht, es kommt eben weniger darauf an, was in den Magen hineinkommt, als darauf, was der Vogel aus der Nahrung herausholt, und vor allem darauf, ob das Futter in physikalischem und chemischem Aufbau dem Vogelmagen genehm ist und von ihm ausgenützt werden kann. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, daß die Wissenschaft bei der Ernährungslehre von den bekannten menschlichen Nahrungsmitteln ausgeht, daß es sich bei der Vogelfütterung hauptsächlich darum handelt, diese zu finden; erst in zweiter Linie kommt dazu deren Gehalt an bestimmten Stoffen in Frage. Ein Beispiel, wie ein Organismus, der sich ganz einseitig auf eine bestimmte Lebensweise festlegte, rein künstlich ernährt werden kann, ist der Ameisenbär; ganz darauf eingestellt, mittels seiner Krallen und wurmförmigen, langen Zunge Termiten und Ameisen zu verzehren, gelingt seine Ernährung mit einem Brei aus Milch, Ei und gehacktem Fleisch in der Gefangenschaft; solch ein Beispiel muß uns veranlassen, bei unseren Pfleglingen immer wieder das eine oder andere als Futter zu probieren, vielleicht finden wir etwas Neues, das ihm schmeckt und ihm bekommt. Welchen Einfluß gewisse Futtermittel auf den Vogelkörper haben, sehen wir z. B. bei der Fütterung unserer Kanarienvögel mit Cayennepfeffer, wobei der zugeführte Farbstoff im Federkleid des Vogels sichtbar wird; wieviele Futtermittel mögen den Körper in dieser oder jener Richtung beeinflussen, ohne daß

Ergrauendes Granatastrildmännchen (s. S. 379). Aufnahme in der Zimmervoliere von A. Adlersparre.

diese Veränderung zunächst unseren Sinnen wahrnehmbar wird.

Meine Damen und Herren, Sie haben vielleicht vor einigen Wochen einen Aufsatz von Adlersparre gelesen, worin dieser von Spezialstoffen spricht, wobei er in enger Anlehnung an die menschliche Ernährungslehre an Salze, Vitamine und einige Aminosäuren wie Thyrosin, Tryptophon u. a. denkt, die die dem Körper als solche zugeführt werden müssen. Ich glaube, wir müssen bei unseren Vögeln noch viel, viel mehr Spezialnährstoffe annehmen, und zwar finden sich dieselben wohl für jede Vogelart in der ihr eigentümlichen Normalnahrung, der ja der Organismus so gänzlich angepaßt ist. Eine Stütze dieser Behauptung sehen wir in Ausfallserscheinungen, die beim Fehlen dieser Stoffe auftreten; die auffälligsten dieser Erscheinungen sind dabei sicher Veränderungen in der Färbung des Vogels, wie wir sie beim gekäfigten Kreuzschnabel, Hänfling und Blaukehlchen beobachten können. Es wären vielleicht noch einige Worte über die Nahrungsmengen zu sagen; den größten Teil des Jahres ist die

Nahrungssuche die Hauptbeschäftigung des Vogels, das Gefundene wird sofort verzehrt; es liegt nahe, anzunehmen, daß der Vogel diese seine Hauptbeschäftigung in der Gefangenschaft nicht plötzlich ablegen kann und, da ihm das Finden sehr leicht wird, zuviel frißt; Sie alle kennen ja den fetten, trägen Vogel; das beste Gegenmittel ist wohl ein großer Käfig, viel Obst, Anregung durch lebhafte Käfiggenossen. Es sind künstliche Nährsalze im Handel; ich kann mich von einer gewissen Abneigung ihnen gegenüber nicht freimachen und glaube, daß wir uns und dem Vogel am besten dienen, wenn wir durch Beobachtungen in freier Natur den Kostzettel des Gefangenen reichhaltiger gestalten, dann vergessen wir auch nie das große Ganze und sind uns immer bewußt, daß wir im Vogel nur ein einzelnes Steinchen aus dem gewaltigen Mosaikgebäude der Natur besitzen, daß wir die ganze Schönheit und Harmonie im Naturgeschehen nur dann verstandes- und gefühlsmäßig erfassen können, wenn wir die tausend Fäden, die sich vom Einzelnen zum All spinnen, zu finden trachten.

Kleine Mitteilungen.

In „Wild und Hund" berichtet Herr J. G. Lensch-Borgstedt: „Der Gastwirt Rehder (Colosseum) in Rendsburg besitzt einen **zahmen Kolkraben**, den ich schon etwa 30 Jahre kenne. Auf Befragen erklärte mir der Besitzer, der Rabe sei 43 Jahre alt. Er ist als junges Tier in dem staatlichen Elsdorfer Gehege gefangen, wo noch jetzt verschiedene Paare horsten sollen. Das Tier ist jetzt erblindet und muß aus der Hand gefüttert werden". (S. Abb. S. 375, 376.)

Hiermit erlaube ich mir zwei Aufnahmen eines ergrauenden Granatastrildmännchens zur gefl. Verfügung zu stellen. Der betr. Vogel ist schon im Artikel: **„Ein paar Worte über Alter und Alterserscheinungen einiger höherer Vögel"** (Gef. W., 1923, S. 131) kurz erwähnt. Jetziger Farbenzustand (Mitte Juni 1925) ist: Scheitel normalfarben, Nacken und Hals unbedeutend weißgesprenkelt, Rücken, Schultern, Flügel und Schwanz dagegen ziemlich viel gesprenkelt mit einzelnen ganz weißen Federn und mehreren größeren weißen Flecken, Ober- und Unterschwanzdecken zeigen ziemlich viel weiß, Gesicht, Kehle und Brust normalfarbig, Bauch und Flanken unbedeutend weißgesprenkelt, Schnabel und Füße normal. Die Verbleichung scheint in erster Linie die Federspitzen und Federränder anzugreifen, verbreitet sich von hier aus über gr. oder ger. Flächen. Das braune Pigment des Rückens und des Halses ist beinahe ausnahmslos verschwunden, das schwarze über verbleibt und die Oberseite macht deshalb den Eindruck, größtenteils grau und weiß zu sein. — Ein ♀ von Uraeginthus angolensis ist ebenso im Braune der Oberseite via damariensis-Farbe (aber ohne bemerkb. grauschw. Stadium) in Reinweiß und bräunliches Weiß übergegangen. Auch in diesem Falle sind einige Schwingen und Schwanzfedern ganz weiß. Die Unterseite ist beinahe unverändert. — Ein ♂ Braunkopfamarant zeigt auf dem Rücken recht viele ganz weiße Federn. Alle diese Vögel erreichen zurzeit bei mir ihren sechsten Sommer, waren früher angeblich ein paar Jahre in Afrika privat gekäfigt und beim Einfangen vermutlich schon ein oder ein paar Jahre alt, sind also zurzeit mindestens auf ein Alter von zirka 10 Jahren zu schätzen. Ein rotk. Gouldamandine-♂, welches kürzlich im Alter von $10^1/_2$ Jahren (bei mir Mitte Okt. 1914 gezüchtet) einging und dem Naturhistorischen Reichsmuseum zu Stockholm überreicht wurde, zeigte, soweit ich mich erinnere, nur ein oder ein paar weiße Federchen, deren Sitz (Hinterkörper unter den Schwingen) von außen kommende Verletzungen wohl ziemlich sicher ausschließt. Auch ich glaube mich zu erinnern, daß der Vogel hie und da im Blau des Hinterrückens geringes Weiß aufwies, in allem also verhältnismäßig geringe Farbenveränderungen im Vergleich zu denen des Granatmännchens, des Blauastrildweibchens und des Braunkopfamarantmännchens. Andere Vogelarten, die ebenso lange bei mir unter gleichen äußeren Milieubedingungen gelebt haben, sind bisher nicht verblichen (s. Abb. S. 377, 378). A. Adlersparre.

Im Nachgange zur kurzen Mitteilung in Nr. 24 dieser Zeitschrift über **Davoser Vogelleben** bemerke ich, daß Davos in einem rings von Bergen umgebenen Tal in 1500 m Höhe liegt. Laubbäume und Sträucher sind nur wenige vorhanden, die Wälder bestehen aus Fichten und Lärchen. Der Vogelzug war nur spärlich. Am 7. April kamen einige kleine Flüge von Feldlerchen, denen am 16. April viele Hausrotschwänze und am 7. Mai ziemlich viele Wasserpfeifer und auch einige Braunkehlchen folgten. Dann folgte wieder einige Wochen lang ziemlich starker Schneefall. Als wärmeres Wetter eintrat, begegnete man auf den Wiesen vielen Braunkehlchen, die dort Brutvögel sind; die Wasserpieper zogen sich auf höher gelegene feuchte Triften zurück. Ein Feldlerchenpaar blieb im Tal und das Männchen war der einzige Sänger der Gegend, von dem man wirklich Genuß hatte. Tannenmeisen bauten in den Steinwänden der Promenadenwege und in Erdhöhlen, Sumpfmeisen meist in hohlen Baumstümpfen. Kohl-, Blau- und Schwanzmeisen fehlen gänzlich, dagegen kommt die Haubenmeise ziemlich oft vor. Von Zeit zu Zeit begegnete man in dichteren Fichtengestrüpp der Heckenbraunelle und der Zaungrasmücke. Ziemlich selten waren Rotkehlchen. An den Bächen tummelten sich hier und da Paare der Gebirgsbachstelze; weit häufiger sah man an ihnen die Wasseramsel. Singdrossel und Amsel waren nur in wenigen Paaren vertreten, häufiger die Ringdrossel. In der überhängenden Moosdecke eines kleinen Steinbruches hatte ein Zaunkönigpaar sein Nest gebaut und in einer ebendort aufgerichteten Steinmauer nistete ein Baumläufer. Diese beiden Vogelarten waren ziemlich häufig. Am 18. April trafen Rauch- und Hausschwalben, und am 1. Mai Mauersegler ein. Von Insektenfressern waren sonst noch in wenigen Exemplaren ansässig: Gartenrotschwanz, Weiße Bachstelze, Kuckuck, Grün- und Großer Buntspecht. Zahlreicher vertreten war das Heer der Körnerfresser. Ungemein zahlreich waren Buchfink und Erlenzeisig, ziemlich häufig Zitronenfink und Kreuzschnabel. Von letzteren beobachtete ich am 13. Juni noch ein Paar mit 5 Jungen. An Nahrung litten die Kreuzschnäbel in diesem Jahr keinen Mangel, denn es gab außerordentlich viele Tannenzapfen. Auch die die Natur so sehr belebenden Raubvögel waren keine allzu häufigen Erscheinungen. Einen Steinadler konnte ich nur Anfang April ein paar Tage lang beobachten. Ein Paar Bussarde horstete am Jakobsberg, sonst sah man dann und wann mal einen Turmfalken und selten einen Sperber oder Wanderfalken.

Bezüglich der Alpensegler muß ich noch nachtragen, daß sie erst Ende Mai endgültig in ihre hoch im Gebirge an schroffen Felswänden befindlichen Brutstätten zurückkehrten. Vergessen hatte ich eine sehr niedliche Bewegung dieser Vögel zu erwähnen, die in einer tiefen Verneigung mit gleichzeitigem Schwanzspreizen besteht.

Recht interessant war es, mit der Ringdrossel in der freien Natur näher bekannt zu werden. Diese Vögel machen sich wenig bemerkbar, ihr Gesang ist wenig auffallend, erinnert keinesfalls an den der Amsel, sondern besteht aus einzelnen kurzen, wenig melodischen, etwas wehmütigen Pfiffen. Das Männchen sitzt beim Singen meist hoch auf einer Fichte, doch immer etwas geschützt; nie so frei wie unsere Singdrossel. Nur wenn sie sich plötzlich überrascht sieht, läßt sie einen Warnruf ähnlich wie unsere Amsel, nur nicht so laut erschallen; sonst zieht sie es vor, lautlos niedrig über den Boden davonzufliegen oder in eiligen Sprüngen davonzuhüpfen. Ein Nest stand ca. drei m hoch in einer Fichte auf einer Unterlage von Reisig, ein anderes auf einem Felsblock durch Alpenrosengesträuch gut verdeckt. Letzteres enthielt fünf größere blaue Eier mit wenigen dunklen Punkten am stumpfen Ende. Die Jungen haben helle Brust, die eine starke Fleckung aufweist; sie halten sich versteckt unter niedrigen Fichtenästen am Boden auf.

Auf der Heimreise fuhr ich nach Solothurn, um mir die auf dem dortigen Münster befindliche Kolonie Alpensegler anzusehen. Unter der liebenswürdigen Führung des Wärters der Kolonie, des Herrn Hafner, wurde mir dieser Genuß zuteil. Es nisten auf dem Dachboden dieser Kirche etwa 25 Paare. 16 Nester sind zugänglich; sie stehen

meist auf dem ebenen Teil der Außenmauer. Zwei Nester enthielten drei Junge, alle anderen nur zwei. Die Jungen waren etwa drei Wochen alt, nur in einem Nest lagen noch ganz nackte, erst wenige Tage alte Junge. Die Alten fliegen durch Maueröffnungen ein und rutschen dann mit Zuhilfenahme ihrer Flügel über den Boden und Balken hinweg bis zu den Nestern. Es ist leicht auf diesem Wege einen Alten zu greifen und so war es mir vergönnt auch einen solchen betrachten zu können. Mit ihren scharfen Krallen haken sie sich sehr fest an die Hand; die weiße Kehle und der weiße Bauch verleihen dem sonst einfarbigen dunkelbraunen Vogel ein apartes Aussehen. Die Spannweite beträgt etwa 50 cm; also schon ganz respektable Segler. Im vorigen Jahre verfielen infolge ungünstiger Witterung etwa die Hälfte aller Jungen und auch ein großer Prozentsatz der Alten dem Hungertod. Beringt wurden in dieser Kolonie bisher ca. 140 Segler. Diese Kolonie dürfte die am weitesten nach Norden vorgeschobene sein. Herr Hafner hängt mit großer Liebe an diesen Vögeln und führt über alle Einzelheiten genau Buch. Außerordentlich geplagt werden Junge und Alte von der Lausfliege. Kaum hat man ein Junges in der Hand und schon krabbeln einem ein halbes Dutzend dieser üblen Gesellen zwischen den Fingern herum.

Bemerken möchte ich noch, daß die Schweiz sehr strenge Vogelschutzgesetze hat, und es große Mühe macht die Erlaubnis zu erhalten, selbst für wissenschaftliche Zwecke sich Vögel resp. Bruten derselben beschaffen zu dürfen.

Zurzeit werden vom Ehepaar Dr. Heinroth zwei junge Alpensegler aufgefüttert und später wohl in dem schönen Werk „Die Vögel Mitteleuropas" uns in Bildern vor Augen geführt.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 16: Welche Erfahrungen sind bisher mit Dr. Lahmanns oder Dr. Riegers Nährsalz und mit Johim-Betol-Tabletten (zur Förderung des Paarungstriebes) gemacht worden und wo sind diese Präparate erhältlich? W. Sack.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Aumüller, Fabrikdirektor, Delitzsch: 1—2 Männchen Königssittiche, 1,1 Blumenausittiche, 1,1 Jendayasittiche.

A. Brandt, Berlin-Grunewald, im Eichkamp 12: 1 Elfenbeinsittich, fingerzahmes Männchen.

J. Götz, Neuulm (Bayern): Blaukappentangaren, Siebenfarbentangaren, violettblaue Organisten, 1 Blaunackenorganist, 1 braunbäuchiger Organist, grüne Zuckervögel, blaue Honigsauger, Vielfarbenfink, lieblicher Papstfink, Orangeblaufinken, mexikan. Trauerzeisige, große Kubafinken, Braunkappenamaranten, Lerchenfinken, Swainsonsperlinge, Gangesbrillenvögel, braune Zwergtimalien, braunköpfige Timalien, Kaprötel, Streifentrupiale, afrikan. Glanzstare, Langschwanzglanzstare, Dajaldrossel, Männchen, Halsbandtäubchen, Senegaltäubchen, Kaptäubchen, Feuerflügelsittiche, Tovisittiche, Neuholländer Amazonenpapageien.

Max Kleinert, Tierhandlung, Berlin NO 18, Strausberger Straße 13: Diademamazonen, Mülleramazonen, Gelbstirnamazonen, Brillenamazonen, Bergpapageien, Tovisittiche, Feuerflügelsittiche, Königsglanzstare, Langschwanzglanzstare, Zebratäubchen.

Max Kunze, Tierhandlung, Freiberg i. Sa., Pfarrgasse 32: Kalifornische Schopfwachteln, mexikanische Karmingimpel, Männchen.

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a: Rötelmerle (Oroscirtetes erythrogaster), Blaurotschwanz (Phoenicurus frontalis), weißbrüstiger bl. Waldschmätzer, Klarino, ind. Bergmeise, graublauer Fliegenschnäpper, olivgrüne Astrilde (Stictospiza formosa) (Green Amaduvade), Weißkehlpfäffchen, Schnurrbärtchen, Angolaschmetterlingsfink, Laufhühnchen, liebliche Papstfinken (Lazalifinken), Orangeblaufinken, mexikan. Zeisige, 1 Paar orangegesichtige Unzertrennliche (Flügel etwas beschnitten), St.-Thomas-Sittiche (C. pertinax), Tovisittiche, Elfenbeinsittiche, 1 Orangestirnsittich, Pavuasittiche, Feuerflügelsittiche, Mohrenkopfpapageien, 1 Benguela-Papagei, zahm, sprechend, 1 Korallenschnabel-Papagei (Pionus corallinus).

Eugen Müller, Küllstedt im Eichsfeld, A. Z.-Mtgl. 65: 1,0 Taranta, 1,1 Schnurrbärtchen, 1,0 Oryxweber, halbe Pracht, 0,1 kl. Flammenweber, 4,0 Rotkopfamadinen, 1,0 Goldstirnblattvogel.



Herrn A. M., Düsseldorf: Wenn in dem Flugkäfig Milben vorhanden sind, wird die Ausrottung derselben bei der Größe des Käfigs am besten durch einen neuen Käfiganstrich vorgenommen oder durch ein gründliches Abwaschen des Flugkäfigs mit einer Lösung von 10 Teilen Kohlysoform mit 100 Teilen Wasser. Dabei sind Ecken, Winkel, überhaupt alle die Stellen, an denen sich Milben verbergen können, besonders sorgfältig zu behandeln. Sitzstangen, Zweige, Äste und dergl. werden am besten verbrannt und durch neue ersetzt.

Herrn K. K., Göttingen; Herrn E. M., Berlin-Friedenau; Herrn Dr. G., Seebach; Herrn N. J., Sehlem-Cochem; Herrn v. Z., Berlin; ist brieflich erledigt.

Herrn A. B., Jena; Herrn W. B., Heilbronn: Beitrag dankend erhalten.

Herrn R. H., Kehlheim. Wenn der Empfänger einen Vogelsendung nachweisen kann, daß ein krank angekommener Vogel schon bei der Absendung krank war, und der Absender bei genügender Sorgfalt gelegentlich der Absendung den Krankheitszustand des Vogels hätte erkennen müssen, so hat der Absender den Verlust zu tragen bzw. ist er zum Ersatz verpflichtet.

Herrn P. B., Thionville. Die Zeitschrift ist das Organ der Société nationale d'acimatation de France, Paris (VII. 198 Boulevard Saint-Germain.

Herrn W. M., Polzin. Das Verfahren, den entwischten Vogel wieder einzufangen, war ganz richtig. Es gelingt nicht immer. Amarant und Grauastrild leben in Afrika. Von heimischen Finken eignen sich für den Freiflug am besten Zeisig, Girlitz, Stieglitz, Grünling, Gimpel.

Herrn R. F., Neugersdorf. Anscheinend ist der Vogel ein Mönchsittich. Ihm das Schreien abzugewöhnen, ist schwer. Um das zu erreichen, müßte sich der Pfleger sehr viel mit ihm beschäftigen, so daß er zahm wird. Dann unterläßt er auch das laute Kreischen.

Herrn L., Wielkie-Hojduki. Junge Goldammern wechseln im Alter von 7—8 Wochen das Kleingefieder. Die jungen Männchen sind durch mehr und reineres Gelb von den gleichaltrigen Weibchen meist unschwer zu unterscheiden. An warmen, sonnigen Tagen im März, zeitweise schon im Februar, meist aber erst Ende März beginnt das Männchen mit dem Gesang.

Herrn J. M., Schwindegg. Mit giftfreien Stoffen, z. B. Alaun, kann man wohl Vogelbälge präparieren, aber die Bälge sind der Vernichtung oder Beschädigung durch mancherlei Kerfe ausgesetzt. Um dieses zu verhüten, benutzt man giftige Mittel, wie arsensaures Natron, Arsenikseife und dergl.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

hrgang 54 6. August 1925 Heft 32

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Alfred Edmund Brehm.

Der Eisvogel. Von P. Arens, Hannover. (Forts.)

Die Zwickauer Ausstellung. Von J. Birk, Leipzig.

Etwas über die Ernährung zarter Weichfresser. Von Karl Finck, Neukölln. (Schluß.)

Ein Versuch von Brillenvögelzüchtung. Von Dr. August Schmitt, Budapest.

Die Lehre von der Ernährung und ihre Anwendbarkeit bei der Fütterung unserer Stubenvögel. Von Dr. Stehle, Köln. (Schluß.)

Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.) Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf. vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Sitz Leipzig. 1. Vors. Hermann Höhne, Leipzig-Volkmarsdorf, Eisenbahnstraße 84 IV. 1. Schriftf. Max Hunger, Leipzig-Gohlis, Polizeigebäude Zimmer 196. Kassierer Ludwig Böttcher, Leipzig, Inselstr. 17 II. — In unserer letzten Veröffentlichung hatten sich verschiedene Fehler eingeschlichen, die das neu angelegte „Giro-Konto" des Landesverbandes betrafen und deren Richtigstellung hiermit erfolgt. Sämtliche dem Landesverband angeschlossenen Vereine wollen in Zukunft ihre Einzahlungen an die Giro-Kasse Leipzig Nr. 6317 (nicht 6318) bewirken. Wir müssen immer wieder darauf hinweisen, daß die Beiträge sehr, sehr spärlich eingehen. Bisher ist nur der Zwickauer Verein seinen Verpflichtungen in anerkennenswerter Weise voll und ganz nachgekommen. Die Vereine mögen es sich angelegen sein lassen, diesem Punkte eine intensivere Beachtung als bisher zu schenken. Auf die Abführung in Teilbeträgen wird nochmals hingewiesen.
Der Vorstand. J. A.: Hunger, Schriftf.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke, Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Restaurant „Zum Löwentor", Königswall 75.
J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung Freitags, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Blasewitzer Hof". Liebhaber willk. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Eliesenhof", Eliesenstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Versammlung jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinsl. „Parkhotel", Epinayplatz 1, und jeden letzt. Sonnabend im Monat im Vereinsl. „Stadt Chemnitz", Thomasstr. 57. Näh. Auskunft erteilt Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 18. August.
A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Der Hannoversche Vogelschutzverein zu Hannover, gegr. 1881, wirkt mit sichtbarem und anerkanntem Erfolge für Vermehrung und Schutz der Vogelwelt bei Hannover mit Aufhängen von jährlich einigen hundert Nistkästen aller Art, durch Erweckung von Interesse und Liebe für die Vogelwelt mit monatlich, zur Gesangszeit wöchentlich stattfindenden Belehrungsspaziergängen und durch Vorträge in den jeden 2. Dienstag der Monate im Landesheim stattfindenden Vereinsversammlungen. Seine Bestrebungen dienen also lediglich gemeinnützigen Zwecken. Mitgliederzahl rund 1200, jährlicher Beitrag nur 1 M. Meldungen an den Vorsitzenden Herrn Fritz Becker, Hannover, Boedekerstr. 1 F.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste willk. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Vereinsabend regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends um 8 Uhr) beim 1. Vors., Herrn Jahn, Feodorastr. 7. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. — Versammlung am Sonnabend, den 25. Juli 1925. Die nur schwach besuchte Versammlung trug den Charakter eines zwanglosen Aussprache-abends. Besonders wurden Vereinsangelegenheiten erörtert. Es wurde beschlossen, von den auswärtigen Mitgliedern einen Jahresbeitrag von 1.— Mark zu erheben und nur solche Herren weiter als Mitglied zu führen, die diesen Betrag bezahlen. Die mit ihren Beiträgen für 1925 rückständigen Mitglieder sollen gemahnt werden. Von den beiden Ehrenmitgliedern wird kein Beitrag erhoben. Die in 14 Tagen fällige Versammlung fällt aus, zu der in 4 Wochen stattfindenden nächsten Versammlung soll schriftlich eingeladen werden. Die Aufnahme eines Herrn, der als Händler anzusprechen ist, wird nach § 2 des Statuts abgelehnt. Da der Kassierer von Jena fortzieht, hat eine Kassenübergabe verbunden mit Kassenrevision stattgefunden. Die Geschäfte des Kassierers übernimmt Herr Walther Voigt. Die Kasse ist in bester Ordnung. Adolf Voigt, Schriftf.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 6. August. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Mon- g im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. arl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versamm- ng beim Mitglied Herrn Normast im „Kaiser Friedrich", reslauerstr. 50. Liebhaber willkommen. J. A.: Friedrich.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zu- mmenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. z. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", erliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. An- hriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Tage im „Goldenen Falken" Versammlung; nächste Freitag, den 7. August. Liebhaber willk. Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Versammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Liebhaber willk. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebenda. R. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste will- kommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44

Anzeigenteil

ergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per d. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

ige u. Gerätschaften

gel-Mistelleim
Fangen schädlicher Vögel, end bei jeder Witterung, garan- rauchsfähig, Dose 1.50 M. fr. von itag Nchf., Frankenberg i. S. 6. verkäufer hohen Rabatt. [1010

Mistelleim
gr., lief. i. anerkannt vorzügl. Güte **Kirschner, Arnsdorf-Daida** (Böhmen), Roseggerstr. [1011

-Fangkäfige M. 2,50 und 4,50. **zuetze** f. all. schädl. Vögel M. 2,30, l. 2,50 u. 2,80. **Katalog gratis.** **men, Gronau 58,** Westf. [1012

eichfresser-Listenkäfige
billig zu verkaufen. [1018
erz, Berlin-Friedenau,
ilhelm-Hauff-Straße 14, II.

Neue Voliere
ön gearbeitet, für Prachtfinken ellensittiche, 100><100><125 cm, zu passender Tisch 75.— Mark. **arant. Inseparables** erprob. ar, 30.— M. Suche **Farben-wellensittiche.** [1014
rau **Klara Neugebauer, Deutsch-Lissa.**

npletter guterhaltener **Sprosser-** (System Schindler) für 15.— M., ein fast neuer **Kistenkäfig** 62>< cm (nach System Schindler ge-), passend für Drossel, für 15.— M., auch prima **Nachtigall** oder **Ameiseneier** dafür in Tausch. **nz Heinrich, Erfurt,** [1015 Ubestedterstr. 13.

Futtermittel

neiseneier,
weiße, luftgetrocknete Tiroler, per .— M. solange Vorrat. [1016
Liesenberg, München 9.

Ameiseneier,
etrocknet, Liter 1,50 M., gibt ab **chwer, Brieg** (Bz. Breslau), Piastenstraße 3. [1017

Drosselfutter,
Marke „Lucullus." [1018
neier, Muska, Zwiebackschrot), ziehen Sie vorteilhaft von **lich, Langen b. Fft. a. M. 8.**

Bekanntmachung!

Infolge andauernder Steigerung der Rohstoffe bin ich gezwungen, den Preis meiner **„L. K. N."** vom **1. 8.** ab pro ½ Kilo auf **M. 1.50** zu erhöhen. [1019

Lorenz, Dresden, Drehgasse 5.

Wer
in der „Gefiederten Welt" inseriert,
hat Erfolg!

Ia Ameiseneier
Pfund 6.00 M.
Ia Weißwurm . . . à Pfd. 5 M
Ia Muska-Zecken . . à „ 2,50
Ia Seidenraupenpuppen,
gemahlen . . . . à Pfd. 0,75
Ia Garnelen, gem. à Pfd. 0,40 M

Ia Universalfutter
Alleckwa I für Nachtigallen 2.— M
„ **II für Grasmücken** 2.— M
„ **III für Drosseln** . 1.50 M
Proben und Analysen zur Verfügung. Vertreter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [1020
Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
A. Schrich II, Waldsee (Pfalz).

Frische Ameisenpuppen
à Liter 2.80 Mark, franko.

Getrock. Ameisenpuppen
à Liter 1,60 Mark, I. Qualität.

Mehlwürmer
gegen Einsendung von Mk. 1.50 ¼ Pfund franko. [1021
Th. Witte, Niederndodeleben bei Magdeburg.

Ein Versuch
überzeugt jeden von der Güte meines **Universalfutters.** Preis 2 M. p. Pfd. Sämtliche Futtersorten für Exoten, Wald- und Kanarienvögel zu billigsten Tagespreisen. Versand geg. Nachnahme. Verpackung und Porto werden billigst berechnet. [1022
P. H. Kirsten, Leipzig 3,
Zeitzer Str. 53. Fernruf 31445.

Vogelfutter [1023
für **Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser.** Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund lang- jähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogel- futter umsonst.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 956.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Mehlwürmer Ia Pfd. 5.— M (ohne Spesen)
½ Pfd. 3.— M frk. Voreinsend.
Jeltner, Breslau, Weinstr. 12. [1024

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark ¼ Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,**
Biesenthal I (Mark). [1025

Für Freunde der heimischen Vogelwelt

Die deutsche Vogelwelt nach ihrem Standort.
Ein Beitrag zur Zoogeographie Deutschlands und zugleich ein Exkur- sionsbuch zum Kennenlernen der Vögel. Von Werner Hagen. Mit 74 Abbildungen und 4 Schwarzdruck- tafeln. Kart. 3.— M.

Die einheimischen Stuben-vögel,
ihre Naturgeschichte und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 6. Auflage des Dr. Karl Rußschen Handbuchs für Vogelliebhaber Band II.) Mit 22 Farbentafeln und 188 Textabbildun- gen. Geh. 14.—, geb. 17.— M.

Die gefiederten Sängerfürsten des europäisch. Festlandes,
ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Matthias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farben- drucktafeln und 16 Textabbildungen. Kart. 3.— M.

Die Hauptregeln der Sprosser-pflege.
Scherzreime von Oskar M. Kisch. Mit 2 Abbildungen. 1.— M.

Der Dompfaff,
seine Naturgeschichte, Pflege, Abrich- tung und Zucht. Auf Grund 54 jähri- ger Erfahrung von F. Schlag. 8. bis 10. Auflage. Mit 2 Schwarzdruck- tafeln. Kart. 1.— M.

Die deutschen Sumpf- und Strandvögel.
Von Dr. Kurt Floericke. Mit ca. 44 Abb. auf 16 Tafeln in Schwarz- druck. Kart. 4.50 M.

Die deutschen Schwimm- und Wasservögel.
Von Dr. Kurt Floericke. Mit ca. 45 Abb. auf 15 Tafeln in Schwarz- druck. Kart. 4.50 M.

Die mitteleuropäischen Vögel.
Von Dr. E. Bade. Band 1. Sing- vögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarz- drucktafeln, 31 Tafeln in Photo- graphiedruck und 141 Textabbild. von Nestern, Eiern u. Vogelteilen. Geb. in Ganzleinen 5.— M.

Allerlei sprechendes gefie-dertes Volk
(Raben- und Krähenvögel, Starvögel usw.). Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Kart. 3.— M.

Zu beziehen durch:

Creutz'sche Verlagsbuch-handlung, Magdeburg
Postschließfach 148.

Vögel

Tausche

12 Stück schöne gesunde

Wachtelhähne

auf **Wellensittiche** oder **Sonnenvögel** (Männchen).

Erbitte Angebot. Liefere zuerst!

Quaiser,

Reichenberg (Böhmen), Herrengasse. [1026

Blauer Arara, taubenzahm	250.—
Große Gelbhaubenkakadus Stck.	100.—
Kleine Gelbhaubenkakadus Stck.	50.—
Rosakakadus . . . . Stck.	40.—
Blaustirnamazonen, fingerzahm, sprechend . . Stck.	65—75.—
Kleine Gelbkopfamazonen Stck.	60.—
Portorikoamazonen . Stck.	40.—
Boliviasittiche . . . Stck.	30.—
Nandaysittiche . . . Stck.	35.—
Kanarienflügelsittiche Stck.	15.—
Goldstirnsittiche . . . Stck.	10.—
Blumenausittiche . . Stck.	10.—
Braunwangensittiche . Stck.	10.—
Braunohrsittiche . . Stck.	15.—
Tovisittiche . . . . . Stck.	16.—
Rosellasittiche . . . Stck.	50.—
Pennantsittiche . . . Stck.	50.—
Pflaumenkopfsittiche . Stck.	20.—
Kleine Alexandersittiche Stck.	14.—
Grüne Wellensittiche Paar	14.—
Gelbe Wellensittiche Paar	15.—
Yendayasittiche . . . Stck.	15.—
Kaktussittiche . . . . Stck.	9.—
Schamadrosseln, in vollem Gesang . . . . . Stck.	60.—
Orangeblaufinken . . Stck.	22.—
Papstfinken . . . . Stck.	19.—
Indigofinken . . . . Stck.	19.—
Karmingimpel . . . Stck.	9.—
Safranfinken . . . . Stck.	7.—
Rothaubenkardinäle . Stck.	10.—
Tigerfinken . . . . Paar	9.—
Olivgrüne Astrilden . Paar	18.—
Rotkopfamadinen . . Stck.	8.—
Graue Reisfinken . . Stck.	2.50
Handzahme Kapuzineraffen . . . . . Stck.	110.—
Mamosett-Äffchen . . Stck.	35.—

Zoologische Großhandlung

Gustav Reiss,

Berlin C 25. Gontardstr. 4.

Gegründet 1877. [1027

---

1 Blaustirnamazonenpapagei,

gesund, zahm, kein Schreier, lacht, spricht, singt, Umständehalber zu verkaufen. Preis einschließlich Käfig 70 M. [1028

E. Hannabach, Eibau i. Sa.

Vertausche

hübschen Steinkauz gegen **Goldammer, Grauammer und Rohrammer.** [1029

G. Wolff, Schötmar i. L.

Tausche

Heide-, Feld- u. Haubenlerche, Baumpieper, 2 lautsingende Rotkehlchen, 3 Gelbspötter von 1925 gegen **Sprosser, Sperbergrasmücke, Steinrötel.** Abholer bevorzugt. [1030

W. Wissel, Braunschweig,

Rebenstr. 29.

Senegalfinken

Goldbrüstchen . . .	Paar	6.—
Langschwanzglanzstare .	Stück	8.—
Kapitäubchen . . .	Paar	6.—
Schmetterlingsfinken .	Paar	3.—
Granatastrilden . . .	Paar	2.50
Orangebäckchen . . .	Paar	3.—
Amaranten	Paar	2.50
Silberschnäbel . . .	Paar	2.80
Bandfinken	Paar	3.—
Webervögel	Paar	2.50
Atlasfinken	Paar	2.30
Schönbürzel	Paar	4.50
Grauedelsänger, o. Garantie,	Stück	2.50
Kleine Elsterchen . . .	Paar	4.50
Mossambikzeisige . . .	Paar	12.—
Schnurrbärtchen . . .	Paar	10.—
Möwchen	Paar	15.—
Tigerfinken	Paar	8.—
Tovisittiche	Paar	20.—
Elfenbeinsittiche . . .	Stück	20.—
Orangestirnsittich . . .		10.—
Pavuasittiche . . .	Paar	40.—
St.-Thomas-Sittiche .	Paar	40.—
Wellensittiche, grün .	Paar	12.—
1 Benguela-Papagei, sprechend		150.—
1 Korallenschnabel-Papagei		80.—
1 Paar Orangegesichtige Unzertrennliche (Flügel etwas beschnitten)		80.—

Porto u. Verpackung M. 3.50, als Dringend M. 6.50, Versand p. Nachnahme. [1031

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a.

Bei Anfragen und Bestellungen bitten wir, sich auf die „Gef. Welt" zu berufen

---

Vertausche

da ich 2 besitze, **1a** zweijährigen nordischen **Sprosser** gegen 6 Pfund getrocknete diesjährige **Ameisenpuppen.** [1032

Bruno Schober,

Geibsdorf (Kreis Lauban).

Vertausche 1,0 Girlitz, 1,0 Buchfink (jung!), **0,1 Dompfaff** (zahm), 2 aufgezog. jung. **Dompfaffen** (zahm), **0,1 gelbe Kanarien.** [1033

A. G. v. Zitzewitz, Berlin W 50, Kurfürstendamm 243. A. Z.-Mtgl. 308.

Lizard-Kanarien

Infolge Aufgabe aus meiner Spezialzucht zirka 20 Stück hocherstklassige Gold- und Silber-Lizard-Kanarien gegen **Höchstgebot samthaft** abzugeben.

Photographie F. Zaugg,

Solothurn (Schweiz). [1034

Gebe ab: 2,2 Zebrafinken, à Paar 15.— M.

K. Wolfrum, Lobenstein (Thür.) [1035

„KAPPEL"

Schreibmaschine

Erstklassiges Erzeugnis ∴ ∴ Strapaziermaschine

Letzte Neuerung:
Geräuschloser
Wagenrücklauf

Maschinenfabrik Kappel A.-G.

Chemnitz-Kappel

Offeriere freibleibend:

Molukkenkakadus

Stück 222.—

Graupapageien, fingerzahm u. sprechend . . . Stck.	95
Ausgefärbte zahme Doppelgelbköpfe . . . . . St.	
Diademamazonen, zahm u. sprechend . . . . . St.	
Mülleramazonen . . . . St.	
Blaustirnamazonen, zahm u. sprechend . . . . Stck.	5
dto. noch nicht sprechend . St.	
Gelbstirnamazonen . . . St.	
Grillenamazonen . . . . St.	
Kleine weiße Gelbhaubenkakadus, sehr schön . . St.	
Tarant. rotköpfige Bergpapageien . . . . . Pa. bei 5 Pa.	
Grüne u. gelbe Wellensittiche, alte Zuchtpaare . . . Pa.	
Junge Wellensittiche . . . Pa.	
Tovisittiche . . . . . Pa.	
Feuerflügelsittiche, fingerz. Pa.	
Schamadrossel, Männchen . St.	
Weibchen . St.	
Königglanzstare . . . . Stck.	
Langschwanzglanzstare . . St.	
Notgehäubte Kardinäle . . St.	
Safranfinken, ausgefärbte Männchen . . . . . St.	
Zebrataubchen . . . . . Pa.	
Reisfinken . . . . . Pa.	
Tigerfinken, halbausgefärbte Pa.	
Senegalfinken, gemischt . . Pa.	
Kanarienrollen, Brut 1924 Stck.	12
Kanarienrollen, Brut 1925 St.	
Kleine handzahme Java-Spieläffchen . . . . . St.	
Kleine sehr zahme Hutäffchen St.	
Drillaffen, zahm . . . Stck.	
Schmuckloris, fingerzahm u. eingewöhnt . . . . Stck.	

1036] **Tierhandlung**

Max Kleine

Berlin NO 1

Strausberger Straße 13.

Fernruf Alexander 3313.

Grünbürzlige Sperlingspapage

Preis 20.— M.

H. Behrke vorm. Mätje, Tier

Braunschweig, Sophienstra

Gegr. 1874. Fernruf 128

Abgebe ab hie

1,1 Singsittiche zu 80 M., erfo

Zuchtpaar, Männchen Kopf kahl

1,0 dto. 1924er zu 30 M.

Eugen Müller, Küllste

Fuchs,

lebend, an die Kette gewöhnt

alles, Preis 28.— M., verk

W. Schwer, Brieg (Bez. B

Piastenstraße 3.

Chinchilla

Alte und Junge, kauft zu

Preisen, wenn reinrassig,

Paul Ahrens, Lübeck, Königs

Beschwerden w

Nichtzustellung der „

fiederten Welt" sind

zuständigen Postamt

zubringen.

Inserate

für das am 13. August 192

Ausgabe gelangende Heft

Ges. Welt erbitten bis 8. A

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 1
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 13. August 1925 | Heft 33

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Mein Zaunkönig.

Von W. Kepp.

(Nachdruck verboten.)

Es war in der schönen Jahreszeit, als er zusammen mit einem jungen Karrakiet und einem jungen Rotschwänzchen ankam.

In dem grün lackierten Schindlerschen Flugkäfig, der etwa 1×1,20×1,30 groß war und außer den Sitzstangen von Holunder einiges Gesträuch, einen kleinen Tujabusch und von alten Rinden viele kleine Verstecke enthielt, Torfmull in den hohen Zinkschubladen und eine weiße Decke hatte, befanden sich schon einige Insektenfresser. Es waren je ein paar Dorngrasmücken und Müllerchen, ein munteres Schwarzplättchen, ein junges Rotkehlchen, eine Braunelle, ein junger Steinschmätzer und der Riese Anton, ein tüchtiger Steinrötel. Sie alle vertrugen sich gut und so wagte ich's mit nötiger Vorsicht, die drei gut eingewöhnten Ankömmlinge einzusetzen. Es ging gut. Die Insassen wurden nicht feindlich gestimmt und betrugen sich daher nach Art vornehmer Weichfresser; sie kümmerten sich nicht um die neuen Hausgenossen.

Du also warst der erste Zaunkönig, den ich pflegen sollte. Ich war Anfänger in der hohen Pflege. Nach der üblichen Körnerfresser-Einleitung war ich vor nicht ganz einem Jahr zu den Weichfressern übergegangen. Ein Jugendtraum war damit verwirklicht.

Jeder kennt die gespannte Sorge des Anfängers, die uns jeden Augenblick treibt nachzusehen, zu beobachten, zu vergleichen, nach den geringsten Anzeichen der Erschlaffung zu suchen. Aber es ging alles gut. Mein Zaunkönig tat wie zu Hause. Keine Ängstlichkeit — die habe ich an ihm überhaupt nicht bemerkt.

Ohne Hast machte er sich vertraut mit allen Sitzgelegenheiten und Verstecken. Er kümmerte sich wenig um den Beobachter vor dem Gitter. Und dieser wieder war entzückt vom Tierchen. Was war das doch für ein niedlicher kleiner Gesell, munter und frisch. Wie gut stand ihm sein Kleid, dessen viele viele Tupfen in Braun, Gelb, Weiß harmonisch zum soliden Braun zusammenstimmten. Nun aber seine großen Augen, sein feiner Schnabel, und die Füßchen, fein wie Stecknadeln. Es war sicher ein schönes Kerlchen. Wer Vögel pflegt, weiß es, daß die Tiere einer Art, wie sie ihren persönlichen Charakter heben, so auch durch alle Schönheitswerte ändern, und er freut sich, wenn er ein besonders schönes Tierchen seinen Hausgenossen nennen kann.

Er gewöhnte sich gut, bald war ich aller Sorge um ihn ledig und nun kommt sein erster Streich.

Für die Braunelle — oder war's für den Baumpieper — hatte ich ein kleines Zinkschächtelchen mit Mohnsamen hingestellt und wunderte mich, daß es seit einiger Zeit so schnell leer wurde. Wem schmeckte es so gut? Ich passe auf, vergebens. Eines Tages höre ich ein unbekanntes Geräusch im Flugkäfig — denn der Pfleger lernt mit der Zeit jedes Geräusch kennen, er bemerkt sofort das unbekannte und beurteilt nach dem Gehör, ob alles in der gewohnten Ordnung ist. Ich eile herzu. Was sehe ich? Mein Zaunkönig badet sich im Mohn, daß die Körnchen nur so stäuben.

Da steht nun der Mensch und möchte schelten über diesen unglaublichen Mißbrauch der teuren Ware, aber er zieht es vor, über das komische Bild zu lachen, wie der kleine Mann mit aller Energie, dick aufgeplustert wie das Huhn im Sand, die Behaglichkeit des Badens zu genießen sucht.

Nun, was würde der kleine Mann auch antworten? „Gib mir doch Sand, wenn du nicht willst, daß ich im Mohnsamen bade." Ganz berechtigt, und von da ab hatte er seinen Sand.

Aber im Wasser plantschte er ebenso gerne. Hei, was konnte er spritzen, besser noch als der vorsichtige Steinrötel. Und nach dem Bad, angeregt, mit schlankem Gefieder hüpfte, trillerte, knixte der Knirps von dannen.

Nein, Scheu kannte er wirklich nicht. Und er war nie in Verlegenheit zu bringen. Das machte wohl seine Schlüpfernatur. Er wußte immer, was er zu tun hatte. Wäre es ein Mensch gewesen, so hätte ich gesagt: Es ist ein kleiner Realist, der sich prachtvoll in allen Wirklichkeiten zurechtfindet, dazu eine ganze Portion unbewußten Humors und dahinter — Gemüt besitzt.

Er war vorsichtig, aber ohne Scheu. Ich habe nie bemerkt, daß ihm die anderen ans Leder wollten, er aber richtete sich ein, wie's ihm paßte, und er verstand das Gute zu finden.

Als die kühle Zeit kam, suchte er sich ein warmes Plätzchen zur Nachtruhe und fand es bei Anton, dem großen Steinrötel, dem Größten aus der ganzen Schar. Oft sah ich sie beisammen auf einer der oberen Stangen, der Kleine dicht unter den Leib des Großen gedrückt, dessen rote Federn ihn einhüllten.

Wie ein Kücken unter der Glucke sah er dann hervor. Und wenn er unruhig sich dichter drängte, so gab der Riese gutmütig Raum. Vielleicht gefiel ihm die gegenseitige Wärme.

Meine Befürchtung, daß die Großen dem Kleinsten etwas tun würden, hatte sich zerstreut. Er fühlte sich in seinem versteckreichen Heim sehr wohl und war in unermüdlicher Bewegung. Er schien sich auszuwachsen und, anfangs stumm, hörte man bald sein Gezeter, und ich weiß nicht, ob im folgenden Jahr, ließ er laut und schmetternd seinen Ruf ertönen.

Nun gut, es war noch in der ersten Zeit, da höre ich eines Morgens ein fürchterliches Gezeter. Sicher ist er's, und er schrie, als ob er am Spieße steckte. Voll Schrecken springe ich auf und denke, nun macht ihm einer den Garaus.

Ich komme herzu, da wälzt sich ein Pärchen, verbissen wie ein paar Dackel, Braunelle und Zaunkönig. Schnell hinzu, ehe sie ihm Leides tut. Ich greife: Die Kämpfer sind auseinander. Und was sehe ich? Braunellchen liegt am Boden ganz erschöpft, so erschöpft, daß ich sie ohne weiteres nehmen kann. Und mein Zaunkönig voll Ekstase; kaum entfernt er sich etwas, will er sich wieder auf die Feindin stürzen mit schrillem Geschrei, wie ein wilder Kämpe.

Mein Herz ergreift Partei für den schneidigen kleinen Kerl, zumal die Braunelle etwas nichtssagend war und ihr unbemerktes Leben mit Fettwerden ausgefüllt hatte. Näherungsversuche veranlassen, daß der Zwerg angreift und die Angegriffene schleunigst flieht. So habe ich sie denn ausgesetzt, und nun war wieder Ruh im Reich.

Ich denke nicht, daß es verkehrter Trieb war; ich denke, es war uralter Nahrungsneid gegen die Mitbewohnerin seiner Schlupfstätten.

Ich hatte sorgfältig darauf geachtet, daß er nicht aus dem Flugkäfig entweichen konnte. Denn, sagte ich mir, die anderen sind leicht wieder einzufangen, aber wie soll ich ihn wiederbekommen, wenn er in die tausend Winkel des mit Käfigen und Möbeln besetzten Zimmers schlüpft; Winkel und Ecken, die für die anderen einfach nicht da sind. Oder wenn er in seiner Dreistigkeit an den Käfigen der Schamas Besuch macht? Da ist er doch verloren!

Eines Morgens höre ich von der Schlafkammer her, daß die Sänger, die in ihren Schindlerschen Bauern sitzen, unruhig sind und etwas Ungewohntes melden. Da müßte schon einer ins Zimmer entwichen sein. Aber die Käfige waren doch alle zu; sollte Er . . . ? Und richtig, er ist's. Also vorsichtig, nur nicht scheuchen. Erst sehen, wie er sich benimmt.

Und er benimmt sich mit aller Unbekümmertheit und Selbstverständlichkeit, die ihm eigen ist, das heißt, er kümmert sich gar nicht um mich und fährt fort, die interessante Welt da im Zimmer zu untersuchen. Nun, ich lasse ihn ruhig seiner Wege ziehn, lasse ihn ein wenig hungrig werden, und dann lockte ihn — ganz selbstverständlich — der zerschnittene Mehlwurm wieder in den Flugkäfig zurück.

Von da ab hatte er Freiflug. Ich hatte an dem Schindlerkäfig einen Anbau von Glas machen lassen mit Springbrunnen. Das Gitter war an der Verbindungsstelle etwas weiter auseinander. Hier war er ausgeschlüpft und hier durfte er immer aus- und eingehen, wann es paßte.

Ich hatte oft Besuch für meine Pfleglinge. Eines Tages hatte die Besichtigung sehr lange gedauert, und der Zaunkönig war die ganze Zeit über draußen gewesen. Jetzt war er verschwunden. Der Pfleger ist gewohnt, auf Tür und Fenster zu achten. Sollte er trotzdem . . ? Wir suchen, suchen in allen Zimmern. Er ist nicht da. Traurig will ich mich auf mein Sofa setzen, um nochmals zu überlegen, wo man suchen könnte.

Auf mein dunkles Sofa, von dem aus ich die Schar meiner Lieblinge übersehen kann. Schon will ich mich setzen, wen sehe ich da? Mitten auf dem Sofa in aller Ruhe, Behaglichkeit und Selbstverständlichkeit sitzt: Er. Nicht auf der Lehne, wie es die anderen Vögel tun, sondern mitten auf dem Sitz, als habe er das Recht hier und als ob der Raum für drei erwachsene Menschen gerade für ihn ausreiche. (Schluß folgt.)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Recht selten werden fremdländische Spechte eingeführt, zumeist sind es solche Arten, welche sich durch besonderen Federschmuck oder auffallende Farben auszeichnen. Und die wenigen, welche zu uns kommen, gelangen selten in die Käfige von Liebhabern, die sich leider noch immer der Pflege derartiger Vögel verschließen, obgleich Spechte außerordentlich interessante Pfleglinge sind.

Wie so ein Spechtkäfig beschaffen sein muß, will ich hier nicht näher ausführen. Daß er von Metall hergestellt sein muß, ist bei Spechten, die meist unausgesetzt Holz bearbeiten wollen, selbstverständlich.

Die Ernährung gefangener Spechte ist nicht schwierig, wie ja auch in einer Arbeit des Heftes 29 des Näheren ausgeführt wurde.

Am häufigsten sehen wir in den zoologischen Gärten den munteren Goldspecht, den „Flicker", der Amerikaner, der den gemischten Wald, Baumgruppen im offenen Gelände, Haine und Waldränder der südöstlichen Staaten der Union bewohnt und in seiner Heimat eine ebenso bekannte Erscheinung ist wie bei uns der Buntspecht. In der Gefangenschaft wird er schnell vertraut mit seinem Pfleger und ist dann bei seiner großen Zahmheit ein sehr netter Käfigvogel. Im alten Berliner Aquarium, das unter Alfred Brehms Leitung ein Pärchen dieser schönen Vögel besaß, schritt dieses Pärchen auch zur Brut, während welcher das brütende Weibchen leider starb.

Im Laufe des Jahres 1924 führte Fockelmann (Gr.-Borstel) in mehreren Stücken den

Gelbschopfspecht — Celeus flavescens *(Gm.)*

ein, einen Bewohner der Wälder Ost- und Südostbrasiliens. Die Angehörigen der Gattung Schopf-

pecht (Celeus, Boil) zeichnen sich besonders durch en spitzen Federschopf und die leicht gekrümmten Schnabelfirste aus, deren Kiel nur schwach entwickelt ist. Man kennt davon etwa 15 Arten, welche im tropischen Südamerika leben. Die eigenartige Erscheinung des Gelbschopfspechtes oder Weißkopfspechtes zeigt die Abildung auf S. 347 in Heft 30. Es ist auffallend, aß von den vielen Arten von Spechten, welche in Brasilien, einem Land voller Wälder, das so reich n Spechten ist, so selten Spechte eingeführt werden.

Über das Freileben ist wenig berichtet. Burmeister igt, daß dieser Specht ungemein häufig sei und in llen Wäldern, selbst in schon stark gelichteten, vorımme. Durch seinen schönen großen Schopf, der us langen bandförmigen, geschlossenen Federn beeht, fällt er bald in die Augen und auch durch ine ziemlich häufig ausgestoßenen schrillen Rufe.

gen Käfig in kurzem, ruckweisem Fluge umherfliegt, dann wieder schnell und gewandt an Stämmen und Rindenwänden umherrutscht, wie in der Heimat an den schlanken Stämmen der Borassuspalme, deren Rinde er beständig beklopft, um die auf ihr lebenden Ameisen und anderen Insekten hervorzulocken und sie zu verzehren. Dabei läßt er oft seinen lauten, trillernden Ruf hören. Er gelangte 1905 in den Berliner Zoologischen Garten, in dem er einige Jahre lebte.

Ein anderer schöner indischer Specht, der

Gelbnackenspecht — Chrysophlegma flavinucha *J. Gd.*,

ein Vogel von Größe und Gestalt unseres Grünspechtes, gelangte in den Besitz eines englischen Vogelpflegers, der darüber im Avicult. Mag. 1924 berichtet. Die Gattung Gelbnackenspecht — Chrysophlegma

Blick auf die Ausstellung in Herne.

Gefieberbeschreibung: ♂ Kopf, Hinterhals, Kehle aßgelb; ein großer karminroter Wangenfleck; Rücken, lügel schwarz, weiß quergebändert; Bürzel gelb, ebenso e Säume der vorderen schwarzen Oberschwanzdecken; brige Unterseite schwarz; Federn zunächst der Kehle, Unterschwanzdecken z. T. trübweißlich gesäumt; Schwingen, Handcken schwarz, gelblichweiß quergebändert; Schwanz schwarz, itliche Federn an der Innenfahne weiß gefleckt; Schenkel blichweiß; Auge tiefrot, Lidrand grau; Schnabel bleiau, Spitze heller; Füße dunkelgrau; Lg. 300, Fl. 160, chw. 100 mm. ♀ mit kleiner Haube, Wangenfleck schwarz estrichelt.

Die Art wurde schon einmal im Jahre 1877 urch Christiane Hagenbeck eingeführt. Der Vogel elangte damals in den Zool. Garten in Frankrt a. M. Zurzeit befindet sich ein außerordentlich unteres Stück dieser Art im Vogelhause des Berner Zool. Gartens.

Aus Indiens Wäldern gelangte bisher nach Deutschland nur eine Art, der farbenprächtige Orangespecht — Brachypternus aurantius *(L.)*, ein unruhiger, geräuschvoller Vogel, der auch im geräumizeichnet sich durch den vollen spitzen Schopf aus, welchen die gelben Genickfedern bilden. Man kennt ungefähr ein Dutzend Arten, welche im Himalaja, in Hinterindien, Südchina und auf den Sundainseln leben.

Der Gelbnackenspecht lebt im Himalajagebiet (von Masuri bis Assam) und in Birma. Jerdon beobachtete ihn bei Darjeeling in Höhen von 700—2000 m.

Gefieberbeschreibung: ♂ Stirn, Oberkopf rötlichbraun, nach hinten grün verwaschen, ebenso Ohrdecken, hintere Nackenfedern, Halsrücken satt leuchtendgelb; übrige Oberseite glänzend gelblich olivgrün; Kinn, Wangen, Kehle hell schwefelgelb; Hals schwärzlich grün mit weißen Längsflecken; Unterseite dunkelgrau, an der Brust grünlich, nach dem Bauch hin rein grau; die ersten 7 Handschwingen leuchtend zimmetbraun, mit schwarzer Spitze, die übrigen und die Armschwingen mit schwarzen Querbinden, welche auf den Armschwingen nur auf den Innenfahnen vorhanden; letzte Armschwingen grün; Schwanzfedern schwarz; Schnabel bleigrau; Auge rot, nackte Augenumgebung mattgrün; Lauf graugrün: Lg. 350, Fl. 170, Schw. 137, Schn. 43, Lf. 75 mm.

♀ an Kinn und Kehle rotbraun.

Der Vogel, welcher jung in den Besitz des Pflegers gelangte, wurde sehr zahm, kletterte ohne Scheu an ihm empor, setzte sich auf Kopf und Schulter, dabei mit der langen, wurmförmigen Zunge alles betastend und untersuchend. Im Frühjahr ließ er auch das Liebeslied der Spechte, das wunderbare Trommeln, hören, das ungefähr wie „Br—r—r—r" klang. Dabei bewegte er Kopf und Schnabel ungemein schnell. Sein Ruf ähnelt fast ganz dem Ruf der Dohle „Tschau", aber er erklingt etwas reiner und volltönender.

Von anderen neu- oder selten eingeführten Kletter-vögeln sind die Kuckucke und Pisangfresser (Donaldsons Turnco, grauer Lärmvögel) bereits besprochen, ebenso die Bart- und Mausvögel. Es erübrigt noch aus dieser Gruppe einige Arten von Pfefferfressern, die selten und zum Teil zum erstenmal nach Europa gelangten, unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Auch von diesen und ihrem Verhältnis zur Vogelliebhaberei kann dasselbe gesagt werden wie von den Spechten. Sie sind bei den Vogelfreunden als Stubengenossen wenig beliebt, d. h. man betrachtet sie mit einem gewissen Vorurteil, während alle die Liebhaber, welche sich mit der Haltung dieser eigenartigen Vögel einmal beschäftigt haben, sie ungern entbehren würden.

In ihrer Heimat sind sie außerordentlich beliebte Gesellschafter des Menschen. Es handelt sich da wohl ausschließlich um aus dem Nest genommene und durch Menschenhand aufgefütterte Vögel, zutrauliche und durch die ihnen eigene Neugierde, in der sie alles irgendwie Auffallende genau besichtigten und untersuchen, unterhaltende Stubengenossen, die ihren Sitzplatz gern auf den Schultern oder dem Kopf des Pflegers, dem sie sehr zugetan sind, wählen. Gern beschäftigen sie sich mit den Fingern des Pflegers, die sie als ein geeignetes Spielzeug für ihren ungeheuren Schnabel betrachten. Sie sind stets aufmerksam und achten auf alles, was im Raum vorgeht. Vielfach wird der große Schnabel für ein gefährliches Werkzeug angesehen. Das ist er auch bei den Beißereien, die zuweilen mit anderen Vögeln, die mit ihnen gehalten werden, vorkommen. Für den Menschen ist er das keineswegs trotz seiner Größe. Der Schnabel ist sehr leicht, da er sich nicht aus Knochenmasse, sondern aus Hohlzellen zusammensetzt. Sehr vorsichtig nimmt er mit der Schnabelspitze das aus der Hand gereichte oder im Futternapf dargebotene Futter, wirft es mit einem kurzen Ruck geschickt ein wenig in die Höhe, um es mit dem Schnabel aufzufangen und es zu verschlucken. Die Bestandteile des Futters dürfen nicht zu klein sein, oder müssen wenigstens zu kleinen Ballen zusammengedrückt sein, damit er sie in der ihm eigenen Art aufnehmen kann. Pflanzliche Stoffe bilden den Hauptbestandteil ihrer Nahrung, frisches Obst in etwa bohnengroße Stücke geschnitten und Beeren. Trockene Früchte werden gequollen verabreicht. Daneben gibt man ein Gemisch von gequollenem grob gehacktem Weizenbrot, gekochter Möhre, Kartoffeln, alles in gröberen Stücken und gekochten Reis, das Ganze mit Zucker überstreut. Zusätze von hartgekochtem Ei, trockenen und frischen Ameisenpuppen, allerlei Insekten, besonders größeren Käfern, Biskuitstücken, einer getöteten jungen Maus oder eines jungen Sperlings dienen zur Herbeiführung der für die Haltung der Pfefferfresser notwendigen Abwechslung. Wie bei allen Vögeln, deren Nahrung wesentlich in Früchten besteht, ist auch bei den Tukanen die Reinhaltung der Käfige infolge der häufigen und umfangreichen, dünnflüssigen Entleerungen nicht ganz leicht, aber durchaus notwendig, wenn man an den buntgefiederten Tukanen Freude haben will. Diese Schwierigkeit ist die eine Schattenseite ihrer Haltung. Die andere ist ihre Streitsucht und auch die Neigung, schwächere Vögel anzugreifen. Es ist deshalb nicht möglich, sie mit kleineren Vögeln zusammenzuhalten, häufig ist es selbst schwierig, mehrere Pfefferfresser in einem Raum zu beherbergen. Das geht noch am besten, wenn es sich um etwa gleichstarke Vögel handelt, die zu gleicher Zeit in den für sie bestimmten Käfig gesetzt werden. Eine von ihnen wird auch dann noch versuchen, die Herrschaft unter ihnen auszuüben. Selbst bei den kleinsten Arten trifft dieser Übelstand zu. Auffallend ist es, daß sie, die ausgesprochene Fruchtfresser sind, eine starke Neigung zum Fleischgenuß haben. Jedenfalls ist häufig beobachtet worden, daß sie rohes Fleisch, welches sich in ihrem Futtergemisch befindet, stets zuerst verzehren.

(Fortsetzung folgt.)

Der Eisvogel.

Von P. Arens, Hannover.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Früher in den 1870—1880er Jahren glaubte man das Heil der Fisch- und namentlich der Forellenzucht lediglich in Schonmaßregeln zu finden, jeder dieser Gesichtspunkt bildete sogar dem damals (1874) erlassenen Fischereigesetze die Grundlage und gab auch die der Fischerei schädlichen Tiere, darunter den Eisvogel, dem Fange durch die Fischereiberechtigten frei. Die Fischereivereine, sogar behördliche Organe setzten obendrein Prämien für den Fang aus. Davon ist man aber schon sehr bald abgekommen, zwar auch mit aus ästhetischen und naturschützerischen Gründen, indessen hauptsächlich aus „fischzüchterischen", so verwunderlich das auch klingen mag. Man erkannte nämlich bald, daß der größte Erfolg bei der Fischzucht nicht mit einem urteilslosen Schonen zu erzielen war, sondern vielmehr damit, daß man die Besatzstärke der Gewässer in ein vernünftiges Verhältnis zu seiner Nährkraft bringen müsse, um dadurch der größtmöglichste Zuwachs gewährleistet würde. Nun erwies sich das aber keineswegs so leicht, als es scheinen mochte, denn selbst in ablaßbaren und rein ausgefischten Teichen, geschweige denn in nicht ablaßbaren Gewässern fanden sich immer wieder allerlei geringwertige Fischsorten ein, meist als Eier eingeschleppt von Wassergeflügel und dergleichen, die bei ihrer ungeheuren Vermehrungsfähigkeit den zum Abwachse bestimmten Fischen Nahrungskonkurrenz machten und trotz aller Vertilgungsbemühungen den Ertrag erheblich schmälerten. Was war da die Folge? Nach dieser Erkenntnis riefen die Fischzüchter die Natur selbst zu Hilfe, indem sie „Raubfische" als Beisatz in die Abwachsteiche einsetzten, namentlich Hechte, nicht, wie allgemein angenommen wird, um die faulen Karpfen in B

vegung zu erhalten, sondern um mit dem Fisch-
nkraute aufzuräumen, falls auch mit der eigenen
Nachkommenschaft der Abwachsfische, die ja im Ab-
vachsteiche ebenfalls nur Nahrungskonkurrenz machten.
Ganz ähnlich verhielt es sich mit vielen fließenden
Gewässern, namentlich den Forellenbächen im Ge-
birge. Diese kranken notorisch ebenfalls an „Über-
völkerung". Ihre Insassen sind aus diesem Grunde
geradezu als ausgeartet anzusprechen. In den
meinigen, an und für sich schon meist nahrungsarmen
Gebirgsbächen finden sich alle paar Meter passende
Laichstellen, zufolge deren viel Nachwuchs hochkommt,
was zusammenwirkend eine viel zu starke Übervölke-
rung zur Folge hat. Die Forellen bleiben also dort
klein. Man findet dort laichreife, also mindestens
$1^1/_2$jährige Forellen von nur $^1/_6$—$^1/_8$ Pfund Ge-
wicht, bei denen also von einer wesentlichen Gewichts-
zunahme nicht mehr die Rede ist, und der ganze
Besatz stellt „Hungerkünstler" von geringem züchteri-
schen Werte dar, die selten über Portionsgröße hin-

„Aber", das den Naturschützern wieder Wasser auf
ihre Mühlen leitete und den Haß gegen die Fisch-
züchter mit ungerechtfertigter Verallgemeinerung weiter
schürte.

Eine Folge der in obigem näher charakterisierten
züchterischen Erkenntnis war, daß nunmehr die Nachzucht
in gesonderten, sogenannten „Brutteichen" stattfand,
weiter spezialisierte sich auch das Geschäftliche der
Fischzucht insofern, als sich je nach den örtlichen
Verhältnissen der eine Züchter auf „Speisefisch-
zucht", der andere auf Zucht von „Besatzfischen zum
Verkauf" legte. Ganz besonders war das bei der
„Forellenzucht" der Fall, wo sowieso die künstliche
Behandlung solche Spezialisierung erleichterte. Selbst-
verständlich waren dafür besondere Anlagen, und zwar
oft genug recht kostspielige nötig, denn solche Satz-
materialzüchtung ist nicht so einfach, wie es dem
Laien erscheinen mag, benötigte auch besonderer Pflege
durch zwecksdessen angestellte Leute, es mußte laufend
mit nicht geringen Kosten Futter, gleichviel, ob natür-

Gelber Schilffink (s. S. 392).

uswachsen. Hier sorgen also die eigenen Nach-
ommen für eine Beeinträchtigung des Ertrages, ein
Übel, gegen das wiederum lediglich eine Verminderung
es Besatzes helfen kann, Schonmaßregeln es nur
erschlimmern. Dementsprechend erscheint also auch
ort wie in allen Abwachsteichen der Eisvogel nicht
ls „Schädling", sondern umgekehrt als „Nutz-
ifter", sogar in verstärkter Hinsicht, denn er ent-
ernt den überschüssigen Nachwuchs nicht wie der
echt und die sonstigen Fischräuber in erwachsenem
Zustande, sondern schon in den Jugendzuständen,
he sie die ertragsschmälernde Nahrungskonkurrenz
usgeübt haben. Also: „Die Naturfreunde und
ie Fischzüchter konnten sich auf dieser Grund-
age die Hand reichen!" Das haben auch die
ischereivereine usw. gewürdigt und die Prämiierung
es Eisvogelfanges schon seit Jahrzehnten abge-
chafft. Selbst das neue, nach den üblichen, lang
ährenden, gründlichen Erhebungen im Jahre 1916
rlassene Fischereigesetz trägt allenthalben solchen
üchterischen Gesichtspunkten Rechnung. Damit
hien es, als ob die widersprechenden Beurteilungen
es Eisvogels ausgeglichen und der Friede wieder-
ergestellt sei — aber nun kam doch wieder ein dickes

liches oder künstliches, beschafft werden und der Züchter
war demnach darauf angewiesen, über jeden heran-
gezogenen Fisch die Hand zu halten. War es
ihm da zu verdenken, daß er die Eisvögel nicht ohne
weiteres auf seinen Brutteichen ungehindert schalten
ließ, sondern sich ihrer an diesem ganz begrenzten
Orte auf alle Weise erwehrte, es als einen Dieb-
stahl ansah, wenn ihm dort die Eisvögel den Er-
trag seiner gewerblichen Tätigkeit nicht bloß schmälerten,
sondern oft genug sogar so gut wie ganz vernichte-
ten! Daß das wirklich möglich ist, darauf weist
neben tatsächlichem Vorkommen an anderen Orten
die Beobachtung hin, daß Eisvögel in meiner eigenen
am Südharze unmittelbar am Gehöfte gelegenen,
mit einer 2 m hohen Planke umschlossenen Anstalt
oft zu mehreren in den frühen, ungestörten Som-
mermorgenstunden in einer Weise häuften, die sich
sichtbar in fortlaufender Verminderung der Besatz-
stärke offenbarte und besonders dadurch charakteri-
siert wird, daß die Räuber in der Regel 3—4mal
getaucht, gefangen und, solange die Forellchen
noch klein waren, auch geschluckt hatten, ehe be-
hufs ihrer Verscheuchung die Strecke von 80 m von
der Tür bis zu den neun, je ein Aar großen, mit

je 5—10000 Brut besetzten Aufzuchtteichen durcheilt wurde, ja, daß sogar einmal ein solcher mit der Hand ergriffen werden konnte, welcher ein „zwölf" Zentimeter langes Forellchen geschluckt hatte, das ihm nach dem Verschlingen noch zwei Zentimeter über die Schnabelspitze herausragte und infolgedessen ihm das Atmen so erschwerte, daß er nicht recht hochkommen konnte. So beschaffen sind die harmlosen kleinen, insektenfangenden Vögelchen der Naturschützer, die nur ab und zu einen kranken Fisch nehmen und auch als Sanitätspolizei noch besonderen Nutzen schaffen! Entspräche alles dies den Tatsachen, so wären die Naturschützer schon längst über die Verlegenheit hinweg, nach einem Eisvogel suchen zu müssen, dann wäre der Letzte schon „verhungert!" — Unter den geschilderten Umständen ist es den Fischzüchtern zu verargen, den Eisvogel auf den Brutteichen als Fischräuber anzusehen und ihm dort zu Leibe zu gehen, dazu gehören lediglich übertriebene und verbissene, alles ohne weiteres über einen Kamm scheerende Naturschützer, die geneigt und gewohnt sind, die Ausübung eines solchen mühevollen und unausgesetzter Hingabe bedürfenden, auch volkswirtschaftlich nicht unbedeutenden Handwerkes, als: „Ödes Jagen nach Geld und Gut", die Verteidigung gegen die Beeinträchtigung ihres Lohnes als „Naturverhunzung" zu bezeichnen, dabei obendrein unbeachtet lassen, daß gerade die Fischzucht im allgemeinen mit ihren auf die Vermehrung der Fische gerichteten Bemühungen die Lebensbedingungen der Eisvögel vielerorts, nicht wie die fortschreitende Kultur vernichten, sondern umgekehrt vermehren. Auf solche Vorhaltungen pflegen die Herren in der Regel zu antworten und sogar zu verlangen, sich der Eisvögel nicht mit Wegfangen, sondern mit Scheuchen und Klappern zu erwehren! Das ist aber ein laienhafter Ratschlag, der gänzlich in sich zusammenfällt, weil sich der Eisvogel vermöge seiner gewohnten stoischen Ruhe nicht einen Deut um solche „Mätzchen" kümmert, sondern ganz wie der Großstädter durch das Gewühl der Autos, der Puff- und sonstigen Räder mit gleicher Kaltblütigkeit hindurchschreitet, weil er weiß, daß schon ein halber Meter daneben die Gefahr vollständig abwendet. Ebenso der Eisvogel. Daß ihm diese wie „Frechheit" anmutende Kaltblütigkeit wirklich innewohnt, beweist nicht bloß die Erfahrung der Nutzlosigkeit der „Mätzchen", sondern auch der Erstaunen erregende Umstand, daß nicht einmal ein mehrere tausend Mark kostendes Zudecken der Aufzuchtteiche mit Drahtgeflechten vollständige Abhilfe schafft, indem sich die Eisvögel ein gelegentliches Aufstehen der nur 20—25 cm großen Klappen für Einführung des Futters zunutze machten, ihr räuberisches Handwerk unter dem Drahtgeflechte fortzusetzen.

Also: „Gemach, Ihr Herren Naturschützer, mit ungerechtfertigten Vorwürfen und urteilslosen Ratschlägen, die nur geeignet sind, dem großen Publikum Sand in die Augen zu streuen, aber vor der Wirklichkeit nicht standhalten, ebenso wie die angedichtete Charakterisierung des Eisvogels als „Insektenfänger". Wie einseitig und ungerecht verfahren die Herren auch damit, daß sie ein Mitglied ihres Vereines in den Himmel heben, das durch eine Extrazuwendung einer verhältnismäßig kleinen Summe sein erhöhtes Interesse an den Bestrebungen des Vereines erkennen läßt, in demselben Atem aber berechtigt zu sein glauben, den Fischzüchter in Grund und Boden zu verdammen, wenn er sich nicht tatenlos und gutwillig Tausende von Mark Schaden machen läßt, bloß damit den Herren das Sichten eines Eisvogels erleichtert wird.

Daß nun wirklich die Verfolgung der Eisvögel an so vereinzelten und ganz lokalen Stellen, wie an den Brutteichen, nicht zu einer allzu großen Verminderung der Bestände führt, auch dafür wieder einen Beweis aus der Praxis meiner Forellenzuchtanstalt: Während des nach wenigen Jahren eingetretenen Beharrungszustandes der Fänge — nochmals ausdrücklich betont, auf der unmittelbar am Gehöfte und obendrein belebten Chaussee gelegenen, auch umzäunten, bloß neun Aar messenden Fläche, der Aufzuchtteiche — wurden ein Jahrzehnt lang, bis zum erwähnten kostspieligen Zudecken, alljährlich gleichbleibend 15—20 Eisvögel gefangen. Das heißt also: „Der Bestand der Eisvögel in der Gegend war so groß, daß davon jährlich 15—20 Stück abkommen konnten, ohne daß er sich verminderte! Dabei war er vor Beginn der Fänge trotz aufmerksamer Beobachtung bloß auf 10—15 Stück geschätzt. Wie groß hat er sich aber nun erwiesen? Der Leser mag sich auf diese Frage die Antwort selbst geben. Jedenfalls dürfte aber ein solcher doch immer noch namhafter Bestand genügen, um den Sichtbedarf vollauf zu befriedigen, um so mehr als man auch nach diesen Fängen draußen im Freien durchaus keine Abnahme spürte. Wieder ein Beweis wie sehr die Häufigkeit der Eisvögel unterschätzt wird.

Zum Schlusse noch einiges über das Verhalten des Eisvogels in der Gefangenschaft: Nicht immer gelingt es, das schöne Geschöpf an die Gefangenschaft zu gewöhnen. Alt eingefangen sind sie ungestüm und ängstlich, verschmähen auch oft das Futter. Ohne alle Umstände gehen aber alte Eisvögel an das Futter, wenn man sie gleichzeitig mit den Jungen einfängt. Aus Liebe zu diesen vergessen sie ihren Trotz und die Freiheit, fischen von der ersten Stunde an eifrig und gewöhnen sich und die Jungen an den umschlossenen Raum und die ihnen gereichte Kost. Auch jung aus dem Neste genommene lassen sich mit Fischen und Fleisch großfüttern und länger Zeit am Leben erhalten. An solchen gefangen gehaltenen nimmt man mit Erstaunen war, wie gefräßig die Eisvögel sind und wie schnell sie verdauen. Daß nun ein Vogel mit den oben dargelegten kaltblütigen Gewohnheiten und dem fehlenden Gesang sich in der Gefangenschaft nicht gerade kurzweilig benimmt, versteht sich von selbst, aber das wird durch sein reizendes Äußere wieder wett gemacht, er bildet also trotzdem eine begehrenswerte Vervollständigung der Vogelstube, die wohl zu empfehlen ist, um so mehr als man dort um so bequemer sein von den anderen Vögeln abweichendes Verhalten erkennen und studieren kann.

Mit den vorstehenden Ausführungen dürften wohl die eingangs betonten widersprechenden Beurteilungen des Eisvogels so viel wie möglich in

das rechte Licht gerückt, vielleicht sogar ausgeglichen sein. Wo das nicht restlos geschehen konnte, auch da bleibt der Eisvogel doch unbestritten: „Der Schönste von Allen“ und „Das Juwel der Vogelwelt!“

Die Zwickauer Ausstellung.

Von J. Birk, Leipzig.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

So reichhaltig die ausgestopften Vögel vertreten und mustergültig, naturgemäß und lebenswahr präpariert waren, bleibt es doch für den wahren Naturfreund eine eigene Sache, wenn er darunter manchen stolzen Bewohner der Lüfte sieht, der heute bereits zum Naturdenkmal herabgesunken ist. Mir ging es wenigstens so, wenn der Blick auf den erst vor kurzem erlegten Uhu, dem König des



Bild von der Zwickauer Ausstellung. Heimische Vögel in Gesellschaftskäfigen.

nächtlichen Waldes, fiel, er thronte in majestätischer Gestalt über dem Eingang des Ausstellungslokals. Er bildete den stummen Ankläger für alle Mörder aussterbenden Geschlechtes, die rohen Frevel begehen an einem unersetzlichen Wunder der heimatlichen Natur. Dem Naturfreund gilt sein heulender, schauerlich schöner Ruf im nächtlichen Walde viel mehr als der noch so schön präparierte Leichnam dieses stolzen Räubers, der letzten Endes doch nur für den Mottenfraß bestimmt ist. Darum Schonung auch den in der Abnahme begriffenen gefiederten Räubern. Damit soll die Ausstellungsleitung kein Vorwurf treffen, denn lebend wird er doch nicht mehr, ob er ausgestellt wird oder nicht, aber ein wohlgemeintes Mahnwort soll es sein, daß der größte Teil unserer krummschnäbligen gefiederten Tag- und Nachträuber aus ästhetischen Gründen unter Ausschaltung des Nützlichkeits- und Schädlichkeitsstandpunktes die weitgehendste Schonung verdient.

Im großen und ganzen war die Zwickauer Ausstellung in ihrer Aufmachung sehr ansprechend, nur einige Mängel bedürfen beim nächstenmal unbedingt der Beseitigung, denn der Wert der Ausstellung und das Ansehen derselben beim Publikum leidet ganz gewaltig, wenn Vögel mit gänzlich verstoßenem Schwanzgefieder gezeigt werden, ebenso macht es keinen guten Eindruck, wenn man Vögel mit hängendem Flügel zu Gesicht bekommt. Derlei Vögel sind wohl in der Vogelstube des Liebhabers ab und zu ganz selbstverständliche Erscheinungen, aber zur Schaustellung vor einem kritischen Publikum eignen sich derartige Vögel nicht. Da ich weiß, daß auch die Ausstellungsleitung des Zwickauer Vereins solche im Aussehen unnatürliche Vögel nicht dulden wollte, so richtet sich meine Mahnung an die Aussteller der betreffenden Vögel, in Zukunft davon abzusehen. Auch einige, wohl für die Vogelstube noch angängige, aber für eine Ausstellung unschöne und unvorschriftsmäßige Käfige waren noch zu sehen, doch bürgt die Rührigkeit des Zwickauer Vereins dafür, daß auch diese nach und nach durch praktische Käfige ersetzt werden und gänzlich verschwinden. Das Material in Volieren und Gesellschaftskäfigen war ein reichhaltiges, es waren wohl gegen 14 Stück, einige darunter sogar sehr ansprechend, nur den einen Fehler hatten viele, daß sie ihrem Rauminhalt entsprechend übervölkert waren. Bei einer Ausstellung bringt nicht die Quantität, sondern nur die Qualität des ausgestellten Materials den vollen Erfolg, ebenso ist es auch mit einem Gesellschaftskäfig. Erstens muß er neben einer praktischen Einrichtung die höchst zulässige Zahl der Bewohner aufweisen und letztere müssen in der Art, sowie auch in der Beschaffenheit des Gefieders, ausgesuchte Exemplare sein. Mag der Gesellschaftskäfig noch so ansprechend wirken, sehe ich aber unter den Bewohnern z. B. einen Stieglitz ohne Schwanz und noch dazu auf einer Ausstellung, so verblaßt ein Teil von dem Ansehen derselben. Einige mit Exoten besetzte Gesellschaftskäfige waren eine wirkliche Augenweide, speziell die zum Teil mit

Glas verschlossenen Käfige wirkten ähnlich wie die im Berliner Zoologischen Garten gesehenen sehr praktisch und gaben von den Bewohnern ein übersichtliches, nicht durch Drahtstäbe gestörtes Bild. Hier muß auch gesagt werden, daß in der Abteilung Exoten wirklich einwandfreies Material gezeigt wurde, zur Ehre der Liebhaber einheimischer Vögel sei aber auch nicht unerwähnt, daß sich Exoten im Käfig viel leichter im glatten Gefieder halten, wie unsere einheimischen Vögel mit den in dieser Hinsicht gefürchteten beiden Zugperioden. Was die Prämiierung einer Ausstellung einheimischer Vögel anbetrifft, so ist dies ein heikles Kapitel, da erstens kein Prämiierungssystem besteht, dessen Standard für diesen oder jenen Vorzug soundso viel Punkte vorschreibt, wie wir dies bei unseren Kleintierausstellungen in Anwendung bringen. Daß dabei Ungerechtigkeiten vorkommen müssen, ist logisch, und der Preisrichter in seiner korrekten Beurteilung kommt in Konflikt mit der Ansicht und Meinung der Aussteller. Zwickau hatte viele und auch sehr wertvolle Preise, erwähnen will ich nur das harmonische Zusammenarbeiten des Zwickauer Vereins mit den Behörden, was allerorts angestrebt werden müßte, weil es für unsere zu Unrecht angefeindete Liebhaberei von Vorteil ist. Die Stadt Zwickau hatte in anerkennenswerter Weise für die hervorragendste Gesamtleistung eine künstlerische Plakette aus Meißener Porzellan gestiftet. Die Gewinner aller dieser schönen Preise haben sie verdient, womit aber nicht gesagt sein soll, daß nun in ihrem Bestande alles vollkommen ist, nein, im Gegenteil, es muß gesagt werden, es gibt noch viel zu lernen und zu verbessern, wenn die kommende Ausstellung in allen, auch den unscheinbarsten Punkten, dem kritischen Blick eines unparteiischen Preisrichters standhalten soll. Meine Ansicht über eine Ausstellung ist die, das lebende Vogelmaterial sowie die Käfige müssen derartig einwandfrei sein, daß sich eine Prämiierung erübrigt, denn sind alle Vögel, wie Ausstellungsvögel sein sollen, in ihrer Erscheinung gesund und ebenso einwandfrei gekäfigt, so fällt die Prämiierung von selbst weg, da jeder einen Preis verdient und erhalten müßte. Alles dies habe ich so eingehend beleuchtet, um nicht nur dem Zwickauer, sondern allen in Betracht kommenden Vereinen die Wege zu weisen, die am gangbarsten sind zum vollen Erfolg einer Ausstellung. Ist und wird auch nie etwas vollkommen sein, so werden wir doch danach trachten müssen, dem uns vorschwebenden Ideal nahe zu kommen.

Verschiedenes über den Kirschkernbeißer — (Coccothraustes coccothraustes *Linné*).

Von Wilhelm Schreitmüller-Frankfurt a. M.

(Nachdruck verboten.)

Meinen ersten Kernbeißer (Abb. s. nebenstehend) fing ich im Jahre 1883 als 13jähriger Gymnasiast. Ich machte damals mit einem meiner Freunde einen Spazier-

Kirschkernbeißer.

gang durch den „Großen Garten" zu Dresden, wobei ich auf einem in einer Wiese stehenden Strauch von Cornus sericea *L.* ein kugelartiges „Etwas" sitzen sah, das sich bei meiner Annäherung als ein eben dem Nest entflogener, junger Kernbeißer entpuppte, welcher auf dem Kopfe noch einige Flaumfedern zeigte.

Das Tierchen ließ sich ohne weiteres einfangen, worauf ich es mit nach Hause nahm.

Ich setzte den Vogel vorerst in einen kleineren Käfig und päppelte ihn mit einem Gemisch von Ameisenpuppen, fein zerhacktem, gekochtem Hühnerei und gequelltem Rübsen auf. Während der ersten zwei Tage wollte das Tierchen absolut nicht sperren, so daß ich genötigt war, ihm den Schnabel zu öffnen, um ihm das Futter beibringen zu können. Nach dieser Zeit gewöhnte er sich jedoch daran, den Schnabel selbst zu öffnen, sobald ich mich ihm nahte und füttern wollte. Nachdem er selbst fressen konnte, gab ich ihm als Nahrung Hanfsamen, Bucheckern, Zirbelnüsse, Kirsch- und Sonnenblumenkerne. Nebenbei erhielt er etwas Weichfutter, Ameisenpuppen, Mehlwürmer und Grünzeug aller Art. Von letzterem

bevorzugte er stets Blätter des Staudensalats, Kreuzkraut, Vogelmiere und besonders die Kerne von grünen Erbsen; auch reifen und grünen Wegerichsamen nahm er gern an.

Nach der ersten Mauser sah der Vogel prächtig aus. Sein Rücken zeigte schwärzlichbraunes, nach dem Ende zu heller werdendes Gefieder; der Bauch (Unterseite) hatte bräunlichgelbe Tönung, der Kopf (Scheitel) war vorn hellgelblichbraun, hinten dunkelgelbbraun. Hieran schloß sich der blaugraue Hals an. Die Kehle war samtartig glänzend schwarz. Die Federn der Flügel zeigten schwarze, in der inneren Mitte weiße Federn, während der Schwanz links braun, rechts schwarz und das Ende weiß gefärbt war. Der dicke, kräftige, kegelartige Schnabel zeigte horngelbe, bis (hinten) bläulichgraue Farbe und die Iris der Augen ist grau bis graubraun, mit ziemlich großer, dunkler Pupille.

Das Tier ist also ganz ansprechend gefärbt, wenn es auch nicht als besonders auffallend und farbenprächtig bezeichnet werden kann. Während des surrenden Fluges dieses Vogels treten die weißen

Schopfwachtel (s. S. 391).

Stellen der Flügel- und Schwanzfedern besonders stark hervor.

Im Jahre 1891 fing ich an der „Tränke" drei dieser Vögel und zwar 1 Männchen und 2 Weibchen. Es waren alte, gut abgemauserte Tiere. Die ♂♂ waren fast ebenso gefärbt wie die ♀♀, nur zeigten sich die Farben der letzteren matter als die des Männchens. In der Größe gleichen sich beide Geschlechter vollkommen. Diese Exemplare hatten von der Schnabelspitze bis zum Schwanzende Längen von zirka 17—18 cm. Das eine der beiden Weibchen ließ ich, nachdem ich es gründlich vom Leim gesäubert hatte, sofort wieder fliegen, während ich die beiden anderen Vögel mit nach Hause nahm. Beim Ergreifen und Reinigen der Tiere mußte ich leider zweimal „nähere Bekanntschaft" mit ihren kräftigen Schnäbeln machen und ich kann versichern, daß so ein Kernbeißerbiß nicht zu unterschätzen ist. Das ♂ brachte mir eine tiefe, stark blutende Wunde am rechten Daumen bei, während mich das eine der beiden ♀♀ nicht ganz so derb erwischte, mir aber trotzdem ein ganz hübsches Dreieck aus der Oberseite des linken Zeigefingers herauszwickte; — allen Respekt vor dem Biß eines solchen Vogels! — Zu Hause brachte ich die beiden Übeltäter zunächst in einem an drei Seiten geschlossenen Holzbauer unter, den ich vorsichtshalber vorn verhängte. Als Eingewöhnungsfutter setzte ich ihnen einen Napf mit Hanf, Zirbelnüssen und Sonnenblumenkernen, sowie einen mit Mehlwürmern und Ameisenpuppen versehenen, auf den Boden des Käfigs und stellte einen Wassernapf dazu.

Daß die Vögel besonders stark getobt hätten während der ersten Zeit, könnte ich nicht behaupten. Als ich am nächsten Morgen behutsam das Zimmer betreten und mich leise auf einen Stuhl niedergelassen hatte, konnte ich ein fortwährendes Knacken und Knicken wahrnehmen, welches kein Ende nehmen wollte. Die Vögel verhielten sich hierbei ganz ruhig im Käfig, nur ab und zu ertönte ein scharfes „zid-zid" (oder „zit-zit").

Die Tiere hatten also bereits Nahrung angenommen. Bis zum Nachmittag desselben Tages

störte ich die Vögel nicht, war aber hierauf gezwungen, frisches Futter und Wasser in den Käfig zu geben, wobei ich konstatieren konnte, daß die Tiere mit dem vorhandenen Futter ganz gewaltig aufgeräumt hatten. Ich nahm hierauf den Vorhang vom Käfig, fütterte frisch und hängte den Käfig ziemlich hoch bei dem Fenster auf.

Nach etwa 10 Tagen waren die Vögel ziemlich eingewöhnt. Sie zeigten sich riesig faul und phlegmatisch.

In ihrem Benehmen erinnerten sie unwillkürlich an den „Seidenschwanz".

Gab ich frühmorgens frisches Futter in den Käfig, so konnte ich hierauf halbestundenlang das typische Knacken und Knicken, welches durch das Aufbeißen der Kerne verursacht wurde, hören; dabei flogen die Schalen von Hanf, Sonnenblumen- und Zirbelnußkernen u. a. nur so umher und wurden oft auf weite Entfernungen hin aus dem Käfig geschleudert und dies bei sonst größter Ruhe und Stille im Behälter. Waren die Freßsäcke satt, so hörte das Knacken plötzlich auf, die Vögel tranken einmal und flogen dann auf die Sitzstangen, worauf ihre Tagesarbeit bis zur nächsten Nahrungsaufnahme beendet war. Wohlbehäbig und selbstzufrieden saßen die beiden Tiere da, ließen sich von der Sonne bescheinen und putzten von Zeit zu Zeit ihr Gefieder; das war auch alles was sie taten, wenn sie nicht an einem am Gitter steckenden Salatblatt oder dgl. herumknabberten. Mit stoischer Ruhe saßen sie oft stundenlang auf einen Fleck, ohne auch nur einen Ton von sich zu geben. Nur ab und zu wurde der dicke, plumpe Kopf nach der Richtung gedreht, aus welcher sie irgendeinen Laut oder ein Geräusch vernommen hatten. — Ihre Parole war: „fressen, verdauen, exkrementieren, wieder fressen und sich dem Trübsinn hinzugeben! — Man kann also von diesen Vögeln nicht behaupten, daß sie „lebhaft und munter" wären wie andere Arten (außer dem Seidenschwanz und ähnliche Faulenzer). Später brachte ich die Tiere in einen geräumigen Käfig von etwa 100 × 70 × 40 cm. Größe unter, den ich mit Ästen und Zweigen versehen hatte. Ich nahm an, daß die Vögel hierin lebhafter und beweglicher würden, doch erwies sich meine Annahme als irrig, denn auch in dem neuen Behältnis änderte sich ihr Benehmen nur insofern, daß das Männchen — meist frühmorgens und nachmittags — seinen primitiven, nicht sehr lauten „Gesang" (wenn man das Gezwitscher so nennen darf!) zum besten gab. — Daß Kernbeißer aber auch mitunter ganz nett singen sollen, beweist eine Notiz des Herrn H. Fitzke-Altona a. Elbe (Heft 2 der „Wochenschrift für Liebhaber exotischer und einheim. Vögel" 1924, Seite 20), welche lautet:

. . . .„Ich besitze z. Zt. im Einzelbauer einen Kernbeißer. Derselbe ist sehr kräftig und schön im Gefieder. Als Futter verabreiche ich ihm Sonnenblumenkerne, Hanf, Zirbelnüsse, Kirschkerne. Was mich noch besonders an dem Vogel interessiert, ist sein großes Nachahmungstalent. Er bringt u. a. tadellos den Gesang der Schwarzamsel, des Stieglitz, Zeisig, Girlitz u. a. mehr. Hat schon ein Liebhaber ähnliche Wahrnehmungen gemacht?" usw. — Zusatz des Verf. Hier scheint es sich um einen selten vorkommenden Ausnahmefall zu handeln, denn ich könnte mich nicht entsinnen, jemals einen Kernbeißer als einen solch prächtigen Nachahmer anderer Vogelgesänge gehört zu haben; obwohl sowohl gekäfigte als auch freilebende Vögel dieser Art mitunter vereinzelte Laute anderer Vögel hervorbringen. Einen vollständigen Gesang einer anderen Art hörte ich solche Vögel, sowohl im Käfig als auch im Freien, wo ich solche Tiere besonders häufig beobachtete und abhörte, noch nie. Möglich wäre vielleicht, daß der Vogel des Herrn F. in irgendeinem Raum, in dem viele Waldvögel untergebracht waren, aufgewachsen ist und sich hierbei Laute und Strophen anderer Arten angeeignet hat; — ob er dazu befähigt ist, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis*).

Im Aufbeißen von Kernen aller Art leisteten die Vögel Erstaunliches. Kirschen-, Zirbelnuß- und selbst Pflaumenkerne wurden anscheinend mühelos geöffnet. Reichte ich den Vögeln Kirschen, Vogelbeeren (Eberesche), Traubenkirsche (Prunus padus *L.*) und andere Früchte, so bissen sie das Fruchtfleisch von den Kernen, warfen dieses zu Boden und knackten nur die Kerne, deren Inhalt sie fraßen. Nur ab und zu sah ich sie von ihnen gereichten Apfel- und Birnschnitten fressen. Obstkerne nehmen sie aber stets gern, besonders solche von Äpfeln, Birnen, Aprikosen und Pflaumen (letztere mußten geöffnet gereicht werden.)

Sie fraßen ferner: Samen von Ahorn, Linde, Esche sowie Mandeln, Nüsse aller Art, Wacholderbeeren als auch Maiskerne. Von letzteren bissen sie nur den Keimteil heraus und warfen das andere (harte) weg. Auch Glanz, Rübsen, Mohn, Hafer und Weizen verschmähten sie nicht. Ameisenpuppen, Mehlwürmer und gekochtes, fein zerhacktes Hühnerei waren für sie Leckerbissen, welche ich ihnen aber nur während der Sommermonate reichte. Auch Fliegen u. dgl. fraßen sie oft. Während des Frühjahrs nahmen sie auch gerne Baumknospen von Äpfeln, Birnen u. dgl. an.

Ich konnte mich bei Beobachtung dieser Vögel nie des Eindruckes erwehren, daß sie sich im Käfig stets tief unglücklich fühlen. Der Ausdruck ihrer Augen ist stets ernst, fast traurig und in dem Grade auffallend, wie ich dies bisher noch bei keinem anderen Vogel in der Gefangenschaft beobachtet habe.

---

*) Es ist wiederholt vorgekommen, daß gefangene Kernbeißer Spötterbegabung zeigten. Ein Kernbeißer Prof. Th. Liebes ahmte ausgezeichnet den Paarungsruf der Zwergwachtel, der aus vier oder fünf angenehm pfeifenden Tönen besteht, nach. Liebe bewunderte, wie der Vogel statt des eignen, so hoch gelegenen, zischenden Locktones den tiefen, flötenden Lockton der kleinen Wachtel hören ließ, der garnicht zu den eignen, hohen Stimmitteln des Kernbeißers zu passen schien. Von einem anderen, anscheinend „mundgelernten" Kernbeißer wird in der „Gef. Welt" 1907 berichtet. Der Vogel pfiff eine Melodie mit angenehmer, sanfter und reiner Flötenstimme. Der Kernbeißer besitzt demnach zweifellos die Gabe, Stimmen anderer Vögel nachzuahmen und Melodien nachflöten zu lernen. Neunzig.

(Schluß folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Anfang März 1925, bezog ich 1,1 kal. **Schopfwachteln** von H. Fockelmann, Hamburg, wie mir mitgeteilt wurde, waren dieselben damals frisch importiert. Ich setzte sie in meine Gartenvoliere, die zu dieser Zeit noch nicht weiter bevölkert war. Die Wachteln waren und sind es auch heute noch, recht scheu, aus diesem Grunde versprach ich mir von einer Weiterzucht nichts, zumal inzwischen auch die Voliere mit 5,5 Wellensittichen, 1,1 gr. Kardinälen, 1,1 Blutschnabelwebern, 1,1 Paradieswitwen, 1,1 kleinen Elsterchen, 1,1 Amaranten, 1,0 Papstfink, 1,0 Bandfink, 1 Kreuzschnabel, 1 Stieglitz, 1,2 Kanarien, besetzt wurde. Wie überrascht war ich indessen, als am 23. Mai 2 Eier, in einer in den Boden gescharrten Mulde unter dichtem Gebüsch, von mir bemerkt wurden. Am 4. Juni lagen im ganzen 10 Eier. Da ich bezweifelte, daß die scheuen Wachteln ruhig brüten würden, legte ich noch am selben Tage die 10 Eier einer Zwerghenne unter. Die Wachtelhenne legte nun vom 5. 6. bis 20. 6. noch weitere 11 Eier, die sie selbst sehr gut bebrütete. Am 27. 6. liefen von den ersten 10 Eiern 5 Stück aus, hübsche klein außerordentlich flinke Tierchen, die sich bis heute bei reichlich Mehlwürmern, geq. Ameiseneiern, geh. Ei und Fasanenaufzuchtfutter gut entwickelt haben. Am 13. bzw. 14. 7. liefen von den weiteren 11 Eiern 9 Stück aus, wovon eins einging, so daß ich nun von 21 Eiern 13 Junge habe, auf deren Weiterentwicklung ich recht gespannt bin. Sollten noch bemerkenswerte Ereignisse bei der Weiterzucht eintreten, werde ich dieselben mitteilen. Bemerken möchte ich noch, daß Wellensittiche in Volieren, wo man zur Aufzucht Weichfutter, Mehlwürmer usw. verwenden muß, recht störend werden, und zwar indem sie, trotz reichlicher und vielseitiger Körnerfütterung, das ganze Weichfutter wegfressen. Ich bin gezwungen, das Aufzuchtsfutter in 4—5 verschiedenen Gefäßen einzeln im Gebüsch zu verstecken und auch da findens die W. noch. Es kommt mir vor als wenn sie mich schon beim Verstecken beobachten. Jedenfalls kommen nächstes Jahr die W. in eine andere Voliere.

Erich Richter, A.-Z. Mitg. 235.

Das Eichkätzchen als Schädling. In der Nr. 29 vom 18. Juli 1925 der Zeitschrift „Hege und Hund" ist folgender Vorgang zu lesen: „Am 2. Juni hatte ich Gelegenheit, die Eichkatze als Jagdschädling kennenzulernen. Mein Haus steht hart am Waldrande. Nicht 50 Schritte davon brütete ein Rebhuhn im Klee, der etwa 20 Zentimeter hoch stand. Meine Tochter bemerkte vom Schlafstubenfenster aus, daß sich dort herum eine Eichkatze zu schaffen machte, und rief mich herbei. Es war aber nichts mehr zu sehen. Nun ging ich in den Klee, vorsichtig und leise, um die brütende Henne nicht zu stören, aber doch nachzusehen, was das Eichhörnchen dort mache. Plötzlich schoß das rote Baumäffchen vor mir aus dem Grünen und flüchtete nach dem Walde. Was ich vorfand, entsetzte mich. Die Henne lag abgewürgt und an Brust und Hals angeschnitten neben dem Gelege. Ich nahm nun dieses auf, um es einer gerade brütigen Zwergbantamhenne unterzulegen, ließ aber zwei kalte — offenbar taube — Eier im Eisen zurück. Am selben Tage nachmittags gegen 4 Uhr — der Mord hatte gegen 11 Uhr stattgefunden — saß mein Eichhörnchen im Eisen. Obwohl gefangen, hatte es die Eier, die taub waren und furchtbar stanken, zu fressen versucht. K. Schl."

Zum Nestschutze. Wie sehr Dornen Nesträuber abhalten, dafür ein kleines Beispiel. In den Stachelbeerbüschen meines Gartens fanden sich manche Jahre vereinzelt Nester, namentlich des Häuflings. Sie kamen aber selten zum Ausfliegen, weil allerlei Raubzeug, namentlich des Niederhaltens der Rattenplage wegen gehaltene Katzen sie meist gerade kurz vor dem Ausfliegen der Jungen, wo sich diese naturgemäß am meisten bemerkbar machten, zerstörten. Um dem Übel zu begegnen, wurden versuchsweise die einzelnen Schößlinge dichter zusammengebunden, damit dadurch die schützenden Dornen erhöhtere Wirkung ausüben konnten. Die Folge davon war, daß sich schon im nächsten Jahre vier Hänflings- und ein Müllerchennest nicht bloß vorfanden, sondern ungefährdet ausflogen. Die schlanken Vögel konnten wohl zwischen den Dornen unbehelligt hindurchkommen, nicht aber die Räuber. Solches Vorgehen ist also sehr zu empfehlen. Arens.

Eröffnung der Vogelschutz-Ausstellung in Ludwigshafen. Ludwigshafen, den 30. Juli. Die Süddeutsche Gartenbau-Ausstellung ist um eine weitere Sehenswürdigkeit bereichert worden, da mit dem heutigen Tage im Ausstellungsgelände die Vogelschutz-Ausstellung eröffnet wurde. Es ist dies eine Schau, die für alle, insbesondere aber für Vogelliebhaber, von größtem Interesse und von größter Bedeutung ist. Sie kann ihrer Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit und der Fülle des Materials als die bisher größte deutsche Vogelschutzausstellung bezeichnet werden. Unter dem Anschauungsmaterial befinden sich neben den deutschen Vogelarten auch Vogelschutzgehölz und Vogelkästen nach dem bekannten System des Freiherrn von Berlepsch. Wer Vogelschutz treiben will, muß zuerst die Vogelwelt kennen und lieben lernen. Hierzu bietet die Ausstellung hinreichend Gelegenheit. Die Vertreter der hiesigen und Mannheimer Presse waren für heute vormittag 11 Uhr zu einer Vorbesichtigung der Ausstellung geladen. Die Ortsgruppe Heidelberg des Deutschen Vogelschutzverbandes, die Veranstalterin der Ausstellung, hat sämtliche Ausstellungsobjekte übersichtlich angeordnet. Auch ist sie jederzeit gerne bereit, Führungen durch die Ausstellung zu veranstalten, um die Kenntnisse über die deutsche Vogelwelt und deren Lebensweise in weiteste Kreise zu bringen. Schulen, Vereine und sonstige Korporationen sollen sich die Gelegenheit zur Besichtigung der Ausstellung nicht entgehen lassen. Jedermann, der Lust und Liebe für die einheimische Vogelwelt hat, ist überrascht von der Fülle des Gebotenen. Neu ist für den Laien die Tatsache, daß auch unter der Vogelwelt eine große Wohnungsnot herrscht, denn durch das Abholzen ganzer Waldungen und durch das Auspuzen und Ausschneiden der Bäume und Sträucher bieten sich den Vögeln keine Nistgelegenheiten mehr. Jedermann hat die Pflicht, für Schonung der Vogelwelt einzutreten, wenn er auf den melodiösen Gesang der Vögel im Sommer nicht verzichten will. Der Grundgedanke der Ausstellung fußt daher auch auf dieser Basis. Zuerst werden die verschiedenen Vogelarten gezeigt, die von der Schule her noch geläufig sind. Sodann sieht man die künstlichen Nisthöhlen, wie sie sein sollen und wie sie nicht sein sollen. Wie der Führer durch die Ausstellung, Herr Panzer, erklärt, steht Deutschland in bezug auf Vogelforschung an der Sitze der ganzen Welt. In einer besonderen Abteilung kann man die nützlichen einheimischen Singvögel bewundern, während in Bildertafeln gezeigt wird, wie die Reiherfedern für den Hutschmuck der Damen gewonnen und wie dadurch massenweise Vögel hingemordet werden, um der Gefallsucht der Damen zu frönen. Die Reiherfedern, die man auf den Hüten der Damen sieht, stammen entweder vom Silberreiher oder vom Seidenreiher. Beide Vögel tragen diesen Schmuck nur zur Zeit des Brutgeschäftes. Um die Federn zu gewinnen, wird nicht nur der Vogel, sondern auch die junge Brut getötet. England und Amerika sind gegen diesen Unfug schon längst eingeschritten und haben das Tragen von Reiherfedern verboten. Vielleicht wird Deutschland ebenfalls bald folgen. Die Eulen bilden eine besondere Kategorie für sich. Im Gegensatz zu den falschen Anschauungen über diese Tiere, denen mancherlei Böses angedichtet wird, sei festgestellt, daß sie zu den allernützlichsten Vögeln zählen, die man sich denken kann. Auch über den Kuckuck, das Käuzchen, den Fischreiher und andere Vögel mehr wußte der Vortragende allerlei Interessantes zu erzählen und die Zuhörer zu fesseln. Zu den Vogelfeinden zählt das possierliche Eichhörnchen, das ein ganz gefährlicher Nesträuber ist, dann das Wiesel, das Hermelin (Großwiesel) und der Eichelhäher. Die interessante Besichtigung dauerte bis gegen 1 Uhr.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 17: Dieses Jahr habe ich Züchtungsversuche mit echten Waldturteltauben (Kitter und Täubin, blutsfremd) in einem großen Flugkäfig gemacht. Sie sind mir aber nicht gelungen, da die Täubin in das an der Käfigwand aufgehängte Korbnestchen, in dem sie oft eine halbe Stunde lang saß, nicht legte. Der Begattungsakt von dem Täuber ging oft und regelrecht vor sich. Die Täubchen habe ich selbst aufgezogen. Sie wurden mir im Jahre 1923 von einem

Oberjäger gebracht, sind also zwei Jahre alt. Hat ein Liebhaber mit Waldturteltäubchen schon Züchtungserfolge gehabt? Franz Kempf.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

Aufnahme in den Reichsverband haben gefunden: 1. der Vogelliebhaberverein zu Remscheid; 2. die Herren: Dr. Bartolomaeus in Crivitz, Karl Johannes Rothe in Dresden-A., Eduard Schütze in Quelle, Franz Kempf in Offenburg und Oberstleutnant a. D. Richter in Altenburg. J. A.: Petters.

Ameisenpuppen betreffend. Unsere sehr verehrten Mitglieder machen wir darauf aufmerksam, daß nunmehr der Betrag für die bestellten Ameisenpuppen eingesandt werden muß. Besonderem Entgegenkommen unseres Lieferanten ist es zu verdanken, daß der Preis erniedrigt worden ist. Es stehen zur Verfügung 200 kg. Wenn es uns möglich ist, diese Menge abzunehmen, kostet die Ware, es ist diesjährige Ernte, pro Pfd. 3,75 M. Erreichen die Bestellungen diese Mengen nicht, kostet das Pfd. 4,75 M. Es ist noch möglich, Bestellungen aufzugeben, die bis zum 20. August mit dem Betrage hierfür einzusenden sind. Geldbeträge sind auf unser Postscheckkonto Leipzig Nr. 22418 einzuzahlen. Die getätigten Bestellungen bleiben bestehen, jedes Mitglied ist an die Abnahme der bestellten Menge gebunden. J. A.: Petters.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Max Kleinert, Berlin NO 18, Strausberger Straße 13, Fernruf Alexander 3313: Diademamazonen, Müllermazonen, Gelbstirnamazonen, Brillenamazonen, Tarant. rotköpfige Bergpapageien, Tovisittiche, Feuerflügelsittiche, Königglanzstare, Langschwanzglanzstare, Zebrataubchen,

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a: Langschwanzglanzstare, Kaptäubchen, Schnurrbärtchen, Tovisittiche, Elfenbeinsittiche, Orangestirnsittich, Pavuasittiche, St.-Thomas-Sittiche, 1 Benguella-Papagei, sprechend, 1 Korallenschnabel-Papagei, 1 Paar Orangegesichtige Unzertrennliche (Flügel etwas beschnitten).

Eugen Müller, Küllstedt: 1,1 Singsittiche, 1,0 dto.

Gustav Reiß, Berlin C 25, Gontardstr. 4: Blauer Arara, kleine Gelbkopfamazonen, Portorikoamazonen, Boliviasittiche, Nandaysittiche, Kanarienflügelsittiche, Goldstirnsittiche, Blumenausittiche, Braunwangensittiche, Braunohrsittiche, Tovisittiche, Rosellasittiche, Pennantsittiche, Pflaumenkopfsittiche, Yendayasittiche, Kaktussittiche, Orangeblaufinken, Karmingimpel, olivgrüne Astrilde, Rotkopfamadinen.

H. Behrke, vorm. Mäße, Tierhandlg., Braunschweig, Sophienstraße 35, gegr. 1874, Fernruf 1281: Grünbürzlige Sperlingspapageien.

F. Zaugg, Photographie, Solothurn (Schweiz): Gold- und Silber-Lizard-Kanarien.



Herrn G. T., Oldenburg. Überwinterungsversuche mit ausländischen Vögeln im Freien sollten nur Vogelpfleger unternehmen, die schon reichliche Erfahrungen in der Haltung dieser Vögel besitzen. Da Fragesteller aber, wie aus der Anfrage zu ersehen, diese Erfahrungen noch nicht besitzt, rate ich entschieden von diesem Versuch ab. Es sind unter den kleinen Exoten, jedenfalls sind Prachtfinken gemeint, auch nicht solche, welche eine besondere Eignung für einen derartigen Versuch besitzen. — Als Aufzuchtfutter reicht man den genannten Prachtfinken außer dem stets gereichten gequollene oder gekeimte Samen, halbreife Samen von Gräsern, Hirse usw., kleine Mehlwürmer, große nach dem Töten in Stücke geschnittene, und ein Gemisch von Ameisenpuppen (frische oder gequollene trockene), feingehacktem, hartgekochtem Ei und Vogelbiskuit zu gleichen Teilen.

Herrn A. L., Frankfurt a. M. Der gelbe Schilffink (s. Abb. S. 385) ist in allem dem gemeinen Schilffinken ähnlich. Er ist im Jahre 1906 von einem englischen Vogelpfleger gezüchtet. Zwischen ihm und dem gemeinen Schilffinken — Munia castaneothorax *(T. Gd.)* scheinen Übergangsformen oder Mischlinge vorzukommen. Die Verbreitungsgebiete beider stoßen zusammen. Zuweilen zeigten eingeführte gelbe Schilffinken die Neigung, die Farbe des gemeinen Schilffinken anzunehmen. Andere halten den gelben für die Steppenform, den gemeinen für die feuchtere Gebiete bewohnende Form desselben Vogels.

Herrn K. R., Darmstadt. Der Fußring entstammt keiner der bekannten Beringungsstationen. Ihn trug jedenfalls ein in der Gefangenschaft gezüchteter Vogel, der seinem Behälter entschlüpft ist. Es wäre besser gewesen, den ganzen Kadaver einzusenden.

Herrn G. in M. Ich sehe mit Interesse der Arbeit entgegen.

Herrn S. L., Berlin-Friedenau; Herrn H. W., Potsdam: Beiträge dankend erhalten.

Herrn G. L., Wielzie-Hayduki. Der Vogel ist der Gartensänger (Gelbspötter). Das Geschlecht ist bei dieser Art am Gefieder oder sonstigen äußeren Merkmalen nicht zu erkennen. Vermutlich handelt es sich um einen noch nicht völlig ausgefärbten Vogel.

Herrn v. Z., Berlin W 50, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn J. F. Sch., Leipzig-Co. Es gibt kein anderes Mittel, Prachtfinken und andere kleine Finken zur Brut zu veranlassen, als richtige Verpflegung der Tiere bei Vorhandensein richtiger Paare.

Herrn H., Rostock. Besten Dank für die Mitteilung. Von einer Veröffentlichung kann abgesehen werden, da Albinismus bei Sperlingen keine seltene Erscheinung ist.

Herrn W. H., Neukischen. Bezugsquellen können an dieser Stelle nicht angegeben werden. Fußringe für Wellensittiche sind in der Regel bei den in der „Gef. Welt" inserierenden Vogelhandlungen käuflich.

Herrn W. L., Braunschweig. Die Mehlwürmer können während der Mauserzeit weiter gegeben werden. Wenn viel andere lebende Insekten gereicht werden, ist die Beigabe der Mehlwürmer unnötig. Die zu fette Schama sollte sie nicht erhalten. Für Entfettung dieses Vogels sollte durch weniger nahrhafte Kost Sorge getragen werden. Vögel mit starkem Fettansatz mausern in der Regel schwer, wodurch naturgemäß das Wohlbefinden des Vogels sehr beeinträchtigt, in vielen Fällen das Leben desselben gefährdet wird. Für Abmagerung wird gesorgt durch Unterbringung des Vogels in einem sehr großen Käfig mit weit auseinander liegenden Sprungstangen, so daß der Vogel sich reichlich bewegen muß, durch knappe Kost, durch zeitweilige, etwa eine Stunde währende Futterpausen, durch weniger nahrhafte Zusammensetzung des Futters, im vorliegenden Fall durch reichlichen Zusatz trockener Ameisenpuppen.

Herrn S. in L. Der Vogel wurde, bevor er in Ihren Besitz gelangte, vermutlich nur mit frischen Ameisenpuppen gefüttert. Mit dieser Fütterung hätte fortgefahren werden müssen, bis der Vogel gemausert hat, und dann wäre es Zeit gewesen, den Übergang zu einem anderen Futter allmählich herbeizuführen. Es handelte sich um einen diesjährigen Wildfang, dem die Verdauung der trockenen Ameisenpuppen Schwierigkeiten machte. Ein längere Zeit gekäfigter Vogel ist eben weniger empfindlich als ein Frischfang. Mehlwürmer soll der Vogel, wenn frische Ameisenpuppen gereicht werden, überhaupt nicht erhalten.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

Jahrgang 54 13. August 1925 Heft 33

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Mein Zaunkönig. Von W. Kepp.
Neueinführungen und Seltenheiten. Von K. Neunzig. (Forts.)
Der Eisvogel. Von P. Arens, Hannover. (Schluß).
Die Zwickauer Ausstellung. Von J. Birk, Leipzig. (Schluß).
Verschiedenes über den Kirschkernbeißer — (Coccothraustes coccothraustes *Linné*). Von Wilhelm Schreitmüller, Frankfurt a. M.
Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.) Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Sitz Leipzig. 1. Vors. Hermann Höhne, Leipzig-Volkmarsdorf, Eisenbahnstraße 84 IV. 1. Schriftf. Max Hunger, Leipzig-Gohlis, Polizeigebäude Zimmer 196. Kassierer Ludwig Böttcher, Leipzig, Inselstr. 17 II. Girokasse Leipzig, Nr. 6317. — Wir hatten unsere Mitglieder aufgefordert, zu der Bildung von Bezirksverbänden Stellung zu nehmen und uns ihre Meinung darüber zum Ausdruck zu bringen. Nachdem die Frist abgelaufen, hat unsere Vorstandssitzung zu den gegebenen Tatsachen ihre Entscheidung hinzugefügt. Wir konnten uns nach genauer Prüfung aller Wenn und Aber nur darüber einig werden, von einer weiteren Teilung der Organisationsarbeit abzusehen. Selbst dort, wo die Umstände besonders günstig dafür sprechen, bleibt uns kein anderer Entschluß übrig auf Grund der Achtung des Willens des größten Teils unserer Mitglieder. Vor allem ist es uns nicht möglich, über die von der Jahresversammlung bewilligten Beiträge zugunsten einer Gruppe anders zu verfügen als uns vorgeschrieben, da uns hierzu die notwendige grundsätzliche Befürwortung der Bezirksbildung fehlt. Unserer Pflicht bewußt, werden wir natürlich nicht außer acht lassen, die engere Fühlungnahme innerhalb unseres Landesverbandes entsprechend wirksam zu pflegen und zu fördern. Im übrigen bitten wir aber, sich mit unserem Beschlusse zu bescheiden und sofern die Wünsche nicht in Erfüllung gehen konnten, dieselben zurückzustellen, bis Zeit und Verhältnisse eine Änderung des Bestehenden empfehlen. Unsere nächste Vorstandssitzung findet am 26. August bei Herrn Ludwig Böttcher statt. Irgendwelche besonderen Wünsche sind bis dahin zu unserer Kenntnis zu bringen. Neu aufgenommen wurde Herr Max Neubauer, Langenberg i. Th., Waldgasse 1. Allen unserer Vereinigung noch Fernstehenden dies zur eifrigen Nachahmung. Der Vorstand. J. A.: Hunger, Schriftf.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke, Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Restaurant „Zum Löwentor", Königswall 75.
J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung Freitags, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Blasewitzer Hof". Liebhaber willk. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden, Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Eliesenhof", Eliesenstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Versammlung jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinsl. „Parkhotel", Epinaystr. 1, und jeden letzt. Sonnabend im Monat im Vereinsl. „Stadt Chemnitz", Thomasstr. 57. Näh. Auskunft erteilt Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 18. August.
A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Der Hannoversche Vogelschutzverein zu Hannover, gegr. 1881, wirkt mit sichtbarem und anerkanntem Erfolge für Vermehrung und Schutz der Vogelwelt bei Hannover durch Aufhängen von jährlich einigen hundert Nistkästen aller Art, durch Erweckung von Interesse und Liebe für die Vogelwelt mit monatlich, zur Gesangszeit wöchentlich stattfindenden Belehrungsspaziergängen und durch Vorträge und Austausch der Beobachtungen in den jeden dritten Dienstag des Monats stattfindenden Vereinsversammlungen. Seine Bestrebungen dienen also lediglich gemeinnützigen Zwecken. Mitgliederzahl rund 1200, jährlicher Beitrag nur 1 M. Meldungen an den Vorsitzenden Herrn Fritz Becker, Hannover, Boedekerstr. 1 F. Nächster Spaziergang Sonntag, den 16. August, nach dem Georgengarten und Herrenhausen. Treffpunkt: Königswortherplatz 9½ Uhr. Becker.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste willk. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Vereinsabend regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends um 8 Uhr) beim 1. Vors., Herrn Jahn, Feodorastr. 7. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. Adolf Voigt, Schriftf.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 20. August. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Normast im „Kaiser Friedrich", Breslauerstr. 50. Liebhaber willkommen. J. A.: Friedrich.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorfstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Tage im „Goldenen Falken" Versammlung; nächste Freitag, den 21. August. Liebhaber willk. Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Versammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Liebhaber willk. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebenda. R. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusamenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Achtung! Am 15. d. M. erhebt die Post die Bezugsgebühr für Sept. Wir bitten den Betrag bereit zu halten, damit die Quittungen beim ersten Vorzeigen eingelöst werden und keine Unterbrechung in der Belieferung eintritt. Wo der Briefträger die Quittungen nicht vorzeigt, ist er daran zu erinnern. Bei Bestellung nach dem 25. erhebt die Post eine Extragebühr von 20 Pfg., die vermieden werden kann, wenn die Zeitschrift rechtzeitig bestellt wird.

Anzeigenteil

viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

äfige u. Gerätschaften

ogel-Mistelleim
um Fangen schädlicher Vögel, lebend bei jeder Witterung, garangebrauchsfähig, Dose 2.— M. fr. von
reitag Nchf., Frankenberg i. S. 6.
iederverkäufer hohen Rabatt. [1041

Mistelleim
ubgr., lief. i. anerkannt vorzügl. Güte
lf Kirschner, Arnsdorf-Haida (Böhmen), Roseggerstr. [1042

mmervoliere,
us Metall, zusammenlegbar, gesucht.
ote mit Größenangabe, Stäbchenzwischenraum und Preis an [1043
ldefleiß, Bad Oeynhausen (Saline).

Futtermittel

deutsche Ameiseneier
nd 6.—, bei 5 Pfund à 5.75 M.
Schindler, Berlin, Elsasser Straße 78. [1044

sche Ameiseneier
geschwelgt . . . . Ltr. 3.— M.
$^4/_{10}$ Ltr. 1.40 „
Ameiseneier das Pfd. 6 u. 8 „
la (Zecke) das Pfd. 2 u. 3 „
wurm . . das Pfd. 6 „
hfutter zu 0.80, 1.40 u. 2.— „
tengrieß das Pfd. 1 „
würmer ¼ Pfd. 2, Pfd. 8 „
franko gegen Voreinsendung des Betrages. [1045
. Hiltmann, Berlin S 14, Dresdener Str. 24.

in Versuch
gt jeden von der Güte meines
rsalfutters. Preis 2 M. p. Pfd.
che Futtersorten für Exoten, und Kanarienvögel zu billigsten reisen. Versand geg. Nachnahme. ung und Porto werden billigst berechnet. [1046
. H. Kirsten, Leipzig 3, Str. 53. Fernruf 31445.

lwürmer la Pfd. 5.— M (ohne Spesen)
3.— M frk. Voreinsend.
er, Breslau, Weinstr. 12. [1047

Fabrikation und Vertrieb
des
Heidelberger Vogelfutters
hergestellt nach Vorschrift
und unter Kontrolle des Prof. Dr. Otto Fehringer,
erfolgt jetzt durch [1048
das
GENO-WERK ~ Mannheim
Rheinkaistraße 8 b.
Interessenten werden Bezugsquellen nachgewiesen.

„ORNIS" Freie Bezugsvereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands.
Gegründet 1912 ∴ Fernsprecher 4198 [1049
Fachgemäße Belieferung mit Vogelfutter („Reform-Normal", individuelle Zusammensetzung bei restlosem Verbrauch; stets frisch gemischt). Hunderte von Liebhabern füttern seit über einem Jahrzehnt mit bestem Erfolg nur „Reform-Normal".
Reform-Normal-Käfige Mod. ORNIS 1925, neue Preisliste erschienen. — Modern eingerichtete Käfig-Bauanstalt mit elektrischem Betrieb.
Anschrift: Ornis-Haus, Halle-Saale. Der Geschäftsführer: Martin Sperling.

Vogelfutter [1050
für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 18 über Vogelfutter umsonst.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark ¼ Pfd. franko versend. D. Waschinski & Co., Biesenthal I (Mark). [1051

la Drosselfutter,
Marke „Lucullus." [1052
(Ameiseneier, Musta, Zwiebackschrot), beziehen Sie vorteilhaft von
H. Pullich, Langen b. Frf. a. M. 8.

la Ameiseneier
Pfund 6.00 M.
la Muska-Zecken . . à Pfd. 2,50
la Seidenraupenpuppen, gemahlen . . . . à Pfd. 0,75
la Garnelen, gem. à Pfd. 0,40 M
la Universalfutter
Alecwa I für Nachtigallen 2.— M
„ II für Grasmücken 2.— M
„ III für Drosseln . 1.50 M
Proben und Analysen zur Verfügung. Vertreter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [1053
Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
A. Eckrich II, Waldsee (Pfalz).

Rohmaterial
zur Herstellung von Weichfutter für Insektenfresser liefert billigst [1054
H. Pullich,
Langen 8 bei Frankfurt am Main.

Sämtliche Vogelsaaten
in [1055
hervorragender Beschaffenheit
liefert zu vorteilhaften Preisen in großen und kleinen Posten
Hugo Schütze, Eystrup (Weser)
Fernruf: Eystrup Nr. 1 u. 23, Postscheck-Konto 5715 Hannover.
Preisliste verlangen.

Frische Ameisenpuppen
à Liter 2.80 Mark, franko.
Getrock. Ameisenpuppen
à Liter 1,60 Mark, I. Qualität.
Mehlwürmer
gegen Einsendung von Mk. 1.50 ¼ Pfund franko. [1056
Th. Witte, Niederndodeleben bei Magdeburg.

Beschwerden wegen Nichtzustellung der „Gefiederten Welt" sind beim zuständigen Postamt anzubringen.

Vögel

Blaue Aras

erstklassig, Stck. 160.— M.

Molukkenkakadus . . . Stck. 225.—
Dopp.-Gelbköpfe, ausgefärbt Stck. 75.—
Diademamazonen, zahm u. sprechend. . . . . Stck. 58.—
Mülleramazonen, zahm und sprechend. . . . . Stck. 60.—
Blaustirnamazonen, sprechend 50—60.—
dito, noch nicht sprechend Stck. 45.—
Gelbstirnamazonen . . . Stck. 45.—
Kleine weiße Gelbhaubenkakadus, sehr schön . Stck. 45.—
Tarantinische rotkpf. Bergpapageien . . . . Paar 18.—
5 Paar 75.—
Grüne u. gelbe Wellensittiche Paar 14.—
Tovi-Sittiche . . . . Paar 25.—
Feuerflügel-Sittiche, fingerzahm. . . . . Paar 40.—
Schamadrosseln im Gesang Stck. 60.—
Schamaweibchen . . . Stck. 50.—
Königlanzstare . . . . Stck. 100.—
Reisfinken . . . . . Paar 5.50
Tigerfinken, halb ausgef. Paar 5.50
Paradieswitwen in Pracht Paar 8.—
Dominikaner in Pracht . Paar 8.—
Goldbrüstchen . . . . Paar 6.—
Graue Edelsänger, ohne Geschlechtsgarantie . . Paar 6.—
Schmetterlingsfinken . . Paar 3.50
Grauastrilden . . . . Paar 3.50
Orangebäckchen . . . . Paar 3.50
Rote Amaranten . . . Paar 3.50
Silberschnäbel . . . . Paar 3.50
Bandfinken . . . . . Paar 3.50
Blutschnabelweber . . . Paar 3.—
Atlasfinken, ausgefärbt . Paar 3.50
Elsterchen . . . . . Paar 4.—
Kleine handzahme Jawaspielaffchen . . . . . Stck. 70.—
Kleine und größere zahme, sehr schöne Hutäffchen Stck. 50.—
Schmuckloris, fingerzahm u. eingewöhnt . . . . Stck. 90.—
Schwarze Makake mit einem 3 Mon. alten sehr schön. Jungen . . . . . Zus. 200.—

1057] **Tierhandlung**

Max Kleinert

Berlin NO 18

Strausberger Straße 13.

Fernruf Alexander 3313.

Offeriere in ges. fehlerfr. Exemplaren:

Gelbnackenpapageien à 60.— M.
Blaustirn-Amazonen à 40.— M.
Mohrenkopfpapageien à 30.— M.
Kl. Gelbhaubenkakadus à 35.— M.
ganz zahme 45.— M.
Elfenbeinsittiche . . Paar 30.— M.
Sperlingspapageien Paar 15.— M.
Grassittiche . . . Paar 15.— M.
Büls-Büls . . . . à 13.— M.
inklusive Porto und Verpackung. [1058

Fluck, Bremen,

Knoopstr. 39.

2,1 hochfeine nordische David-Weidensprosser, tiefe schöne Rufe, Baßrollen, weichste Presse u. glockentöniger Schnapper. Nehme Grammophon in Tausch. Messing-Auszug-Fernrohr × 18 (zeigt an 150 m deutlich jede Feder), RM. 25. Neues Zeiß-Fernglas, Prismenmonocle, 4 × 20, tadellos, 25.— RM. [1059

Tarnn, Berlin N 24,
Linienstr. 131.

Graupapageien

verkaufe billig

2 hellängige à Mk. 80.—
1 schwarzängigen à Mk. 70.—
alle schon etwas sprechend, gesunde, sehr begabte Vögel. Versand Nachnahme.

Bosman, Rotterdam,
Stevenhdstr. 35. [1060

Amaranten . . . . . Paar 3.—
Astrilde . . . . . „ 3.—
Atlasfinken, ausgefärbt . „ 5.—
Webervögel, grau . . „ 2.50
Kl. Elsterchen . . . „ 4.50
Schmetterlingsfinken . „ 5.00
Tigerfinken . . . . „ 8.00
Paradieswitwen, ausgefärbt „ 8.00
Mövchen . . . . . „ 15.00
Kaktussittiche . . . „ 20.00
Gr. Wellensittiche . . „ 15.00
Kl. Java-Affen . . . Stck. 70.—
Kl. Rhesus-Affen . . . „ 60.—
Andere Vögel Preisliste.

Ernst Schöndube, Berlin,

1061] **Elisabethkirchstraße 1.**

Verkaufe:

1,1 **Silberschnäbel** à 6.—
1 **Schönbürzel** à 4.— [1062
1,1 **Tigerfink** à 6.—
ges. Tiere, in Freivoliere gehalten.

Gustav Merz, Königsberg, Ufr.

Verkaufe:

2 Paar **kalif. Schopfwachteln**, Paar 30 M. 4 Paar **Goldfasanen**, à Paar 35 M. 8 **Rebhühner**, zusammen 35 M. 15 **grüne Wellensittiche** à 3,80 M. **Brautenten**, Paar 110 M. Alles diesjährige Tiere. [1063

Schloß. Allersberg b. Nürnberg.

Suche

2,0 **Auroraastrilde**, 2,0 **Wachtelastrilde**, 1,2 **Rebhuhnastrilde**, 2,0 **mexikanische Trauerzeisige**, 1,0 **Kapuzenzeisig**, 1,0 **Yarellzeisig**, 1,0 **Magellanzeisig**, 1,0 **Schwarzbrustzeisig**, 0,1 **schwarzbäuch. Tigerfink**, 0,1 **Gouldamadine**. [1064

Walter Voigt, Jena,
Feodorastraße 13.

Kaufe

1,0 **Nymphensittich**, zuchtfähig, evtl. tausche gegen gleiches Tier. [1065
1,1 **blaue Wellensittiche**, voll befiedert, gesund u. zuchtfähig, auch einzeln.
1,2 **Lady-Amherst-Fasanen**, diesj.

E. Stümke, A. Z.-Mtgl. 258,
Vegesack (Bremen).

Abzugeben

Blaue Wellensittiche sowie 3/4 **Blaublut** von guter Abstammung, mit jeder Garantie. **J. Walter**, [1066

Nidau 58 bei Biel (Schweiz).

Junge Blaustirn-Amazone 45.—
Junge Gelbstirn-Amazone 45.—

Zoo-Frank, Hamburg 27,
Röhrendamm 40. [1067

Tausche

0,1 **Sperbergrasmücke**, aufgep.,
1 **Hausrotschwanz**, aufgepäp.,
1,0 **Dorngrasmücke**. **Suche Flammenweber** und gutes Zuchtpaar **Wellensittiche**, grün. [

E. Nürnberger, Mühlhausen i.
Hoyergasse 2.

Kaufe

Schama-, Stein-, Blau- und Sp drossel. [
H. Kirbach, Dresden-A.,
Kohlschütterstr. 3.

1,1 Rot-Kardinäle

gut eingew. gesundes Zuchtpaar, tad im Gefieder. Männchen fingerza nimmt Futter aus der Hand ohne Scheu. Preis 60.— Mark. [

A. Mertes, Mainz, Wallaustr.

Junge Blaurake,

eingewöhnt, 25.— Mark ab hier. [
G. Hartung, Grimma in Sach

Jg. Wellensittiche u. Körnerfresser à
G. Hartung, Grimma i. S. [

Offeriere in gesunden Exempla

Schamadrosseln . . Mch. 60
Schamadrosseln . . Wbch. 50
Rote Kardinäle . . Mch. 25
Graue Kardinäle . . Mch. 12
Pflaumenkopfsittich . Mch. 15
Bergpapageien . . Paar 18
Wellensittiche . . . Paar 15
Goldbauchmalien Paar 40
Kaptäubchen, . . . Paar 6
Orangeblaufinken . Paar 40
Tigerfinken . . . . Paar 8
Prachtfinken, div. . Paar 4
Lazulifinken . . . Mch. 2
Papstfinken . . . Mch. 2
Safranfinken . . . Mch. 8
Zitronfinken . . . Mch. 1
Seidenschwänze . . Mch. 1
Kanarien . . . . Wbch.
Ueber andere Arten Preisliste

W. Hiltmann, Berlin S 1
Dresdener Str. 24.

Dame,

langjährige Pflegerin von einheim Körner- und Weichfressern, erfolg Kanarien- und Kanarienbastardzüch sucht in größerem Betrieb diesbezü Stellung. Dieselbe ist auch kaufmä gebildet, hat Handelsschule besuch Praxis. Ausführliche Angebote a **L. H.** postl. **Aubstadt** (Unterfra

---

Wer in der „Gef. W inseriert hat Erfol

Inserate

für das am 20. August 192 Ausgabe gelangende Heft 3 Gef. Welt erbitten bis 15. Au

---

Nachruf!

Tieferschüttert geben wir die Sch richt, daß unser Gründungs- u Ausschußmitglied, Herr

Sebastian Engl
Schneidermeister

am 30. Juli verschieden ist.

Einer unserer Besten ist von uns gegangen; ein begeisterter Vogelh haber, ein prächtiger Mensch. Ein uns verliert auch die Städt. Tier schutzkommission ihren, mit viel Ch kenntnis ausgerüsteten Beir Schwer trifft uns dieser Verlust u wir ehren unsern lieben Tote m besten dadurch, daß wir sein In denken fortleben lassen in der Gesch des Bay. Vogelliebhabervereins

Bay. Vogelliebhaberver e. V., Sitz München.
Der Ausschuß.

Bei Anfragen und Bestellungen bitten wir, sich auf die „Gef. Welt" zu berufen

---

„KAPPEL"

Schreibmaschine

Erstklassiges Erzeugnis ∴ ∴ Strapaziermaschine

Letzte Neuerung:
Geräuschloser Wagenrücklauf

Maschinenfabrik Kappel A.-G.
Chemnitz-Kappel

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 1.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 20. August 1925 | Heft 34

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Mein Zaunkönig.

Von W. Kepp.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Der Pfleger wird oft den Umschlag aus Sorge in Freude erleben. Aber der Übergang von Sorge zu dem Gefühl einer überwältigenden Komik wird ihm seltener zuteil werden.

Dies Mal hatten wir ihn wieder. Ein anderes Mal war er wirklich fortgewesen. Die Wohnung am Ende der Stadt mit dem Blick ins freie Feld lag im dritten Stock und die Dachseiten reichten bis unter die Fenster herunter. Wo fanden wir ihn wieder? Am anderen Ende der Wohnung in der Speisekammer, deren Fenster offen stand. Nach Lage der Dinge muß er über die ganze Länge des Daches gekommen sein. Schnell machen wir das Fenster zu, aber das war kaum nötig. Er beachtet es nicht und ist eifrig beschäftigt, die Fliegen zu fangen. Wir locken ihn in die Küche, wo er fortfährt Fliegen von den Wänden zu schnappen, und dann aber den langen Flur zurück ins Vogelzimmer.

Ich ließ ihn jetzt immer frei in der Stube und in dem anstoßenden Schlafzimmer fliegen. Er gewöhnte sich nun auch, die dargebotenen Fliegen aus der Hand zu nehmen. Noch spüre ich, wie er anfliegt, leicht wie ein Federchen. Mit einem kleinen Zucken schließt er die nadelspitzen Krallen um den Finger, nimmt die Beute und fliegt wieder ab.

Höchst unbekümmert wie er war, besucht er oft die Käfige der einzeln gehaltenen Sänger, besonders wenn der Insasse seinen Freiflug machte. So liebte ers, den Haidijo zu besuchen und in dessen Wassernapf zu baden. Ich sehe noch, wie der kleine Schwarzkopf, der bei allem Temperament und Schneid kein sonderlicher Held war, seine Scheitelfedern sträubt, unruhig über den ungebetenen Besuch hin- und herhüpft und alsbald sein Haus räumt, wenn unter ihm das Spritzbad beginnt.

Eine Zeitlang hielt ich den Zaunkönig mit Goldhähnchen zusammen in einem kleinen Flugkäfig. Es gefiel ihm gut hier und er vertrug sich prächtig mit den kleinen Elfen. Ich sehe ihn noch, wie er vom Freiflug heimkehrend auf der Torfstreu saß, wie ein Huhn auf dem Nest. Seine Augen und seine Haltung schienen zu sagen: Wie ist das Leben so mühevoll.

Zur Nachtruhe drängten sich alle auf dem höchsten Tannenzweig zusammen und bildeten dort die Reihe der Federbällchen, aus der links und rechts einige Schwänzchen hervorsehen.

Die äußersten drängten gegen die mittleren, so daß diese oft den Platz mit jenen tauschen mußten. Unser Freund sicherte sich den besten Platz, indem er einfach seinen Nachbarn über den Rücken wegstieg, bis er in der Mitte ankam. Hier machten ihm die stets nachgiebigen Geschöpfchen alsbald Platz, so daß er am wärmsten saß.

Er war mit der Zeit sehr vertraut geworden und ich mußte mich allmählich bei allen Bewegungen in acht nehmen, daß ich ihn nicht unversehens verletzte. Wenn ich vom Stuhle am Schreibtisch aufstand, war er sicher schon da und saß mitten auf dem Sitz.

Er war nun ständig draußen und tauchte bald hier, bald da auf. Er schien sehr neugierig zu sein.

Ich erinnere mich, als ich einmal der Orpheus die Krallen schnitt, war er sofort bei mir auf der Schulter und hakte sich dann auf der Brust fest, um dem ungewohnten Schauspiel und dem sich sträubenden Vogel nahe zu sein.

Wenn ich die Gläser in einer etwa 10—15 cm hohen Emailleschüssel auswusch, konnte ich sicher sein, daß plötzlich sein Köpfchen über dem Schüsselrand erschien, um die auf dem Spülwasser schwimmenden Puppen zu erhaschen. Ich wehrte es ihm, aber geschadet hat's ihm nicht, wenn er eine haschte. Ich sehe ihn noch, wie er sich nach Art der Dommeln oder Pinguine ganz strack aufrichtete und es ist mir heute noch unbegreiflich, wie er sich so lang machen konnte. Aber es sah ungeheuer komisch aus.

Wenn im Juli die frischen Puppen ausblieben, so suchte ich Wiesenameisenpuppen, tat sie mit der unvermeidlichen Erde in ein Glas und teilte davon an alle aus. Für den Zaunkönig ließ ich das Glas offen stehen, und er holte sich sein Teil. Dabei gewöhnte er sich, mit der abnehmenden Futterschicht immer tiefer ins Glas zu gehen, bis er schließlich auf dem Boden angelangt war. Nun brauchte ich nur in das leere Glas ein paar Puppen, eine Fliege, eine Motte zu tun, und sofort ging er hinein.

Es sah possierlich aus, wie er sich dann alle Augenblicke aufrichtete und über den Rand des Glases

sicherte. Und so ließ er sich dann auch ohne Scheu in einem weit größeren Glase, an das ich ihn gewöhnt hatte, photographieren.

Er war so vertraut geworden, daß er sich auch den Besuchern näherte. Einen Vogelliebhaber, der öfter kam, wollte er einst genauer untersuchen, und ich sehe noch, wie er ihm unter den Rockschoß zwischen Rock und Weste eindringen wollte.

Als nun der Sommer vorbeiging, der zweite, den wir zusammen verlebt hatten, stellte ich eine kleine Tanne im Zimmer auf. Hübsch gedeckt in den unteren Zweigen hielt er seine Nachtruh. Kam ich abends heim, so leuchtete ich kurz die Nachtplätze meiner Freiflieger ab, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist.

Während die anderen meist weiterschliefen, hob er sofort sein Köpfchen, sah mich unverschlafen und ruhig an. Ich zog mich dann sofort zurück, um ihn nicht aufzustören.

Manchmal aber verpaßte er seine Schlafstelle und dann mußte ich suchen. Einmal lugte er aus einer Spalte hervor, die der zurückgezogene Vorhang gebildet hatte.

Ich ließ, um immer bereit zu sein, und um den Luftraum für die Tierchen zu vergrößern, die Tür zwischen Zimmer und Schlafzimmer offen. An der Wand über dem Bett hing ein größeres Bild mit breitem Rahmen. Und so kam das kleine Kerlchen jeden Morgen angeflogen oder besser angeburrt, setzte sich aufs Bild, knixte, schmetterte seinen Ruf und kam schließlich auf die Bettdecke. Ich nahm's als Morgengruß und Weckruf, grüßte wieder und dann flog er ab.

Das Vogelzimmer lag nach Süden, das Schlafzimmer nach Westen, also sehr günstig für meine Pfleglinge. Es wurde nun wieder Herbst, und wenn der Abend kam, wurde der Zaunkönig unruhig, flog einige Mal hin und her, vom Vogel- ins Schlafzimmer, ließ hier im Fenster angesichts der scheidenden Sonne seinen schmetternden Ruf erklingen und begab sich dann zum Schlafen in seine Tanne im Vogelzimmer.

Er hatte etwas unsagbar Rührendes für mich, dieser Abschied von der Sonne. Gewiß, ich weiß, daß es mein Gefühl war. Die scheidende Sonne, der scheidende Sommer, und die sorgende Stimmung des Pflegers: wirst du deine Lieblinge durch den Winter bringen?

Aber der Vogel ist doch Lebensorganismus wie wir. Und warum soll ihn die Veränderung, die mit der scheidenden Sonne eintritt, nicht ähnlich berühren wie uns, nur daß wir's eben als Gefühl erleben und sagen können, was wir fühlen?

Nun sollte es nicht mehr lange dauern, da schied auch unser Liebling. Es war ein schöner sonniger Sonntagmorgen. Ich war in Eile, denn zu Tisch erwartete ich meinen Vogelfreund, und da sollte bald alles in bester Ordnung sein. Zaunkönig war immer um mich und begleitete mich bei allen Hantierungen. Aus der Kiste an der Wand unterm Bört mußte ich einen neuen Schwamm holen und schob hernach die etwas schwere Kiste mit Gewalt zurück. Zaunkönig war eben noch bei mir gewesen und wie mir schien, jenseits über den Flugkäfig hinübergetürmt. Nach einer Weile vermisse ich ihn, suche ihn, finde ihn nicht. Da zuckt in mir eine Ahnung auf. Ich ziehe die Kiste hervor und richtig, an der Wand liegt er tot, sonst unbeschädigt in voller Schönheit.

Der Pfleger begreift meine Stimmung. Mich tröstete, daß er einen schnellen und schmerzlosen Tod gehabt haben muß, und daß ihm die schlimmen Altersleiden erspart waren.

Mir ist er so lebendig geblieben, daß ich sagen kann: er lebt in mir, und oft träume ich von ihm.

Ich wünsche, daß er auch in euch lebt, damit ihr die Wesen da draußen nicht nur seht und beobachtet, sondern erlebt als Wesen, die eigenartiges Leben haben und euer Gemüt mit tausendfältigem Leben erfüllen können.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Es ist auffallend, daß die buntfarbigen Tukane verhältnismäßig selten und dann meist nur vereinzelt auf den Vogelmarkt gelangen.

Das hat wohl seinen Grund in der Tatsache, daß es schwer ist, ihrer im Urwald habhaft zu werden, obgleich alle Angehörigen der Familie außerordentlich lärmende und geräuschvolle Vögel sind, und die grellen Farbengegensätze ihres Gefieders, ihre Größe und ihre bizarre Gestalt ihr Auffinden und ihre Erbeutung im Blätter- und Pflanzengewirr des Urwaldes nicht allzu schwer erscheinen läßt.

Dem ist aber nicht so. Trotz langen und aufmerksamen Beobachtens ist es schwer festzustellen, ob die gehörten Rufe einem Tukan zuzuschreiben sind. Häufig werden die Laute Arten zugelegt, denen sie nicht zukommen. Wenn man aber wirklich einmal zweifellos den Tukanruf festgestellt hat, so ist es meist schwer, den Vogel zu erkennen, wohl aber wird der Ruf zuweilen zum Auffinden der Niststätte des Tukans führen.

Wie in unseren Breiten die schlichte Gefiederfärbung unserer Vögel sie gegen Sicht schützt, so werden gerade die stark- und buntfarbigen Vögel in der Farbenpracht des Urwaldes für unser Auge schwer auffindbar. Die Üppigkeit, die Färbung, Gestalt und Größe der Blattvegetation des Urwaldes erschwert das Erkennen eines Vogels, dessen grelle leuchtende Farben wir in der Färbung der mannigfaltig gestalteten Blätter wiederfinden, die bald vom Licht durchleuchtet, das feurigste Gelb des Tukangefieders an Leuchtkraft übertreffen, bald im Schatten als dunkler Fleck erscheinen. Häufig sind die großen Blätter durchlöchert, z. B. bei der auch bei uns bekannten Schlingpflanze Dendrophyllum. Durch diese Löcher sieht man bald den als hellen Fleck erscheinenden Himmel, bald den unserem Auge ganz dunkel erscheinenden Schatten des Urwaldes, so dunkel, wie das sammetschwarze Gefieder eines Tukans. Auch die Schnäbel sind trotz ihrer auffallenden Form infolge ihrer Färbung nicht erkennbar. Alle Gefiederfarben lösen sich auf im farbenreichen Blattgewirr des Urwaldes. „Ich habe unendlich oft gesucht, um den Urheber eines heisernen Krächzens zu finden, nur um dann einmal einen großen Tukan auffliegen zu sehen von seinem Sitzplatz." Ähnliche Erfahrungen haben die meisten Forscher gemacht.

Leicht zu erkennen sind sie, wenn sie aufgebäumt auf einem unbelaubten Ast über dem Horizont sitzen. Sitzen sie ruhig im Schutze des Waldes, so schmelzen ihre Farben trotz ihrer Buntscheckigkeit mit dem Hintergrund zusammen.

Tukane bewohnen in etwa 60 Arten das tropische Mittel- und Südamerika. Sie sind Waldvögel, die offenes Gelände meiden und nur selten in der Nähe menschlicher Ansiedlungen beobachtet werden. Auf dem Boden, den sie selten aufsuchen, bewegen sie sich hüpfend wie in den Zweigen der Bäume, in denen sich die unruhigen, lebhaften Vögel gewandt auf der Nahrungssuche bewegen. Die großen Arten sieht man meist einzeln oder paarweise, die kleinen leben gesellig. Während der heißen Zeit des Tages ruhen sie im Schatten der Baumkronen. Schlafend nehmen sie eine eigenartige Stellung ein, indem sie den Schwanz senkrecht aufrichten. Ihre Stimme besteht in kurzen rauhen Tönen. Zur Nahrung dienen ihnen Früchte und auch tierische Stoffe, wahrscheinlich auch Eier und junge Vögel, welche sie aus den Nestern rauben. Der häufig gebrauchte Name „Pfefferfresser" könnte darauf hindeuten, daß sie mit Vorliebe Pfeffer verzehren. Dieser Name beruht auf einer Mitteilung Schomburgs, der von einer Art, dem Toko, berichtet, daß er zeitweise vornehmlich die Früchte der verschiedenen Arten des spanischen Pfeffers verzehre. Von andern Arten ist derartiges nicht bekannt. Tukane nisten in Baumhöhlen und legen in der Regel zwei weiße Eier.

Halsbandarassari (s. unten).

Gegen Ende des vorigen und im Laufe dieses Jahres sind einige Arten von Tukanen neu, einige seltene Arten wieder eingeführt worden. Am beliebtesten und wohl auch am häufigsten eingeführt sind die kleinen Arten der Gattung Schwarzarassari — Pteroglossus *Ill.* Ihre Färbung ist oberseits meist schwarz oder schwarzgrünlich. Das übrige Gefieder zeigt stark gegensätzliche Farben, wie gelb, rot, grün usw. Der im Verhältnis zu ihrer Körpergröße sehr große Schnabel ist kalkweiß mit allerlei farbigen, häufig schwarzen Abzeichen. Der Schwanz ist ziemlich lang und stufig.

Die Arassaris streifen in größeren oder kleineren Flügen einander lockend umher. Die stark entwickelten Füße zeigen, daß sie geschickte Kletterer sind. Munter hüpfend und springend durchstreifen sie die Baumkronen, die großen krummen Schnäbel stets in entgegengesetzter Richtung hebend und senkend, wie den außerordentlich lebhaft bewegten, stufigen Schwanz, in dessen Gebrauch sie alle anderen Gattungen der Tukane übertreffen. Ihre rauhen wenig angenehmen Rufe ähneln denen der Häher, aber sie sind lauter und mehr in die Länge gezogen. Sie gleichen einem lauten, rasselnden und kehlenden „squak". Bei den Jägern sind sie, wie die Häher, wenig beliebt, weil sie jede auffallende Erscheinung, also auch den Jäger, durch ihre unaufhörlich ausgestoßenen Schreie und Rufe den anderen gefiederten Bewohnern des Waldes melden und besonders die, denen sich der Jäger sehr vorsichtig nähern muß, zur rechtzeitigen Flucht veranlassen.

Trotzdem man in solchen Augenblicken die Arassaris deutlich sieht, sind sie doch im nächsten Augenblick dem Auge entschwunden. Vermutlich haben sie, wie alle anderen Tukane, die Fähigkeit, schnell und geräuschlos zu verschwinden, sobald die ihnen eigene Neugierde befriedigt ist oder sie Unheil wittern. Ihre Fähigkeit, weite Sprünge von Ast zu Ast mit angelegten Flügeln auszuführen, macht ihnen das plötzliche Verschwinden leicht, zumal ja schon die Eigenart ihres Aufenthaltsgebietes sie gegen Sicht schützt.

Der von Fockelmann-Gr.-Borstel gegen Ende des Jahres 1924 eingeführte

Halsbandarassari — Pteroglossus torquatus (*Gm.*)

ist, soweit feststellbar, der erste Vogel dieser Art, der nach Deutschland gelangte. Im Zoolog.-Garten zu London war er schon 1870 vorhanden. Seine

Verbreitung erstreckt sich über Südmexiko südlich bis Kolumbien und Venezuela. Er soll besonders heiße Gegenden bevorzugen (s. Abb. S. 395).

Gefiederbeschreibung: ♂ Kopf, Hals glänzendschwarz, Nackenband kastanienbraun; Hinterrücken, Bürzel, Oberschwanzdecken rot; übriger Rücken, Flügel, Schwanzfedern grünschwarz; unterseits hellgelb mit Rot gemischt; schwarzer Brustfleck; über den Bauch eine mit Rot gemischte schwarze Binde; Schenkel braun, Auge gelb, nackte Augengegend vorn blaugrau, hinten rot; Schnabel kalkweiß, am Grunde ein blaßroter Fleck; Firste und Spitze schwarz; Unterschnabel schwarz mit schmaler, weißer Binde am Grunde; Lg. 360 mm, Fl. 55, Schw. 60. ♀ etwas kleiner; Schnabel kürzer; Spitze weniger herabgebogen, dunkler Firststreif schmaler.

Ähnlich wie mit der Araſſaris verhält es sich mit den Tukanen der Gattung „Kurzschnabeltukan" — Selenidera *J. Gd.*, von denen ein Stück im Vogelhaus des Zoologischen Gartens zu Hamburg vorhanden war, und zwar der

Zwergaraſſari — Selenidera gouldi (*Natt.*)

aus Unteramazonien. Die Gattung unterscheidet sich von der Gattung Pteroglossus hauptsächlich durch den kürzeren Schnabel und durch die geringere Länge des stufigen Schwanzes, der kürzer ist als der Flügel. Man kennt 7 Arten. Die Geschlechter sind bei den Arten dieser Gattung, abweichend von anderen Tukanen, verschieden gefärbt. Der häufig eingeführte Fleckenaraſſari — S. maculirostris (*Lcht.*) aus Südostbrasilien hat bereits in der Gefangenschaft in einer Nisthöhle genistet, ohne die Jungen aufzuziehen. (Qiseaux 1925. II). Über das Frei- wie über das Gefangenenleben des das Erstemal eingeführten Zwergtukans liegen Nachrichten nicht vor.

Gefiederbeschreibung: ♂ oberseits dunkel olivgrün, Kopf schwarz, dahinter gelbes Nackenband; über die Kopfseiten ein breites orangefarbenes, nach hinten gelbwerdendes Band; Unterseits schwarz, hinterer Teil des Bauches grünlich; Flanken orange; Schenkel kastanienbraun, After scharlachrot; Schwanzspitzen kastanienbraun; Schnabel milchweiß mit schwarzer Zeichnung. Lg. 130, Fl. 52, Schw. 45, Schn. 25 mm.

Eine weitere neueingeführte Tukanform ist der auf S. 399 abgebildete

Lauchgrüne Araſſari — Anlacorhynchus prasinus (*Lcht.*)

von dem zurzeit ein sehr zahmes Stück im Vogelhaus des Berliner Zoolog. Gartens untergebracht ist. Die Gattung Grünaraſſari — Anlacorhynchus *I. Gd.* umfaßt 15 Arten. Der bei den Arten dieser Gattung sehr verschieden lange Schnabel hat bald glatte, bald mit Kielen und Furchen versehene Schnabelseiten, der gestufte Schwanz ist etwa ebenso lang wie die Flügel, die Färbung ist vorherrschend grasgrün.

Die Grünaraſſaris sind in manchen Gegenden häufig vorkommende Tukane. Es wäre aber vergebliche Mühe, diese grüngefiederten Vögel ruhig sitzend im Laube zu suchen. Nur wenn sie in Bewegung sind, kann man sie sichten. Ihre Stimme gleicht einem nicht allzulauten Gebrumme, das ein Beobachter treffend vergleicht mit dem Geräusch, das entsteht, wenn ein Stück Öltuch langsam durchrissen wird.

Der lauchgrüne Araſſari lebt in Südmexiko, Guatemala und Honduras.

Gefiederfärbung: Oberseits grün, Schwanz braun überlaufen und alle Federn mit breiten kastanienbraunen Spitzen; unterseits leuchtender grün; Kehle weiß, Flanken trüb gelblich; Steiß kastanienbraun; Oberschnabel hellgelb; Fleck am Grunde und schmale Linie auf den Seiten braun oder schwarz; Unterschnabel schwarz; Lg. 140, Fl. 52, Schw. 52, Schn. 30 mm.

Die größten Angehörigen der Familie Pfefferfresser gehören der Gattung Tukan — Ramphastos *L.* an. Man kennt etwa 14 Arten. Der sehr große an eine große Hummerschere erinnernde Schnabel hat eine scharfkantige Firste, die nur an der Wurzel abgerundet oder flach ist. Die Schnabelfärbung ist außerordentlich bunt. Man findet auf dem Schnabel Zeichnungen und Farbenflecke in Schwarz, Weiß, Gelb, Rot, Orange, Blau und Grün. Das Gefieder ist hauptsächlich schwarz, Kehle und Brust meist weiß oder gelb, und an der Schwanzwurzel kleinere Stellen roten, weißen oder gelben Gefieders.

Von den 14 bekannten Arten sind bisher 10 Arten lebend nach Europa gelangt. Es handelt sich bei diesen wohl ausschließlich um aus den Nestern genommene und von den Eingeborenen aufgefütterte Vögel. Es ist schon oben erwähnt, daß die großen Tukane von den Eingeborenen vielfach in Gefangenschaft gehalten werden, und daß auch alle in jenen Gegenden forschenden Reisenden gefangene und zahme Tukane als Gesellschafter hielten und von ihnen mancherlei zu erzählen wissen. Schon Alexander von Humboldt berichtet von zahmen Tukanen, unter andern auch, daß die Mönche behaupten, der Tukan mache das Zeichen des Kreuzes über dem Wasser, und diese Meinung sei zum Volksglauben geworden, so daß die Kreolen dem Tukan den sonderbaren Namen „Dios te de" (Gott gebe es) beigelegt haben. Tschudi und andere wiesen schon darauf hin, daß der Name „Dios te de" oder „Dios te ve" (Gott sehe es) eine freie Umschreibung des Tukanrufes sei, die den Rhythmus und den allgemeinen Charakter des Rufes gut wiedergebe. Der Ruf ist laut und rauh und klingt etwa wie „tios-to-to-or, tios-to-to-to."

Der

Arieltukan — Ramphastos ariel *Vig.*,

den Fockelmann 1924 einführte, gehört zu den seltener nach Europa gebrachten Arten (Abb. s. S. 400). Er lebt im Waldgebiet Ostbrasiliens. Nach Burmeister (Bericht vom Jahre 1854) traf man ihn schon in der Nähe von Rio de Janeiro. In Neufreiburg sah B. viele Arieltukane, unter anderen auch einen, der mit Kartoffeln, Mandiok und Bataten gefüttert wurde. Er berichtet auch, daß die Indianer diesem Vogel eifrig nachstellen, sowohl seines wohlschmeckenden Fleisches wegen, wie auch wegen der mit schönen gelben Federn besetzten Haut der Kehle.

Gefiederbeschreibung: Schwarz; Ober- und Unterschwanzdecken rot; Kehle orange, blaßgelb umsäumt; Auge bläulich, nackte Augenumgebung dunkelrot; Schnabel schwarz, am Grunde breit gelb, flacher Grund der Firste hellblaugrau; Füße blaugrau. Lg. 440—480, Fl. 175—180, Schw. 150—160 mm.

(Fortsetzung folgt.)

Meine Körnerfresser.

Erinnerungen aus einem mehr als 50jährigen Vogelliebhaberleben.

(Nachdruck verboten.)

An einem herrlichen Frühlingstag wandere ich durch die in voller Blütenpracht stehenden Schrebergärten dicht vor den Toren der Großstadt.

Kirschen-, Birnen-, Pflaumen- und Apfelbäume zeigen sich in ihrer schönsten Pracht. Von allen Seiten her ertönt Vogelgesang. Am hellsten schmettern die Buchfinken ihren vollen Schlag dazwischen. Da tauchen plötzlich zwei solcher Gesellen vor mir auf, sie raufen beide wie echte Strauchritter. Jedenfalls ist einer dem andern in sein Revier geraten, und da gibt's kein Verzeihen. Wütend hacken sie aufeinander los, es ist wie eine lustige, schallende Turnei. Die harten und gestählten Schnäbel der beiden Kämpen knappen hell gegeneinander, wenn sie sich an dem gewölbten Harnisch ihrer Brust oder am Helme ihrer Scheitel versuchen, so daß der Schlag der Flügel mit ihrem glänzenden Wappenfelde bei dem aufwirbelnden, echt finkenmäßigen Luftkampfe laut erschallt, wie einst die dröhnenden Schilde der längst vergangenen Heldengeschlechter in Stahl und Eisen. Bald kämpfen sie an der Erde, dicht vor mir auf dem Wege, bald auf dem niedrigen Gartenzaun, bald in den nächsten Obstbäumen. Ab und zu tritt eine kurze Ruhepause ein, dann stürmen sie wieder aufeinander los. Schon glaubte ich einen der Kämpfer, der ein junger Hahn zu sein schien, aus dem Felde geschlagen; denn er flüchtete sich in die nächsten Gärten, und der Standfink schmetterte laut und kräftig seinen Schlag in die Natur hinaus. Aber nochmals tauchte der Eindringling auf, und der Kampf begann aufs neue, es war jedoch der Endspurt. Die Ermattung des jüngeren Kämpfers ist doch zu groß, er unterliegt, verfolgt von dem Sieger. Nach einer Weile höre ich, der ich still auf meinem Platz stehen blieb, beide schlagen. Sie werden wohl künftig einander aus dem Wege gehen, da sie ihre Stärke kennen. Mich aber führte der Finkenkampf weit in die schöne, selige Jugendzeit zurück und Bilder längst vergangener Vogeltage tauchen vor meinen geistigen Augen auf: alle jene Bilder und Freuden, die mir die Vogelliebhaberei in einem Zeitraum von mehr als 50 Jahren brachte. Ist auch der Körper alt geworden, die Liebe zu unsern einheimischen Waldvögeln lebt noch wie immer in meinem Herzen, und meine Vogelschar: Hänfling, Stieglitz, Zeisig und Buchfink neben einigen Weichfressern hält dieselbe wach. Heute will ich meine Erfahrungen über die genannten Körnerfresser niederschreiben: zu meiner Erbauung, aber auch hoffentlich zur Freude und Nacheiferung vieler Vogelliebhaber! Denn die heutigen verfahrenen Verhältnisse unseres gesamten gesellschaftlichen Lebens bringen wohl viele treue Menschen wieder mehr, so wie früher, in ihr geistiges Leben und in einfachere Genüsse zurück, zu denen in erster Linie doch die Freude an der Natur und damit zu den lieben Sängern in der Vogelwelt, die uns die Natur in die Stube zaubern, gehört. Die ersten Anfänge meiner Vogelliebhaberei gehen weit in meine Jugendzeit zurück. Mein Heimatsort, eine kleine Stadt am Mittellauf der Elbe, hatte eine herrliche Umgebung, namentlich in bezug auf die Vogelwelt. Das hochgelegene Elbufer war mit vielem Buschwerk und Bäumen bedeckt, und Hänflinge, Stieglitze und Buchfinken trieben da ihr lustiges Wesen. Zeisige gab es nicht. Von den Einwohnern wurden besonders Hänflinge und Stieglitze im Käfig gehalten. Meistens nahm man diese jung aus dem Neste, fütterte sie mit dem Gänsekiel auf oder steckte sie in ein Bauer und ließ sie von den Alten großfüttern. Letzteres glückte bei Hänflingen immer, bei Stieglitzen seltener. Ich war etwa zehn Jahre alt, als die Liebhaberei in mir erwachte. Meine beiden Onkel, Besitzer einer Windmühle, waren eifrige Verehrer des Hänflings. Um den Mühlberg zog sich eine dichte Dornhecke, in der jährlich mehrere Paare von diesem nisteten. Für sie gab es keine besseren Singvögel wie den „rogen Hämpling". Sie ließen entweder ein Nest voll von den Alten auffüttern oder fingen im Winter bei hohem Schnee unter dem Sieb, das von der Mühle aus mit einer Schnur zugezogen wurde, einen alten roten Hänfling. Auch Stieglitze erbeuteten sie öfter in dieser Weise. Bei dieser Gelegenheit möchte ich gleich bemerken, daß der Hänfling damals in vielen Familien meiner Heimat zu finden war und als der beste Sänger

Zwerg-Araffari (s. S. 396).

galt, weil Drosseln (Schwarz- und Singdrosseln) dort noch nicht heimisch waren, sie waren noch echte Waldbewohner, der Wald aber in meiner Heimat fehlte. Grasmücken — namentlich Schwarzplatten gab es zahlreich — wurden nicht gehalten; nur Rotkehlchen, die zum Fliegenfangen im Hochsommer und Herbste in die Stuben gebracht wurden; Kanarienvögel waren zu der Zeit, in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, verhältnismäßig noch selten, ihre Zucht war bei weitem nicht so verbreitet wie jetzt oder etwa 20 Jahre später. Der Stubenvogel des einfachen Mannes war besonders der Hänfling. Einer unserer Nachbarn, ein Schuhmacher, hatte stets einen oder mehrere in Bauern. Er war besonderer Virtuose darin, sie mit dem Munde zum Nachpfeifen von Liedern anzulernen. Er war im ganzen Städtchen der „Vogelnarr" und wurde damit gehänselt, indem man ihn fragte: „Pesenecker, wat moakt dänn sien Hämpling"? Antwort: „He sitt still und wunnert sich". In dieser Umgebung also wurde meine Vogelliebhaberei geboren, zu dem Nachbar-Schuster ging ich fast täglich, und mein einziger Gedanke war auf den Besitz eines Hänflings gerichtet. Zu meinem 12. Geburtstage schenkte mir ein Onkel einen solchen. Da ich einen Käfig nicht besaß — solchen verfertigten sich die Liebhaber damals noch meistens aus Holz selbst —, so machte ich mich an die Anfertigung. Da mein Vater eine Tischlerwerkstatt besaß und ich schon eine gewisse Fertigkeit in Holzarbeiten hatte, machte dies keine großen Schwierigkeiten, ein Harzerbauerchen der Form nach, nur etwas größer, war bald der Erfolg. Später habe ich noch zahlreiche solcher Vogelbauer selbst gebaut, ja sogar Drahtkäfige mit Holzuntersatz arbeitete ich, und ich finde noch heute, daß ein Waldvogel eigentlich in ein feines Drahtbauer mit Glasscheiben usw. nicht recht hineinpaßt, deshalb sind die Vogelbauerfabriken in den letzten 10—20 Jahren wieder zum Bauer mit Holzgestell und eingezogenen Drahtstäben zurückgekehrt. Für denjenigen, der Gelegenheit und Geschick zum Selbsterbauen von Käfigen hat, macht es doppelte Freude, seine Vögel in „eigenen Häusern" zu haben. Meistens strich ich meine Vogelbauer mit hellgrüner Zinnoberfarbe an, und hierin befinden sich die Vögel am wohlsten, weil so die Natur um sie herumgezaubert wird. Sehr zweckmäßig sind nach meinen Erfahrungen die Kistenkäfige, die nur vorn ein Gitter haben. Der Vogel sitzt darin viel ungestörter wie im offenen Drahtkäfig, der Gesang schallt aus demselben gesammelter heraus, und die Stube wird aus dem Kistenkäfig heraus lange nicht so beschmutzt durch umhergeschleudertes Futter wie aus dem offenen Käfig — ein gewichtiges Bedenken der reinlichen Hausfrau gegen die Vogelhaltung des Hausherrn fällt damit fort. Meinen ersten Hänfling besaß ich also nun, und welche Freude hat er mir bereitet! Noch heute gedenke ich mit einer gewissen Wehmut dieser Zeiten und des Glücksgefühls, das mich beim Besitz desselben erfaßte. Wer von den Lesern eine glückliche Kindheit durchlebt hat, wird mit mir empfinden und gern an die rosenfarbenen Erscheinungen aus derselben zurückdenken; denn die Eindrücke, die man damals empfangen hat, sind tief ins Innere eingedrungen, und noch in späten Jahren geht die Erinneruug auf sie zurück und wiederholt sie. Unvergeßlich sind besonders die Erlebnisse, welche mit der freien Natur, mit ihren uns teuren Geschöpfen in Verbindung stehen. Die Gegenstände, die damals mit geheimnisvollem Entzücken unsere Zuneigung weckten, tauchen im Alter vor unseren Blicken freundlich grüßend, wie liebe alte Bekannte, auf und laden uns zuweilen zur Rast mitten in unserm Streben nach ernsteren Dingen und Zielen ein.

(Fortsetzung folgt.)

Die Bedeutung der Vogelschau.

Albin Pollmer, Aue i. Erzgeb.

(Nachdruck verboten.)

Unsere Stubenvogelliebhaberei ist in Gefahr. Was besser Unterrichtete schon längst vorausgesehen und befürchtet haben, dürfte, wenn nicht alle Zeichen trügen, in nicht allzuferner Zeit eintreten. Ist man doch stark dabei, unsere von unseren Vätern ererbte Liebhaberei systematisch zu unterdrücken. Unter Inanspruchnahme der Presse versucht man die breite Öffentlichkeit zu beeinflussen; fühlen sich doch jetzt schon obskure Provinzblättchen dazu berufen, uns Liebhaber für die Abnahme verschiedener Vogelarten verantwortlich zu machen. Aller Augen sind zurzeit auf das zur Beratung stehende Vogelschutzgesetz gerichtet. Aber bedenken wir, daß die Regierung durchaus nicht den umständlichen Apparat der Gesetzesmaschinerie in Bewegung zu setzen braucht, hat sie es doch nur nötig, Naturnotschutzverordnungen zu erlassen, um unsere Liebhaberei zu Grabe zu tragen. In dieser kritischen Lage dürfen wir nicht länger beiseite stehen, sondern müssen den uns aufgezwungenen Kampf aufnehmen, und es ist moralische Pflicht eines jeden organisierten Vogelliebhabers, durch Wort, Schrift und Bild das Laienpublikum in unserem Sinne aufzuklären und für unsere Liebhaberei zu interessieren. Was könnte da wohl geeigneter sein als unsere alljährlich veranstalteten Ausstellungen, die uns die Möglichkeit bieten, die Bestrebungen und Ziele unserer Liebhaberei, die jedem Vogelpfleger Herzenssache geworden ist, agitatorisch auszuwerten. Unwillkürlich erinnere ich mich der Eindrücke, die ich von den Ausstellungen in Leipzig und Zwickau gewonnen habe. Diese Veranstaltungen, insbesondere die des Leipziger Vereins, waren dazu angetan, an die Seele des Besuchers zu appellieren. Die Hingabe und Liebe zur Natur und ihren Geschöpfen, die sich hier in mustergültiger Weise offenbarte, dürfte jeden, auch den fanatischen Gegner unserer Liebhaberei, bei einiger Objektivität von dem erzieherischen und ethischen Wert unserer Stubenvogelpflege überzeugt haben. Wieviel Mühe verursachen die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, eine Ausstellung auf eine derartige Höhe zu bringen, so daß sie jeder Kritik standhält, und den Beweis zu erbringen, wie unsere Stubenvogelliebhaberei im Volksgemüt verankert ist. Es sei mir hier gestattet, eine Betrachtung über die im Erzgebirge getätigten Ausstellungen zu geben. Ich muß feststellen, daß von jedem der dem „Bezirksverband Erzgebirge" angeschlossenen Vereine der Wille, den gegebenen Verhältnissen Rechnung zu tragen, offensichtlich zutage

getreten ist, wenn auch in noch sehr bescheidenen Formen. Es wäre aber eine Überhebung, wollte man behaupten, daß diese Ausstellungen in der Lage gewesen wären, unsere Daseinsberechtigung zu erweisen. Wollen wir unseren Zielen näherkommen, dann müssen wir Erzgebirgler bestrebt sein, unseren Lieblingen die größtmöglichste Bewegungsfreiheit in ihren Käfigen zu bieten, indem wir ihnen vorschriftsmäßige Käfige als Wohnung geben. Wir wissen, wie die zurzeit bestehende Wohnungsnot den einen oder den andern mehr oder weniger unangenehm berührt hat. Ein ähnliches Los von Wohnungsnot dürfen wir auf keinen Fall unseren Lieblingen zuteil werden lassen, wenn wir gute Vogelwirte sein wollen. Ich höre schon wieder den Einwurf: die Vögel fühlen sich auch in kleinen Käfigen wohl, oder: sie singen nicht intensiver in großen Käfigen. Das ist eine lendenlahme Rechtfertigung. Der Vogel soll uns nicht nur etwas geben, er hat auch etwas zu verlangen. Eine derartige Handlungsweise ist eines echten Vogelliebhabers unwürdig, gleichzeitig aber geben wir durch eine derartige Käfigung unseren Gegnern billiges Angriffsmaterial gegen unsere Liebhaberei in die Hände. Wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Ich weise Euch den Weg, der zum Ziele führt. Das ist die Unterbringung der Vögel in Käfigen, wie sie der Reichsverband vorgeschrieben hat.

Eine weitere Krankheit, die bei uns im Erzgebirge bereits chronischen Charakter angenommen hat, sind die mit den Ausstellungen verbundenen Prämiierungen mit Haushaltungsgegenständen. Abgesehen davon, daß jeder Vereinsleitung diese Arbeit — Beschaffung und Verteilung der Preise — erspart bliebe, so bringt auch die Preisverteilung am Ende der Veranstaltung noch manche unangenehme Überraschung, die dem Wesen unserer Liebhaberei auf keinen Fall entspricht. Es ist nicht meine Absicht, hier zum Ausdruck zu bringen, daß ich Gegner jeder Prämiierung bin, aber eine Preisurkunde wird die Bedürfnisse eines jeden von Idealismus getragenen Liebhabers voll und ganz befriedigen, und gleichzeitig würden dadurch die unschönen Nebenerscheinungen beseitigt. Fernerhin muß sich jede Vereinsleitung angelegen sein lassen, daß die Ausstellungen nicht um ihrer selbst willen, sondern nur um die Daseinsberechtigung unserer Liebhaberei zu beweisen, veranstaltet werden. Es ist ein Gebot der Stunde, gleichzeitig aber eine dringende Notwendigkeit in anbetracht der Bekämpfung, der wir ausgesetzt sind, daß wir unsere Vogelschauen unseren Tendenzen entsprechend organisieren, um den Beweis zu erbringen, hier ist tiefgründige Hingabe und Liebe zur Natur und ihren Geschöpfen vorhanden.

Lauchgrüner Arassari (s. S. 396).

Verschiedenes über den Kirschkernbeißer

(Coccothraustes coccothraustes *Linné*).

Von Wilhelm Schreitmüller-Frankfurt a. M.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Nie sah ich diese Vögel sich spielend oder jagend umhertreiben oder sonst wie belustigen; immer ist diesen Tieren der gleiche ernste, — ich möchte fast sagen „wehmütige Ausdruck" eigen. Es ist vielleicht möglich, daß ich mich täusche, doch wird mir wohl jeder Liebhaber, welcher diese Vögel schon gehalten hat, beipflichten, daß der gefangen gehaltene Kernbeißer stets ein melancholisches, fast traurig anmutendes Benehmen zeigt, was vielleicht noch dadurch stärker in Erscheinung tritt, weil diese Art wenig beweglich, ziemlich phlegmatisch und mehr zurückhaltend ist als andere lebhafte Finkenvögel.

Ich habe bei dieser Art (im Käfig) auch nie gegenseitige Annäherungsversuche oder auf etwaige Brutgelüste hinweisende Wahrnehmungen gemacht und ich glaube deshalb kaum, daß sich der Kernbeißer zur Zucht im Käfig eignet, was vielleicht in einer geräumigen Freilandvoliere mit Strauch- und Baumbepflanzung doch möglich ist.

Trotz der Wehrhaftigkeit und des robusten Aussehens dieser Vögel habe ich nie beobachtet, daß sie sich gebissen oder gegenseitig verfolgt hätten. Auch zwei Feldsperlinge, welche ich ihnen vorübergehend beigesellte, blieben unangetastet. Die Kernbeißer nahmen alsolut keine Notiz von ihnen. Nicht einmal das Umherflattern dieser Tiere (Sperlinge) während der ersten Tage brachte die phlegmatischen Kernbeißer aus ihrer stoischen Ruhe. Trotzdem die Sperlinge öfter an sie anrannten, resp. -flogen, zuckten sie kaum, sie blieben stets unbeweglich wie Bronzefiguren auf ihren Sitzästen hocken, ohne auch nur den Schnabel aufzutun. Nur wenn sich die Sperlinge dem Futternapf näherten, sobald die Kernbeißer daran saßen, wurden sie von letzteren verjagt.

Ich habe in späteren Jahren noch einige (einzelne) Kernbeißer (vorübergehend) gepflegt, deren Benehmen sich in nichts von dem der beschriebenen Vögel unterschied.

Zum Halten im kleinen Einzelkäfig eignet sich dieser Vogel nicht. Infolge Mangels an ausreichender Bewegung verfettet das Tier hierin sehr bald, wozu noch kommt, daß es ein starker phlegmatischer Fresser (wie der Seidenschwanz) ist, dessen angeborene Beschaulichkeit und Freßsucht nur dazu beitragen, daß das Tier in Gefangenschaft ständig fetter und fauler wird, wodurch ihm ein allzulanges Leben daselbst nicht ermöglicht wird.

Arieltukan (s. S. 396).

Ich möchte noch erwähnen, daß ich diesen Vögeln öfter auch Kerne von gekochten Kirschen und Pflaumen bot, die aber nie angerührt wurden, was mich um so mehr wundert, da Herr J. Batscha-Haniowitz (Mähren) in Heft 4 der „Mitteilungen über die Vogelwelt" 1922 S. 161 über einen Kernbeißer wie folgt berichtet:

....„Im vergangenen Winter brannten wir Sliwowitz (Schnaps). Die ausgezogenen Pflaumenreste wurden aus dem Brennkessel auf dem Hofe ausgeschüttet und es bildete sich hier ein Tümpel, der nicht zufror, da der heiße Brennkessel alle $1^1/_2$

Saatkrähen.

Stunde entleert wurde. Diese Stelle wurde täglich von einem Kirschkernbeißer aufgesucht, der stundenlang sorglos die vielen Pflaumenkerne aufknackte und sich nicht stören ließ, wenn ich mich ihm auch bis auf 2 m näherte". —

Von anderen Liebhabern habe ich dagegen gehört, daß deren Kernbeißer — ebenso wie meine — Kerne von gekochten Früchten stets verschmähten. Im Falle des Herrn B. dürfte der Vogel wohl infolge Nahrungsmangels (da Winter) an die ausgekochten Pflaumenkerne gegangen sein.

Hier anschließend möchte ich noch auf das sonderbare Benehmen eines Kernbeißers hinweisen, über welches Herr Lehrer K. G. Hermann-Leonbronn in Heft 1/3 der „Mitteilungen über die Vogelwelt" 1922 S. 70 wie folgt berichtet:

...„Der Bauer J. Schüle von Ochsenburg (10 Minuten von hier) befand sich am 11. II. 22 mit seinem Fuhrwerk auf dem Felde am Waldrand. Da kam plötzlich ein Vogel wie ein Pfeil aus der Luft herabgeschossen und setzte sich seinem Jungen auf die Mütze. Der wollte ihn abschütteln, aber der Vogel ging nicht weg. Der Bauer ergriff ihn daher mit der Hand und setzte ihn auf den Wagen und schlug den Zipfel einer Viehdecke über ihn. Der Kernbeißer, — um einen solchen handelte es sich nämlich, — dachte gar nicht ans Durchgehen, sondern ließ sich ruhig nach Hause fahren, wo er mit Vorliebe Hanf annahm, während er Kirschkerne von gekochten Dörrkirschen nicht anrührte*).

Nach 14 Tagen ging er ein; er sei zuletzt recht „schnaufig"**) geworden. Ich habe 2 mal mit dem Manne über die Sache gesprochen, weil mir das sonderbare Einfangen nicht recht glaubhaft erschien, aber jedesmal gab er beinahe wörtlich dieselbe Schilderung des Vorganges." —

*) Also auch dieser Vogel nahm gekochte Kerne nicht an. Der Verf.

**) zahm (?) der Verf.

Zusatz des Verfassers. Es kann sich in diesem Falle wohl nur um einen durch Hunger und Kälte ermatteten oder erkrankten Vogel gehandelt haben, denn wer den scheuen, schlauen und vorsichtigen Kernbeißer genau kennt, wird zugeben müssen, daß dieser Vogel sich nicht so mir nichts, dir nichts in Gefahr begibt und sich fangen läßt. Evtl. handelte es sich auch um einen, aus der Gefangenschaft entwichenen, zahmen Vogel, der durch Hunger und Kälte dermaßen ermattet und entkräftigt war, daß er sich — unfreiwillig — irgendwo niederlassen mußte und nicht mehr im Stande war zu entfliehen, als man ihn ergriff; anders kann ich mir den Fall nicht erklären. Zum Schluß möchte ich noch darauf hinweisen, daß man nestjunge Kernbeißer sehr leicht mit einem Gemisch von gehacktem, gekochtem Ei und Ameisenpuppen aufziehen kann. Die Vögel werden dann äußerst zahm und zutraulich und machen, wenn man sie im großen Gelaß freifliegen lassen kann, durch ihr plumpes, töpelhaftes Wesen doch Spaß. In Zimmern, in welchen man seltene Topfpflanzen hält, darf man sie jedoch nicht unterbringen, weil sie letztere oft arg zerbeißen und ruinieren.

Verschiedentlich sind aber bisher Kreuzungen mit Kernbeißern u. a. Vögeln gelungen. So berichtet beispielweise Herr Ulysse Haldy in Nyon (Schweiz) in Heft 1 der „Mitt. üb. d. Vogelwelt" 1923, S. 22, über eine gelungene Kreuzung von Kirschkernbeißer ♀ × roter Kardinal ♂ (aus Nordamerika) wie folgt:

...„Mein schönster Erfolg war aber eine gelungene Paarung zwischen einem ♂ des roten Kardinals und einem ♀ des Kirschkernbeißers. Die Vögel nisteten in einer großen Dachvoliere auf einem großen Zedernzweig, den ich mit noch anderen Zweigen in Wasser mit gelöschtem Kalk eingesetzt hatte; die Äste halten sich dann 6 Monate frisch und treiben sogar. Als Nistmaterial reichte ich allerlei Wurzelfasern, Heuhalme, Moos, Wolle und Tannenbart, aber nicht Watte, die die Weibchen auf den Eiern schwitzen macht. Von den fünf Eiern erwiesen sich drei als befruchtet und lieferten 1 ♂ und 2 ♀♀. Alle kamen glücklich auf und sind sehr schön gefärbt. Das Männchen ist kreuzschnabelrot mit himmelblauen, schwarz geränderten Schwungfedern; der Schwanz besteht aus roten und weißen Federn, ein Halsband, die Kehle und Schnabelwurzelgegend ist rosenrot, die Beine trübrötlich, der Vogel bringt einen sehr hübschen amselartigen Gesang zum Vortrag." —

Ein anderer Vogelliebhaber erzielte eine Kreuzung von Kirschkernbeißer ♂ × Gimpel ♀; die fünf befruchteten Eier verunglückten jedoch leider infolge eines Unfalles." —

Unter diesen Verhältnissen dürfte es also auch möglich sein, den Kernbeißer in geeigneten, großen Freilandvolieren zur Fortpflanzung zu bringen, wenn solche entsprechend mit Büschen, Sträuchern und Bäumen bepflanzt sind.

Meine Krähen.

Von J. Stöß.

(Nachdruck verboten.)

Es handelt sich um heurige Saatkrähen. Nur um Krähen! Was sollen diese Neues bieten! wird mancher Leser verächtlich denken. Da aber auch in der vorliegenden Zeitschrift des öfteren betont worden ist, daß keine Beobachtung auf naturwissenschaftlichem Gebiete der Druckerschwärze zu gering ist, und da die Krähe immerhin ein — Singvogel ist, der aus verschiedenen Gründen nicht allzu häufig gekäfigt wird, so will ich die Mühe nicht scheuen, meine allerdings nur wenige Wochen umfassenden Beobachtungen bei der Aufzucht dieser Jungvögel niederzulegen.

Ein Krähengeschwisterpaar kam Anfang Juni lf. J. in meine Hände. Vier Stück Jungtiere waren in anscheinend noch recht zartem Alter von einem

Rotbrauner Weber.

Jagdbeflissenen, besorgt um die Häschen seines gnädigen Jagdherrn, aber nicht allzusehr beschwert mit naturwissenschaftlichen Kenntnissen, wie wir aus dem folgenden ersehen werden, ausgehoben worden. Als ich Gelegenheit fand, dieselben zu besichtigen, hatten bereits zwei Stück davon das Zeitliche gesegnet, und die beiden überlebenden fristeten mindestens seit vierzehn Tagen in einem dunkeln Kaninchenställchen bei in Wasser aufgeweichtem Brote ihr Dasein. In welchem Zustande sich bei dieser unausreichenden Ernährung die beiden Schwarzröcke befanden, kann sich der nur einigermaßen Denkende vorstellen. Schwarzröcke habe ich diese meine zukünftigen Pfleglinge genannt, aber dies beinahe mit Unrecht, denn sie waren noch ziemlich nackt. Mein erstes war natürlich, Anweisungen über eine einigermaßen naturgemäße Ernährung zu geben, sollten die zwei Unglückswürmer nicht über kurz oder lang ihren beiden ja bereits abgefahrenen Geschwistern in die ewigen, besseren Jagdgründe nachfolgen.

Aber siehe da! Ohne daß ich auch nur das geringste Verlangen nach diesen verkümmerten Ge-

schöpfen geäußert hatte, waren dieselben bereits am nächsten Tage bei meiner Rückkehr vom Dienste per Eilboten in meinen Besitz gelangt. Ich kann offen gestehen, daß diesmal meine Freude ob des auch noch so billigen Erwerbs meiner neuesten Schützlinge wegen ihres trostlosen Zustandes nicht allzu groß war. Das eine, größere Tierchen konnte sich nur mühsam auf den Beinen erhalten, und das noch schwächere blieb vor Entkräftung liegen, wo es hingelegt wurde. Ich machte den Krähen nun ein Lager aus Stroh zurecht, so, daß sie nach Möglichkeit, auf die natürlich bis auf weiteres keine Aussicht war, jederzeit freien Auslauf auf meinen bescheidenen Hühnerhof hatten. Nun ans Füttern! Sperren taten die Tierchen unter Gäk-gäk-Rufen, die der noch in meinem Besitz befindlichen Krähe auch ihren Namen eingebracht haben, wohl schon aus Hunger gut, und so stopfte ich denn abwechselnd in Milch geweichte Semmel, Quark und mit zerstoßener Kreide gefüllte rohe Fleischklößchen in die schier unergründlichen und unersättlichen Rachen. Regenwürmer nahmen sie nur widerwillig an, und behaarte Raupen würgten sie mit sichtbarem Ekel wieder hervor. Dagegen haben sie einmal einige kleine Teichmolche ohne merklichen Nachteil verschlungen. Einige halbwüchsige Mäuse und zerteilte Sperlinge mit Haut und Knochen waren ihnen unverkennbar Leckerbissen.

Wie weit die Tiere körperlich geschwächt waren, ist daraus zu ersehen, daß es bei der von mir angewandten Fütterung doch volle vierzehn Tage noch dauerte, ehe die kräftigere der beiden Krähen im Garten herumlaufen konnte, während die zurückgebliebene in dieser verhältnismäßig langen Zeit erst gelernt hatte, sich auf die Beine zu erheben und unter sichtbar größter Anstrengung ein bißchen fortzuhüpfen, aber noch nicht zu laufen. Fleißig dehnte sie sich aber zu ihrer Kräftigung, sich gleichsam auf die Fußspitzen erhebend und die Schwingen streckend. Nach fast vierwöchigem, aufrichtigem Bemühen meiner-

seits um die Gesundung und Erstarkung meiner neuen Freude hatte ich dieselben glücklich soweit gefördert, daß sie mir auf meine Gäk-gäk-Rufe hin aus allen Winkeln des Gartens entgegenliefen, um sich ein paar Brocken, am liebsten rohes, mageres Fleisch, während sie fettes, talgiges bei nicht wirklichem Hunger verweigerten, in den weit aufgerissenen Schlund stecken zu lassen. Von Alleinfressen war immer noch keine Rede. Schon glaubte ich in der Aufzucht und Eingewöhnung meiner Jungkrähen über den Berg zu sein, da lag der Schwächling ohne vorhergegangene besondere Anzeichen eines Morgens — tot im Kasten. Das war natürlich wenig erfreulich für mich, aber die Fehler in der Pflege bei ihrem vorigen Herrn waren demnach doch nicht ganz auszuwetzen gewesen. Als ich den Kadaver beseitigte, bogen sich seine Beine, als wären sie von Pappe (Kalkmangel, Rachitis). Nun, mein Turmfalke, der den meisten Lesern dieser Zeitschrift ja bereits vorgestellt ist, hat daran nicht den geringsten Anstoß genommen, sondern hat ihn soweit wie möglich mit ungeschmälertem Appetit verdrückt. —

„Noch blieb mir ja der kräftigere Schwarzrock. Er treibt sich unbehelligt unter allerlei Alt- und Junggeflügel, Hühner, Enten, Tauben mit herum. Wenn ihm ein größerer Mitbewohner des Geflügelhofes einmal in allzu bedrohliche Nähe kommt, sperrt er abwehrend seinen Respekt einflößenden Schnabel auf. Trotzdem diese Krähe bereits vor vierzehn Tagen beim Auslesen von Mehlwürmern die Larven recht gut zu finden und auch zu packen wußte, macht sie noch heute keine Anstalt zum Selbstfressen. Selbst die heißbegehrten Fleischbrocken faßt sie nur mit der Schnabelspitze und läßt sie unter ständig bettelndem Gekreische wieder fallen. Dafür verfolgt sie aber ausdauernd die Hühner und reißt diesen ihre Beute aus dem Schnabel, nur um den Bissen auch sofort wieder fallen und unbeachtet liegen zu lassen. Futterkörner, Weizen, Mais, Holzstückchen, Federn, Steinchen werden spielend davongetragen und versteckt. Jeder für die Krähe nicht transportable Gegenstand, selbst das Gefieder des ahnungslosen Geflügels, wird mit dem Schnabel auf seine Dichte und Dauerhaftigkeit hin untersucht. Jede erreichbare Erhöhung wird ersprungen, und aus Übermut werden die tollsten Kapriolen, sich oft im Kreise drehend, ausgeführt. Drollig sieht es aus, wenn ich ihr die Kehle kraue. Da legt sie vor unverkennbarem Wohlbehagen den Kopf soweit hintenüber, daß sie das Gleichgewicht zu verlieren droht. Zu diesem ihr wohlgefälligen Beginnen fordert sie mich, gravitätisch vor mir stehend, mich unverwandt anschauend, mit sanftem, bittendem Tone auf. Schleicht eine Katze verdächtig an der Hausmauer und unter den Büschen dahin, so schießt meine Krähe wie toll umher. Guckt der große Schäferhund meines Nachbars durch den schützenden Zaun, so reckt sie nur neugierig und vielleicht doch auch etwas mißtrauisch den Hals. Aber von einem durch den Garten miauenden jungen Kätzchen und von meinem harmlosen Zwergrehpinscher nimmt sie so gut wie keine Notiz. Man sieht doch daraus, welch feines Unterscheidungsvermögen diesem Wildtier eigen ist.

So ungeschickt sich meine Krähe bis heute zum Fressen angestellt hat, so bald wußte sie die Bedeutung des Wassers zu schätzen. Trinken tut sie unter eigentümlich kauenden Bewegungen der beiden Schnabelhälften, und auch von der Badegelegenheit am großen, tiefen Steintroge macht sie öfters Gebrauch. Durch ihre geringe Furcht vor dem Naßwerden unterscheidet sie sich vorteilhaft von meinem geradezu wasserscheuen Turmfalken, der, wie schon seinerzeit an dieser Stelle erzählt, bei den ersten fallenden Regentropfen in den gedeckten Teil der Voliere flüchtet.

Ist meine Krähe sonst äußerst zutraulich, ja, sogar aufdringlich, wenn es sich um Befriedigung ihrer Magenfrage handelt, so kann sie ganz gegen ihr vorstehend gerühmtes Unterscheidungsvermögen auch recht schreckhaft, ja dummscheu sein. So kam ich dieser Tage mit der Treppenleiter, einem Ding, das ihr wahrscheinlich noch nicht vor die Augen gekommen war, über der Schulter in ihr Gehege. Meine Krähe mich sehen, einen Augenblick stutzen, und dann ging's nach dem Worte: Vorsicht ist der bessere Teil der Tapferkeit! in wilder Flucht durch den Garten, über die niedrige Mauer, die sie bisher noch nie überschritten hatte, und die Straße entlang, so daß die nachgeschickten Kinder Mühe hatten, sie einzuholen. Daraufhin hielt ich es für ratsam, ihr erstmalig die inneren Fahnen der Schwingen zu beschneiden, eine Antiflugmethode, die sich auch bei meinen Hühnern gegen das Überfliegen der Zäune bewährt hat und, was mir die Hauptsache mit ist, den Vogel nicht wesentlich verunstaltet.

Wird meine Krähe bei Freilauf, etwaigen Fluggelüsten ihrerseits vorbeugend in der Flugkraft behindert, auf die Dauer der drohenden Katzen- und Hundegefahr oder auch zweibeinigen Räubern ohne Federkleid entgehen?! Gern möchte ich den selbständiger gewordenen Raben zu meinem Turmfalken in die etwa 20 Raummeter große Gartenvoliere bringen. Kann ich es wagen? Wer hat Erfahrung in diesem Experiment?

Kleine Mitteilungen.

Angriff eines Fisches auf einen Eisvogel! Herr Dr. Hörl in Triftern, ein zuverlässiger Naturbeobachter, teilte mir folgende Beobachtung mit: Als ich gegen Abend in einem unserer Gewässer ein Bad nahm und am Ufer saß und eine Zeitung durchsah, beobachtete ich, wie mir gegenüber am andern Ufer ein Eisvogel sich auf einen übers Wasser reichenden Strauch setzte. Kaum war dies geschehen, als ein schwerer Hecht in wuchtigem Satze aus dem Wasser nach dem Vogel schnappte, ohne ihn jedoch zu fassen, denn der Eisvogel suchte, gewandt wie immer, noch rechtzeitig das Weite. Anton Luginger, Pfarrkirchen.

In meiner Gartenvoliere nisteten, wie schon mehrfach, wieder Stieglitze und brachten auch die Jungen groß, die sich jetzt verfärben. Eines Morgens, vor etwa vier bis fünf Wochen, lag das alte Männchen tot da. Das Weibchen war sehr erregt und lockte viel. Als ich so gegen ½3 Uhr bei der Voliere vorbeiging, saß auf einem Zwergbirnbaum ein singender, herrlicher Stieglitzhahn, ließ sich auch durch mein Vorbeigehen durchaus nicht stören und sang munter weiter, flog gegen das Gitter und begehrte Einlaß. Trotzdem ich riskieren mußte, daß mir ein Insasse des Käfigs entwischte, öffnete ich die Tür, und kaum geschehen, zog auch schon der neue Herr ein und fühlte sich anscheinend wie zu Hause. Ich nehme an, daß es ein schon gekäfigter Vogel ist, der irgendwo entflog und dem die Freiheit, wo er sich das Futter erst suchen soll, nicht behagte. Wieder ein Beweis mehr, daß gut verpflegte Vögel gern die Freiheit aufgeben. Hermann Wünn.

Winterfütterung und Eichhörnchen. Folgende, auch den Blättern für Naturschutz mitgeteilte Beobachtung dürfte auch den Lesern der „Gefiederten Welt" von Interesse sein.

In den Tagen des strengsten Winters dieses Jahres in einem Hochgebirge, als eine dreiviertel Meter hohe Schneedecke und eine ungemein starke Vereisung die Ernährung der zurückgebliebenen Singvögel in hohem Maße gefährdete, beobachtete ich zu wiederholten Malen an Stellen, wo Eichhörnchen die Reste ihrer in bekannter Weise eingenommenen Mahlzeit aus Fichtensamen, in Gestalt der abgedeckten Zapfenschuppen in größerer Menge zurückgelassen hatten, Scharen von Tannen-, Grau- und Haubenmeisen, von Goldhähnchen und einigen Berg- und Buchfinken, die von dem geradezu „vergletscherten" Boden die vom Eichhörnchen in Menge aus den festen Zapfen befreiten und verstreuten Samen auflasen. Die Meisen und Goldhähnchen untersuchten eifrig die abgebissenen Zapfenschuppen nach winzigen Insekten, Spinnchen usw., welche in den Zapfen für den Winter Quartier gemacht hatten und von mir mit der Lupe in großer Anzahl festgestellt werden konnten. All' diese Tiere und auch der Samen sind an den noch nicht völlig geöffneten und vielfach stark verharzten Zapfen den feinen Meisen- und Goldhähnchenschnäbeln recht schwer zugänglich.

So haben sich denn in diesem Falle die, den fanatischen Vogelschützern verhaßten Eichhörnchen selbst als praktische Vogelschützer gezeigt, indem sie in einem abgelegenen Hochgebirgsurwald den dem Hunger preisgegebenen Singvögeln durch eine dem Forstmann unbeliebte Betätigung einen reichen Futterplatz gedeckt und sich so durch Erhaltung nützlicher Vögel selbst nützlich gemacht und den Dank sowohl des Forstmannes, als auch des Vogelschutzfreundes verdient haben. — H. v. Boettcher.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

Wir ersuchen alle unsere Vereine und Einzelmitglieder, Einzahlungen von Jahresbeiträgen nicht an Personen des geschäftsführenden Vorstandes zu dirigieren, sondern nur auf unser Postscheckkonto Leipzig Nr. 22418 vorzunehmen.

J. A.: Petters.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 18. In Nr. 31 der „Gef. Welt" lese ich den Bericht des Herrn Professor Braun über Grauedelsänger. Dadurch sehe ich mich veranlaßt anzufragen, ob Weibchen des Grauedelsängers gänzlich ohne den geringsten Gesang sind? Vor dem Kriege besaß ich ein gutes Zuchtpaar, wovon das Männchen ein ganz vorzüglicher, lauter Sänger war und mir viel Freude machte. Jetzt, im Mai oder Anfang Juni, erwarb ich wieder nebst diversen Prachtfinken usw. ein Pärchen Grauedelsänger. Diese waren bei der Ankunft sehr hinfällig, erholten sich aber bald und sind zurzeit mobil. Der erwartete Gesang blieb aber aus! Wie nun verschiedentlich geschrieben wurde, man solle die Vögelchen trennen und einzeln halten, habe ich befolgt, und schon nach zwei Tagen ertönte Gezwitscher, und zwar singen beide. Doch Gesang kann man es nicht nennen, es ist, als wenn junge Kanarienhähnchen zu studieren anfangen oder alte Weibchen kurze Strophen bringen. Sollten dies nun etwa junge Männchen sein, die sich erst einüben, oder Weibchen, die da den stümperhaften Gesang von sich geben? Jedenfalls war mein früher gehabtes Männchen ein ganz anderer Sänger. Vielleicht gibt mir die Redaktion oder ein Leser der „Gef. Welt" Auskunft hierüber, wofür ich sehr dankbar wäre.

H. W., Potsdam.

Antwort.

Auf Frage 14 in Heft 28. Die in meinem Besitz befindlichen Granatastrilde sind keineswegs weichlich, nachdem sie die Eingewöhnung gut überstanden hatten. Weder Temperaturschwankungen im Winter und Sommer noch sonstig widrige Umstände ließen an ihrer Munterkeit und Sangesfreudigkeit irgendwelche Einbuße erkennen. Auch die Weibchen des Granatastrildes singen eifrig und verhältnismäßig laut. Stark schreibt in seinem Werke: „Es mag auffallend erscheinen, daß der zarte kleine Vogel mitten im Winter brütet, wo die Nächte ziemlich kalt sind, aber ich habe immer gefunden, daß die kleineren südafrikanischen Vögel gegen Temperaturunterschiede wenig empfindlich sind. Viele brüten mitten im Winter, sogar in Gebirgen, und machen dann häufig wieder im Hochsommer eine Brut."

Rudolf Neunzig.

Frage 19. Wo kann man Grahammehl bekommen? Aus was wird Grahammehl hergestellt? J. F. W.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Fluck, Bremen, Knoopstr. 39: Gelbnackenpapageien, Mohrenkopfpapageien, Elfenbeinsittiche, Grassittiche, Bülbüls.

W. Hiltmann, Berlin S 14, Dresdener Str. 24: Rote Kardinäle, Pflaumenkopfsittich, Bergpapageien, Goldaugentimalien, Kaptäubchen, Orangeblaufinken, Lazulifinken, Papstfinken.

Max Kleinert, Tierhandlung, Berlin NO 18, Strausberger Straße 13, Fernruf Alexander 3313: Blaue Araras, Doppelgelbköpfe, Diademamazonen, Mülleramazonen, Gelbstirnamazonen, tarant. rotkpf. Bergpapageien, Tovi-Sittiche, Feuerflügelsittiche, Königglanzstare, Schmucklori's.

A. Mertes, Mainz, Wallaustr. 62: 1,1 Rotkardinäle.

Ernst Schöndube, Berlin, Elisabethkirchstraße 1: Kaktussittiche.

Schlöß. Allersberg b. Nürnberg: 2 Paar kalif. Schopfwachteln, 4 Paar Goldfasanen, 8 Rebhühner, Brautenten.

J. Walter, Nidau 58 bei Biel (Schweiz): Blaue Wellensittiche sowie 3/4 Blaublut von guter Abstammung.

Zoo-Frank, Hamburg 27, Röhrendamm 40: Junge Gelbstirn-Amazone.

Herrn W. B., Lindau-Bodensee. Über wirksame Milbenbekämpfung ist nachzulesen im laufenden Jahrgang auf S. 296, Redaktionsbriefkasten unter „Herrn K. L., Gera" und S. 380 Redaktionsbriefkasten unter „Herrn A. M., Düsseldorf".

Herrn A. L., Pfarrkirchen; Herrn E. M., Berlin-Friedenau; Herrn O. P., Erfurt; Herrn A. D., Königsberg i. Pr.: Beiträge dankend erhalten.

Herrn A. M., Suonenjoki. Die Amazone ist die gewöhnliche Blaustirn- oder Rotbugamazone — Amazona aestiva mit z. T. abnormer Gefiederfärbung. Es kommen bei dieser Art viele individuelle Variationen vor. Daß sich das Gelb im Gefieder der Doppelgelbköpfe auch an Stellen zeigt, die normalerweise grün sind, wird häufiger beobachtet, es kommen auch Vögel dieser Art vor. Die vollständig gelbes Gefieder zeigen. Es handelt sich hier anscheinend auch um eine individuelle Veranlagung, nicht um eine für die Art allgemein gültige Alterserscheinung.

Frau E. v. O., Hannover; ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn W. L., Lauban. Die Tatsache, daß zuweilen ein Gimpel, wie Individuen aller anderen Vogelarten, sich als ein arger Raufbold erweist, ist bekannt. Sie geben auf die Frage, wie man einen solchen Raufbold behandeln muß, die einzig richtige Antwort mit den Worten „jetzt sitzt der Missetäter längst in Einzelhaft". Von einer Veröffentlichung derartiger Fragen an die Leser muß ich schon des Raummangels wegen absehen.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

rgang 54 20. August 1925 Heft 34

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Mein Zaunkönig. Von W. Kepp. (Schluß.)
Neueinführungen und Seltenheiten. Von K. Neunzig. (Forts.)
Meine Körnerfresser.
Die Bedeutung der Vogelschau. Von Albin Pollmer, Aue i. Erzgeb.
Verschiedenes über den Kirschkernbeißer (Coccothraustes coccothraustes *Linné*). Von Wilhelm Schreitmüller, Frankfurt a. M. (Schluß.)
Meine Krähen. Von J. Stöß.
Kleine Mitteilungen – Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.) Sitz Leipzig – Sprechsaal – Vom Vogelmarkt – Redaktionsbriefkasten – Aus den Verbänden – Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

reutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Sitz Leipzig. 1. Vors. Hermann Höhne, Leipzig-Volkmarsdorf, Eisenbahnstraße 84 IV. 1. Schriftf. Max Hunger, Leipzig-Gohlis, Polizeigebäude, Zimmer 196. Kassierer Ludwig Böttcher, Leipzig, Inselstr. 17 II. Girokasse Leipzig, Nr. 6317. — Nächste Vorstandssitzung am 26. August bei Herrn Ludwig Böttcher.

Der Vorstand.
J. A.: Hunger, Schriftf.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.



Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10.

Angemeldet ist Herr G. P. Huckfeldt, Hamburg 15, Spaldingstr. 160. — Aufgenommen wurde unter Mitgl.-Nr. 150n Herr Dr. Seelmann, Berlin-Zehlendorf-West, Prinz-Friedrich-Karl-Str. 34. A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.

J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke, Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Restaurant „Zum Löwentor", Königswall 75.

J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung Freitags, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Blasewitzer Hof". Liebhaber willk. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Eliesenhof", Eliesenstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Versammlung jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinsl. „Parkhotel", Epinaystr. 1, und jeden letzt. Sonnabend im Monat im Vereinsl. „Stadt Chemnitz", Thomasstr. 57. Näh. Auskunft erteilt Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 1. September. A. Weber, Vors., Hamburg 1, Rabotsen 56, Hansa 9599.

Der Hannoversche Vogelschutzverein zu Hannover, gegr. 1881, wirkt mit sichtbarem und anerkanntem Erfolge für Vermehrung und Schutz der Vogelwelt bei Hannover durch Aufhängen von jährlich einigen hundert Nistkästen aller Art, durch Erweckung von Interesse und Liebe für die Vogelwelt mit monatlich, zur Gesangszeit wöchentlich stattfindenden Belehrungsspaziergängen und durch Vorträge und Austausch der Beobachtungen in den jeden dritten Dienstag des Monats stattfindenden Vereinsversammlungen. Seine Bestrebungen dienen also lediglich gemeinnützigen Zwecken. Mitgliederzahl rund 1200, jährlicher Beitrag nur 1 M. Meldungen an den Vorsitzenden Herrn Fritz Becker, Hannover, Boedekerstr. 1 F.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste willk. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Vereinsabend regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends um 8 Uhr) beim 1. Vors., Herrn Jahn, Feodorastr. 7. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. Adolf Voigt, Schriftf.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 20. August. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Normast im „Kaiser Friedrich", Breslauerstr. 50. Liebhaber willkommen. J. A.: Friedrich.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße.
gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wsl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Aller 14 Tage im „Goldenen Falken" Versammlung; nächste Freitag, den 21. August. Liebhaber willk. Friedr. Rütschle, 1. Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Versammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Liebhaber willk. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebenda. R. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 27. August 1925 | Heft 35

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Ein Vogelheim.

Von Rudolf Hermann.

(Nachdruck verboten.)

Wenn man mit Vogelliebhabern spricht und darunter diejenigen versteht, welche nicht nur ihre Freude an dem Vogel in freier Natur haben, sondern deren Streben darauf gerichtet ist, eines oder das andere dieser anmutigen Geschöpfe zu besitzen, um es in der Häuslichkeit zu pflegen und sich dort seiner zu erfreuen, so muß man sagen, daß die Zahl unserer Liebhaber gegenüber jener der Vorkriegszeit recht gering geworden ist. Das ist auch ganz erklärlich. Denn vor dem Kriege, als unsere wirtschaftlichen Verhältnisse im allgemeinen noch gut genannt werden konnten, war es sehr vielen Menschen auch möglich, sich einige gefiederten Hausgenossen zu halten, wie überhaupt Naturanstalten in der Häuslichkeit, zu denen man doch einen mit Vögeln besetzten Flugkäfig rechnen darf, einzurichten. Heute ist dies anders geworden. Unsere Zeit drückt schwer auf die Gemüter und auf den Geldbeutel; deshalb muß sich auch die große Mehrzahl der Vogelliebhaber auf nur wenige Stubengenossen beschränken, zumal noch die Preise für die Vögel selbst und die Futterkosten ganz erheblich in die Höhe gegangen sind. Immerhin gibt es aber noch einige Vogelliebhaber, deren Interesse für die gefiederten Wesen soweit geht, daß sie sich gern Entbehrungen auferlegen, wenn sie dafür einen gefiederten Sänger ihr Eigen nennen können, und gerade in der Großstadt, deren Bewohner so schwer in unmittelbare Berührung mit der Natur kommen, ist dieser Charakterzug sehr ausgeprägt. Es gibt aber außer diesen auch noch einige Liebhaber, die gut genug situiert sind, sich mehrere Vögel zu halten, um daran ihre Studien zu vermehren, und in das Heim eines solchen war ich neulich geladen.

Gleich beim Eintritt begrüßte uns ein erst einige Wochen alter, doch schon selbständiger Wiedehopf, der abwechselnd durch Aufklappen und Anlegen seiner hübschen Federhaube seiner Erregung über die Störung Ausdruck verlieh, die ihm augenblicklich durch unsere Ankunft bereitet wurde. Dennoch ließ er sich nicht abhalten, dem Futter zuzusprechen, so daß wir Gelegenheit hatten, zu beobachten, wie mühsam er sich, wenn man so sagen darf, „sein tägliches Brot verdienen muß". Seine Nachbarschaft bildete ein mit einem Zaunkönig besetzter, der Natur der Vögel entsprechend eingerichteter Käfig, und ein Schwarzplättchen, schon mehrere Jahre im Käfig, unterließ nicht, durch seinen ständig wiederholten, gesanglich hervorragend zu nennenden Überschlag unsere Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Alsdann betraten wir die Vogelstube des Herrn Dähnick, jenes Liebhabers, der vielen Vogelfreunden von der Vogelschau in Berlin im November v. J., wo er den ersten Preis für ausgestellte Vögel erhielt, bekannt sein wird.

Ein Raum von 2,50 m Länge, 2,50 m Breite und 3,25 m Höhe, in dem 33 Einzelkäfige an den Wänden hingen, bzw. in Regalen standen, nahm uns auf. Unser Auge fiel zunächst auf eine Schama, die sich in tadellosem Gefieder präsentierte, und als Nachbarn je eine Grau- und eine Schwarzdrossel und ein Steinrötel hatte. Dann kam ein Vogelidyll mit sechs Goldhähnchen und einem Zaunkönig sowie einem Baumläufer, von denen dieser sowie drei Goldhähnchen überwintert waren, das in seiner reizenden Anlage so manchen Gegner der Vogelliebhaberei darüber hätte belehren können, daß dieses alles andere als Tierquälerei ist. Nicht anders verhielt es sich mit einem geräumigen Vogelheim, das zwei Kleiber beherbergt. Wohin das Auge schaute, wurde es angenehm berührt; denn alle Vögel befanden sich in Käfigen von gleichmäßigem Anstrich, waren in äußerst sauberem Zustande und je nach der Art ihrer Insassen in der Größe verschieden. (Schindler-Idealkäfige.) Infolgedessen waren auch die Vögel durchweg in gutem Gefieder, wenn sie auch, durch unser plötzliches Erscheinen ein wenig beunruhigt, nicht viel von ihrer Gesangskunst hören ließen. Neugierig schauten zwei Heide- und eine Feldlerche von oben zu uns herab, während ein Blaukehlchen uns seine schön gefärbte Brust mit weißem Stern bewundern ließ; ein 70 cm langes, 26 cm tiefes und mit einer 5 cm hohen Schublade ausgestattetes Gebauer, dessen Bodenbelag Moos bildete, diente ihm zum Aufenthalt. Ein hübsches Gegenstück dazu bildete ein Braunkehlchen, das aber etwas verängstigt sich unseren Blicken zu entziehen suchte. Dagegen schauten uns ein vierjähriger und ein dreijähriger, im Gefieder prachtvolle Sprosser unverwandt an, und in geradezu stolzer Haltung saß ein schon dreimal in der Ge-

fangenschaft überwinterter Rotrückiger vor uns, nur dann und wann durch rudernde Schwanzbewegungen seinen Unmut darüber kundgebend, daß wir ihn länger, als ihm lieb war, beobachteten. Eine zweijährige Nachtigall, zwei Gartengrasmücken, zwei Schwarzplatten, eine Sperbergrasmücke, drei Jahre in der Gefangenschaft, eine Dorngrasmücke und ein Müllerchen vervollständigten das Bild unserer lieblichen und von Vogelliebhabern gern gepflegten Vögel, und ein noch nicht ausgefärbter Zwergfliegenfänger, den Herr Dähnick schon zwei Jahre besitzt, verrät den geschulten Vogelpfleger, wofür noch der Umstand spricht, daß er ein Stück dieser zarten Art einmal vier Jahre im Käfig gehalten hat. Da gerade die Anzahl der Jahre, während deren man Vögel in der Gefangenschaft gesund erhält, ein wichtiger Maßstab für die Entkräftung des Urteils ist, daß Vögel im Käfig nicht lange leben, so ist deren Angabe nicht unwichtig. So sahen wir neben einem dreijährigen Reitzugfink noch einen fünfjährigen Würzgebühr, ferner Rotkehlchen und zwei Gelbspötter.

Von dieser Vogelstube führt eine mit Draht abgeteilte Verbindungstür in einen Freiflugraum, ungefähr 3 m lang, 2,50 m breit und 3,25 m hoch, und von dort in ein Außengebauer von 1,50 m Höhe, 0,65 m Tiefe und 1,08 m Breite, der Raum ist mit zwei Fichten und zwei Birken ausgestattet und hat wie der vorbeschriebene Raum elektrische Beleuchtung, die für die trüben Herbst- und Wintertage gedacht ist. Auf dem Fußboden befinden sich Kästen mit Erde, in der Mitte weißer Sand, ein Futtertisch und Badegelegenheit sowie ein Steingruppenbau, den zwei Bachstelzen besonders bevorzugten. Dieser Raum, der den Insassen auch einen Flug ins Freie ermöglichte, wo sie ein Regenbad nehmen, oder sich, wie es ihnen beliebt, sonnen können, war mit fünf Stieglitzen, fünf Zeisigen, drei Girlitzen, zwei Birkenzeisigen, fünf grauen Hänflingen, einem Steinhänfling, drei Kreuzschnäbeln, zwei Buchfinken, drei Grünfinken, 3,2 Dompfaffen, einem Grauammer, zwei Goldammern, einem Rohrammer, einem Rotkehlchen, einer Braunelle, einer grauen Bachstelze, einer Gebirgsbachstelze und einem Pärchen Sonnenvögeln besetzt. Alles in allem eine schöne Sammlung von lebenden Vögeln, die in der ganzen Anlage den verständigen, liebevollen und um das Wohl seiner Pfleglinge besorgten Liebhaber erkennen läßt und deren Anschauung, das Fundament der Erkenntnis, dem Besucher einen Genuß bereitet, wie man ihn bei Liebhabern in der heutigen Zeit wohl kaum öfter finden dürfte.

Doch wenn ich hiermit meinen Bericht über das, was bei Herrn Dähnick zu sehen war, schließen würde, so wäre er nur unvollständig; denn hinter Glaswänden zeigte sich uns ein weiteres Stück Natur in der Häuslichkeit, das zwar mit der Vogelkunde nichts gemein hat, doch dem Naturfreund, der das Verlangen fühlt, das lebende Geschöpf zu sich heranzuziehen, mit Bewunderung erfüllt.

Auf vier Dreietagenständern erblickten wir Wasserbecken, von denen vier die Länge von 85 cm, die übrigen eine solche von 1 m aufwiesen und hinter deren Glaswänden sich prächtige und seltene Meeres- und Flußbewohner unserem Auge zeigten. Diese Aquarien sind zu beheizen, die Ständer aus Gasrohr, in der Mitte abgedichtet, so daß vorn die Durchlüftung und hinten das Gas in dem ganzen Ständer zirkulieren kann. Je nach Bedarf ist es möglich zu heizen und zu durchlüften. Letzteres geschieht durch Wasserkraft von zwei übereinander montierten K. D. A. Kindel u. Stössel-Durchlüftungsapparaten sowie außerdem für den Notfall durch den neuen elektrischen Durchlüftungsapparat von der Firma Rietz aus Saalfeld. Und woran erfreute sich unser Auge und das Herz des Aquarienfreundes? Wir erblickten Zuchtpärchen von Scheibenbarschen sowie von Pfauenaugenbarschen, zwei Pärchen Heros spurius, jetzt Cichlasoma severum genannt, ein Pärchen Mollenisia velivera und drei Pterophyllum scalare. Ein Becken mit sechs Kugelfischen (Tetrodon fluviatilis) besetzt, die im Amazonenstrom heimisch sind. Weiter sahen wir von Importfischen ausländische Welse und drei Pärchen von Yenyrsia lineata und Ambassis lala, Schwertfischen u. a. m.

Die wärmebedürftigen Fische werden in einer Wassertemperatur von 25° gehalten. Im ganzen besteht die Anlage des Herrn Dähnick aus 20 Aquarien. Den Glanzpunkt unter allen bilden aber für uns die vier Seewasserbecken. Von diesen sind zwei Aquarien 1 m lang, 50 cm tief und 40 cm hoch, die anderen etwas kleiner. Das eine ist das sog. Mittelmeerbecken. Es beherbergt: zehn Gürtelrosen, 20 Purpurrosen, fünf Seemannsliebchen, fünf Edelsteinrosen, von denen drei rot, die übrigen beiden weiß sind. Alle leben schon drei Jahre bei Herrn Dähnick. Außerdem sind in dem Becken noch zwei große Wachsrosen und vier ebensolche Sonnenrosen. Das zweite Becken ist ein Nordseeaquarium, besetzt mit 23 Erdbeerrosen, drei dickhörnigen Seerosen, fünf Witwenrosen, acht Höhlenrosen und ein halbes Dutzend verschiedenfarbigen Seenelken. Ein drittes Becken, 50 cm lang, enthält zwei Zylinderrosen aus dem Mittelmeer, die leider an dem Tage unseres Besuchs nicht entfaltet waren; und das vierte, ebenfalls 50 cm lange Nordseebecken zeigte uns zwei Butterfische, sowie 2 Aalmuttern.

Was soll ich noch hinzufügen? Wer einmal das Berliner Aquarium besuchte und hinter dessen Spiegelscheiben die Meeresfauna und Meeresflora bewundert hat, der wird auch den geheimen Wunsch gehegt haben, sich einmal ein Stückchen davon in die Häuslichkeit zu verpflanzen, und wer die Vogelwelt liebt, der wird nicht minder das Verlangen haben, auch von ihren Bewohnern einmal den einen oder anderen bei sich aufnehmen zu können, um sich an seinen verschiedenen Eigenschaften zu erfreuen. Daß dies möglich ist, zeigt die, wie ich schon sagte, mit Lust und Liebe umhegte Einrichtung des Herrn Dähnick, die zu zeigen ihm sichtliche Freude macht. Wenigstens hatten wir den Eindruck, als wir von ihm schieden, daß er sich jedem, der die Natur so liebt wie er und Vögel und Fische nicht nur aus Sport, sondern aus wahrhaftem Interesse hält, gern mit Rat zur Verfügung stellt.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

In L'Oiseau 1925 II. erwähnt J. Delacour einen Araſſari, von dem dem Verfaſſer nicht bekannt iſt, daß er bisher nach Deutſchland gelangt iſt:

Baillons Araſſari — Selenidera bailloni (*Vieill.*).

Er wird a. a. O. als ziemlich häufig eingeführt aufgezählt. Abweichend von den Gattungsverwandten ſind bei ihm die Geſchlechter gleichgefärbt und der Schwanz iſt länger als die Flügel. Burmeiſter hebt ſeine Schönheit beſonders hervor und Delacour nennt ihn „einen ſehr niedlichen kleinen Tukan". Seine Verbreitung erſtreckt ſich über Südoſtbraſilien.

Gefiederbeſchreibung: Stirn, Augen-, Ohrgegend, ganze Unterſeite goldgelb; Rücken, Flügel bräunlicholiv, Bürzel rot; Schwingen, Schwanz graugrün; Auge bräunlichgelb, nackter Augenring ziegelrot; Schnabel grünlich, Wurzel bläulich mit rotem Fleck; Füße grünlichgrau.

Einen ſehr ſeltenen Langflügelpapagei brachte der letzte abeſſiniſche Import in das Vogelhaus des Berliner Zoologiſchen Gartens, den nebenſtehend abgebildeten, von Reichenow (in „Vogelbilder aus fernen Zonen")

Zitronenkopf — Poicephalus flavifrons (*Rüpp.*) [citreocapillus (*Heugl.*)]

genannten Papagei.

In den „Vögeln Afrikas" und auch a. a. O. ſpricht Reichenow die Anſicht aus, daß es ſich bei dieſem Vogel nur um die höhere Ausfärbung des Gelbſtirnmohrenkopfes P. flavifrons *(Rüpp.)* handelt. Heuglin, dem auch dieſe ſchon von Schlegel ausgeſprochene Anſicht bekannt war, weiſt darauf hin, daß bei dem Zitronenkopf Schnabel und Füße viel kräftiger ſeien als bei dem Gelbſtirnmohrenkopf, und betont auch die hellere Farbe der Nägel des erſteren. Der Zitronenkopf unterſcheidet ſich vom Gelbſtirnmohrenkopf in allen Kleidern durch den ſchön und glänzend türkisblauen oder blau überflogenen Bürzel und Unterleib ſowie den gelben Flügelrand; auch einige Federn des Afterflügels ſind gewöhnlich, der Kopf im Alter ſtets ganz hellgelb.

Heuglin fand dieſe Art in kleinen Geſellſchaften auf dichtbelaubten Hochbäumen in der Nähe von Flüſſen. Den Aufenthaltsort des Gelbſtirnmohrenkopfes ſchildert Heuglin ganz ähnlich und ungefähr im ſelben Gebiet wie den des gelbköpfigen Vogels. Er habe ihn in Höhen von 5—8000 Fuß in engen waſſerreichen Schluchten auf dichtbelaubten Hochbäumen in Flügen von 3—8 Vögeln gefunden. Sie ſeien lebhaft, ſcheinen ſchwer in ihren Bewegungen und ſtoßen im raſchen, ſchnurrenden und geraden Flug einen unangenehmen, pfeifenden Ton aus. Die Nahrung beſtehe in Getreide, Beeren, Mark und Früchten der Adanſonien. Das Verbreitungsgebiet ſind Teile Nordoſtafrikas. Reichenow gibt folgende

Gefiederbeſchreibung: Grün; Bürzel, Oberſchwanzdecken, Unterkörper heller, bisweilen bläulichgrün; Stirn, Scheitel, Zügel, Augengegend und obere Wangen, oft auch die Schenkel gelb. Bei manchen Vögeln dehnt ſich das Gelb über den ganzen Kopf aus; auch der Flügelrand iſt zuweilen gelb, Unterflügeldecken grün; Schwingen ſchwarzbraun mit grünen Außenſäumen; Schwanz olivenbraun, ſchmal grün geſäumt; Oberkiefer dunkelhornbraun, Unterkiefer weißlich; Füße grauſchwarz; nackte Augengegend ſchwärzlich; Auge gelbrot; Lg. 250, Fl. 165—180 mm.

Der zurzeit im Vogelhaus befindliche Vogel zeigt die Merkmale der höheren Ausfärbung der Art. Ein Vogel in dieſer Ausfärbung iſt bisher nicht in einen zoologiſchen Garten gelangt.

Zwei bisher noch nicht eingeführte Arten von „Unzertrennlichen" haben Europa, in dieſem Falle England nur auf der Durchreiſe nach Amerika berührt, und zwar „Fiſchers Unzertrennlicher" (ſ. Abb. S. 409) und das „Schwarzköpfchen" (ſ. Abb. S. 411). Den

Fiſchers Unzertrennlichen — Agapornis fischeri *Rchn.*

nennt Emin, der ſich viel Mühe gegeben hat, das Vorkommen von Arten der Gattung Agapornis

Zitronenkopf (Text ſ. nebenſtehend).

feſtzuſtellen, einen der bezeichnendſten Vögel Deutſch-Oſtafrikas von Nanjamweſi bis zum weſtlichen Viktoriaſee. „Selten durchzieht man ein Gehölz, ohne einigen Paaren oder kleinen Geſellſchaften von 3 bis 4 Stücken zu begegnen, die unter feinem, nicht ſo grellem Schreien, wie es A. pullarius hören läßt, ziemlich hoch, ſchnurrend in gerader Linie fliegen. Auch auf der Erde machten dieſe Papageien ſich viel zu tun." Im Magen fand Emin ausſchließlich feine Grasſamen, die ſie jedenfalls von der Erde aufgeſammelt hatten.

Gefiederbeſchreibung: Stirn, Kopfſeiten, Vorderhals orangerot, am ſatteſten auf der Stirn, auf dem Kopf zuweilen in Orangegelb übergehend, Ohrgegend mit roſarotem Anflug; Oberkopf düſter olivgelb, auf dem Scheitel zuweilen rötlich verwaſchen; letzteres auch häufig auf dem

olivgelben Nacken; Rücken grün, Unterkörper heller grün; Oberschwanzdecken blau, Flügel grün, Schwingen mit Ausnahme der innersten, welche grün sind, schwarzbraun, grün außengesäumt; Unterflügeldecken hellgrün, größere bläulichgrau; Schwanzfedern grün, am Ende hellblau, meist die mittelste am Grunde mit gelbrotem Mittelfleck, vor dem hellblauen Ende auf der Innenfahne eine schwarze Querbinde; Schnabel korallrot; Auge braun, nackte Umgebung des Auges, Schnabelwachshaut weiß; Füße grau. Lg. 130 bis 150, Fl. 70—95, Schw. 40 mm.

Auch der andere Unzertrennliche ist ein Bewohner Deutsch-Ostafrikas. Er hat eine oberflächliche Ähnlichkeit mit dem Rußköpfchen, unterscheidet sich von diesem ganz wesentlich. Prof. Neumann, der ihn in der Freiheit beobachtete, nennt ihn „Braunköpfiger Zwergpapagei" und in der Gefiederbeschreibung, welche Reichenow in „Die Vögel Afrikas" gibt, heißt es: „Stirn, Scheitel und Kopfseiten schwarzbraun." Am Balg, den ich vor mir hatte, waren diese Teile des Gefieders von stumpf schwarzer Färbung, und Dr. Seth-Smith, der Herausgeber des Avicult. Mag., gibt gleichfalls an, daß der ganze Kopf schwarz sei. Ich halte aus diesen Gründen den Namen

Schwarzköpfiger Unzertrennlicher — Agapornis personata *Rchn.*

vorerst für den passenderen. Prof. Neumann traf den kleinen Papagei in Flügen von 10—20 Stück häufig in den Akazienhainen des nördlichen Ugogo und anderen Landschaften Deutsch-Ostafrikas. Er ist der Ansicht, daß das Verbreitungsgebiet des Vogels ein sehr beschränktes sei.

Gefiederbeschreibung: Kopf schwarz, am Hinterkopf in Fahlolivbraun übergehend; breites Band um den Hals und die Oberbrust gelb, Kropfgegend soll zuweilen orangefarben verwaschen sein; Rücken grün; Oberschwanzdecken ultramarinblau schimmernd, bei anderem Lichteinfall gelblichgrün; Unterseite heller grün; Flügeldecken, innerste Schwingen grün wie der Rücken, übrige Schwingen schwarzbraun, meistens grün gesäumt; Unterflügeldecken grün, große blaugrau; mittelste Schwanzfedern grün, übrige grün mit orangefarbenem Fleck am Grunde und schwarzer Querbinde, zuweilen auch auf der Außenfahne vor der gelbgrünen Spitze; Schnabel korallrot, Wachshaut, nackte Augenumgebung weiß; Auge braun; Füße hell bläulichgrün; Lg. 145 bis 160, Fl. 90—95, Schw. 45—50 mm.

(Fortsetzung folgt.)

Meine Körnerfresser.

Erinnerungen aus einem mehr als 50jährigen Vogelliebhaberleben.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Diesen meinen ersten Hänfling durfte ich sogar mit mir nehmen, als ich das Vaterhaus verließ, um eine höhere Schule zu beziehen. Wie oft habe ich dabei während der Anfertigung der Schularbeiten seinem Gesang gelauscht und mich an seinem einfachen, schlichten Wesen erfreut. Er blieb mein ungestörter Besitz bis zum Verlassen der Schule — also 6 Jahre lang —, und dann schenkte ich ihn meinen Wirtsleuten, die ihn sehr blieb gewonnen hatten. Während des nun folgenden Zeitraums von $^1/_2$ Jahre, den ich im elterlichen Hause verlebte, widmete ich mich ungestört der so schönen Umgebung meines Heimatorts, namentlich dem Leben und Treiben der Vogelwelt, war doch die Freizeit dazu wie geschaffen, weil sie in den Frühling und Sommer fiel. Um den Garten meines Elternhauses, das im freien Felde lag, war im Laufe der Jahre eine hohe Dornhecke aufgewachsen. Eifrig durchsuchte ich sie nach Vogelnestern und bald hatte ich ein Hänflingsnest entdeckt. Außerdem nisteten darin noch ein Pärchen der Dorngrasmücke und des rotrückigen Würgers und in einem Nistkästchen an der Giebelseite des Bienenschauers ein Pärchen der grauen Bachstelze. Ferner hatte ein Buchfink in einem hohen Birnbaum sein Standquartier, und dicht neben unserm Garten in einer sehr hohen Akazie an der vorüberführenden Chaussee nistete ein Stieglitzpärchen. Sobald die jungen Hänflinge so weit gediehen waren, daß sie ohne Schaden für ihr Fortkommen in ein Bauer gesetzt werden konnten, tat ich sie da hinein und brachte dasselbe in der Hecke an derselben Stelle unter, wo das Nest gesessen hatte. Täglich war früh mein erster Gang in den Garten, um nach ihnen zu sehen. Sie wuchsen gut, und die Alten fütterten danach also fleißig. Da der Hänfling ein sehr scheuer und vorsichtiger Vogel ist, konnte ich ihn dabei nie beobachten. Jedenfalls pirschten sie sich in der Hecke an das Bauer heran. Die Vögelchen waren flügge geworden, und ich setzte ihnen, um sie für später an das Futter zu gewöhnen, schon immer eingeweichten Rübsen in den Käfig. Auch wollte ich dadurch feststellen, ob sie allein fraßen. Ich habe dies immer bei allen Vögeln getan, wenn ich sie von den Alten auffüttern ließ, um nachher keine Verluste durch Eingehen zu erleiden. Eines Tages kam ich gegen abend vom Baden in der Elbe zurück, und mein Gang war wieder zu meinen Hänflingen — aber mein Schreck: Das Bauer war leer, die Gefangenen waren fort. Die Ursache ist mir nie klar geworden, entweder hatte ich die Tür beim Hineinstellen des Futters nicht ordentlich verschlossen oder eine fremde Hand hatte sie geöffnet. Die Hecke, in der das Bauer stand, lag an der Chaussee, und ein anderer, der nach Nestern suchte, hatte die Vögelchen gefunden und mitgenommen. So endete mein erster Versuch, Hänflinge, und zwar junge, durch Auffüttern zu erlangen. Da ich im Herbste das Vaterhaus nunmehr für immer verließ, um in eine Beamtenlaufbahn einzutreten, und da während meiner Ausbildungszeit ein längerer Aufenthalt an ein und demselben Orte für mich ausgeschlossen war, so konnte ein Halten von mehreren Singvögeln nicht in Betracht kommen. Ich blieb aber begeisterter Vogelliebhaber und suchte meine Lieblinge dafür, so oft ich konnte, in der freien Natur oder bei anderen Vogelhaltern auf. Wie oft habe ich in den frühen Morgenstunden oder an dienstfreien Nachmittagen in den schönen Frühjahrs- und Sommermonaten dem Leben und Treiben meiner Freunde nachgespürt und ihren Gesangskünsten gelauscht. Ich habe dabei Freuden genossen, die ich noch heute mit keinerlei anderen Genüssen vertauschen möchte. Dabei war mein Hauptstreben immer, mir wenigstens einen gefiederten Stubengenossen verschaffen und halten zu können. Der Zufall kam mir hierbei zu Hilfe. In einem kleineren Städtchen der Provinz Sachsen dienstlich tätig, wohnte ich im ersten Gasthaus, hierher brachte eines Tages der Kutscher einer benachbarten Oberförsterei für den Hausdiener ein Nest mit 5 jungen Hänflingen mit. Sie waren noch fast nackt, und aus diesem Grunde wollte der Hausdiener sich die Mühe des Auffütterns nicht

machen, er fürchtete die mühselige Arbeit und dabei wohl auch, daß er dieselben nicht groß brächte. Um die armen Tiere nicht verkommen zu lassen, nahm ich sie in meine Obhut. Da sie schon fast verklammt waren, sorgte ich zunächst durch Bedecken des Nestes mit wollenen Strümpfen für die nötige Erwärmung, und dann kochte ich auf meinem Spiritusapparat ein Hühnerei hart. Mit einem als Löffelchen zugeschnittenen Gänsekiel wurden sie alle zwei Stunden sorgfältig gefüttert. In den ersten Tagen gab ich nur reines Ei, später setzte ich etwas aufgequellten Rübsen hinzu und ich hatte die große Freude, meine sämtlichen Zöglinge gut gedeihen zu sehen. Mit dem Füttern begann ich früh 5 Uhr, gegen 6 Uhr abends erhielten sie das letzte Futter. Da meine Amtsstelle sich gleich im Gasthaus befand, so konnte ich meine Vögelchen bald in meinem Zimmer

Fischers Unzertrennlicher (s. S. 407).

aufsuchen und zur rechten Stunde besorgen. Selbst des Sonntags blieb ich zu Hause, nur um meine Pfleglinge keine Not leiden zu lassen. Noch heute, nach 44 Jahren, gedenke ich mit Freude meiner damaligen Kunst; denn es ist eigentlich tatsächlich eine Kunst, solch kleinen Tierchen die Eltern zu ersetzen. Unendliche Mühe und Arbeit ist damit verbunden, namentlich wenn man alleinsteht und Hausgenossen nicht zur Aushilfe mitheranziehen kann. Man ist fast ein Sklave seiner Vögelchen, denn mindestens alle 2 Stunden muß man für sie bereitstehen. Ich habe deshalb in meinem späteren langen Vogelliebhaberleben nie wieder selbst junge Nestvögel aufgefüttert, sondern — namentlich Hänflinge — immer von den Alten im Bauer großziehen lassen. Um so stolzer war ich aber, als mein erster Versuch so gut gelang: alle 5 Jungen wurden groß, und zwar waren sie, als sie flügge waren, wie aus der Luft gegriffen, kein Federchen fehlte. Dazu hatte neben dem vorbeschriebenen guten Futter auch der Umstand beigetragen, daß ich beim jedesmaligen Füttern den Kot vom Nestrand sorgfältig entfernte. Unter den 5 Jungen waren 3 Hähnchen und 2 Weibchen. Letztere ließ ich fliegen. Ich will hier gleich noch bemerken, daß man sich beim Heraussuchen von jungen Hähnchen aus Hänflingsnestern selten irren kann, der weißliche Halsring und die lebhaft weißumsäumten Flügel- und Schwanzfedern zeigen sofort das Geschlecht. Durch meine Hände sind im Laufe der Jahre viele junge Hänflinge gegangen, ich habe mich stets nach den vorgenannten Abzeichen gerichtet und dabei nie Fehlgriffe getan. Auf eine genaue Beschreibung des Hänflings, wie sie sich bei mir nach mehr als 50jähriger Beobachtung gebildet hat, komme ich weiter unten zurück. Von den 3 jungen Hänflingsmännchen verschenkte ich 2 an liebe Bekannte, 1 behielt ich selbst, und zwar zum Anlernen nach dem Munde von Liedern. Zunächst lehrte ich meinem Zögling das alte so fröhliche Jägerlied: „Im Wald und auf der Heide, da such ich meine Freude usw." Wie ich später noch oft beobachtet habe, eignet sich gerade die Melodie dieses Liedes besonders für den Hänfling gut, er pfeift es „wie getragen". Als Lehrstunden wählte ich die erste Morgen- und die letzte Abendstunde, mehrere Male pfiff ich es auch im Laufe des Tages. Da mein Hänfling gar keine anderen Vögel hörte — er hing in meinem Schlafzimmer —, so fing er bald an, zu studieren. Damit er recht aufmerksam sein mußte, hing ich ihn tiefer wie meine Augen auf und beim Vorpfeifen sah ich ihn scharf an. Er saß dann meistens ganz still und hörte, wie ich sicher merkte, ganz aufmerksam zu. Bis zur Herbstmauser hatte er schon gut begriffen, obwohl er mit dem lauten Nachpfeifen noch sehr zurückhaltend war. Auch während der Mauser setzte ich natürlich den Unterricht unvermindert fort, und etwa 4 Wochen später — Mitte Oktober — pfiff er laut und rein, ohne zu stocken, nach. Man darf nie den Fehler begehen, beim Stocken des Lehrlings

einzugreifen, sondern man muß stets das ganze Lied von Anfang an wiederholen. Jetzt begann ich auch mit dem zweiten Liedchen: „Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab usw." Auch diese Melodie eignet sich für einen Hänfling bei seinem ernsten, gemessenen Wesen vorzüglich.

(Fortsetzung folgt.)

Kapuzenzeisig × Bluthänfling.

Von Walter Schmelzer, Madrid.

(Nachdruck verboten.)

In meiner Arbeit „Finkenmischlinge und anderes" erwähnte ich bereits meine Absicht, Mischlinge von Kapuzenzeisigmännchen und Bluthänflingsweibchen zu züchten. Heute kann ich von einem Erfolg berichten.

Das ungleiche Elternpaar überwinterte in bester Eintracht mit einem Distelfinkweibchen in ungeheiztem, aber frostfreiem Zimmer in mittelgroßem Käfig. Ich hielt diese drei Finken zusammen, um zu sehen, welchem von den beiden Weibchen der Zeisig mehr Zuneigung zur evtl. Zucht zeigte.

Der Frühling hielt seinen Einzug und mit seinen zunehmenden, warmen Sonnenstrahlen wurde auch das kleine „Triumvirat" recht lebenslustig. Bald bemerkte ich, daß der tiefrote Venezuelaner sich mit allerlei lieblichen Bewegungen und Gesang der Distelfinkin näherte, um sie aus seinem Kröpfchen zu füttern, welcher galanten Einladung sie flügelschlagend gern nachkam. Da sich jedoch der kleine Amerikaner auch der Hänflingin gegenüber ganz liebenswürdig benahm, ließ ich den Freundschaftsbund einstweilen ungestört, bis ich beobachten konnte, wie sich die Hänflingin mit kleinen Federchen im Schnabel nervös im Käfig herumtrieb. So hielten denn auch alle drei sofort ihren Einzug in einem großen Käfig, der mit Zypressen-, Mandelzweigen und Nistkörbchen aus Weidengeflecht ausgestattet ist. Selbstverständlich wurde auch das nötige Nestmaterial beigegeben; kleine Würzelchen, trockene Grashalme, Moos, Palmenhaare, Wolle, Charpie usw. Nachdem nun die Hänflingin alles so schön vorbereitet fand, genau so wie im Vorjahre, entschloß sie sich auch sofort zum Nestbau und in wenigen Tagen entstand im Körbchen in dichtem Zypressengezweig ein schöngeformtes Nestchen, — währenddessen die Distelfinkin das Werden und Gedeihen mit recht neidischen Blicken bewunderte, aber sich nicht zu gleichem Tun herbeiließ. Ihre Eifersucht wurde bald so groß, daß sie daran ging, die beabsichtigte „Kinderwiege" ihrer Nebenbuhlerin zu zerstören. Das war doch zu viel und sofort mußte sie da heraus, wo Freude, Glück und Zufriedenheit wohnten. Anscheinend eine stille Erlösung für Frau Hänfling, welche die entstandenen Lücken bald wieder ausgebessert hatte. Am 27. April, wer beschreibt meine Freude, lag im Nest das erste reinweiße Eichen. Diesem folgten zwei weitere, mit welchen das erste Gelege abgeschlossen war. Um die Sache nun recht gut zu machen, beging ich die Dummheit und vertauschte die zwei ersten Eichen durch Porzellaneier, um zu warten, bis das Gelege vollzählig ist, aber die Hänflingin war mit meinem Handeln nicht einverstanden, erkannte den Schwindel und verließ ihr Nest. Glücklicherweise konnte ich ihre drei Eier bei drei verschiedenen Kanarienhennen unterbringen, von welchen ein Ei sich als taub erwies, während aus den andern beiden Eiern die gewünschten Mischlinge ausschlüpften und ihren guten Pflegemüttern ihre hungrigen Hälschen entgegenstreckten. Heute, am 28. Mai, sind sie so weit vorgeschritten, daß sie jedenfalls in wenigen Tagen den Nestern entschlüpfen werden. Eines dieser beiden Mischlingsfinkchen wird von seiner braunbunten Pflegemutter, deren Gelege unfruchtbar war, liebevoll großgezogen und vom Pflegevater — Yarellzeisigkanarie × Kanarie — fleißig unterstützt. Das andere erfreut sich besten Gedeihens in Gesellschaft von zwei gleichalten Bastarden von Kapuzenzeisig × Kanarie. Über Haut- und Federfarbe, Gestalt und Gesang gebe ich später Auskunft. Soviel ich jetzt sehen kann, sind die Vögelchen oberhalb häuflingsfarben mit dunklen Flügel- und Schwanzfedern, jedoch bedeutend heller als junge, reinblütige Nesthänflinge. Die Unterseite hat eine bräunlichgelbe Farbe.

Ich mag nicht viel am Nest herumhantieren, um keine unliebsamen Folgen zu haben. Wie gesagt, hierüber später ausführlicher, d. h. wenn mir Herr Neunzig noch ein Plätzchen in der „Gef. Welt" freilassen kann. (Selbstverständlich. N.)

So will ich nun weiter erzählen, vom glücklichen Kapuzenhänflingspaar. Wenige Tage darauf, als ich das erste Gelege, wie beschrieben, anderweitig untergebracht hatte, erbaute das Weibchen sein zweites Nest im gleichen Körbchen, nachdem ich vorher alles alte Nestmaterial entfernt hatte. Am 12. Mai lag wieder das erste Ei im Nest und am 16. Mai war das Gelege aus fünf Eierchen beendet, die nun von ihrer Eigentümerin treu bebrütet wurden, während der Zeisig seine Ehehälfte auf dem Nest fütterte und ihr durch seinen niedlichen Gesang auf dem Neststrand die Brutlangeweile zu verkürzen versuchte. Nie habe ich eine Begattung beobachten können, aber dennoch sind bereits wieder vier neue „Weltbürgerlein" vorhanden. Am 28. Mai, einen Tag vor dem Ausschlüpfen, legte ich zwei Eier einer dreifachen Kapuzenkanarie, die stets unbefruchtete Eier erzeugte, unter, da ich befürchtete, die Hänflingin könnte die Jungen wegen Futtermangel selbst nicht großfüttern. Am 29. Mai entschlüpfte im Nest des Mischlingsweibchens der erste Bastard, während bei Frau Hänfling am 28. und 29. Mai drei Vögelchen das Licht der Welt erblickten. Anscheinend füttert jene wie auch die eigentliche Mutter gut. Was würde ich geben, wenn ich heute Ameisenpuppen, frische oder getrocknete, bieten könnte. Aber so was kennt man hier nicht und ist für gutes Geld in Spanien nicht aufzutreiben. Selbst sammeln ist unmöglich, da die nähere Umgebung Madrids vollständig waldarm ist, außer den künstlich erhaltenen Parkanlagen. So muß ich halt meine seltenen Mischlinge ihrem Schicksal überlassen und kann nur hoffen, daß die Mutter zur Aufzucht sich mit allerlei Sämereien, Eifutter und zerkleinerten, frischen Kiefernkernen begnügt. Übrigens diese mandelähnlichen Nadelholzkerne werden sehr gern von allen meinen Vögeln, und im besonderen von der Hänflingsmutter, genommen. Diesem harzschmeckenden Samen schreibe ich auch den Glanz des

Besieders zu, den meine Vögel haben. Die Distelfinken z. B., welche ich zum Teil zwei und drei Jahre schon käfige, prangen in ihren schönsten Farben. Dies nur nebenbei.

In nachstehendem werde ich nun die täglichen Notierungen über den weiteren Verlauf der Aufzucht bringen. Hoffentlich bleiben meine einstweilen unbegründeten Befürchtungen aus und es bleibt mir ein vollständiger Erfolg vergönnt. Man soll eben nicht den Tag vor dem Abend loben, wie jedenfalls alle Mischlingszüchter genügend aus Erfahrung wissen.

Gesagt und geschehen! Am 30. Mai morgens finde ich am Käfigboden der Hänflingin einen toten Mischling. Ich erkläre mir den Vorfall nicht, da das Weibchen die andern beiden mit Futter versorgt. Es kann sein, daß der Zeisig den Kleinen herauswarf, da jener ich oft am Nest zu schaffen machte und Neststoffe herauszog. Jedenfalls hat er seinen Nachkommen ungewollt am hellgrauen Kopfflaum gepackt und ihn dadurch zum Verderben gebracht.

Ich reiche jetzt viel in Milch stehenden Hafer und Getreide, die vom Weibchen als Futter gern genommen werden. In Milch aufgeweichtes und gut ausgedrücktes Weißbrot wird ganz verschmäht. Ebenso wird sehr wenig Eifutter genommen, dagegen zerdrückter Hanf sehr gern.

Bisher übernachtete das Weibchen im Nest. Am 2. Juni abends, o Schrecken, sehe ich die Hänflingin schlafend im Geäst und am folgenden Morgen finde ich die beiden Mischlinge mit leeren Hälsen schnabelöffnend im Nest. Kurz entschlossen und ehe es zu spät war, brachte ich die beiden Unglücklichen zu ihren zwei Geschwistern in das Nest der dreifachen Kapuzenkanarie, welche die Hungernden gottlob sofort hilfebringend angenommen hat. Was mag wohl die Hänflingin bewogen haben, nicht mehr im Nest zu schlafen? Milbenplage kann nicht gut möglich sein, denn ich halte auf peinlichste Sauberkeit. Vielleicht die schwüle Hitze, die wir an jenem Abend hier hatten. — Der Käfig ist neu vorbereitet fürs dritte Gelege, das da kommen soll.

Ja, ja, das Schicksal schreitet schnell. Am 4. Juni finde ich im Nest des Mischlingsweibchens, das sich im Flugraum befindet, nur noch drei Mischlinge vor. Der vierte spurlos verschwunden und am 5. Juni einen weiteren tot im Nest. Die Pflegemutter muß doch wohl die beiden Untergelegten erkannt haben. Schade! Die restlichen zwei Mischlinge finde ich wohlgesättigt vor.

Man soll nicht glauben, wie schnell so ein kleines Vogelherz seine unglücklichen Nachkommen vergißt. Am 7. Juni beschäftigt sich die Hänflingin schon wieder mit dem dritten Nestbau und heute, am 10. Juni, ist er fast beendet. Am 12. Juni das erste Ei und nachmittags des gleichen Tages bemerke ich zu meinem Bedauern, daß das Weibchen traurig und abgemagert dasitzt. Ich vermutete Legenot und am folgenden Morgen wurde ein Kamillenteebad nach der bekannten Methode vorgenommen und eine halbe Stunde später legte der Vogel das zweite Ei am Käfigboden, der vorher mit Charpie ausgelegt war, um das Zerbrechen des Eies zu verhindern. Am 14. Juni finde ich die Starkabgemagerte tot im Käfig. Was mag wohl das bedauerliche Ende des Vögleins verursacht haben? Ich reichte stets das beste Futter. Gerne hätte ich den toten Vogel an Herrn Neunzig zwecks liebenswürdiger Untersuchung gesandt, um zu erfahren, was meiner Kapuzenzeisig × Bluthänflingszucht ein so jähes Ende gebracht hat. Aber das ist ja unmöglich. Somit bleiben mir also zwei selbständige Mischlinge aus erstem Gelege, die jetzt schon orangegelbe Flügelspiegel aufweisen, und zwei weitere Mischlinge aus zweitem Gelege, die sich schon munter im Flugraum herumtreiben, aber von ihren Stiefeltern noch fleißig gefüttert werden. Außerdem zwei Eier aus drittem Gelege, die von einer Kanarie bebrütet werden. So kann ich wohl noch auf weitere zwei Mischlinge hoffen. Später, wie schon erwähnt, gebe ich gern Auskunft über Farbe, Gestalt und Gesang der Kapuzenzeisig × Bluthänflinge.

Dem verwitweten Kapuzenzeisig habe ich das zu Anfang erwähnte Distelfinkweibchen zugesellt.

„Friede der Hänflingin und Glück der Distelfinkin!"

Madrid, den 15. Juni 1925.

Schwarzköpfchen (s. S. 408).

Finkensport.

Von Otto Pensler.

(Nachdruck verboten.)

Wenn ich heute etwas von Edelfinken schreibe, so geschieht dies aus dem Grunde, weil lange über derartiges nicht geschrieben wurde. Warum? Nun, ich glaube, weil die wenigsten Liebhaber einheimischer

Vögel überhaupt wissen, was wir heute noch für herrliche Schläger haben. Meine Erfahrung erstreckt sich zwar nur auf einige Gebiete, Harz und Thüringen, doch da haben wir nun schon so viel gute Schläge, daß es sich lohnt, einiges darüber zu berichten. Im Jahrgang der Gefiederten Welt 1922 S. 181 schrieb Herr M. Jacobs über das Aussterben des Finkensports; dem ist aber nicht so, denn heute noch sieht man in Thale und Benneckenstein die kleinen Harzerbauerchen in weißem Stoff eingebunden am Fenster hängen mit dem Harzer-Reiter oder Groben Weida und anderen beliebten Schlägern. Auch findet jedes Jahr zu Pfingsten noch Finkenmanöver statt. Mein erster Fink war ein Reitscharfink; das ist nun schon lange her, und damals war ich noch kein Kenner.

Da verklärten sich des alten Herrn Züge, und sagte zu mir: „Wo haben Sie denn den Reitzugfi her?“ Nun wußte ich, daß es einer war, und wa stolz auf seinen Besitz. Doch sollte ich mich leide nur ein Jahr daran erfreuen. Der Vogel war wil und scheu. Ich stellte ihn schon Anfang April vor Fenster, nahm ihn abends jedoch wieder herein, un trotzdem hatte er nach ein paar Tagen Lungenen zündung und starb kurz darauf. Heute weiß ic daß ich solch einen Vogel wohl nie mehr bekomme werde. Er brachte auch am Ende den so beliebte Schnapper.

Doch es gibt auch noch andere edle Schläge die zu hören ein großer Genuß ist. Ich besitze je drei Finken, einen reinen Thüringer-Weinjahr un

Zwergmaskenweber
(s. S. 416).

Den Vogel erhielt ich hier in Erfurt von einem Fänger für wenig Geld, da der Fänger ebenso wie ich keine Ahnung hatte, was es für ein wertvoller Vogel war. Nach drei Tagen schlug der Fink, welcher vor dem Fenster stand, und zwar so eigenartig schön, daß ich mir sagte, das kann nur ein Reitzugfink sein, und richtig, ich sollte mich nicht täuschen, denn genau derselbe Schlag stand in dem kleinen Buch „Gefiederte Sängerfürsten“ von M. Rausch. Nun bat ich einen langjährigen Liebhaber, auch meine anderen Vögel einmal abzuhören, sagte ihm jedoch nichts von meinem kleinen Künstler, sondern dachte, der wird dir's schon selber sagen, wenn der Vogel schlagen wird. In der Stube orgelte eine Gartengrasmücke, und eine prima Schwarzplatte brachte ihre herrlichen Überschläge, und wie wir noch den beiden Sängern lauschten, da auf einmal erklang es vom Fenster her „Tiriririririririrararararararararareitschaar“, und wieder und wieder ließ der Fink seinen Schlag hören.

einen Weinjahr mit zwei Beischlägen, den weichen Vier undvierziger und den Düsterjöhr, und einen Harze groben Weida. Ich will versuchen, so gut es geh die Schläge wiederzugeben. Der Weinjahr geh Tiiiiiiiiiirrrröööööööörrrrjabjabjabjabweinjahr, de weiche Vierundvierziger klingt: ding ding ding dan dang dang dang vier viervierzigstesjahr, der Düsterjöhr „simbri gall gall gall Doktor Doktor Düsterjöhr“ der Harzer grobe Weida Zizizizizidödödödödöschorr schorrschorrweida. Das sind schöne Schläge un man kann sie immer wieder hören, stets ist es ei Genuß. Nun kommen aber noch andere beliebt Schläge im Thüringer Wald vor, der grobe Vier undvierziger und der Vierunddreißiger. Doch kan ich darüber nichts berichten, da Vögel mit diesen Schlag noch nicht in meinen Besitz gelangt sind Beide Schläge sind für den Finken sehr schwer, darun auch so selten. Ein alter Finkenliebhaber von hier Spezialist auf diesem Gebiete, besitzt herrliche Vögel

tets macht es große Freude, ihn von seinen Vögeln zählen zu hören. Ich war auch dieses Jahr ieder im Harz. Außer den beiden Schlägen, die) schon anführte, sind noch beliebt die kleine Weida id das Weizaptier. Heute kann mir auch kein Fink ehr an Lungenentzündung eingehen, und die Thüger Redensart „der Fink ist ein ärgerlicher Vogel" istiert nicht mehr bei mir. Wenn man ihn erst behandeln weiß, so wird auch der unbändigste ogel zahm. Einen dankbareren Vogel als unseren uchfinken gibt es nicht. Über Pflege will ich nichts richten, da selbige in Neunzig „Einheimische Stubenigel" genug erörtert ist. Der Käfig für den Finken ja im Harz ziemlich klein, am besten ist ein istenkäfig 50×22×30. Meine sind im Sommer 28 cm langen Wiener Zweisprungbauern und im Winter in dem größeren Kistenkäfig, wie angegeben. ätte ich genügend Platz, um größere Käfige vors enster zu stellen, so blieben die Finken auch im den letzten Höhenzug im Schneckentempo gemeistert hatten, und sich vor unseren Augen das herrliche Bild des von uns zum Ferienaufenthalt gewählten Städtchens Schwarzburg entrollte. Alle von uns auf der Fahrt genossenen Naturschönheiten konnten nicht in den geringsten Vergleich mit denen sich unseren Anblick bietenden gebracht werden.

Tief unten im Tale, in entzückender Anmut, erblicken wir Schwarzburg. Das schmucke Städtchen, mit seinen vorwiegend aus Holzfachwerk hergestellten und mit Schiefer bekleideten Häuschen mit ihren bunt durcheinander gewürfelten Balkons, bietet in seiner idyllischen Ruhe einen reizenden Anblick. Mitten durch den Ort windet sich wie ein silbernes Band die Schwarza. Die umliegenden Berge mit ihrem immergrünen Nadelwald geben dem Ganzen das Gepräge der Romantik.

Mit Recht führt diese Gegend den Namen „die Perle Thüringens". Keine andere Bezeich-

Kappenammer (s. S. 416).

ommer darin. Hoffentlich haben meine Zeilen ndere Liebhaber angeregt, auch einmal was von inken zu schreiben, insbesondere die westfälischen iebhaber, die in vielen Finkenvereinen organisiert nd.

Wenn Vogelliebhaber eine Reise tun, da können sie was erzählen.

Von Max Hunger, Leipzig.

(Nachdruck verboten.)

„Wer hat dich du schöner Wald, aufgebaut so ch da droben, wohl den Meister will ich loben so ng noch mein Stimm' erschallt — —!" Die Beisterung in den Worten des Dichters kann man recht verstehen, wenn man das Schwarzatal mit inen schier unergründlichen, tiefgrünen Nadelwäldern sehen hat.

Ein geheimnisvolles Rauschen geht durch die urten Kiefern- und Fichtenwälder, als wollten sie uns zählen von längst Vergangenem und Vergessenem, on Waffengeklirr und Siegesgeschrei, von Jagdgemmel und Liebesleid unserer Vorfahren — — —.

Im Banne dieses Eindrucks standen wir, als ir von Leipzig über Naumburg, Saalfeld kommend, nung dürfte so passend und zutreffend sein als diese.

Bald nimmt uns das am Ende des Ortes gelegene neue Heim auf. Das leise melodische Orgeln einer ausgezeichneten Gartengrasmücke schallt uns vom nahen Ufer der Schwarza als Willkommengruß entgegen und läßt unsere Liebhaberherzen höher schlagen.

Von unseren Balkons genießen wir einen schönen Ausblick nach dem allbekannten und vielbesuchten Trippstein und der im nahen Walde entschwindenden Schwarza.

Die Strapazen der langen Reise machen sich bald bemerkbar, und frühzeitig geht es zu Bett, um am nächsten Morgen neugekräftigt den ersten Ausflug zu unternehmen.

Der Montag findet uns auf einem Vormittagsausfluge um und durch Schwarzburg. Im felsigen Flußbett der Schwarza tummeln sich in buntem Gemisch die hier naturgemäß stark vertretenen gelben und weißen Bachstelzen. Auch die Gebirgsstelze oder graue Bachstelze ist vertreten. Der aschgraue Kopf und Rücken mit Ausnahme der weißen Augenbrauenstreifen, sowie die tiefschwarze Kehle lassen sie

sofort als solche erkennen. Am nahen Schloßberg läßt eine nicht besonders gute Singdrossel ihre grellen, das Ohr fast beleidigenden Rufe erschallen. Da — ein Eisvogel! Herr Chlodek ruft dies in großer Freude ob dieser seltenen Beobachtung aus. Wahrhaftig, dort sitzt er stumm, nur ab und zu den Kopf drehend, auf einem über das Wasser hervorragenden Steine und lauert, bis seine kleinen scharfen Augen irgend eine Beute erspähen. Sein buntes Gefieder gleist förmlich im Sonnenlichte. Das kleine Kerlchen bietet in seiner leuchtenden Farbe und seiner besonderen Gestalt, an welcher der lange, spitze Schnabel und das kleine Schwänzchen besonders auffallen, einen derart seltsamen Anblick, daß ihn jeder Mensch, der ihn zufällig erblickt, beachten muß. Ein Schwarzplättchen läßt seinen sehr hohen Überschlag in mehrmaliger Folge ertönen — — —.

Wir sind an unserem Ziele, dem Schwarzburger Schloß, angelangt. Leider ist nur das Zeughaus für die Besichtigung freigegeben.

Wie einexerziert sitzen sie nebeneinander und bitten in ihrem unscheinbaren grauen Kleid und den kurzen Schwänzchen einen reizenden Anblick. Der Alte hält ihnen einen Vortrag über die Anfangsstadien des Grasmückengesanges. Nicht weit davon lassen mehrere Rotkehlchen ihre feierlichen, anheimelnden Weisen ertönen. Drei Eichelhäher haben sich an einem umfangreichen Buchenstamme festgekrallt und streiten geräuschvoll um die soeben erwischte Beute. Einige Tannen- und Blaumeisen flüchten erschrocken ins dichte Gebüsch. Hoch in den Lüften, nach Raub ausspähend, zieht ein Mäusebussard majestätisch seine Kreise.

In den grüngolden schimmernden Buchenkronen ertönt das sanfte und weiche „Twitwiwi, tuituitui" des Fitislaubvogels. Dazwischen vernimmt man den monotonen Wechselgesang „zilp zalp, dilm dalm" des Weidenlaubsängers.

Wir sind hoch oben auf waldreicher Höhe, strichweise dazwischen Wiesen und Felder, angelangt.



Blauflügelsonnenvogel (s. S. 416).

Wir betreten das nicht allzu hohe, in gotischem Stile erbaute, früher als Kirche dienende Gebäude. Wohin man blickt, nichts als Waffen und sonstige Kriegswerkzeuge früherer Zeiten.

Erleichtert atmen wir beim Verlassen des Zeughauses auf. Dieses düstere, wie eine Fürstengruft anmutende Gebäude hat mit seinen stummen Zeugen früherer Schreckens- und Greueltaten auf uns einen tiefen nachhaltigen Eindruck gemacht.

Das läutende Glöckchen der nahen Kirche erinnert uns an die Mittagszeit, und frohgemut treten wir den Heimweg an, um den knurrenden Magen zu seinem Rechte kommen zu lassen.

Auf dem Nachmittagsausflug, der nach Burkersdorf und dem Helenensitz geplant ist, lernen wir den Vogelreichtum des Schwarzatales kennen. Das kribbelt und wibbelt, das singt und springt nur so in dem Geäst der Fichten und Kiefern und den fast undurchdringlich scheinenden Buchen und Brombeerhecken.

Große Mengen Jungvögel werden von uns beobachtet.

Da fliegt eine Gartengrasmücke auf und ab, ihre fünf auf einem Ast sitzenden Jungen eifrig fütternd.

Unweit von uns liegt Burkersdorf. Jubilierend steigt die Feldlerche empor, höher immer höher, um im blauen Äther zu verschwinden.

Die scheidenden Sonnenstrahlen, in deren Glanz Fliegen und Mücken ihr neckisches Spiel treiben, mahnen uns zur Umkehr. Das tourenreiche und melodiöse Lied einer Amsel begleitet uns auf dem Heimwege. Vollbefriedigt von all den schönen Beobachtungen begeben wir uns zur Ruhe.

Der grauende Morgen des Dienstag zeigt ein wenig erbauliches Gesicht. Bleischwer hängen die Regenwolken am Himmel. Wohin man blickt, bedeckt ödes Grau das Firmament. Nicht besonders ermutigend für den Naturfreund. Trotzdem wird der nach dem Trippstein und der Fasanerie geplante Ausflug in Angriff genommen.

Ein grauer Fliegenschnäpper mit fünf und eine Gartengrasmücke mit vier Jungen, beide fütternd, bilden eine Bereicherung unserer Beobachtungen.

Aus den Lüften hören wir die lieblichen zu Herzen gehenden Weisen zweier Heidelerchen herabschallen. Es ist ein Genuß, diesen kleinen Sänger zu lauschen, und ihr ergreifendes, von zarter Innigkeit getragenes Liedchen zu hören.

Da bemerken wir auch den Haussperling, hier in seltener Gast. An einem Kiefernstamme sehen wir ein rindengraues Vögelchen flink wie eine Maus herumklettern. Es ist der kleine Baumläufer mit einem langen, dünngebogenen Schnabel und den scharf zugespitzten Schwanzfedern, die er zum Anstemmen benutzt, um so seiner Insektenjagd ungestört obliegen zu können.

Durch das dichte Tannengestrüpp sehen wir vier, fünf, sechs kleine rostbraune Kerlchen huschen. Es sind junge Zaunkönige. Unser Herannahen hat sie aufgescheucht.

Wir sind auf dem Trippstein angelangt. Von hier aus bietet sich uns ein herrlicher Rundblick über Schwarzburg mit seinen Tälern und seinen Höhen. Der vor kurzem herniedergegangene Sprühregen hat aufgehört. Im Glanze der siegreich hervorbrechenden Sonnenstrahlen funkeln die Regentropfen wie Glasperlen. — — —

Die Fasanerie, die wir hierauf erreichen, bietet in ihrer launigen Abwechslung von Kultur und Wildnis ein Bild, welches für sich selbst spricht.

(Fortsetzung folgt.)

Die Nachtigall.

Von Karl Soffel, Ascona (Lago maggiore).

(Nachdruck verboten.)

Der Frühling war eingezogen, und mit ihm waren Farben und Lieder in die Welt gekommen. Längst hat das ja die Amsel laut gesungen, der Buchfink geschmettert, der Laubsänger gerufen.

Allerorten sind Blüten erwacht. An den Waldrändern haben sich Windröschen und Leberblümchen durchs Altlaub gearbeitet, und wenn mittags die Sonne hell und warm gegen die silbernen Buchenstämme prallt, leuchtet ein blauer Stern am andern. Rotkehlchen schnickern vorwitzig am Südrand der Vorhölzer herum, Grünspechte lärmen fröhlich darinnen, Eichkätzchen kratzen murksend die Stämme hinauf. Ein tiefes Summen ist in der Luft; ungezähltes Insektenvolk schwirrt und tanzt um blühende Wildobstbäume und schneeige Sträucher.

Besonders traulich aber ist es des Abends hier, wenn alles Geflügel nochmals laut wird, wenn Rotkehlchen seine süße Weise vom Fichtengipfel plaudert und die Schwarzdrossel in langen Pausen ihren Weihegesang hören läßt. Sie und der kleine Rotkopf sind die letzten.

Noch aber fehlt ein sehnsüchtig erwarteter Gast, der seit Menschengedenken alljährlich hier gewohnt und die Herzen erfreut.

Dann kam er endlich in einer dunklen Nacht.

Wenig hatte man erst von ihm gewonnen. War er doch von weither, über Berge und Meere zugereist, und gar müde und noch nicht wieder vertraut mit dem Lande seiner Kindheit.

Eines Spätabends aber, als längst die Amsel ausgesungen und im frühlingsjungen Auwald die Nacht mit Mondesstrahlen und Dämmerlicht ihre Zauber spann, war die Stunde gekommen.

Ich kam müde und nachdenklich das ungekannte Sträßlein herauf, von einem Totenhause her, wo ich viel Jammer und Angst miterlebt und miterlitten hatte.

Da drangen plötzlich, wie Stimmen aus einer andern Welt, lang anhaltende, zärtlich-sehnsüchtige Töne aus der Wirrnis der Jungbuchen und Feldahorne; erstarben, setzten von neuem ein, ordneten sich zu Strophen, die voller und voller tönten. Tief drangen sie mir ins wunde, zweifelnde Herz. Freudig verwundert blieb ich stehen, andächtig lauschte ich in die helle Nacht hinein, lauschte den wehmütig ziehenden Tönen, womit die Sängerin der Nacht ihr drängendes Lied begann, lauschte den schluchzenden, jauchzenden, auffubelnden Strophen, die mich einhüllten in lindes Vergessen und meine erschreckte Seele befriedeten. Ganz aufgeschlossen, ganz hingegeben dem Zauber der Stunde war mirs mit einem Male bewußt, was den kleinen Vogel bewegte und sein Lied begriff ich, daß vom Leid und Glück der Erde sprach. Von der Schönheit der Erde sang er in überquellender Dankbarkeit, von der Einsamkeit der Seelen und vom nächtlichen Dunkel, vom Vergehen und Sterben. Dann wieder träumte er wohl von der Gefährtin, die im Vorjahre hier mit ihm zusammen war, und seine kleine Kehle jubelte. Von unsagbarem Glück, von Liebe und Süßigkeit der Zweisamkeit, von stolzen Elternsorgen und Kämpfen erzählte die trunkene Weise, und alles war ein überschwänglicher Dank an das Leben, ein Dank für herbes und frohes Geschick, das den Sänger schon berührt.

Heimwärtswendend tönten mir noch lange die Hymnen des einsam-glücklichen Geschöpfes nach, die meiner Seele aufs neue Heiterkeit und Sicherheit schenkten, die mich versöhnten mit allem Harten der Erde, als mit einem Teil des Lebens, den wir nicht weniger lieben sollten, als alles goldene Glück.

Nur Mondnacht und Vogellied war die Welt, und Friede und Schönheit. Alles andere war ausgetilgt.

Kleine Mitteilungen.

Wiedehopf und Schwarzspecht in der Großstadt. Im Juli des Jahres erhielt ich von einem hiesigen Friedhofsgärtner ein schwerverletztes Weibchen vom Wiedehopf, das der Betreffende auf dem hiesigen Friedhof fand. Am 5. August fand ich an einem Drahtgeflechtzaun eines hiesigen Grundstückes, das nur noch wenigen Baumbestand aufweist, einen toten Schwarzspecht, der anscheinend gegen den Zaun geflogen war und an den erlittenen Verletzungen zugrunde gegangen ist. Rudolf Neunzig.

Milbenbekämpfung. Der unangenehmste Feind in der Vogelstube, Volieren oder Käfigen ist ja bekanntlich die Vogelmilbe. Wie viele Mittel habe ich schon angewendet, um diese Quälgeister von meinen Lieblingen fernzuhalten, aber alle Mühe vergebens. Petroleum, Benzin, Essigessenz und dergleichen wurde an den Käfigen verstrichen; nichts hat geholfen. In der „Gefiederten Welt 1924, Heft 38", auf das von der Chemischen Fabrik E. Merck in Darmstadt hergestellte Läusebekämpfungsmittel „Cuprex" aufmerksam geworden, wurde auch damit ein Versuch gemacht. Der Erfolg war tatsächlich überraschend. Die Anwendung des Cuprex ist sehr einfach. Holzkäfige bestreicht man mit der Flüssigkeit innen und außen, besonders die Ecken und Ritzen, und läßt sie in das Holz einziehen. Während der Behandlung sind natürlich die Vögel aus dem Käfig zu nehmen, damit sie durch die Cuprexverdunstung nicht belästigt werden. Es empfiehlt sich, sie auch möglichst erst am nächsten Tage wieder einzusetzen, nachdem das Präparat vollkommen verdunstet ist. Die Tiere selbst sollen nicht mit Cuprex behandelt werden. Die Enden der Sitzstangen werden ebenfalls mit Cuprex bestrichen. Milben und deren

Eier, die mit Cuprex in Berührung kommen, sind erledigt. Wenn man so die Käfige alle Herbst und Frühjahr mit einem Cuprex-Anstrich versieht und die Enden der Sitzstangen jede Woche einmal in Cuprex eintaucht, ist ein Aufkommen der Milben ausgeschlossen. Ein Stück Löschpapier mit Cuprex getränkt und hinter dem Nistkasten so angebracht, daß es ringsherum 1—2 mm hervorragt, verhindert den Milben den Zugang. In Drahtnester lege man ebenfalls bei Erneuerung des Nestes unter den Baustoff ein mit Cuprex getränktes Stück Löschpapier. Allen Vogelpflegern und Züchtern kann ich Cuprex warm empfehlen. Heinrich Erdmann, Darmstadt.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 20. Unter den Heuschrecken findet man sehr häufig solche, welche von Bandwürmern befallen sind. Diese erreichen ungefähr eine Länge von 15—20 cm und gleichen einem weißen Bindfaden. Können derartige Parasiten unseren Käfigvögeln von schädlichem Einfluß sein?
Anton Luginger, Pfarrkirchen.

Antworten.

Auf Frage 19. Grahammehl nennt man ungebeuteltes Weizenmehl, d. h. Weizenmehl, aus welchem die Kleie nicht entfernt ist. Ob dieses Mehl im Handel erhältlich ist, ist mir unbekannt. Man müßte es vom Müller oder aus Bäckereien beziehen, welche Grahambrot herstellen.
A. M., Kiel.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

Der 1. Vorsitzende des Reichsverbandes wird von seiten der Liebhaber mit Anfragen fachtechnischer Art überhäuft. Es läßt sich nicht umgehen, darauf hinzuweisen, daß diese Anfragen gern, aber nur den dem Reichsverbande angeschlossenen Mitgliedern, soweit Rückporto beigefügt ist, beantwortet werden. Alle übrigen Anfragen wolle man an die Geschäftsstelle richten.
J. A.: Petters.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Ed. Beicher, Aarau (Schweiz): blaue Wellensittiche, 3/4 blaue Wellensittiche, Surinamamazone, sprechend, Kalif. Schopfwachtelhahn.

Otto Didakowsky, Berlin N 4, Invalidenstraße 35: blaue u. rote Araras, Gelbstirnamazone, Gelbnackenamazone, Pavua-, junge Elfenbein-, Braunohr-, Grassittiche, Lieblicher Papstfink, Orangeblaufink.

Fluck, Bremen, Knoopstr. 39: Gelbnacken-, Mohrenkopfpapageien, Elfenbein-, Grassittiche, Bülbüls.

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a: Rötelmerle (Oroscirtetes erythrogaster), Blaurotschwanz (Phoenicurus frontalis), Klarino im Gesang, ind. Bergmeise, graublauer Fliegenschnäpper, Flötenwürger (Laniarius rufiventris), Maskenwürger (Lanius vittatus), Borstenhäherling (Janthocincla lineatum), Würgerschnäpper im Gesang, afrikanische Glanzstare, Liebliche Papstfinken (Lazulifink), Orangeblaufinken, Schnurrbärtchen, Angolaschmetterlingsfinken, Pavuasittiche, sehr brütlustig, St.-Thomas-Sittiche (C. pertinax), Tovisittiche, Elfenbeinsittiche, Mohrenkopfpapageien, Korallenschnabel-, Benguellapapagei.

Hermann Rath, Hamburg 4, Sophienstr. 34: Surinamazonen, Schwarzohrpapagei, 1 Taubenhalsamazone, Jamaikatrupiale, rote und blaue Araras.

Erich Richter, Bernstadt b. Herrnhut in Sachsen: 1,1 kal. Schopfwachteln, 5 junge desgl.

Max Schimang, München, Landsberger Str. 169: 1,1 Diamantfinken, gar. Paar, rein weißer Sperling.

Walter Voigt, Jena, Feodorastr. 13: 1,1 Singsittich, junge Kubafinken.



Herrn V. M., Elberfeld. Der Schwarzkappenammer ist einer der schön befiederten Ammern (s. Abbild. S. 413). Der Kopf ist tiefschwarz, der Rücken rostrot, die Unterseite gelb. Eine farbige Darstellung ist in der neuesten Auflage von „Einheimische Stubenvögel" zu finden. In Süd- und Mitteldeutschland ist er sehr selten beobachtet worden. Seine Heimat ist Südosteuropa, Kleinasien, Persien, Beludschistan. Er wechselt abweichend von den meisten andern Ammern das Kleingefieder zweimal im Jahr. Die in Deutschland in den Handel gebrachten Kappenammern wurden meist aus Istrien oder Dalmatien eingeführt.

Herrn L., Bremen. Der Blauflügelsonnenvogel (s. Abb. 414) ist, soweit bekannt, seit 1914 nicht mehr lebend nach Deutschland gelangt. Seine Züchtung war Herrn Apotheker Nagel gelungen. Der Blauflügelsonnenvogel gehört nicht derselben Gattung an wie der gemeine Sonnenvogel. Das am meisten in die Augen springende Unterscheidungsmerkmal ist, abgesehen von der verschiedenen Färbung, die Form des Schwanzes. Dieser ist beim Sonnenvogel ausgebuchtet und die äußeren Schwanzfedern sind nach außen gebogen, während der Schwanz des Blauflügelsonnenvogels seitlich gestuft ist, die vier mittelsten Schwanzfedern sind gleich lang. Auch die Bildung der oberen Schwanzdecken ist eine sehr verschiedene. — Der Zwergmaskenweber gehört zu den Webervögeln, welche in der Gefangenschaft leichter zur Brut schreiten als andere. Er ist im allgemeinen verträglich, nur am Nest ist er sehr angriffslustig (s. Abb. S. 412).

Herrn E. M., Berlin-Friedenau; Herrn O. G., Berlin W.; Herrn A. H., Köln-Holweide; Herrn v. Z., Berlin W.; Herrn P. E., Ohlau. Ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn A. L., Pfarrkirchen; Herrn E. K., Berlin SW.; Herrn K. F., Neukölln; Herrn H. E., Darmstadt; Herrn Prof. B., Leipzig-Mockau; Herrn W. Sch., Frankfurt a. M.: Beiträge dankend erhalten.

Herrn E. N., Seelow i. Mark. Der Vogel war ein ♂ Baumpieper.

Herrn H. W., Bremen. Der junge Gimpel ist verhungert. Das Weibchen hat jedenfalls die Jungen überhaupt nicht mehr gefüttert. Sicherlich wären die jungen Vögel aufgezogen worden, wenn das alte Männchen nicht eingegangen wäre. Wenn der Flugraum von dem Pärchen allein bewohnt worden wäre, wären die Aussichten auf eine erfolgreiche Züchtung selbstverständlich besser. Aber die Annahme, daß es überhaupt nicht möglich wäre, Gimpel in einem größeren Flugraum, den sie mit anderen Vögeln teilen, zu erfolgreicher Fortpflanzung zu bringen, ist nicht zutreffend. Die Züchtung ist auch unter diesen Umständen wiederholt gelungen. Mitteilungen über Massenawachteln und Krickenten in dem Außenflugraum sind sehr erwünscht.

Herrn A. D., Berlin. Die gesandte Arbeit werde ich gern veröffentlichen.

Herrn J. H., Fulda. Die Gartengrasmücke war ein Weibchen.

Herrn G., Neuulm. Der Vogel war ein Weibchen des Zuckervogels — Dacnis cajana.

Frl. A. G., Berlin. Das gereichte Futter ist nicht das richtige, um einen E. aufzuziehen. Geben Sie demselben so viel lebende Insekten (Engerlinge, Käfer, Schmetterlinge) und Würmer, wie zu erlangen sind, dazu Milchsemmel, Weißkäse, rohes Fleisch mit genanntem Universalfutter vermengt und mit Zusatz von präzipitiertem phosphorsaurem Kalk.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.

ıang 54 27. August 1925 Heft 35

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Ein Vogelheim. Von Rudolf Hermann.
Neueinführungen und Seltenheiten. Von K. Neunzig. (Forts.)
Meine Körnerfresser. (Forts.)
Kapuzenzeisig × Bluthänfling. Von Walter Schmelzer, Madrid.
Finkensport. Von Otto Pensler.
Wenn Vogelliebhaber eine Reise tun, da können sie was erzählen. Von Max Hunger, Leipzig.
Die Nachtigall. Von Karl Soffel, Ascona (Lago maggiore).
Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.) Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

utz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhaber-vereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10. Aufgenommen ist Mitgl. Nr. 164 n Herr G. P. Huckfeldt, Hamburg 15, Spaldingstr. 160. Angemeldet ist Herr Wilhelm Schinke, Hordorf Post Wendhausen in Braunschweig. — Der Vorstand sieht sich jetzt gezwungen, seine ganze Aufmerksamkeit dem Eingang der noch rückständigen Beiträge zuzuwenden, um für das nächste Jahrbuch disponieren zu können. Binnen kurzem werden die Mitgliedernummern veröffentlicht, die der Beitragspflicht noch nicht genügt haben. In angemessener Frist darauf werden die Beiträge durch Postnachnahme eingezogen. A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke, Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Restaurant „Zum Löwentor", Königswall 75.
J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung Freitags, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Blasewitzer Hof". Liebhaber willk. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Eliesenhof", Eliesenstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Versammlung jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinsl. „Parkhotel", Epinaystr. 1, und jeden letzt. Sonnabend im Monat im Vereinsl. „Stadt Chemnitz", Thomasstr. 57. Näh. Auskunft erteilt Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 1. September. A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber. Von den Mitgliedern hielten 32 keinen Vogel in der Gefangenschaft, 62 Mitglieder hielten zusammen 924 Vögel. Davon waren 459 ausländische Vögel. Von heimischen Vögeln wurden gehalten 220 Körnerfresser, 214 Weichfresser, 30 Kanarien, 1 Mischling, und zwar folgende Arten: a) Körnerfresser: 44 Zeisige, 35 Hänflinge, 31 Stieglitze, 25 Buchfinken, 16 Feldlerchen, 15 Dompfaffen, 11 Heidelerchen, 8 Grünfinken, 5 Feldsperlinge, 5 Girlitze, je 3 Leinzeisige, Haubenlerchen, Kreuzschnäbel, Bergfinken, 2 Berghänflinge, je 1 Haussperling, Goldammer, Kirschkernbeißer, 8 verschiedene. b) Weichfresser: 32 Rotkehlchen, 28 Mönchsgrasmücken, 22 Nachtigallen, 10 Amseln, je 8 Gartengrasmücken, Blaukehlchen, je 6 Tannenmeisen, Singdrosseln, je 5 Schwanzmeisen, Blaumeisen, Goldhähnchen, Kleiber, Heckenbraunellen, Gartenrotschwänze, je 3 Sumpfmeisen, Zaungrasmücken, Zaunkönige, Baumpieper, Dorngrasmücken, Gebirgsbachstelzen, Alpenbraunellen, je 2 Weidenlaubvögel, Haubenmeisen, Kohlmeisen, weiße Bachstelzen, je 1 Sumpfrohrsänger, Waldlaubvogel, Fitislaubvogel, Gartenspötter, Wiesenpieper, Wiedehopf, Flußregenpfeifer, Sprosser, Turmfalk, Trauerfliegenschnäpper, Braunkehlchen, Sperbergrasmücke, Star, Rohrdrossel, 21 verschiedene. Heinz Appel

Der Hannoversche Vogelschutzverein zu Hannover, gegr. 1881, wirkt mit sichtbarem und anerkanntem Erfolge für Vermehrung und Schutz der Vogelwelt bei Hannover durch Aufhängen von jährlich einigen hundert Nistkästen aller Art, durch Erweckung von Interesse und Liebe für die Vogelwelt mit monatlich, zur Gesangszeit wöchentlich stattfindenden Belehrungsspaziergängen und durch Vorträge und Austausch der Beobachtungen in den jeden dritten Dienstag des Monats stattfindenden Vereinsversammlungen. Seine Bestrebungen dienen also lediglich gemeinnützigen Zwecken. Mitgliederzahl rund 1200, jährlicher Beitrag nur 1 M. Meldungen an den Vorsitzenden Herrn Fritz Becker, Hannover, Boedekerstr. 1 F.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste willk. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Vereinsabend regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends um 8 Uhr) beim 1. Vors. Herrn Jahn, Feodorastr. 7. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. Adolf Voigt, Schriftf.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumerstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 2. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch in Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an.

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereins „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Unsere nächste Vereinssitzung findet infolge der Messe nicht in unserem Vereinslokale, sondern am 3. September im Restaurant Posthörnchen, Querstraße, statt. Auswärtige Liebhaber welche zur Messe in Leipzig weilen, sind herzlich willkommen. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl. „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 3.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Normast im „Kaiser Friedrich" Breslauerstr. 50. Liebhaber willkommen. J. A.: Friedrich

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße.
gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 4

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseit

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Sitzung aller 14 Tage im Restaurant „Zum Neckarstrand", Messeplatz 1. Liebhaber willkommen. Joh. Daubmann, Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Versammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Liebhaber willk. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebenda. R. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Derselbe hielt nach einigen Wanderversammlungen — von denen eine wegen anhaltenden Regens, der wider Erwarten kam, unausgeführt blieb, auf denen aber mit einer Ausnahme stets ein Vortrag des 1. Vorsitzenden angekündet war, den derselbe dann aber wegen zu geringer Beteiligung nicht zu Gehör brachte — am 14. d. Mts. wieder einen Vortragsabend im Vereinslokal „Sächsischer Hof" ab. Die Versammlung eröffnete und leitete für den von der Reise gekommenen 1. Vorsitzenden der 2. Vorsitzende Werkmeister Mann. Nach kurzer Begrüßung der Erschienenen durch Herrn Mann begann der Vortrag. Denselben hatte der in Kanarienvogelzüchterkreisen nicht unbekannte Herr Weise über „die Krankheiten unserer Lieblinge, ihre Verhinderung und Heilung" freundlicherweise übernommen. Mit großer Sorgfalt und stillem Eifer ist Herr Weise, der nebenbei Vorsitzender eines Kanarienvereins ist, seinem Thema längere Zeit nachgegangen. Dabei kamen ihm seine gesammelten Erfahrungen bei seiner Großzüchterei von Kanarien zustatten. An Empfehlungen prophylaktischer Maßnahmen und anzuwendender Mittel bei der Behandlung und Pflege unserer Stubenvögel vor und während ihrer Erkrankung ließ es der Sprecher nicht fehlen. Näheres zu erwähnen läßt der kurze Raum nicht zu. Der ganze Vortrag war durchweht von Verständnis und Liebe zu unseren Pfleglingen. Anerkennung wurde Herrn Weise allseitig zuteil. Eine kurze Aussprache diente der weiteren Klärung. Unter dem Punkt „Verschiedenes" wurde dem Wunsche des Versammlungsleiters, mit dem Leipzig-Schl. Vogelverein im September in Wermsdorf ein Stelldichein zu veranstalten, zugestimmt. Nach Erledigung verschiedener geschäftlicher Angelegenheiten wurde die Versammlung gegen 11 Uhr geschlossen. — Der Verein ist gegründet am 1. Mai 1922 und veranstaltet monatlich einen Vereinsabend mit Vortrag und eine gesellige Zusammenkunft. In der Praxis blieb es nur bei dem ersteren. Vereinslokal ist der „Sächsische Hof". Den gegenwärtigen Vorstand bilden Studienrat Professor Jahn, 1. Vorsitzender; Werkmeister Mann, 2. Vorsitzender; Lagerhalter Fritzsche, 1. Schriftführer; Werkmeister Köhler, 2. Schriftführer; Pensionär Koch, Kassierer. Dazu kommen 4 Beisitzer: Kassenrevisor Echost, Postbote Schulze, Werkmeister Wemme und Ehrenmitglied Herrmann sen. Der Verein ist mit etwa 40 Mitgliedern im Mai ins neue Geschäftsjahr eingetreten. Studienrat Professor Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

e viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per ief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Schindler-Käfige

Stck. 45×30×23 cm à Mk. 10.— Stck. 65×30×33 cm Mk. 15.— Stck. 72×30×33 cm Mk. 20.—, alle Weichfresser, 1 Stck. 45×30×23 cm Finken Mk. 10.— Sämtl. Käfige sind in und weiß lackiert, gut erhalten u. ständig ausgerüstet. 1 **Spitzdach-fig,** 40×44×20 cm, Eichen lackiert k. 10.— **Mehlwurmkiste** mit Inhalt Mk. 8.—

Ornitholog. Bücher

unzig, Fremdl. Stubenvögel 5. Aufl.). neu Mk. 25.— Neunzig, Einheim. ubenvögel 6. Aufl. geb. wenig genucht Mk. 10.— Bengt: Mit den ugvögeln nach Afrika, neu Mk. 5.— olf: Vögel der Heimat, neu, Mk. 3.— hacht: Vogelwelt, neu, Mk. 5.— hlag: Der Dompfaff, neu, Mk. 1.— üller: Am Neste, Mk. 1.— Brehms: e Singvögel, neu, Mk. 1.— Ruß: ndbuch f. Vogelliebhaber. Fremdl. ögel (1871) Mk. 3.— Ludwig: Wonschrift fremdl. u. einheim. Vögel, ntl. erschien. Hefte mit Originaldecke Mk. 6.—

gen Nachnahme, Porto extra, Verpackung frei.

irsch- und Rehgeweihe nehme in Tausch. [1111

Egon Schmitz, Duisburg, Prinzenstraße 36.

eue Voliere mit Tisch

legbar, 100×100×125 (ohne Tisch), Preis zusammen 75 M.

otköpf. Tarant., erprob. Zuchtpaar, stlustig, 25 M., kräftige Nachzucht von ingelben u. grünen **Wellensittichen.**

Suche: Farbenwellensittiche, Nymphensittiche, tausche auch.

Frau Klara Neugebauer, Wellensittich-Züchterei, **Deutsch-Lissa.** [1112

ußringe f. Wellensittiche

ierreicht in Qualität, Spezialerzeugnis, rner **Wellensittiche** in allen Farben, ch **blaue** u. blaublütige, sowie **weiße** u. schieferblaue Kanarien empfiehlt **C. Balser, Fulda.** [1113

„KAPPEL"

Schreibmaschine

Erstklassiges Erzeugnis ∴ ∴ Strapaziermaschine

Letzte Neuerung:
Geräuschloser
Wagenrücklauf

Maschinenfabrik Kappel A.-G.
Chemnitz-Kappel

Anzeigen in der Gef. Welt haben guten Erfolg

Vogel-Mistelleim

zum Fangen schädlicher Vögel, **I a** klebend bei jeder Witterung, garantiert gebrauchsfähig, Dose 2.— M. fr. von **A. Freitag Nchf., Frankenberg i. S. 6.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [1114

Ia Mistelleim,

echt laubgrün, liefert in anerkannt vorzüglichster Güte [1115 **Adolf Kirschner, Arnsdorf-Haida, (Böhmen), Roseggerstr.** Probesendungen geg. Einsend. v. Mk. 2.— Wiederverkäufer Vorzugspreise.

Heidelberger Vogelfutter

Braune Packung für Erdsänger u. ä. Vögel 250 g 2.75
Graue Packung f. Grasmücken 250 g 1.70
Blaue Packung für Drossel 250 g 1.10
empfiehlt
Arthur von Ende, [1116
Zoologische Handlung,
Jena (Thüringen), Magdeslitieg Nr. 55.

Ein Versuch

überzeugt jeden von der Güte meines **Universalfutters.** Preis 2 M. p. Pfd. Sämtliche Futtersorten für Exoten, Wald- und Kanarienvögel zu billigsten Tagespreisen. Versand geg. Nachnahme. Verpackung und Porto werden billigst berechnet. [1117

P. H. Kirsten, Leipzig 3, Zeitzer Str. 53. Fernruf 31445.

Vogelfutter [1118

für **Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser.** Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,

Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Mehlwürmer Ia Pfd. 5.— ℳ (ohne Spesen) ½ Pfd. 3.— ℳ frk. Voreinsend. **Jeitner, Breslau,** Weinstr. 12. [1119

Frische Ameiseneier

à Liter 3.00 Mark, franko.

Ia tro. dtsch. Ameiseneier

à Liter 1,80 M., Pfd. 5 M. fr.
Ia Muska (Zecke) à Pfd. 2.50 M. fr.
Ia Weißwurm à Pfd. 4.50 M. fr.

Mehlwürmer

vegetarisch gefüttert, ¼ Pfd. 1.50 M., ½ Pfd. 3.00 M., 1 Pfd. 5.60 M. Franko geg. Voreinsend. des Betrages.

Th. Witte, Niederndodeleben bei Magdeburg. [1120

Mehlwürmer

(Versand beginnt Anfang Oktober)
Ia Ameiseneier Pfund 5.00 M.
Ia Muska-Zecken Pfund 1.80 M.
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen Pfd. 0.65 M.

Die Preise sind freibleibend, ab Lager, ohne Porto und Verpackung. Bei Anfrage Rückporto beifügen. [1121

Bei größerer Abnahme hoher Rabatt.

Karl Claus, Mutterstadt II (Hauptbahnhof).

Ia Ameiseneier

Pfund 5.00 M.

Ia Muska-Zecken	à Pfd. 2,—
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen	à Pfd. 0,75
Ia Garnelen, gem.	à Pfd. 0,35

Ia Universalfutter

Alectwa I für Nachtigallen 2.— M
„ II für Grasmücken 2.— M
„ III für Drosseln 1.50 M

Proben und Analysen zur Verfügung. Vertreter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [1122

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser

A. Eckrich II, Waldsee (Pfalz).

Ameiseneier

prima Ware, à Liter 2.50 M., à Pfund 6.— M., hat abzugeben [1123

Fritz Schwegler, Weißenburg i. B., Pflastergasse 19.

Ia Moselweißwurm

à kg 5.— M. gegen Nachnahme.
Müller-Liebfried, Nehren bei Eller (Mosel). [1138

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark ¼ Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [1124

Sämtliche Vogelsaaten

in [1125

hervorragender Beschaffenheit

liefert zu vorteilhaften Preisen in großen und kleinen Posten

Hugo Schütze, Eystrup (Weser)

Fernruf: Eystrup Nr. 1 u. 23, Postscheck-Konto 5715 Hannover.

Preisliste verlangen.

„ORNIS"

Freie Bezugsvereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands.
Gegründet 1912 ∴ Fernsprecher 4198 [1126

Fachgemäße Belieferung mit Vogelfutter („Reform-Normal", individuelle Zusammensetzung bei restlosem Verbrauch; stets frisch gemischt). Hunderte von Liebhabern füttern seit über einem Jahrzehnt mit bestem Erfolg nur „Reform-Normal".

Reform-Normal-Käfige Mod. ORNIS 1925, neue Preisliste erschienen. — Modern eingerichtete Käfig-Bauanstalt mit elektrischem Betrieb.

Anschrift: Ornis-Haus, Halle-Saale. Der Geschäftsführer: Martin Sperling.

Bei Anfragen und Bestellungen bitten wir, sich auf die „Gef. Welt" zu berufen

Offeriere in gesunden gutbefiederten Exemplaren

Große Gelbhauben-Kakadus

Stück 50.— Mark

Kleiner Gelbhauben-Kakadu	35.—
Blaustirniger Zwergara, sprechend und zahm	50.—
Mohrenkopf-Papagei	40.—
Katharina-Sittiche à Paar	22.—
Tarantiner Unzertrennliche à Paar	18.—
Kleine Alexander-Sittiche, Weibch. à Stück	7.—
Feuerflügel-Sittiche à Stück	17.50
Grüne und gelbe Wellensittiche, halbausgefärbt à Paar	10.—
ditto, alte Zuchtpaare à Paar	12.—
Afrikanische Glanzstare à Stück	8.—
Afrikanische Turteltäubchen à Paar	6.—
Stahlfleckentäubchen à Paar	6.—
Kaptäubchen à Paar	5.—
Rote Kardinäle à Stück	28.—
Dominikaner-Kardinäle à Stück	7.—
Mexikan. Baumwachteln à Paar	22.—
Afrikanische Schwarzelster à Stück	10.—
Paradieswitwen, in voller Pracht à Paar	6.50
ditto, ohne Pracht à Paar	4.—
Dominikanerwitwen, i. voll. Pracht à Paar	8.—
ditto, ohne Pracht à Paar	4.—
Blutschnabelweber, i. Pracht à Paar	4.—
ditto, ohne Pracht à Paar	2.50
Zwergmaskenweber, Männchen, in Pracht à Stück	6.—
Afrikanische Goldsperlinge à Paar	6.—
Kleiner Textorweber, in Pracht à Stück	8.—
Atlasfinken, in Pracht à Paar	4.—
ditto, ohne Pracht à Paar	2.50
Schwarzkopfnonnen à Paar	4.—
Goldbrüstchen à Paar	5.—
Zebrafinken, Hähne à Stück	6.—
Bandfinken à Paar	4.—
Grauastrilde, Amaranten, Orangebäckchen, Silberschnäbel à Paar	3.—
Klein-Elsterchen à Paar	4.—
Edelsänger à Stück	2.50
Großer Gelbbrust-Ara in Prachtgefieder, ganz zahm, frei auf Ständer nur	150.—
Prachtvolle, gutgenährte, im Pelz vorzügliche Resus-Affen Stück	50.— u. 60.—
Kl. zahme Kapuziner-Affen Stck.	85.—

Für lebende Ankunft sowie reellste Bedienung wird Garantie übernommen.
Verpackung und Porto 3.50 Mark, Dringend 6.50 Mark. [1127

Paul Tzornack,

Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189.

Rohmaterial

zur Herstellung von **Weichfutter** für **Insektenfresser** liefert billigst [1128

H. Pullich,
Langen 8 bei Frankfurt am Main.

Goldfinn-Sittiche

(Brotogerys chrysopogon)
(Columbien)
Paar 15.— Mark. [1129

A. Mumme, Bremerhaven.

Ia Kalanderlerche

hochprima Davidsprosser, ditto Nachtigall, ditto laut singendes Blaukehlchen, ditto Heidelerche, ganz erstklassige Singdrossel mit herrlichen Rufen vertausche ich gegen Schama, Klarino, Graupapagei usw.

Otto Neupert, Breslau, [1130
Kospothstr. 21.

Meyer-Papagei ♂

(Mohrenkopf) sehr selten, pa. Vogel, sehr gutes Gefieder, gut eingewöhnt, **Gelegenheit für Zoo,** verkauft

A. Brandt, Berlin-Grunewald, 1131] Im Eichkamp 12.

Verkaufe:

Brehms Tierleben, ganz neu, 6 Bde., 25 M., oder tausche gegen 6 Pfd. prima deutsche trockne Ameisenpuppen.

Otto Pensler, Erfurt, Nerlystr. 5 III. [1132

Vertausche

diesj. aufgepäppelte zutrauliche

Haubenlerche

(unbek. Geschlechts)
gegen singenden Graudelsänger oder Mönchen. [1133

Schmidt, Wittenberg

(Bezirk Halle)
Kurfürstenstraße 41 I. A.-Z.-Mtgl. 346.

Blaustirn-Amazone,

ganz zahm, etwas sprechend, jung, tadellos, 45 Mark.
Porto und Verpackung frei. [1134

A. Mumme, Bremerhaven.

Einige schöne, kräftige

Stieglitz-Kanarien-Bastarde,

fleiß. studierend, verkauft [1135

A. Völker, Stettin, Schnellstr. 7.

Umstände halber verkaufe sofort meine Ia Schama an schnell entschlossenen Käufer für 45 Mark.

Bruno Schober, Geibsdorf, Kreis Lauban. [1136

Himmelblaue Wellensittiche

1,0 reinblau mit 0,1 blaublütig (Geschwister reindl.) 95 M. [1137

Blaublütige Paar 50 M., diesj. Brut.

A. Mertes, Mainz, Wallaustr. 62.

Carl Hagenbeck's Tierpark

Stellingen bei Hamburg

offeriert freibleibend folgende fest an Körnerfutter gewöhnte, seit längeren importierte Vögel:

Aras, fingerzahme, teils sprechende Vögel.

Ararauna	Stck. M 1
Grünflügel-Aras	„ „ 17
Gelbflügel-Aras	„ „ 17
1 Zuchtpaar Gelbflügel-Aras, ungewöhnl. schön u. groß Paar	„ 4

Auch andere Arten vorrätig.

Kakadus.

Molukken-Kakadus	Stck. M 2
Weißhauben-Kakadus	„ „ 2
Rosa-Kakadus	„ „
Inka-Kakadus	„ „ 1
Feuerhauben-Kakadus	„ „ 1
Gelbhauben-Kakadus	„ „

Amazonen.

Doppel-Gelbkopf-Amazonen	„ „
Müller-Amazonen	„ „
Rotmasken-Amazonen	„ „
Kleine Gelbkopf-Amazonen	„ „
Panama-Amazonen	„ „
Blaustirn-Amazonen	„ „

Papageien.

Graupapageien	„ „ 1
Schwarzohr-Papageien	„ „
Gelbschnabel-Papageien	„ „

Edel-Papageien.

Edel-Papageien	Paar „ 20
Schwarzschulter-Edel-Papag.	Stck. „
Müller's Edel-Papageien	„ „ 7

Loris.

Gelbmantel-Loris (Domicella garrula)	„ „ 8
Blaunacken-Loris (Domicella cyanauchen)	„ „ 10
Erz-Loris (Domicella atricapille)	„ „ 8
Rote Loris (Eos rubra)	„ „ 8
Kapuzen-Loris (Eos riciniala)	„ „ 8
Breitbinden-Loris (Trichoglossus cyanogrammus)	„ „ 8
Schmuck-Loris (Trichoglossus ornata)	„ „ 8
Gebirgs-Loris (Trichoglossus novaehollandiae)	„ „ 9
Schuppen-Loris (Psitteuletes chorolepidotes)	„ „ 9

Sittiche.

Guyana-Sittiche	„ „ 3
Guayaquil-Sittiche	„ „ 8
Nanday-Sittiche	„ „ 3
Goldmasken-Sittiche	„ „ 1
Mönchs-Sittiche	„ „ 1
Große Alexander-Sittiche	„ „ 2
Kleine Alexander-Sittiche	„ „ 1
Afrik. Halsband-Sittiche	„ „ 1
Bart-Sittiche	„ „ 2
Pflaumenkopf-Sittiche	„ „ 2
Adelaide-Sittiche	„ „ 8
Rosella-Sittiche	„ „ 5
Elfenbein-Sittiche	„ „ 2
Sperlings-Papageien	Paar „ 1

Versand per Nachnahme.
Porto und Verpackung M 3.—,
Dringend M 6.—. [113

Inserate

für das am 3. Sept. 1925 zu Ausgabe gelangende Heft 36 der Gef. Welt erbitten bis 29. August

Nachruf!

Am 2. August 1925, morgens 5 Uhr, verstarb unerwartet infolge Unglücksfalles unser Vereinsmitglied

Bruno Jux

im blühenden Alter von 22 Jahren.

In dem Entschlafenen verlieren wir ein wirklich eifriges und treues Mitglied. [1139

Wir werden ihm ein dauerndes und ehrenvolles Andenken bewahren.

Verein der Vogelliebhaber von Dortmund u. Umgegend.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 3. September 1925 | Heft 36

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Vom Sperlingskauz.

Von Max Sandner.

(Nachdruck verboten.)

Vorausschicken möchte ich, daß ich mich seit mehr als zwei Jahrzehnten hauptsächlich mit der Pflege solcher Vögel befasse, die nur selten in der Gefangenschaft gehalten werden und deren Freileben — nicht zuletzt eben deshalb — noch manch Unerforschtes bietet.

Es war schon lange mein Wunsch, mich einmal mit dem Sperlingskauz (Glaucidium passerinum *Linn.*) (Zwergeule) näher zu befassen. Im vorjährigen Sommer, Ende Juli, gelang es mir, den auch in Tirol ziemlich selten gesehenen Vogel auf einer Gebirgswanderung im oberen Inntal auf zirka 1800 Meter Höhe genauer zu beobachten. Die damals eben ausgeflogenen Jungen wurden noch von den Alten gefüttert, und dies dürfte auch der Grund gewesen sein, warum ich die ganze Gesellschaft in den noch frühen Abendstunden beobachten konnte. Leider fand ich damals weder die Nisthöhle, noch gelang es mir, eines der noch verhältnismäßig zahmen Jungen zu fangen. Immerhin hoffte ich, da ich nun wenigstens einen Standort wußte, heuer die Nisthöhle zu finden. Schon im zeitigen Frühjahr begann ich mit der Suche. Mitte Juni, als ich wieder einmal in dieser Gegend unter einer besonders hohen Gebirgslärche rastete, fiel etwas vor mir auf die Erde. Ich schaute danach und, bald hätte ich vor Freude gejauchzt, es war das Gewölle eines Sperlingskauzes. Vorsichtig spähte ich umher, konnte jedoch vorerst nichts bemerken. Als ich an den Stamm der Lärche klopfte, sah ich in zirka 20 Meter Höhe einen Sperlingskauz abstreichen. Mittels des „Zeiß" konnte ich auch bald ein Baumloch entdecken. Nun dachte ich mir gewonnenes Spiel. In der ersten Freude übersah ich die kommenden Schwierigkeiten. Wie ich später feststellte, war das Nistloch in 14 Meter Höhe auf einer Hochgebirgslärche, die bis zu dieser Stelle keinen Ast hatte. Auch wegen des großen Umfanges war an ein gewöhnliches Erklettern nicht zu denken. Merklich gedämpft in meiner ersten Freude mußte ich, da es inzwischen stark dämmerte, zur Bahn und heim. In den nächsten Tagen erwog ich alle möglichen Pläne, wie ich mich am besten ausrüsten könnte, um das Nest zu erreichen. Ich entschied mich, mir die für das Ersteigen der Telegraphensäulen gebräuchlichen Steigeisen auszuleihen und nahm noch für alle Fälle mehrere starke Drahtstifte und ein Seil mit. Säge und Baumhacke wurden nicht vergessen. So machte ich mich am 20. Juni auf den Weg, denn es schien mir höchste Zeit, wenn ich nicht wieder zu spät kommen sollte.

Unter großer Anstrengung gelang es mir, die Lärche zu erklimmen. Beim Ersteigen stieß mich der männliche Kauz zweimal am Kopfe an! Endlich war ich oben. Die Nisthöhle, scheinbar die des mittleren Buntspechtes, hatte ovalen Einschlupf, der wegen des stark fließenden Peches ganz mit kleinen Federn ausgekleistert war. Nachdem ich mich angebunden hatte, begann ich mit Hacke und Säge das Nistloch so zu erweitern, daß ich mit der Hand hinein konnte. Zitternd vor Anstrengung und wohl auch Aufregung griff ich hinein und merkte mit Bedauern, daß drei eben geschlüpfte Junge und mehrere Eier darinnen waren. Ich war also, trotzdem wir den 20. Juni schrieben, zu früh daran! So gut ich konnte, reinigte ich die Nisthöhle von den hineingefallenen Holzsplittern und kletterte wieder herunter. Da es inzwischen Zeit zur Heimkehr war, konnte ich mich nicht mehr versichern, ob die Alten diese grobe Störung nicht mit dem Aufgeben des Nestes beantworteten, sondern mich nur mit meiner Erfahrung trösten, daß Nester, in denen die Jungen, wenn auch noch so schwach, rufen, von den Alten nicht verlassen werden; und „gezirpt" hatten meine jungen Käuze schon. Einige Tage später konnte ich auch bei vorsichtigem Anpirschen feststellen, daß die Alten weiterfüttern.

Ich setzte nunmehr den 3. Juli, also 13 Tage nach dem ersten Versuch, als den Tag des endgültigen Nestausnehmens fest. Unter ähnlichen Schwierigkeiten wie das Erstemal kam ich zur Nisthöhle; diesmal wegen eines um den Kopf gebundenen, grellen Tuches nicht verfolgt. Das Einschlupfloch war neuerdings mit Federn ganz ausgekleidet. Im Neste lagen 5 Junge und 10 Eier, ein Beweis, daß diese Brutstätte schon öfter benutzt wurde. Ich nahm 3 Junge und die Eier mit, die 2 kleinsten Jungen ließ ich zurück, einerseits weil ich die Vögel aus der Gegend nicht vertreiben wollte, anderseits weil ich für meine Zwecke mit 3 Jungen genug hatte.

Aus allem möchte ich nun nachstehende Folgerungen ziehen: Der Sperlingskauz nistet nach dieser und der vorjährigen Erfahrung, bei uns wenigstens, sehr spät. Die Jungen werden vor Mitte Juli nicht flugfähig. Er dürfte in der Regel 5 bis 7 Eier legen, woraus man den weiteren Schluß ziehen könnte, daß er häufiger vorkommt, als man glaubt. Meiner Überzeugung nach ist er auch in den Alpenländern kein wirklich seltener Vogel; lediglich seine ausgesprochene nächtliche und stille Lebensart macht ihn zu einem wenig beachteten Vogel. Erst wenn die Jungen viel Futter brauchen, dürfte er auch in den frühen Morgen- und Abendstunden umherstreichen. Ich wenigstens hörte oder sah ihn auch in früheren Jahren nur um die Mitte des Monat Juli herum. Weiter läßt sich aus den von mir zahlreich vorgefundenen Gewöllen und auch aus den oben erwähnten Federn am Nistloch mit Sicherheit und in Übereinstimmung mit den Andeutungen in der Literatur annehmen, daß er ein ausgesprochener „Räuber" ist. Ich halte ihn nach seinem Vorkommen und den deutlich erkennbaren Federn des Gewölles für den Hauptfeind des Goldhähnchens.

Das Aufpäppeln geht mühelos vor sich, wenn man nur genug Futter hat. Um „Kinderkrankheiten" zu vermeiden, füttere ich möglichst naturgemäß, d. i. Mäuse und Spatzen. Meine 3 Jungen sind daher schon voll entwickelt und selbständig, zum Unterschied von ihren 2 Geschwistern in der Freiheit, die, wie ich mich kürzlich überzeugte, ihr Nest noch nicht verlassen haben. Ich kann mir allerdings nicht denken, wie die Alten die große Menge Futter, die ich zur Aufzucht verwendete, bei ihrer Lebensweise zustande bringen könnten. Heut, wo meine Jungen schon fertig sind, hat ihr Hunger bedeutend nachgelassen. Ich füttere seither wegen des „angenehmeren Betriebes" auch nicht mehr so „naturgemäß", sondern in der Hauptsache mageres Fleisch bzw. Herz, Heuschrecken und Mehlwürmer. Zirka 5 dkg und eine Hand voll Heuschrecken oder Mehlwürmer täglich genügen für meine 3 Käuze. Das Fleisch bespicke ich wegen der notwendigen Gewöllbildung mit den gerade jetzt genug herumfliegenden Federn meiner übrigen Vogelstubenbewohner. Durch das frühe Alter, mit welchen ich die Sperlingskäuze in meine Pflege nahm, sind sie auch, was bei Nachtvögeln nicht so selbstverständlich ist, vollständig zahm und daher reizende, sehr angenehme Pfleglinge geworden. Jeder, der meine Vogelstube besucht, ist geradezu begeistert über ihr Gehaben. Eine, wenn auch nicht ganz erklärliche, so doch sehr angenehme Erscheinung möchte ich noch erwähnen: während sich manche Stubenvögel z. B. an den Aufenthalt des Würgers im gleichen Raume nicht gewöhnen können, bemerkte ich nicht die geringste Scheu meiner übrigen gefiederten Stubenbewohner vor den Käuzen. Ein ihnen knapp gegenüber gekäfigter Zaunkönig z. B. treibt sein munteres Wesen ruhig weiter und läßt sich in seinem fleißig vorgetragenen Liedchen nicht im geringsten stören. Auch nachtsüber herrscht vollständige Ruhe bei allen übrigen Käfiginsassen. Mag sein, daß die möglichst naturgemäße, daher auch sehr geräumige Käfigung meiner Vögel (ich halte, wie eingangs erwähnt, Stubenvögel nicht nur des Gesanges wegen) ihnen ein größeres Sicherheitsgefühl gibt; Tatsache ist jedenfalls, daß keiner meiner übrigen Mitbewohner der Vogelstube seine Zahmheit und sein liebenswürdiges Benehmen der Käuze wegen aufgab.

Von meinen Prachtfinken.

Von Rudolf Reunzig.

(Nachdruck verboten.)

In meiner Vogelstube leben seit einiger Zeit eine Anzahl afrikanischer und australischer Prachtfinken. Unter ihnen befinden sich etliche, die in dem Rufe stehen, besonders heikle und empfindliche Pfleglinge zu sein. Über die Pflege dieser Vögel ist schon sehr viel geschrieben worden, und doch lohnt es sich immer, Erfahrungen in Pflege und Zucht niederzuschreiben, um ein Gesamtbild über die Pflege der einzelnen Vogelart zu gewinnen. Häufig stehen sich die Urteile der Vogelpfleger in krasser Form gegenüber, die Erfahrungen des einzelnen sind eben recht verschieden. Und so ist es in diesem Falle. Die Eingewöhnung und Pflege dieser allgemein als weichlich geltenden Vogelarten machte weit weniger Schwierigkeiten als die der allgemein im Handel befindlichen Nordwestafrikaner. Die natürlichen Verhältnisse sprechen auch dafür. Die südafrikanischen und australischen Vögel, abgesehen von nordaustralischen, besonders letztere, leben in einem Klima, das dem unseren näher kommt als das von Senegambien und Abessinien, welche Gebiete dem Aquator näher liegen als Transvaal oder die gemäßigten Teile Australiens. Ferner sind die Verhältnisse, unter denen jene seltener im Handel befindlichen und daher teueren Vögel zu uns gelangen, für den Gesundheitszustand dieser weit günstiger, weil sie in geringerer Anzahl in verhältnismäßig geräumigen Transportkäfigen zu uns gelangen, und der Pfleger des Transportes sich mit ihrer Betreuung weit mehr abgibt als mit jenen billigen Nordwest- oder Nordost-Afrikanern, die häufig zu Hunderten einen kleinen Transportkasten bewohnen. Die Übersicht ist schwierig, auf die Pflege wird weniger Wert gelegt. Wasser und Futter sind dem Verderben und dem Beschmutztwerden weit mehr ausgesetzt. Die ersteren dagegen werden schon in ihrem Heimatland gekäfigt und von meist erfahrenen Pflegern eingewöhnt. Allerdings ist ihre Reise länger und sie sind dem Temperaturwechsel, namentlich bei der Durchquerung der tropischen Zone, weit mehr ausgesetzt. Dem Gesundheitszustand des Vogels sind schlechte Verpflegung, schlechtes Futter und Wasser, schlechte Durchlüftung des Behälters und namentlich die Wärme desselben, die durch das Zusammensein so vieler Vögel von diesen ausgestrahlt wird, weit abträglicher als der Temperatur- und Klimawechsel, welchem letztere ja auch nur in geringem Maße ausgesetzt sind. An starke Temperaturunterschiede sind auch die Südafrikaner durch den Unterschied zwischen Tages- und Nachtwärme in ihrer Heimat gewöhnt.

Über die Fütterung und Eingewöhnung meiner Prachtfinken hatte ich bereits auf S. 36 der „Ges. Welt" berichtet. Die Verabreichung von Lebertran hat sich voll bewährt, ebenso die Verfütterung angekeimter Sämereien. Abgesehen von mit Leber-

tran durchmischten Sämereien erhielten die Vögel denselben in Eischalen, den sie zunächst wohl für Eiweiß hielten und so sich an die Annahme des Lebertrans gewöhnten.

In einem größeren Flugraum werden verschiedene Hirsearten auf einen größeren Zinkkasten gestreut, der mit schwarzer Gartenerde angefüllt ist, und untergeharkt. Ein Teil der Sämereien quillt durch die Feuchtigkeit der Erde auf, beginnt zu keimen und entwickelt sich allmählich zu kleinen Pflänzchen. Den Vögeln stehen daher die Sämereien in den verschiedensten Stadien der Entwicklung zur Verfügung, was durch mehrmaliges Ausstreuen und Nachsäen zu erreichen ist. Diese Art der Fütterung lieben die Prachtfinken sehr, und ein großer Teil von ihnen hält sich dann zum Fressen auf dem Zinkblech auf. Natürlich werden daneben täglich ihre Futternäpfe gefüllt und die Vögel durch Verabreichung geringerer Mengen auf dem Blech gezwungen, auch den trockenen Samen aus den Näpfen zu fressen. Weichfutter, gehacktes Ei und frische Ameisenpuppen werden ebenfalls verfüttert und gern angenommen, das gleiche gilt von grünen Pflanzenteilen und halbreifen Sämereien. Seit einiger Zeit bewohnen zwei Paare des Elfenastrilds in Gesellschaft anderer Prachtfinken die Vogelstube. Diese schönen Gesellen sind stets in Bewegung und treiben sich paarweise oder auch alle zwei Paare zusammen in dem Gesträuch umher. Sie untersuchen ab und zu einen Nistkasten und werden dabei des öfteren von den Insassen hinausbefördert. Sie gehören zu den beweglichsten Vögeln des Flugraumes. Mit besonderer Vorliebe lassen sie sich das gehackte Ei und die verabreichten Ameisenpuppen munden. Auch frisches Grünzeug, halbreife und angekeimte Sämereien lieben sie sehr. Als ich sie seinerzeit erhielt, sahen sie gerade nicht verlockend schön aus. Sie hatten unter dem Transport etwas gelitten. In kurzer Zeit erholten sie sich und das Gefieder war vollständig und schön. Sie wurden zusammen mit Granat- und Blauastrilden auf die schon beschriebene Weise eingewöhnt.

Bei den Granatastrilden ist die Verschiedenartigkeit im Farbton des Weibchenkleides auffallend. Die Unterseite mancher Weibchen ist dunkler, als es in der Regel der Fall ist. Der Granatastrild ist in seiner Heimat kein weichlicher Vogel, wie Stark in seinem Werk berichtet. Er brütet dort auch während der Winterzeit, selbst im Gebirge, trotz der kalten Nächte. Granatastrilde verzehren ebenso wie viele andere Prachtfinken Ameisenpuppen usw. Ihre Hauptnahrung müssen natürlich Sämereien bleiben, wie es ja auch einem körnerfressenden Vogel zukommt. Die Weibchen des Granatastrildes singen für weibliche Vögel ziemlich laut. Ihr Gesang ist ein angenehmes Gezwitscher, was den größten Teil des Tages zu hören ist.

In dem größeren Flugraum der Vogelstube züchteten verschiedene Arten erfolgreich, wie Tigerfinken, beide Formen des Goldbrüstchens, beide Formen des Silberschnäbelchen (Nordwest- und Nordostafrikaner), Malabarfasänchen, verschiedene Formen des Amaranten, Schmetterlingsfinken und Zebrafinken. Auch wurden Mischlinge von Silberschnäbelchen und Malabarfasänchen erzielt.

Zwergkauz (s. S. 417).

Ein Paar Zebrafinken brütete erfolgreich und hatte fünf Kinder aufzuziehen, als plötzlich das Weibchen einging. Die 13 Tage alten Jungen wurden von ihrem Vater weitergefüttert und bis zum Selbständigwerden erzogen. Die Zebrafinken bedienten sich zur Aufzucht stets der Ameisenpuppen und des Eigelbs. Jeden morgen wartete der sorgsame Vater dicht an der Tür auf den gefüllten Futternapf.

Verschiedene Prachtfinken zeigten sich gegen das Herausnehmen der Jungen sehr empfindlich und ließen ihre Jungen danach im Stiche. So war es bei Malabarfasänchen, Bandfinken und Schmetterlingsfinken der Fall.

Ein Paar der abessinischen Bandfinken brütet regelmäßig und mit wahrem Eifer auf dem Gelege und füttert die Jungen, die aber ebenso regelmäßig zwischen dem 6. und 8. Tage nacheinander eingehen, trotz bester Fütterung der Alten. Dieser eigentümliche Fall ist nun das fünfte Mal aufgetreten. Zunächst hielt ich die große Anzahl der Jungen (sieben Stück) für schuld daran, was aber nicht der Fall ist, da nach Wegnahme von 2—3 Eiern dieselbe Erscheinung auftrat. Die jungen toten Bandfinken werden von den Alten nicht hinausbefördert, sondern bleiben im Neste liegen und verfaulen darin. Gegen das Herausnehmen der Toten selbst mit einem Instrumente sind die Alten empfindlich und gehen nie mehr in das Nest, um die lebenden Jungen zu füttern. Das Riechen von Bandfinkennestern könnte daher rühren, daß ein oder einige Jungvögel sterben, besonders bei größerer Zahl derselben, und im Nest verfaulen.

Die Maskengrasfinken brüteten bisher vergebens, sie warfen stets ihre erbrüteten Jungen heraus. Vielleicht sind die Vögel noch verhältnismäßig jung und haben die ersten Brutversuche hinter sich.

Ähnliche Erscheinungen waren anfangs bei Zebrafinken, Spitzschwanz- und Gouldamadinen des öfteren zu bemerken. Letztere haben nun endlich erfolgreich vier Junge erbrütet, von denen eines nach dem Ausfliegen verendete. Die Gouldamadinen bedienten sich bei der Aufzucht ihrer Jungen nur des Körnerfutters in trockenem und angekeimtem Zustande. Sie meiden stets das ihnen zur Verfügung stehende Weichfutter, gehacktes Ei, frische Ameisenpuppen und Insekten. Am 15. Juni lag das erste Ei im Nest, am 4. Juli waren die Jungen sämtlich geschlüpft. Solange Eier vorhanden waren, brüteten die beiden Gatten abwechselnd, das Weibchen allerdings mehr als das Männchen. Das wurde nach dem Schlüpfen der Jungen zunächst geändert. Da bedeckten häufig beide Eltern zu gleicher Zeit ihre Jungen. Am 13. Juli fingen die Kiele der Flügelschwingen an durchzubrechen, die sich dann fünf Tage später entfalteten, und das Rückengefieder erschien, nach wiederum zwei Tagen war das graugrüne Rückengefieder deutlich sichtbar. Mit dem zunehmenden Alter wurde auch die Stimme der nach Futter bettelnden Jungvögel lauter, die am 30. Juli das Nest verließen.

Ein weiterer Zuchterfolg war eine Mischlingszucht von Spitzschwanzamadine × Maskenamadine, über die ich wegen der Scheuheit der Vögel leider keine Aufzeichnungen gemacht habe. Am 6. Juni lagen drei zarte zwei Tage alte bedaunte Junge im Nest, von denen leider zwei während meiner Abwesenheit nach Verlassen des Nestes eingingen. Diese Mischlingszucht ist schon wiederholt gelungen. Die Färbung und Zeichnung der jungen Mischlinge stimmt mit den bereits gezüchteten überein.

Im Gegensatz zu den Spitzschwanzamadinen sind die Körper der nestjungen Gouldamadinen ohne jede Bedunung, welches Merkmal ein sicheres Zeichen für die verschiedenartige systematische Stellung dieser Vogelarten ist, die von der Systematik häufig in dieselbe Gattung gestellt werden. Weitere Unterschiede sind in den Balzstellungen der Arten vorhanden. Gouldamadinen balzen nach Art anderer Prachtfinken (in den „Fremdländischen Stubenvögeln“ ist nach Adlersparre eine treffende Schilderung davon gegeben), während die Maskenamadinen, in ziemlich wagerechter Körperhaltung, das Rückengefieder etwas sträuben, so daß der Eindruck eines Katzenbuckels erweckt wird, dabei mit den Schwanzfedern vibrierend und ihre arteigentümlichen Lockrufe ausstoßend. Das Fehlen der Papillen bei den Masken- und Spitzschwanzamadinen und ihre starke Ausbildung bei den Gouldamadinen dürfte auch gegen die Gattungsgemeinschaft beider Arten sprechen.

Meine Körnerfresser.

Erinnerungen aus einem mehr als 50jährigen Vogelliebhaberleben.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Zu Weihnachten saßen beide Lieder bei meinem „Hänschen“, wie ich ihn im Unterricht getauft hatte, fest und er trug sie fleißig vor, namentlich wenn ich ihn durch Liebkosungen und Anrufen dazu ermunterte. Ich habe ihn wohl 5 Jahre besessen und auf meinen zahlreichen Umzügen mitgenommen. Er blieb stets ein fleißiger, treuer und bescheidener Künstler. Als ich mich verheiratete und in eine ferne Stadt verzog, schenkte ich ihn einem treuen Freunde zum Andenken, der ebenfalls ein großer Vogelfreund war und der mich wiederholt durch Aufmerksamkeiten erfreut hatte. Auch da hat er noch 4 Jahre „gewirkt“ und gelebt. Von den beiden anderen verschenkten jungen Hähnchen kam einer bei einem Kanarienhahn in die Lehre; sein Besitzer teilte mir später mit, daß der Hänfling den Kanarienschlag besser bringe als der Lehrmeister, namentlich bringe er nicht die grellen Töne, die man damals vielfach bei den Kanarien fand. Der zweite Hänfling erhielt bei seinem neuen Besitzer gar keinen Unterricht, er blieb sich selbst überlassen. Da er aber viel vor dem Fenster hing, und zwar nach dem Garten heraus, so hörte er viele Gartensänger, darunter Hänflinge. Von den letzteren lernte er eifrig, er brachte deren Gesang, vermischt mit den Gesängen von Stieglitz und Gartengrasmücke. Beide Tierchen brachten ihren Besitzern viele Freude, für mich war aber die größte Freude die, daß ich 5 Tierchen vom sichern Tode errettet und damit noch andere Vogelliebhaber erfreut hatte, die meiner nachher dadurch noch oft in treuer Freundschaft gedacht haben. In meiner Vogelliebhaberei trat jetzt notgedrungen eine längere Pause ein, weil mich berufliche Verhältnisse an der Ausübung verhinderten. Erst nachdem ich durch etatsmäßige Anstellung einen festen Wohnor gewonnen hatte, konnte ich an eine geordnete Durchführung derselben denken — dann ging ich aber mit Nachdruck und Eifer vor. Sobald ich einen festen Hausstand gegründet hatte, schaffte ich mir sofort eine größere Zahl von Singvögeln an, und zwar Weichfresser in Einzelkäfigen, Körnerfresser in einer größeren Voliere und z. T. in Einzelbauern. Zu

Kopf der Spitzschwanzamadine, der Maskenamadine, des Mischlings.

nächst ließ ich mir einen großen Flugkäfig bauen, etwa $1^1/_2$ m lang, $^3/_4$ m tief und 1 m hoch. In ihm hielt ich: Hänfling, Stieglitz, Zeisig, Fink, Kreuzschnabel, Dompfaffe und einige Tannenmeisen. Den Innenraum richtete ich möglichst naturgemäß ein, Futter- und Badehäuschen waren von außen angebracht, neben den erforderlichen Sitzstangen aus Holunderschößlingen brachte ich in einer Ecke Tannenzweige an, die in ein Wassergefäß gestellt und häufig erneuert wurden. Außerdem hielt ich meistens einen Hänfling, einen Stieglitz und einige Finken — letztere Tierchen mit seltneren Schlägen — in Einzelbauern. Sämtliche Vögel bezog ich am liebsten aus dem Thüringer Wald, der es mir wegen seiner Vogelliebhaberei angetan hat, soweit ich sie mir nicht an Ort und Stelle beschaffen konnte. Dies letztere behielt ich hauptsächlich für Hänflinge bei; denn beim Bezug von Hänflingen mit der Post habe ich oft bittere Erfahrungen gemacht. Nach meinen Erfahrungen ist der Hänfling nämlich als Frischfang ein recht, recht weichlicher Geselle, der oft eingeht. Z. B. ließ ich mir für meine Voliere mal sechs rote Hänflinge aus Steinach im Thüringer Wald kommen, die nach der Anzeige futterfest sein sollten. Die Vögel kamen auch lebend an, aber nach wenigen Tagen stellte sich bei ihnen Durchfall ein und sie gingen bis auf einen trotz sorgfältiger Pflege ein. Alle meine Bemühungen zur Behebung des Leidens waren vergebens. Wärme, eisenhaltiges angewärmtes Trinkwasser und Fütterung von reinem Rübsen halfen nichts. Seit der Zeit bin ich mit dem Bezug von Hänflingen eben sehr vorsichtig geworden. Aber trotzdem war der Hänfling unter den Körnerfressern mein Lieblingsvogel und ist es bis heute geblieben. Nach der vorstehend geschilderten üblen Erfahrung war mein Bestreben darauf gerichtet, möglichst wieder junge Hänflinge zu erlangen und dazu bot meine nunmehrige Heimat vielfache Gelegenheit. Meine Schwiegereltern besaßen auf dem Lande ein Grundstück mit prächtigem Garten, der von einer hohen Hecke umgeben war. Darin nisteten in jedem Jahre mehrere Hänflingspärchen, darunter herrliche rote Hähne. Bald hatte ich einige Nester ausgespürt, und sobald die Jungen soweit waren, setzte ich sie mit dem Nest in ein kleineres Bauer zum Großfüttern. Ich brachte das Bauer zunächst in einem dem Standort des Nestes nahen Obstbaum unter, später hing ich es an die dem Garten zugekehrte Giebelseite des Hauses. Die Alten fütterten fleißig und sobald die Jungen einigermaßen flügge waren, gab ich eingequellten Rübsen ins Bauer, damit die Vögelchen das Selbstfressen zeitig erlernten. Bemerken will ich noch, daß die Jungvögel umgesetzt werden müssen, ehe sie zu flügge werden; denn sonst entwischen sie aus dem Nest, sobald man sich mit der Hand nähert. Auf diese Weise habe ich mir im Laufe der Jahre meinen Nachwuchs an Hänflingen stets verschafft, ich hatte dann immer junge Hänf-

Emins Weber (Text im nächsten Heft).

linge, die von meinen alten lernten. Einmal hatte ich auch ein Hänflingsnest mit fünf Eiern in unserm Gartenhause entdeckt, und da ich gerade ein brütelustiges Kanarienweibchen im Heckkäfig zu sitzen hatte, legte ich diesem die Eier unter. Ich brachte sie in einem mit Watte ausgefütterten Schächtelchen nach Hause und bugsierte sie sorgfältig mit einem Teelöffel in das Kanariennest. Mein Weibchen nahm die Eier sogleich an und fing an zu brüten. Nach Verlauf von acht Tagen schlüpften die Jungen aus und wurden von der Kanarienstiefmutter mit großer Sorgfalt aufgezogen. Als Aufzuchtfutter gab ich hartgekochtes Hühnerei und später aufgequellten Rübsen. Alle fünf Jungen gediehen prächtig, die Hähnchen behielt ich, die Weibchen wurden in Freiheit gesetzt. Zu der Zeit hatte ich gerade einen prächtigen alten Hänflingshahn, den ich ausnahmsweise mal wieder mit der Post von auswärts bezogen hatte, und zwar aus dem Riesengebirge. Einen solchen Vogel habe ich nie wieder besessen. Er kam mit etwas zugestutztem Schwanz an und ich traute ihm nicht viel zu — aber einen so fleißigen, einzigartigen Sänger habe ich unter Hänflingen niemals gefunden, er sang und jodelte den ganzen Tag von früh bis spät. Mit ihm habe ich eine ganze Generation von Hänflingssängern angelernt. Für Liebhaber, die sich junge Hänflinge verschaffen wollen, will ich hier noch bemerken, daß die Hänflinge im Frühjahr schon recht zeitig nisten, wenn sie eine gutsichernde Nistgelegenheit finden. So habe ich z. B. wiederholt volle Gelege am 8. April gefunden, die Nester standen in einer dichten Hecke von Fichtengebüsch. Sehr schade ist es, daß der Hänfling in der Gefangenschaft nach der ersten Mauser immer zum Rostbraun des Weibchens und der Jungen zurückfärbt. Das herrliche Blutrot auf Stirn und den Seiten der Brust verschwindet und keine Kunst im Futterwechsel usw. kann es zurückzaubern. Ich habe rote Hänflinge das ganze Jahr hindurch in einer Voliere im Freien gehalten, sie, solange es irgend angängig war, mit frischen Tannenschößlingen versorgt — alles aber war vergebens. Kein anderer seiner Verwandten, wie Stieglitz, Zeisig, Fink, verändert eigentlich in der Gefangenschaft so das Gefieder. Werden auch bei diesen die Farben etwas matter, beim Stieglitz das Rot um den Schnabel herum etwas blasser, aber so auffällig wie beim Hänfling ist die Verfärbung bei ihnen nicht. Allgemein bekannt ist ja, daß der Hänfling in seinen drei ersten Lebensjahren verschieden färbt: im ersten Jahre nach der Mauser ist die Brust rötlich graubraun und der Scheitel schwarzbraun gefleckt, der Oberleib rostfarben mit einzelnen dunkelbraunen und rötlichweißen Flecken versehen; nach der zweiten Mauser bemerkt man an der Stirn, wenn man die rötlich aschgrauen Federn aufhebt, blutrote Punktchen, die rote Brust wird nur noch durch die großen, gelblichweißen Federränder verdeckt; erst im dritten Jahre ist die Stirn blutrot und ebenso sind die Seiten der Brust gefärbt — der rote Hänfling ist fertig. Selbstverständlich treten diese verschiedenen Färbungen des Hänflings nur in der Freiheit auf, in der Gefangenschaft bleibt er der graue Hänfling. Aber trotzdem ist er mit seiner netten Gestalt, mit dem allerliebsten, niedlichen Köpfchen und Schnäbelchen sowie seinem munteren Wesen und hauptsächlich seiner inneren Vorzüge wegen einer unserer liebsten Stubengenossen. Hier unterhält er, wenn er ein Wildling ist, seinen Besitzer durch seinen natürlichen Originalgesang, der angenehm und meistens fleißig vorgetragen wird, aufs beste. Es zeichnet ihn ein schwungreiches, melodisches Jodeln und Jubeln sowie ein schmetterndes, gellendes, aber reines Krähen aus, das der Hänfling im Freien auf Bäumen, Büschen und hoch in der Luft immer munter und emsig hören läßt. Jetzt, da ich alt geworden bin, gebe ich mich mit der Aufzucht von jungen Hänflingen nicht mehr ab, ich kaufe nur rote Hänflinge, d. h. mehr als dreijährige Vögel. Diese haben nach meinen Erfahrungen den Naturgesang am vollsten und besten inne, man hat von ihnen trotz ihrer Wildheit, die sich in der Gefangenschaft beim Hänfling eigentlich nie legt, den reinsten Genuß. Ebenso halte ich keine Voliere mehr, jeder Vogel — auch der Körnerfresser — sitzt im eigenen Käfig; denn der Gesang wird im Gesellschaftsbauer doch zu sehr gestört und beeinflußt. Früher, in jüngeren Jahren, hatte ich eine große Voliere an der Hinterseite meines Hauses, neben dem Balkon angebracht, in der ich das ganze Jahr hindurch Hänflinge, Stieglitze, Zeisige, Kreuzschnäbel und Finken hielt. Das Innere war stets mit frischen Tannenzweigen besteckt und darin sangen die Vögel, trotzdem der Käfig nach Osten hinaushing, im Winter von Mitte Februar ab so laut und gut wie in der Freiheit. Wenn ich des Morgens im Bett lag, weckte mich ihr Gesang. Aber wie schon gesagt, ich bin zu Einzelkäfigen zurückgekehrt. Dabei bringe ich meine Vögel aber trotzdem möglichst viel in die frische Luft, sobald es die Jahreszeit gestattet: sie halten sich dann besser im Gefieder und singen auch schöner. Z. B. kommen meine Finken stets pünktlich am 1. März ins Freie, denn der Fink schlägt nur im Freien am schönsten. Selbst hartnäckige Schweiger verlieren dann ihren Trotz und lassen bald ihren Schlag hören. Als Futter reiche ich meinen Hänflingen nur reinen Rübsen, Glanz und Hanf in geringem Maße erhalten sie nur im Frühjahr beim Hinaushängen ins Freie. Daneben gebe ich etwas Grünkraut (Miere und Salatabfälle) oder ein Stückchen Apfel. Nun will ich aber von meinem lieben Freunde, dem Hänfling, Abschied nehmen und zu den anderen Körnerfressern, seinen Verwandten, übergehen; zunächst zum Stieglitz. Wer kennt ihn nicht, jenen schmucken Gesellen, der eigentlich, nach seinen Farben zu urteilen, in die heißen Tropen gehört. Sein lebhaftes Wesen erinnert mich immer an die Dichterworte:

„Flüchtig und flink,
Frei wie der Fink,
Auf Sträuchern und Bäumen
In Himmelsräumen!"

Und damit paßt er so recht zu den Soldaten in „Wallensteins Lager": buntscheckig wie der Soldatenrock ist auch sein Kleid, flink, wie der Soldat sein soll, ist auch er!

(Fortsetzung folgt.)

Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten.

Von J. Kuntzendorff, Berlin.

(Nachdruck verboten.)

Selten ist das Urteil über eine Vogelart von Vogelkennern und -liebhabern so verschieden, wie es gerade bei den Tangaren der Fall ist. Einesteils entspricht dieses dem, daß dieser Familie so viele gänzlich in ihrer Lebensweise und Ernährung entgegengesetzt sich verhaltende Arten angehören, andererseits sind letztere auch in ihrer äußeren Gestalt, Schnabel und Kopfbildung, vielfach voneinander völlig verschieden. Und zu alledem machen viele, sehr viele Liebhaber den großen Fehler, aus einer Artbeschreibung, oftmals fußend auf nur ein oder bestenfalls wenig mehr Exemplaren, ein feststehendes, unbedingt geltendes Urteil für die ganze Art herauszulesen, während doch bei diesen Erläuterungen, auf einzelne wenige Stücke basierend, gesagt werden will, daß diese oder jene Beobachtung aller Wahrscheinlichkeit nach als zutreffend für die ganze Art bezeichnet werden könnte. Es darf nicht vergessen werden, daß ebenso wie bei uns Menschen auch bei den Vögeln der Individualismus der einzelnen Lebewesen ein sehr verschiedener, ja direkt konträrer sein kann, so daß der eine Vogel sozusagen das direkte Gegenteil eines anderen derselben Art vorstellt. In diesem letzteren liegt auch der Grund, daß sich die Urteile mehrerer Kenner vollkommen widersprechen, wie das bei dem eines so bekannten und geschätzten Vogelkenners und Vogelwirts wie Eichlam, z. B. die Haltung der Tangaren betreffend, der Fall ist, das meinen Beobachtungen und Erfahrungen, die gleichfalls als authentische Tatsachen von anderen autoritativen Seiten bestätigt worden sind, direkt gegensätzlich gegenübersteht. Auch bei den im Laufe der Jahre von mir gepflegten Vögeln — ich habe in den meisten Fällen mehrere Exemplare derselben Art gehalten — habe ich die Verschiedenheit der Individuen vielfach feststellen können, um wieviel mehr muß diese zur Geltung kommen, wenn es sich um eine bedeutend größere Anzahl freilebender Vögel handelt. Außerdem wirken bei jedem Lebewesen die äußeren Einflüsse und die Umgebung auf die Charaktereigenschaften und das Benehmen, also, weshalb sollten da die Vögel, in diesem besonderen Falle die Tangaren, darin eine Ausnahme machen. Wir sehen daher bei den Arten dieser Gattung ebenso große Verschiedenheiten in ihrem Wesen und Benehmen, wie es auch bei ihnen in der Größe und der Färbung ihres Federkleides Verschiedenheiten gibt. Man muß daher bei einer Beschreibung einer Vogelart stets das im Auge haben, daß sie sich auf die beobachteten, eine geringe Anzahl repräsentierende Menge, bezieht und diese Beschreibung als das auffassen, was sie ist, eine Möglichkeit, die sich auf die ganze Spezies beziehen kann. Nur wo durch vielfache und vielseitige Beobachtung an einer größeren Anzahl einer Art die gleichen Resultate von verschiedenster Seite sich als übereinstimmend erweisen, darf man diese als sich auf die ganze Art beziehend bezeichnen.

Die einzelnen Gattungen sind oft voneinander derart verschieden, daß man seine Verwunderung über deren Zusammenbringen in einer Familie nicht unterdrücken kann. Denn nicht allein die Verschiedenheit im Wesen wie auch die im Körperbau, hauptsächlich die des Kopfes und des Schnabels, sondern auch die in der Ernährungsweise trennt die einzelnen Gattungen. Sei es, wie es wolle, in der jetzigen Einteilung weist die Familie der Tangaren eine derart große Anzahl von sich sehr unterscheidenden Gattungen auf wie kaum eine andere Familie. Daß von den etwa 555 bekannten Arten Tangaren naturgemäß der allerkleinste Teil bei uns eingeführt worden ist, ist ganz selbstverständlich, und doch repräsentiert dieser kleine Teil schon eine ganz annehmbare Anzahl. Von dieser letzteren habe ich beobachtet sowie außer einer selbst verpflegten im ganzen im Laufe der Jahre 18 Arten. Diese setzen sich zusammen aus 3 der Organisten, 7 der kleineren, 6 der großen und 2 der Schwarztangaren.

Den Organisten

wird von vielen Forschern meist ein wohllautender und reichhaltiger Gesang nachgerühmt, welches aber

Brillenamazone.
Aufnahme von S. Lichtenstaedt.

wiederum von anderer Seite ihnen abgestritten wird. Besonders die amerikanischen Schriftsteller sind des Lobes voll, was allerdings nicht so viel besagen will, da sie lange nicht so hohe Ansprüche an die Güte des Gesanges stellen, wie man es von den deutschen her gewohnt ist. So nimmt es auch nicht wunder, wenn ein so tüchtiger Kenner der Tangaren wie Eichlam das Gegenteil von ihrer Lautäußerung sagt, indem er ihren in allen Tonarten hervorgebrachten Lockruf auf keinen Fall einen Gesang nennt. Von dritter Seite werden einzelne Arten als gute Spötter bezeichnet. Die Nahrung besteht nach dem vorerwähnten Beobachter der Tangaren ausschließlich aus Früchten, Beeren und Samen mit fleischiger Umhüllung, jedoch wird von anderer Seite wiederum auch behauptet, daß die Organisten gleichfalls Insekten zu sich nehmen, was von Eichlam aber aufs entschiedenste abgestritten wird, da er bei seinen Untersuchungen in allen Fällen sie nur als ausschließliche Fruchtfresser feststellen konnte. Da diese Vögel einen eigentlichen Magen nicht besitzen, sondern deren Speiseröhre in der Magengegend nur erweitert ist,

dauert der Verdauungsprozeß nur kurze Zeit und sind die Exkremente, durch die Fruchtnahrung ohnehin bedingt, sehr flüssigkeithaltig. Das Aufenthaltsgebiet der Organisten richtet sich nach der Jahreszeit und besonders nach der Fruchtreife. Im allgemeinen die Waldungen bevölkernd, suchen sie zur Zeit der Fruchternte die Plantagen und Obstgärten heim, wo sie recht erheblichen Schaden anrichten können, da sie Beeren und Obst in sehr großen Mengen vertilgen. Während der Brutzeit, meint Eichlam, sei es möglich, daß sie auch Insekten verfüttern, doch haben seine Untersuchungen hierfür noch keine Beweise ergeben. Das Nest ist napfförmig und wird teils im Gebüsch, teils recht hoch angelegt. Mehr als zwei Bruten finden nicht statt. Während der Brutperiode leben sie versteckt und still. Das Gelege besteht aus 3—5 rahmweißen, am dicken Ende dunkel gezeichneten Eiern. Nach der Nistzeit treiben sie sich in großen Scharen herum und werden dann leicht in Mengen gefangen und von den Eingeborenen auf den Eisenbahnstationen feilgeboten.

Außer einer Art, dem violettblauen Organisten, sind die farbenschönen Vögelchen zu den selten zu uns nach Deutschland gelangenden Arten zu zählen, obgleich sie in ihrer Heimat für wenige Pfennig pro Kopf erhältlich und in großer Anzahl zu haben sind. Die immerhin recht beschwerliche Verpflegung und Reinhaltung während der Überfahrt mag im allgemeinen der Grund für diese seltene Einfuhr sein. In der Gefangenschaft erfordern sie ein möglichst mannigfaltiges Futter. Viel ist an der Fütterungsweise und der Zusammenstellung des Futters herumgedoktert worden. Während die einen weiche, süße Früchte und eingeweichtes Weißbrot preisen, raten andere wieder zu einem Gemisch aus getrockneten Ameiseneiern, geriebenem Biskuit, Mohnmehl, feinem Zucker, geriebenem, gekochtem Rinderherz, alles angefeuchtet mit Wasser, dazu als Zugabe Honig und weiche, süße Frucht, wieder andere Eierbiskuit mit gekochter Milch. Eichlam verfütterte folgendes Futter: die Hauptnahrung bildeten, in recht abwechselnder Weise gereicht, weiche, süße, saftige Früchte, vorzüglich gute Bananen, hierzu als Beigabe in kleinen Rationen Eierbrot mit feingehackten Bananen, mit Käferschrot vermischt, hartgekochtes, geriebenes Ei, gekochtes und feingeriebenes Herz oder Leber. José-Maria Parejo, Frankreich, gibt folgende, dort übliche Futterweise an: Hauptbestandteil verschiedenste reife Früchte, in mehreren Arten am Tage gereicht, sowie ein Gemisch aus Bananenmehl, getrockneten, gekochten und gehackten Früchten und etwas getrocknetem Ochsenblut. Im Gegensatz zu Eichlam rät er von hartgekochtem Ei ab, da die Vögel bei dieser Nahrung leicht zu Leberleiden hinneigen sollen. Als Beigabe führt er in mit Honig vermengter Milch eingeweichten Zwieback an. Meine Fütterungsweise der Organisten war wie folgt: als Hauptnahrung in möglichster Abwechslung gereichte reife, süße Früchte, daneben ein Gemenge aus mit kondensierter Milch vermischtem Honig, geriebenem Eierbiskuit, hartgekochtem Ei, kleingehackten Früchten, nach Möglichkeit Bananen, ein wenig Ameiseneier und Weißwurm, falls notwendig, noch mit etwas Wasser angefeuchtet. Diese Mischung wurde von ihnen gern angenommen, auch als ich später die Portion Ameiseneier ganz allmählich etwas vergrößerte. Doch blieben die Früchte stets die Hauptnahrung.

Gleichfalls ein schwieriges Kapitel nicht nur für die Organisten, sondern für alle Tangaren, bildet die Reinhaltung der Behausung dieser Vögel. Bedingt durch die fast ausschließliche Ernährung mit Früchten und Beeren ist die Beschmutzung des Bodenbelages der Käfige eine bedeutend größere und daher auch deren Reinhaltung eine schwerere. Letztere muß öfter als bei den Insektenfressern vorgenommen werden, schon vom ästhetischen Gesichtspunkte aus, ganz abgesehen davon, daß eine nicht regelmäßig vorgenommene Säuberung den Gesundheitszustand der Tierchen schädigen kann. Als Bodenbelag wird Papier, Sand oder Torfmull wegen erleichterter Reinhaltung der Käfige empfohlen, besonders Papier, in mehreren Lagen aufeinandergelegt, so daß man bequem die oberste entfernen kann. Gewiß hat diese letzte Methode viel für sich, doch verhindert sie nicht das Feucht- und damit Übelriechendwerden der unteren Lagen, so daß die Kalamität des „Duftens" hierbei nicht behoben wird. Eine Methode, die ich jahrelang bei meinen Vögeln ausgeprobt habe und als praktisch empfehlen kann, ist folgende: Man füllt die Schublade mit schwach angefeuchtetem Torfmull und preßt ihn unter Zuhilfenahme eines glatten Brettes möglichst stark. Nachdem man den Torfmull etwas trocknen ließ, bildet er eine ziemlich harte Masse, von der die Exkremente sich leicht mittels eines breiten Messers entfernen lassen. Diese Art hat den Vorzug, daß der Torfmull die Flüssigkeit der Auswürfe aufsaugt, den Geruch neutralisiert und somit die Verschlechterung der Luft des Vogelzimmers verhindert. Durch zeitweises Entfernen der feuchten Stellen und deren Ausfüllen mit frischem Torfmull, der wiederum gepreßt wird — eine leichte Arbeit — werden üble Gerüche erst recht vermieden und wird für größte Reinlichkeit gesorgt. (Fortsetzung folgt.)

Bemerkenswerte Neuzüchtungen.

Von A. Dams, Königsberg.

(Nachdruck verboten.)

Heute weilte ich wieder in dem von mir wegen seiner landschaftlich eigenartigen Schönheit stets gern aufgesuchten ostpreußischen Städtchen Lötzen inmitten der masurischen Seen. Der Vogelreichtum hier ist für jeden, der sich in das Vogelleben vertieft, besonders anziehend, und jeder Vogelliebhaber kommt hier besonders auf seine Rechnung. Sei es, daß er den König der gefiederten Sänger, den Sprosser hören will, oder das Schwarzplättchen, auch selbst das Rotkehlchen, hier kommt bei der eigenartigen Akustik am Masowiastrand der Gesang erst recht zur Geltung.

Nun hat Lötzen noch eine andere Anziehungskraft für mich, es sind dieses die Liebhaber und Züchter unserer gefiederten Sänger. Ich versäume es nie, bei Herrn Matern, Sulimmer Weg 3, vorzusprechen, dessen Gastfreundschaft in Liebhaberkreisen zur Genüge bekannt ist. Sein Interesse für die gefiederte Welt kennen nicht nur wir Ostpreußen

sein Wissen und Wollen ist weit und breit bekannt. Vor einer Reihe von Jahren, als mir Herr Matern bekannt wurde, merkt ich sofort, einen Meister, besonders auf züchterischem Gebiet, gefunden zu haben.

Es waren vor Jahren fruchtbare Bastarde von Herrn Engel (Tilsit) gezüchtet worden mit einem starken Einschlag von Rot. Durch mich sind dann verschiedentlich Doppelbastarde erzüchtet. Herr Matern war dann derjenige, der den Gedanken der Weiterzüchtung weitergesponnen hat. Das damals vorhandene Material ging in seinen Besitz über. Jahrelange Geduld und bewundernswerten Züchterfleiß hat er trotz Mißlingens seiner Versuche in vielen Jahren gezeigt. Es kostete Zeit und Geld, aber das Ziel fest im Auge, war ihm kein Opfer zu hart, bis er das Ziel erreichte. Es ist ihm gelungen, was er erstrebte, nämlich rötliche Kanarien zu schaffen. Der nunmehr in sechs Generationen konstant gezüchtete Vogel, den er geschaffen, ist ein orangefarbener Kanarienvogel im wahrsten Sinne des Wortes. Orangefarben ist sein Gefieder, ähnlich den mit Farbfutter gefütterten goldgelben Kanarien. Der Unterschied ist aber doch ein gewaltiger. Bei den mit Farbfutter gefütterten Kanarien ist das Farbfutter stets herauszukennen. Der Farbton bei der Neuzüchtung Matern ist ein weit zarterer, hat auch einen Einschlag ins bräunliche Rot mit Gelb vermischt.

Herr Matern hat die Vögel in drei Farben gezüchtet: 1. Orange ohne jede dunkle Feder; 2. Orangeisabell und 3. Dunkelbraun. Die reinen Orangevögel sind die schönsten. Das reine, zarte Orange muß jedem sofort ins Auge fallen. Beim ersten Anblick haben sie unser Herz erobert. Die Nestjungen haben rotbraune Augen wie die Isabellvögel. Später dunkeln die Augen nach, wie bei den Isabellen. Herr Matern besitzt auch reine Orangevögel mit Isabellkappen. Die Orangeisabellen sind isabell und haben als Einschlag und Unterfarbe Orange, wo die Goldisabellen Goldgelb haben. Die Farbtöne bei diesen sind auch besonders zart mit einem fast ins Lilafarbene gehenden Schimmer. Die Dunkelbraunen sind so gezeichnet wie unsere grünen Kanarien, nur daß anstatt des grünlichen Einschlags der rötliche tritt. Der Bauch ist bei allen schön orange, was bei den Dunkelbraunen oder Schwarzbraunen, wie man sie auch nennen könnte, besonders auffällt.

Das Wesentliche ist dabei, daß die rötliche Farbe sich sicher und dauernd vererbt. Bei den mit Farbfutter gefütterten Kanarien verschwindet jeder rötliche Ton während des Federwechsels, auch tritt erst recht nichts davon bei den Nachkommen in Erscheinung. Den Vorteil, den uns die Neuzüchtung Matern bringt, können wir auch bei der Bastardierung merken. Hier werden uns überhaupt neue Wege geöffnet. Herr Matern hat einen Bastard gezogen Orangeisabell × Bluthänfling. Der Bastard ist Isabell gefallen mit hellem Halsring und heller Kehle. Der rötliche Einschlag ist bei dem vier Wochen alten Vogel ganz deutlich zu sehen, deutlich ist die Hänflingszeichnung an Kopf, Brust und Rücken sichtbar. Es wird interessant sein, diesen Vogel bei der Mauser zu beobachten, ob das feurige Rot dann erscheint. Die Neuzüchtung Matern hat uns Wege gewiesen zu noch nie Dagewesenem in der Mischlingszucht. Wer hätte vor Jahren daran gedacht, daß uns mit Leichtigkeit möglich sein wird, rötliche Bastarde zu züchten?

Nun möchte ich noch meine Behauptung beleuchten, daß die Neuzüchtung Kanarien sind. Unter

Baumpieper.

Kanarien verstehen wir den Abkömmling des Kanarengirlitzes von den Kanarischen Inseln. Es sind dieses Kulturvögel geworden, die nur mit ihren verwandten Girlitzarten fruchtbare Nachkommen im allgemeinen liefern. Die Farben sind Gelb, Grün, Weiß, Blau, Isabell (Braun). Die Unterfarbe war stets Gelb oder, wo das Gelbe weggezüchtet war, Weiß. Bei der Neuzüchtung Matern ist die Unterfarbe nicht Gelb, sondern Orange. Dadurch erscheint der Vogel in anderem Farbton, ist aber andererseits mit jeder beliebigen Farbe zu züchten und ist in Figur und Gesang dem bisherigen Kulturvogel gleich. Das Wesentliche ist aber, daß er mit jeder Farbe fruchtbare Nachkommen liefert. Ein Unterschied besteht also nur in dem rötlichen Einschlag. Wer den Vogel sieht, ganz gleich welche der 3 Neuzüchtungen, hat den Eindruck, einen richtigen Kanarienvogel vor sich zu haben.

Wasserschmätzer.

Es ist besonders erfreulich, daß diese Neuzüchtung Matern auf deutschem Boden geschaffen ist. Deutsche Züchter waren die Verbreiter des Kanarienvogels und haben den Grundstock zu der heutigen Kanarienliebhaberei und -züchtung gelegt. Wir wollen aber auch den Schöpfer dieser hoffnungsvollen Kanarienvogelform nicht vergessen. Für unsere Liebhaberei sind uns durch die Neuschöpfung neue Gebiete erschlossen, und daher müssen wir ihn gebührend würdigen. Es wird nun nur noch eine kurze Strecke Weges bleiben bis zum roten Kanarienvogel. Ob Herr Matern oder ein anderer ihn hervorbringt, ist gleichgültig, die Möglichkeit dazu hat Herr Matern geschaffen.

Mein weiteres Interesse bei den Vögeln des Herrn Matern nahmen seine sonstigen Farbenkanarien in Anspruch, die zum Teil auf edlen Gesang gezüchtet sind. Hier konnte man sehen: rein weiße, weiße mit blauen und melierten, schönen Kappen, schieferblaue, weißbunte, pirolgelbe, moosgrüne Goldisabellen und Silberisabellen. Fürwahr ein schöner Anblick, der mir den Besuch in Lötzen dauernd in angenehmer Erinnerung halten wird.

Wenn Vogelliebhaber eine Reise tun, da können sie was erzählen.

Von Max Hunger, Leipzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Am Nachmittag geht es per Dampf nach Obstfelderschmiede, um von hier aus mit der bekannten Oberweißbacher Bergbahn, der steilsten Bahn Europas, nach Oberweißbach zu fahren. Hier angelangt, steigen wir weiter bergaufwärts, um den Dom, wie der Fröbelturm von den Anwohnern genannt wird, zu besichtigen.

Der launische Wettergott, der uns schon bisher mit kalten Regenschauern beglückte, hat die Umgegend in dichtes Grau gehüllt und bleibt der schöne Überblick über das obere Schwarzatal uns leider versagt. Die Feld- und Heidelerchen bringen trotz des stürmischen Regenwetters ihre lieblichen, anheimelnden Weisen zu Gehör. Auf kahler felsiger Höhe fristen einige Wetterlärchen ihr anspruchloses Dasein. Auf einem ihrer wenig benadelten Äste sitzt fest aneinandergepreßt ein Baumpieper mit seinen ausgeflogenen Jungen. Sie haben sich ein wenig schützendes Plätzchen ausgesucht und werden von dem stark herrschenden Sturme arg zerzaust. — — — —

Hatten wir den Dienstag mit seinem unfreundlichen Wetter in nicht gerade gutem Gedenken, so entschädigte uns der Mittwoch wenigstens etwas hierfür. Wenn es auch der Vormittag nicht unterlassen konnte, uns ab und zu mit einigen „Huschen" zu bedenken, so war doch der Nachmittag um so angenehmer.

Die heutige Partie war für den ganzen Tag geplant und sollte mit der Bahn bis zur Endstation Katzhütte, von hier aus zu Fuß nach Groß-Breitenbach, Böhlen, Schwarzmühle-Meuselbach, wieder mit der Bahn zurück nach Schwarzburg, führen.

Auf steilen Wegen marschieren wir von Katzhütte aus in der Richtung nach Groß-Breitenbach.

Links am Wiesenrande tummeln sich, eifrig nach Futter suchend, mehrere Stare. Im nahen Schlehdorn läßt ein braungraues Vöglein mit weißer Kehle seinen charakteristischen Lockruf „Woid wäd wäd" erschallen. Es ist eine Dorngrasmücke.

Eine Holztaube streicht girrend nach dem nahen Walde ab. Wir sind an den ersten Häusern von Groß-Breitenbach angelangt. Das Charakteristische dieses Ortes sind die kleinen an den Außenseiten der Häuser angebrachten Drahtbauer. Diese Wahrnehmung mußten wir bereits in allen bisher von uns berührten Ortschaften Thüringens machen, wenn auch nicht in dieser großen Anzahl wie in Groß-Breitenbach. Diese kleinen, jedem menschlichen Empfinden und jeder sachgemäßen modernen Liebhaberei Hohn sprechenden Drahtkäfige sind aufs entschiedenste zu verurteilen. Wenn auch an einzelnen Stellen schüchterne Verbesserungen zu bemerken sind, so ist bei der überwiegenden Mehrheit doch noch die alte traditionelle Käfigung vorherrschend. Den örtlichen wie zentralen Liebhaberorganisationen dürfte hier noch ein gewaltiges und undankbares Stück Arbeit bevorstehen. Die Käfige waren vorwiegend mit Stieglitz, Zeisig, Hänfling oder Kreuzschnabel besetzt. Hier und da bemerkten wir auch einige Amseln und Schwarzplättchen.

Im Interesse unserer idealen Sache empfehlen wir den in Frage kommenden Liebhabern, den Anforderungen der modernen Liebhaberei wenigstens in bezug auf Benutzung größerer Käfige gerecht zu werden, um somit unseren zahlreichen Gegnern auch diesen Angriffspunkt zu entziehen.

Wir verlassen Groß-Breitenbach und wandern in der Richtung Böhlen Schwarzmühle weiter.

Zahlreiche Fitis- und Weidenlaubsänger, Goldhähnchen und Zaunkönige, Rotkehlchen und graue Fliegenschnäpper beleben den dichten nur ab und zu von Schonungen unterbrochenen Nadelwald.

Einzelne Buchfinken lassen ihren unschönen, dem Leitzugfinken ähnelnden Schlag ertönen.

Am Rande der staubigen, steinigen Landstraße singt der Goldammer sein anspruchsloses Liedchen.

Kurz vor dem Endpunkt unserer Wanderung, dem Dörfchen Meuselbach, hören wir ein lautes, sich in ungleichmäßigen Zwischenräumen wiederholendes Trommeln. Es ist der Schwarzspecht. Leider können wir den scheuen Gesellen nur ganz flüchtig beim Abstreichen beobachten.

Wie ein glutroter Feuerball verschwindet die Sonne hinter den Bergen und beleuchtet mit ihren scheidenden Strahlen beerensuchende Kinder. Die laute Stimme eines Dorfglöckchens tönt durch die Abenddämmerung.

Wieder ist ein Tag mit schönen interessanten Erlebnissen und Beobachtungen zu Ende. — — — —

(Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Eigentümlicher Nistplatz einer Bachstelze. In Vadstena (Schweden) baute eine graue Bachstelze ihr Nest auf einen fernen Träger unter der Plattform eines Eisenbahnwagens. Der Wagen ging beinahe täglich zwischen Vadstena und Tagelsta hin und her, und am Dienstag ging er sogar bis nach Linköping, wo er einige Zeit bleiben soll. Nun wird man ja bald sehen, ob das Bachstelzenpaar dem Wagen nach Linköping folgen und ihn aus vielen anderen herausfinden wird. In Vadstena selbst hat man nie beobachtet, daß die Vögel dem Wagen gefolgt sind, wenn er abrollte. Sobald letzterer jedoch wieder ankam, nahmen die Vögel auch sofort das Nest wieder in Besitz. Das Bebrüten der Eier wird infolgedessen sehr unregelmäßig vor sich gegangen sein, doch hofft man, daß die Bachstelzen in Linköping ungestört bleiben werden, d. h. wenn sie überhaupt nach dort hinfinden. Jedenfalls haben die Bachstelzeneltern nicht nur Geschmack, sondern auch Unterscheidungsvermögen, sie suchten sich nämlich einen Wagen 2. Klasse für den Bau ihres Nestes aus. Oberingenieur Gockel, Malmö.

Vom Eichelhäher. Neben unserem Wohnhause liegt ein Friedhof, in dessen Buschwerk viele Singvögel ihr Heim aufgeschlagen haben. Ich machte im Frühling den Verwalter darauf aufmerksam, daß sich dort Eichelhäher zeigten, die scheinbar in dem vollkommen mit dornigem Gebüsch durchwucherten „alten Teil" ihre unwillkommene Kinderwiege aufzuschlagen gedachten. Der sehr auf „Vogelschutz" bedachte Mann ersuchte mich aber, die schmucken Vögel nur ruhig gewähren zu lassen. — Als großer Vogelfreund hatte ich bald nachher eine ganze Anzahl der verschiedensten Vogelnester ausgemacht, die ich liebevoll überwachte. In diesem Jahr zeigten sich all die kleinen Sänger nun lange nicht so zertraut wie früher. Zerstörte Gelege, ausgeraubte Junge verrieten mir ihre Unruhe. Bald hatte ich es heraus, daß wohl fast alle Schandtaten auf die Familie Markwart zurückzuführen waren. Leider konnte ich das Nest dieser Lüderjane nicht ausfindig machen, das dem Verwalter wohl bekannt war, wie er mir belustigt sagte, denn er war von der Schädlichkeit dieses Vogels noch immer nicht überzeugt. Bald aber verwünschte auch er es, dem Verbrecher eine Freistatt in seinem stillen Reiche gewährt zu haben, denn er überraschte ihn beim Abmurksen eines Geniste junger Nachtigallen. — Ich selbst machte folgende Beobachtung: Dicht in meiner Nähe befand sich ein Geheck Schwarzplättchen, die Alten brachten der hungrigen Schar recht fleißig Atzung; manchmal erstarrten sie in der charakteristischen Weise zu regungslosen Bildsäulen oder flogen gar, einen Warnungsruf ausstoßend, wieder davon. Bald hatte ich den Grund ihrer Unruhe erblickt. Ein Eichelhäher bemühte sich, das Nest ausfindig zu machen. Er äugte scharf hin und her, konnte aber lange Zeit nicht zum Ziele kommen. Was tat der Schelm? — Er ahmte den Lockruf der Alten nach und die antwortenden Jungen verrieten sich ihm. Leider! Denn wenn ich auch an diesem Tage den Räuber verscheuchte, so fand ich doch nach zwei Tagen des Nest ausgeplündert. Nun darf kein Eichelhäher mehr dort nisten! K.

Abnorm gefärbte Rotbugamazone. Herr A. Munsterjelm in Suonenjoki gelangte in den Besitz einer abnorm gefärbten gemeinen Amazone. Bei diesen Amazonen gibt es sehr viele individuelle Farbenabänderungen. Nicht eine gleicht völlig der anderen. Bei einigen anscheinend völlig entwickelten Vögeln ist das Gelb an den Kopfseiten nur

ein wenig über das Auge hinaus ausgedehnt, so daß der untere Teil der Ohrdecken und die Wangen grün sind, bei der hier in Frage stehenden nimmt das Gelb die ganzen Kopfseiten ein und auch noch den oberen Teil des Halses. Bei anderen zeigt der obere Teil der Wange nahe am Schnabelgrund blaues Gefieder wie Stirn und Zügel. Auch der Flügelrand ist sehr veränderlich. Bei manchen ist das Gefieder an dieser Stelle rot, bei anderen rot mit Gelb gemischt, bei einer dritten überwiegt das Gelb. Es sind auch ganz gelbe Stücke bekannt, welche von den älteren Forschern für eine besondere Art gehalten wurden. So nannte Brisson (1760) ein solches albinotisches Stück Psittacus

luteus = gelber Papagei, und Gmelin und Latham (1780) gaben ihm den Namen Psittacus aurora = Aurorapapagei. Im vorliegenden Fall zeigt der sonst normal gefärbte Vogel auf dem Scheitel bis auf die Augen herab hellgraues Gefieder vorn vom Blau, die Stirn und hinten von einem Streif blauer Federn begrenzt (s. Abb. S. 427).

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Antworten.

Mit Interesse habe ich den Artikel des Herrn J. Stöß „Meine Krähen" in Heft 34 der „Gef. Welt" gelesen. Ich selbst käfigte lange Zeit Dohle, Rabenkrähe, Elster und Eichelhäher. Ebenso hatte ich auch damals einen Turmfalken sowie zwei Eulen, eine Schleiereule und einen Steinkauz. Die Rabenvögel zeigten stets große Abneigung gegen den Falken und die beiden Eulen. Bei den Freiflügen, die ich der Dohle usw. fast täglich auf einige Zeit gestattete, machten die Rabenvögel stets immer wieder Angriffsversuche auf den im Käfig befindlichen Falken und auf die beiden Eulen, so daß mir nie der Gedanke gekommen wäre, die verschiedenen Vögel zusammenzuhalten. Die Abneigung der Rabenvögel gegen Tag- und Nachtraubvögel ist von Natur aus angeboren, wie wir dieses ja auch täglich in der Freiheit beobachten können. Diese natürliche Abneigung Vögeln abzugewöhnen, halte ich für ausgeschlossen, weshalb ich auch von einer Zusammenhaltung des Turmfalken und der Krähe, selbst in einer großen Gartenvoliere, entschieden abraten möchte. Der Turmfalke hätte meiner Ansicht nach unter den anfänglichen Neckereien der Krähe, die mit zunehmendem Alter der letzteren in direkte Mißhandlungen ausarten, fürchterlich zu leiden.

Sollte Herr Stöß dennoch einen Versuch mit der Zusammenhaltung der beiden Vögel wagen wollen, so rate ich, daß Falke und Krähe anfänglich stets nur unter Aufsicht zusammengelassen werden und daß das gegenseitige Verhalten der beiden Vögel beobachtet wird. Mit Geduld können ja immerhin auch sich von Natur aus abgeneigt oder feindlich gegenüberstehende Tiere aneinander gewöhnt werden, wie beispielsweise Hund und Katze oder auch Fuchs und Hund. Die Veranlagung der einzelnen Individuen spielt meiner Erfahrung nach hierbei eine große Rolle. Auf alle Fälle würde mich der Ausgang eines derartigen Versuches sehr interessieren, da ich mir keinen dauernden Erfolg davon versprechen kann. J. Lebroit, Mainz.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

Aufnahme in den Reichsverband haben gefunden: 1. Der Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Mittelthüringens, Sitz Erfurt, 2. Herr Johann Fischer in Waldsassen, 3. Herr Johann Nurtsch in Regensburg, 4. Herr August Ferstl in Regensburg, 5. Herr Max Leser daselbst, 6. Herr Ruppert Neuner daselbst, 7. Frau Dora Rothe in Dresden-A., 8. Herr Anton Langer in Dresden-A. und 9. Herr Fritz Thiemann in Dresden-A. J. A.: Petters.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Carl Hagenbeck's Tierpark, Stellingen bei Hamburg: Ararauna, Grünflügel-, Gelbflügelaras, Weißhauben-, Inka-, Feuerhaubenkakadus, Müller-, Rotmasken-, kl. Gelbkopf-, Panamaamazonen, Schwarzohr-, Gelbschnabelpapageien, Edelpapageien, Schwarzschulter-Edel-, Müllers Edelpapageien, Gelbmantel-, Blaunacken-, Erz-, Kapuzen-, Breitbinden-, Schmuck-, Gebirgs-, Schuppen- rote Loris, Guyana-, Guayaquil-, Nanday-, Goldmasken- Bart-, Adelaide-, Rosella-, Elfenbein-, afrik. Halsband- Sittiche.

A. Mertes, Mainz, Wallaustr. 62: Himmelblaue Welle- sittiche, 1,0 reinblau mit 0,1 blaublütig, u. blaublütig

A. Mumme, Bremerhaven: Goldkinnsittiche (Brotogeris chrysopogon).

Paul Tzornack, Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 18: Blaustirniger Zwergara, Mohrenkopfpapagei, Katharinasittiche, tarant. Unzertrennliche, Feuerflügelsittiche, afrik. Glanzstare, afrik. Turteltäubchen, Stahlfleck- täubchen, Kaptäubchen, mexikan. Baumwachteln, afr. Schwarzelster, Zwergmaskenweber, afrik. Goldsperlinge, großer Gelbbrustara.



Frau M. St., München: Mangelhafte Befiederung, schlechter Verlauf des Federwechsels, Federausrupfen usw. dgl. ist ein Zeichen, daß der Vogel krank ist. Ein Herumdoktern an den äußeren Symptomen ist zwecklos. Es kommt darauf an, daß der Vogel richtig ernährt wird. Dabei ist es selbstverständlich, daß er in frischer, guter Luft bei reichlicher Bewegungsmöglichkeit gehalten wird. Ein Tiriisittich erhält Spitzsamen, Hirse, Hafer, dazu Obst, Sämereien auch ab und zu gequollen oder gekeimt. Das Bedürfnis, Süßigkeiten zu verzehren, erfüllt das Obst, das stets gut weich und süß sein soll. Als Getränk kann an Tagen, an welchen Obst nicht gereicht wird, gute abgekochte Kuhmilch oder kondensierte Milch vorgesetzt werden. Das Bedürfnis, Kalk aufzunehmen, befriedigt die Darreichung frischer roher Hühnereischale mit dem daran haftenden Eiweiß. Zuträglich ist auch die Verabreichung eines Bades. Ein Vogel, der ein solches nicht freiwillig nimmt, wird vermittels eines Zerstäubers gründlich mit lauwarmem Wasser abgespritzt. Bei einem „sehr nervösen" Vogel tut man dabei anfänglich sehr vorsichtig. Allmählich aber gewöhnt sich der Vogel daran.

Herrn W. H., Marburg; Herrn J. L., Mainz; Herrn A. T., Hannover; Herrn A. V., Jena; Herrn K. S., Altona, Herrn W. B., Karlsruhe: Beiträge dankend erhalten.

Herrn F. P., Neukirch. 1. Die Kennzeichen, welche zur Unterscheidung der Geschlechter des kleinen Gelbhaubenkakadus angegeben werden, sind unzuverlässig. So ist das Auge des ♀ hellrotbraun, das des ♂ rotbraun bis schwarzbraun sein. ♀♀ sollen kleiner sein und kleineren, von oben gesehen schmaleren Schnabel haben. Die Spitze des Schnabels soll in der Regel kürzer sein. 2. Der Ausfall der neugebildeten Feder ist nicht auf Kalkmangel zurückzuführen. Bei richtiger Ernährung, Aufenthalt in reiner, frischer Luft und ab und zu in der Sonne, Möglichkeit zu reichlicher Bewegung, wird die Erneuerung des Gefieders in normaler Weise vor sich gehen. Es ist aber darauf zu achten, daß der Futterzustand des Kakadu ein normaler ist. Bei zu fetten wie bei zu mageren Vögeln geht der Federwechsel häufig nicht in normaler Weise vonstatten. Zu den durchaus notwendigen hygienischen Maßnahmen gehört auch 3. das Baden des Vogels. Wenn er nicht freiwillig badet, muß wöchentlich mindestens einmal eine gründliche Durchnässung des Gefieders vorgenommen werden. Dabei bedient man sich handwarmen Wassers, welches mit einem Zerstäuber, einer Gartenspritze oder einer Gießkanne zur Benetzung des Gefieders benutzt wird. Zweckmäßig ist es auch, den Vogel den warmen Sommerregenfällen auszusetzen. Man muß bei allen diesen Maßnahmen sehr vorsichtig verfahren, weil manche Vögel durch das Zwangsbad sehr erregt werden. Zur Reinigung des Gefieders gibt es kein anderes Mittel als das Wasserbad.

Herrn F. M., Grohn-Vegesack. Rotohrsittiche sind nur selten eingeführt worden. Ein Preis für diese Vögel ist sehr schwer festzusetzen. Sie sind vielleicht ebenso zu bewerten wie Papuasittiche.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite)

ıgang 54 3. September 1925 Heft 36

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:-

Vom Sperlingskauz. Von Max Sandner.

Von meinen Prachtfinken. Von Rudolf Neunzig.

Meine Körnerfresser. (Forts.)

Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten. Von J. Kuntzendorff, Berlin.

Bemerkenswerte Neuzüchtungen. Von A. Dams, Königsberg.

Wenn Vogelliebhaber eine Reise tun, da können sie was erzählen. Von Max Hunger, Leipzig. (Forts.)

Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.) Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Landesverband Preußen. 1. Vors. Gumprich, Berlin W 50, Nürnberger Str. 44; 1. Schriftf. Böhme, Berlin O 17, Rüdersdorfer Str. 69; Kassierer Erich Merz, Bln.-Friedenau, Wilhelm-Hauff-Str. 14. Geldsendungen an: Erich Merz, Bln.-Friedenau, Postscheckkonto Berlin NW 7 Nr. 461 55. Vorbehaltlich der Zustimmung der nächsten Generalversammlung hat der Vorstand der Vereinigung der Vogelliebhaber, Landesverband Preußen, in seiner Sitzung vom 26. August 1925 folgende Entschließungen gefaßt:

1. Der Vorstand der Vereinigung der Vogelliebhaber, Landesverband Preußen, erblickt zunächst in der Verbindung mit den örtlichen Vereinen (Ortsgruppen) den gesunden Unterbau für den Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber, um diesen in seinen Zielen zu unterstützen. Die jetzige Gepflogenheit, daß jeder Verein nach Belieben dem Reichs- oder dem Preußenverbande als Mitglied beitreten kann, führt nach diesf. Dafürhalten zu Verwirrungen, die beseitigt werden müssen. Die Angelegenheit ist bis zur nächsten Generalversammlung im Einvernehmen mit dem Reichsverbande zu klären. Über den Lauf der Verhandlungen sind die Verbandsmitglieder durch Veröffentlichungen in dem Verbandsorgan zu unterrichten.

2. Das vorteilhafteste Bindeglied unter den Vogelliebhabern stellt ein Mitgliederverzeichnis dar. Da ein solches fehlt, ist es alsbald aufzustellen und herauszugeben mit folgenden Angaben:

Bezeichnung des Vereins: .....
Dem Preußenverbande (Reichsverbande) beigetreten: .....
Vereinslokal: .....
Sitzungen: .....

I. Vorstand.

1. Vorsitzender: Hermann Gottschlag, Kaufmann, Berlin-Wilmersdorf, Berliner Str. 160, Telephon Uhland 5218. usw.

II. Ehrenmitglieder.

.....

III. Ordentliche Mitglieder.

.....

3. Als Verbandsorgan wird die „Gefiederte Welt" bestimmt, weil sie vom Reichsverbande als solches gewählt ist und die am weitesten verbreitete Liebhaber-Zeitschrift ist.

4. Von einer Entschließung zur Beitragsfrage wurde für das laufende Geschäftsjahr abgesehen.

5. Der Vorstand glaubt zurzeit die Anregung, ein Verbandsabzeichen einzuführen, ablehnen zu müssen, da jetzt zunächst die zu betreibenden organischen Maßnahmen im Vordergrunde stehen.

6. Die Jahresversammlung der Vereinigung der Vogelliebhaber (Landesverband Preußen) findet Mitte März 1926 in Berlin statt. Anträge auf Satzungsänderungen usw. sind spätestens bis zum 15. Februar 1926 an den 1. Schriftführer, Herrn Kaufmann Böhme, Berlin O 17, Rüdersdorfer Str. 69, einzusenden (möglichst in 2 Exemplaren). Die Teilnahme der Vorsitzenden der Vereine oder eines Bevollmächtigten an dieser Generalversammlung wird, namentlich um sich persönlich näher zu kommen, dringend erbeten. Die frühe Bekanntgabe des Termins versetzt die Vereine in die Lage, durch monatliche Umlagezahlungen einen Reisefonds zu gründen.

7. Der Vorstand des Preußenverbandes hält seine Sitzungen in den Monaten September und Oktober am zweiten Montag im Monat ab. Beginn 8 Uhr. Gegenwärtiges Vereinslokal: Berlin, „Königgrätzer Garten", Königgrätzer Str. 111, gegenüber dem Anhalter Bahnhof. Bekanntgabe über Zeit und Ort weiterer Vorstandssitzungen erfolgt rechtzeitig.

8. Mit der Kauf- und Tauschvermittlung für die Mitglieder des Reichsverbandes ist das Mitglied der Aegintha, Herr Max Dähnick, Berlin NO 18, Gr. Frankfurter Str. 90, betraut worden.

Ausführlicher Bericht über den Verlauf der Vorstandssitzung erfolgt demnächst in der „Gefiederten Welt".

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

Aufgenommen ist unter Mitgl.-Nr. 166 n Herr Wilhelm Schinke in Hordorf, Post Wendhusen (Braunschweig). — Anmeldungen zur A. Z. bitte ich an den Präsidenten Herrn Horst Wagner in Bruchmühle bei Fredersdorf a. Ostbahn, Lindenstr. 32, zu richten. A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37 a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke, Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Restaurant „Zum Löwentor", Königswall 75.
J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung Freitags, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Blasewitzer Hof". Liebhaber willk. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Eliesenhof", Eliesenstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Versammlung jeden 2. Mittwoch im Monat im Vereinsl. „Parkhotel", Epinaystr. 1, und jeden letzt. Sonnabend im Monat im Vereinsl. „Stadt Chemnitz", Thomasstr. 57. Näh. Auskunft erteilt Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 15. September. A. Weber, Vors., Hamburg 1, Rabotsen 56, Hansa 9599.

Der Hannoversche Vogelschutzverein zu Hannover, gegr. 1881, wirkt mit sichtbarem und anerkanntem Erfolge für Vermehrung und Schutz der Vogelwelt bei Hannover durch Aufhängen von jährlich einigen hundert Nistkästen aller Art, durch Erweckung von Interesse und Liebe für die Vogelwelt mit monatlich, zur Gesangszeit wöchentlich stattfindenden Belehrungsspaziergängen und durch Vorträge und Austausch der Beobachtungen in den jeden dritten Dienstag des Monats stattfindenden Vereinsversammlungen. Seine Bestrebungen dienen also lediglich gemeinnützigen Zwecken. Mitgliederzahl rund 1200, jährlicher Beitrag nur 1 M. Meldungen an den Vorsitzenden Herrn Fritz Becker, Hannover, Boedekerstr. 1 F.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste willk. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Vereinsabend regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends um 8 Uhr) beim 1. Vors.,

(Fortsetzung auf der 8. Umschlagseite.)

Herrn Jahn, Feodorastr. 7. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. Adolf Voigt, Schriftf.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an!

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Unsere nächste Vereinssitzung findet infolge der Messe nicht in unserem Vereinslokale, sondern am 3. September im Restaurant Posthörnchen, Querstraße, statt. Auswärtige Liebhaber, welche zur Messe in Leipzig weilen, sind herzlich willkommen. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Normast im „Kaiser Friedrich", Breslauerstr. 50. Liebhaber willkommen. J. A.: Friedrich.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Sitzung aller 14 Tage im Restaurant „Zum Neckarstrand", Messeplatz 1. Liebhaber willkommen. Joh. Daubmann, Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Versammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Liebhaber willk. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebenda. R. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Schindler- und Rausch-Sprosserkäfige

sehr gut erhalten, verkauft das Stück für 15.— R.-M. [1141
Jos. Schreiber, Dresden, Augsburger Str. 47.

Verkaufe

Heidelberger Käfige

Größe II u. III, 4 Wochen gebraucht, Anschaffungspreis Mk. 67.—, für Mk. 50.— Schindler-Kistenkäfig Größe 58×23 ×33 cm mit Badehaus Mk. 15.— Zirka Ltr. Ia Weichfutter Mk. 5.—. Nur an Selbstabholer. Tausche auch einschließlich Ia Schwarzplatte (Frühjahrsang 25) im Werte von Mk. 20.— gegen sprechenden Graupapagei oder Blaustirnamazone. [1142
W. Madeheim, Hannover, Bohnenstraße 7 III.

Vogel-Mistelleim

zum Fangen schädlicher Vögel, klebend bei jeder Witterung, garantiert gebrauchsfähig, Dose 2.— M. fr. von H. Freitag Nchf., Frankenberg i. S. 6. Wiederverkäufer hohen Rabatt. [1143

Ia Mistelleim,

hellaubgrün, liefert in anerkannt vorzüglichster Güte [1144
Adolf Kirschner, Arnsdorf-Haida, (Böhmen), Roseggerstr.
Probesendungen geg. Einsend. v. Mk. 2.— Wiederverkäufer Vorzugspreise.

Mehlwürmer Ia Pfd. 5.— M (ohne Spesen) Pfd. 3.— M frk. Voreinsend. Seltner, Breslau, Weinstr. 12. [1145

„KAPPEL"

Schreibmaschine

Erstklassiges Erzeugnis ∴ ∴ Strapaziermaschine

Letzte Neuerung:
Geräuschloser
Wagenrücklauf

Maschinenfabrik Kappel A.-G.
Chemnitz-Kappel

Ia Moselweißwurm

à kg 5.— M. gegen Nachnahme.
Müller-Liebfried, Nehren bei Eller (Mosel). [1146

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark ¼ Pfd. franko versend. D. Waschinski & Co., Biesenthal I (Mark). [1147

Ia Ameiseneier

Pfund 5.00 M.
Ia Muska-Zecken . . à Pfd. 2,—
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen . . . . à Pfd. 0,75
Ia Garnelen, gem. . à Pfd. 0,35

Ia Universalfutter

Alleckwa I für Nachtigallen 2.— M
„ II für Grasmücken 2.— M
„ III für Drosseln . 1.50 M
Proben und Analysen zur Verfügung. Vertreter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [1148
Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
A. Eckrich II, Waldsee (Pfalz).

Waldvogelfutter

Pfund 0.60 Mark, 5 Pfund 2.50 Mark. Kanarien-Singfutter Pfd. 0.60 M., 5 Pfd. 2.50 M.
Papageifutter Pfd. 0.60 M. 5 Pfd. 2.50 M.
Weichfutter Pfd. 1.— M., 5 Pfd. 4.50 M.
Orig. Lucullus ½ Pfd. 1.25 M., 5 Pakete 6.00 M.
Ia Rübsen, Spitzsaat, Hanf, Sonnenblumen-, Negersaat, Leinsaat, Senegal-, Algier-, Ital. weiße Hirse, Erdnüsse Pfd. 0.60 M., bei 5 Pfd. 2.50 M.
Getrocknete Ameiseneier Pfd. 6.00 M.
Ia Muska . . . . . Pfd. 2.50 M.
Versand gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages. Alle Preise exkl. Porto. Verpackung frei. [1149
Fritz Krüger, Zoologische Handlung, Charlottenburg, Pestalozzistr. 87.

Vogelfutter [1150

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,

Tröndlinring 1. Telephon 14958.

Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Mehlwürmer

veget. gefüttert, 1/4 Pfd. 1.50 M., 1/2 Pfd. 3.00 M., 1 Pfd. 5.60 M.

Getrock. Ameisenpuppen

à Pfund 5.50 Mark.

Ia Muska (Zecke) **à Pfd. 2.50 M.**

Ia Weißwurm à Pfd. 4.50 M.

Franko geg. Voreinsend. des Betrages.

Th. Witte, Niederndodeleben bei Magdeburg. [1151

Mehlwürmer

(Versand beginnt Anfang Oktober)

Ia Ameiseneier Pfund 5.00 M.

Ia Muska-Zecken Pfund 1.80 M.

Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen Pfd. 0.65 M.

Die Preise sind freibleibend, ab Lager, ohne Porto und Verpackung. Bei Anfrage Rückporto beifügen. [1152

Bei größerer Abnahme hoher Rabatt.

Karl Claus, Mutterstadt II (Hauptbahnhof).

Ein Versuch

überzeugt jeden von der Güte meines **Universalfutters.** Preis 2 M. p. Pfd. Sämtliche Futtersorten für Exoten, Wald- und Kanarienvögel zu billigsten Tagespreisen. Versand geg. Nachnahme. Verpackung und Porto werden billigst berechnet. [1153

P. H. Kirsten, Leipzig 3, Zeitzer Str. 53. Fernruf 31445.

Züchterurteil

Die mit „L. K.-N." gehabten Erfolge übertrafen alle meine Erwartungen. Die Jungvögel gedeihen nach derselben sehr gut, sind kräftig und gesund, so daß ich dieses Jahr keinen einzigen Todesfall in meiner Zucht zu verzeichnen hatte. Auch für ältere Vögel ist es sehr ratsam, „L. K.-N." mit zu verfüttern; die Mauser wird dadurch leicht und schnell überwunden, so daß Mitte August meine Vorsänger schon ziemlich wieder auf der Höhe ihres Gesanges sind. „L. K.-N." ist ein Universalfutter und ist jedem Züchter wärmstens zu empfehlen.

Rudolstadt, 16. 8. 1925.

1154] Gustav Kohrs.

Lorenz, Dresden,

Drehgasse 5.

Das Original obiger Zuschrift hat uns vorgelegen.

Die Schriftleitung der „Kanaria".

Exoten-Liebhaber!

Am 9. September treffe ich auf Dampfer Krefeld (Bremerhaven) mit einem Transport **brasilianischer Vögel** ein. Tangaren, Drosseln, Köhleramseln, Elsterlinge, kleine Täubchen, Pfäffchen, Safranfinken, Morgenammerfinken, Sittiche, Blauraben, **Pitpits** (blaugrüner Naschzuckervogel) und viele andere Arten. Die Vögel sind längere Zeit gefüttert und soweit es mir möglich war, nach deutscher Art verpflegt worden.

Robert Kühn, [1155

ab 10./9. per Adresse: **B. Haase, Berlin-Lankwitz,** Charlottenstr. 42.

Verkaufe

meine **Blaustirn-Amazone,** spricht, lacht und singt, für den billigen Preis von 65.— Mark ab Hamburg. [1156

Bien, Kaufmann, **Hamburg,** Dragonerstall 12, ptr.

„ORNIS"

Freie Bezugsvereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands.

Gegründet 1912 .·. Fernsprecher 4198 [1157

Fachgemäße Belieferung mit Vogelfutter („Reform-Normal", individuelle Zusammensetzung bei restlosem Verbrauch; stets frisch gemischt). Hunderte von Liebhabern füttern seit über einem Jahrzehnt mit bestem Erfolg nur „Reform-Normal".

Reform-Normal-Käfige Mod. ORNIS 1925, neue Preisliste erschienen. — Modern eingerichtete Käfig-Bauanstalt mit elektrischem Betrieb.

Anschrift: Ornis-Haus, Halle-Saale. Der Geschäftsführer: Martin **Sperling.**

Grüne Blaustirn-Amazonen-Papageien

prachtvolle fingerzahme gesunde Vögel, anfangend zu sprechen Stück nur Mk. 40.— einige Worte sprechend Mk. 50.—, extra ausgesuchte hochfeine Vögel, selten so schön, Stück 60 u. 70 Mk. Kleine Gelbhauben-Kakadus, schneeweiß, fast zahm, Stück nur Mk. 40.— Rosakakadus, leicht sprechen lernend, Stück nur Mk. 40.— Große Papageien-Käfige, 75 cm hoch, dauerhaft nur Mk. 16.—. Taubenhals-Amazonen, selten, Mk. 55.— Guatemala-Amazonen Mk. 75.— Veilchen-Papagei Mk. 85.— Goldstirn-Papagei Mk. 65.— 1 Guayaquil-Sittich, ausgefärbt Mk. 45.— Feuerflügel-Sittiche, ganz zahm, Paar Mk. 35.— Pavua-Sittiche Paar Mk. 40.— Blumenau-Sittiche Paar Mk. 24.— Jendaya-Sittiche, junge fingerzahme Vögel, Paar Mk. 40.— Blaustirn-Sittiche Paar Mk 35.— Braunohr-Sittiche, sehr schön in Farbe, Paar Mk. 25.—

Wellensittiche,

3/4 ausgefärbt, richtige Paare, Paar nur Mk. 12.— 3 Paar Mk. 33.— 10 Paar Mk. 90.— Gelbe Wellen-Sittiche, ausgefärbte Zuchtpaare, Paar nur Mk. 15.— 3 Paar Mk. 40.— 10 Paar Mk. 110.— Safranfinken, ausgefärbt, schöne Sänger, Paar Mk. 9.— Männchen Stück Mk. 6.— Afrikanische Glanzstare, wundervoll in Gesang und Farbe, Stück nur Mk. 12.— 3 Stück Mk. 30.— Organisten Paar Mk. 22.— Schwarze Tangaren mit roter Haube Stück Mk. 20.—, Pärchen Mk. 30.— 1 Schwarzkopf-Zeisig Mk. 12.— Pfäffchen Paar Mk. 15.— Gelbwangen-Sittiche Paar Mk. 30.— 1 zahmen garantiert zehn Worte sprechenden Mönch-Sittich Mk. 30.— Blauflügel-Sperlings-Papageien, Paar nur Mk. 15.— Astrilde, Amaranten, Atlasfinken Paar Mk. 2.— Elsterchen, Schmetterlingsfinken Paar Mk. 5.— Paradieswitwen, ausgefärbt, mit vollständig langen Schwänzen, Paar Mk. 9.— Rotsteiß-Bülbüls, Stück Mk. 10.— Kleinste Zwerg-Äffchen, ganz zahm, Stück Mk. 60.— Marmosett-Äffchen Stück Mk. 30.— Rhesus-Affen Mk. 50.— ganz fingerzahme, seit einem Jahr hier, 75—90 Mk. Meerkatzen, Javaner-, Lapponder-Affen Stück Mk. 60.—, ganz fingerzahme, selten schöne Spiel-Affen 75—90 Mk. Kapuziner-Affen Mk. 75.— zahme Mk. 100.—

Zebrafinken Paar Mk. 20.— Meine sämtlichen Tiere und Vögel werden in großen, geräumigen Käfigen und sehr sauber gehalten, daher kann ich stets saubere und gesunde Tiere versenden. Lebende Ankunft garantiert. Nachnahme. Porto Eilboten Mk. 2.10, dringend Mk. 5.30, Preislisten über Tiere, Vogelfutter und Käfige gegen 10-Pf.-Marke. Gegründet 1892. Stelle fachkundige Bedienung.

Gustav Müller

Tier-Großhandlung

Hamburg 31 [1158

Langenfelderdamm 27

Fernspr.: Vulkan 7141

Billigst!

Importierte schöne **Zebrafinken,** Paar 25.— Mark, etwas gerupfte, aber tadellos gesund, Paar 20.— Mark.

Rosenpapagei . Paar 80.— Mark, Anfragen u. Liste gegen Rückporto.

Friedrich Frauf, München, [1159 Gabelsbergerstr. 9.

Tausche Rotkehlch., Schwarzplättch. od. Grasmücke geg. sing. Kanarienhahn (Nachtigallschläg. bev.) od. gut. Flemmingkäfig. 15 Stieglitzkanarien à 15 M., Wbch. 1 M. Porto und Verpackung 1 M. extra.

Liebestind, Bingen (Rhein). [1160

Steinrötel-Junghähne

(Südtiroler) [1161

sowie prima **Wachtelhähne** gibt ab **Richard Heydenreich, Bad Suderode** (Harz).

1,0 rot. Kardinal

mit oder ohne Käfig, sowie verschiedene erstklassige **Weichfresser** zu verkaufen.

Oscar Haas, Fabrikant,

Lauterbach (Württ. Schwarzwald), „Villa Bergfried".

A. Z.-Mtgl. Nr. 11. [1162

!! Verkaufe Wellensittiche !!

Zuchtpaare 7,7 grüne, 2,2 gelbe à Paar 8.—

Jg., teilweise schon ausgefärbte, 26 grüne, 1163] 16 gelbe à 3.—

Heinr. Panen, Düsseldorf, Talstr. 60.

Kaliforn. Schopfwachteln

eine Zierde für Volieren, Paar 42.— M.

Junger Blaustirn-Amazonen-Papagei, kommt auf den Finger, läuft frei umher, ganz zahm, fängt an zu sprechen 60.— M.

Großer Alexander-Papagei, ganz zahm 25.— M.

Kleiner Gelbhauben-Kakadu 45.— M.

Rotstirnige Bergpapageien, Paar 17.— M.

Zebra-Täubchen . . Paar 8.— M.

Organist, Männchen . . . 16.— M.

Papstfink, Mch., fast all. Farb. 18.— M.

Indigofink, Männchen . . 16.— M.

Safranfinken, Männchen . . 8.— M.

Mexik. Karmingimpel, Mch. 8.— M.

Dominikaner-Kardinäle, Paar 15.— M.

Versand per Nachnahme. [1164

Kunze, Freiberg in Sachsen, Pfarrgasse 32.

Beschwerden wegen Nichtzustellung der „Gefiederten Welt" sind beim zuständigen Postamt anzubringen.

Inserate

für das am 10. Sept. 1925 zur Ausgabe gelangende Heft 37 der Ges. Welt erbitten bis 5. Sept.

Von der

„Gefiederten Welt"

habe ich mehr als 150 Bände am Lager die meisten in Originalband gebunden Die Preise schwanken je nach Erhaltung Einband und Seltenheit zwischen 6.— bis 12.— M. Eine Liste der Bände verschicke ich auf Wunsch. Ich tausche auch oder kaufe solche Jahrgänge, die mir fehlen, z. B. 1881—1890.

Alfred Troschütz,

Buchhändler und Antiquar,

Hannover, Gr. Aegidienstr. 4. [116

50 Stck. grüne Wellensittiche,

Jungtiere, in Freivoliere gezogen, garantiert blutsfremd, pro Stck. Mk. 5.—. Unter zwei werden nicht versandt. Ausgefärbte Zuchtpaare Paar Mk. 12.—. 1,0 Weißkopfweber im Prachtgefieder Mk. 10.— Porto u. Verpack. Selbstkostenpreis.

R. Huth, Perleberg. [116

Schama, Rot- u. Graukardinal

zus. für Mk. 75.—, Neunzig, „Einheimische" für Mk. 12.—; Neunzig „Fremdländische" für Mk. 30.— zu verkaufen.

Dr. Baumeister, [116

Abtswind (Unterfranken).

Aus Gartenvoliere

gebe ab: 1,0 chines. Nachtigall, garant. Ia Doppelüberschläger, 1,0 Schwarzplatte 1,0 Mossambik, Zeisig, fleißig. Sänger 1,2 jap. Mövchen, gelbbunt, ferner aus Zimmervoliere: 1,1 kl. Alexandersittiche, 1,1 Mönchssittiche u. 1,1 Topfsittich. Alle Vögel sind in jed. Beziehung tadellos. Tausche evtl. auf Zebrafinken u. seltenere Prachtfinken.

Clauß, Grimma i/Sa. Lorenzstr. 3. [116

Verkaufe

1,1 Grauedelsänger für Mk. 5.—.

Frau E. Birkner, [116

Crimmitschau, Annenstr. 38.

Violettblaue Organisten

Stück 40 frcs. Grüne Pitpit

Stück 40 frcs. Rotbauchfluchtvögel

Stück 350 frcs. Goldstirnblattvögel

Stück 250 frcs. Silberohrsonnenvögel

Stück 800 frcs. Blaubürzel-Sperlingspapagei Paar 50 frcs. Mönchssittich Paar 60 frcs. Graue delsänger (ab gehört) 35 frcs.

J. Henninger, [117

rue Beeckman 98, Bruxelles.

Rabenkrähe

völlig tadellos und zahm, für photographische Zwecke zu kaufen gesucht.

Dr. Heinroth, [117

Berlin W. 62, Aquarium.

1—1½jähr. grüne Wellens

Mk. 12.— und diesj. Mk. 10.— do Paar abzug.

Hoepfel, Salzwedel, Bism.-Str. 21. [117

Gefiederte Welt

29. bis 32. Jahrg., 1900 bis 1903, geb. **Der Lehrmeister im Garten- und Kleintierhof,** 1—5 Jahrg., 1903—0 gebd. **Anton Bauer, München,** Reformbücherei, Kapuzinerstr. 39. [117

Werke über Vogelfang

besonders ältere von Bechstein, Brehm Buliard, Mayer, Schäffer, Tscheiner u. kaufe ich stets zu angemessenen Preisen Für Nachweis derartiger Literatur bin ich dankbar. [117

Alfred Troschütz,

Buchhändler und Antiquar,

Hannover, Gr. Aegidienstr. 4.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148. Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

ıhrg. 54 | Den 10. September 1925 | Heft 37

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Von grauen und anderen Papageien.

Von S. Lichtenstaedt.

(Nachdruck verboten.)

In Heft 29 der „Gef. Welt" bestreitet Herr ıforke meine in meinem Jako-Artikel aufgestellte ehauptung, daß männliche Jakos zu Frauen und ngekehrt weibliche Tiere zu Angehörigen des männ-hen Geschlechts zutraulicher werden resp. sind.

Ich möchte vorerst bemerken, daß sich meine Beob-htungen nur auf junge, also schwarzäugige Jakos ziehen, und da habe ich bei diesen Tieren in diesem ıhre genau die gleichen Beobachtungen gemacht ie in früheren.

Junge Jakos schließen sich an das entgegenge-tzte Geschlecht beim Menschen viel schneller und niger an. Sind die Vögel erst ein oder mehrere ıhre in gleichem Besitz und werden liebevoll und rständig behandelt, so legt sich allmählich die Zu-ckhaltung, und man kann später kaum noch unter-ıeiden, mit welchem Mitglied der Familie es der ogel besser meint.

Ich habe gerade in diesem Jahre, wo ich wieder ne größere Anzahl junger Jakos pflegte, den sicheren eweis erhalten, daß meine Ansicht, wenigstens bei ngen Tieren, richtig ist.

Vier junge Graue, welche ich seit Februar d. J. legte, waren ein Weibchen und drei Männchen.

Das Weibchen war schon nach 2—3 Wochen mir so zahm, daß ich mit dem Vogel machen nnte, was ich wollte, die drei Männchen ließen ch nach zwei Monaten von mir noch nicht anfassen ıer gar „kraulen".

Nun ließ ich die Gegenprobe durch meine Frau achen, und siehe da, meine früheren Erfahrungen urden voll bestätigt. Mein Weibchen war zurück-ıltend zu meiner Frau, die Männchen zutraulich, ınlich wie das Weibchen zu mir.

Erst nach und nach ließ auch die Zurückhaltung r Männchen zu mir nach, und im Laufe eines ahres würde sich wahrscheinlich keinerlei Unterschied der Zutraulichkeit mehr bemerkbar machen.

Im Juli gab ich drei Vögel fort, und hatte bis diesem Tage noch kein Männchen die Anhäng-hkeit des Weibchens, welches noch heute in meinem esitze ist, erreicht.

In nächster Zeit erhalte ich wiederum einige Schwarzaugen und werde das Experiment dann wiederholen und über den Erfolg hier berichten.

Ich bin überzeugt, daß der erste von Herrn Kaforke erwähnte Kakadu ein Weibchen war, über die noch erwähnten Inka- und Gelbhaubenkakadus möchte ich folgendes bemerken:

Beide Vögel waren voraussichtlich lange Zeit in weiblichem Besitze resp. wurden irgendwo gehalten, wo eine Dame ihre Pflege in der Hand hatte.

Die Vögel waren eben an weibliche Pflege und weiblichen Umgang gewöhnt und waren auf den Herrn der Schöpfung weniger gut zu sprechen resp. nicht an ihn gewöhnt.

Gerade ein Kakadu ist äußerst empfindlich gegen schlechte Behandlung seitens einer Person und äußerst empfänglich für liebevolle.

So besaß ich einen großen Gelbhaubenkakadu, welcher in Neunzig, „Fremdländische Stubenvögel" im Bilde verewigt ist, der in dickster Freundschaft mit meiner Frau lebte, bis diese ihn eines Tages aus Versehen mit seiner Stange fallen ließ. Das Tier war so eifersüchtig, daß ich nicht zu meiner Frau gelangen konnte, wenn diese den Vogel im Arme hielt. Nach jenem „Fall" war das Tier wie umgewandelt. Er biß nach meiner Frau, wo er nur konnte, und war mit ihr nicht mehr zu versöhnen.

Aus dem von Herrn Kaforke zuletzt erwähnten Beispiel ersehe ich, daß er mit mir der gleichen Meinung ist, daß nämlich ein Papagei nie „menschlich" sprechen lernt, sondern nur die einmal gehörten oder ihm gelernten Ausdrücke im Gedächtnisse behält, um sie später bei gleichen Situationen „passend" anzuwenden, ohne natürlich im geringsten zu ahnen, daß die betreffenden Redensarten gerade hier hingehören.

Bei der Haltung großer Papageien wird der Liebhaber immer wieder die Beobachtung machen, wie verschiedenartig die Charaktere der Vögel sind. Da gibt es die reinsten Teufel, welche mit größtem Vergnügen ihrem Herrn und Meister die Hände zerfleischen würden, wenn sie könnten. Andere wieder sind hinterlistige Gesellen, welche sich mit der größten Hingebung „Köpfchen kraulen" lassen und plötzlich wie der Blitz zuhacken, so daß Blut fließt. Andere haben wieder ganz unerklärlicherweise einen Wider-

willen gegen bestimmte Mitglieder der Familie, ohne daß ihnen jemals von diesen je ein Leid zugefügt wurde.

Andere Vögel sind wieder unwirsch, wollen von keiner Seite belästigt werden, und sind nur genießbar, wenn man mit dem gefüllten Futternapf erscheint. Andere sind wiederum die Sanftmut selber, lassen sich alles gefallen, ohne jemals zu opponieren.

Mein Grauer, welcher schon ein Jahrzehnt bei mir ist und mit geradezu beispielloser Liebe an mir hängt, kann alles leiden, nur keine Kinder. Wollen diese ihn streicheln, so ist er außer sich und versucht zu beißen, wo er kann.

Häufig liegt das unwirsche Benehmen vieler Vögel an falscher Pflege und Behandlung. Meist werden unangenehme Amazonen oder Kakadus mit Hanf, Nüssen, Fleisch, Kartoffeln oder anderen schlechten Dingen gefüttert. Kommt noch mangelnde Bewegung hinzu, so reagiert das Papchen bald mit einem Schmerbauch und mit einem damit zusammenhängenden unwirschen Benehmen.

Ein Grauer läßt sich solche schlechte Pflege nicht so lange gefallen und reist bald in die ewigen Maisgründe. Amazonen und Kakadus können jahrelang bei falscher Pflege leben oder besser vegetieren, aber welch ein Unterschied ist im Aussehen und Benehmen zwischen einem richtig und einem falsch gepflegten Vogel.

Allerhand kleine Unarten seiner Lieblinge können den Pfleger manchmal zur Verzweiflung treiben.

Einer meiner Grauen warf konsequent sofort nach der Fütterung das gesamte Futter aus dem Napf. Meldete sich später der Hunger, so war er genötigt, die Körner einzeln vom Käfigboden aufzusuchen. Es war unmöglich, ihm diese Unart abzugewöhnen.

Ein junger Grauer machte sich mit seinen Kollegen ein besonderes Vergnügen. Kletterte er mit noch zwei Genossen auf seinem großen Käfige umher, so machte er plötzlich kehrt, begab sich durch die geöffnete Tür zurück in den Käfig, kletterte nach oben und zwickte die außen umherkletternden Grauen in die Füße. Der kleine Kerl tat diesen Schabernack anscheinend mit voller Überlegung und trieb es so weit, daß ich ihn schließlich nur allein herauslassen konnte.

Einen prächtigen Molukkenkakadu mußte ich einst wegen übergroßer Liebe zu meiner Frau abschaffen.

War nämlich meine Frau zu Hause und beschäftigte sich nicht mit ihm, so begann er so entsetzlich zu schreien, daß ich mit Recht eine Exmissionsklage meines Hauswirts befürchten mußte.

Trat meine Frau nur in die Wohnung und begann nicht sofort mit „Köpfchen kraulen", so konnten wir sicher sein, keine ruhige Minute mehr zu haben.

Zudecken nützte nichts, denn die festeste Decke war in kurzer Zeit in Atome zerlegt.

Kamen wir einmal spät am Abend nach Hause, so war der Vogel leider der Meinung, daß es zum Kraulen noch Zeit sei, und begann sich mit ein paar energischen Schreien in Erinnerung zu setzen.

Ein anderer Molukke, den ich besaß, war zwar ein Nichtschreier, hatte dafür aber die liebliche Gewohnheit, das Gackern der Hennen so naturgetreu und laut zu imitieren, daß uns bei seinem „gack, gack, gaack" oft himmelangst wurde.

Und doch müssen diese entzückenden Vögel mit den großen sanften Kirschaugen jeden Papageienfreund begeistern. Ich stelle sie an Intelligenz n den Graupapageien auf eine Stufe. Oben erwähnt Molukke hatte ein großes Talent, trotz besten V schlusses seine Käfigtür zu öffnen.

Eines Nachmittags telephonierte mir meine Fra daß der Molukke spurlos verschwunden war. R Rückkehr von einem Ausgang war der Käfig le und der Vogel verschwunden. Nach langem Such fand man den Ausreißer unter einem Spind, pl auf die Erde gedrückt.

Er hatte während des Suchens keinen Mu von sich gegeben, gleichsam als hätte er sich köstl amüsiert, uns ein Schnippchen zu schlagen.

Molukken werden jetzt regelmäßig wieder eing geführt. Herr Kleinert, Berlin, hatte zeitweise 4— prachtvolle Exemplare frei im Laden umherlaufe und jeden Kunden zum „Köpfchen kraulen" a bettelnd. Leider sind die Preise für die Vögel f einen gewöhnlichen Sterblichen zu hoch.

Auf meine Jako-Artikel gehen mir häufig Brie zu, in denen die Schreiber mir mitteilen, daß tr bester Pflege junge Graue bei ihnen eingegangen sin

„Mein junger Grauer war abends frisch u munter, morgens lag er tot im Käfig. Ich ste vor einem Rätsel", schreibt mir ein Herr.

Dieses Rätsel ist keineswegs schwer zu lösen.

Es gibt kaum einen Vogel, welcher in jung Jahren so schreckhaft ist wie ein Jako. Ein heftig Erschrecken hervorgerufen, durch irgendeine auffallen Erscheinung, kann einen Krampfanfall und sein sofortigen Tod herbeiführen.

Dutzende von Grauen gehen an solchen Schre krämpfen ein. Das Eigenartige an solchen Krämpf ist, daß sie sich, selbst wenn sich das Tier nach dem erst Anfall wieder erholt, nach 1—2 Tagen ohne äuße Ursache wiederholen und den Tod herbeiführen könne

Sehr nervöse Vögel, welche einige Anfälle übe stehen, bleiben häufig für ihr ganzes Leben Epileptik und werden schließlich doch einmal von einem A fall dahingerafft.

Ein Berliner Händler erzählte mir, daß, dur eine umfallende Leiter erschreckt, von zwölf Jak zwei Vögel an Schreckkrämpfen von der Stan fielen und eingingen.

Eine auffallende Erscheinung oder nachts e Lichtstrahl, eine Maus oder dergl. kann die Vög so erschrecken, daß sie unter den Krämpfen eingehe.

Auch in der Freiheit sind die Tiere als äuße schreckhaft bekannt (Reichenow).

Sache des Liebhabers ist es nun, seine Grau nach Möglichkeit vor jedem Erschrecken zu bewahre Nachts decke man die Tiere zu, am Tage halte m jede plötzliche, auffallende Erscheinung fern.

Meine Schwarzaugen gerieten eines Tages auß sich, als mein Mädchen eine große Porzellaner in ihre Nähe stellte. Auch bei dem ersten Heraus lassen der jungen Vögel sei man vorsichtig. Sie könn durch plötzlichen Schreck abfliegen und, da sie vie fach beschnittene Flügel haben, sich ernstlich verletz

Über die richtige Pflege habe ich mich schon i meinen früheren Artikeln zur Genüge ausgelasse Erwähnen will ich noch, daß den jungen Tieren i Sommer frische Schoten, mit Schale gereicht, se zuträglich sind. Mit der Darreichung von Leitung

wasser sei man vorsichtig. In vielen Gegenden ist das Leitungswasser nicht einwandfrei. Ich reiche zweimal täglich mit bestem Erfolge dünnen Haferschleim.

Neunzig schreibt im „Graupapagei" bei der Obstfütterung, daß Bananen und Apfelsinen nur mit Vorsicht zu reichen sind. Ich habe gerade mit Bananen die besten Erfolge erzielt. Bananen sind für Mensch und Tier das nahrhafteste und leicht verdaulichste Obst, dazu für den Jako noch ein „Nationalessen", denn in vielen Gegenden ernähren sich die Vögel fast ausschließlich von diesen Früchten (Emin Pascha, O. Neumann).

Mit Apfelsinenscheiben habe ich sogar bei leichten Darmkatarrhen vorzügliche Erfolge erzielt.

Selbstverständlich ist bei jeder Obstfütterung eine gewisse Vorsicht am Platze. Man reiche einen Tag um den anderen Bananen (je eine halbe Frucht in 3—4 Portionen), an den Zwischentagen abwechselnd Apfel, Weintrauben oder Kirschen. Keinesfalls verschiedene Obstsorten hintereinander oder durcheinander. Bei Obstfütterung trinken die Vögel so gut wie gar nicht.

Zuletzt möchte ich noch der falschen Ansicht entgegentreten, daß junge Graue nur dann besonders gelehrig sind, wenn sie schon nach ganz kurzer Zeit zu sprechen anfangen.

Viele Vögel sprechen schon ein paar Worte, wenn sie hier ankommen, andere lernen in 2—3 Wochen einiges. Ich besaß jedoch Vögel, welche 7—8 Monate nicht ein Wort herausbrachten und dann noch ganz hervorragende Sprecher wurden.

Es ist ganz verkehrt, wenn ein Liebhaber einen jungen Jako nach ein paar Monaten als unintelligent fortgibt, wenn das Tierchen noch nichts spricht.

Häufig fangen die Tiere erst zu sprechen an, wenn die Verfärbung des Auges in Grau beendet ist, häufig noch später. Bei ausschließlicher oder wenigstens hauptsächlichster Fütterung mit Mais färben sich die Augen viel schneller gelb als bei anderer Ernährung.

Selbst ein ein bis eineinhalb Jahre alter Jako ist noch ein „Baby" und kann sich erst dann zu einem hervorragenden Sprecher entwickeln. Der Liebhaber darf also niemals die Geduld verlieren.

Richtig gepflegte Jakos sollen ein menschliches Alter erreichen, vorausgesetzt, wie mir einst ein alter Papageienkenner sagte, daß sie nicht vorher eingehen.

Meine Körnerfresser.

Erinnerungen aus einem mehr als 50jährigen Vogelliebhaberleben.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Meinen ersten Stieglitz schaffte ich mir in meinem 19. Lebensjahre an, ihn zu besitzen, war schon lange mein Ideal gewesen. Ich war zu der Zeit in einem kleinen Orte auf der Post beschäftigt, und der Postmeister war ein eifriger Vogelliebhaber. Er ließ sich eines Tages zur Zucht ein Dompfaffenpärchen kommen und diese Gelegenheit benutzte ich, ein Stieglitzmännchen mitzubeziehen. Wenn ich nicht



Kehlstreifige Meisentimalie.

irre, kamen die Vögel aus einer Vogelhandlung in Braunschweig auf Grund einer Anzeige in der „Ges. Welt". Da es im Frühling — etwa Mitte April — war, erhielt ich einen Frischfang, der allerdings schon futterfest war. Man hat sonst oft mit Stieglitzfrischfängen seine große Not. Ich habe deren im Laufe von einem halben Jahrhundert wohl mindestens 100 Stück gehabt, sie — Junge und Alte — gehen leicht ein. Als bestes Mittel zur Erhaltung habe ich ausgeprobt: erstens Fütterung mit gutem Salatsamen und zweitens frische Luft. In einen kleinen Käfig, Harzerart, gesteckt, mit Salatsamen und blauem Mohn versehen und dann an die frische Luft gestellt, diese Kur versagte fast nie, auch wenn der Patient schon mit gesträubtem Gefieder dasaß und nicht mehr recht fressen wollte. Dieser mein erster Stieglitz bereitete mir viel Freude, er war neben seinem hübschen Gefieder ein eifriger Sänger. Ich hatte ihn auf einen Schrank gestellt, und zwar so, daß die Sonne ihn mehrere Stunden am Tage traf. Ach, wie drehte er dann mit seinem Köpfchen und dem Oberkörper, wenn ihn die Sonnenstrahlen trafen; es war ordentlich, als wenn er einen begrüßen wollte durch alle seine Verbeugungen, und dabei sang er lustig und fidel. Noch heute schwebt mir das Bild

klar vor Augen. Sowie bei einem Menschen, den man zum ersten Male sieht, der erste Eindruck, den man empfängt, der beste sein soll, so ist es auch beim ersten Anblick des neuerworbenen Vogels: der Stieglitz stahl sich in mein Herz. Trotzdem der Stieglitzgesang nicht an den des Hänflings heranreicht; ich möchte ihn in meiner Vogelgesellschaft nicht wieder missen. Meistens habe ich eingefangene Stieglitze gekauft, denn Stieglitznestern ist schwer beizukommen. Sie befinden sich immer in den höchsten Spitzen der Bäume, so daß sie ohne Gefahr nie zu erreichen sind. Nur einmal gelang es mir, ein solches mit fast flüggen Jungen zu erbeuten, es befand sich in einer nicht hohen Kugelakazie. Ich setzte die Jungen mit dem Nest in ein Drahtbauer und die Alten fütterten eifrig. Aber die spätere Eingewöhnung und namentlich die Gewöhnung an das Körnerfutter waren sehr schwierig — lange nicht so leicht wie beim Hänfling —, die jungen Stieglitze gingen bis auf ein besonders kräftiges Männchen ein. Deshalb habe ich bisher jeden anderen Versuch der Art unterlassen. Ich kaufte lieber Herbstfänge, und zwar junge Vögel, sogenannte „Grauköpfe". Diese geben nach meinen Erfahrungen die besten Käfigvögel. Sie verfärben sich nach der ersten Mauser sehr schön, namentlich wenn man sie viel ins Freie bringt. Z. B. besitze ich jetzt einen vorjährigen jungen Stieglitz, der — weil meistens in frischer Luft gehalten — von einem Naturvogel gar nicht zu unterscheiden ist, und seinen Gesang trägt er so eifrig vor wie der beste Natursänger. Schwierig ist es nur, ein richtiges Männchen zu erlangen; denn die Unterscheidungszeichen zwischen Männchen und Weibchen sind bei alten Vögeln gerade beim Stieglitz sehr wenig klar, beim jungen Vogel aber noch unklarer. Nach der Mauser ist das beste und auch sicherste Kennzeichen des Männchens das Rot um den Schnabel, das beim Weibchen mit dem Auge abschneidet, während es beim Männchen bis hinter das Auge zurückreicht. Auch die tiefschwarzen Schultern oder Achseldeckfedern sind nur beim Männchen zu finden. Letzteres ist auch bei den jungen Männchen das einzig sichere Unterscheidungszeichen, die Flügeldecken sind schon meist schwarz, wenigstens doch dunkelbraun, während sie beim Weibchen gleichmäßig grau sind. Und welch schmucker Geselle ist nicht der ausgemauserte Stieglitz, namentlich im Frühlingsgewand! Ganz nahe sah ich zum ersten Male einen ausgefärbten Stieglitz etwa in meinem 16. Lebensjahre bei einem alten Handwerksmeister, der eifriger Vogelliebhaber und zugleich Fänger war. Das Tierchen saß in einem ganz kleinen Lockbauer, so dichte hatte ich noch keinen Stieglitz vor meinen Augen gehabt. Von der Ferne hatte ich Stieglitze schon oft im Freien beobachtet, wenn sie auf den Wiesen sich aus den Disteln die Samen holten oder zu Neste flogen. In meiner Heimat, dicht an meinem elterlichen Garten, führte eine Chaussee vorbei, die an beiden Seiten mit sehr hohen Akazienbäumen bepflanzt war. In diesen nisteten viele Stieglitze, aber, wie gesagt, ich sah sie nur von fern. Sieht der Vogel auch da schon sehr schmuck aus, in der Nähe präsentiert er sich noch ganz anders. Der degenspitze, feste Schnabel ist bei einem mehrjährigen Männchen elfenbeinweiß mit einem kleinen schwärzlichen Strich über der oberen Spitze. Der Vorderkopf erscheint um Schnabel und Augen fein schwarz eingefaßt, sonst bis hinter die feurigen braunen Augen schön karminrot, den Scheitel deckt ein sammetschwarzes, mützenartiges Band, das sich, am Hinterkopf beiderseits wie ein Sturmband hinter den Backen herunterziehend, ausspitzt und mit dem Rot des Vorderkopfes die weißen Backen einfaßt. Die Hauptfarbe des Oberkörpers ist nobelbraun, im Genick bis ins Weißliche übergehend. Unterleib, Hals und Brust sind weiß, die letztere zu beiden Seiten mit zwei lichtbraunen, matt ins Gelbe spielenden, nierenförmigen Flecken versehen. Die Flügel und den fischartig leicht gespaltenen Schwanz ziert das Sammetschwarz des Scheitels mit weißlichen Schwungfederspitzen und die ersteren auf ihrem Mittelfelde ein prachtvoller, lebhaft zitronengelber Spiegel. Beim Weibchen sind alle Farben nicht so hervortretend, aber die Unterscheidung vom Männchen bleibt sehr schwer, wenn die oben geschilderten Unterschiede nicht genau beachtet werden. Dabei hält sich der Stieglitz immer fein und säuberlich im Gewand. Man muß nur mal im Mai einen Stieglitzhahn, auf dem schwankenden Zweige oder im Gipfel eines blühenden Obstbaumes sich wiegend, betrachten, wie er sich selbstgefällig schwankt, wendet und dreht, gerade als wollte er sein glänzendes, gehobenes „Ich" so recht in den Vordergrund bringen! Und so zeigt er sich auch im größeren Flugkäfig. Ich habe den Stieglitz in seinem Äußeren hier so ausführlich geschildert, weil man an diesem prächtigen Gesellen nicht so klang- und zwanglos wie am Hänfling vorübergehen kann: ist es bei dem letzteren der einschmeichelnde Gesang, der den echten Liebhaber reizt, so ist es beim Stieglitz sein prachtvolles Kleid. Übrigens unterscheiden — namentlich die Händler tun es — wir drei verschiedene Arten in der Größe: Alpen-, Wald- und Gartenstieglitze. Die Alpenstieglitze sind besonders große, farbenprächtige Vögel, die Waldstieglitze sind ein wenig kleiner und die Gartenstieglitze sind die kleinsten unter ihnen. Ob diese Unterscheidung richtig ist, mag dahingestellt bleiben; Tatsache ist, daß häufig auffallende Unterschiede in Größe, Färbung und Gesang sogar bei Stieglitzen in ein und derselben Gegend beobachtet werden. Nach meiner Ansicht mag hier derselbe Umstand wie bei Menschen und Tieren vorliegen, daß größere und kleinere Arten in derselben Familie entstehen. Ich habe zahlreiche sogenannte Alpenstieglitze besessen, sie sogar direkt aus dem Alpengebiet mir kommen lassen; sie waren große und schön geschmückte Vögel, aber im Gesang konnten sie mit unseren Wald- und Gartenstieglitzen nicht konkurrieren. Ich habe unter den letzteren fleißige und eifrige Sänger gefunden, unter den Alpenstieglitzen nie, sie waren mehr eine Weide fürs Auge. Der Stieglitzgesang hat ja überhaupt für den Kenner nicht gerade bedeutenden Wert, trotzdem höre ich ihn seiner Frische wegen immer gern: er gleicht einer Reiterfanfare! Er hat sozusagen zwei Abteilungen, welche oft jede für sich allein ausgeführt werden, ebensooft aber auch in kleinen Zwischenpausen hintereinander erschallen. Die erstere ist eigentlich eine Einleitung, oder auch ein Seitenstück zur zweiten,

etwas längeren Abteilung, dem Hauptgesang. Sie wird gebildet aus des Vögelchens Locktönen oder denselben ähnlichen, hüpfendpfeifenden Lauten und einem geschlossenen, trompetenartigen Schlußsatze. Es liegt gleichsam etwas Feuriges, Kriegerisches in diesen raschen Tönen. Der Hauptgesang ist in seinem Grundton dem Vorgesang zwar ähnlich, enthält aber mitten einen abändernden Teil, indem bei guten Sängern die Rufe „Fink, Fink" mindestens drei- bis viermal hintereinander erschallen, dann in einige etwas gehaltene, hohe Noten übergeht und hierauf mit dem schmetternden Schlußsatze des Vorgesangs endigt. Ich habe versucht, den Gesang deshalb eingehender zu beschreiben, weil — wie vorgesagt — bei vielen Vogelliebhabern der Stieglitz seines Könnens wegen nicht besonders geachtet ist. Ich höre ihn stets gern! Die bestsingenden Stieglitze hörte ich bei meinen vielen Reisen im Thüringer Walde, wo man ja — namentlich vor dem Kriege — fast an jedem Hause einen Stieglitz fand. In den letzten Kriegsjahren und in den ersten Jahren nach dem Kriege hat die Vogelliebhaberei im allgemeinen dort, wie überall, nachgelassen, weil kein Futter zu erlangen war. Jetzt ist sie aber wieder im Zunehmen begriffen. (Fortsetzung folgt.)

mürrisch, wenn man ihren Neigungen und Wünschen nicht entspreche. Unbeobachtet sei sie geneigt, alles zu zerstören, was ihrem Schnabel keinen genügenden Widerstand leistet. Trotz dieser Untugend könne man ihr bei ihrem drolligen Wesen nicht böse sein, und sie bleibe stets der Liebling der Familie des Pflegers. Ihre Auffassungsgabe beim Nachsprechenlernen von Worten sei eine hervorragende, ihr Gedächtnis aber nicht besonders. Das leicht Erlernte werde auch schnell vergessen. Trotzdem spräche sie viel, wenn auch nicht gerade sehr deutlich. Noch weniger bekannt dürfte die von Fockelmann nach langer Zeit eingeführte Gelbbauchamazone — A. xanthops (*Spix.*) aus Ost- und Mittelbrasilien sein, die bisher nur in zwei Stücken im Jahre 1879 von Karl Hagenbeck eingeführt war. Über ihre Naturgeschichte wie über ihr Leben in der Gefangenschaft ist wenig be-

Jerdons Hügelmeise.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Reich an Arten und Zahl ist in neuerer Zeit die Einführung von Papageien, darunter auch recht selten eingeführte Arten. Von seltenen Amazonen gelangte die Brillenamazone — Amazona albifrons *(Sparrm.)* aus Mittelamerika (Mexiko bis Kostarika) auf den Markt (s. Abb. S. 423), von der ein Pfleger berichtet, daß das von ihm gehaltene Stück ein sehr angenehmer Vogel sei, von allergrößter Zahmheit und einem hohen Grad von Zutraulichkeit, der gern mit Kindern spiele. Sie sei aber eigenwillig und kannt. Nach Natterer zeigten sich die von ihm beobachteten Stücke „sehr stumpfsinnig". Die Gelbbauchamazone hat einen gelben Kopf und ein gelbes Querband über den Bauch, auf den Körperseiten einen orangeroten Fleck, der auch schon im Jugendkleid, in welchem sich die eingeführten Stücke befanden, vorhanden ist, während die jugendlichen Stücke das Gelb des Kopfes nur an Stirn, Zügel, Augengegend und auf den Ohrdecken, nach hinten ins Orangefarbene gehend, zeigen. Als Surinamamazone kommt zuweilen eine seltene Amazone in den Handel, die neben vielen anderen Papageienformen, wie Aras, Kakadus, Edelpapageien, Loris und Sittichen zurzeit in Karl Hagenbecks Tierpark in Stellingen vorhanden ist, die Panamaamazone — A. panamensis *Cab.* aus Kolumbien, Panama. Sie ist kleiner als die Surinamamazone, ohne schwarze Federsäume, das Gelb des Oberkopfes wird hinten durch die blaugrünen Scheitelfedern begrenzt, ferner fehlt das Rot am Grunde der Schwanzfedern. Ihr wird große Zahmheit und Gelehrigkeit nachgerühmt.

Im Juli traf ein größerer ostafrikanischer Transport der Tierhandlung Ruhe, Alfeld, ein. Er brachte

unter anderen den dunklen Schmetterlingsfinken — Uraeginthus bengalus schoanus *Neum.* (s. S. 6), den abessinischen Amaranten — Lagonosticta senegala carlo *Zedl.* (s. S. 6), das östliche Silberschnäbelchen — Aidemosyne cantaus orientalis und einige seltene Widafinken, wie Fischers Widafink und die seltene Glanzwitwe. Leider wurden letztere beiden Arten ins Ausland verkauft. Unter den Nordostafrikaner befand sich als Neueinführung auch der auf S. 421 abgebildete

Emins Weber — Ploceus emini *(Hartl.)*.

Er gehört zu einer Untergruppe, welche sich durch schwarze oder schwarzbraune Flügelfedern mit breiten, gelben oder olivgrünen Säumen auszeichnet. Die Kopfseiten sind stets schwarz, die Kehle gelb. Die Geschlechter sind einander ähnlich. Die Weibchen sind etwas matter gefärbt und meist in der Kopffärbung abweichend. Bisher war kein Vertreter dieser Gruppe lebend nach Deutschland eingeführt.

Über das Freileben ist kaum etwas berichtet. Es ist anzunehmen, daß sie, wie nahe verwandte Arten, nicht gesellig ihre großen, beutelförmigen Nester auf Hochbäumen unweit von Gewässern bauen, und sich hauptsächlich auf Hochbäumen, im Gebüsch der Flußufer und in Hecken aufhalten. Das Gelege besteht aus drei Eiern. Die Eier, welche im April und Mai gefunden wurden, sind verschieden gefärbt und messen 20,5—23×14—15,5 mm. Die Verbreitung erstreckt sich über Teile Nordostafrikas.

Gefiederbeschreibung: ♂ Stirn, Scheitel ein Band, welches die Ohrdecken begrenzt, Vorderhals, Vorderbrust goldgelb; Hinterkopf, Zügel, Augen-, Ohrgegend, Hinterhals, Oberrücken schwarz, übrige Oberseite graubraun, Oberschwanzdecken zuweilen grünlichgelb verwaschen; übrige Unterseite weiß mit bräunlichem Anflug; Flügelfedern schwarz, mittlere und große Deckfedern zuweilen schwarzbraun und wie die Schwingen mit breiten grünlichgelben Säumen; Unterflügeldecken graubraun, gelblich verwaschen; Schwanz olivbraun, grünlichgelb verwaschen. Auge hellgrau bis gelb. Schnabel schwarz; Füße bräunlich fleischfarben; Lg. 140—160; Fl. 77—83; Schw. 55—63 mm.

♀ Oberkopf, Kopfseiten schwarz, schwarze Rückenfedern mit gelblichen Säumen; das Gelb des Gefieders matter.

Eine Reihe afrikanischer und indischer Insektenfresser, die bisher noch nicht nach Europa gebracht waren, gelangte in den Besitz englischer und französischer Liebhaber.

Aus Südafrika wurde die

Kap-Steindrossel — Monticola rupestris *(Vieill.)*

eingeführt. In ihrem Wesen und ihrer Lebensweise scheint sie wenig verschieden von unserem Steinrötel zu sein. Leider liegen über ihren Gesang keine Mitteilungen vor. Die Nahrung besteht in Insekten, Beeren und Samen. Nach Stark soll sie aber auch Blütenhonig verzehren, den sie den Blüten einer Aloe und einer Proteazee entnimmt. Das große, umfangreiche Nest, aus Reisern und Wurzeln erbaut und mit Haaren und Wurzelfasern gepolstert, steht in Felslöchern oder -spalten, auch unter Steinen. Das Gelege besteht aus 3—5 einfarbig blaßblauen oder auf blaßblauem Grunde rotbraun gefleckten Eiern (28×19 mm).

Gefiederbeschreibung: ♂ Kopf, Kehle graublau, Zügel schwarz; Nacken, Rücken braun, etwas ins Rotbraune gehend, alle Federn mit schwarzem Schaftstrich; übrige Oberseite und Unterkörper rotbraun; Unterschwanzdecken heller rotbraun; Flügeldecken, Schwingen schwarzbraun, heller braun oder rotbräunlich gesäumt, Unterflügeldecken rotbraun; Schwanzfedern rotbraun bis auf die mittelsten, welche schwarzbraun sind.

♀ Kopf, Kehle, braun wie der Rücken. Die Verbreitung erstreckt sich über die Kapkolonie bis Natal.

Unter diesen Neueinführungen befand sich ein naher Verwandter des Sonnenvogels, und zwar sein indischer Vertreter, der

Indische Sonnenvogel — Leiothrix lutea calipyga *Hodgs.*,

der sich von der bekannten südchinesischen Form nur durch das Fehlen des Orangerot am Grunde der Außenfahnen der inneren Handschwingen unterscheidet. Seine Verbreitung erstreckt sich über das Himalajagebiet von Simla bis Butan, die Khasiaberge bis Oberbirma. Er lebt hauptsächlich in Höhen von 1250—2000 m.

Jerdon nennt ihn den gemeinsten Vogel um Darjeeling, der sich in Gesellschaften von 5—6 Vögeln in Dickichten und im Unterholz des Waldes aufhält. Er ist ein scheuer Vogel, der sich der Beobachtung möglichst entzieht. Seine Nahrung bilden Früchte, Beeren, Insekten und Samen; letzteren verzehrt er, wie Jerdon beobachtete, besonders im Winter. Er sah, wie sich diese Vögel für Augenblicke auf der Landstraße niederließen, um ausgefallene Körner aufzunehmen und dann schnellstens wieder im Dickicht verschwanden. Der Gesang gleicht dem der chinesischen Form. Hartert vergleicht ihn mit dem der Gartengrasmücke. Das Nest steht gewöhnlich in einem belaubten Busch in mäßiger Höhe über dem Boden. Es ist napfförmig und wird hauptsächlich aus Gras mit Wurzeln, Fasern und Moosstücken untermischt erbaut. Es enthält 3—4 blaßgrünlichblaue Eier, die mit braunen und rötlichen Flecken gezeichnet sind. (22×16 mm).

Im Benehmen in der Gefangenschaft unterscheidet er sich nicht von dem gemeinen Sonnenvogel.

Herr J. Delacour, der Herausgeber von „l'Oiseau", erhielt im Jahr 1921 ein paar Sonnenvögel aus China, der Herkunftsort ist ihm nicht bekannt, die im allgemeinen dem gemeinen Sonnenvogel gleichen, aber bei dem Männchen sind Stirn, Augenbrauen und Unterseite leuchtend gelb und die Brust ist karminrot. Delacour nannte diese den gemeinen Sonnenvogel an Farbenpracht weit übertreffende Form zu Ehren des kürzlich verstorbenen Vorsitzenden von „The Avicultural Society" zu London Astley,

Astleys Sonnenvogel — Leiothrix l. astleyi *Delacour*.

Diese im Jahre 1921 von Delacour benannte Form ist anscheinend identisch mit der von Dr. Stresemann (Journ. f. Ornithol. 1923) Leiothrix lutea kwangtungensis benannten Sonnenvogelform, die a. a. O. folgendermaßen gekennzeichnet wird: „... größere Sättigung der gelben Lipochrome: Kehle dunkler und rötlicher gelb; Brust, Bauchmitte, Zügel und Augenring gelblicher, weniger weißlich; Oberkopf mehr orangeoliv, weniger grünoliv; Rücken grünlicher, weniger grau; Färbung der Schwingenaußensäume wie bei L. l. lutea. Fundorte in der Prov. Kwangtung".

(Fortsetzung folgt.)

Die Darre (Kalkdurchfall) der Körnerfresser.

Von Karl Finck, Neukölln.

(Nachdruck verboten.)

Im Freien war es fast noch winterlich öde. Schwere Regentropfen klatschten an die Fensterscheiben, jedoch in meiner Stube herrschte schon Lenzstimmung.

Laut flötete das beinahe fingerzahme Rotkehlchen, obwohl es erst vor wenigen Tagen sterbensmatt aus dem Süden kam, unaufhörlich krähte der Hänfling, dazwischen klingelte eine Kohlmeise, schmetterte mein alter Buchfink — alles ehemalige Todeskandidaten, die durch eine geeignete Behandlung ihre volle Lebensfrische wiedererlangt haben.

Zwar ist die Pflege der Körnerfresser verhältnismäßig einfach, trotzdem läßt die Ernährung beinahe immer zu wünschen übrig.

Wer derartige Vögel gewissenhaft in der Freiheit beobachtet, wird bald bemerken, daß die Tiere eigentlich nur wenige Wochen völlig ausgereifte Körner verzehren, während in der übrigen Zeit gekeimte oder halbreife, noch milchige Sämereien nebst Grünkraut, Beeren und Insekten ihre hauptsächliche Nahrung bilden.

Rotschwänzige Hügelmeise.

Bekanntlich vermag der Tierkörper allein wasserlösliche Nährverbindungen direkt auszunützen. Alle festen Stoffe werden dagegen erst durch die Sekrete der verschiedenen Drüsen verändert, resp. verflüssigt. Aber für solche Umwandlungen ist der jugendliche Organismus nur unvollkommen befähigt. Aus diesem Grunde erkranken junge Körnerfresser leicht, sobald sie vorwiegend hartes Samenfutter erhalten.

Auch die Pflanze kann zum Aufbau ihrer Gewebe bloß lösliche Verbindungen gebrauchen, daher werden bei der Keimung alle Reserveablagerungen des Samens durch Fermente nach und nach umgruppiert. Sobald ein Samenkorn Wasser aufnimmt, quillt es auf, der Sauerstoff regt die Atmung an, und sofern die Wärme genügt, zeigt sich bald junges Leben. Bei den zweilappigen Pflanzen wachsen die Keimlappen, worin die Vorratsstoffe lagern, mit dem Stengel aus dem Boden heraus.

Ein Vogel, welcher Samenblätter, gekeimte oder unreife Körner verzehrt, führt seinem Körper eine leicht verdauliche, nach jeder Hinsicht gehaltvolle Nahrung zu. Der kleine Gefangene muß dagegen Tag für Tag ausgereiftes, vielfach ungeeignetes Futter aufnehmen.

Allmählich entwickelt sich zwar bis zu gewissen Grenzen eine Anpassung, und die Verdauungsorgane leisten notgedrungen halbwegs die vermehrte Arbeit.

Dauernd vermag jedoch der Körper die übermäßigen Nahrungsmengen schlecht auszunützen, Einnahmen und Ausgaben stehen in keinem richtigen Verhältnis zueinander, und es kommt im günstigen Falle eine Überernährung zustande.

Zuerst lagert sich das Fett unter der Haut ab. Schließlich entarten lebenswichtige Organe. Das geschwächte Herz verlangsamt den Stoffwechsel. Die Nahrung wird nun nur mehr unvollkommen abgebaut, verschiedene Schlacken bleiben teilweise zurück, und es entwickelt sich eine fehlerhafte Blutmischung.

Sehr häufig verursacht vorgeschrittene Fettsucht schnell tödlich verlaufende Darmkrankheiten. Solche entstehen auch, wie schon erwähnt, infolge naturwidriger Ernährung. Besonders werden Wildfänge während der Eingewöhnung von solchen Leiden befallen und gehen häufig innerhalb weniger Tage zugrunde.

Die Symptome des akuten Darmkatarrhs, der sogenannten Darre oder des Kalkdurchfalles, kennt wohl jeder Liebhaber aus seiner eigenen Praxis. Ein erfahrener Pfleger bemerkt schon die ersten Anzeichen der überaus gefährlichen Krankheit, selbst wenn das Vögelchen anscheinend noch ganz gesund ist.

Bei Einzelhaltung fällt es zunächst auf, daß der Patient die übliche Futtermenge nicht restlos verzehrt, also eine gewisse Appetitlosigkeit markiert. Das Gefieder wird zeitweise etwas locker getragen, und oft-

mals schließt der Vogel wenige Minuten ermüdet die Augen. Abmagerung braucht zunächst keineswegs vorhanden sein, dagegen zeigt sich beim Aufpusten der Bauchfedern bereits eine ziemliche Spannung des Unterleibes. Vielfach sind Teile der erweiterten Därme sichtbar. Die Bauchpartie eines gesunden Vogels ist verhältnismäßig klein, liegt tiefer, bildet niemals mit dem Brustbein eine gerade Linie oder tritt gar gewölbt hervor. Fettanhäufungen verwischen selbstverständlich das Bild.

Im Gesellschaftskäfig sind die Anfangssymptome schwer sichtbar, weil der noch immer kräftige Patient von seinen gesunden Kameraden ständig mitgerissen wird und tagsüber selten zur Ruhe kommt. Bald aber ändern sich die Gesamterscheinungen. Der Kranke schläft viel, hockt aufgeplustert mit hängenden Flügeln umher; und unstillbarer Durst und Heißhunger stellen sich ein. Sorgsame Beobachtung ergibt jedoch, daß solcher Vogel zwar hastig Futter aufnimmt, aber harte Körner wieder fallen läßt, da die Kräfte zur Aushülsung nicht mehr genügen.

Stieglitze, Kreuzschnäbel und Zeisige klettern bei Beginn der Krankheit oftmals aufgeregt umher, äußern Unrast und Bangigkeit.

Der Kot verliert schon frühzeitig seine feste Form, wird weich, flüssig, weiß, kalkig und sieht zuletzt beinahe wasserhell aus.

Nun nimmt die Abmagerung schnell zu, messerscharf erscheint das Brustbein, die Augen werden klein, der Todeskandidat schläft viel und erwacht nur, um zu fressen und viel zu trinken. Nach einigen Tagen stellt sich der Tod ein. Die zarten Schleimhäute sind bei dem geöffneten Kadaver geschwollen, mit mehr oder minder zähen Sekreten überzogen. Entzündungsherde, entweder eng umgrenzt oder mehr verschwommen, sind fast stets vorhanden, namentlich ist der Kloakenausgang gerötet. Oft sieht man eine stark vergrößerte Leber und ausgeprägte katarrhalische Reizungen des Magens.

Die Krankheit macht sich bei Herbstwildfängen keineswegs in jedem Jahre gleichmäßig bemerkbar; sie tritt nach meinen Erfahrungen besonders in feuchten Jahrgängen auf, da dann die Vegetation spät abschließt und das Vogelvölkchen lange unreife Sämereien findet.

„Do Vieal san holt empfindli, weil's draußen no vül woaches Fuatter haben", erklärte mir einmal ein niederösterreichischer Vogelfänger. Der alte Jockel, wie er von den Winzern genannt wurde, durfte mit Erlaubnis der Forstbehörde zu bestimmten Perioden den Fang von Samenvögeln betreiben. Meistens benutzte der ehrliche Kerl große Zugnetze. Obwohl er seine Beute geradezu rührend human behandelte, die Tierchen bloß wenige Minuten in luftigen Behältern transportierte, machten sich häufig nach 24 Stunden zahlreiche Erkrankungen bemerkbar. Der Mangel an Vitamin- und Nährsalzarten kam in dieser kurzen Zeit sicherlich nicht in Frage.

Der plötzliche Futterwechsel einmal, nachher auch die Eingewöhnung in großen Flugräumen, wo die aufgeregten Geschöpfe niemals zur Ruhe kamen, infolgedessen ungenügend und zu hastig Nahrung aufnahmen, verursachten nach meiner Ansicht die Darmleiden.

(Schluß folgt.)

Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten.

Von J. Kuntzendorff, Berlin.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Die Verträglichkeit ist eine große. Eichlam besonders rühmt dieselbe, auch wenn die Organisten zu mehreren Paaren zusammen gehalten werden.

Rotbauchorganist.

Desgleichen zeigten sie diese im Flugraum anderen Vogelarten gegenüber, wie genannter Pfleger ausführlich beschreibt. Ich selbst habe hierin keine Beobachtungen machen können, da ich sie stets in Käfigen meist paarweise gehalten habe.

Die einzige häufiger eingeführte Art ist der in seiner Heimat als Käfigvogel beliebte

violettblaue Organist — Euphonia violacea (*L.*).

Seine Heimat ist Britisch Guiana, Surinam, Kayenne, Trinidat und Nordbrasilien. Er lebt hauptsächlich in Obstplantagen, wo er sich in den Obstbäumen an den Früchten gütlich tut, in mehr oder minder großen Scharen und verursacht daher zuweilen nicht geringen Schaden. Der Gesang wird als ziemlich laut, andauernd und schwatzend erwähnt und das Spöttertalent hervorgehoben. Das Nest baut er im dichten Gebüsch eigenartig groß, napfförmig und nicht sehr kunstvoll aus Gräsern, Fasern und Baumwollflocken und es enthält 3—5 dünnschalige Eier. Nach Angabe José-Maria Parejos erwähnt Teschemaker (England) die kuglige Form des Nestes.

Das ♂ ist an der Stirn bis zur Höhe der Augen orangegelb, ebenso die ganze Unterseite; Oberseite, Schwanz und Flügel dunkelviolettblau; die schwarze

Unterseite des Schwanzes weist an den beiden äußeren Federn einen weißen Fleck an der Innenfahne auf; an der Innenfahne der Unterseite der Schwingen ein großer, weißer Fleck; Auge braun, Schnabel und Füße schwarz. Das ♀ ist oberseits olivgrün, unterseits gelblicholiv. Lg. 92, Fl. 63—64, Schw. 36—37 mm.

Als Käfigvögel sind die Organisten zu den Vögeln zu zählen, die infolge ihres im Bauer an den Tag gelegten Pflegmas und ihrer meist wenig großen Beweglichkeit auf die Dauer langweilig wirken können. Ihr Gebaren erinnert in einer Beziehung an das der Prachtfinken, da sie sich oft aneinander kuscheln. Im Flugraum dagegen sollen sie in voller Natürlichkeit ihrem lebhaften Temperament die Zügel schießen lassen. Beweglich und mit großer Munterkeit würden sie hier, nicht nur durch ihre lebhaften Farben, viel zur Belebung der Voliere beitragen, und sie bieten dann viel interessanten Beobachtungsstoff. Es ist somit für die Organisten die Unterbringung in Flugräumen die wirklich richtige Käfigungsart, besonders, da sie nach Angaben der angeführten Vogelwirte dann ausdauernder sein sollen. Eigenartig ist es, daß mit wenigen Ausnahmen die Lautäußerungen allgemein nicht als ein Gesang bezeichnet werden und die Liebhaber fast alle die gradezu begeisterten Lobpreisungen der Reisenden nicht bestätigen können. Dr. Ruß allerdings berichtet von 2 Organisten, die sich als großartige Spötter erwiesen haben. Von meinen beiden Paaren kann ich solches nicht behaupten, es war der sog. Gesang mehr wie unbedeutend zu nennen. Züchtungsversuche sind bei mir nicht gelungen, doch sind solche auch verschiedentlich anderweitig angestellt worden, aber nur einer ist zur allgemeinen Kenntnis gelangt. Über einen sehr ausführlich beschriebenen, jedoch mißglückten Versuch Teschemakers berichtet José-Maria Parejo in der Wochenschrift. Hier sollen übrigens die Organisten mit größtem Wohlbehagen dicke schwarze Gartenschnecken verzehrt haben(?). Ich muß diese Vögel als unbedingt diffizil bezeichnen, denn trotz mannigfaltiger Kost, hauptsächlich in Früchten, waren sie nie so lange bei mir am Leben zu erhalten, wie andere Vögel. Mithin muß dem gereichten Futter irgend ein Stoff fehlen, den sie in der freien Natur bei ausschließlicher Fruchtnahrung nicht zu entbehren brauchen.

Über beide nachfolgende Arten kann ich aus eigener Erfahrung leider nicht viel berichten, da sie sich bei mir nicht lange gehalten haben. Der

Gelbbauchorganist — Euphonia aurea (*Pall.*)

wurde von mir in einem Pärchen verpflegt. Die Heimat ist Guiana und Nordbrasilien. In ihrem Wesen und ihren Lebensgewohnheiten dürften sie sich von der vorigen Art kaum unterscheiden. Das ♂ ist am Oberkopf bis zur Scheitelmitte gelb, übrige Oberseite, Kehle, Flügel, Schwanz violettschwarz; übrige Unterseite goldgelb; Schwanz unterseits schwarz, auf der Innenfahne der beiden äußeren Federn ein großer, weißer Fleck; die Unterseite der Flügel schwarz mit einem großen, weißen Fleck an der Innenfahne der Schwingen; Auge dunkel, Schnabel und Füße schwarz. Das ♀ ist oberseits grauoliv, an Stirn und Bürzel gelblicher, desgleichen unterseits, Brust- und Bauchmitte grauweiß, Seiten und After hellgelb. Lg. 83, Fl. 52, Schw. 30 mm.

Dieses Organistenpärchen hatte, da es sich um recht empfindliche Vögel handelte, in einem Schamakäfig am Fenster der Sonnenseite meines Schreibzimmers seinen Platz, unter welchem sich die mit einem Verdampfungsapparat versehene Zentralheizung befand — ich erhielt die Vögelchen im März. Trotz der stets gleichmäßig warmen und feuchten Temperatur und des guten und vielseitigen Futters — bei der vorigen Art angeführt — hatte ich an denselben nur kurze Zeit meine Freude, denn bald nach der Ankunft segnete das ♂ das Zeitliche, während

Gelbbauchorganist.

das ♀ anscheinend sich besserer Gesundheit erfreute. Da es dem Ehegesponst nachzutrauern schien, bestellte ich noch ein ♂, das auch bald bei mir seinen Einzug hielt und noch am gleichen Abend zum ♀ gelassen wurde. Am anderen Morgen war ich, als ich die Neuerwerbung in Augenschein nahm, nicht wenig erstaunt, als ich bemerkte, daß der neue Ankömmling ein anders gefärbtes Federkleid besaß als der dahingeschiedene Gatte der Organistin. Er entpuppte sich als der

Schillerorganist — Euphonia chlorotica *L.*

aus dem nördlichen Brasilien, Neugranada, Venezuela, Guiana und Kolumbien. Das ♂ ist an Stirn und Oberkopf bis hinter die Augen dottergelb; Zügel, Wangen, Rückenseiten, Kehle bis über den Vorderhals stahlblau, dunkelviolett glänzend; Rücken und Flügeldecken am meisten blau; unterseits dottergelb; Flügel und Schwanz schwarz, erstere mit weißem Innensaum, die äußersten Federn der letzteren mit einem großen, weißen Fleck; Auge braun, Schnabel horngrau, Füße bräunlichschwarz. Lg. 100, Fl. 63, Schw. 25 mm. Beide Organisten vertrugen sich in ihrer Behausung gut, doch wollte besonders der zu-

letzt eingetroffene nicht so recht ans Futter gehen und dieser genehmigte auch in der Hauptsache und fast ausschließlich nur die Fruchtnahrung. Mehlwürmer wurden gänzlich unbeachtet gelassen. Trotz der größten Abwechslung im Futter und der sorgfältigsten Pflege gingen beide schon Anfang Mai ein.

(Fortsetzung folgt.)

Wenn Vogelliebhaber eine Reise tun, da können sie was erzählen.

Von Max Hunger, Leipzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Gleichsam, als wollte uns Petrus für die Witterungsunbilden der ersten Tage entschädigen, durchbricht die Sonne in sieghaftem Glanze die Morgendämmerung des neuen Tages.

Schon Donnerstag! — Wie schnell verrinnt doch für uns Naturfreunde die kostbare Ferienzeit.

Der Vormittagsausflug findet uns auf dem Wege zum Mooshäuschen bis kurz vor Sitzendorf. Er sollte hauptsächlich der Nestersuche dienen. Beim Überschreiten der Schwarza sehen wir einen schwarzgrauen amselgroßen Vogel auffliegen. Unweit von uns, mitten im Flußbett auf einem hervorragenden Steine, läßt er sich nieder. Eifrig knicksend und mit dem Schwanze wippend wendet er uns seine Vorderseite zu.

Eine Wasseramsel! Die erste, die wir zu Gesicht bekommen! Aus aller Munde ertönt dieser freudig bewegte Ausruf (s. Abb. S. 426).

Das Tierchen bietet mitten im reißenden Bach mit seiner weißen Brust und Kehle, hurtig von Stein zu Stein springend, einen reizenden Anblick. Unser Weitergehen scheucht sie auf, und weiter oben am buschigen Ufer läßt sie sich nieder.

Der sanft ansteigende Berg bildet mit seinen vielen Schwarz- und Schlehdorn-, Buchen- und Brombeerhecken ein wahres Dorado für die Nester unserer gefiederten Lieblinge. Dementsprechend groß ist auch die Zahl der gefundenen Nester. War es uns doch vergönnt, innerhalb verhältnismäßig kürzester Zeit 14 Nester mit Eiern bzw. Jungen zu finden.

Nachstehend eine kurze Aufstellung:

2 Gartengrasmücken mit 4 bzw. 5 Eiern; 3 Gartengrasmücken mit 3, 5 bzw. 4 Jungen; 2 Singdrosseln mit 5 bzw. 4 Eiern und 1 Singdrossel mit 5 Jungen; 1 Schwarzplatte mit 3 Eiern und 1 Schwarzplatte mit 5 Jungen; 1 Dorngrasmücke mit 5 Jungen; 1 Weidenlaubsänger mit 5 Eiern und 1 Weidenlaubsänger mit 5 Jungen; 1 Müllerchen mit 4 Jungen.

Gleichzeitig möchte ich noch einer Gebirgsstelze und einer weißen Bachstelze mit ausgeflogenen Jungen Erwähnung tun.

Dabei sind sämtliche vorstehenden Vogelarten, die mehrfach mit ausgeflogenen Jungen beobachtet wurden, nicht mit berücksichtigt.



Gebirgsstelze.

Ferner beobachteten wir noch auf dem Rückwege eine Mehlschwalbe beim Nestbau und eine solche Junge fütternd.

Stolz und froh ob dieses großen Erfolges traten wir den Heimweg an.

Die Nachmittagswanderung führt uns auf dem Wege nach Blankenburg bis zum Schweizerhaus, einem beliebten Ausflugsort. Geschäftig eilt die Schwarza zwischen dem steil emporstrebenden Felsengewirr dahin. Diese gigantischen Felsmassen bieten in ihrem zwanglosen Durcheinander, dadurch groteske Formen bildend, einen überwältigenden Anblick. Hier und da beleben kleinere und größere Flecken des bekannten roten Fingerhutes (Digitalis), einer giftigen, zu Arzneimitteln verwendbaren Pflanze, die Waldblößen in farbenprächtiger Harmonie. Der laute Ruf eines Kuckucks, des ersten, den wir zu Gehör bekommen, unterbricht unsere Wanderung auf kurze Zeit. Kohl- und Sumpfmeisen liegen in emsiger Tätigkeit der Mücken- und Fliegenjagd ob. Zahlreiche Zeisige lassen auf den das Ufer der Schwarza umsäumenden Erlen ihr „didl didl deidl dehn" hören.

Hatten wir schon zu Beginn unserer Wanderung ein Pärchen Wasseramseln beobachtet, so gelingt es uns jetzt, ein weiteres zu beobachten. Ihr munteres Wesen mit den anmutigen knicksenden Bewegungen entzückt uns aufs neue. Am gegenseitigen Ufer unter einer von Buschwerk umrankten Steinwölbung verschwinden beide. Leider verbietet das feuchte Element und die vorgerückte Zeit eine nähere Untersuchung. — — — —

Ein Abendspaziergang durch Schwarzburg vereint uns noch auf ein Stündchen. Aus dem „Schwarzburger Hof" ertönen die lustigen Weisen einer Kapelle. Horcht — — — war das nicht ein Spötter! Herr Chlodek hat recht. Deutlich vernehmen wir im Gehölz des ansteigenden Schloßberges den an Imitationen so reichhaltigen Gesang dieses kleinen, fleißigen Burschen.

„Stiglit, stiglit, piklnik" zwitschert's im nahen Apfelbaume. Ein Stieglitz hat sich dort niedergelassen. Farbenprächtig leuchtet sein schwarz-weiß-rotgoldenes Gefieder.

Der Freitag ist für einen nochmaligen Besuch der beiden unstreitig schönsten Aussichtspunkte, dem Trippstein und Schloß, vorgesehen. An Beobachtungen sind nur ein zweiter Spötter, der in seiner Tonlage nicht die Reichhaltigkeit und Reinheit des ersteren erreicht und eine an dem keck aufgerichteten Federschopf erkennbare Haubenmeise zu verzeichnen. Dieses kleine possierliche Kerlchen ist, wie ja überhaupt ihre sämtlichen Artgenossen, ungemein niedlich und reizend anzuschauen. Schon von weitem verrät sie sich durch ihre kollernden Locktöne „Zikürr, zikürr".

Große Flecken der hier sehr viel vorkommenden Walderdbeere bieten den Damen die nötige Kurzweil. — — —

In strahlender Pracht beginnt die Sonne ihre Laufbahn, den Sonnabend als letzten Ausflugstag unseres Ferienaufenthaltes einleitend. Stahlblauer Himmel, nur ab und zu von kleinen weißen Wolken unterbrochen, bedeckt den Horizont.

(Schluß folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Lebensrettung bei den Schwalben. Die rührende Fürsorge, die die Schwalbeneltern ihren Jungen entgegenbringen, ist schon oft in Prosa und Vers geschildert und gepriesen worden. Ein vortreffliches Beispiel für diese Elternliebe, das zugleich das innige Zusammenwirken von Vater und Mutter bei den Schwalben schlagend beleuchtet, ist von dem Halleschen Anatom Paul Eisler beobachtet worden. Eisler sah eines Tages, wie durch das offene Fenster seines im Erdgeschoß gelegenen Arbeitszimmers eine noch nicht ganz flügge Schwalbe hart auf die Diele fiel. Nachdem das Tierchen sich von seiner leichten Betäubung erholt hatte, setzte er es auf die breite, sanft nach außen geneigte Schieferplatte der Fensterbank, wo es unter ängstlichem Schreien unbeweglich sitzen blieb. „Die beiden alten Schwalben", so erzählt der Gelehrte den Vorfall, „waren zunächst laut kreischend vor dem Fenster hin und her geflogen, hatten sich bei meinem Anblick auf die Dachkante eines zweistöckigen Anbaues zurückgezogen und beantworteten von dort lebhaft das Schreien des Jungen. Ich trat nun hinter den dichten Fenstervorhang und beobachtete durch ein Loch in diesem das Weitere. Nach einer kleinen Weile begann das Junge mit unsicheren Schritttchen und weitabgespreizten Flügeln gegen den Rand der Fensterbank vorwärtszutaumeln. Die Alten schrien jetzt unaufhörlich, kamen aber nicht herbei. Am Rande der Fensterbank angelangt, kippte das Junge ungeschickt nach vorn über, und sein Sturz in den Hof schien mein Eingreifen unvermeidlich. Da schossen plötzlich unter durchdringendem Gekreisch die beiden Alten mit Blitzesgeschwindigkeit vom Dach herab, schwebten in wundervollem Steilbogen von rechts und links dicht an das Junge dem gleichen ununterbrochenen Schwunge in weitausgreifender Schraubenlinie zum Dache des Anbaus empor. Die Präzision in dem gleichzeitigen Untergreifen der Flügel des Jungen und in der Wahrung des gegenseitigen Abstandes beim Aufsteigen war noch verblüffender als die Ausführung der ganzen Bewegung ab- und aufwärts in einem zusammenhängenden Gleitflug ohne einen einzigen Flügelschlag. Das Junge hing während des Aufstiegs ganz ruhig zwischen den beiden Alten."

(Hann. Tagebl.)

* Mit der Fütterung von mit **Leberthran** benetztem Futter, habe ich ganz auffallend gute Erfolge erzielt. Besonders was die Befiederung frisch importierter Vögel anbelangt, ist das Resultat ein ganz hervorragendes. Kaum ein Drittel der Zeit benötigen selbe, um vollständig glatt und schmuck dazustehen, gegen früher; selbst bei sehr defekten Tieren. Legenot kenne ich fast nicht mehr; außerdem ist eine gesteigerte Lebenslust und Tätigkeit ganz unverkennbar festzustellen. Doch will ich aber auch nicht unerwähnt lassen, daß meine sämtlichen Körnerfresser auch sehr viel animalische Kost, wie Mehlwürmer, frische Ameisenpuppen erhalten und auch sehr gern annehmen. H. S., Troppau.

Steinadler in Baden abgeschossen. Das „Karlsruher Tagblatt" bringt folgende Mitteilung: „tu. Hauingen b. Lörrach, 22. Aug. Der Jäger L. Schwal schoß einen prächtigen Steinadler mit einer Spannweite von 1,89 Metern. Man glaubt, daß der Vogel sich verflogen hat, weil in der Schweiz zurzeit große Gebirgsmanöver stattfinden. Da der Steinadler ein seltener Vogel ist und unter dem Naturschutz steht, ist dieser Schuß mehr zu bedauern." Da es sich hier wirklich um einen Steinadler zu handeln scheint, die Angabe der Flügelspannweite spricht dafür, muß diese „Heldentat" des Jägers aufs schärfste verurteilt werden. Die Gesetzgebung der neueren Zeit schützt den Adler als seltenes Naturdenkmal. Trotzdem bringt es ein anscheinend berufsmäßiger Jäger fertig, den seltenen, reckenhaften Vogel herunterzuholen, genau wie in früheren Zeiten, als die Naturschutzbestrebungen noch wenig wirksam waren und jeder Schießer es für seine Pflicht hielt, jeden größeren Raubvogel niederzuholen.

Ungestörtheit beim Nestbau. In unserm Garten befindet sich ein Brunnen, wo im Frühjahr ein Gartenrotschwänzchenpaar sich anschickte, unter dem Dach des Brunnens über der Röhre ihr Heim aufzuschlagen. Eines Tages war die Brunnenröhre verstopft und das angefangene Nest mußte leider entfernt werden, da wir ohne Wasser gewesen wären. Am nächsten Tage war schon wieder der Brunnen verstopft, indem das Paar schon wieder einen Haufen Nistmaterial in den Brunnen geschleppt hatte. Es mußte abermals entfernt werden und der Brunnen wurde nun ganz zugemacht, alle Öffnungen verstopft. Erst dann bezog das dreiste Paar einen Nistkasten, welche zur Genüge angebracht sind. Anton Luginger, Pfarrkirchen.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 21: Das Buch von Detmers: „Pflege und Abrichtung von Raubvögeln" ist im Verlag von Pfenningstorff, Berlin, vergriffen, kann mir ein Leser dieses Buch käuflich überlassen? Rendant Walter, Eilenburg.

Antwort.

Auf Frage 18: Wie bei vielen Finkenvögeln, kommen auch bei dem Grauedelsänger singende Weibchen vor. Doch singen sie anders als die Männchen. Ihrem Gesang fehlt die richtige rhythmische Bindung; sie wispern und zwitschern, lassen aber nicht die lange, schlagartig hinfließende Weise der Männchen hören. Ebenso ist es ja auch bei Zeisigen und Stieglitzen; nur der Dompfaff dürfte in der Hinsicht eine Ausnahme machen. Selbst bei solchen Arten, wie dem Sonnenvogel, wo die Weibchen auffällige melodische Rufe hören lassen, pflegen diese ja von den Lauten des Männchens spezifisch verschieden zu sein.

Jedenfalls habe ich den Eindruck, daß aus den Rufen der Tierchen noch nicht gefolgert werden dürfe, daß es sich um Männchen handle. Dazu wäre der Besitzer erst berechtigt, wenn die Vögel nicht nur auf die Rufe des gleichartigen Nachbarn mit zwitschernden Lauten antworten, sondern aus freiem Antriebe rhythmisch gebundene Strophen vortragen, wie sie für den männlichen Grauedelsänger bezeichnend sind. Fritz Braun.

Auf Frage 20. Es handelt sich nicht um Bandwürmer. Die ausgesprochen fadenförmige Gestalt der Würmer, von denen in der Anfrage die Rede ist, ist für die Familie der Fadenwürmer, um solche handelt es sich, kennzeichnend. Es sind von diesen eine große Anzahl bekannt, welche in den Leibeshöhlen oder in den Organen der Vögel leben. Sie gelangen in den Vogelkörper dadurch, daß der Zwischenwirt, in welchem sie in einem bestimmten Entwicklungsstadium leben, von den Vögeln verzehrt wird, oder auch, daß ein solcher Zwischenwirt, häufig blutsaugende Insekten, die nicht selten mikroskopisch kleinen Stadien der Fadenwürmer durch seinen Stich in den Vogelkörper überträgt. In kürzerer oder längerer Zeit entzieht der Parasit dem Wirtstier lebende Substanz oder fertige Nahrung. Die meisten entziehen dem Körper des Wirtes Körpersäfte. Anscheinend fügen die in dem Körper der Stubenvögel lebenden Fadenwürmer ihnen nur in seltenen Fällen einen das Leben bedrohenden Schaden zu. Bekannt ist, daß bei fast jedem alten Rotrückenwürger unter der Haut des Hinterkopfes Fadenwürmer gefunden werden, die den Vogel nicht gerade sehr zu belästigen scheinen. Anders verhält es sich mit dem jungen Hausgeflügel, dem starker Befall mit Fadenwürmern sehr gefährlich werden kann. H.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.), Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

Auf dem Verbandstage der Deutschen Vogelhändler in Dortmund ist Beschwerde über Angriffe des Reichsverbandes auf die Händlerschaft geführt worden. Die organisierte Händlerschaft glaubt in unserem Jahresberichte „Ges. Welt" Nr. 28 Jahrgang 25, wo es heißt: „Bedauerlicherweise genießen aber die Händler trotz nachgewiesener Unreellität noch den gesetzlichen Schutz gegen die Verbreitung der Warnungen", angegriffen worden zu sein. Um Unstimmigkeiten in den Beziehungen zwischen den Händlerorganisationen und dem Reichsverbande von vornherein zu unterbinden, erklären wir gern, daß keinerlei Angriffe gegen die Händlerschaft beabsichtigt waren und sind. Der aufmerksame Leser wird zugeben müssen, daß in dem Bericht nur von unreellen Händlern die Rede ist und, daß der beanstandete Satz auch nur diese betreffen kann. Es ist daher unmöglich, daß sich die gesamte organisierte Händlerschaft getroffen fühlen kann. Wir werden auch fernerhin auf ein gedeihliches Zusammenarbeiten mit den Organisationen der Vogelhändler Deutschlands gemäß § 1 Punkt 5 unserer Satzungen: Bekämpfung unlauterer Machenschaften im Vogelhandel im Verein mit dem Verbande der Vogelhändler Deutschlands, unser Augenmerk richten. J. A.: Petters.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Clauß, Grimma i. Sa., Lorenzstr. 3: 1 Tovisittich.

Friedrich Frank, München, Gabelsbergerstr. 9: Rosenpapagei.

J. Henninger, rue Beeckman 98, Brüssel: Violettblaue Organisten, grüne Pitpits, Rotbauchfluchtvögel, Goldstirnblattvögel, Silberohrsonnenvögel.

Robert Kühn, ab 10. 9. per Adresse: B. Haase, Berlin-Lankwitz, Charlottenstr. 42: Tangaren, Drosseln, Köhleramseln, Elsterlinge, kleine Täubchen, Pfäffchen, Safranfinken, Morgenammerfinken, Sittiche, Blauraben, Pitpits (blaugrüner Naschzuckervogel).

Kunze, Freiberg in Sachsen, Pfarrgasse 32: Kalifornische Schopfwachteln, rotstirnige Bergpapageien, Zebrataubchen, Organist (Männchen), Indigofink, mex. Karmingimpel.

Gustav Müller, Tier-Großhandlung, Hamburg 31, Langenfelderdamm 27, Fernsprecher: Vulkan 7141: Taubenhals-, Guatemala-Amazonen, Veilchen-, Goldstirn-Papagei, Guayaquil-, Feuerflügel-, Pavua-, Blumenau-, Jendaya-, Blaustirn-, Braunohr-Sittiche, afrikanische Glanzstare, Organisten, schwarze Tangaren mit roter Haube, 1 Schwarzkopfzeisig, Pfäffchen, Gelbwangen-Sittiche, Rotsteiß-Bülbüls.



Herrn W. K., Meuselwitz. Besondere Erfahrungen über Verfütterung von Hausgrillen an heimische Insektenfresser liegen wohl nicht vor. Größere Insektenfresser wie Drosseln, Stare, Würger werden sie gern annehmen, kleinere wie Rot- und Blaukehlchen werden wahrscheinlich auch ab und zu eine der Grillen verzehren. Wenn diese Kerfe in größeren Mengen vorhanden sind, wäre es zweckmäßig, sie zu trocknen und zu Insektenschrot zu verarbeiten, um sie so als wertvolle Beigabe im Futtergemisch den Vögeln zu verabreichen. Ab und zu kann ja dann auch eine lebende Grille gereicht werden.

Herrn A. P., Die Amazone war eine Gelbbauchamazone — Amazona xanthops im Jugendkleid. Die Art wurde 1897 von Karl Hagenbeck das Erstemal in zwei Stücken eingeführt. Seitdem scheint sie nicht mehr nach Europa gebracht zu sein.

Herrn H. W., Breslau. Die Vorbedingung zur Erzielung eines fleißig vorgetragenen Gesanges ist bei unsern als gute Sänger geschätzten Insektenfressern die richtige Pflege, die hohe Anforderungen an Verständnis und Kenntnis des Pflegers stellt. Diese Vorbedingung kann in einem Gesellschaftskäfig, in welchem 8—10 edle Insektenfresser untergebracht sind, nicht erfüllt werden. Schon aus diesem Grunde, neben anderen, würde die Absicht des Fragestellers nicht ausgeführt werden können oder die Ausführung nicht zu dem gewünschten Resultat führen. Mit der Unterbringung von 10 Kanarienhähnen in einem Käfig würde der Zweck gleichfalls nicht zu erreichen sein. Die Vögel würden einander stören, würden sich überschreien, Beißereien wären an der Tagesordnung. Der Ankauf von Kanarien ist zurzeit nicht zu empfehlen, da die alten Vögel jetzt schweigen und die Jungen noch nicht fertig mit der Ausbildung sind. Am ehesten ging es noch mit einigen Körnerfressern, denen man ein Schwarzplättchen beigesellen könnte, obgleich auch dabei gewisse Übelstände eintreten können. Der Bluthänfling ist ein sehr angenehmer Sänger, ferner käme hinzu Stieglitz, Erlenzeisig, Girlitz, Buchfink.

Herrn J. B., Leipzig-Mockau: Beiträge dankend erhalten.

Herrn P. W., Dahlerbrück. Anscheinend ist die Schamadrossel, als sie vor einem Vierteljahr bezogen wurde, sofort mit frischen Ameisenpuppen gefüttert worden. Infolgedessen ist sie zu früh in die Mauser gekommen. Es ist gut, ihr neben dem Futtergemisch möglichst viel lebende Insekten, wie Käfer, Schmetterlinge, Grashüpfer, Spinnen und dergleichen zu geben.

Herrn M. W., Eilenburg. Ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn A. C., Berlin. Parrells Zeisig ist der bekannten mit Abzehrung verbundenen Ernährungsstörung erlegen.

Frl. F. L., Oberkirch. Zur Beherbergung eines Stares ist der ganz aus Metall gefertigte Käfig einem Käfig, dessen Sockel aus Holz gefertigt ist, vorzuziehen.

Herrn D. K., Osnabrück. 1. Ein gutsingender Kanarienvogel kann durch den Gesang eines Girlitzes in gesanglicher Beziehung ungünstig beeinflußt werden. 2. Zebrafinken können mit anderen Prachtfinken zusammengehalten werden. Im Nisten lassen sie sich durch die Mitbewohner nicht stören.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.

hrgang 54 10. September 1925 Heft 37

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Von grauen und anderen Papageien. Von S. Lichtenstaedt.
Meine Körnerfresser. (Forts.)
Neueinführungen und Seltenheiten. Von K. Neunzig. (Forts.)
Die Darre (Kalkdurchfall) der Körnerfresser. Von Karl Finck, Neukölln.
Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten. Von J. Kuntzendorff, Berlin. (Forts.)
Wenn Vogelliebhaber eine Reise tun, da können sie was erzählen. Von Max Hunger, Leipzig. (Forts.)
Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (e. V.) Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung d. Vogelliebhaber, Landesverband Preußen. 1. Vors. Karl Gumprich, Berlin W 50, Nürnberger Str. 44; 1. Schriftf. P. Böhme, Berlin O 17, Rüdersdorfer Str. 69; Kassierer Erich Merz, Bln.-Friedenau, Wilh.-Hauff-Str. 14. Geldsendungen an: Erich Merz, Bln.-Friedenau, Postscheckkonto Berlin NW 7 Nr. 461 55. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt". Schriftwechsel von grundlegender Bedeutung ist dem 1. Vorsitzenden zuzuleiten. J. A.: P. Böhme.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10. Anmeldungen zur A. Z. bitte ich an den Präsidenten Herrn Horst Wagner in Bruchmühle bei Fredersdorf a. Ostbahn, Lindenstr. 32, zu richten. — Angemeldet ist Herr Franz Gröchl, Böhm. Leipa (Tschechoslovakei), Parkstraße.

A. Krabbe.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen. — Am Sonnabend, dem 3. Oktober, begeht die Vereinigung die Feier ihres 30. Stiftungsfestes im Vereinslokal, großer Saal, Alexandrinenstr. 37a. Alle Freunde und Gönner des Vereins sind dazu herzlichst eingeladen. Eintrittskarten à 1,50 M. sind beim Unterzeichneten zu entnehmen.

J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke, Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Dessau und Umgegend. Gegründet März 1925. Versammlung jeden 2. Mittwoch abends 8 Uhr. Vereinslokal: „Fürst Blücher," Ecke Antoinetten-Leopoldstr. Nächste Versammlungen: 16. und 30. September. Demnächst ist eine Führung durch das Naturkundliche Museum zu Zerbst unter Leitung des bekannten Ornithologen, Herrn Krietsch, Dessau, geplant. 1. Vors. Herr Krietsch, 2. Vors. Herr Weichelt, Schriftf. Herr E. Dielitzsch, Kass. Herr Michel. Gäste zu den Versammlungen und sonstigen Veranstaltungen stets willkommen. Ein Zusammenschluß aller Liebhaber im Interesse unserer schönen, aber schwer bedrohten Liebhaberei ist auch in Dessau unerläßlich.

J. A.: Erich Dielitzsch, Schriftf., Dessau, Teichstr. 8.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Restaurant „Zum Löwentor", Königswall 75.

J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung Freitags, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Blasewitzer Hof". Liebhaber willk. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Eliesenhof", Eliesenstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Mittelthüringens (Sitz Erfurt). Versammlung jeden 2. Mittwoch im Monat und jeden letzt. Sonnabend im Monat im Vereinslokal „Stadt Chemnitz", Thomasstr. 57. Näh. Auskunft erteilt

Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 15. September. A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Der Hannoversche Vogelschutzverein zu Hannover, gegr. 1881, wirkt mit sichtbarem und anerkanntem Erfolge für Vermehrung und Schutz der Vogelwelt bei Hannover durch Aufhängen von jährlich einigen hundert Nistkästen aller Art, durch Erweckung von Interesse und Liebe für die Vogelwelt mit monatlich, zur Gesangszeit wöchentlich stattfindenden Belehrungsspaziergängen und durch Vorträge und Austausch der Beobachtungen in den jeden dritten Dienstag des Monats stattfindenden Vereinsversammlungen. Seine Bestrebungen dienen also lediglich gemeinnützigen Zwecken. Mitgliederzahl rund 1200, jährlicher Beitrag nur 1 M. Meldungen an den Vorsitzenden Herrn Fritz Becker, Hannover, Boedekerstr. 1 F. Nächste Vereinsversammlung: Dienstag, den 15. September, 8 Uhr abends, im Landesheim (Volgersweg). Tagesordnung unter anderem: „Zusammenfassender Bericht über die Spaziergänge und die dabei gemachten Beobachtungen seit Juli 1924" (Referent Herr Arens). „Circumpolare Vögel", Vortrag des Herrn Hagemann. Nächster gemeinsamer Spaziergang: Sonntag den 20. September, 9½ Uhr, in die Eilenriede, Treffpunkt „Kriegerdenkmal".

Becker.

Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber. 56. Mitgliederversammlung am 13. August 1925, abends 8¼ Uhr in Landesheim, Volgersweg. Anwesend 21 Personen. Der Vorsitzende teilt mit, daß die Vereinigung jetzt 95 Mitglieder zählt. Die Verminderung rührt daher, daß von uns wieder einige aus der Liste gestrichen sind, die keine Anteilnahme an unserer Arbeit zeigen. Wir wollen nur tätige Mitglieder haben. Verschiedene Anregungen und Wünsche aus Kreisen der Mitglieder werden an den Vorstand weitergegeben, der demnächst dazu Stellung nehmen wird. Auch haben die Mitglieder allerlei Beobachtungen gemacht, die durchgesprochen werden. Ameisenpuppen sollen demnächst in größeren Mengen beschafft werden. Unser Mitglied Herr Ornithologe Schütz hielt dann einen eingehenden, wissenschaftlichen, durch viele Zeichnungen erläuterten Vortrag über die Atmung der Vögel. Werden dabei auch Gebiete berührt, die nur der Zoologe vom Fach oder der Anatom verstehen kann, so haben unsere Mitglieder alle sicher viel Neues gelernt und Aufschlüsse erhalten, die weitere Wege weisen können. Der Vortragende führt aus, daß die Vögel wohl von allen Lebewesen die feinstentwickelten, jedenfalls die leistungsfähigsten Atemwerkzeuge besitzen. Rein äußerlich geht das daraus hervor, daß die Vögel eine höhere Körperwärme haben als andere Tiere, und daß sie großartige Flugleistungen vollbringen, ohne daß man ihnen nachher, etwa wie bei den Menschen oder bei den Säugetieren, nach körperlichen Anstrengungen, eine besondere Erschöpfung anmerken könne. Die besonderen Leistungen werden dadurch hervorgerufen, daß die Atmungswerkzeuge der Vögel einen lebhaften Gasaustausch ermöglichen, daß sie eine außerordentliche Oberflächenvergrößerung durch feinste Verteilung der Blutgefäße besitzen, daß die Vögel außerdem eine Reihe von Windsäcken im Körper haben, und daß sie schließlich auch durch ihre Knochen willkürlich Luft kreisen lassen können. An einer Reihe von Beispielen und Zeichnungen wurde das anschaulich erläutert. Der Vorsitzende wies darauf hin, daß solche Vorträge, von allen Belehrungsmöglichkeiten abgesehen, für die Naturfreunde auch deswegen wichtig sind, weil sie immer wieder zeigen, wie wunderbar bis in die kleinsten, nur mikroskopisch fast zu beobachtenden Teile alle Geschöpfe der Natur aufgebaut sind, wie eins ins andere greift und wie grob dagegen selbst die feinsten Werkzeuge und Maschinen der höchsten Menschenkunst erscheinen. Man könne durch eingehende Naturbeobachtungen immer wieder Demut vor den Wundern der Natur lernen und gegen das Alles-Können-Wollen des Menschen, des „Königs der Schöpfung", kämpfen.

Appel.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

(Fortsetzung auf der 8. Umschlagseite.)

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um 8 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste willk. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Vereinsabend regelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends um 8 Uhr) beim 1. Vors., Herrn Jahn, Feodorastr. 7. Jena besuchende Vogelfreunde treffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodorastraße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. Adolf Voigt, Schriftf.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Vollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an!

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 17. Sept. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Normast im „Kaiser Friedrich", Breslauerstr. 50. Liebhaber willkommen. J. A.: Friedrich.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße.
gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Sitzung aller 14 Tage im Restaurant „Zum Neckarstrand", Messeplatz 1. Liebhaber willkommen. Joh. Daubmann, Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Versammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Liebhaber willk. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebenda. R. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

iergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

fige u. Gerätschaften

Verkaufe

neue Flemmingkäfige à Stck. M. (Nachtigalleng. öße). Bei Anfragen erbitte Rückmarke. [1175
r Stauder, Ulm (Württemb.), Grüner Hof 2.

gel-Mistelleim

u Fangen schädlicher Vögel, bend bei jeder Witterung, garan- brauchsfähig, Dose 2.— M. fr. von ztag Nchf., Frankenberg i. S. 6. rverkäufer hohen Rabatt. [1176

Mistelleim,

ubgrün, liefert in anerkannt vorzüglichster Güte [1177
Kirschner, Arnsdorf-Haida, Böhmen), Roseggerstr.
endungen geg. Einsend. v. Mk. 2.— iederverkäufer Vorzugspreise.

Futtermittel

Ameiseneier

Pfund 5.00 M.

nska-Zecken . . à Pfd. 2,—
idenraupenpuppen, mahlen . . . . à Pfd. 0,75
rnelen, gem. . à Pfd. 0,35

Universalfutter

va I für Nachtigallen 2.— M
II für Grasmücken 2.— M
III für Drosseln . 1.50 M
und Analysen zur Verfügung.
ter oder Wiederverkäufer erhalten hohe Rabatte. [1178

ezialvogelfutterhaus für Weichfresser
Eckrich II, Waldsee (Pfalz).

„ORNIS" Freie Bezugsvereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands.
Gegründet 1912 .·. Fernsprecher 4198 [1179

Fachgemäße Belieferung mit Vogelfutter („Reform-Normal", individuelle Zusammensetzung bei restlosem Verbrauch; stets frisch gemischt). Hunderte von Liebhabern füttern seit über einem Jahrzehnt mit bestem Erfolg nur „Reform-Normal".

Reform-Normal-Käfige Mod. ORNIS 1925, neue Preisliste erschienen. — Modern eingerichtete Käfig-Bauanstalt mit elektrischem Betrieb.

Anschrift: Ornis-Haus, Halle-Saale. Der Geschäftsführer: Martin Sperling.

Für Freunde der heimischen Vogelwelt

Die deutsche Vogelwelt nach ihrem Standort.
Ein Beitrag zur Zoogeographie Deutschlands und zugleich ein Exkursionsbuch zum Kennenlernen der Vögel. Von Werner Hagen. Mit 74 Abbildungen und 4 Schwarzdrucktafeln. Kart. 3.— M.

Die einheimischen Stubenvögel,
ihre Naturgeschichte und Zucht. Von Karl Neunzig (zugleich 6. Auflage des Dr. Karl Rußschen Handbuchs für Vogelliebhaber Band II.) Mit 22 Farbentafeln und 188 Textabbildungen. Geh. 14.—, geb. 17.— M.

Die gefiederten Sängerfürsten des europäisch. Festlandes,
ihre Naturgeschichte, sachgemäße Käfigung, Behandlung und Pflege als Stubenvögel. Von Matthias Rausch. 2. Auflage. Mit 3 Farbendrucktafeln und 16 Textabbildungen. Kart. 3.— M.

Der Dompfaff,
seine Naturgeschichte, Pflege, Abrichtung und Zucht. Auf Grund 54jähriger Erfahrung von F. Schlag. 8. bis 10. Auflage. Mit 2 Schwarzdrucktafeln. Kart. 1.— M.

Die deutschen Sumpf- und Strandvögel.
Von Dr. Kurt Floericke. Mit ca. 44 Abb. auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.

Die deutschen Schwimm- und Wasservögel.
Von Dr. Kurt Floericke. Mit ca. 45 Abb. auf 15 Tafeln in Schwarzdruck. Kart. 4.50 M.

Die mitteleuropäischen Vögel.
Von Dr. E. Bade. Band 1. Singvögel. Mit 1 Farbentafel, 4 Schwarzdrucktafeln, 31 Tafeln in Photographiedruck und 144 Textabbild. von Nestern, Eiern u. Vogelteilen. Geb. in Ganzleinen 5.— M.

Allerlei sprechendes gefiedertes Volk
(Raben- und Krähenvögel, Starvögel usw.). Ein Hand- und Lehrbuch von Dr. Karl Ruß. Mit 5 Vollbildern in Schwarzdruck. Kart. 3.— M.

Gefiederte Hausfreunde I.
Von Karl Neunzig. Kurze Unterweisung üb. d. Pflege heimischer Stubenvögel. Kart. 1.— M.

Zu beziehen durch:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg
Postschließfach 148.

Deutsche Ameiseneier,

getrocknete, Liter 1.80 M., Pfd. 6.— M.
Schwer, Brieg (Bezirk Breslau), Piastenstr. 3. [1180

Ia steirische getr. [1181

Ameiseneier

per kg 15 Schilling, Waldvögel, Haselmäuse, prima Vogelleim per kg 5 Schilling.

Franz Hruschka,
Tier- und Tierfutterhandlung,
Wien, XVI., Habichergasse Nr. 29.

Mehlwürmer

beget. gefüttert, ¼ Pfd. 1.50 M., ½ Pfd. 3.00 M., 1 Pfd. 5.60 M.

Getrock. Ameisenpuppen

à Pfund 5.50 Mark.

Ia Muska (Zecke) **à Pfd. 2.50 M.**
Ia Weißwurm à Pfd. 4.50 M.
Franko geg. Voreinsend. des Betrages.
Th. Witte, Niederndodeleben bei Magdeburg. [1182

Mehlwürmer

(Versand beginnt Anfang Oktober)

Ia Ameiseneier Pfund 5.00 M.
Ia Muska-Zecken Pfund 1.50 M.
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen Pfd. 0.75 M.

Die Preise sind freibleibend, ab Lager, ohne Porto und Verpackung. Bei Anfrage Rückporto beifügen. [1183
Bei größerer Abnahme hoher Rabatt.
Karl Claus, Mutterstadt II (Hauptbahnhof).

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark ¼ Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co., Biesenthal I** (Mark). [1184

Mehlwürmer Ia Pfd. 5.— ℳ (ohne Spesen)
½ Pfd. 3.— ℳ frk. Voreinsend.
Jeltner, Breslau, Weinstr. 12. [1185

Heidelberger Vogelfutter
Braune Packung für Erdsänger u. ä. Vögel
250 g 2.75
Graue Packung f. Grasmücken 250 g 1.70
Blaue Packung für Drossel 250 g 1.10
empfiehlt [1186
Arthur von Ende,
Zoologische Handlung,
Jena (Thüringen), Magdelstieg Nr. 55.

Vogelfutter [1187
für **Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser.** Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 18 über Vogelfutter umsonst.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Ia Universalfutter
Marke „Lukullus" [1188
M. 2.— u. 1.80 per Pfd.
Ameiseneier . M. 5.— per Pfd
Muska . . . M. 1.50 per Pfd
H. Pullich, Langen 8
bei Frankfurt am Main.

Züchterurteil
Nach wiederholter Fütterung mit „L. K." kann ich Ihnen mitteilen, daß ich mit dem Erfolg vollständig zufrieden bin. Kranke Vögel sind ganz ausgeschlossen. Ebenso habe ich die Wahrnehmung gemacht, daß die Mauser glatt vonstatten geht. Bitte senden Sie mir umgehend per Postnachnahme wieder zwei Pakete. „K. L." soll mir nicht fehlen.
Kostheim, 27. 8. 1925. J. Siebenhaar.
Lorenz, Dresden,
1189] **Drehgasse 5.**
Das Original obiger Zuschrift hat uns vorgelegen.
Die Schriftleitung der „Kanaria".

Ein Versuch
überzeugt jeden von der Güte meines **Universalfutters.** Preis 2 M. p. Pfd. Sämtliche Futtersorten für Exoten, Wald- und Kanarienvögel zu billigsten Tagespreisen. Versand geg. Nachnahme. Verpackung und Porto werden billigst berechnet. [1190
P. H. Kirsten, Leipzig 3,
Zeitzer Str. 53. Fernruf 31445.

Vögel

Grüne und gelbe Wellensittiche
sehr kräftige, blutsfremde Vögel, das Paar 12 M., gibt ab
1191] **Max Kasten,**
Schwenningen a. N.

Graupapageien
1192] anf. zu sprechen, 80 M.
Blaustirnamazone, Ia Vogel, einige Worte sprech., zahm . . . 60.—
Gelbkopfamazone . . . . 38.—
Surinamamazone . . . . 35.—
Gelbhaubenkakadus . . . 30.—
Javaaffe, fingerzahm, possierlicher Kerl . . . . . 65.—
Kronenaffe, zahm . . . . 70.—
Meerkatze, zahm . . . . . 50.—
Carl Willer, Tierhandlung,
Altona a. d. E., Kirchenstraße 34.

! Zech-Blesmull
gegen Meistgebot.
1 Gelbhörnchen . . . 25.— M.
Zoo-Frank, Hamburg, [1193
Röhrendamm 40.

!! Graupapagei !!
echter Kongovogel, prächtig im Gefieder, Sprechkünstler, zahm, ohne Fehler, gesund, verkauft mit neuem Käfig für nur 200.— Mark. [1194
W. Müller, Obergärtner,
Friedersdorf (Kreis Beeskow).

Gebe ab
2 prima Gelbspötter, 24er und 25er, beide fingerzahm, gegen eine **Schama-, Dayal-** od. **Spottdrossel,** nur pr. Vögel.
Johann Deininger, Nürnberg,
Hintere Karthäusergasse 19. [1195

Umstände halber verkaufe sofort an schnell entschlossenen Käufer: [1196
1 Kleinen Gelbhauben-Kakadu, 1,0 Tarantiner Unzertrennlichen, 1,2 grüne Wellensittiche — sehr gutes Gefieder, gut eingewöhnt. Preis zus. 50.— M.
F. Nonnast,
Nimmersath (Kreis Bolkenhain).

Rot-Kardinäle
gut eingewöhntes Zuchtpaar, aus Gartenvoliere, tadellos im Gefieder, fehlerfrei, 45.— Mark. [1197
H. Pauen, Düsseldorf, Talstr. 60.

Tausche prima Sprosser,
prima getr. Ameiseneier; — nehme Gef. Welt, mögl. ungebunden, 1917, 1916, 1911 abwärts. Genaue briefl. Angeb. unt. **„garant. erstklassig"** 1198] an die Gef. Welt.

Verkaufe dauernd junge
Wellensittiche Ia befiedert, kerngesund,
i. Freiflug gezüchtet, grün u. gelb, à 5 M.
Saller, Planegg bei München,
1199] **Hofmarkstraße 8.**

Verkaufe oder **tausche** auf andere Exoten aus meiner Freivoliere:
1,1 Tigerfink, 1,1 Silberf., 1,1 Kubafink, 1,1 Wellensittich, brütlustig, 1,1 Bandfink, diesjähr., selbst gezogen, 1 zahme Dohle, 1 zahme Elster. [1200
W. Laßner, Liegnitz,
Glogauer Str., Volkshaus-Nord.

Bei Anfragen und Bestellungen bitten wir, sich auf die „Gef. Welt" zu berufen

„KAPPEL"

Schreibmaschine

Erstklassiges Erzeugnis ∴ ∴ Strapaziermaschine

Letzte Neuerung:
Geräuschloser Wagenrücklauf

Maschinenfabrik Kappel A.-G.
Chemnitz-Kappel

Arieltukan
Ramphastos Ariel Vig., 3 Stück bester Kondition, gesunde Fü vollbrüstig, nur Schwanz bes Stück zu 100 Mk.; ferner fi zahmen Timneh-Graupapagei 80.— Mk., franko u. Verpackg. gibt ab
Jos. Meyer, Verwalter d. St Volieren, **Luzern - Schwei**

Rotgehäubte Kardin
Stück 8.— M., Paar 15.— M
Indigo- und Papstfinken Stck. 25.—
Mexikan. Karmingimpel Stck. 12.—
Safranfinken . . . Stck. 8.5
Zebrafinken . . . . Paar 25.—
Japanische Möwchen . Paar 18.—
Paradieswitwen i. Pracht Paar 8.—
dito, außer Pracht Paar 4.—
Elsterchen . . . . Paar 6.—
Weber . . . . . Paar 3.5
Astrilde P. 2.50 M., 10 P. 20.—
Kaptäubchen . . . Paar 6.—
Maskentäubchen . . Paar 7.5
Kanarienhähne Stck. 8.— bis 10.—
Zahme Eichhörnchen und Eichelhäh Stck. 8.—
und viele andere Vögel. Liste g
Ad. Schwarz, Weißenfel
Klingenplatz 8.

Gebe ab: 1 erprobtes Zuchtp. Wel grün, 10 M., 1 erprobt. Zuchtp. Mö 10 M., 2,0 junge Zebrafinken à 5 0,2 K. Kubafinken à 5 M., 2,0 Wellens. à 6 M.
Walter Voigt, Jena, Feodoraft

Waldvögel
Offeriere bei gutem Fang ab 1. Ok jeden Posten Hart- und Weichf Ia Mistelleim. Anfragen bitte gen frankieren.
Rudolf Passian, Zoolog. Hand
Dönis bei Grottau in Böhme

Zu kaufen gesuch
das Werk über **Papageien** mit far Abbildungen von **Reichenow** aus allen Zonen).
H. Fockelmann, Hamburg
Catharinenstr. 25.

Empfehle
Grafers naturgetreue Abbildungen
50 einheimischen Vöge
in farbiger Lithographie, natürliche G für 2.10 M. durch
Curt Möller,
Berlin-Friedenau,
Odenwaldstr. 12.

Zahmes Affchen.
Weg. Raummangels geb. m. **„Jacki"**, drolliges Tierchen, welch. viel Spaß m für 85.— Mark ab (Nachnahme) tausche gegen **prima Schama** o. **andere edle Weichfresser.**
A. Alex, Breslau
Anderssenstr. 13.

Briefmarken-Albu
Europa, etwa 1850 Marken, tad erhaltene Stücke. Preis 300.— M.
A. G. v. Zitzewitz, Berlin W
Kurfürstendamm 248. A. Z.-Mitgl.

Beschwerden we Nichtzustellung der „ fiederten Welt" sind b zuständigen Postamt zubringen.

Inserate
für das am 17. Sept. 1925 Ausgabe gelangende Heft 38 Gef. Welt erbitten bis 12. S

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Wilder Kanarienvogel . Zimmetfarbener Kanarienvogel
Gesangskanarienvogel Weißer Kanarienvogel mit Schwalbenzeichnung

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 17. September 1925 | Heft 38

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Die Gartenvoliere.

Von Adolf Voigt, Jena.

(Nachdruck verboten.)

Verschiedenen Anregungen aus dem Leserkreise folgend, will ich im nachstehenden schildern, wie ich zweckmäßige Gartenvolieren errichtete, praktische und unpraktische vielfach sah. Den älteren und erfahrenen Vogelliebhabern werde ich gewiß nichts Neues bringen, aber der Leserkreis einer Zeitung erneuert und erweitert sich ständig, und für die Anfänger in dieser Art der Vogelhaltung sollen diese Zeilen bestimmt sein.

Ehe man an den Bau einer Gartenvoliere geht, mache man sich klar, welcher Art die Bewohner sein sollen: Papageien, einheimische oder ausländische Körnerfresser oder Insektenfresser. Bei der Bevölkerung mit der ersteren Art ist ein Bepflanzen der Voliere mit lebenden Bäumen oder Sträuchern völlig zwecklos, die Krummschnäbel würden bald jeden Pflanzenwuchs zunichte machen. Auch die einheimischen Körnerfresser, besonders Grünfinken, Buchfinken, Gimpel und Kreuzschnäbel vernichteten bei mir in der allerdings starkbesetzten Voliere bald jeden Trieb der angepflanzten Bäume. Weniger Schaden richten Prachtfinken an, zumal wenn sie in nicht gar zu großer Anzahl gehalten werden, doch halte ich auch hier eine Bepflanzung nur dann für angebracht, wenn diese mindestens zwei Jahre vor dem Einsetzen der Prachtfinken geschieht. Bis zu diesem Zeitpunkt könnten Insektenfresser in der Voliere gehalten werden, die sich vortrefflich für gut bepflanzte Volieren eignen.

Wer sich's leisten kann, baue die Voliere von vornherein aus Beton, Eisensäulen und engmaschigem Draht (8 cm Maschenweite) und umgebe den ganzen Drahtbau noch einmal mit Draht, der etwas größere Maschenweite haben kann, so, daß zwischen beiden Drahtwänden ein Raum von 15—20 cm bleibt. Da kann keine Katze einem etwa am Draht hängenden Vogel schaden, und gerade gegen Katzen muß man die Volieren am meisten sichern. Meine Gartenvolieren waren, wie eben beschrieben, geschützt, ich habe oft 2—4 Katzen gleichzeitig an und auf der Voliere gesehen, ohne daß die Vögel sich schließlich überhaupt noch vor ihnen erschreckt hätten. Im Gegenteil, sie beachteten schließlich die Katzen gar nicht mehr. Dagegen wurden meinem Gartennachbar, der eine große dichtbepflanzte Voliere an unserm gemeinsamen Zaune stehen hat, sowohl ein Schwarzplättchen als auch eine Gartengrasmücke von Katzen getötet. Ersterem wurde ein Flügel ausgerissen, letzterer der Kopf. In einer großen Voliere, die in der Nähe des Waldes lag, wurden eine große Anzahl Wellensittiche gehalten, die sich bei nächtlicher Beunruhigung oft an das Drahtgitter hängen. Vermutlich durch eine Eule wurden den Wellensittichen in einer Nacht die Leiber aufgerissen. Deshalb kann ich nur immer wieder jedem, der sich eine Gartenvoliere errichtet, dringend raten, doppelte Drahtwände zu ziehen. Auch Drahtgeflecht unter $8^1/_2$ cm Maschenweite sollte man auf keinen Fall verwenden, einmal, um auch die kleinsten der einheimischen und fremdländischen Vögel darin halten zu können, dann aber auch, um so lange als möglich die Mäuse fernzuhalten. Früher oder später kommen ganz junge Mäuse doch in die Voliere, wenn man sich auch nie erklären kann, wo sie eindrangen. Gewöhnlich fressen sie friedlich mit den Vögeln aus einem Napfe, was ich sehr oft beobachtete, bis dann eines Tages eine Spitzmaus einwandert und zuerst die Mäuse und dann die Vögel frißt, wie das Herr Stefoni im Jahrbuch 1925 der A. Z. schildert. Ich habe in meinen Gartenvolieren jährlich oft 30—40 Mäuse gefangen. Ich habe die alte Fallenkonstruktion, bei der die Maus den Faden durchbeißen muß, um zu dem Köder zu gelangen. Wird diese Falle etwas verdeckt aufgestellt, nachdem abends alle Futtergefäße entfernt sind, so kann man ohne Sorge, einen Vogel zu verletzen, auf guten Erfolg rechnen.

Ein Teil der Voliere sei überdacht, gegen Sturm und Regen errichte man mindestens eine Schutzwand. Sehr zweckmäßig ist es, den überdachten Teil mit Draht zu überspannen, ehe man das Holzdach auflegt, das natürlich durch Teerpappe geschützt werden muß. Auch bei den Rück- und eventuellen Seitenwänden ist das zweckmäßig. Vorzuziehen ist auf alle Fälle eine Steinwand und ein Betondach; das letztere gibt auch mehr Schutz gegen die Sonnenstrahlen im Sommer. Das Bretterdach meiner Gartenvoliere wurde einmal durch eine Ratte zerfressen — dieses Raubtier tötete mir dann verschiedene brütende Vögel.

Den Boden der Voliere hatte ich mit Drahtgeflecht ausgelegt und auf dieses wieder Erde ge-

bracht. So wurde ein Eindringen auch von unten her unmöglich. Das geht natürlich nicht, wenn die Voliere über Bäumen oder Sträuchern errichtet werden soll oder wenn solche angepflanzt werden. In diesem Falle versenke man den Draht der Wände mindestens ½ Meter tief in die Erde. Noch besser ist es, die ganze Grundfläche vorher ¾ Meter tief auszuheben, eine Betonsohle einzulegen und dann wieder die Erde aufzubringen. An diese Sohle schließt sich dann die Drahtwand oder der Betonsockel an.

Gegen Sturm und Regen schütze man die Voliere vor allen Dingen gut. Ich sah eine sehr sauber gearbeitete Gartenvoliere, die nach allen Seiten offen war und auch innen keinerlei Dickicht enthielt. Obgleich nur harte, heimische Vögel sie bewohnten, kann ich mir nicht denken, daß sich diese bei Sturm und Regen drin wohl fühlten. Eine Überwinterung darin wäre Tierquälerei!

Die Tür der Voliere gehe nie unmittelbar ins Freie, ein kleiner Vorraum ist stets zweckmäßig, da sonst doch mal Vögel beim Öffnen der Türen entwischen. Sollen Körnerfresser gehalten werden, so ist ein Besäen des Bodens kaum nötig. Die Vögel verstreuen so viel Sämereien, daß sich bald von selbst ein dichter Rasen bildet. In jedem Stadium der Keimung wird das verstreute Futter gefressen — meist lieber als die trockenen Körner in den Näpfen. Das Futter reiche ich nie gemischt — es sei denn das Weichfresserfutter. Grünfutter und halbreife Sämereien kann man hier ohne Sorge selbst bei Regenwetter geben, sofern die Vögel nur einige Zeit im Freien sind.

Das Überwintern in Gartenvolieren ist mit so vielen Arten versucht worden, daß es für alle härteren Vögel, auch für die aus den Tropen stammmenden, dem angeraten werden kann, der schon über die nötige Erfahrung in der Käfigung der Vögel besitzt. Leichtfertig jedoch nenne ich es, Vögel in ungeschützten Volieren zu halten, zumal, wenn diese klein sind. Zur nötigen Erwärmung während unserer kälteren Jahreszeit braucht der Vogel nicht nur kräftiges Futter, sondern auch ausgiebige Bewegung! Ich deckte im Spätherbst meine Gartenvoliere von oben mit den (im Winter unbenutzt stehenden) Mistbeetfenstern, versah die Innenräume reichlich mit Wacholder-, Tannen- und Kieferndickichten, schützte alle freien Außenwände des Nachts — bei Sturm und strenger Kälte auch am Tage — durch aufrollbare Stroh- und Bastmatten. Trinkwasser gab es nur morgens und mittags auf 30° erwärmt und auf warme Ziegelsteine gestellt. Man kann auch kleine Nachtlichter unter den Wasserbehältern brennen, doch habe ich nie gemerkt, daß die Vögel bei mir besonderen Durst gezeigt hätten. Ohne Winterschutz lasse man keinen Vogel in der Gartenvoliere.

Nun zu der Bevölkerung selbst. Über das Halten von Papageien in Volieren ist so viel geschrieben worden, daß sich eine Wiederholung eigentlich erübrigt. Am meisten wird wohl der Wellensittich hier gehalten und gezüchtet, und ich sehe noch immer das Bild vor meinen Augen, das meine Wellensittichschar in der Gartenvoliere bot, wenn sie kreischend darin umhertobte. Unbedenklich kann man Wellensittiche im Winter im Freien lassen, wenn die Voliere geschützt liegt oder geschützt wird. Gern nehmen diese kleinen hurtigen Australier Schneebäder und fühlen sich bei frischer Kälte eigentlich wohler als im Hochsommer bei großer Hitze. Die Hauptsache beim Einsetzen von Vögeln in die Gartenvoliere ist der Zeitpunkt des Einsetzens. Selbstverständlich wäre es ganz verkehrt, etwa erst im September Vögel ins Freie bringen zu wollen, die den ganzen Sommer über im Käfig steckten. Das verträgt nicht mal ein Wellensittich. Ich sah verschiedene sehr hübsche, große und auch hohe Fasanenvolieren, mit Sockeln aus Beton und ganz engmaschigem Draht versehen (auch zum Schutze gegen Spatzen!). Eine große Schaar Wellensittiche flog mit darin und bot ein reizendes Bild. Umgekehrt sah ich eine ähnlich bevölkerte Voliere, die auch Tauben enthielt, aber nicht genügend gesichert war! Ratten drangen ein und fraßen Wellensittiche, junge Fasanen und Tauben! Ähnlich sind ja auch die Volieren der zoolog. Gärten besetzt: neben Fasanen und Tauben härtere Körnerfresser oder Insektenfresser. Im letzteren Falle ist auch eine Bepflanzung möglich. Stehen ältere Bäume in den Volieren, so achte man auf das Dach. Ich entsinne mich, gelesen zu haben, daß Wellensittiche durch ein solches Dach entwichen: Durch den Sturm und Regen war das Dach an der Stelle undicht geworden, wo es um den Baum herumlag und ermöglichte so das Durchschlüpfen der behenden Wellensittiche. Diese sollen dann in den im Garten hängenden Starkästen gebrütet haben; zur Nahrungsaufnahme sollen sie sogar wieder durch das Dach in die Voliere zurückgekehrt sein. Man könnte auf diese Weise die Wellensittiche an Ein- und Ausfliegen gewöhnen; bei brütenden Paaren müßte das m. E. nach gut möglich sein. Wie man neben größeren Sittichen hurtige, kleine Prachtfinken halten kann, wurde erst kürzlich hier geschildert.: Die Niststätten der Prachtfinken werden durch Drahtgeflecht geschützt, das so weit sein muß, daß es eben die kleinen, schlanken Prachtfinken durchläßt, nicht aber die Sittiche.

Eine große dicht bewachsene, sehr schwach bevölkerte Gartenvoliere habe ich, wie eingangs erwähnt, täglich vor Augen. Außer unsern heimischen Sängerfürsten enthält sie höchstens 8—10 Körnerfresser, die natürlich dem üppigen Pflanzenwuchse nicht schaden können. Polygonum baltschuanicum deckt üppig wuchernd ihr Dach, ein Teil des Daches ist mit Brettern und Pappe gedeckt, die Ostseite durch eine Bretterwand geschützt. Die Vögel finden hier vielerlei lebendes Futter, fühlen sich äußerst wohl und singen bis in den Herbst hinein mit geringen Unterbrechungen. Auch eine Zucht edler Weichfresser wäre hier gut zu erreichen, wenn nicht eben die geschilderte Katzengefahr bestände. Aber auch so bietet dieses kleine Stück Natur dem Besitzer, unserm verehrten Vereinsvorsitzenden, reiche Freude durch den Gesang der Vögel und ich als Gartennachbar habe diese Freude noch bequemer und billiger als er selbst!

Monatelang hat hier seine Nachtigall gesungen, Sprossertouren mischten sich darein, aber kaum einer in der ganzen Nachbarschaft hätte gehört, daß dies die Sängerkönigin war, so wenig bekannt ist hier, wo es keine Nachtigallen im Freien gibt, deren Gesang.

Um schnell zu einer Deckung für die Vögel zu kommen, hatte der Besitzer Topinamburknollen eingepflanzt, die üppig wuchernd bis an das Dach wuchsen und schnell Schatten spendeten, wozu einige Fichtenbäumchen und Kiefernreiser, sowie Feuerbohnen beitrugen. Jetzt ist der angepflanzte Sträucherbestand hoch gewachsen, Himbeeren treiben dazwischen ihre schlanken Ruten, Kletterrosen umgeben außen die Voliere; allerlei mannshohe Blütenstauden wuchern üppig dazwischen. Bald muß ausgelichtet werden. Im Winter werden alle Vögel ins Zimmer gebracht, die Voliere bleibt offen und Amseln stöbern dann mit dem Zaunkönig um die Wette darin herum.

Eine mit zahlreichen einheimischen Körner- und Insektenfressern, sowie exotischen Körnerfressern besetzte Voliere besaß ich 5 Jahre lang. Die angepflanzten Fichten, Wacholdersträucher und Jelängerjelieber vernichteten die Schnäbel der Insassen schnell, aber ich schuf aus Kiefernästen dichte Nist- und Schutzstellen. Gimpel, Grünfink, Stieglitz-Kanarien haben hier neben Prachtfinken gebrütet und reiche Zuchtresultate waren die Folge. Freilich gab es trotz aller Vorsicht bei der Auswahl der Vogelarten doch hin und wieder unverträgliche Paare, die entfernt werden mußten: so z. B. waren Gimpel und Mossambikzeisige arge Störenfriede. Auch Wellensittiche paßten nicht dazwischen. Die Alten überfraßen sich am Insektenfuttergemisch und die ausgeflogenen Jungen verübten allerlei Unfug. Bösartig waren sie dagegen nie. Auch Weber passen nicht recht hierher, sie zogen sich Darmkatarrh zu dadurch, daß sie fast nur Mehlwürmer und Ameisenpuppen fraßen. Ohne jeden Schaden zu nehmen, überwinterten in meinen gut geschützten Volieren Nymphensittiche, Wellensittiche, Weber, alle einheimischen Finken, Kanarien, Sonnenvögel, Rotkehlchen, Reisvögel, Muskatfinken, Nonnen und ähnliche Prachtfinken.

Gerade den Freunden von Prachtfinken kann ich geschützte Gartenvolieren — aber nur solche — für den Sommeraufenthalt ihrer Lieblinge empfehlen. Zur richtigen Zeit in gut gelegene, gut eingerichtete, große, geschützte Volieren gebracht, fühlen sich auch die zartesten Amaranten, Schönbürzel und Schmetterlingsfinken wohl. Ich habe in Warenhäusern verschiedentlich gerade diese so heiklen Prachtfinkenarten gekauft — bis 1914 bestand ja die scheußliche Unsitte des Verkaufs von Vögeln an 95-Pfg.-Tagen in den Warenhäusern — und habe diese Vögel im Hochsommer direkt in meine geschützt liegenden Gartenflugräume gesetzt, ohne Verluste zu erleiden. Bedingung ist nur, daß die Vögel nicht vor Ende Mai und nicht nach Mitte August ins Freie gebracht werden und reichlich Nistkästen und Dickichte zum Schutz gegen die Kälte der Nacht finden. Die meisten Ausländer haben ja in ihrer Heimat auch nächtliche Temperaturabkühlungen — oft bis 0 Grad herab — auszuhalten.

Man nehme die Maße nie zu klein, wenn man irgend über genügenden Raum verfügt, und lege vor allem gleich mindestens zwei Räume an, deren Türen in den oben beschriebenen Korridor münden. Einmal kann man dann Arten halten, die mit Artgenossen unverträglich sind, und dann ist eins ganz sicher: der Appetit kommt beim Essen! Mir ists wenigstens in der Vogelhaltung immer so gegangen.

Will man den Mäusen den Zutritt zu den Futtergefäßen erschweren, so stelle man letztere auf Bretter, die schwebend angebracht sind.

Eines vergesse man nicht: wer von seinen Vögeln wirklich etwas haben will, der muß Zeit für sie haben, muß sie täglich längere Zeit beobachten. Deshalb ist es zweckmäßig, im Korridor eine Sitzgelegenheit, eventuell einen Klappsitz einfacher Art aus einem Brette, anzubringen. Auch dieser Sitz sei überdacht, damit der Besitzer auch bei Regen hier weilen kann, denn gerade bei Regenwetter hat z. B. der Gartenbesitzer die meiste freie Zeit, und die soll er seinen gefiederten Freunden schenken. Sie werden ihm dann immer mehr ans Herz wachsen.

Gujana-Buntbartvogel.

Meine Körnerfresser.

Erinnerungen aus einem mehr als 50jährigen Vogelliebhaberleben.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Die größte Freude haben mir meine Stieglitze im Laufe vieler Jahre in der Voliere gewährt, und zwar in der, wo sie während des ganzen Jahres im

Freien waren. Im Gefieder wie in der Freiheit glänzend lockten und wiegten sie sich auf den darin angebrachten Zweigen, dabei stets fleißig und fröhlich singend. Nur einen häßlichen, direkt unangenehmen Charakterzug hat der Stieglitz, sobald er mit mehreren seinesgleichen oder mit anderen Vögeln im Flugbauer zusammen gehalten wird — das ist sein Futterneid. Sobald er am Futternapf sitzt, darf sich kein anderer Mitinsasse nähern, sofort geht das „Rätschen" und Beißen los. Und wenn mehrere Stieglitze im Bauer sind, endet dies kaum den ganzen Tag; im Einzelkäfig hört man vom Stieglitz diese Töne nie. Für einen meiner schönsten Stieglitze wurde diese Untugend einst zu seinem Verhängnis. Ich hatte eine Kohlmeise gefangen, ein prächtiges Männchen mit breitem tiefschwarzen Brustlatz. Dieses setzte ich mit in den Flugkäfig, schon um zu sehen, ob die Kohlmeise tatsächlich ihren Ruf als Vogelmörder verdient. Eine ganze Woche verging, ohne daß sich irgend etwas ereignet hätte — ich beobachtete die Voliere so oft als möglich —, nur hatte ich bemerkt, daß Stieglitz und Meise erbitterte Feinde waren: Der erstere beanspruchte allen Hanf für sich, aber auch die Kohlmeise war ein großer Freund desselben. Der Stieglitz hatte einen nadelspitzen, scharfen Schnabel, er war in dieser Waffe der Meise mindestens ebenbürtig, und deswegen hatte ich für ihn eigentlich keine Sorge. Doch eines Morgens fand ich ihn mit zerhacktem Kopf am Boden des Käfigs. Die Meise hatte gesiegt, ihr scharfer Schnabel und die spitzen Krallen, gepaart mit der nötigen Dosis Hinterlist, waren dem tapferen Kämpen Stieglitz zum Verderben geworden. Die Meise erreichte dadurch auch, was sie wollte, — ihre Freiheit; ich ließ sie wieder fliegen. Übrigens habe ich auf ähnliche Weise einen schönen Stieglitz verloren, wenn auch nicht durch einen Mitbewohner des Käfigs, sondern durch einen Feind von außen. Der Stieglitz hatte die Gewohnheit, des Nachts beim Schlafen sich auf der Sitzstange ganz dicht ans Gitter zu drängen. Eines Morgens fand ich ihn tot am Käfigboden mit zerhacktem Schädel. Eine Eule hatte ihm mit ihren nadelspitzen Krallen den Schädel aufgerissen, konnte ihn aber nicht durchs Gitter ziehen. Zufällig entdeckte ich später — zunächst war mir der Tod des Stieglitz ein Rätsel — die Eule, wie sie nachts auf und am Käfig hin- und herlief, um einen darin befindlichen Vogel zu ergattern. Ich befestigte danach Dornzweige auf und am Bauer und bemerkte dann nichts wieder von der Einbrecherin. Ich empfehle aber allen Besitzern von Volieren usw., die im Freien aufgestellt sind, ähnliche Maßnahmen. Als Futter für meine Stieglitze reiche ich stets blauen Mohn mit etwas Leinsamen und wenig Hanf gemischt, Rübsen bekommt dem Stieglitz auf die Dauer nicht. Dazu gebe ich Kreuzkraut, grün und blühend, als Erfrischung, auch Distelköpfe, so oft ich sie finde. Bei dieser Verpflegung hält sich der Stieglitz gut und jahrelang in der Gefangenschaft. Zur Bastardzucht mit einem Kanarienweibchen eignet er sich besonders gut, hierüber berichte ich später noch besonders mal. Z. Zt. besitze ich ein prachtvolles Stieglitzmännchen vom vergangenen Jahre, das ich mir als jungen Graukopf nach den vorbeschriebenen Merkmalen selbst aus einer größeren Anzahl beim Fänger und Händler aussuchte. Meine Merkzeichen trogen nicht, es ist ein fleißiger und tüchtiger Sänger geworden. Die Preise sind ja jetzt allerdings bedeutend höher als vor dem Kriege. Damals zahlte ich für den Graukopf durchschnittlich 1 M., für den Zeisig 50—75 Pf. Dafür konnte ich mir beim Händler oft unter Hunderten die besten Vögel aussuchen. Für mich als Liebhaber war es immer ein herzerhebender Anblick, vor einer größeren Anzahl von Frischfängen im Frühjahr, die in ihrer Prachtkleidung glänzten, zu stehen — die Auswahl fiel mir unendlich schwer; denn ein Vogel schien mir immer noch schmucker als der andere. Diese Zeiten sind jetzt vorüber, seitdem der Handel großen Beschränkungen unterliegt. Aber trotzdem weiß man als Liebhaber doch immer noch, sich den geeigneten Vogel zu verschaffen.

Ich wende mich nun zu dem Dritten im Bunde: zum Zeisig. Ihn habe ich in meiner ersten Jugendzeit nicht kennengelernt, da in meiner Heimat Zeisige nicht vorkommen. Erst als mich das Leben umherwarf, mehr nach dem Gebirge zu und in das Treiben der Großstädte mich mein Weg führte, da erwarb ich ihn. Gehört und gelesen hatte ich schon viel von ihm, und es war immer meine größte Sehnsucht, auch einen Zeisig zu besitzen. Meinen ersten Zeisig kaufte ich vor etwa 43 Jahren in Hannover. Dort waren damals bedeutende Vogelhandlungen, Hannover war eine „vogelfreudige" Stadt, die sich rings um sie erstreckende Eilenriede, ein prachtvoller Laubwald, forderte geradezu dazu heraus. Wie oft bin ich in ihm zu jeder Jahreszeit gewandert, um dem Leben und Treiben der Vögel nachzuspüren. Hier war ich auch in meinem Leben zum ersten Male in größeren Vogelhandlungen, und ich suchte nach Zeisigen. Während meiner Schülerzeit hatte nämlich ein alter Handwerker, ein mehr als 70jähriger Seilermeister, der auch im hohen Alter noch begeisterter Vogelliebhaber und -kenner war, meine Begierde auf den Zeisig gelenkt. Dieser alte Mann war noch ein „Vogeloriginal" aus der alten Zeit, ich lernte ihn in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts kennen und besuchte ihn meiner Vogelliebhaberei wegen sehr, sehr oft. Namentlich verstand er auch, gut von vergangenen „Vogelzeiten" zu erzählen, so daß ich ihm mit Entzücken lauschte. Noch heute sehe ich ihn in seinem Silberhaar vor mir, im Werktagsrock mit der Seilerschürze angetan, wenn er beim Krebsgang des Spinnens innehielt, um seine Schilderungen recht lebhaft zu gestalten. Bei ihm hatten früher — etwa 1830—50 — die Harzer und Thüringer Vogelhändler immer übernachtet, wenn sie, wie es damals noch Mode war, mit ihren lebendigen Waren in die norddeutschen Ebenen herabkamen. Ihre Vögel steckten in lauter kleinen Harzerbauerchen, die auf einem Tragegestell auf dem Rücken — und zwar zu Fuß — weitherum befördert wurden. Diese Händler, die meist auch Vogelfänger waren, hatten ihn im Vogelfang unterrichtet, und er fing sich seine Hänflinge, Stieglitze und Buchfinken immer selbst. Er hatte davon immer mehrere auf Lager. Bei ihm sah und hörte ich z. B. auch in meinem Leben den ersten gefangenen Edelfinken. Dieser hing gleichsam

als Aushängeschild in der wärmeren Jahreszeit außen am Hause neben dem Fenster und erfreute die ganze Straße durch seinen schönen Schlag. Er saß in einem größeren, grüngestrichenen Holzbauer, und noch heute sehe ich dies Bild vor mir. Mein alter Freund ruht längst im Grabe — aber ich vergaß und vergesse ihn nicht; denn war er es doch, der in mir die Liebe zu den Vögeln gerade unserer Heimat stärkte und inniger zu gestalten wußte. Also er erzählte mir auch viel vom Zeisig, leider hatte er keinen mehr in seinem Bestande; denn selbst fangen konnte er ihn nicht, weil es dort Zeisige nicht gab. Er hatte sie früher auch immer von seinen Händlerfreunden erhalten. Den Zeisken, wie er ihn nannte, gibt's hier nicht, pflegte er zu sagen, den gibt's nur im Gebirge, Harz oder Thüringer Wald. In Hannover sollte ich ihn zum ersten Male sehen! Später habe ich ihn zu Dutzenden besessen und gepflegt, sowohl im Einzel- wie im Gesellschaftskäfig, und er ist mir ein lieber Stubengenosse geworden. Immer munter und keck, hält er sein Gefieder stets schmuck, obwohl er es meistens nicht anlegt, ist er stets in Bewegung. In dieser Beziehung erinnert er viel an seinen Vetter, den Stieglitz. Sein Aussehen ist hauptsächlich grün und gelb, Stirn, Kopf und Kehle sind schwarz — kurz gesagt. Beim Weibchen fehlt der schwarze Kehlfleck, dies ist das besondere Unterscheidungszeichen. Sein Gesang ist weniger bedeutend, er erinnert eigentlich an das „Quieken" eines Strumpfwirkerstuhls, er endigt gewöhnlich mit einer Art „Krähen". Da er aber sehr fleißig vorgetragen wird, so reizt er namentlich andere Vögel zum Gesang an. (Fortsetzung folgt.)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Den Sonnenvögeln nahestehend ist die Gattung der „Hügelmeisen" — Minla *Hodgs.*, welche sich von jenen besonders durch den kürzeren, leicht gerundeten Schwanz und die roten Säume der Schwanzfedern unterscheidet. Auch der Schnabel ist schwächer, ebenso die mit schlanken Zehen versehenen Läufe, deren Hinterzehe im Vergleich zu der des Sonnenvogels ziemlich lang ist. Die Krallen sind stark gekrümmt. Diese schönen zierlichen Vögel schlüpfen wie der Sonnenvogel, mit dem sie häufig vergesellschaftet umherstreichen und unruhig wie jener unablässig das dichte Gebüsch und die Bäume der bewaldeten Gebirge ihres Verbreitungsgebietes, welche sie nach Nahrung durchsuchen, die in Insekten und Beeren, z. T. wohl auch in Samen besteht. In ihren Gewohnheiten und ihrem Wesen erinnern sie in höherem Grade als der Sonnenvogel an die Meisen. Sie klettern gewandt und hängen sich an den Zweigen an wie diese. Die „Handlist" nennt zwei Arten, die beide in neuerer Zeit nach Europa gelangt sind. Die

Elfenblauvogel (s. S. 446).

rotschwänzige Hügelmeise — Minla igneitincta *Hodgs.* (s. Abb. S. 435) bewohnt die bewaldeten Gebiete des östlichen Himalaja von Nepal bis Butan, die Nagaberge und Manipur. Jerdon bezeichnet sie als einen gemeinen Vogel in der Nähe seines Wohnsitzes, den er häufig in Gemeinschaft mit dem auf S. 434 besprochenen indischen Sonnenvogel und der Bergmeise — Parus monticolus habe herumstreifen sehen. In kleinen Flügen von 5—6 Vögeln durchsuchen sie die äußersten Zweige der Bäume fleißig nach Insekten von allen Seiten, häufig auch sich an ihnen anhängend. Das Nest ist napfförmig aus Moos und Grashalmen erbaut und beherbergt

vier weiße, mit wenigen rostbraunen Flecken versehene Eier.

Gefiederbeschreibung: Oberkopf, Hinterhals schwarz begrenzt durch einen breiten weißen Augenbrauenstreif, der sich bis auf die Seiten des Hinterhalses erstreckt; Augenlid weiß; Zügel und Ohrdecken schwarz; übrige Oberseite dunkelbraun, auf dem Bürzel rostbräunlich; Oberschwanzdecken schwarz; Wangen, Vorderhals, Unterkörper weiß; Brust, Bauch, Unterschwanzdecken gelb; Körperseiten grau verwaschen; kleine Flügeldecken schwarz, braun verwaschen, mittlere und große schwarz mit weißen Säumen, Handdecken schwarz; Handschwingen schwarz mit scharlachroten, nach der Spitze zu in gelblichen Säumen; Armschwingen schwarz mit weißen Spitzen und Säumen; Unterflügeldecken weiß; Schwanzfedern schwarz mit scharlachroten Außensäumen und hellen scharlachroten Spitzen; Auge braun; Schnabel schwärzlich; Füße hellhorngelb; Lg. 130, Fl. 60, Schw. 45 mm.

Der östliche Vertreter der vorstehenden Art (Abb. S. 433) ist

Jerdons Hügelmeise — Minla jerdoni *J. Verr.*,

deren Verbreitungsgebiet sich über das westliche China (Szetschuan) erstreckt. Diese Hügelmeise ist der vorstehenden Art ähnlich, hat aber nach der Beschreibung von David und Oustalet hellgelbe Augen und der Unterschnabel ist am Grunde bläulich, Füße gelblichgrün; der Oberkörper ist nicht dunkelbraun, sondern oliv, nur die Kehle ist weißlich, der übrige Unterkörper gelblich weiß mit matten olivfarbenen Flecken an den Seiten.

Von den Meisentimalien — Ynhina ist wiederholt auch bei uns die als „Meisen- oder Zwergtimalie" bezeichnete Y. nigrimentum *Hodgs.* eingeführt (s. S. 121). Neuerdings kam eine andere hübsche Art dieser Familie, die auf S. 431 abgebildete

Kehlstreifen-Meisentimalie — Ynhina gularis *Hodgs.*,

nach Europa. Ihre Verbreitung erstreckt sich gleichfalls über das östliche Himalajagebiet bis ins westliche China. Die in Indien wohnenden Engländer nennen diesen kleinen Vogel „the Stripe-throated Flower-Pecker", den „kehlstreifigen Blütenpicker", weil er, wenn im April auf den Berggipfeln des Himalaja in Höhen von 10 000 Fuß die Rhododendronstauden blühen, sich in diesen Höhen große Flüge dieser Meisentimalien einstellen, um die zahlreichen kleinen Kerfe, welche sich in den Blüten aufhalten, zu verzehren. Gewöhnlich lebt sie in Flügen von 15—20 Vögeln, zuweilen sind die Flüge auch etwas größer. Sie fliegen dann von Baum zu Baum, deren innere Zweige sie bevorzugen. Sie hüpfen von Ast zu Ast bis zum Gipfel und klettern auch zuweilen an den bemoosten Stämmen umher. Dabei suchen sie sehr eifrig nach kleinen Kerfen und deren Larven, die während der warmen Jahreszeit ihre hauptsächlichste, wahrscheinlich ausschließliche Nahrung bilden. Im Winter halten sie sich in tieferen Lagen auf und in dieser Zeit verzehren sie auch reichlich kleine Beeren verschiedener Art. Ihre Stimme ist wie die der Verwandten einförmig und nicht sehr laut, ein einsilbiger Ruf, der häufig wiederholt wird.

Gefiederbeschreibung: Oberseits blaßbraun, auf den Bürzel mehr rostbräunlich; die Federn des Oberkopfes und die der stark entwickelten Haube und des Nackens sind besonders an den Spitzen grau verwaschen; die Zügelfedern sind rostbraun gefleckt, Ohrdecken graubraun; Vorderhals, Brust hellweinfarben mit schwärzlichen Streifen, übrige Unterseite ockerfarben, Seiten und Schenkel dunkler, mehr graubräunlich; kleine Flügeldecken wie Rücken, mittlere und große dunkelbraun, außen rostbräunlich gerandet; Handdecken, Afterflügel schwarz; Armschwingen außer den letzten, welche die Farbe des Rückens zeigen, mit breiten orangefarbenen Säumen; Handschwingen schwärzlich mit schmalen hellgrauen Außensäumen an der Spitzenhälfte; Unterflügeldecken weißlich, außen grau; Schwanzfedern dunkelbraun, nach der Spitze zu schwärzlich; Auge braun; Schnabel oben schwarz, unten hornbräunlich; Füße satt ockerfarben oder orange; Lg. 130, Fl. 75, Schw. 57 mm.

Im Zoologischen Garten zu London lebt zurzeit im 4. oder 5. Jahre das Weibchen eines prächtigen indischen Vogels, welchen die Abb. auf S. 445 darstellt, den man in England den „Fairy blue bird", den Elfenblauvogel, nennt — Reichenow nennt die Gattung in „Die Vögel" Irene, Irena *Hersf.* —, der

Elfenblauvogel — Irena puella *(Lath.)*.

Die Gattung, welcher der Vogel angehört, umfaßt 8 Arten, welche in Indien, auf Philippinen und Sundainseln leben. Der kräftige Schnabel mit schmaler, kantiger Firste erinnert an den Schnabel der Rabenvögel. Die schöne kobaltblaue Färbung der Oberseiten hat an manchen Stellen porzellanartigen Glanz und die blauen Federn haben „eine auffallend harte Struktur". Die Flügel sind ziemlich lang, der schwach gerundete Schwanz ist kürzer als der Flügel, die Füße sind kurz. Bei manchen erreichen die Unterschwanzdecken das Schwanzende. Die Schnabelform veranlaßte einzelne Ornithologen, sie den Drongos einzureihen. Die prächtige Farbe in Verbindung mit dem kräftigen Schnabel brachte sie in die Reihe der Pirole. Jetzt werden sie zu der Familie der Bülbüls, der Kupferdrosseln, gezählt und stehen bei Reichenow am Ende dieser Familie, bei andern, z. B. in der Handlist und bei Jerdon, schließen sie sich den Blattvögeln an.

Der Elfenblauvogel lebt in den hochgelegenen dichten Wäldern des östlichen Himalajagebiets bis in die indochinesischen Gebiete, in Südindien und auf Ceylon. In kleineren Flügen zu 4—6, zuweilen auch mehr oder auch nur paarweise, besucht er die höchsten Zweige der Baumwipfel und fliegt von Zweig zu Zweig, dabei läßt er seinen lauten, angenehmen Gesang ununterbrochen hören und schweigt auch nicht bei der Nahrungsaufnahme. Sein lauter Gesang verrät stets zuerst seine Anwesenheit im dichten Dschungel. Von Früchten der verschiedensten Art, gelegentlich auch von Insekten, besonders Käfern, nährt er sich hauptsächlich. Das große napfförmige Nest ist aus Wurzeln und Fasern erbaut und innen mit Moos gepolstert. Das Gelege soll in 2 Eiern bestehen von hellgrünlicher Grundfarbe mit zahlreichen dunkelbraunen Flecken.

Gefiederbeschreibung: ♂ oberseits glänzend kobaltblau; Unterseite, Flügel, Schwanz tiefschwarz; Auge rot; Schnabel, Füße schwarz. ♀ trübblau mit hellen blauen Federspitzen. Lg. 250, Fl. 130, Schw. 100 mm.

(Fortsetzung folgt.)

Die Darre (Kalkdurchfall) der Körnerfresser.

Von Karl Finck, Neukölln.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Der Fänger lieferte häufig Vögel nach Wien. Beim Einpacken ließ er alle Exemplare, die Auftreibungen des Unterleibes zeigten, sofort fliegen, da solche, wie

er sich auszudrücken pflegte, niemals die weite Reise aushalten.

Vor dem Kriege sandten Holland und Belgien viel Körnerfresser nach Deutschland. Recht oft wurden die armen Sonnenkinder uneingekäfigt für wenige Groschen verschleudert, verkauften doch selbst Warenhäuser Waldvögel.

Von einer sachgemäßen Eingewöhnung hängt vornehmlich die weitere Widerstandskraft der kleinen Gefangenen ab.

Jede Lebensäußerung ist mit Stoffverlusten verbunden. Schafft die Nahrungsaufnahme keinen genügenden Ausgleich, so macht sich bald eine Abmagerung bemerkbar.

Der Liebhaber muß stets bedenken, daß in den ersten Tagen der Gefangenschaft die unvermeidlichen Aufregungen und die krasse Umgruppierung der Erreichend Zeit, leiden infolgedessen Not, obwohl zunächst, um die Stoffverluste auszugleichen, geradezu eine Überernährung notwendig erscheint.

Nun gibt es auch Samenarten, welche selbst im ausgereiften Zustande allen Anforderungen genügen.

Mit den Körnern der Kornblume (Centaurea cyanus) lassen sich z. B. Stieglitze, Hänflinge, Zeisige und sogar junge Buchfinken beinahe ohne Verluste einfüttern. Der Kern dieses Samens ist weich, sehr fett und eiweißreich, während Kohlenhydrate darin auffallend wenig vorkommen.

Auch mit halbreifen, angedrückten Sonnenblumenkörnern habe ich vorzügliche Erfolge erzielt.

Fehlt geeignetes Unkrautgesäme, so gebe man zunächst vornehmlich gekochten, aber vorher wieder vollständig abgetrockneten Hanf. Die Kochzeit beträgt 10—15 Minuten. Die Körner werden hierauf scharf



Wüstenlerche.

nährung den Verdauungsprozeß ungünstig beeinflussen, wodurch wichtige an- und organische Nährverbindungen schlecht ausgenützt werden, selbst wenn sie überreich vorhanden sind.

Gerade in der ersten Zeit entstehen leicht Krankheitsanlagen, die später häufig unheilbare Leiden verursachen.

Unnötige Anstrengungen sollte man nach Möglichkeit ausschalten.

Aus diesem Grunde passen für die Eingewöhnung nicht zu hohe und große Käfige am besten. Selbstverständlich darf keine zu starke Besetzung stattfinden. Das gefiederte Völkchen soll allmählich, ohne übermäßige Beängstigung, die neue, für sie gewiß schreckliche Umgebung kennenlernen und zu dem Pfleger Vertrauen fassen.

Erhebliche Schwierigkeiten bereitet eine naturgemäße, dabei ausreichende Ernährung. Das bisher gewöhnte Naturfutter läßt sich selten beschaffen. Unreifes Gesäme muß außerdem meistens in den Samenständen verabfolgt werden. Die unruhigen Tierchen nehmen sich aber vielfach zur Aushülsung nicht ausabgespült und bei einer Temperatur von ungefähr 40 Grad R getrocknet.

Das Kochen verursacht zwar keine chemische Umgruppierung, doch die Gewebe werden dadurch bedeutend gelockert, und dieser Umstand genügt, um Verdauungskrankheiten fernzuhalten.

Den Hanf zerdrückt man vor der Verwendung, mischt rohen Mohn hinzu und reicht das Futter in flachen Gefäßen oder streut es auf den Boden des Käfigs. Finken und Ammern erhalten auch präparierten Spitzsamen (gekochten). Nebenbei sollten die Tiere stets halbreife Sämereien bekommen, die auch für eingewöhnte Vögel gesunde, gerne angenommene Leckerbissen bilden.

In 1—2 Wochen sind nach der geschilderten Methode die Wildfänge vollständig futterfest und vertragen dann gut die übliche harte Körnernahrung. Ein plötzlicher Übergang ist selbstverständlich zu vermeiden.

Dauernd dürfen allein gekochte und wieder getrocknete Sämereien nicht gereicht werden; sie sind ungemein leicht verdaulich und fördern die Fettsucht.



Reisvögel.

Jeden krank erscheinenden Vogel setzt man am besten in einen kleinen Einzelkäfig, dessen Schublade mit Papier ausgelegt wird, damit sich die Exkremente leicht beobachten lassen. Die Sitzstangen sollen niedrig angebracht sein, um unnötige Anstrengungen auszuschalten. Erscheinen die Entleerungen bereits dünnflüssig, so gibt man dem Patienten eine Kamillenabkochung, worin etwas frisches oder gekochtes Eigelb fein zerrührt wird. Animalische Stoffe assimilieren Vögel, welche in der Freiheit nebenbei Insekten verzehren, leichter wie vegetabilische Nahrung.

Für kranke Stieglitze und Zeisige besteht das Futter aus gekochtem, fein zerquetschtem Hanf und rohem Mohn. Außerdem erhalten die Kranken zweckmäßig alle zwei Stunden 2 bis 6 Mehlwürmer. Bei der Verabfolgung nehme ich jeden Patienten in die Hand und drücke den weichen Inhalt der geköpften Kerfen an den Schnabel. Meistens wird die Masse bald begierig eingesogen, nur viele Buchfinken, auch Hänflinge verweigern hartnäckig jede Annahme. In solchen Fällen muß eben Eigelb, im Trinkwasser verrührt, als Ersatz dienen.

Weit fortgeschrittene Darmentzündung ist außerdem mit einer Stoffwechselkrankheit verbunden, die der menschlichen Zuckerharnruhr in gewisser Hinsicht ähnelt, zu deren Symptomen ebenfalls unstillbarer Durst gehört.

Sobald derart kranke Vögel ihr Wasserbedürfnis nicht befriedigen können, macht der Kräfteverfall schnell Fortschritt, deshalb sollten die Tiere selbst während der Nacht nach Belieben trinken und fressen können.

In einzelnen Fällen wirkt Alaun oder Eisenvitriol günstig. Von der gesättigten Lösung gibt man einige Tropfen in die Trinkflüssigkeit. Der Geschmack soll bloß schwach herb sein. Eine sorgsame Dosierung ist unbedingt notwendig. Niemals darf der Pfleger schablonenhaft arbeiten. Bei manchen chronischen Formen erweisen sich gewisse Fermente als wirksam.

Die Behandlung vollständig abgemagerter Vögel hat selbstverständlich mit außerordentlichen Schwierigkeiten zu kämpfen; sie erfordert bedeutende Umsicht und reiche Erfahrungen. Wer außerdem noch viel Geduld besitzt, wird oft überraschende Erfolge erzielen; ich wenigstens habe Hunderte, hoffnungslose, kranke Kanarienvögel, Papageien und sonstige Körnerfresser gerettet. Die Praxis führt mit der Zeit zur Meisterschaft.

Sehr empfindlich sind späte Frühjahrsfänge nach der Einpaarung. Vor dem neuen Vogelschutzgesetz kamen selbst noch im Mai aus Holland resp. Belgien frischgefangene Buchfinken und Hänflinge. Von den herrlich gefärbten Tieren gingen unzählige ein.

Schon im Vorfrühjahre ernähren sich die Körnerfresser vorwiegend von aufgelaufenen Sämereien, Knospen und Grünkraut. Am Rande tiefgelegener Wiesen, wo das Schmelzwasser vielfach ausgedehnte Schmutzwellen bildet, welche vorwiegend aus allerlei Pflanzenresten bestehen, kann man die Tierchen gut bei ihren Schmausereien beobachten.

Je weiter die Vegetation fortschreitet, desto reicher und vielseitiger ist der Tisch gedeckt. Durch ein scharfes Glas sieht der Beobachter genau, wie manche Vogelarten begierig gekeimte Körner aus dem Boden ziehen oder Samenlappen abknipsen.

Obwohl die Pflege der Körnerfresser in der Gefangenschaft verhältnismäßig wenig Umstände macht, wird ein verständnisvoller Wirt seinen Lieblingen nebenbei halbreife Sämereien, geeignetes Grünkraut und Insekten reichen.

Im Käfig ist selbstverständlich der Stoffverbrauch geringer. Aus diesem Grunde sind bei der Abmessung und Zusammenstellung des Futters die jeweiligen Verhältnisse und auch die Individualität des betreffenden Vogels unbedingt zu berücksichtigen.

Die Haft verursacht durch das Ausschalten des Daseinskampfes immer Abschwächungen. Solche treten umso ausgeprägter hervor, je einseitiger die Ernährungsweise ist.

Im Anfange bereitet die Heilung der Darre kaum Schwierigkeiten, während das Leiden bei Nachlässigkeit schnell tödlich verläuft.

Mit gekochtem Hanf und Spitzsamen, wozu, um den Vitaminbedarf zu decken, noch roher Mohn usw. gemischt wird, lassen sich selbst späte Frühjahrsfänge und junge Vögel sicher eingewöhnen. Gekochte Sämereien müssen vor der Verabfolgung unbedingt vollständig wieder getrocknet sein. Für Exoten verwendet man gekochte Hirse. Rübsen und Leinsamen eignen sich nicht zum Abkochen, da diese Samenarten bei scharfem Trocknen steinhart werden.

Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten.

Von J. Kuntzendorff, Berlin.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Die übrigen Tangaren sind von den Organisten nicht unwesentlich unterschieden. Und zwar läßt sich eine eigentliche Norm für dieselben nicht aufstellen, da sie sich nicht allein durch die verschiedene Gestalt und den anders geformten Schnabel unterscheiden, sondern auch die Ernährungsweise trennte die Gattungen in streng trennbare Gruppen. Hinsichtlich der letzteren sind hier vereinigt solche, die, ähnlich den Organisten, vorzugsweise Früchte, in geringem Maße aber auch Insekten zu sich nehmen, sowie solche, bei denen neben dem Fruchtfutter Insekten in erheblicherer Menge und nach verschiedenen Angaben in geringer Menge auch Sämereien als Nahrung in Betracht kommen und schließlich solche, bei denen diese drei Futterarten sich die Wage halten. Wenn behauptet wird, daß die Tangaren in ihrem Wesen still und langweilig sind, so hat die Behauptung nur für einige Arten nach meinen Erfahrungen Berechtigung und dann nur bei einer Haltung in Käfigen. Im Flugraum hingegen zeigen alle Arten eine große Beweglichkeit und Lebhaftigkeit, mithin müssen sie auch in der Freiheit dieselben, womöglich noch in erhöhtem Maße, besitzen. Zierlich und anmutig sind allerdings ihre Bewegungen nicht, sie haben vielmehr etwas Robustes an sich. Der Flug ist, je nach der Örtlichkeit, mal reißend schnell, mal langsamer, und gewöhnlich ein klein wenig schwerfällig. In gesanglicher Hinsicht kommen sie nicht in Betracht, da sie meist nur rauhe und unmelodische Töne hervorbringen, und in den wenigsten Fällen sind die Lautäußerungen einigermaßen ein unbedeutender Gesang zu nennen, der jedoch den Pfleger stets seltsam anmutet.

Die Mehrzahl der Gattungen gehört nach meinen Beobachtungen zu den friedfertigen Vögeln, von denen sich aber in dieser Hinsicht die Schwarztangaren in konträrem Sinne unterscheiden. Doch in diesem Punkte sind die Meinungen grundverschieden; während die Mehrzahl der Forscher und auch der Liebhaber sie als durchaus unverträglich und unliebenswürdig beschrieben, die mit ihresgleichen und schwächeren Vögeln meist in Unfrieden leben und sich oft sogar geradezu zu Tyrannen unter der Volierenbevölkerung aufwerfen, sagen andere wieder von den meisten eingeführten Arten direkt das Gegenteil. Diesen muß ich unbedingt zustimmen, denn bei allen von mir verpflegten Arten habe ich keine dieser gerügten Mißstände empfunden, ja sogar die von mir gehaltenen Sänger- oder Schwarztangaren, die allgemein und wahrscheinlich mit allem Recht als unverträglich und bösartig verschrien sind, haben sich bei mir als verträglich und friedfertig erwiesen. Dieser Fall ist sicher und in keiner Weise auf die ganze Gattung auszudehnen, wir haben es hier unbedingt mit einem ausgesprochenen Individualismus der betreffenden Vögel zu tun, denen die Natur einen durchaus friedfertigen Stempel ausnahmsweise aufgedrückt hat. Ich möchte darauf hinweisen, daß in meinem Zürcher Vogelhause verschiedene Bülbülarten,



Grauköpfchen. Rußköpfchen. Orangegesichtiger Unzertrennlicher.

Schama, Laufhühnchen, Zwergwachteln u. a. m. im gleichen Raum gebrütet haben, in welchem nicht weniger als 13 Tangarenarten zu gleicher Zeit vertreten waren, die weder sich gegenseitig befehdeten, noch anderen Vögeln in irgendeiner Weise zu nahe kamen, noch den brütenden Paaren gefährlich wurden. Und doch waren unter diesen Tangaren z. B. die Purpurtangare, die Schmucktangare, die Trauertangare — sogar in einem Pärchen — und die Krontangare vertreten. Die gleiche Erfahrung habe ich später in Frohnau gemacht, hier hatte ich sieben Tangarenarten zugleich im Flugraum, ohne daß diese sich als bösartig erwiesen oder Nester zerstörten. Hat doch z. B. die Mamulabachstelze zwei Jahre hintereinander, allerdings ohne ♂, genistet und Eier gelegt, ohne daß eine von Tangaren verursachte Störung eintrat. Ich weise aber hierbei nochmals auf das am Anfang dieser Abhandlung Gesagte und auch auf das eben Erwähnte sich Beziehende hin und warne vor Übereilung in der Wertung dieser oder jener Gattung. Ein jeder muß seine eigenen Erfahrungen machen unter Zuhilfenahme oder fußend auf die ihm bekannten Veröffentlichungen. Dasselbe gilt auch für ihr sonstiges Benehmen.

Während sonst die Tangaren als wenig lebhafte und auch als mehr oder weniger interessante Vögel benannt werden, habe ich das direkt entgegengesetzte Urteil über diese fällen müssen. Ich verweise dabei auf meine in dieser Zeitschrift in einem früheren Jahrgang veröffentlichte Arbeit, in der es heißt: „Da sollten so ungünstig über die Tangaren Urteilende meine Tangaren beobachten, wie sie munter und gewandt im Flugraum ihre Flüge unternehmen, im Geäst herumklettern und unter ständigem Zwitschern scheinbar einander haschen, wie es ausgelassene Kinder gerne tun, und noch sagen, sie wären uninteressante Vögel". Von authentischer Seite, von dem Herausgeber dieser Zeitschrift Herrn Neunzig, wurde mir die Bestätigung dieser Ausführungen, indem er in Nr. 17 des vorigen Jahrgangs schreibt: „Wiederholt konnte ich mich bei Besuchen .... davon überzeugen, daß Herr K. das Benehmen der Tangaren in seinen Flugräumen völlig zutreffend schildert". Ich verweise wiederum auf die eingangs gemachten Ausführungen und erwähne hierbei, daß ich von einer ganzen Anzahl Tangarenarten mehrere Exemplare verpflegt habe, daß meine Beobachtungen also nicht nur auf ein Stück bei diesen basieren. Von der Purpurtangare besaß ich z. B. im Laufe der Jahre im ganzen 8 Stück, und an allen diesen habe ich, gleich den in mehrfacher Anzahl verpflegten anderen Arten, stets die gleiche Erfahrung gemacht. Wenn also Eichlam über die Tangaren schreibt („Gef. Welt" 1901 S. 4): „Tangaren in die Vogelstube einzusetzen, bleibt immer ein Wagnis", muß ich ihm mit meinen Erfahrungen direkt entgegentreten und kann ihm höchstens nur in beschränktem Maße zustimmen, da er vorangehend die Tangaren als durchaus unverträglich hinstellt und weiter ausführt: „nur zu leicht werfen sie sich dort zu Tyrannen auf, stiften nach allen Richtungen hin Unheil, zerstören die Nester anderer Insassen, töten jung und alt und vertreiben selbst viel stärkere Vögel mit Konsequenz vom Futterplatz". Er fällt also über die Tangaren ein geradezu vernichtendes Urteil, das nur dazu angetan ist, jeden Liebhaber von der Unterbringung dieser Vögel in einem Flugraum abzuhalten. Nur die „kleineren, farbenprächtigsten Arten" schließt er von diesem Urteil aus, in dem er sie als „verträglicher" betitelt, also die Streitsucht auch hier in gewissem Maße hervorhebt.

(Fortsetzung folgt.)



Schwarzkappentimalie
(s. S. 451).

Wenn Vogelliebhaber eine Reise tun, da können sie was erzählen.

Von Max Hunger.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Bad Blankenburg, das in dreistündigem Marsche bequem zu erreichen ist, heißt heute die Parole. Auf dem Dachgiebel des Nachbargrundstückes trillert der Hausrotschwanz sein Liedchen in den herrlichen Morgen hinein. Rauch- und Mehlschwalben wetteifern in der Kunst ihres Fluges. Am Ufer der Schwarza hat sich ein „Türke", wie der Gartenrotschwanz vielfach genannt wird, niedergelassen. Er gehört ohne Zweifel zu denjenigen Vögeln unserer

einheimischen Fauna, die einen Vergleich mit manchem Vertreter fremdländischer Arten aushalten würden. Das bläuliche Aschgrau am Kopfe und Oberkörper, verbunden mit dem gelblichroten Farbenton, der Brust, Bürzel und Schwanz bedeckt, bildet mit der tiefschwarzen Färbung des Gesichts und der Kehle einen wundervollen Farbenkontrast.

Unweit in einem Obstgarten zwitschert der kleinste in der Familie der Finken, der Girlitz, recht eifrig und unermüdlich sein Lied in den Tag hinein. Dazwischen lockt ein Grünfink sein bekanntes „Tschwuintsch". Hinter dem Schweizerhaus verlassen wir das diesseitige Ufer der Schwarza, um auf dem jenseitigen weiter zu wandern.

An einem Baumstamme rutscht kopfabwärts ein Kleiber. Seine lauten Rufe werden durch das „Güp, güp, güp, güp" mehrerer Kreuzschnäbel unterbrochen. Ein Müllerchen führt seine Jungen spazieren.

Ganz besonders zahlreich sind hier Grasmücken und Platten vertreten. Aber welch Unterschied in bezug auf Qualität des Gesanges. Während wir nur zwei Platten fanden, die uns kaum einigermaßen befriedigten, waren sämtliche von uns gehörte Grasmücken gut, sogar sehr gut in ihrem Vortrag. Dieser sehr hohe, spitze Vorgesang, verbunden mit einem schrillen Überschlag, beide untermischt von zahlreichen Mißtönen, sind alles andere als schön, und jeder Liebhaber dürfte sich bei einem solchen „Genuß" entsetzt die Ohren zuhalten.

Im nahen Dornbusch warnt ein rotrückiger Würger, ein hier sehr seltener Geselle, mit lautem „Täck, täck, täck." Unruhig, mit schwirrend klingendem „Sipp, sipp, sipp, sirrrr", wechselt der Waldlaubsänger in den Baumkronen. Die harmlose, gegen ihresgleichen jedoch zänkische Heckenbraunelle schwirrt hastig ins dichte Gebüsch. Irgendwo ertönt das Gegacker des Bluthänflings.

Ein eigenes Bild gewähren die lieblichen Schwanzmeisen, wie sie flink und behendig, flatternd und schnurrend durch das Gehölz ziehen. Mit ihrem langen, keilförmigen Schwanz und ihrem kugeligen Köpfchen mit dem winzigen Schnäbelchen bieten sie einen reizenden Anblick.

Die ersten Parkanlagen Blankenburgs mit ihren Villen und Pensionen treten in unseren Gesichtskreis. Rechts im Buchengehölz macht sich ein Gimpel bemerkbar. Sein abwechselnd in knarrenden oder sanft flötenden Tönen vorgetragener Gesang läßt ihn als solchen erkennen.

Blankenburg macht mit seinen terrassenförmig angelegten Kulturen im Gegensatz zu der romantischen Wildheit Schwarzburgs einen nüchternen, gekünstelten Eindruck. — — —

„Und die Sonne blickt durch der Zweige Grün und malt auf den glänzenden Matten der Bäume gigantische Schatten — —." Leise, ganz leise senkt sich die Abenddämmerung hernieder. Das Dampfroß bringt uns gen Schwarzburg. — Die umliegenden Höhen haben sich in dichtes Grau gehüllt. Vom Schloßberg tönt das verlorene Lachen eines Buntspechts hernieder. „Schwarzburg ade, scheiden tut weh." Ein leises Gefühl der Traurigkeit ob des morgigen Abschieds will uns beschleichen.

Doch das Bewußtsein gereicht uns zum Troste, diese herrliche Gegend früher oder später wiederzusehen. — —

Eine rückschauende Betrachtung der großen Menge jubilierender Sänger, die uns während der kurzen Sommerszeit in Wald, Feld und Garten mit ihrem Sang und Tun ergötzen, läßt um so mehr das Verständnis des Naturfreundes, ein Stück dieser klingenden Welt in das Zimmer zu bannen, gerechtfertigt erscheinen. Wirkt doch die Stubenvogelpflege in mannigfacher Beziehung veredelnd und erziehend auf uns ein. Um so unverständlicher ist daher die große Gegnerschaft gewisser Kreise. Doch müssen wir den bestehenden Verhältnissen Rechnung tragen. Und dies können wir am besten in einer straffen Organisierung aller deutschen Vogelliebhaber. Nur in der Einigkeit liegt die Stärke und in der Stärke die Macht. —

Darum ihr Liebhaber, die ihr noch nicht organisiert seid, wacht auf. Schließt euch den örtlichen Vereinigungen, und wenn keine bestehen, einem Landes- oder unmittelbar dem Reichsverband als Einzelmitglieder an.

Einig und intensiv tätig in der Organisation, praktisch und ideal in der Liebhaberei; diesen Wahlspruch muß sich ein jeder rechter deutscher Liebhaber zu eigen machen, im Interesse und zum Wohle der gesamten deutschen Vogelliebhaber.

Kleine Mitteilungen.

Auslandsbericht. Die erstmalige Zucht der Schwarzkappentimalie, Lioptila capistrata, gelang Herrn Albert Sheriff, der den Verlauf des Brutgeschäfts in Nr. 8 des Avic. Magazine mitteilt. Er hatte das Männchen bereits drei Jahre in der Voliere; es stammte von einem Schiffstransport; das Weibchen kam aus einem Londoner Geschäft, wo dasselbe schon längere Zeit gekäfigt war. Ehe beide Tiere zusammenkamen, war das Männchen einem Braunohrbülbül sehr zugetan, doch hörte die Freundschaft auf, sobald es mit dem Weibchen vereint war. Im Februar kamen beide in einen sehr geschützten Flugraum, den sie nur mit einem Pärchen Zwergwachteln teilten. Anfang April begann das Männchen mit dem Bau des Nestes, das es vier Fuß über der Erde in einem Lorbeerbaum innerhalb einer Woche herstellte. Als Baustoffe wurden Heu, abgestorbene Blätter, Haare und Gräser verwandt. Das Weibchen blieb ganz unbeteiligt bei dem Bau. Bald darauf lagen zwei Eier im Nest und das Weibchen brütete fest. Eine Woche lang ging alles gut, dann aber war eines Morgens ein Ei verschwunden und das andere zerstört. Schon fünf Tage später wurde mit dem Bau eines neuen Nestes begonnen, und zwar diesmal zehn Fuß über dem Boden in einem Pflaumenbaum. Am 19. Mai saß das Weibchen wieder; doch konnte während der ganzen Brutzeit wegen der Höhe der Nestlage ein Einblick in dasselbe nicht gewonnen werden. Beide Vögel wechselten beim Brüten ab und ließen sich keineswegs bei ihrem Geschäft durch neugieriges Herantreten stören. Nach 15 Tagen kamen die Jungen aus und vier Tage später konnte man schon die Köpfchen der Kleinen beim Füttern über dem Nestrand erblicken. Gefüttert wurden Spinnen, Raupen, Mehlwürmer und besonders Fliegen in großen Mengen. Das Nest wurde vom Weibchen sehr sauber gehalten; häufig trug es die Entleerungen der Jungen in die äußerste Ecke der Voliere. Nach 17 Tagen flogen die Jungen aus; sie waren, abgesehen von Haube und Schwanz, vollkommen befiedert. —

Drei auf dem Vogelmarkt seltene Vögel wurden von Dr. Hopkinson aus Gambia nach England gebracht: Spreo

pulcher — Rotbauchglanzstar; ein westafrikanischer Pirol — Oriolus auratus und eine blaubrüstige Rake — Coracias cyanogaster. —

Derselbe Autor gibt an Hand von Neunzigs „Fremdländische Stubenvögel" eine Übersicht der bis jetzt eingeführten Glanzstare. Als in den letzten Jahren neu eingetroffene nennt er: Lamprocolius purpureus *Müller* (L. chalcurus?); weiter den Spreo hildebrandti aus Südafrika, der im Londoner Zoo vorhanden ist; außerdem den in der „Gef. Welt" von Neunzig beschriebenen Spreo superbus, der, wie ich in einem früheren Bericht ausführte, erstmals von M. Ezra gezüchtet wurde. Endlich noch der Cosmopsarus regius — Königsglanzstar („Gef. Welt" Nr. 24, 1924) aus Ostafrika, den Ezra einführte. Nicht erwähnt sind der Schuppenglanzstar und der Schwalbenglanzstar, der erste in Nr. 8, der zweite in Nr. 29 der „Gef. Welt" 1925 von Neunzig beschrieben. —

Interessant ist die Mitteilung von Louise Washington in Neuyork im selben Heft über die Fütterung der Loris. Im Gegensatz zu den bisherigen Anschauungen ernährt sie dieselben ausschließlich mit Sonnenblumenkernen! Nur ganz ausnahmsweise wird gelegentlich etwas Biskuit, Frucht oder rohe Möhren gereicht. Ein Schmucklori lebt bei dieser Diät schon zehn Jahre. Die Dame hält zirka 150 Papageien, Sittiche und Loris, die alle nur mit Sonnenblumenkernen gefüttert werden. —

In Heft 41 „Gef. Welt" 1924 hatte ich die erfolgreiche Bastardzucht von Astley erwähnt, dem es gelang, Barrabandsittichmännchen mit Blaukappensittichweibchen zu kreuzen. Im neuen Septemberheft des A. M. berichtet Herzog von Tavistock über die ebenfalls gelungene Kreuzung von Männchen Blaukappensittich — Polytelis Alex., mit dem Weibchen von Rotflügelsittich — Ptistes erythropterus. Die beiden Jungen gleichen mehr dem Vater als der Mutter.

Dr. Luig, Brüssel.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 22. Ein junges Wellensittichmännchen, welches seit 4 Wochen in meinem Besitz ist, ist plötzlich, anscheinend an der Ruhrkrankheit, eingegangen. Die Afterfedern waren mit blutigem Kot verklebt, doch war er bis zum vorletzten Tag noch munter. Bei der Öffnung des Kadavers fanden sich im Magen neben Sandkörnchen auch einige kleine silberfarbige Körnchen vor. Da ich ihn in einer, mit verzinktem Drahtgeflecht bespannten Voliere hielt, vermute ich, daß es kleine Zinkklümpchen, welche an dem Geflecht haften, sein könnten. Hat schon irgend jemand etwas ähnliches erlebt und wie ist solchem zu begegnen? Im voraus bestens dankend C. Nürnberger, Mühlhausen i. Th.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Richard Vorwerk, Leipzig-Lößnig, Merveldstr. 39. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

Wir verpflichten unsere Mitglieder bei Inanspruchnahme des Reichsverbandes, bei Käufen und Verkäufen, bei Tausch irgendwelcher Art, einerlei ob unter Liebhabern oder bei Händlern, stets auf die Mitgliedschaft zum Reichsverbande hinzuweisen. Wir wollen damit erreichen, daß Unreellitäten Tür und Tor verschlossen wird. Die gleiche Maßnahme ist unseres Wissens bei den meisten Vogelhändlerverbänden eingeführt und hat denselben Zweck, den wir mit der vorstehenden Verpflichtung zu erreichen versuchen. Auf diese Weise glauben wir Liebhaber wie Händler am besten geschützt.

Unsere Kassenverhältnisse vertragen es nicht, daß die Ausgaben für Porto in hohe Summen auswachsen. Wir möchten daher recht sehr bitten, bei Anfragen an uns das Porto beifügen zu wollen.

Wir möchten nicht versäumen, die Herren Vorsitzenden unserer angeschlossenen Vereine daran zu erinnern, daß die Verzeichnisse über den Mitgliederbestand am 1. April 1925 uns recht bald eingereicht werden. Die Verzeichnisse müssen, um auch einer Statistik zu dienen, enthalten: Laufende Nr., Vor- und Zuname, Stand, Wohnort, Wohnung, Straße und Hausnummer. Die Mitgliedsbeiträge betragen im Jahre 30 Pf. pro Vereinsmitglied, die, soweit die Vereine einem Landesverbande angehören, an diesen, und wo das nicht der Fall ist, an den Reichsverband nur auf Postscheckkonto Leipzig Nr. 22418 zu überweisen sind. J. A.: Petters.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

W. Laßner, Liegnitz, Glogauer Str., Volkshaus-Nord: 1,1 Kubafink.

Jos. Meyer, Verwalter d. Städt. Volieren, Luzern-Schweiz: Arieltukane, Ramphastos ariel *Vig.*, Timneh-Graupapagei.

Ad. Schwarz, Weißenfels, Klingenplatz 8: Mexik. Karmingimpel, Maskenläubchen.

Walter Voigt, Jena, Feodorastr 13: 0,2 kl. Kubafinken.

Carl Willer, Tierhandlung, Altona a. d. E., Kirchenstraße 34: Gelbkopf- und Surinamamazone.



Herrn A. St., Leipzig-G. Es handelt sich um einen Spulwurm, von denen etwa ein halbes Dutzend Arten in den Eingeweiden der Stare leben. Aus der Tatsache, daß der Wurm nicht mit Kot beschmutzt ist, kann nicht geschlossen werden, daß er den Vogel durch den Schnabel verlassen hat. Es ist möglich, daß er diesen Weg genommen hat. Die schmatzenden Töne, welche der Vogel von sich gibt, hängen kaum damit zusammen. Zur Bekämpfung der Würmer wendet man bei kleinen Vögeln am besten das bekannte Hausmittel, frische Kürbiskerne, an, die jetzt leicht zu beschaffen sind. Der innere Kern wird fein zerrieben oder gehackt unter das Futtergemisch gegeben. Das kann mehrere Tage hintereinander geschehen. Bei längerer Verwendung der frischen Kerne verläßt der Parasit meist den Körper seines Wirtes.

Herrn K. K., Göttingen; Herrn A. K., Anklam; Herrn O. B., Halle/Saale; Herrn K. H., Erfurt; Herrn O. M., Berlin; Herrn W. S., Speyer; Herrn C. B., Fulda; Herrn Dr. L., Brüssel; Herrn M. D., Berlin; Herrn E. M., Berlin: Beiträge dankend erhalten.

Herrn M. W., Eilenburg; Herrn H. E., Magdeburg; Herrn H. H., Braunschweig, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Frau N., Deutsch-Lissa. Beim Blaustirnsittich sind die Geschlechter gleich gefärbt. Dem jugendlichen Vogel fehlt das Blau an Stirn und Scheitel, beim ♀ soll der Schnabel schwächer, die Spitze länger und schlanker sein als beim ♂. Feuerflügelsittiche sind im Gefieder dem Geschlechte nach nicht zu unterscheiden. Beim orangerotköpfigen Inseparables ist Hinterkopf und Kehle orangerot bei beiden Geschlechtern; bei einem Bergpapagei ist die Stirn des ♂ rot, beim ♀ ohne rot.

Herrn E. B., Königsberg. Was bisher über die Timalie bekannt geworden ist, findet der Fragesteller auf S. 119 f. Der Gesang des Vogels ist dort eingehender geschildert. Leider liegen Berichte von Liebhabern über diesen das erste Mal eingeführten Vogel noch nicht vor.

Herrn C., Berlin. Die N. ist infolge von Funktionsstörungen der Leber, wohl eine Folge des Alters des Vogels, eingegangen. Das Rotkehlchen litt an Darmentzündung, verbunden mit Darmerweiterung.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

raang 54 17. September 1925 Heft 38

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Die Gartenvoliere. Von Adolf Voigt, Jena.

Meine Körnerfresser. (Forts.)

Neueinführungen und Seltenheiten. Von K. Neunzig. (Forts.)

Die Darre (Kalkdurchfall) der Körnerfresser. Von Karl Finck, Neukölln. (Schluß.)

Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten. Von J. Kuntzendorff, Berlin. (Forts.)

Wenn Vogelliebhaber eine Reise tun, da können sie was erzählen. Von Max Hunger. (Schluß.)

Kleine Mitteilungen – Sprechsaal – Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber (E. V.) Sitz Leipzig – Vom Vogelmarkt – Redaktionsbriefkasten – Aus den Verbänden – Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung d. Vogelliebhaber, Landesverband Preußen. 1. Vors. Karl Gumprich, Berlin W 50, Nürnberger Str. 44 III; Geschäftsstelle: 1. Schriftf. P. Böhme, Berlin O 17, Rüdersdorfer Str. 69; Kassierer: Erich Merz, Bln.-Friedenau, Wilh.-Hauff-Str. 14. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt". Schriftwechsel grundsätzlicher Art ist an den 1. Vors., im übrigen an die Geschäftsstelle (2. Vors.) zu richten. Geldsendungen: Postscheckkonto Berlin NW 7 Nr. 46155 für Erich Merz.

Nächste Sitzung: zweiter Montag im Oktober.

Unter Leitung des 1. Vorsitzenden fand, wie dies bereits aus der Veröffentlichung über die gefaßten Entschließungen — vgl. Umschlagbogen des Heftes 36 der „Gef. Welt" für 1925 — hervorgeht, am 26. August 1925 eine Vorstandssitzung des Preußenverbandes statt. Für diese war folgende Tagesordnung vorgesehen: 1. Berichterstattung des 1. Vorsitzenden über die Geschäftslage im Preußenverbande. 2. In welcher Weise hat der Aufbau des Preußenverbandes als Glied in der Kette der Spitzen- (Länder-) Verbände der Untergruppen am zweckmäßigsten zu erfolgen. 3. Aufstellung und Herausgabe eines Mitgliederverzeichnisses im Einvernehmen mit dem Reichsverbande. 4. Wahl einer Zeitschrift als Verbandsorgan. (Offengebliebene Frage in der Generalversammlung). 5. Beitragsfrage. 6. Verbandsabzeichen-Angelegenheit. 7. Festsetzung des Termins für die Jahresversammlung 1925/26 (Reichsverband hält Generalversammlung bereits vom 4.—6. April 1926 ab). 8. Festlegung bestimmter regelmäßiger Sitzungsabende und Sicherstellung eines Sitzungszimmers. 9. Betreuung eines Berliner Verbandsmitgliedes mit einer Kauf- und Tauschvermittlung für die Mitglieder des Reichsverbandes nach Maßgabe der Richtlinien auf S. 200 der „Gef. Welt" für 1924. Zu Punkt 1 der Tagesordnung: Der 1. Vorsitzende, der zunächst in ehrender Weise des verstorbenen Verbandsmitgliedes Herrn Nadlermeister Schindler gedachte, wies in seiner Begrüßungsrede darauf hin, daß er die verspätete Einladung zu einer Vorstandssitzung — und zwar zur ersten im laufenden Geschäftsjahre — zu entschuldigen bitte. Denn es wäre ihm infolge Vorenthaltens des Aktenmaterials seitens seines Vorgängers bis jetzt beim besten Willen nicht möglich gewesen, vor den Gesamtvorstand mit positiven Vorschlägen hinzutreten. Ihm fehlten bei der Amtsübergabe jegliche Anhaltspunkte, an die er hinsichtlich der organischen Fortentwicklung des Preußenverbandes hätte anknüpfen können. Nur durch zeitraubende Orientierungen sowohl beim Reichsverbande wie bei den Vereinen hätte er sich einen Überblick darüber verschaffen können, wie die Verhältnisse im Preußenverbande lägen. Das Resultat sei gerade nicht als rosig zu bezeichnen. Es fehle, so führte der Sprecher aus, draußen das Vertrauen zur Leitung des Verbandes, das wir uns nunmehr erst erringen müßten. Dessenungeachtet gehe er, nachdem er einmal den Posten des 1. Vorsitzenden übernommen hätte, unerschrocken an die Bekämpfung etwaiger Widerwärtigkeiten heran und verlange von jedem Vorstandsmitgliede treue Gefolgschaft. Was das Verhältnis des Preußenverbandes zum Reichsverbande anbelange, so sei ersterer dem letzteren als untergeordnet zu betrachten und hätte demzufolge dessen Ziele in jeder Weise zu unterstützen. Zu Punkt 2 ebendort referierte der 1. Vorsitzende dahingehend, daß nach seiner Ansicht nur ein vertikaler Aufbau im Preußenverband zum richtigen Ziele führen könne, und zwar in der Weise, daß durch Orts- und Kreisvereine sowie Provinzgruppen gewissermaßen den Eigenheiten jeder Landsmannschaft in der Vogelliebhaberei ihres Heimatsbezirks Rechnung getragen werden müßte. Der Preußenverband hätte als Spitzenorganisation (Landesverband) für seinen Geschäftsbereich zu wirken und die Verbindung mit dem Reichsverbande herzustellen. Mit dem Ideengang erklärte sich der Vorstand grundsätzlich einverstanden. Herr Karl Neunzig (Herausgeber der „Gef. Welt"), der einer Einladung zu dieser Sitzung gefolgt war, machte auf Grund seiner Erfahrungen bei dem ehemaligen Reichsverbande darauf aufmerksam, daß es vielleicht zweckmäßiger wäre, zunächst die Kreisvereine und Provinzgruppen außer Betracht zu lassen und diese Verbandserweiterung dem späteren Ausbau zu überlassen. Dieser Anregung wurde Rechnung getragen und die Entschließung, wie geschehen, formuliert. Zu Punkt 3 ebendort erklärte der 1. Vorsitzende, daß nach seiner Ansicht gerade ein Mitgliederverzeichnis die Mitglieder des Verbandes näher zusammenführen dürfte und dessen beschleunigte Herausgabe in möglichst einfacher Form ein dringendes Bedürfnis wäre. Allgemeine Zustimmung führte zu der Entschließung. Zu Punkt 4 ebendort: Bei der Wahl der „Gef. Welt" ging der Vorstand von dem Gesichtspunkt aus, daß der dem Reichsverbande unmittelbar unterstellte Preußenverband naturgemäß dieselbe Zeitschrift für seine Veröffentlichungen zu benutzen hätte, in denen die Bekanntmachungen des Reichsverbandes erfolgen. Als für unsere Zwecke am geeignetsten ist und bleibt nun einmal die über ein halbes Jahrhundert bestehende Wochenschrift „Gef. Welt", die auch ohne weiteres in Anbetracht ihrer Popularität, bildlichen Ausstattung und Verbreitung andern in letzter Zeit neu erschienenen Zeitschriften gegenüber den Vorzug verdient. In der Erwartung, daß sich auch die Außenstellen mit diesem Grundsatze einverstanden erklären werden, wurde die veröffentlichte Entschließung gefaßt. Die Verbandsmitglieder werden, um auf dem laufenden zu bleiben, gebeten, soweit es noch nicht geschehen ist, die „Gef. Welt" zu halten. Zu Punkt 5 ebendort: Die Beitragsfrage ist vorläufig als Schmerzenskind zu bezeichnen, da einige Vereine infolge ihrer niedrigen Vereinsbeiträge sich nicht zu der statutarisch und durch Generalversammlungsbeschluß festgesetzten Beitragsleistung aufschwingen können. Es wird nicht verkannt, daß hier gegenüber diesen Vereinen eine Härte besteht. Eine grundsätzliche Regelung dieser Angelegenheit muß jedoch mit Rücksicht darauf verschoben werden, weil der größte Teil der Vereine und Einzelmitglieder bereits für das laufende Geschäftsjahr ihre Verpflichtungen erfüllt haben. Hierbei sei darauf hingewiesen, daß der Verband bestrebt sein wird, nur die allernotwendigsten, lediglich im Interesse des Landesverbandes liegenden Ausgaben aus den Vereins- pp. Beiträgen zu bestreiten. Im übrigen wird diese Angelegenheit im Einvernehmen mit dem Reichsverbande zu regeln sein. Zu Punkt 6 ebendort: Der gefaßten Entschließung über die Schaffung eines Verbandsabzeichens ist nichts hinzuzufügen. Wie jedes einsichtige Verbandsmitglied merken muß, drücken den Verband jetzt andere Sorgen. Zu Punkt 7 ebendort: Der endgültige Termin für die Generalversammlung 1925/26 wird in einer der nächsten Vorstandssitzungen endgültig festgelegt und in der „Gef. Welt" bekanntgegeben werden. Es wurde die Erwartung ausgesprochen, daß in der Generalversammlung die Anwesenheit von Vereinsvertretern ein dringendes Bedürfnis ist. Zu Punkt 8 ebendort: Festlegung bestimmter Sitzungstage. Bis auf weiteres müßte vorläufig wegen der Besetzung des Lokals von der Festsetzung bestimmter Tage für die ganze Geschäftsperiode leider abgesehen werden. Das Stattfinden jeder einzelnen Vorstandssitzung wird rechtzeitig in der „Gef. Welt" bekanntgegeben. Zufällig in Berlin anwesende auswärtige Verbandsmitglieder sind ebenso wie die Berliner Verbandsmitglieder zur Teilnahme an den Vorstandssitzungen herzlichst eingeladen. Zu Punkt 9 ebendort: Die Übernahme der Kauf- und Tauschvermittlung durch Herrn Däbnick jr. wird allseitig begrüßt werden. Die Verbandsmitglieder werden gebeten, von dieser Einrichtung möglichst Gebrauch machen zu wollen. Die Sitzung nahm einen harmonischen Verlauf. Der 1. Schriftf.: P. Böhme.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10. Anmeldungen zur A. Z. bitte ich an den Präsidenten Herrn Horst Wagner in Bruchmühle bei Fredersdorf a. Ostbahn, Lindenstr. 32, zu richten. — Angemeldet ist Herr Konditoreibesitzer Karl Rist, München, Blumenstr. 15. Aufgenommen wurde unter Mitgl. Nr. 170 n Herr Franz Gröchl, Böhm Leipa (Tschechoslovakei), Parkstraße. A. Krabbe.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögeln in Aplerbeck. Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, in der Wirtschaft Sprave, früher Fritz Lecking, Kirchstraße. Die Monatsversammlung für September findet am 20. d. Mts. statt. Der Vorstand. J. A.: F. Hartlieb.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen. — Am Sonnabend, dem 3. Oktober, begeht die Vereinigung die Feier ihres 30. Stiftungsfestes im Vereinslokal, großer Saal, Alexandrinenstr. 37a. Alle Freunde und Gönner des Vereins sind dazu herzlichst eingeladen. Eintrittskarten à 1,50 M. sind beim Unterzeichneten zu entnehmen.

J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke, Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Dessau und Umgegend. Gegründet März 1925. Versammlung jeden 2. Mittwoch abends 8 Uhr. Vereinslokal: „Fürst Blücher," Ecke Antoinetten-Leopoldstr. Nächste Versammlung: 30. September. Demnächst ist eine Führung durch das Naturkundliche Museum zu Zerbst unter Leitung des bekannten Ornithologen, Herrn Krietsch, Dessau, geplant. 1. Vors. Herr Krietsch, 2. Vors. Herr Weichelt, Schriftf. Herr E. Dielitzsch, Kass. Herr Michel. Gäste zu den Versammlungen und sonstigen Veranstaltungen stets willkommen. Ein Zusammenschluß aller Liebhaber im Interesse unserer schönen, aber schwer bedrohten Liebhaberei ist auch in Dessau unerläßlich.

J. A.: Erich Dielitzsch, Schriftf., Dessau, Teichstr. 8.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Restaurant „Zum Löwentor", Königswall 75.

J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung Freitags, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Blasewitzer Hof". Liebhaber willk. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Eliesenhof", Eliesenstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Mittelthüringens Sitz Erfurt. Sitzung jeden 2. Mittwoch und jeden letzt. Sonnabend im Monat im Vereinsl. „Stadt Chemnitz", Thomasstr. 57. Näh. Auskunft erteilt Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 6. Oktober. A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Der Hannoversche Vogelschutzverein zu Hannover, gegr. 1881, wirkt mit sichtbarem und anerkanntem Erfolge für Vermehrung und Schutz der Vogelwelt bei Hannover durch Aufhängen von jährlich einigen hundert Nistkästen aller Art, durch Erweckung von Interesse und Liebe für die Vogelwelt mit monatlich, zur Gesangszeit wöchentlich stattfindenden Belehrungsspaziergängen und durch Vorträge und Austausch der Beobachtungen in den jeden dritten Dienstag des Monats stattfindenden Vereinsversammlungen. Seine Bestrebungen dienen also lediglich gemeinnützigen Zwecken. Mitgliederzahl rund 1200, jährlicher Beitrag nur 1 M. Meldungen an den Vorsitzenden Herrn Fritz Becker, Hannover, Boedekerstr. 1 F. Nächster gemeinsamer Spaziergang: Sonntag, den 20. September, 9½ Uhr, in die Eilenriede, Treffpunkt „Kriegerdenkmal". Becker.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste willk. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Versammlung am Sonnabend 5. September. Herr Jahn hielt einen Vortrag über den Star, erörterte auch die Frage, ob dieser eine oder zwei Bruten macht, dahin, daß in einem Starkasten an seinem Hause in diesem Jahre kurz hintereinander zwei Bruten gemacht wurden, leider sind die Alten nicht beringt worden, so daß es nicht ganz sicher ist, ob es dasselbe Paar war. Er erwähnte die leichte Aufzucht, das Imitationstalent: Ein dies Jahr aufgepäppelter Star studiert schon fleißig in der Gartenvoliere den Grasmückengesang. Friedrich gibt an, daß schon bei den Nestjungen die Männchen dadurch erkenntlich seien, daß sie einen kleinen dunklen Fleck auf der Zunge hätten. Er hat die Jungen in seinen Kästen darauf untersucht und festgestellt, daß ein Teil von ihnen den kleinen schwarzen Flecken tatsächlich bekommt, aber erst wenn sie schon befiedert sind; einige Jungen im Neste hatten ihn nicht, so daß wohl anzunehmen ist, daß ihn nur die Männchen zeigen, denn das aufgepäppelte Männchen hatte diesen kleinen dunklen Zungenfleck! Einige heitere Episoden von einem fingerzahmen Star schlossen den Vortrag. Über einen originellen fingerzahmen Grünfink berichtete Herr Uhlmann. Eine wundervolle Zeitungsnotiz der Jenaischen Zeitung gab Stoff zum Lachen: Holzhauer des Rockauer Forstes haben einen Kuckuck beobachtet, der erst die Jungen eines Zaunkönigs im Nest fraß, dann seine Eier hineinlegte, die die Zaunkönige erbrüteten, dann später die Alten fraß! Einen sehr breiten Raum nahmen die Verhandlungen über den in Jena gegründeten Verein „Naturschutzpark Thüringen" ein. Herr Borggreve, der Vorsitzende dieses Vereins, war als Gast zugegen. Unser Verein hat sich zunächst als körperschaftliches Mitglied angemeldet. Einige Exemplare der Vereinssatzungen wollen 3 Vereinsmitglieder gemeinschaftlich prüfen und mit Herrn B. dann nochmal besprechen. Als Gelände ist das der Carl-Zeiß-Stiftung gehörige Rosenthal in Aussicht genommen. Es sprachen viele Gründe für dieses, einige schwerwiegende aber auch dagegen so vor allem der Umstand, daß das Gelände Eigentum der Carl-Zeiß-Stiftung bleibt. Vielleicht berichtet Herr Borggreve selbst an dieser Stelle einmal ausführlich über das Projekt. Die Versammlungen fanden bisher in der Wohnung des Vorsitzenden statt, sollen aber wieder in ein Gasthaus verlegt werden. Der 2. Vorsitzende will sich um ein geeigneteres Zimmer bemühen. Die nächste Versammlung findet am 19. Sept. noch einmal in der Wohnung des Vorsitzenden statt. A. Voigt, Schriftf.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1 Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an!

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinboldt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 17. Sept. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Normast im „Kaiser Friedrich", Breslauerstr. 50. Liebhaber willkommen. J. A.: Friedrich.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße.
gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

(Fortsetzung auf der 4. Umschlagseite.)

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wst., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Sitzung aller 14 Tage im Restaurant „Zum Neckarstrand", Messeplatz 1. Liebhaber willkommen. Joh. Daubmann, Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Versammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Liebhaber willk. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebenda. R. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste willkommen.
J. A.: Paul Schmidt, 1. Vorsitzender, Bosenstraße 44.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zwe

Käfige u. Gerätschaften

20 Schindler- u. and. Käfige
gebr., f. 2—5 M. pro Stück abzugeben. Besichtigung nur 4 Uhr nachm., zu and. Zeit vorherige Telephonanmeldung.
Kanthack, Berlin-Friedenau,
Albestraße 15, V. III. [1209
Tel. Rheingau 9917.

Ia Mistelleim,
echt laubgrün, liefert in anerkannt vorzüglichster Güte [1210
Adolf Kirschner, Arnsdorf-Haida, (Böhmen), Roseggerstr.
Probesendungen geg. Einsend. v. M. 2.— Wiederverkäufer Vorzugspreise.

Vogel-Mistelleim
zum Fangen schädlicher Vögel,
Ia klebend bei jeder Witterung, garantiert gebrauchsfähig, Dose 2.— M. fr. von
A. Freitag Nchf., Frankenberg i. S. 6.
Wiederverkäufer hohen Rabatt. [1211

Fußringe f. Wellensittiche
unerreicht in Qualität, Spezialerzeugnis, ferner **Wellensittiche** in allen Farben, auch **blaue** u. blaublütige, sowie **weiße** u. schieferblaue Kanarien empfiehlt
C. Balser, Fulda. [1212

Futtermittel

Ameiseneier
Pfund 6.— Mark. [1213

Weißwurm	Pfund 6.— M.
Muska	Pfund 2.50 M.
ff. Eigelb	Pfund 3.00 M.
Waldvogelfutter	Pfund 0.60 M., 5 Pfund 2.50 M.
Zeisig- u. Stieglitzfutter	Pfund 0.75 M 5 Pfund 3.50 M.
Kanarien-Singfutter	Pfund 0.60 M., 5 Pfund 2.50 M.
Papageifutter	Pfund 0.60 M., 5 Pfund 2.50 M.
Weichfutter	Pfund 1.00 M., 5 Pfund 4.50 M.
Orig. Lucullus	½ Pfund 1.25 M., 5 Pakete 6.00 M.

sowie sämtliche Sämereien aus dem Inserat Nr. 36 der „Gef. Welt".
Verpackung frei. Porto extra.
Zahlungen erbitte auf mein Postscheck-Konto Berlin Nr. 46657.
Bedienung prompt und reell.
Fritz Krüger, Zoologische Handlung, **Charlottenburg,** Pestalozzistr. 87.

Mehlwürmer
(Versand beginnt Anfang Oktober)
Ia Ameiseneier Pfund 5.00 M.
Ia Muska-Zecken Pfund 1.50 M.
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen Pfd. 0.75 M.
Die Preise sind freibleibend, ab Lager, ohne Porto und Verpackung. Bei Anfrage Rückporto beifügen. [1214
Bei größerer Abnahme hoher Rabatt.
Karl Claus, Mutterstadt II (Hauptbahnhof).

Zücherwaren:

Verbesserte „L. K.-N."	½ kg Mk. 1,50
Rübsen Ia, 1924er	„ „ „ 0,50
Rübsen Ia, 1925er	„ „ „ 0,40
Glanz, Marokko	„ „ „ 0,50
Hanf, deutscher	„ „ „ 0,30
Hafer, gesch.	„ „ „ 0,30
Negersaat	„ „ „ 0,35
Leinsaat	„ „ „ 0,40
Silberhirse, weiß	„ „ „ 0,45
Marokko-Hirse	„ „ „ 0,30
Senegalhirse	„ „ „ 0,30
Sonnenrosenkerne	„ „ „ 0,35
Ia Mischfutter	„ „ „ 0,45
Blau-Mohn	„ „ „ 0,70
Ameiseneier, getrocknet	„ „ „ 4.—

Andere Sämereien auf Wunsch zu billigsten Tagespreisen.
1215] Preise freibleibend!
Lorenz, Dresden, Drehgasse 5.

„ORNIS" Freie Bezugsvereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands.
Gegründet 1912 .·. Fernsprecher 4198 [1216
Fachgemäße Belieferung mit Vogelfutter („Reform-Normal", individuelle Zusammensetzung bei restlosem Verbrauch; stets frisch gemischt). Hunderte von Liebhabern füttern seit über einem Jahrzehnt mit bestem Erfolg nur „Reform-Normal".
Reform-Normal-Käfige Mod. ORNIS 1925, neue Preisliste erschienen. — Modern eingerichtete Käfig-Bauanstalt mit elektrischem Betrieb.
Anschrift: Ornis-Haus, Halle-Saale. Der Geschäftsführer: Martin Sperling.

Offeriere in gesunden Exemplaren
Junge Blaustirnamazonen
(Sprechvögel) Stück 45.— Mark

Kl. Gelbhauben-Kakadus	Stück 30.—	Schmetterlingsfinken	Paar 3.50
Tarantinische Unzertrennliche	Paar 18.—	Amaranten, ausgefärbt	Paar 3.—
Feuerflügel-Sittiche	Stück 15.—	Silberschnäbel	Paar 3.—
Tovi-Sittiche	Paar 15.—	Astrilde	Paar 3.—
Grüne Wellensittiche	Paar 10.—	Afr. Goldsperlinge, ausgef.	Paar 6.—
dto. ausgefärbte, blutsfremd	Paar 12.—	Graue Edelsänger	Stück 2.—
Afr. Langschwanzstare	Stück 8.—	Blutschnabelweber in Pracht	Paar 4.—
Afr. Turteltäubchen	Paar 6.—	Feuerweber in Pracht	Paar 7.—
Senegaltäubchen	Paar 6.—	Paradieswitwen in Pracht	Paar 6.50
Kaptäubchen	Paar 5.—	Dominikanerwitwen ohne Pracht	Paar 4.—
Graue Kardinäle	Stück 8.—	Zahme Kapuzineraffen	Stück 70.—
Fingerzahm. Zwergara, spricht einige Worte	40.—	Prachtvolle Nesusaffen, ohne Fehler	Stück 45.—
Schwarzkopf-Nonnen	Paar 4.50		
Bandfinken	Paar 3.50		

Für lebende Ankunft sowie reellste Bedienung wird Garantie übernommen.
Verpackung und Porto 3.50 Mark, als Dringend 6.50 Mark. [1217
Bei Abnahme von 10 Paar kleinen Exoten verschied. Arten Verpackung u. Porto frei.
Prima Ameiseneier à Pfund 3.80 M., bei 10 Pfund franko.
Paul Tzornack, Berlin NO 55,
Prenzlauer Allee 189.

Aus meiner Farbenwellensittichzucht gebe ich zuchtreife Paare ab: Grüne 20 M., gelbe 22 M., oliv 40 M., dunkle 80 M., orangegelbe je nach Wellenzeichnung 40 bis 80 M., jede 60.— M. das Paar. Meine sämtlichen Wellensittiche führen blaues Blut, auch die gelb., u. hab. geschloss. Fußringe, die den Abstammungsnachweis ermöglichen. Sie sind sowohl zur Reinzucht wie zur Kreuzung u. Blutauffrischung sehr geeignet. Tausche ein: einzelne Nymphen u. Reisvögel. [1218
Richard Schwarzkopf, Ingelfingen (Württbg.), A. Z.-Mitglied Nr. 216.

Ia Ameiseneier
Pfund 5.00 M.
Ia Muska-Zecken . . à Pfd. 2
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen . . . . à Pfd. 0
Ia Garnelen, gem. . à Pfd. 0
Ia Universalfutter
Alleckwa I für Nachtigallen 2.—
„ **II für Grasmücken** 2.—
„ **III für Drosseln** . 1.50
Proben und Analysen zur Verfügung Vertreter oder Wiederverkäufer erhal hohe Rabatte. [1
Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
A. Eckrich II, Waldsee (Pfalz)

Mehlwürmer Ia Pfd. 5.— (ohne Spes ½ Pfd. 3.— M frk. Voreinsei
Jeltner, Breslau, Weinstr. 12. [1

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark ¼ P franko versend. **D. Waschinski & C**
Biesenthal I (Mark). [1

Mehlwürmer
veget. gefüttert, ¼ Pfd. 1.50 M ½ Pfd. 3.00 M., 1 Pfd. 5.60
Wiederverkäufer Rabatt.

Getrock. Ameisenpuppe
à Pfund 5.50 Mark.
Ia Muska (Zecke) **à Pfd. 2.00**
Ia Weißwurm à Pfd. 4.50
Franko geg. Voreinsend. des Betrag
Th. Witte, Niederndodeleben bei Magdeburg. [1

Heidelberger Vogelfutte
Braune Packung für Erdsänger u. ä. Vö 250 g 2
Graue Packung f. Grasmücken 250 g 1
Blaue Packung für Drossel 250 g 1
empfiehlt [1
Arthur von Ende,
Zoologische Handlung,
Jena (Thüringen), Magdelstieg Nr.

Vogelfutter [12
für Kanarien, Waldvögel, Exote **Papageien, Weichfresser.** Anerkan bewährteste Mischungen auf Grund la jähriger Erfahrung. Liste 18 über Vog futter umsonst.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 9
Bei Anfragen bitte auf die „Gefieder Welt" Bezug zu nehmen.

Ein Versuch
überzeugt jeden von der Güte mein **Universalfutters.** Preis 2 M. p. P Sämtliche Futtersorten für Exote Wald- und Kanarienvögel zu billigst Tagespreisen. Versand geg. Nachnahm Verpackung und Porto werden billi berechnet. [12
P. H. Kirsten, Leipzig 3,
Zeitzer Str. 53. Fernruf 3144

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Der heutigen Nr. der Gef. Welt liegt die Farbentafel „Kanarienvögel" bei

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 24. September 1925 | Heft 39

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Ornithologische Skizzen aus Südtirol.

Von W. Bacmeister, Heilbronn.

(Nachdruck verboten.)

„Bolzano!“ ruft der Schaffner und „Bolzano-Gries“ steht auch am Gebäude der Station angeschrieben, in das soeben der Zug, der uns über den Brenner führte, einfährt. Es ist jetzt schon so: Brenner heißt „Brennero“, Klausen, das urgemütliche heimelige Städtchen, das so echt deutsche Spitzwegmotive in seinen Straßen und Gäßchen überall aufweist, muß sich „Chiusa“ heißen lassen, Bozen „Bolzano“. Nur für Gries haben die Italiener noch keine Übersetzung gefunden. Macht nichts, man sagt dann eben geschmackvoll „Bolzano-Gries“.

Der Deutsche, der — nach dem Kriege — zum erstenmal wieder das gesegnete, so kerndeutsche, so kerndeutsch gewesene Südtirol aufsucht, muß sich schon an allerlei Neues gewöhnen. Alles neu macht der Mai, alles neu auch das neue Regiment dort unten im Tale des Eisak, der Talfer, des Grödnerbaches. Mit Schmerzen sieht man es, wie dieses gesegnete Land mit Gewalt italienisch gemacht werden soll, mit Ingrimm nimmt man wahr, wie zielbewußt die neuen Herren dort vorgehen gegen alles Deutsche in Sprache und Gesittung. Herr Walther von der Vogelweide, der kerndeutsche Mann, der aus jener Gegend stammt und dessen Denkmal auf dem nach ihm benannten Platze in Bozen steht — „Piazza Walther“ heißt jetzt dieser Platz! — schien uns noch tiefer das gedankenvolle Haupt zu senken ob all dem undeutschen Wesen, das sich jetzt dort um ihn herum breit macht! Doch davon wollen wir hier ja nicht weiter reden. Immerhin — man kann nicht schweigen von dem, was schmerzlich auf Schritt und Tritt sich dort unten einem aufdrängt, wo man sich auszuspannen hoffte von der Berufsarbeit, frei und ledig umherzuschweifen gedachte, lauschend auf der Vöglein Lied und sich labend nach tüchtigem Marsch am goldenen feurigen Tiroler Wein. Gottlob! Die Vögel und der Wein, die bleiben die Alten, diesen Genuß vermag keine Regierungsgewalt uns zu verkümmern.

Aber auch vom edlen Tiroler Wein will ich hier nicht weiter singen und sagen, schon um nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, ich sei lediglich um dieses Sorgenbrechers willen ins tirolische Land gefahren. Will auch keinen förmlichen Reisebericht hier geben, auch nicht im einzelnen alles genau anführen, was ich an Ort und Stelle in mein ornithologisches Tagebuch eingetragen habe. Nur ein paar lose Skizzenblätter möchte ich dem Leser der „Gefiederten Welt“ vorlegen, was aus dem Leben unserer Gefiederten dort unten im Süden in kurzen Umrissen aufzuzeichnen mir wert schien.

In Bozen und Umgebung.

Der erste Vogel, der mir in Bozen begegnete, war die Nachtigall. Spät am Abend war ich angekommen, hatte sofort mein Gasthaus aufgesucht, mich rasch noch etwas gestärkt, um mich, müde von der langen Fahrt Stuttgart—Bozen, alsbald zur Ruhe zu begeben. Kaum hatte ich das Fenster geöffnet, um die köstliche, herrlich duftende Frühlingsluft hereinströmen zu lassen, da schlug schon an mein Ohr das Lied unserer Sängerkönigin:

Vor dem walde in einem tal
tandaradei!
schone sanc diu nachtegal,

so sang einst Walther, und die von ihm gefeierte Nachtigall selbst schlug im nahen Garten vor meinem Fenster in Bozen die ganze Nacht hindurch, bis endlich der Schlaf mein Auge kühlte.

Und die weiteren Verse des edlen Minnesängers kamen mir in den Sinn, als am anderen Morgen die Sonne über diesem wunderschönen Tal aufging und mein Blick voll Entzücken von den Rosen des Gartens unter meinem Fenster zu den kühnen Formen der Rosengartengruppe und zu dem gewaltigen Massiv des Schlern hinüberglitt:

Wenn die Blumen aus dem Grase dringen,
gleich als lachten sie hinauf zur Sonne,
des Morgens früh an einem Maientag,
und die kleinen Vöglein lieblich singen
ihre schönsten Weisen: Welche Wonne
hat wohl die Welt die so erfreuen mag?
man glaubt sich halb im Himmelreiche.

Noch zweimal bin ich in Bozens Umgebung der Nachtigall begegnet. Am 13. Mai 1925 schlug eine sehr eifrig im dichten, wildwuchernden Ufergebüsch der Talfer am Fuße der prächtigen Burg Runkelstein. So üppig ist dort der Pflanzenwuchs, daß man den Vogel, der nur wenige Schritte von uns entfernt seine Lieder in den Frühlingsmorgen hineinschmetterte, trotz eifrigen Spähens nicht entdecken

konnte. Aber es befriedigte uns schon das Hören. Und am Tag darauf sang eine weitere abends ½ 8 Uhr im weinberühmten, am Fuße der Mendel gelegenen Eppan. An dem gleichen Orte, oberhalb Eppan, hat der verstorbene bayrische Ornithologe Dr. C. Parrot im Frühjahr 1895 diesen Edelsänger nachgewiesen. (Vgl. hierüber die Arbeit Parrots „Versuch einer Ornis des Grödner Tals (Südtirol)" in den Ornithologischen Monatsheften 22. Jahrg. (1879) S. 47—55 und S. 73—77 und den in den Verhandlungen der Ornithol. Gesellschaft in Bayern in Bd. V (1904) S. 28—32 enthaltenen Bericht desselben Verfassers „Über die Ornis von Süd-Tirol").

Als weitere für die Vogelwelt Bozens bezeichnende Vögel möchte ich das allbekannte Schwarzplättchen und den Mauersegler anführen. Beide sind ungemein häufig. Angenehm hat es mich berührt, daß ich in zwei Häusern in Bozen eigens für den Mauersegler ausgesparte Löcher in der Hauswand entdeckte, in einem Hause in St. Anton sogar drei nebeneinander, die von den „Speiern" gerne angenommen wurden. Auch auf Klobenstein (1149 m ü. M.) nistete noch der stürmische Segler an der Kirche. Die Bozener scheinen überhaupt vogelfreundlich zu sein. Man sieht viele gekäfigte Vögel, insbesondere einheimische Arten, wie Kreuzschnabel, Dompfaff, Buchfink, Grünfink, Stieglitz. Selbst der Girlitz wurde einmal im Käfig gehalten. Ich hörte diesen niedlichen Hans Unverzagt wiederholt in den Anlagen der Stadt, im Garten meines Gasthauses und anderwärts. Überrascht fuhr ich aber doch herum, als mitten in der Stadt, wo nirgends ein Garten war, die klirrende Strophe dieses kleinen Finken an mein Ohr schlug. Das war mir doch etwas sonderbar. Aber das Ungewöhnliche des Vorkommens fand sehr bald seine natürliche Erklärung; der Girlitz wurde von einem Vogelliebhaber in einem Käfig gehalten, der hoch oben im dritten Stock unter dem Fenster stand. Parrot hat diese Art nur ein einziges Mal bei der Haselburg gehört. Sie scheint nun dort entschieden zahlreicher zu sein. Auch auf dem Obst- und Gemüsemarkt in Bozen sah ich einmal, daß ein paar Vögel für Liebhaber feilgeboten wurden: je ein Stieglitz, Hänfling, Bergfink (auffallenderweise), Rotkehlchen, zwei Kreuzschnäbel (das Stück zu 20 Lire) und ein Schwarzplättchen (zu 50 Lire, also etwa 8 Mark).

Sehr beachtenswert scheint mir auch, daß ich den italienischen Haussperling wiederholt in Bozen gesichtet habe, neben der gewöhnlichen bei uns vorkommenden Form. Die italienische Form zeichnet sich bekanntlich von unserem Passer domesticus dadurch aus, daß statt des Grau der Kopfplatte der Oberkopf und Hinterhals des italienischen Sperlings (Passer italiae) ein dunkles Rotbraun aufweisen. Die Halsseiten sind schön weiß. Auffallenderweise erwähnt Parrot diese geographische Form des Sperlings in seinen beiden (oben angeführten) Arbeiten nicht.

Höchst genußreich auch in ornithologischer Beziehung gestalteten sich einige Ausflüge in die wunderschöne Umgebung von Bozen; so vor allem ein solcher auf den Ritten, dem so beliebten Sommeraufenthaltsort der Bozener und ein weiterer auf die Mendel und den Monte Penegal (1738 m ü. M.). Ich hoffte, bei diesen Ausflügen auch einige der Bergregion angehörige Vögel anzutreffen, und ward in meiner Hoffnung nicht getäuscht. Daß der allbekannte Weidenlaubsänger überall im Walde ja selbst auf der Höhe des Penegal anzutreffen war, versteht sich fast von selbst. Aber auch den für uns Flachlandbewohner seltenen Berglaubvogel (Phylloscopus bonelli) konnte ich wiederholt, so im Mischwald zwischen Klobenstein und Lengmoos, beobachten und verhören. Sein Lied klingt ähnlich wie das des Waldlaubsängers, nur trillert er rascher als dieser; auch fehlen seiner Strophe die weichen Düh-Düh-Laute des sibilator. Große Freude bereitete es mir, wieder einmal der Alpenmeise zu begegnen. Eine verhörte ich am 17. Mai auf dem Mendelpaß und eine weitere am selben Tag auf der Hochfläche des Penegal. Recht rauh klangen die so bezeichnenden Däh-Däh-Lockrufe, entschieden härter und rauher als diejenigen der zarteren und auch etwas kleineren Weidenmeise (Parus atricapillus rhenanus). Mit Vergnügen lauschte ich auch beim Abstieg von der Mendel herunter nach Eppan dem mir bisher unbekannten Gesang der Ringdrossel, deren Lied prächtig in dem frischergrünten Buchenwalde durch den Abend klang. Die klangreichen Strophen sind entschieden kürzer als die der Schwarzdrossel, aber sie kamen mir so klangreich vor wie die ihrer weitverbreiteten Verwandten.

Vom Seeadler und Steinadler sah ich je ein Stück in ausgestopftem Zustand im Hotel Kalterer Hof auf der Mendel. Nach meinen Erkundigungen sei der Seeadler schon vor langen Jahren am Kalterer See (den man von dort oben sieht) geschossen, der Steinadler aber erst im Jahre 1924 auf dem Roenberg, dem mit der Mendel zusammenhängenden Gebirgsstock, von einem Kalterer Jäger erlegt und an das Hotel dann verkauft worden. Schade! Man müßte die maßgebenden Kreise oder Personen in Bozen darauf aufmerksam machen, daß der Steinadler — wie wenige werden es noch sein, die dort vorkommen! — als Naturdenkmal geschützt werden sollte. Einen solch prächtigen Vogel über die ausgedehnten Wälder der Mendel und der Roen fliegen zu sehen, das wäre ein anderer Anblick als der dem Mottenfraß ausgesetzte traurige Balg!

(Schluß folgt.)

Meine Erfahrungen mit Zusammenhalten verschiedener Vogelarten in der Voliere.

Von A. Krabbe.

(Nachdruck verboten.)

Eines der wichtigsten Kapitel in der Vogelhaltung ist die Verträglichkeit der verschiedenen Arten unter sich und mit anderen. Der Vogelliebhaber, der sich die Erfahrungen mehrerer Jahre zunutze machen kann, hat sich je nach der Art seiner Erfolge, resp. Mißerfolge die bestgeeigneten Zusammensetzungen festgelegt und operiert damit mit mehr oder weniger Glück. Die Jüngeren unter uns, die nach kurzer Pflege der Vögel in Käfigen in den beneidenswerten

Besitz einer Vogelstube oder größeren Zimmer- oder gar Freivoliere gelangen, sind vor die Frage gestellt, mit wieviel und mit welchen Arten besetze ich die Voliere. Der Wünsche sind gewöhnlich mehr als anwendbar und die Liste, welche die geplanten Insassen enthält, hinsichtlich Anzahl und Artverschiedenheit von staunenswerter Länge. Nicht jeder Liebhaber oder Züchter baut unter ganz bestimmten Voraussetzungen zur Aufnahme oder Zucht einer bestimmten Art oder Gattung und diesen gilt mein Beitrag aus dem kleinen Schatz meiner Beobachtungen, welche hoffentlich für andere Leser unserer Zeitschrift, die über mehr Erfahrungen berichten können, ein Anlaß sein wird, die großen Lücken, die sich in unseren Kenntnissen immer noch finden, ausfüllen zu helfen.

Man kann wohl die Vogelliebhaber nach der Art ihrer Pfleglinge in zwei Gruppen zerlegen, und zwar in Liebhaber einheimischer und fremdländischer Vögel, und diese wiederum in zwei Untergruppen, nämlich Pfleger von Körner- und Kerbtierfressern. Die einheimischen und ausländischen Kerbtierfresser schalte ich aus, einmal, weil es sich hierbei überwiegend um einzeln gekäfigte Gesangsvögel handelt und ferner, weil ich über eigene Erfahrungen wenig berichten kann, und verweise Interessenten auf die vorzügliche, in ihrer Art einzige Arbeit des Herrn Troschütz, Hannover, in „Ges. Welt" 1923, Heft 8—12, und die in den Vorkriegsjahrgängen erschienenen Artikel des den Lesern wohlbekannten Herrn John Kuntzendorff, Frohnau, früher Zürich. Die Liebhaber, die Weichfresser in Flugräumen halten, sind gezählt, leider, doch will ich die Gründe, die dafür sprechen, als nicht zur Sache gehörig beiseite lassen. Ich beschränke mich im nachfolgenden nur auf die große Zahl der einheimischen und fremdländischen Körnerfresser und daraus wiederum nur derjenigen, die ich aus eigener Anschauung kennengelernt habe.

In den Nachkriegsjahren, als an den Import der Exoten noch nicht zu denken war, besaß ich eine fast vollständige Sammlung einheimischer Finken, die in einer Voliere von 2×1,2×2 m untergebracht war. Es lebten darin in Paaren: Stieglitz, Bluthänfling, Berghänfling, Erlenzeisig, Birkenzeisig, Zitronenzeisig, Girlitz, Dompfaff, Bergfink, Buchfink, Grünfink, Feldsperling und ein Männchen Kreuzschnabel. Sämtliche Insassen haben sich vortrefflich vertragen, von bedeutungslosen Reibereien abgesehen. Beißereien am Futternapf, die schon im Gesellschaftskäfig an der Tagesordnung sind, habe ich stets als bedeutungslos gefunden, da der Schwächere Gelegenheit hat, dem Stärkeren Platz zu machen. Nur wenn der Angreifer auf energischen Widerstand stößt, weniger am Futternapf als besonders während der Brutzeit am Nistkasten u. dgl., so wird der Sache ernstere Bedeutung zuzumessen sein. Gefährlich ist auch die ruhelose Verfolgung ein und desselben Exemplares bis zur Ermattung; hier hilft nur Herausfangen des Verfolgers. Dies alles kam bei den Finken jedoch nicht in Betracht, und so herrschte in der kleinen Voliere paradiesischer Friede. Als die in „Ges. Welt" 1921 Heft 19—24 beschriebene große Voliere in der neuen Vogelstube fertiggestellt war, wanderte der größte Teil hier hinein und bekam bald die Gesellschaft eines Kernbeißerpaares, das auch seinerseits den Frieden nicht störte, hingegen froh war, wenn es selber nicht gestört wurde. Es waren ebenso schlaue wie scheue Gesellen. Als wirklich unfriedlich mußten zum Frühjahr die Bergfinken entfernt werden, da das Buchfinkenweibchen von ihnen andauernd verfolgt wurde. — Nach meiner Erfahrung können alle heimischen Finken in genügend großer Räumlichkeit, d. h. in einer der gehaltenen Anzahl angepaßten Voliere, zusammen untergebracht werden, mit Ausnahme von Bergfinken,

Ausschnitt aus der Webervogelvoliere des Berliner Zoologischen Gartens.
Aufnahme des Berliner Zoologischen Gartens.

die während der Brutzeit entfernt werden müssen, wenn die geschlechtliche Erregung zu stark zum Ausdruck kommt. Gegenteilige Erfahrungen anderer Liebhaber werden hierdurch wie auch nachher niemals ausgeschlossen, im Gegenteil, zur Äußerung hoffentlich angeregt.

Über das Zusammenhalten heimischer mit ausländischen Vögeln hat sich der Herr Schriftleiter stets abfällig geäußert, und dazu hat er seinen guten Grund. Dieser liegt hauptsächlich in der verschiedenen Ernährungsweise, die ich als nicht zu meinem Thema gehörig unberührt lasse. Als 1921 die ersten Exoten auf den Markt kamen, begann ich mit dem Abbau der Inländer, die aus meiner Voliere bis auf das eine Paar Bluthänflinge verschwunden sind. Unverträglichkeit zwischen Einheimern und Ausländern habe ich nie bemerkt, allerdings habe ich die kleinen

Astrilde mit jenen nicht zusammen gehalten, schon des Größenunterschiedes wegen. Professor Braun, Danzig, hat bereits einmal das Unvorteilhafte derartiger Zusammensetzungen hervorgehoben, und glaube ich kaum, daß ein Liebhaber in beschränkter Zimmervoliere Amaranten zu Dompfaffen setzen wird. In sehr großen Flugräumen liegen die Verhältnisse etwas anders. Sehr wohl lassen sich die ungefähr gleich großen ausländischen Girlitze, Kernbeißer, Kardinäle u. a. mit unseren Finken zusammen halten, wenn man der Fütterung besondere Aufmerksamkeit zuwendet.

Die größte der drei Volieren beherbergt seit einigen Jahren eine Sammlung von Webervögeln und Widafinken, über die ich im Jahrgang 1924 Heft 34—44 berichtet habe. Weber gelten im allgemeinen als zänkische und stürmische Käfiggenossen. Ich muß ausdrücklich bemerken, daß ich in der Voliere Beißereien niemals beobachtet habe und daß sämtliche Weber und Widas sowohl unter sich als auch gegen andere stets friedlich waren. Eine Voliere mit diesen interessanten, rastlosen und schöngefärbten Nestbaukünstlern gibt einen reizenden Anblick, und muß ich mich wundern, daß die Nachfrage nicht größer ist als das Angebot. Selbst die Oryxweber, die sich bei Herrn Pracht, Düsseldorf, als Mörder gezeigt haben, begnügten sich bei mir mit ihren wunderlichen Balztänzen; allerdings besitzen meine beiden Männchen keine Weibchen, um die sie während der Brutzeit streiten können. Im Käfig wird sich das Verhältnis sicher zuungunsten der Weber verschieben, und ich will durchaus nicht empfehlen, in eine Zimmervoliere von ungefähr 1 cbm Inhalt Weber zu Prachtfinken zu setzen, von denen man Zuchterfolge erwartet. In Ausnahme hiervon wären zu nennen Orange-, Taha- und dottergelber Weber, ferner die kleineren Widas, wie Paradies- und Königswitwen. Dominikaner haben sich bei mir stets als friedfertig erwiesen, trotzdem mich andere, sehr erfahrene Liebhaber nachdrücklich vor diesen gewarnt haben. Probieren geht eben über Studieren; feste Regeln gibt es bei Geschöpfen nicht, denen man individuelle Veranlagungen nicht absprechen kann. Junge unselbständige Vögel, insbesondere Zebrafinken, aber auch junge Goldsperlinge, dottergelbe und Larvenweber haben in der Gesellschaft brünstiger Weber unter Begattungsversuchen zu leiden. Die Gelbrückenwitwe trieb es in dieser Hinsicht am schlimmsten, und ich verlor mehrere junge Zebrafinken durch dieses Manöver. Die armen Geschöpfe wurden mit Schnabelhieben bedacht, da sie den Wünschen der begattungslustigen Männchen nicht gerecht werden konnten und gingen an Entkräftung ein. Ein weiterer lästiger Umstand in der Haltung von Webern und Widas ist der, daß es unmöglich ist, fütternden Elternpaaren das nötige Aufzuchtfutter zugänglich zu machen. Die frechen Gesellen stehlen den Weibchen die Mehlwürmer fast aus dem Schnabel fort und fallen mit Begierde über Ameisenpuppen her, so daß ich täglich hätte $^1/_2$ l Puppen und $^1/_4$ Pfd. Mehlwürmer kaufen müssen, wenn ich die Aufzucht der Jungen in allen Fällen gewährleisten wollte. Die durch die erhitzende fleischliche Nahrung entstehenden Nachteile und die daraus entspringenden großen Unkosten machten mir dies in der Praxis unmöglich.

(Schluß folgt.)

Meine Körnerfresser.

Erinnerungen aus einem mehr als 50jährigen Vogelliebhaberleben.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Ich möchte den Zeisig unter keinen Umständen unter meinen Waldvögeln missen. Als Futter reiche ich ihm hauptsächlich blauen Mohn mit etwas Lein- und Hanfsamen, dabei als Grünfutter: Vogelmiere, Kreuzkraut und Apfelschnittchen. Bei dieser Verpflegung hält er lange in der Gefangenschaft aus, besonders im Flugkäfig, der immer mit Tannenzweigen versehen ist. Dann ist der Zeisig der erste Frühaufsteher unter seinen anderen Käfiggenossen, den ich im Sommer schon morgens um 4 Uhr hörte und der die „Reveille" sang und damit das Signal zum Singen für die übrige Gesellschaft gab. Seit mehr als 40 Jahren bin ich nie ohne Zeisig gewesen, bei jeder Reise in den Thüringer Wald, die ich gewöhnlich jährlich unternehme, bringe ich mir einen solchen mit; denn nach meiner Ansicht sind die dortigen Zeisige die schönsten und namentlich die besten Sänger: sie zaubern mir meinen lieben Gebirgswald aus Thüringen in die Stube! Bastarde mit dem Zeisig und dem Kanarienweibchen habe ich oft gezogen, keiner unserer Waldvögel paart sich nach meiner Ansicht so leicht mit den Kanarien wie er. Und nun steht wieder vor meinem Auge, der stolze Held unserer Heimat — der Gärten und des Waldes —, der Buch- oder Edelfink, der mich zu diesen Schilderungen eigentlich begeisterte. Der echte Thüringer Waldbruder, der früher der beste Finkenkenner und -Züchter war, sagte allerdings: der Fink ist ein ärgerlicher Vogel — aber ich kann dem nicht beipflichten. Meine Erfahrungen gehen nach einer anderen Seite hin, ich verehre ihn noch heute, wie ich ihn 50 Jahre verehrte, mehrere Finken mit guten Schlägen pflege ich stets. Sein Schlag hat's mir angetan! Und wer ihn genau kennt und seine Schläge richtig erlauscht hat, läßt nicht wieder von ihm. Da ist der „Reithahn", „Waidmann", „Weingesang", das „Gutjahr", der „Reitherzu" oder „Reitzug", „Bräutigam", „Reitscheer" oder „Reitschaar", „Wildsau", „Zirol", „Musketier", „Dulzier", das „Würzgebühr", bis zum „Putzscheere" usw. In diesen Namen der Schläge liegen die Beziehungen zu den ritterlichen Eigenschaften unseres Finken, wie ich letztere schon in dem Eingang meiner Ausführungen zeichnete, sehr nahe. Auch das Volk, das die Schläge benannte, rechnete demselben rittermäßige Tugenden an; es war ein echter „Reithahn". Und wie trägt er seinen Schlag vor! Sprüht dabei nicht das Feuer seiner Seele aus dem Glanz der Augen unter der kriegerischen schwarzen Sturmbinde der Stirn? Sprechen nicht Liebes- und Kampflust gleichmäßig aus dem lebhaften Rotbraun der Kehle und Brust? Und wie glänzen dabei die schneeweißen Spiegel der dunklen Flügel uns entgegen? Der Finkenschlag ist ein heiterer, schmetternder Frühlingsgruß, der oft schon an den ersten Märztagen das Vorgefühl des Lenzes in uns erweckt. Der Fink war neben dem Hänfling der Vogel meiner Kindheit, den ich zuerst in der schönen Natur kennen lernte. Kaum hatte ich lesen gelernt, da las ich von ihm und seinem kunstvollen Neste. Es war darin geschildert, wie ein böser Bube auf das brütende Finkenweibchen im

Neste mit dem Feuergewehr schießen wollte; das Gewehr zersprang beim Schusse und zerschmetterte dem Schützen die Hand. So wurde diese Ruchlosigkeit bestraft — und ich habe mich nie an ein Finkennest gewagt. Als Schüler bin ich einmal in die Lage gekommen, meine Kunst im Auffüttern junger Finken zu erproben. Nachbarskinder hatten ein Nest mit jungen Finken aus dem Walde mitgebracht und wußten sich damit nachher keinen Rat. Um das Nest wieder an Ort und Stelle zu bringen, dazu war der Weg zu weit, auch waren die Tierchen schon zu erschöpft. Da ich als Vogelliebhaber bekannt war, rief man mich und ich habe versucht, sie mit in Milch geweichter Semmel, vermischt mit eingequelltem Rübsen, großzuziehen. Meine Kunst versagte aber leider, die Tierchen waren schon zu sehr ermattet, sie gingen bis auf eins, das ein kräftiges Tier war, ein. Ihm gaben wir, sobald es allein fraß, aus Reue die Freiheit. So sehr die alten Finken ihre Jungen lieben und sie verteidigen, in den Käfig gesetzte Jungen füttern sie nicht, sie lassen sie verhungern. Ich habe mich mit der Aufzucht von jungen Finken nicht abgegeben, entweder kaufte ich junge Herbstfinken zum Anlernen oder alte Schläger. Letztere habe ich mir oft von weither kommen lassen, um die Finkenschläge der verschiedenen Gegenden kennen zu lernen und zu studieren. Ich habe „Harzer Doppelschläger" und Thüringer Waldfinken in großer Zahl im Laufe der Jahre besessen. Ich bin wiederholt nach Ruhla, dem früheren Dorado der Finkenliebhaber, gefahren, um die Finken dort zu hören und zu kaufen; aber hervorragende Schläger konnte ich auch dort nicht mehr ermitteln. Auch in Großbreitenbach, wo die Finkenliebhaberei ebenfalls zu Hause ist, habe ich nachgeforscht; nur in der sogenannten „Fehrenbacher Schweiz", unweit Wasserberg, fand ich einen Finkenliebhaber, einen kleinen Kistenmacher, dessen Finken sehr Gutes leisteten. Meinen ersten, tadellos schlagenden einschalligen Reitzugfinken mit Schnapper bezog ich von Georg Brühl in Kötzschenbroda vor 25 Jahren. Genannter Lieferant ließ die Finken nach seiner Angabe aus Rußland kommen, hörte sie ab und lieferte dann die gewünschten Schläge. Ebenso habe ich mehrere Male Wildsaufinken von Mathias Rausch in Wien bezogen, die auch tatsächlich das leisteten, was sie sollten. Vor etwa 30 Jahren bezog ich auch mal zwei Finken mit „Reitscher"- und „Pirol"schlag aus Mähren. Sie waren zum Beweise der Reellität unter dem einen Flügel mit dem Stempel der liefernden Firma in blauer Farbe bedruckt, es waren aber — wie oft alte Finken — wilde und stürmische Gesellen. Trotz aller Mühe schlugen sie im selben Jahre nicht mehr — auch bei verhülltem Käfig nicht — ich mußte bis zum nächsten Jahre warten. Dann aber ließen sie die versprochenen Schläge klar und rein hören. Finken, die im Schlagen versagten, habe ich nie gehabt, bei sachgemäßer Pflege und namentlich, wenn der Finke im Frühjahr ins Freie gehängt wird, schlägt er stets — d. h. nach meiner Erfahrung —, ich kann ihn also, wie der alte Thüringer, als „ärgerlichen" Vogel nicht bezeichnen. Besondere Schläger halte ich stets in Einzelkäfigen und dabei noch einen weniger guten in der Voliere bei den übrigen Samenfressern. Wiederholt habe ich auch im Laufe der Jahre versucht, junge Herbstfänge von einem meiner guten Schläger anlernen zu lassen. Hierbei erzielte ich aber wenig günstige Ergebnisse, ich habe darauf verzichtet. Wenn ich in den letzten Jahren keinen guten Schläger kaufen konnte, schaffte ich mir im Frühjahr etwa sechs Wildfänge an, die ich in kleine Einzelbauer setzte und dann abhörte. Wenn irgend möglich, nahm ich sie aus einer Gegend, in der erfahrungsgemäß gute Finkenschläge heimisch waren.

Rotschnabeltoko.
Aufnahme des Zoologischen Gartens zu Berlin.

Viel Erfolg habe ich damit allerdings nicht oft gehabt; denn sehr, sehr häufig waren darunter keine guten Schläger. Meistens handelte es sich um Stümper, die ihren Schlag — wenn er auch einen guten Ansatz hatte — nicht ganz durchschlugen, sondern „stümperten", oder sie schlugen drei und mehr Schläge und damit keinen besonders gut. (Schluß folgt.)

Aus dem Vogelhause des Berliner Zoologischen Gartens.

Von Rudolf Neunzig.

(Nachdruck verboten.)

Das Vogelhaus des Berliner Zoologischen Gartens beherbergt eine große Anzahl von Pfleglingen, die zum Teil als Ersteinführungen aus den abessinischen Transporten stammen oder von einführenden Firmen erworben wurden. Über die Kennzeichen und die

Lebensweise dieser Vögel ist bereits vom Herausgeber unserer Zeitschrift im vergangenen und im laufenden Jahrgange eingehend berichtet worden. Andere Vögel wieder, die das Vogelhaus bewohnen, werden aus einer mir unverständlichen Abneigung von seiten der Vogelpfleger höchst selten gekäfigt und verpflegt. Hier sollen nur einige flüchtige Beobachtungen, die ich bei Besuchen im Vogelhause an derartigen Vogelarten machen konnte, erwähnt werden. Ein Teil der Angaben verdanke ich dem Pfleger dieser Vögel, Herrn Dähne.

Die großen Flugkäfige des Vogelhauses werden von den verschiedensten Vogelarten bewohnt, die meist in Eintracht miteinander leben. Doch sind Zänkereien, manchmal auch ernstlicher Natur, nicht zu vermeiden, und es ist notwendig, erst Erfahrungen über die Verträglichkeit der verschiedenen Arten untereinander zu sammeln. In dem einen Flugraum leben, was stets der Fall ist, verschiedene afrikanische Prachtfinken friedlich miteinander. Sie werden häufig in ihrer behaglichen Ruhe von den Dominikanerwitwen, besonders zur Brutzeit, gestört, die auch ein und den andern Vogelmord auf dem Gewissen haben. Abessinische Silberschnäbelchen und Schnurrbärtchen wurden wiederholt gezüchtet. In demselben Raume wohnen vier Schopfwachteltauben, die wohl in der Nachkriegszeit das Erstemal nach Deutschland gelangt sind, ferner eine Maidtaube und eine Anzahl von Tamborintäubchen, die sämtlich aus Westafrika stammen.

Verschiedene Weberarten bauen ihre kunstvollen Nester in einem weiteren Flugraum und geben den Besuchern einen Einblick in das Freileben und die Lebensweise dieser Vogelgruppe. Abessinische Bandfinken und südafrikanische Rotkopfamadinen hausen in verlassenen Webernestern, besonders letztere Art sucht sie mit Vorliebe auf und hat bereits in ihnen gebrütet, doch wurden die Jungen von Webern hinausgeworfen. Mir ist die Zucht der Rotkopfamadinen bisher nicht gelungen, da diese Vögel durchaus nicht selbst bauen wollen und die wenigen Eier auf den Boden des Käfigs oder des Nistkastens legen und sie nur kurze Zeit bebrüten. Beim Zusammenhalten mit anderen kleineren Webefinken erweisen sie sich stets als Störenfriede, indem sie die Nester derselben aufsuchten und ihre Eier hineinlegten, um sie nach einigen Tagen wieder zu verlassen. Im Eierlegen leistete ein Paar dieser Amadinen in meinem Flugraum mehr als manches Legehuhn. Ich fand einmal zu gleicher Zeit drei aus zwei und drei Eiern bestehende Gelege.

Beim Besuch des Vogelhauses wundere ich mich stets über das friedfertige Zusammenleben in der Starenvoliere. Diese zänkischen und in der Größe so verschiedenen Arten haben sich nach einigen Mißerfolgen doch gut aneinandergewöhnt. Neben den verschiedenen Trupialarten hausen Beos, Glanzstare, Rosenstare, Soldatenstare, Goldkopfstare, Pagoden- und Mainastare und Perlbartvögel. Die braunen Mainastare schritten auch erfolgreich zur Brut, doch ging das erwachsene Junge kurz nach dem Verlassen des Nestes ein. Die Mainastare wurden bereits 1893 im Zoologischen Garten in Berlin das erstemal gezüchtet. Das aus drei Eiern bestehende Gelege wurde von beiden Eltern abwechselnd bebrütet und die Jungen aufgezogen. Dieses Paar machte im Frühjahr und Sommer zwei Bruten. In dieser Voliere hat sich das Auslegen eines Teiles derselben mit Rasenplatten voll bewährt, da ein Teil der Stare darin gern herumstochert und die Schnäbel abwetzt, wodurch ein Überwuchern derselben verhindert wird.

Besonders anziehend finde ich immer die verschiedenen Arten der Bartvögel, die leider so selten Pfleger finden. Über die Lebensweise dieser merkwürdigen Vogelgruppe in der Gefangenschaft ist wenig bekannt. Ihre Ernährung ist umständlich und vielleicht auch kostspieliger als mancher anderer Arten. Neben einem Gemisch für Insektenfresser erhalten sie Früchte und rohes Fleisch. Die Stimme der Bartvögel ist auch nicht so abschreckend, wie man es oft hört. Ein Kaffernbartvogel im Vogelhause läßt häufig seine melodischen, lauten aufeinander folgenden Rufe hören, indem er dabei die Kopf- und Kehlfedern ein wenig sträubt.

An seltenen Singvögeln wurde im Vogelhause seit $1\frac{1}{2}$ Jahren der Weißbindendrosselschmätzer, der ähnlich wie Schamadrossel u. a. gefüttert wird, gehalten, ferner die Somali-Lärmdrossel, die viel Mehlwürmer und lebende Insekten verzehrt, aber neben dem Futtergemisch auch Ebereschenbeeren erhält. Rotflügelglanzstare und Königsglanzstare erhalten als Beigaben Würmer und kleingeschnittene Bananenstückchen, die sie mit Vorliebe verzehren.

Der aus dem Fockelmannschen Transport stammende Baumhopf bewohnte einen größeren Glaskäfig im Vogelhause $\frac{3}{4}$ Jahr. Die Baumhopfe leben ähnlich wie unsere Baumläufer und klettern gern auf Baumstämmen und auf breiten Ästen umher. Dementsprechend war auch die Einrichtung seines Behälters. In seinem Transportkäfig, der aus einer an der Vorderseite mit Draht bespannten Kiste bestand, war in einer der oberen Ecken des Käfigs ein kleiner mit einem Schlupfloch versehener Kasten angebracht, in dem er sich gern aufhielt und den er in der ersten Zeit bei Annäherung stets aufsuchte. Zur Ernährung des Baumhopfes dienten Mehlwürmer, gehacktes gekochtes Ei und langgeschnittene, schmale Fleischstückchen, außerdem erhielt er ein aus vielen Ameisenpuppen bestehendes Mischfutter. Obst und Beeren verschmähte er.

Die abessinischen Blauraken und die Strichelblauraken verzehren mit Vorliebe Fleischstücke und Insekten und stimmen in der Ernährung und Lebensweise mit der heimischen Art überein.

Einen andern Teil des Vogelhauses bewohnen neben den einzeln gehaltenen vielen Papageienarten unter denen die verschiedenen Loriarten, der Weißbauchpapagei, der Grünzügelpapagei und die verschiedensten Sittichartenauffallen, Vertreter interessanter Vogelgruppen.

Verschiedene Ariel- und Riesentukane leben in Flugräumen, Halsbandarassari und der kleine zahme Grünarassari in einzelnen Käfigen. Die Ernährung al dieser Arten, die ja in der Freiheit viele Früchte und Beeren verzehren, ist dementsprechend. Sie erhalten ein Gemisch aus Reis und Früchten, wie in Stücke geschnittene Bananen und Datteln, die si besonders gern verzehren. Grün- und Halsband

arassari verschmähen auch nicht frische grüne Salatblätter. Die Ernährung der schönen Donaldsons Turakos ist der der Tukane ähnlich. Sie erhalten gekochten Reis mit Bananen vermischt und ziehen als Beigabe Rosinen allem anderen vor. Die Tukane werden in der Gefangenschaft schnell sehr zahm oder sind es bereits, wenn sie nach Europa kommen, da es sich meist um aufgepäppelte Vögel handelt.

Die aus Abessinien stammenden Tokos, kleine etwa elstergroße Angehörige der Familie der Nashornvögel (s. Abb. S. 457) haben auch die Neigung, sich dem Pfleger schnell anzuschließen und ihn durch ihre Zahmheit zu fesseln. Die Familie der Tokos ist in drei Arten vertreten, die nordostafrikanischen Gelb- und Rotschnabeltokos und den nordwestafrikanischen Bindentoko, der erst neuerdings in den Zoologischen Garten gelangt ist. Diese interessanten Vögel schließen sich leicht dem Menschen an und werden, ähnlich wie Papageien, zahm. Ihre Pflege und Haltung ist Vogelpflegern, die über größere Räumlichkeiten verfügen, sehr zu empfehlen. Die Möglichkeit einer erfolgreichen Züchtung ist nicht ausgeschlossen. Ich habe wiederholt Tokos balzen sehen. Nach Angaben des Herrn Dähne wird der Rotschnabeltoko zahmer als der gelbschnäblige. Gekochter Reis mit Gebäck, Ameisenpuppen u. a. vermischt, dazu rohes Fleisch, das sie besonders gern verzehren, sind ihre Nahrung. Gern wird von ihnen eingeweichtes Weißbrot gefressen, weniger gern Früchte und Beeren.

Besonders erwähnenswert ist die mit verschiedenen Strandvögeln besetzte Voliere. In ihr sehen wir verschiedene wohlbekannte Gestalten, wie den Sanderling, Alpenstrandläufer, Flußuferläufer, Wachtelkönig und eine Zwergrohrdommel. Der langbeinige Stelzenreiter und die schöne, zierliche Sonnenralle vertreten den amerikanischen Kontinent. In der benachbarten Voliere ist ein Paar Sonnenrallen untergebracht, das leider bisher jede Hoffnung auf einen Zuchtversuch zuschanden gemacht hat.

Am Anfang des September konnte ich einen Begattungsakt der Weißbauchpapageien, der ungefähr drei Minuten dauerte, beobachten. Das auf einer Stange seitlich liegende Weibchen wurde vom Männchen mit einem Bein umklammert, während das andere zum Festhalten auf der Stange diente. Nach vollendeter Begattung saßen beide friedlich nebeneinander, sich gegenseitig im Kopfgefieder krauend.

Orangerote Kanarien.

Von C. Balser, Fulda.

(Nachdruck verboten.)

Zu den Ausführungen des Herrn Dams, Königsberg, über die orangeroten Kanarien des Herrn Mattern, Lötzen, möchte ich noch einiges Ergänzende zufügen.

Der Stammvater dieser Vögel ist der in Venezuela heimische Kapuzen- oder Feuerzeisig, Spinus cucullatus (*Sw.*), ein reizender, kleiner Vogel, kaum halb so groß wie unser Kanarienvogel. Kopf, Kehle, Hals, Oberbrust und Schwanz schwarz. Breites Nackenband hellrot; Rücken, Schultern, Mantel bräunlichrot, jede Feder mit schwärzlicher Mitte; Schwingen, Flügeldecken schwarz mit breiter hellroter, vorn weißlicher Querbinde; Bürzel, Oberschwanzdecken, Brust, Unterseite dunkel feuerrot (s. Abb. S. 340).

Dieses niedliche Tierchen paart sich leicht mit Kanarien, wie wir aus den interessanten Aufsätzen des Herrn Schmelzer ersehen, auch mit verschiedenen Arten unserer einheimischen Vögel. Die Kanarienbastarde sind meist prächtige, helleuchtendrote Tiere, größer als der Vater und kleiner als die Kanarienmutter. Diese Bastarde paarte ich auch mit Kanarien weiter, doch haben dann diese weitergezüchteten Bastarde statt der hellroten Farbe ein prächtiges Orangerot. Von vierter Geschlechtsfolge ab gelang es mir sogar, diese Bastarde untereinander weiter

Königsglanzstar.
Aufnahme des Zoologischen Gartens zu Berlin.

zu züchten; dieselben werden allmählich immer mehr dem Kanarienvogel ähnlich, nur gesanglich bleiben sie, obgleich äußerst fleißige Sänger, hinter unserem Roller zurück. Die weitergezüchteten Kapuzenbastarde neigen in zweierlei Hinsicht mehr zu dem Kanarienvogel hin, sowohl in der Größe wie in der Farbe. Letztere ist bei den ersten Bastarden derart rot, daß die Jungen dem Vater in der Farbe fast völlig gleichen und sich nur durch die geringe Größe unterscheiden, während die weitergezüchteten Bastarde nicht rot, sondern orangefarben sind, doch bleibt diese Farbe dann bestehen; freilich zog ich bei den Bastarden aus den orangefarbenen auch einzelne Gelbschecken und einmal einen mausgrauen Vogel, den ich heute noch ausgestopft besitze.

Auf diese Bastarde, denn als reine Kanarien möchte ich sie nicht bezeichnen, erhielt ich Dezember 1920 in München den ersten Preis und die große Weltbundmedaille, Januar 1921 den ersten Preis und Medaille, November 1921 in Nürnberg und Dezember 1921 in München den ersten Preis

und große Weltbundmedaille, Dezember 1922 in München die bronzene Medaille. Trotz dieser Auszeichnungen erfuhr ich, daß die Herren Preisrichter die Vögel zwar auf ihre Schönheit hin prämiiert hätten, daß jedoch bezweifelt worden sei, daß es sich um weitergezüchtete Bastarde gehandelt hätte. Ich schrieb dann in der Allgemeinen Kanarienzeitung Mai 1922 über diese Bastardzucht und wies darauf hin, daß Anno 1916 sicher kein lebender Kapuzenzeisig mehr in Deutschland war und es sich bei meinen Tieren sicher um weitergezüchtete Bastarde handeln mußte. Trotzdem schrieb der bekannte Forscher der Vererbungslehre Herr Norduijn erst vor noch nicht allzulanger Zeit, daß er an solche Weiterzucht nicht

Braunstärling (s. S. 463 unter Kl. Mitteilungen).

glaube. An den Matternschen Vögeln habe ich nun den Beweis der Richtigkeit meiner Angaben. Auch ein seinerzeit von Herrn Dams bezogener Kapuzenzeisigbastard brachte bei mir in der Weiterzucht prächtige orangefarbige Vögel.

Leider ist der Feuerzeisig, der schon in der Vorkriegszeit alljährlich nur in wenigen Köpfen eingeführt wurde, seit 1914 nicht mehr importiert worden. Es ist mir nun gelungen, eine kleine Anzahl herüber zu bringen, die in einigen Tagen bei mir eintreffen werden; wie mir bereits mitgeteilt wurde, befinden sich die Tiere in bester Verfassung. Im kommenden Monat Oktober erwarte ich einen weiteren Transport der von so manchem Liebhaber so lange vermißten Venezolaner.

Lerchen als Käfigvögel und ihre Gesangsbewertung.

Von Erich Merz.

(Nachdruck verboten.)

Wer kennt sie nicht, unsere fröhlichen Lenzesboten! Wohl jedem von uns schlägt der Puls schneller, wenn die ganze Luft von Jubelchören singender Lerchen erfüllt ist. Über die einzelnen Arten dieser Gattung ist schon viel geschrieben worden, so daß ich mich nur mit einigen Fragen betreffs ihrer Käfigung uud ihres Gesanges befassen will. In den Käfigen der Liebhaber sind am häufigsten die Feld-, Heide- und zuweilen die Haubenlerchen zu finden. Als erste Grundbedingung für eine richtige Käfigung der Lerchen ist eine zweckmäßige Unterkunft des Vogels erforderlich. Man nehme hierzu die im Handel erhältlichen Lerchenkäfige mit hoher Schublade und versäume es nicht, diese reichlich mit Sand und Gartenerde zu füllen, worauf man noch ein Rasenstück und als Sitzgelegenheit einen Stein lege. Lerchen im Käfig zur Sitzgelegenheit ein Sprungholz zu geben, könnte man höchstens bei Heidelerchen vornehmen. Ich habe jedoch festgestellt, daß manche Heidelerche eine Sitzstange nicht benutzt. Was in dieser Beziehung am zweckmäßigsten ist, ergibt ein Versuch. Nach meinen Erfahrungen möchte ich denjenigen Liebhabern, die über reichlich Platz in ihrer Vogelstube verfügen, empfehlen, den Lerchen einen möglichst geräumigen Käfig zu geben. Die Vögel fühlen sich wohler und ihre Bewegungen kommen besser zur Geltung. Wie ja bekannt ist, haben alle Lerchen, besonders die Feldlerchen, anfangs in der Gefangenschaft ein recht scheues Wesen. Ein Übelstand, dem leicht dadurch abgeholfen werden kann, daß man die Käfige möglichst niedrig stellt und sich den Vögeln nicht ungestüm nähert. Auf diese Weise lernen sie bald ihren Pfleger kennen, und gerade bei den Heidelerchen werden mit dieser Methode schöne Erfolge erzielt. Da frische Luft die Vögel zum Gesange anfeuert, besonders unsere Lerchen, können sie, wenn die Nächte nicht mehr kalt sind, auf dem Balkon oder draußen vor dem Fenster untergebracht werden. Vorsicht ist natürlich

in dieser Hinsicht geboten, denn wenn der Vogel Zugluft ausgesetzt ist, hat man bald einen kranken Pflegling. Um unsere Lerchen zweckmäßig zu käfigen und um recht lange an ihrem schönen Gesang Freude zu haben, ist ein Futter erforderlich, das der Futteraufnahme in der Freiheit entspricht. Da im Frühjahr, wo man am besten Lerchen einsetzt, frische Ameisenpuppen fehlen, füttere man ein Mischfutter, bestehend aus reichlich trockenen Puppen, gekochtem oder rohem, kleingewiegtem Fleisch, kleingehacktem, hartgekochtem Ei, Eierbrot oder Zwieback. Die Anfeuchtung des Futters geschieht am besten mit Mohrrüben oder Weißwurm. Es ist meines Erachtens notwendig, dem Futter kleingeschnittenes Grünkraut beizufügen. Mehlwürmer sowie allerlei andere Insekten werden gern genommen. Da die Lerchen nicht ausschließliche Insektenfresser sind, ist neben dem angegebenen Weichfutter eine Körnermischung von Mohn, Hirse, Spitzsamen und Buchweizen zu verfüttern. Eine Ernährung in dieser Weise ist bei einer normalen Körperbeschaffenheit des Vogels ausreichend. Viele Lerchen sind bei ihrer Ankunft durch die Anstrengungen der langen Reise von ihrem Winterquartier zu uns so unterernährt, daß zu ihrer Erhaltung im Käfig ein nahrhaftes Futter notwendig ist. Zur Anfeuchtung des Futters ist bei mageren Vögeln Weißwurm anstatt Möhre zu empfehlen und abwechselnd von den nahrhaften Bestandteilen im Futter etwas mehr zu geben. Auf keinen Fall darf das Futter zu feucht sein, sonst sind Darmerkrankungen die Folgeerscheinung. Die Ausscheidungen müssen fest sein. Stehen erst frische Ameiseneier laufend zur Verfügung, so rate ich jedem Liebhaber, der auf seinen Geldbeutel keine Rücksicht zu nehmen braucht, Heide- und Feldlerchen neben Körnerfutter ausschließlich frische Ameisenpuppen zu verabreichen. Aus welchem Grunde ich dafür eintrete, will ich bei dieser Gelegenheit verraten. Die Verfütterung von frischen Puppen übt auf die Mauser aller Vögel einen günstigen Einfluß aus. Gerade der Federwechsel ist bei den Lerchen in der Gefangenschaft ein heikles Kapitel. Wie oft hört man Liebhaber klagen, meine Feld- oder Heidelerche hat nur zum Teil oder gar nicht gemausert und ist an den Folgeerscheinungen der steckengebliebenen oder teilweisen Mauser eingegangen. Es sind dann irgendwelche Fehler in der Käfigung oder in der Ernährung gemacht worden. Jede Lerche, die nicht glatt vermausert, ist immer über kurz oder lang ein Todeskandidat. Das Auge des Kenners erkennt solche Lerchen an dem struppigen Gefieder und daran, daß sie sich ruhig verhalten. Irgendeinen Eingriff, die Mauser künstlich herbeizuführen, möchte ich nicht empfehlen. Zur Überwinterung gebe man den Lerchen einen hellen Platz im ungeheizten, gutgelegenen, nicht aber sehr kalten Zimmer. Ich bin der festen Überzeugung, daß dieses den Lerchen zuträglicher ist und sie gut durchgebracht werden. Hat eine Lerche erst einmal die Mauser im Käfig gut überstanden, wird sie auch in ferneren Jahren standfest bleiben. Lehrgeld zahlt ja ein jeder Liebhaber, doch bedenke man, daß die Grundbedingung auch bei der Haltung von Lerchen die sein muß, den Vögeln in der Gefangenschaft ein Dasein zu schaffen, das ihrem Leben in der Natur entspricht. Daß die Lerchen sehr unter Ungeziefer zu leiden haben oder leicht kranke Füße bekommen, habe ich eigentlich nicht wahrgenommen. Verfährt man mit dem Bodenbelag in der von mir angegebenen Weise, daß die Lerchen im Sande baden können, und achtet auf Reinlichkeit, bleiben dem Liebhaber Verdruß und Ärger erspart.



Blaukappentangare (Calospiza).

Zum Schlusse meiner Betrachtungen einiges über den Gesang der Lerchen, der uns allen bekannt ist. Wie mancher Liebhaber den Gesang des Sprossers dem der Nachtigall vorzieht oder sagt, eine Sperber- oder Gartengrasmücke singt schöner als die beste Schwarzplatte, so verhält es sich ähnlich bei den Lerchen. Welcher Lerche gebührt gesanglich der Preis? Ich persönlich möchte sagen, der Heidelerche gebührt der Preis, wenn mir auch mancher Liebhaber erzählte, daß der Gesang auf die Dauer wehmütig stimmt. Gewiß mag hier ein Körnchen Wahrheit drin vorhanden sein, denn die Feldlerche singt feuriger, sie jubiliert. Will man einen Vergleich in der Musik anstellen, so könnte man sagen, der Gesang der Feldlerche gleicht jubilierenden Tönen auf der Geige, während die Heidelerche ihr Lied vorträgt, als wenn auf dem Cello eine getragene Melodie erklingt. Der Gesang der Feldlerche gleicht einem lustigen Trillern, einem überfrohen Jauchzen.

Alle Läufer und Triller hell und rein. Es gibt bei ihr keine Unterbrechung, keinen Aufbau in der Strophe, und in einem Atem geht es fort. Der Gesang unserer Heidelerche: bald flötet sie wie eine Amsel, dann schluchzt sie wie die Nachtigall und trillert wie ihre Artgenossin, die Feldlerche. Die Haubenlerche singt bescheidener, aber doch angenehm flötend und fröhlich. Die Pausen machen das Lied eindrucksvoll. Und doch ist jede Lerche auf ihre Weise eine Sängerin des Himmels und verschafft uns Liebhabern daheim durch ihren Gesang so manche frohe Stunde.

Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten.

Von J. Kuntzendorff, Berlin.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Ich ersehe es als meine Pflicht, dieses harte Urteil des in jeder Beziehung glaubwürdigen Vogelpflegers dahingehend zu mildern, an Hand meiner langjährigen Beobachtungen, daß das Urteil Eichlams nicht immer zutreffen kann und daß vielmehr bei den Tangarenarten, wahrscheinlich mehr noch als bei anderen Vögeln, das Individuum zu berücksichtigen ist, daß es bei allen als bösartig hingestellten Arten wiederum, vielleicht in nicht kleiner Anzahl Exemplare gibt, die gleich den meinen sich als durchaus verträglich erweisen werden. Zudem muß man die Art der Unterbringung und der Umgebung, ich meine die Ausstattung des Flugraumes, berücksichtigen. Auch Eichlam gibt solches später zu, indem er sagt: „Freilich gibt es auch hier verschiedene Temperamente", so daß auch er, in gewisser Beziehung schon sein eben gefälltes Urteil wenigstens ein ganz klein wenig mildert. Es gilt demnach als feststehend, daß es bei allen als bösartig angeführten Arten Exemplare gibt, die unbedingt friedfertig sind, und es muß jeder Liebhaber, der Tangaren im Flugraum halten will, sich der Mühe unterziehen, seine Vögel in bezug auf die Verträglichkeit selbst zu prüfen. Wegen der entgegengesetzten abgeschlossenen Urteile läßt sich anders nicht handeln.

Wenn nun Eichlam über das Freileben schreibt („Ges. Welt" 1901 S. 4): „Im Freileben machen die meisten Arten einen überaus ruhigen, friedlichen Eindruck, sitzen stundenlang auf einer Strauchspitze .....", so bestätigt er hiermit einerseits meine die Verträglichkeit betreffenden Beobachtungen, während andererseits wieder meine das lebhafte Wesen betreffende hier mit dem von Eichlam Gesagten direkt im Gegensatz stehen, wiederum auch hier individuelle Veranlagung. Denn wenn Vögel in großen Flugräumen sich als beweglich und lebhaft erweisen, werden sie es meinem Dafürhalten nach im Freileben bestimmt und erst recht sein. Es sind durchweg farbenprächtige Vögel, denen die Natur ein Federkleid beschert hat, das zu den schönsten und farbenprächtigsten gehört. Die Angabe, ihre Farben würden in der Gefangenschaft an Schönheit und Glanz verlieren, habe ich in keinem Falle, auch bei der Purpurtangare nicht, bestätigt gefunden, im Gegenteil, nach jedem Federwechsel erhielten sie ihr schönes Federkleid in alter Pracht wieder. Die Tangaren gehören, da bei ihnen der Gesang in keiner Weise



Kubatangare
(Spindalis).

in Betracht kommt, was die Käfigung anbetrifft, zu den Vögeln, die nur ihres interessanten Wesens und ihrer Schönheit halber gehalten werden. Ersteres tritt allerdings hauptsächlich nur in Flugräumen zutage, in Käfigen sind sie ruhiger und stiller, es fehlt ihnen da die Möglichkeit, ihre Urnatur zu betätigen und ihrem Freileben gemäß alle Möglichkeiten ihres das Interesse des Menschen weckenden Wesens zu entfalten.

Meistens bilden ausgedehnte Waldungen ihren Aufenthaltsort, wo sie teils niedere Sträucher, teils Bäume bevorzugen. Zur Zeit der Fruchtreife der verschiedenen Obstbäume fallen sie in die Pflanzungen und Obstanlagen ein und verursachen dann nicht unerheblichen Schaden. Während der Nistzeit bekämpfen sich die ♂♂ heftig und verteidigen mit großem Mut und großer Ausdauer ihr auserwähltes Brutgebiet. Die Tangaren bauen ihre Nester äußerst nachlässig, jedoch derart, daß sie durch den auserwählten, geschützten Platz der Witterung wenig ausgesetzt sind und daher Wind und Wetter widerstehen. In einem gewissen Zusammengehörigkeitsgefühl errichten sie ihre Nistgelegenheiten nicht allzu entfernt voneinander, es soll sogar nach Eichlam vorkommen, daß auf ein und demselben Baum zwei

Paare ihre Wohnung aufgeschlagen haben. Jährlich finden gewöhnlich zwei hintereinander folgende Bruten statt. Sie bauen das Nest teils niedrig bis manns-hoch im Gebüsch, teils in mittelhohen Bäumen; es ist muldenförmig, offen und wird aus Fasern, Würzel-chen und Stengeln hergestellt und mit Gräsern, Halmen und Moos ausgepolstert. Das Gelege besteht aus 3—5 Eiern. Während im nördlichen Amerika nur eine Brut stattfindet, sollen im südlichen zwei und sogar noch mehr Bruten vorkommen. Eichlam be-richtet, daß es „ungemein schwer ist, von dem tiefsten Familienleben des Naturvogels Einblick zu nehmen. Die Zurückgezogenheit des farbenprächtigen Vogels, der kaum für einen anderen Interesse bekundet, der nur sich und der Familie zu leben scheint, gab dann auch zu mancherlei Sagen Veranlassung".

Die in folgendem erwähnten Tangaren gehören zu den Feintangaren — Tanagrella *Sw.*, Schiller-tangaren — Calospiza *Gray* und Antillen-tangaren — Spindalis *Jard. & Selbg.* Diese kleinen, etwa die Größe eines Stieglitzes aufweisenden Tan-garen sind mit einem Gefieder ausgestattet, das in seiner Pracht und schillernden Beschaffenheit der Farben zu den schönsten zu zählen ist, welches die Natur den gefiederten Lebewesen geschenkt hat. Die leuchtenden Federn haben meist einen seidenartigen Glanz und scheinen vielfach, je nach dem auffallenden Lichte, diese oder jene Farbe zu besitzen. Sie sind in der Hauptsache Fruchtfresser, doch nehmen sie auch in geringen Mengen Insekten zu sich, letzteres ist wahrscheinlich besonders während der Brutperiode der Fall. Die Angaben verschiedener Reisender, sie würden ausschließlich sich von Sämereien ernähren, oder sie seien ausschließlich Fruchtfresser, beruht auf einem Irrtum. Sie leben im Walde in kleinen Flügen und bevorzugen hier Gebüsche oder sie halten sich in Obstpflanzungen oder -gärten auf. Zur Frucht-reife kann man sie dort leicht fangen. Ihre seltene Einführung liegt also nicht am beschwerlichen Fang, die Ursache ist vielmehr darin zu suchen, daß sie vielfach den Anstrengungen der Reise erliegen und die Fütterung während derselben eine sehr beschwer-liche ist. Gelangen diese Vögel gesund in die Hände erfahrener Liebhaber, so zeigen sie sich, an ein gutes und richtig zusammengesetztes Mischfutter ge-wöhnt, keineswegs so hinfällig und weichlich, als welche sie im allgemeinen verpönt sind. In Käfigen sind es ruhige Vögel, die mit der Zeit aber wegen ihrer Ruhe auf die Nerven fallen könnten, wenn ihre Farbenpracht ihnen nicht immer wieder Interesse ab-gewinnnen würde. Im Flugraum hingegen gehören sie unbedingt zu den lebhaften und beweglichen Vögeln, deren Wesen hier so richtig zur Geltung kommt. Ihre Verträglichkeit mit anderen Vögeln stempelt sie zu angenehmen Insassen eines großen Flugraums. Die Ernährung verursacht naturgemäß etwas Mühe: Die Hauptnahrung bilden süße, saftige und reife Früchte, da sie jedoch schon in der Freiheit Insekten zu sich nehmen, so lassen sie sich in der Regel mehr oder weniger schwer an ein gutes Misch-futter gewöhnen. (Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Kennt der Kuckuck sein Ei? Auf einem Wiesenwege, der eines Verbotes halber kaum betreten wird, wurde ein unversehrtes Kuckucksei gefunden. Da weder Fußspuren noch sonst ein Merkmal vorhanden waren, auch niemand ein Interesse daran hat, ein Ei, ausgerechnet ein Kuckucksei, aus einem Neste zu nehmen und es hierher zu legen, so konnte das Ei nur durch den Vogel selbst dahin gelangt sein, und doch war es bebrütet. Offenbar kennt der Kuckuck sein Ei; er hat es aus dem ihm durch das Abernten der Wiese als gefährdet erscheinenden Neste im Wiesenstrauche wieder entfernt, um es in einem anderen, ihm bekannten Neste unterzubringen. Da er dieses aber als gestört vor-fand, so schob der Kuckuck sein Ei nicht hinein, lieber spie er es auf den Erdboden, der Bequemlichkeit halber auf eine ebene Stelle im Wege nieder, um sich nicht mehr darum zu kümmern. Mit seiner Legetätigkeit war das Kuckucksweibchen zu Ende, und so hatte es Muße, um diese Kontrolle auszuüben. O. Salzmann, Oschatz.

Buchfink × Kanarien. Die Züchtung von Mischlingen zwischen Buchfinkenmännchen und Kanarienweibchen ist Herrn Karl Disselhoff in Afferde (Westfalen) gelungen. Der Züchter teilt der Schriftleitung darüber folgendes mit: „Ich habe in diesem Sommer zwei Männchen Buchfink × Kanarienvogel ge-zogen. Der Buchfink war ein aufgepäppelter Vogel vom vorigen Jahr, das Weibchen ein gescheckter Kanarienvogel, gleich-falls vom Jahre 1924. Der Käfig hatte die Größe von 40 × 25 ⊥ 30 cm. Bis das Gelege, 4 Eier, vollzählig war, blieb der Buchfink in dem Zuchtkäfig. Das Weibchen be-brütete das Gelege allein. Zwei völlig entwickelte Junge waren in den Eiern abgestorben, zwei sind geschlüpft und entwickeln sich gut. Die beiden jungen Bastarde studieren eifrig (30. August), als Vorsänger dient ein Kanarienhahn. Der eine hat mehr Buchfinkenzeichnung und -färbung, der andere ähnelt mehr einem Kanarienvogel. Als Aufzucht-futter reichte ich nur Eierbrod und hartgekochtes Ei, nicht ein Insektenfresserfutter, wie W. Barth in seinem Buch „Bastard-kanarienvogelzucht". Dort wird diese Bastardzüchtung unter der Rubrik „äußerst schwierige" verzeichnet. Der schöne Züchtungserfolg des Herrn D. ist besonders bemerkenswert, weil es bisher noch nicht gelungen ist, flügge Buchfink × Ka-narien zu erzielen, während Gelege und auch Nestjunge schon verschiedentlich vorhanden waren. Die Angabe eines Buches, hintereinander 6 Bruten von einem Buchfinkenhahn mit Kanarienweibchen erzielt zu haben, empfiehlt Barth mit größter Vorsicht aufzunehmen.

Der in neuerer Zeit zahlreich auf den Vogelmarkt ge-brachte **Braunstärling** — Molothrus badius *(Vieill.)* (s. Abb. S. 460), ist ein munterer unterhaltender Stubenvogel. Im Gesellschaftskäfig oder in der Vogelstube zeigt er sich häufig harmlos, zuweilen aber ist er streitlustig, besonders kleinen und gleichgroßen Vögeln gegenüber, die er gern neckt und denen er auch gefährlich werden kann. Als Futter erhält er Spitzsamen, Hirse, Reis in Hülsen, Grassämereien, mit dem er völlig auskommt. Besser ist es aber, ihm daneben auch etwas Drosselfutter, Insekten (Mehlwürmer) und etwas Obst zu reichen. Er ist nicht wie andere Kuhstare lediglich Nest-schmarotzer. Anscheinend legen mehrere Weibchen dieser Art ihre Eier in die Nester anderer Vögel, besonders in das eines Bündelnisters (Anumbius), um sie selbst zu er-brüten, nachdem sie den Erbauer des Nestes vertrieben haben, zuweilen bauen aber auch einzelne Paare in eine Astgabel ein sorgfältiges Nest zur Aufnahme des Geleges. Das Gefieder des braunen Kuhstärlings ist braungrau, unterseits etwas heller, Zügel schwärzlich; Flügel rotbraun, Spitze der Handschwingen, innere Armschwingen, Schwanz schwärzlich. Lg 180—190 mm. Die Heimat ist Argen-tinien, Bolivia, Paraguay. Er lebt ähnlich wie unser Star, ist ebenso zutraulich. Der Gesang besteht aus langen, klaren, sanften und angenehmen Tönen, die vielfach modu-liert, sehr bedächtig vorgetragen werden. Ein Gesangs-künstler ist er nicht.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

C. Balser, Fulda: Feuerrote Kapuzenzeisige.

Max Kleinert, Tierhandlung, Berlin NO 18, Strausberge Straße 13: Diadem-, Gelbstirn-, Brillen-Amazonen

Braunohr-, Tovi-, Feuerflügel-Sittiche, fingerzahm, Tarant. rotköpfige Bergpapageien, Königsglanzstare, Tyran. schwefelgelb, Weißkehldrosseln, Rotbauchdrosseln, Köhleramseln, Blauraben, Rotrücken-Kassiken, Kronen-Tangaren, Meerblaue Tangaren, Purpur-Tangaren, Morgenammerfinken, Jakarinifinken, Habiafinken, Orangepfäffchen, Sperlingstäubchen.

Kunze, Freiberg i. Sa., Pfarrgasse 32: Rotstirnige Bergpapageien, kaliforn. Schopfwachtel, Hahn, mexikan. Karmingimpel, afrik. Zebratäubchen.

Richard Schwarzkopf, Ingelfingen (Württbg.), A. Z.-Mitglied Nr. 216: Farbenwellensittiche, olive, dunkle, orangegelbe, jade, sämtliche Wellensittiche führen blaues Blut.

Thies, Oldenburg i. O., Bismarckstraße 3: Kaliforn. Schopfwachtel (Zuchtweibchen).

Paul Tzornack, Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189: Tarant. Unzertrennliche, Feuerflügel-, Tovi-Sittiche, afrik. Langschwanzstare, afrik. Turteltäubchen, Senegaltäubchen, Kaptäubchen, afrik. Goldsperlinge, ausgef.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Max Dähnick in Berlin NO 18, Gr. Frankfurter Str. 90, Ecke Markusstr. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

I. Tauschvermittlung. Unsere sehr verehrten Mitglieder machen wir darauf aufmerksam, daß in der Tauschvermittlung Änderungen vorgenommen worden sind. Wichtig ist zunächst, daß alle Tauschgesuche und Angebote an Herrn Max Dähnick in Berlin NO 18, Gr. Frankfurter Straße 90, Ecke Markusstraße, zur Erledigung zu senden sind, und nicht wie bisher an Herrn Richard Vorwerk. Weiter ist zumindest der Hinweis notwendig, daß der Tauschende seine Mitgliedschaft zum Reichsverbande ausweist durch Angabe der auf seiner Mitgliedskarte vermerkten Nummer. Wird dieses Erfordernis nicht erfüllt, kann dem Ersuchen auch nicht entsprochen werden. Die weiteren Bedingungen über die Tauschvermittlung finden unsere Mitglieder in der Nummer 25 der „Gef. Welt" vom Jahre 1924. Den neu hinzugetretenen Mitgliedern seien aber folgende Wichtigkeiten aus unserer Veröffentlichung in genannter Nummer zur Kenntnis gebracht: Tauschgesuche können nur vermittelt werden, wenn auf denselben — soweit ein Tausch von in Sachsen geschützten Vögeln in Frage kommt — das Tausch- und Eintauschobjekt genannt sind. Ein Preis bzw. ein ziffernmäßig ausgedrückter Wert des Vogels darf nicht angegeben werden. Tauschgesuche von geblendeten Vögeln können nicht vermittelt werden. Um die Arbeit der T.-V. zu erleichtern, wird gebeten, die Tauschgesuche nach folgendem Schema in Postkartengröße auszufüllen: Biete zum Tausche an: Schwarzplättchen gegen Rotkehlchen oder Feldlerche. Falls Vermittlung nicht möglich ist, Rückantwort nach . . . . Tagen erbeten. . . . . Name. . . . . Nr. der Reichsverbandsmitgliedskarte. Es wird gebeten, für jede einzutauschende Vogelart eine besondere Karte einzusenden. Eine Rückantwort resp. Vermittlung kann ausnahmslos nur erfolgen, wenn eine frankierte Postkarte mit der genauen Adresse des Absenders beigelegt wird. Wie oben angegeben, bitten wir um Angabe, nach welcher Zeit die Rückantwort an den Absender zurückgesandt werden soll, falls ein entsprechendes Gegenangebot nicht vorliegt. Im Interesse aller sich am Austausch beteiligenden Mitglieder wird dringend gebeten, die T.-V. nach Erledigung eines Tauschgesuches sofort zu benachrichtigen. II. Kaufvermittlung. In der Zeit vom 2. Oktober bis 28. Februar ist der An- und Verkauf wie das Feilbieten von in Europa einheimischen Vögeln mit Ausnahme der Meisen, Kleiber, Baumläufer und Spechte zulässig, soweit Preußen in Frage kommt. In den übrigen deutschen Ländern ist er verboten. Durch das freundliche Entgegenkommen des Preuß. Landesverbandes ist unseren Mitgliedern Gelegenheit geboten, sich ihren Bedarf an Pfleglingen in Preußen zu decken. Die Vermittlung hat liebenswürdigerweise auch Herr Max Dähnick in Berlin NO 18, Gr. Frankfurter Straße 90, Ecke Markusstr., übernommen. Die Kaufgesuche sind wie die Tauschgesuche in der Form an Herrn Dähnick zu richten, wie unter I angeführt. Die mit der Erledigung der Tausch- und Kaufgesuche betrauten Herren bieten unseren angeschlossenen Mitgliedern die beste Gewähr für peinliche Erledigung der Ersuchen. Wir wollen nicht unterlassen hierauf besonders hinzuweisen und die Einrichtung zur regen Benutzung unseren Mitgliedern zu empfehlen.

Petters



Herrn P. Z., Klostermansfeld. In den in der Zeitschrift meist von erfahrenen Vogelwirten verfaßten, veröffentlichten Arbeiten sind so viele Hinweise gegeben, daß bei aufmerksamem Lesen dieser Arbeiten gerade der Neuling recht viel lernen kann. Die Schriftleitung ist aber jederzeit bereit, jede Anfrage zu beantworten. — Die Zahl vor dem Komma gibt an, um wieviel Männchen, die hinter dem Komma, um wieviel Weibchen es sich handelt, also: 0,1 = 1 Weibchen, 1,0 = 1 Männchen, 1,2 = 1 Männchen, 2 Weibchen. Als Aufzuchtfutter für Grauedelsänger und Zebrafinken werden die Sämereien, welche sonst verfüttert, auch in gequollenem oder gekeimtem Zustand geboten, daneben, solange erhältlich, frische Ameisenpuppen, andernfalls ein Gemisch von gleichen Teilen getrockneten, gequollenen Ameisenpuppen, gemahlenem Vogelbiskuit und hartgekochtem Hühnerei. Da gequollener Samen und das Futtergemisch leicht verdirbt, reicht man immer nur kleinere Mengen, also etwa soviel, wie an einem halben Tag verzehrt wird. Halbreife Samen, besonders von Gräsern und von Vogelmiere, werden gleichfalls gern zur Aufzucht verwendet.

Herrn F. H., Aplerbeck. Der Fehler, welcher bei den Aufzuchtversuchen gemacht wurde, besteht wohl darin, daß den jungen Vögeln, als sie begannen selbst Nahrung aufzunehmen, trockene Sämereien gereicht wurden. In der Natur sind zur Zeit der Bruten reife Samen nicht vorhanden, sondern nur halbreife oder keimende Samen. Die Natur ist aber die beste Lehrmeisterin. Den jungen Vögeln werden gequollene oder soeben keimende Samen geboten. Der Erfolg wird dann ein besserer sein. Siehe auch die Arbeiten „Meine Körnerfresser" (S. 408 ff.) und „Die Darre der Körnerfresser" S. 435.

Herrn K. L., Oldesloe; Herrn K. A. Sch., Züssow; Herrn B. H., Berlin N 54. Ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn A. V., Jena; Herrn G. J., Erfurt. Besten Dank für freundliche Bemühung.

Herrn R. R., Meuselbach. Die bisherigen Bestimmungen des Vogelschutzgesetzes sind im Freistaat Thüringen nicht geändert.

Herrn M., Berlin. Bezüglich des Braunstärlings s. Abb. S. 460 und unter Kl. Mitteilungen.

Herrn Dr. W., Schömberg; Herrn A. A., Stockholm. Beiträge dankend erhalten.

Herrn P. P., Augustenborg. 1. Kaptäubchen sind mehrfach gezüchtet. Sie schreiten leicht zur Brut, die aber, weil diese Täubchen ein sehr leichtes Nest im Gezweig bauen, leicht verunglückt. Während der Brut sind sie gegen Störungen empfindlich. 2. Neben dem üblichen Futter erhalten sie zur Aufzucht der Jungen kleine Mehlwürmer, kleine Regenwürmer, frische oder gequollene trockene Ameisenpuppen, ein Gemisch von diesen und gleichen Teilen Zwieback und geriebener Möhre, kleingeschnittene Vogelmiere, Salat, Spinat und auch gequollene und gekeimte Sämereien.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

brgang 54 24. September 1925 Heft 39

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Ornithologische Skizzen aus Südtirol. Von W. Baemeister, Heilbronn.

Meine Erfahrungen mit Zusammenhalten verschiedener Vogelarten in der Voliere. Von A. Krabbe.

Meine Körnerfresser. (Forts.)

Aus dem Vogelhause des Berliner Zoologischen Gartens. Von Rudolf Neunzig.

Orangerote Kanarien. Von C. Balser, Fulda.

Lerchen als Käfigvögel und ihre Gesangsbewertung. Von Erich Merz.

Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten. Von J. Kuntzendorff, Berlin. (Forts.)

Kleine Mitteilungen – Vom Vogelmarkt – Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig – Redaktionsbriefkasten – Ausstellung – Aus den Verbänden – Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellung.

Der Verein der Vogelliebhaber von Dortmund und Umgegend veranstaltet am 3., 4. und 5. Oktober 1925 im Vereinslokal Restaurant „Zum Löwentor", Königswall, Dortmund (3 Minuten vom Hauptbahnhof) seine Herbstausstellung. Ausgestellt werden einheimische und fremdländische Zier- und Singvögel. Der Verein bietet seinen Besuchern eine interessante und reichhaltige Schau. Die Ausstellung ist geöffnet von morgens 9 Uhr bis abends 10 Uhr. Ein Besuch ist sehr zu empfehlen. Der Vorstand.

Aus den Verbänden.

Vereinigung d. Vogelliebhaber, Landesverband Preußen. 1. Vors. Karl Gumprich, Berlin W 50, Nürnberger Str. 44 III; Geschäftsstelle: 1. Schriftf. P. Böhme, Berlin O 17, Rüdersdorfer Str. 69; Kassierer: Erich Merz, Bln.-Friedenau, Wilh.-Hauff-Str. 14. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt". Schriftwechsel grundsätzlicher Art ist an den 1. Vors., im übrigen an die Geschäftsstelle (2. Vors.) zu richten. Geldsendungen: Postscheckkonto Berlin NW 7 Nr. 46155 für Erich Merz.
Nächste Sitzung: zweiter Montag im Oktober.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Sitz Leipzig. 1. Vors. Hermann Höhne, Leipzig-Volkmarsdorf, Eisenbahnstraße 84 IV. 1. Schriftf. Max Hunger, Leipzig-Gohlis, Polizeigebäude Zimmer 196. Kassierer Ludwig Böttcher, Leipzig, Inselstr. 17 II. Girokasse Leipzig, Nr. 6317. — Die Vereine wollen es sich in Zukunft angelegen sein lassen, den bescheidenen Wünschen des Landesverbandes mehr als bisher Rechnung zu tragen und seinen Mitteilungen eine intensivere Beachtung und schnellere Erledigung zu widmen. Trotzdem schon vor Wochen und Monaten um baldige Einsendung der Mitgliederlisten für das Geschäftsjahr 1925/26 ersucht wurde, fehlen noch heute weit über die Hälfte derselben. Die durch Mahnungen entstehenden, immerhin erheblichen Unkosten dürften wohl eine weit bessere Verwendung finden, als es durch nachlässige Behandlung solcher Selbstverständlichkeiten geschieht. Wir machen immer wieder auf das Giro-Konto des Landesverbandes, dessen Anschrift jedesmal im Kopfe desselben enthalten ist, aufmerksam. Sämtliche Einzahlungen sind auf dasselbe zu leisten. Die nächste Vorstandssitzung des Landesverbandes findet am 7. Oktober 1925, 8 Uhr abends, bei Herrn Roth, Leipzig-Gohlis, statt. Eventuelle Anfragen und Wünsche bitten wir bis dahin zu unserer Kenntnis zu bringen. J. A.: Hunger, Schriftf.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Aus den Vereinen.

Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10. Anmeldungen zur A. Z. bitte ich an den Präsidenten Herrn Horst Wagner in Bruchmühle bei Fredersdorf a. Ostbahn, Lindenstr. 32, zu richten. A. Krabbe.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögeln in Apterbeck. Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, in der Wirtschaft Sprave, früher Fritz Lecking, Kirchstraße. Der Vorstand. J. A.: F. Hartlieb.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen. — Am Sonnabend, dem 3. Oktober, begeht die Vereinigung die Feier ihres 30. Stiftungsfestes im Vereinslokal, großer Saal, Alexandrinenstr. 37a. Alle Freunde und Gönner des Vereins sind dazu herzlichst eingeladen. Eintrittskarten à 1,50 M. sind beim Unterzeichneten zu entnehmen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke, Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde und Geflügelzucht Breslau. Vogelliebhaber Breslaus, wollt ihr euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei nicht endlich auch zusammenschließen, wie es in anderen Städten schon längst geschehen ist? Ein Stamm von erfahrenen Vogelpflegern ist vorhanden, jedoch können Fortschritte nur erzielt werden, wenn alle noch abseits Stehenden sich uns anschließen und unsere mit belehrenden Vorträgen verbundenen Vereinsabende besuchen. Auskunft ert. bereitwilligst P. Spitzner, 1. Schriftf., Ofener Str. 26.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Dessau und Umgegend. Gegründet März 1925. Versammlung jeden 2. Mittwoch abends 8 Uhr. Vereinslokal: „Fürst Blücher," Ecke Antoinetten-Leopoldstr. Nächste Versammlung: 30. September. Demnächst ist eine Führung durch das Naturkundliche Museum zu Zerbst unter Leitung des bekannten Ornithologen, Herrn Krietsch, Dessau, geplant. 1. Vors. Herr Krietsch, 2. Vors. Herr Weichelt, Schriftf. Herr E. Dielitzsch, Kass. Herr Michel. Gäste zu den Versammlungen und sonstigen Veranstaltungen stets willkommen. Ein Zusammenschluß aller Liebhaber im Interesse unserer schönen, aber schwer bedrohten Liebhaberei ist auch in Dessau unerläßlich.
J. A.: Erich Dielitzsch, Schriftf., Dessau, Teichstr. 8.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Restaurant „Zum Löwentor", Königswall 75.
J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung Freitags, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Blasewitzer Hof". Liebhaber willk. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Eliesenhof", Eliesenstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Mittelthüringens Sitz Erfurt. Sitzung jeden 2. Mittwoch und jeden letzt. Sonnabend im Monat im Vereinsl. „Stadt Chemnitz", Thomasstr. 57. Näh. Auskunft erteilt Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 6. Oktober. A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Der Hannoversche Vogelschutzverein zu Hannover, gegr. 1881, wirkt mit sichtbarem und anerkanntem Erfolge für Vermehrung und Schutz der Vogelwelt bei Hannover durch Aufhängen von jährlich einigen hundert Nistkästen aller Art, durch Erweckung von Interesse und Liebe für die Vogelwelt mit monatlich, zur Gesangszeit wöchentlich stattfindenden Belehrungsspaziergängen und durch Vorträge und Austausch der Beobachtungen in den jeden dritten Dienstag des Monats stattfindenden Vereinsversammlungen. Seine Bestrebungen dienen also lediglich gemeinnützigen Zwecken. Mitgliederzahl rund 1200, jährlicher Beitrag nur 1 M. Meldungen an den Vorsitzenden Herrn Fritz Becker, Hannover, Boedekerstr. 1 F. Becker.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste willk. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Vereinsabend egelmäßig aller 14 Tage (Sonnabends um 8 Uhr) beim 1. Vors.,)errn Jahn, Feodorastr. 7. Jena besuchende Vogelfreunde reffen jeden Sonntag vormittag den Schriftführer, Feodora- raße 13 wohnhaft, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube herzlichst eingeladen. Adolf Voigt, Schriftf.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogel- iebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bier- uben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend ach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Orts- ruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber . V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumen- raße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. ritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Vollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden . und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der estauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im nteresse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an!

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung eden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Ver- inslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 1. Okt. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Mon- ag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versamm- ung beim Mitglied Herrn Normast im „Kaiser Friedrich", Breslauerstr. 50. Liebhaber willkommen. J. A.: Friedrich.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden . Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zu- ammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße.

ez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. An- schriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Sitzung aller 14 Tage im Restaurant „Zum Neckarstrand", Messeplatz 1. Liebhaber willkommen. Joh. Daubmann, Schriftf.

Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.) Sitz München. Jeden letzten Samstag im Monat Versammlung im Vereinslokal Pschorrbräuhaus, Bayerstr. Liebhaber willk. Jeden Samstag gesellige Zusammenkunft ebenda. — Nächste Monatsver- sammlung am 26. September im Vereinslokal Pschorrbräu- haus, Bayerstraße; Gegenstand der Tagesordnung: Aus- stellung. Vollzähliges Erscheinen unbedingt nötig.

Der Ausschuß. R. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste will- kommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Am 9. ds. Mts. entschlief nach schwerem Leiden unser langjähriges Mitglied, der Apotheker

Heinrich Stöcker

in Delligsen, im 38. Lebensjahre. Wiederum sind wir durch den Heimgang eines unserer Besten in tiefe Trauer versetzt worden. Allen Liebhabern, die mit dem Verstorbenen persönlich oder schriftlich in Be- ziehungen getreten sind, wird der seit langem leider nicht unvorhergesehene Verlust ein schmerzlicher sein. Seine von feiner Beobachtungsgabe und tiefem Ge- müt zeugenden Berichte in der „Gef. Welt" werden seinen Zeitgenossen stets in Erinnerung bleiben.

Der Vorstand der A. Z. J. A.: A Krabbe.

ergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per
ob. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

che 3 Käfige
1 m lang, möglichst Metall,
ine Voliere
zirka 2 m lang,
starke Metallkäfige
1.20 m lang, für Jakos.
Verkaufe:
ra Jca Palmos 9×12 cm,
Zeisar 4,5 Schlitzverschluß.
Lichtenstaedt,
lin-Friedenau,
Kaiserallee 137. [1239

gel-Mistelleim
r Fangen schädlicher Vögel,
bend bei jeder Witterung, garan- brauchsfähig, Dose 2.— M. fr. von :itag Nchf., Frankenberg i. S. 6. verkäufer hohen Rabatt. [1240

Mistelleim,
ubgrün, liefert in anerkannt vor- züglichster Güte [1241
Kirschner, Arnsdorf-Haida, Böhmen), Roseggerstr.
endungen geg. Einsend. v. Mk. 2.— iederverkäufer Vorzugspreise.

lwürmer Ia Pfd. 5.— M (ohne Spesen)
. 3.— M frk. Voreinsend.
er, Breslau, Weinstr. 12. [1242

Mehlwürmer
nsend. v. 2.— Rentenmark ¼ Pfd.
versend. D. Waschinski & Co.,
Biesenthal I (Mark). [1243

„ORNIS" Freie Bezugsvereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands.
Gegründet 1912 ∴ Fernsprecher 4198 [1244
Fachgemäße Belieferung mit Vogelfutter („Reform-Normal", individuelle Zusammensetzung bei restlosem Verbrauch; stets frisch gemischt). Hunderte von Liebhabern füttern seit über einem Jahrzehnt mit bestem Erfolg nur „Reform-Normal".
Reform-Normal-Käfige Mod. ORNIS 1925, neue Preisliste er- schienen. — Modern eingerichtete Käfig-Bauanstalt mit elektrischem Betrieb.
Anschrift: Ornis-Haus, Halle-Saale. Der Geschäftsführer: Martin Sperling.

Versäumen Sie nicht das Abonnement der „Gefiederten Welt" zu erneuern!

Züchterwaren:

Verbesserte „L. K.-N."	½ kg	Mk. 1,50
Rübsen Ia, 1924er	„ „	„ 0,50
Rübsen Ia, 1925er	„ „	„ 0,40
Glanz, Marokko	„ „	„ 0,50
Hanf, deutscher	„ „	„ 0,30
Hafer, gesch.	„ „	„ 0,30
Negersaat	„ „	„ 0,35
Leinsaat	„ „	„ 0,40
Silberhirse, weiß	„ „	„ 0,45
Marokko-Hirse	„ „	„ 0,30
Senegalhirse	„ „	„ 0,30
Sonnenrosenkerne	„ „	„ 0,35
Ia Mischfutter	„ „	„ 0,45
Blau-Mohn	„ „	„ 0,70
Ameiseneier, getrocknet	„ „	„ 4.—

Andere Sämereien auf Wunsch zu billigsten Tagespreisen.
1245] Preise freibleibend!
Lorenz, Dresden, Drehgasse 5.

Mehlwürmer
gegen Voreinsendung von 5.60 M
1 Pfund franko; bei Abnahme von 6 Pfd. 5 M p. Pfd. Porto u. Verp. frei.
Ia Ameiseneier
1925er, 4.50 M per Pfd.
Ia Weißwurm, 1925er 4.50 d. Pfd.
Ia Muska-Zecken . . 1.50 d. Pfd.
Ia Seidenraupen- puppen, gemahlen 0.75 d. Pfd.
Ia Garnelen, gemahl. 0.35 d. Pfd.
tf. Universalfutter
Aleckwa I für Nachtigallen M 2.—
„ II für Grasmücken M 2.—
„ III für Drosseln . . M 1.50
das Pfund ab hier, ausschl. Verp.; bei größeren Mengen billiger. [1246
Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
A. Eckrich II, Waldsee (Pfalz).

Mehlwürmer
veget. gefüttert, ¼ Pfd. 1.75 M., ½ Pfd. 3.25 M., 1 Pfd. 5.60 M.
Wiederverkäufer Rabatt.
Getrock. Ameisenpuppen
à Pfund 5.50 Mark.
Ia Muska (Zecke) à Pfd. 2.00 M.
Ia Weißwurm à Pfd. 4.50 M.
Franko geg. Voreinsend. des Betrages.
Th. Witte, Niederndodeleben bei Magdeburg. [1247

Inserate
für das am 1. Oktober 1925 zur Ausgabe gelangende Heft 40 der Gef. Welt erbitten bis 26. Sept.

Mehlwürmer

(Versand beginnt Anfang Oktober)

Ia Ameiseneier Pfund 5.00 M.
Ia Muska-Zecken Pfund 1.50 M.
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen Pfd. 0.75 M.

Die Preise sind freibleibend, ab Lager, ohne Porto und Verpackung. Bei Anfrage Rückporto beifügen. [1248

Bei größerer Abnahme hoher Rabatt.

Karl Claus, Mutterstadt II
(Hauptbahnhof).

Vogelfutter [1249

für **Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser.** Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.

Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Ein Versuch

überzeugt jeden von der Güte meines **Universalfutters.** Preis 2 M. p. Pfd. Sämtliche Futtersorten für Exoten, Wald- und Kanarienvögel zu billigsten Tagespreisen. Versand geg. Nachnahme. Verpackung und Porto werden billigst berechnet. [1250

P. H. Kirsten, Leipzig 3,
Zeitzer Str. 53. Fernruf 31445.

Verkaufe dauernd junge

Wellensittiche Ia

bestfiedert, kerngesund, i. Freiflug gezüchtet, grün u. gelb, à 5 M.

Saller, Planegg bei München,
1251] **Hofmarkstraße 8.**

Blaukopf-Häher (Mexiko) Stck. 15.—
Ig. Gelbhauben-Kakadu Stck. 25.—
Ig., zahmer spr. Gelbkopf Stck. 75.—
Amerikan. Spottdrossel Stck. 50.—
Mönch-Sittich, sprech. I., Stck. 10.—
Papstfinken, in Pracht Paar 20.—
dito (etwas defekt im Gefieder, sonst gesund) . . . Paar 15.—
Indigofinken . . . . Stck. 15.—
Gelbe u. grüne Wellensittiche, Prima Zuchtpaare . 15.— bis 18.—
Glanzstare . . . . . Paar 12.—
Rote Kardinäle, Ia Sänger Stck. 25.—
1 Paar **Sperlingstäubchen** 10.—
Japanische Mövchen, Zuchtpaar 15.—
Ab 1. Okt. **Tiroler Schwarzplatten,** Ia Sänger und andere Waldvögel.
Große Papageikäfige Stck. von 16.— M. an.
1252] **J. Bock, Hamburg 22,**
Hamburger Str. 3a.

Abgebe:

1,0 Wellensittich, grün, 1924er, 6.—; 1,0 dito grün, zahm, 1925, 12.—; junge, grüne, 1925er à 4.—; 1,0 tarant. Zwergpapagei 9.—; 1,1 Schnurrbärtchen 20.—; 2 Reisvögel à 2.—; 1,0 Rotkopfamadine 3.—; 1,1 Singsittiche 80.—, erfolgreiches Zuchtpaar; 1,0 Larvenweber in Pracht 10.—; 1,0 Rotkardinal 20.—; 1,0 Goldstirnblattvogel 50.—; 1,0 Klarino 60.—; die beiden letzteren unermüdliche Sänger. [1253

Suche:

1,0 Schama, Ia im Gesang, je 0,1 Tigerfink, Amarant, Silberschnabel.

Nehme auch Schlachtgeflügel in Tausch.

Versand ab hier bzw. franko gegen franko.

Alles eingewöhnte Tiere.

Eugen Müller,
Küllstedt im Eichsfeld.

Abzugeben:

1,0 Lazulifink 22 M.,
1,0 Alariofink 15 M.,
1,1 Orangeblaufink 35 M.

Offerten unter **„Berlin"** an die Expedition der Gefiederten Welt. [1254

Zoologische Handlung — Versandgeschäft

Otto Didakowsky

Berlin N 4, Invalidenstraße 35

am Stettiner Bahnhof

(vordem langjährig Potsdamer Straße)

Renommiertes Spezialgeschäft seit 1889

Fernsprecher: Norden 6085 — Postscheckkonto: Berlin NW. 7 Nr. 73499

Offeriere prima Vogelfuttersämereien

maschinell gereinigt (keine ungereinigte naturelle Ware)

Senegal-, Mohair-, Algier- und weiße Hirse 5 Pfund 2.50 M. Kolbenhirse Pfund 2.— M. Rübsaat, Spritzsaat, Hanfsaat, Leinsaat, Sonnenkerne, Erdnüsse 5 Pfund 2.50 M. Anerkannt erstklassige Spezialmischung n: Kanarien-Singfutter, Waldvogelfutter, Prachtfinkenfutter (erbitte Angabe ob für kleinere oder größere Exoten) je 5 Pfund 2.50 M. Papageifutter 5 Pfund 3.50 M. Universal-Weichfutter 5 Pfund 5.— M. Original „Lucullus"-Weichfutter, 5 Pakete ca. 1/2 Pfund 6.— M. Getrocknete Ameiseneier Pfund 5.— M. Mehlwürmer Pfund 5.50 M. Muska Pfund 2.— M. Trocken-Eigelb Pfund 3.— M. [1255

Exkl. Porto, Verpackung frei, Nachnahme oder Voreinsendung auf mein Postscheckkonto Berlin NW 7 Nr. 73499.

Illustrierter Katalog über Metall-Vogelkäfige und Utensilien zur Vogelpflege 2.— M. portofrei, Gutschrift des Betrages **bei Aufträgen** von 20.— M. an. Vorratsliste **über Vögel,** Affen usw. kostenlos.

Überzeugen Sie sich, bitte, durch persönlichen Besuch von der Leistungsfähigkeit und Größe meines Geschäfts.

In der Zeit vom

2. Oktober bis 28. Februar.

ist der An- und Verkauf wie das Feilbieten von **in Europa einheimischen Vögeln — mit Ausnahme der Meisen, Kleiber, Baumläufer und Spechte** — zulässig, es können daher in dieser Zeit derartige Inserate in der „Gefiederten Welt" zum Abdruck gelangen! Der Insertionspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum beträgt 0.20 Gm. Aufträge erbeten an

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg
Postschließfach 148

Nymphen-Sittiche

diesj. tadellose Vögel aus Gartenvoliere, gebe ab. Zwecks Blutswechsel tausche 1,0 1924er Zucht gegen gleichalt. oder 1925er Frühbrut. Anfragen Rückporto.

Kaufe:

1,1 Blaue Wellensittiche, voll befiedert, auch einzeln. [1256

E. Stümcke, Vegesack (Bremen).
A. Z.-Mitgl. 258.

Stieglitze,

Zeisige, Hänflinge, Girlitze usw.

Liste nur gegen Freimarke.

J. Beck, Stuttgart,
Tierimport. [1257

überzähliges Weibchen

Singsittich

gibt für 50 M. ab [1258

Jos. Porzelt, München, Klarastr. 3.

Himmelblaue Wellensittiche

Stck. 70 M., 3/4 blaublütige Stck. 20 M.

Suche Nymphensittiche.

Frau Klara Neugebauer,
Wellensittich-Züchterei,
Deutsch-Litta. [1259

Abzugeben:

Gesunder, guter Gelbspötter, Frühling 25, gegen einheim. Finken; tadelfreie jg. Zebraf. ♂ 3 M., ♀ 6 M., z. T. blutsfremd. [1260

F. Brock, Osnabrück, Schloßstr. 49.

---

30 junge grüne Wellensittiche,

starke, tadellose Vögel, à 5 Mark, abzugeben.
Wenn zusammen billiger.

H. F. Kircheisen, Chemnitz,
Katharinenstraße 3. [1261

Gebe ab:

1,0 **Kanarie,** prima Sänger,
2,1 **Zeisig-Kanarie,** [1262
1,1 **Hänfling-Kanarie,**
schöne, fleißige Sänger, nehme **Sonnenvogel u. andere Exoten in Tausch.**
Rudolf Schmitt, Weinsheim
bei Worms a. Rh., Postweg 17.

Gebe ab: Haussperling-Albino-Weibchen und Feldsperling-Männchen

mit 2 Jungen. Das Pärchen hat fünfmal mit Erfolg in der Voliere gehegt. [1263

K. Rinke, Stargard i. Pom.

Gebe ab: 1,1 gr. Reisfink, je 1,0 Schmetterlingsfink und Kleinelsterchen.

Tausche auch. [1264

Becker, Nassau (Lahn), Steinstr. 2.

Vert. aus Gartenvoliere

1,1 Rothänfling, 1,1 Goldammer, 1,1 Grünfink, 1,0 Schwarzplättchen, 1,0 Gartenrotschwanz, 1,0 Wiesenpieper, Brehm, Gefangene Vögel, 1872, Weichfresser gegen Schamadrossel (Männchen) oder ältere Jahrg. Gef. Welt 1900—05.

Georg Rose, Pyritz,
1265] Bahnhofstraße 7.

Gesangs-Kanarie

gold. Med. prām., neueste Zere
empfehle, solange Vorrat reicht,
billig. Schöne, tiefe, tourenreiche
hähne à 8—10—12 M., 3 Stü
25 M., hochf. Vorsänger à 15—18—
3 Stück zus. 40 M. sowie beste
weibchen à 3 M., 6 Stück 15 M.
Dankschreiben im Besitz.

Fritz Schönfel
Kanarienzüchterei
Dresden-Kadit

Wegen Auflösung der Voge
gebe ab in Zuchtpaaren b
tadellosen Exemplaren:
1,1 Sonnenvögel 15.— M., 1,1
Sperlingspapageien 15.— M., 1,0
die-witwe in Pracht, 1,0 Elsterche
Amarant, 1,0 Schmetterlingsfin
Astrilde zusammen 10.— M., 1 Zu
gelbbunte Mövchen 12.— M.,
Mövchen 3 Stück 10.— M.
Verpackung, ausschl. Porto, 1
würger (jung), 1,0 Dompfaff, 1,0
piep.r gegen Erstattung der Un
Dr. Pfützenreuter, Klötze

Waldvög

liefern ab 1. Oktober
in gesund. Exemplaren, Bestellu
heute schon erbeten,

Kaufmanns Söhn
Arnegg bei Ulm a. D., W

1,0 Singsittich

vollkommen fehlerfrei und gesund,
ich gegen ebensolches 0,1. Abz
gesundes 1,0 Singsittich zu Mk.
(beide aus der Brut 1925).

Gustav Rambausek,
Wien XVIII/1 Martinstraße 8

1,1 Amsel,

diesj., aufgepäppelt, tauscht geg. Nac
oder Gartengrasmücke
Röhl, Berlin N 54, Fehrbelliner S

Turmfalke,

vollständig zahm, frißt aus der
diesjährig, vertauscht gegen **Ia**
lerche oder sonst guten Vogel, ev
gegen **Ameisenpuppen**
Heinrich Groebel, Coble
Löhrstraße 14.

Meerschweinchen, weiße M
japanische Tanzmäuse,
Eichhörnchen, Frettchen, K
Lachtauben, junge Brieftau
(Anfragen auf Rückkarte)
verkauft
Kleintierzüchterei
A. Polentz, Breslau

Billig zu verkaufen: „Gefi
Welt". Gebundene Jahrgänge: 18
1910. Ungebunden: 1911 bis
(9 Hefte fehlend) Angebote an
Rupert Ederer, Pöllaube
Post Pöllau (Steiermark).

„Gefiederte Welt

Jahrg. 1909 10.—M., 1921 u. 22 14.—
1923 7.— M. mit sämtlichen Be
und in Original-Einband gebu
sehr gut erhalten. „Neunzig,
Stubenv.", gebund., 12.— M.
Amazonen" von Dr. K. Ruß, gel
2.50 M. „Mitteilungen üb. die
welt der Südd. Vogelwarte" 1922,
24 je Heft 0.50 M. „Der Philosop
Bauer" 0.50 M. Dr. R. S. Ros
„Meisterschafts-System z. Selbsterle
moderner Sprachen", Französisch 7.
neu 15.— M., verkauft
Otto Pensler, Erfurt, Nerlys

Brockhaus' Konvers.-Lexikon
17 Bände in Halbleder, nur
Meier's Konvers.-Lexikon,
17 Bände in Halbleder
Andrees Handatlas,
Jubiläumsausgabe . . .
Alles vollständig, sehr gut erha
Preise portofrei inkl. Verpack
W. Müller, Friedersdo
(Kreis Beeskow).

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 14
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 1. Oktober 1925 | Heft 40

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Ornithologische Skizzen aus Südtirol.

Von W. Bacmeister, Heilbronn.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Am Gardasee.

Als Aufenthaltsort wählten wir das an der Nordspitze des azurblauen Sees gelegene liebliche Torbole, von wo aus wir die nähere und weitere Umgebung durchstreiften. Die Vogelwelt kam mir etwas spärlicher der Zahl nach vor als die Bozens, womit aber kein endgültiges Urteil abgegeben werden soll. Auch hier traf ich die Nachtigall an. Einmal im Buschwald, der sich öde und einförmig am östlichen Ufer in der Richtung auf Malcesine erstreckt, dort wo die Schützengräben vom Kriege noch zu sehen sind und vor welchen man nun den Stacheldraht wieder aufgerollt und den Berg hinuntergeworfen hat. Da sang sie, aber ihr Gesang war hart und einförmig wie die Gegend, in der sie hauste. Eine zweite verhörte ich im Walde zwischen Torbole nnd Arco, wohin ich einmal zur größten Verwunderung aller Leute, die in den Gärten arbeiteten, mit meiner Frau zu Fuße ging. „Wie kann man nur", lasen wir auf allen Gesichtern. „Da nimmt man doch ein Auto oder einen Wagen! Wie kann man nur den Weg zwischen den Feldern und Weingärten hindurch zu Fuße machen und staubbedeckt in Arco ankommmen. Ihr Deutsche seid doch wunderliche Leute!" Das und noch weiteres sagten uns die erstaunten Mienen. Doch: „Der wackre Schwabe forcht sich nit, ging seines Weges Schritt vor Schritt." Dafür hörte er eine Nachtigall und lauschte dem Lied der auch dort sehr zahlreichen und für die Gegend bezeichnenden Schwarzköpfe, deren Gesang übrigens ebenfalls nicht berühmt war. Ein weiterer Charaktervogel für den Gardasee ist (wie in Bozen) der Mauersegler. Überall finden wir ihn in den Uferorten. Besonders zahlreich umschwärmte er die hohen Zinnen des alten, so malerisch gelegenen Schlosses in Malcesine, in dessen Mauern eine größere Anzahl von Steinen ausgebrochen sind offenbar zu dem Zwecke, dem stürmischen Segler einen Unterschlupf für seine Niststätte zu gewähren. Man staunt, daß solches in Italien geschieht, dem a Vogelfreundlichkeit sonst nicht gerade nachgesagt wird. Am gleichen Orte sah ich auch einige Hausschwalben, die ich sonst nicht bemerkte, dagegen überall viele Rauchschwalben. Am Ponalefelsen bei Riva nistet nach Prof. Dr. K. W. von Dalla Torre (Junks Naturführer, Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein) die Felsenschwalbe (Biblis rupestris). Ich kam aber nicht dorthin und vermochte die Angabe nicht nachzuprüfen. Derselbe Verfasser führt übrigens eine so große Anzahl von Sumpf- und Wasservögeln an, daß man staunen muß. Er schreibt: „Aus der Gruppe der Sumpfvögel finden oder fanden sich: Ardea garzetta, Seidenreiher (!); A. cinerea, Fischreiher; A. ralloides, Schopfreiher (!); A. stellaris, Rohrdommel; Nycticorax griseus, Nachtreiher; Fulica atra, Wasserhuhn; Gallinula chloropus, Teichhuhn; Totanus littoreus, Wasserläufer; Cygnus olor, Höckerschwan (!)." Dann folgen die Namen von so ziemlich allen Enten. „Als Seltenheiten sind zu erwähnen: Platalea leucorodia, Löffelgans; Thalassidroma pelagica, Sturmschwalbe (!); Pelecanus onocrotalus, Pelikan (!); Harelda glacialis, Eisente, und Carbo pygmaeus, Zwergkormoran (!)."

Ich sah von alledem nichts. Ich will nicht bezweifeln, daß alle diese Arten schon am Gardasee beobachtet bzw. erlegt worden sind, will auch einigermaßen — mit einigem Vorbehalt — glauben, daß die verschiedenen Entenarten, wie „Hause bemerkt, Ende November zu Tausenden in den südlichen See einfallen, daß er schwarz wird, bis die Verteilung stattgefunden". Aber diese Aufzählung von seltenen und seltensten Erscheinungen in der Vogelwelt (die ich oben mit eingeklammerten Ausrufezeichen zu versehen mir gestattete,) gibt dem Uneingeweihten doch ein falsches Bild. Werden Seltenheiten wie Seidenreiher, Schopfreiher, Löffelgans usw. angeführt, dann bedarf es näherer Zeit- und Ortsangaben, denn es handelt sich in fast allen solchen Fällen um ein einmaliges Vorkommen.

Auch den Fischadler, der von Dalla Torre erwähnt wird, vermochte ich nicht zu sichten. Aus der Sippe der Raubvögel konnte ich nur eine Art beobachten. Am 17. Mai vormittags schwebte gemächlichen Fluges über der Einmündung der Sarca in den Gardasee, also zwischen Torbole und Riva, ein schwarzer Milan. Und am selben Tage beobachtete ich diesen Vogel nochmals zwischen

Torbole und Arco, wo er wahrscheinlich wieder dem Fischfange oblag. Ich zeigte einem Manne, der eben vom Fischen kam, diesen Vogel und fragte ihn, ob er ihn schon öfters da gesehen habe. Er bejahte die Frage, und auf meine weitere nach dem Namen des Vogels gab er die Bezeichnung „Poiana" an. Nach der Neuausgabe des Naumann wird im Italienischen der schwarze Milan mit Nibbio nero bezeichnet, mit Poiana (auch Poana) dagegen der gewöhnliche Mäusebussard, während der Rauhfußbussard Poiana calzeta (beschuhter Bussard) heißt. Sonst sah ich, wie gesagt, nichts besonderes, was gerade an die Vogelwelt eines Sees gemahnte, mit Ausnahme von zwei Drosselrohrsängern, die im noch nicht beseitigten Röhricht eines neuangelegten Hotelgartens mächtig lärmten und einem Teichrohrsänger, der im Bambusgebüsch im noch nicht eröffneten „Grand Hotel" in Torbole sein Lied herunterleierte. Erwähnt sei noch, daß die Form des italienischen Sperlings sehr häufig mir auch in Torbole begegnete.

Im Gröd̈ner Tal.

Heraus aus den erschlaffenden Niederungen in die reineren Lüfte der Berge! Ist es auch zu Bergbesteigungen noch zu früh im Jahre, so wollen wir uns doch den frischen Bergwind um die Ohren wehen lassen, wollen statt der Pracht üppig blühender Rosen die zarteren, aber nicht minderschönen Blümlein der Berge schauen und uns einige davon zum Strauße pflücken. Wollen dem Tosen der Bergbäche und dem Frühlingsliede der Bergvögel lauschen. Drum auf, hinauf ins Gröd̈ner Tal, dem weltberühmten, wunderschönen!

Es war schon ein gewaltiger Abstand und ein großer Höhenunterschied zwischen dem Gardasee und der Lagune von Venedig (wohin wir vom Gardasee uns einige Tage begeben hatten) und dem Hochtal, das der Gröd̈nerbach durchstürmt. St. Christina, 1428 m ü. M. am Fuße des gewaltigen Dolomitriesen Langkofel gelegen, wählten wir als letzten Rastort unserer Urlaubsreise. Es war wundervoll dort oben, und ausgezeichnet waren wir bei Herrn und Frau Pescoller in der „Post" aufgehoben, neben einem Ehepaar aus Hannover die einzigen Gäste im ganzen Haus! Denn die „Saison" hatte noch nicht begonnen. Gerade deshalb war es so schön da oben. Nicht gestört von lästigen und lauten Zimmernachbarn, nicht beeinträchtigt im Schauen und Genießen all der Herrlichkeiten, die den Wanderer auf Schritt und Tritt umgeben, konnte man sich so von ganzem Herzen und mit ganzen Sinnen der Schönheit und Großartigkeit dieser herrlichen Gebirgswelt hingeben. Auch das Belauschen der Vogelwelt kam nicht zu kurz dort oben, sei es am Ufer des tosenden Gröd̈nerbachs, in den ich den Wasserschmätzer sich tollkühn in den wildesten Strudel stürzen sah oder wo die gelbe Bachstelze schwanzwippend am Gestade auf- und abtrippelte, sei es bei der Regensburger Hütte, die gerade an dem Tage, an dem wir zu ihr emporstiegen (25. Mai), eröffnet wurde (2039 m ü. M.), wo der Kuckuck rief, der Baumpieper jubilierend in die Luft stieg, wo der Zaunkönig durch die Zwergföhren huschte und der Tannenhäher seine krächzenden Schnarrlaute hören ließ. „Das Herz des Vogelfreundes muß höher schlagen," sagt unser trefflicher, leider schon heimgegangener Dr. A. Voigt, „wenn er einige dieser stattlichen, weißgescheckten Braunröcke in unseren deutschen Gebirgswäldern rastend oder gar als Nistvögel entdeckt." Nun, ich hatte dieselbe große Freude, als ich den dickschnäbligen Nußknacker dort oben im tirolischen Bergwald verhörte.

Im Hochtal selbst begegnen wir überall unseren gefiederten Freunden. Rauchschwalbe, Mauersegler, Buchfink und Rabenkrähe sind häufig. Weniger häufig Hausschwalbe und Hausrotschwanz. Den Ruf des Grünspechts hört man oft, wie auch das schlichte Liedchen der Goldammer und die schmetternde Strophe des Zaunkönigs. Zwischen den Häusern St. Christinas treiben sich überall Haussperlinge herum, und zwar auch in der Form des Passer italiae, und tagtäglich hörten wir über dem kleinen Streifen eines Getreidefeldes bei der Fachschule für Holzbildhauer — diese Kunst blüht ja im ganzen Gröd̈ner Tal — die Feldlerche singen. Ich traute zuerst meinen Ohren nicht: wie? so hoch da droben noch eine Feldlerche? Aber es war kein Zweifel. Sie war es, die Frühlingsverkünderin des Flachlandes, die auch dort oben in stiller Gebirgswelt ihre Jubellieder zu unserer Freude ertönen ließ. Dr. Parrot ist ihr dort nicht begegnet. Er schreibt: „Die Feldlerche konnte ich lediglich auf dem Plateau der Süßeralp konstatieren; im Gröd̈ner Tale, selbst auf den Feldern und Wiesen, schien sie zu fehlen."

Aber nicht nur die Feldlerche allein läutete den Frühling dort oben ein. Auch die übrigen gefiederten Sänger stimmten zu seinem Preise ihre Loblieder an. Am 27. Mai stieg ich über St. Jakob durch den Bergwald in der Frühe empor. Ohne bestimmtes Ziel. Nur der Schönheit der großartigen Landschaft mich hingebend und den Liedern der fröhlichen Sänger lauschend. Unten im Tal blühten auf den Wiesen die prächtigen Trollblumen in Menge, an den Berghalden duftete die Schlüsselblume und leuchtete des Enzians tiefes Dunkelblau. Würziger Duft entströmte der lieblichen Daphne. Über dem tiefeingeschnittenen Tale ragten die rötlichen Porphyrwände des gewaltigen Langkofel in stolzer Pracht in den Himmel. Ein überwältigender Anblick! Um mich herum aber sang und flötete es von den Zweigen: der Grünspecht jauchzte dem Frühling entgegen, das Wintergoldhähnchen ließ sein zartes Liedchen im frühlingsgrünen Lärchenwald ertönen, Baumpieper stiegen jubelnd in die Höhe. Goldammer und Berglaubvogel ließen sich hören; selbst die Zaungrasmücke hatte sich dort oben eingestellt. Von der Sippe der Meisen fehlte nicht die muntere Haubenmeise und von einem Pärchen Alpenmeisen mit ihren rauh klingenden Lockrufen fütterte vor meinen Augen zum Greifen nahe der eine Gatte den andern. Ein Bild voll Lieblichkeit und Großartigkeit zugleich, das sich dauernd dem glücklichen Wanderer einprägte.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Ein französischer Offizier brachte neben anderen interessanten Vögeln Algiers auch einige Stücke der auf S. 447 abgebildeten

Wüstenläuferlerche — Alaemon alaudipes alaudipes (Desf.)

nach Frankreich. Es ist das Erstemal, daß diese schöne, etwa drosselgroße Lerche in die Hände von Vogelliebhabern Europas gelangte. Die Kennzeichen der Gattung Sichellerche — Alaemon *Keys.* u. *Blas.* sind der lange, schlanke, leicht gebogene Schnabel, dessen Nasenlöcher unbedeckt sind, ihre Größe, die wenig der einer Drossel nachsteht, sodann, daß die inneren weichschäftigen und stark verlängerten Armschwingen nicht die Flügelspitze erreichen, welche von der dritten, vierten und fünften Schwinge gebildet wird. Der Schwanz, gerade abgeschnitten, hat ungefähr $^2/_3$ der Flügellänge, die Läufe sind lang und der Nagel der Hinterzehe ist gerade und ziemlich kurz. Die Wüstenläuferlerche, welche von allen Reisenden wegen ihrer überaus lieblichen Erscheinung und ihres zutraulichen Wesens bewundert wird, ist eine Bewohnerin der Sahara vom Rio de Oro bis Ägypten. Ihre Färbung ist der des Wüstenbodens angepaßt, auf dem sie emsig umherläuft, um Insekten, die allein ihre Nahrung bilden, zu jagen. Besonders stellt sie der „auf dem Wüstenboden flügellos werdenden Gottesanbeterin (Eremophila)" nach, wie König in „Die Sänger Ägyptens" mitteilt. Der Vogel „trägt nicht nur die äußeren Abzeichen der starren Sand- und Steinwüste an sich; er verkörpert und versinnbildlicht auch die Seele der unwirtlichen, von der Sonne durchglühten Flächen. Dort, wo die Steine im Sonnenglanze glitzern und glimmern, wo sich die sandigen Dünen aneinanderreihen oder nackte Bergketten sich hinziehen: da läuft dieses wunderbare Geschöpf über den harten Boden oder gaukelt einem unstät fliegenden Wiedehopfe gleich über die Kämme der rieselnden Dünen, steigt, in der Liebeswerbung begriffen, einer Leuchtkugel vergleichbar, vom Boden, um in melancholischen und doch so unvergleichlich wohlklingenden, ergreifenden Tönen die Erhabenheit der unendlich großen, weiten Wüste zu offenbaren." Dieser schönen Schilderung Prof. Königs (a. a. O.) möchte ich noch hinzufügen, daß sie gewöhnlich einzeln oder paarweise beobachtet wurde. Hartert (Die Vögel der paläarktischen Fauna) sagt von dem Gesang dieser Lerche: „Der klangvolle, nach Lerchenart in langsam aufsteigendem Fluge ausgestoßene, wehmütige Gesang hebt an mit einer aus 3—4 Tönen bestehenden aufwärtssteigenden Skala, an der sich ein lebhafter Triller anschließt." Das Nest fand König und andere frei auf dem Boden oder auf niedrigen Büschen. Es steht in einer Vertiefung wohl verborgen unter einem Stein oder in einem Grasbusch. Es ist zierlich gebaut. Die aus Halmen bestehende Einlage war am Rande mit Steinen belegt. Das Gelege soll aus 2—3, auch 4 Eiern bestehen, deren milchweiße Schale mit matt lilafarbenen Schalenflecken und gelb- oder dunkelbraunen Oberflecken bedeckt ist (20—22×15—17 mm).

Die Wüstenlerche ist ungemein zutraulich und zeigt so wenig Scheu vor dem Menschen, daß sie „im Zelte des braunen Nomaden", wie Brehm berichtet, „förmlich als Hausvogel auftritt".

Gefiederbeschreibung: ♂ oberseits isabellfarben, bald mehr gelblich, bald mehr ins Bräunliche ziehend, am Kopf und Hals grau überlaufen, an Unterrücken und Schulterfedern mehr rötlich; die kleinen Oberschwanzdecken weiß, die größeren wie oberseits mit dunklen Schaftstrichen; am Grund des Oberschnabels jederseits ein weißlicher Fleck; Zügel weiß, nach dem Auge zu einige schwärzliche Federn; kurzer weißer Augenbrauenstreif; Ohrdecken weißlich, oben und unten durch ein schwärzliches Band begrenzt; Unterseite weiß; Kropfgegend und Seiten grau überhaucht; Kropfgegend mehr oder weniger braunschwarz gefleckt, kleine Oberflügeldecken isabellfarben, mittlere fahlbraun isabellfarben gesäumt, große braun mit weißen Spitzen; Handschwingen braunschwarz, am Grunde weiß, erste nur an der Innenfahne; Armschwingen braunschwarz mit hellisabellfarbenen Säumen, innerste wie Schulterfedern; Unterflügeldecken weiß; mittelste beide Schwanzfedern wie Oberseite mit verwaschener dunkler Federmitte und schwarzem Schaft, übrige schwarzbraun, äußerste mit breitem weißem Saum auf den Außenfahnen, nach innen werden die Säume schmaler und gehen ins Isabellfarbene; Auge braun; Schnabel schieferfarben; Füße grauweiß; Lg. 210—240, Fl. 118—130, Schw. 90—94, Lf. 35, Schn. 25—27 mm. ♀ erheblich kleiner, oberseits gelblicher isabellfarben ohne grauen Anflug an Kopf und Hals; Kropfgegend gelblich überlaufen, fein gefleckt.

Mohrenkopf. Aufgenommen von A. Adlerspurre (s. S. 476).

In der Gefangenschaft müßte diese schöne Lerche in einem sehr großen Lerchenkäfig untergebracht werden, dessen Schublade reichlich mit trockenem, nicht zu

feinem Sand und einigen Steinen belegt werden müßte. Der Natur des Vogels entsprechend müßte sie ein Futtergemisch mit hauptsächlich animalischen Stoffen und als Beigabe reichliche Mengen von Insekten, besonders Heuschrecken, erhalten.

Von den Bartvögeln gelangen meist nur in Afrika und Indien lebende Arten nach Europa, sehr selten amerikanische Arten, welche meist die äequatorialen Striche des amerikanischen Kontinentes bewohnen. Sie, besonders die größeren Arten, sind sehr träge Vögel, die gern in träumerischer Ruhe ihr Dasein fristen, wenn sie nach reichlichem Genuß von Früchten, Beeren, Blattknospen und Insekten, welche sie hauptsächlich in den Rindenspalten oder unter der Rinde der Bäume, auf welchen sie sich aufhalten, suchen, gesättigt sind. Die kleinen Arten sind munter und klettern gewandt in den Zweigen umher. Ihre Rufe, kurz, laut und schrill, nur bei wenigen angenehmer, lassen sie beständig während ihrer beschaulichen Ruhe hören.

Die einzelnen Gattungen werden hauptsächlich nach der Schnabelbildung (Zähnauskerbungen am Unter- oder Oberschnabel, Nasenfurche), besondere Federbildungen (haarartige Verlängerung der Kopffedern, Haubenbildung, Federbildungen über dem Auge, unbefiederte Stellen am Kopf), Schwanzlänge und Form des Schwanzes unterschieden.

Der in letzter Zeit nach Frankreich gebrachte (s. Abb. S. 443)

Buntbartvogel — Capito niger *(St. Müller)*,

in Frankreich Barbu à gorge rouge genannt, lebt in Guiana.

Die Gattung Buntbärtling — Capito *Vieill.* hat einen schmalen, seitlich zusammengedrückten Schnabel ohne Zahnausschnitt mit schwach gebogener Firste und schwach entwickelten Schnabelborsten. Der zehnfederige Schwanz ist gestuft, und zwar so, daß die mittleren vier Schwanzfedern gleichlang, die drei äußersten jederseits sich nach außen stufig verkürzen. Die Geschlechter tragen verschiedenes Gefieder. Man kennt etwa 18 Arten, welche die tropischen Striche Mittel- und Südamerikas bewohnen.

Gefiederbeschreibung: ♂ oberseits schwarz, ein weißer Schulterstreif durch die weißen Endsäume der Schulterfedern gebildet; die Federn des Unterrückens und Bürzels mit olivgelben Spitzen; Oberschwanzdecken olivbraun mit schwärzlichen Federmitten und Schäften, ebenso die Schwanzfedern; Stirn, Wangen, Kehle scharlachrot, dahinter ein strohgelbes Band, Hinterkopf, Nacken schwarz mit Braun gefleckt; Augenbrauenstreif hellgelb; übrige Kopf- und Halsseiten schwarz, Kinn gelblich; übrige Unterseite hellschwefelgelb; Körperseiten bräunlich mit verwaschenen dunklen Federmitten; Unterschwanzdecken mit dunklen Querbinden; Schenkel weißlich, innen bräunlich; Flügeldecken schwarz, große mit gelblichweißen Spitzen, übrige Flügelfedern schwarz mit olivbraunen Säumen, innerste Schwingen mit ockergelblichen Spitzenflecken an der Außenfahne, Unterflügeldecken weiß, ockergelblich verwaschen. Lg. 170, Fl. 80, Schw. 50 mm.

♀ ähnlich, kleine und mittlere Flügeldecken gelblich gerandet, das Weiß an den Spitzen der großen nur angedeutet; Brust mit rundlichen schwarzen Flecken.

(Fortsetzung folgt.)

Meine Körnerfresser.

Erinnerungen aus einem mehr als 50jährigen Vogelliebhaberleben.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Die wirklich guten Schläger sind eben im allgemeinen im Freien verschwunden. Beispielsweise habe ich hier in der Umgebung von Halle (Saale) seit Jahren keinen Reitscherfinken mehr draußen gehört, während früher ab und zu mal einer vorkam. Vor etwa 12—15 Jahren hörte ich viele solcher guten Schläger in der Umgegend von Naumburg (Saale). Die besten Reitscherfinken hörte ich auf meinen Wanderungen vom Schwarzatal über Gehren nach Großbreitenbach, namentlich auf der Strecke dicht vor Gehren, wenn man aus dem Schwarzatal heraufstieg. So gut habe ich sie eigentlich im ganzen Thüringer Wald nicht gehört, und zwar von der Gegend um Eisenach herum bis zum Schwarzatal nicht. Ich habe wiederholt den ganzen, langen Rennstieg mit seinen Seitentälern danach abgesucht; aber vergebens. Ob irgendwo noch Finken in der Gefangenschaft in den vorgenannten Gegenden nach Vorschlägern abgerichtet werden, ist mir nicht bekannt. In Westfalen und dem Rheinlande geschieht dies noch, ich kann aber aus eigener Erfahrung darüber nicht sprechen. Ich halte meine besseren Schläger zurzeit in kleinen Finkenbauern der allgemein vorgeschriebenen Größe. Als Futter reiche ich Rübsen mit etwas Hanf und von Weihnachten ab bis zur Beendigung der Schlagzeit Weichfutter, dabei täglich auch einige Mehlwürmer. Hiermit bringe ich meine Finken im geheizten Zimmer nach Weihnachten in Schlag, bei milderer Witterung kommen sie vom 1. März ab vors Fenster. Allerdings gewöhne ich sie allmählich an den Temperaturunterschied, indem ich sie in die Küche — also in einen weniger warmen Raum — die letzte Hälfte Februar bringe. Am besten und fleißigsten schlägt der Fink eben in freier Luft, hier höre ich ihn dann schon vom Bett aus die ersten Stunden nach Tagesanbruch eifrig und mit großem Genuß zu. Bemerken will ich hier noch, daß auch nach meinen langen Erfahrungen der Fink ein guter Wetterprophet ist; wenn er sein „Ju" oder „Trüb" hören läßt, gibt es unfehlbar bald Regen. So, nun lebt wohl ihr edlen Finkenhähne, ihr Ritter der alten soviel gepriesenen Minnezeit, die ihr im Freien auch jetzt noch in jedem Frühjahr bei euren Kampfspielen verteidigt, möge euch euer heißes Blut für immer erhalten bleiben!

Von den anderen hiesigen Körnerfressern hielt ich stets einige Exemplare des Kreuzschnabels in meinen Volieren, namentlich des Fichtenkreuzschnabels (s. Abb. S. 469). Ein Sohn des geliebten Gebirges, der Papagei unter unseren Vögeln — er durfte mir nie fehlen. Wie belebt er den Flugkäfig, wenn er eifrig und künstlerisch am Gitter und an der Decke desselben herumturnt, dabei sein „güb, güb" oder „göb, göb" hören lassend. Und dann, welche Zierde ist nicht sein blutrotes Kleid! Dabei erschallt auch sein durchaus angenehmer Gesang, der einem heiseren Zirpen und Schnurren wechselnd mit hellen flötenden Strophen gleicht. Wie oft habe ich diesem zur strengsten Winterzeit, wenn Eis und Schnee ungemütliche Tage schufen, an meiner Freivoliere gelauscht, wenn alle anderen Käfiginsassen schwiegen. Meine Kreuzschnäbel blieben nämlich immer im Freien, sind sie doch wetterharte Gesellen, die keine Kälte anficht. Sie behielten auch dann ihre schöne rote Färbung, namentlich, wenn ich es nie an Fichtenzapfen fehlen ließ und diese wußte ich mir immer zu verschaffen. Übrigens möchte ich dem Kreuzschnabel eine große Schlauheit nicht

absprechen. Ich hatte einst ein älteres, prächtig rotes Männchen, das fast den ganzen Tag sang und sehr zahm war — wenigstens sich so zeigte — indem es immer auf der untersten Sitzstange des Käfigs saß. Dadurch war ich ganz sichergemacht und öffnete die größere Vordertür desselben, die nach der Seite aufging, ohne weitere Vorsicht, um frisches Badewasser hineinzusetzen. Mein Kreuzschnabel sah dann ruhig dabei zu, wenigstens hatte er dies schon oft getan. Eines Tages jedoch schoß er ohne weiteres, sobald ich die Tür öffnete, auf mich zu, und zwar so heftig, daß ich fast einen Schreck bekam — und verschwunden war er. Er hatte also den Fluchplan sich schon lange überlegt — deshalb sah er mich

Fichtenkreuzschnabel.

immer so ruhig und schlau an — mich dadurch sichermachend, bis ihm die geeignete Gelegenheit gekommen schien: also ein Zeichen seiner großen Intelligenz! Alle anderen Vögel der Voliere flüchteten stets nach oben, wenn ich die am Boden befindliche Tür öffnete, mein Kreuzschnabel hatte sich aber einen anderen, besseren Plan schlau ausgesonnen. Als Futter reiche ich Hanf mit den gewöhnlichen Körnersämereien, dazu aber viel Tannensamen und tunlichst immer Tannenzapfen und auch etwas Weichfutter. Bei diesem Futter und dem Aufenthalt in frischer Luft mit viel Sonnenschein haben sich meine Kreuzschnäbel immer gut und lange gehalten, von einer zu frühen Sterblichkeit bemerkte ich nie etwas. Auch ein anderer Gebirgsbewohner, der Dompfaff, durfte wegen seines schönen, noblen Gefieders selten in meinen Sammlungen fehlen, obwohl sein Naturgesang eigentlich gleich Null ist und ich hauptsächlich „Sänger" hielt; denn mir geht es, wie dem echten Thüringer Vogelfreund, „was nicht singt, setze ich nicht ein". Aber in einer größeren Vogelgesellschaft darf der Dompfaff nicht abwesend sein, er gibt der Gesellschaft erst die richtige „Anfmachung", wie der Kaufmann sagt. Ich habe auch mehrere Male von dem verstorbenen Kantor Schlag in Steinbach-Hallenberg junge Männchen zum Liederanlernen bezogen und damit ganz erfreuliche Ergebnisse erzielt — aber der Hänfling unter den Körnerfressern sowie der Star und die Amsel unter den Weichfressern waren mir dazu lieber. Auch habe ich gefunden, daß der gelernte Dompfaff im Einzelkäfig ein recht weichlicher Geselle ist, der sehr leicht eingeht. Als Wildfang hält er sich in der Voliere besser. Viel kann man für seine Gesundheit tun, wenn man neben dem üblichen Körnerfutter (Rübsen, Glanz und wenig Hanf) stets — solange man haben kann — einen Büschel Vogelbeeren (Ebereesche) in den Käfig hängt, er frißt davon die Kerne und wirft das Fleisch beiseite. Er soll im Flugkäfig bissig sein; dies habe ich meinem Dompfaffen aber nie nachsagen können, es waren meistens friedliche, aber langweilige Gesellen. Eines anderen Bewohners unserer heimischen Fluren will ich ferner nicht vergessen, den ich auch in vielen Einzelvertretern im Laufe der Jahre hielt: des Grünlings. Unter allen einheimischen Vögeln wird ihm die wenigste Beachtung geschenkt, obwohl es keinen ausdauernderen und dankbareren Stubengenossen gibt als ihn, der auch fast gar keinen Krankheiten unterworfen ist. Ein altes, wild eingefangenes Männchen ist ein nobler gelblich-olivengrüner Kerl, der sich stets sauber und schmuck hält. Auch ist sein Gesang gar nicht so unbedeutend, wie allgemein geglaubt wird. Namentlich ist der Grünling, jung aufgezogen, ungemein zahm und auch gelehrig, auch paart er sich leicht mit dem Kanarienweibchen. Ich

habe wiederholt junge Grünlinge aufgezogen oder von den Alten auffüttern lassen — was diese sofort ohne Scheu tun — und davon junge Männchen zur Bastardzucht benutzt, was immer guten Erfolg hatte. Es gab einen kräftigen Bastardschlag. Auch einen Südländer, der aber in den letzten Jahrzehnten immer weiter nach Norden vorgedrungen ist, habe ich mehrere Male in meiner Vogelschar gehabt: den Girlitz. Ich war eigentlich mit ihm betrogen worden, statt eines Zeisigs, den ich bestellt hatte, wurde er mir unter„geschoben", obwohl man damals eigentlich vom edlen „Schieben" öffentlich noch nicht viel wußte. Er hat auch tatsächlich viel Ähnlichkeit mit dem Erlenzeisig, nur daß er kleiner ist und schlanker auftritt. Sein Gesang ist unbedeutend, seine Einzelhaltung verlohnt sich nicht, aber im Flugkäfig macht er ein ganz gutes Bild. Für mich als Gesangsliebhaber hatte er keinen Wert — nur seine Vertauschmöglichkeit mit dem Zeisig überraschte mich und wird auch andere Liebhaber unter Umständen interessieren!

Hiermit schließe ich diese Ausführungen. Sie sollen keine wissenschaftlichen Schilderungen unserer Wald-, Feld- und Stubengenossen sein, es sind Bilder, wie sie sich im Laufe der Liebhaberjahre meinen Augen und meinem Herzen darboten. Mögen auch die Leser unserer lieben „Ges. Welt" sie so auffassen!

Farbenwellensittiche.

Aus dem Französischen übersetzt von Dr. Luig.

(Nachdruck verboten.)

Im Auslandsbericht, Heft 29 der „Ges. Welt", erwähnte ich die Angaben, die J. Bailly-Maitre im „L'Oiseau" über die Wellensittichzüchtereien in Toulose macht. Der französische Aufsatz geht weiter auf die Grundsätze der Farbenzucht ein; in folgendem gebe ich die Übersetzung dieses Teiles mit Erlaubnis des Schriftleiters Herrn Delacour wieder:

Beim Besuch einer so bedeutenden Wellensittichzucht wie die des Hauses Blanchard ist man erstaunt über die zahlreichen Abweichungen, die man im Gefieder dieser Vögel beobachten kann. Es gibt glaube ich, wenig Tierarten, die, obgleich erst relativ kurze Zeit dem Einfluß des Menschen unterworfen, eine so große Zahl von Varietäten gezeitigt haben. Aus den Berichten des Hervieux de Chanteloup in seinem „Neuen Lehrbuch über die Kanarienvögel" vom Jahre 1785 ersieht man, daß zu der Zeit die Anzahl der voneinander unterschiedlichen Kanarienspielarten nicht größer war, als wir sie heute bei dem Wellensittich finden. Und doch war damals der Kanarienvogel schon seit drei Jahrhunderten eingebürgert, während der Wellensittich ein erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit importierter Vogel ist. Es scheint, daß die außerordentliche Veränderlichkeit dieses Sittichs in so geringem Zeitraum verschiedenen günstigen Umständen zu verdanken ist: einerseits der Leichtigkeit, mit der der Vogel sich in allen Ländern eingewöhnt hat, anderseits seiner hervorragenden Fruchtbarkeit. Wenn man berücksichtigt, daß der Wechsel des Klimas, der Ernährung und der Lebensbedingungen bei den organisierten Wesen die wichtigsten Faktoren der Veränderlichkeit darstellen, so versteht man, daß der eingeführte Wellensittich infolge der ganz veränderten Lebensweise ebenso diesen Gesetzen gehorchte, wie es bei unseren Haustieren der Fall war. Allerdings gibt es auch manche Tierarten, die, schon in vielen Generationen in der Gefangenschaft gezüchtet, keinerlei individuelle Veränderung gezeigt haben. Man darf auch nicht vergessen, daß diese Veränderlichkeit sich nur in seltenen Fällen zeigt und daß erst eine große Anzahl von Individuen gezüchtet werden muß, ehe man eins findet, das irgendwelche Besonderheit aufweist, geeignet eine neue Abart hervorzurufen. Bei der gewaltigen Ausdehnung, die die Zucht dieses kleinen Sittichs genommen hat, ist es klar, daß die besten Bedingungen gegeben waren, um die zahlreichen Varietäten hervorzurufen, die wir heute bei dieser Art vorfinden. Das Gefieder des Wellensittichs ist eine lange Zeitspanne unverändert geblieben, und während vieler Jahre haben die Liebhaber nur den ursprünglichen grünen Typ gekannt, dem sie mit Recht die größte Bewunderung zollten. Damals dachte niemand daran, das Gefieder des herrlichen Vogels zu ändern. Ganz zufällig entstand eines Tages aus dem grünen Sittich der gelbe; wahrscheinlich geschah das zum ersten Male in Belgien zwischen 1875—1880. Der Fall war eine Ausnahme, und die französischen Liebhaber jener Zeit kannten ihn nur vom Hörensagen. In der ausführlichen Arbeit, die E. Leroy im Jahre 1883 über den Wellensittich veröffentlichte, wurde diese Abart überhaupt nicht erwähnt, und in der Abhandlung, die ein Jahr später Alfred Rousse über diese Vögel schrieb, wurden dem gelben Sittich nur wenige Zeilen gewidmet*). Als diese Farbenvarietät in weiteren Kreisen bekannt wurde, nahm man sie allenthalben sehr günstig auf, aber ohne besonderes Erstaunen, da schon andere grünbefiederte Vögel in der Gefangenschaft gelbe Varietäten gezeitigt hatten. Mit um so größerer Bewunderung wurde die blaue Spielart von den Liebhabern begrüßt. Ein genaues Bild von dem Gefieder dieses Vogels gab zum ersten Male eine im Jahre 1882 erschienene Farbentafel der Brüsseler Zeitschrift „L'Acclimatation illustrée". Das Paar unterschied sich nur sehr wenig von der himmelblauen Abart, die wir heute kennen. Die Vögel, die als Modell für die farbige Wiedergabe dienten, befanden sich im Besitz des Herrn M. Limbosch in Uccle (Belgien). Soviel ich weiß, wurde der blaue Wellensittich erst dreißig Jahre später in Frankreich eingeführt; jedenfalls wurde er im Jahre 1911 zum ersten Male in Paris durch Frau Quentin de la Guérinière ausgestellt. Daß alle Welt den Vogel entzückend fand, braucht wohl kaum betont zu werden; heute hat wohl fast ein jeder Liebhaber wenigstens Gelegenheit gehabt, diese Tiere zu bewundern. Aber ebenso groß war das Erstaunen, daß die ursprüngliche Form eine derartige Farbenabweichung hervorbringen konnte. Vergleicht man den grünen mit dem blauen Wellensittich, so sieht man, daß alle Teile des Gefieders, die bei ersterem gelb sind

*) Ruß erwähnt in seinem III. Band „Die fremdländischen Stubenvögel", daß er die ersten gelben Wellensittiche schon im Jahre 1872 bei einem Herrn J. Boone sah; leider kamen dieselben durch einen Zufall um. L.

(Stirn, Kehle und Umrandung der Wellenzeichnung), bei diesem weiß erscheinen. Daher könnte man die Entstehung der blauen Spielart einfach auf das vollkommene Fehlen der gelben Farbe beim Urvogel zurückführen, dessen Grün auf einer Mischung von gelbem und blauem Farbstoff beruht. Mit den drei Abarten grün, gelb und blau hatten es die Züchter in der Hand, die verschiedensten Varietäten zu schaffen, die uns bis heute bekannt sind und deren Zahl wahrscheinlich noch zunehmen wird. Bisher hat man alle Zwischenfarben vom Grün zum Gelb erzielt, und unter diesen ist die Farbenabweichung so geringfügig, daß es schwer fällt, sich auf den Namen zu einigen. Übrigens sind diese verschiedenen Farbentöne recht flüchtiger Art, und nicht selten kommt es vor, daß nach der ersten Mauser die Tiere wieder die ursprüngliche Farbe ihrer Stammeltern annehmen. Durch die Verdunklung der Grünfärbung entstand die olivenfarbige Art, die anscheinend sehr beständig ist.

Der große Ehrgeiz vieler Züchter geht dahin, die reine weiße Sorte zu erzielen. Bis jetzt wurde zu diesem Zwecke mit dem blauen Wellensittich gezüchtet, und man muß zugeben, daß einzelne der erzielten Vögel dem gesuchten Typ ziemlich nahe kommen. Es ist auffallend, daß die blaue Form sich gleich durch eine ziemlich große Verschiedenartigkeit der Farbe auszeichnete; in der Tat findet man neben solchen mit himmelblauem Ton andere mit einem mehr oder weniger verwaschenen, wieder andere mit einem prachtvollen, dem Kobalt vergleichbaren Blau. Meiner Ansicht nach ist letztere Farbe diejenige, die den vollkommenen Grad des blauen Wellensittichs darstellt; leider haben nur wenige Züchter in diesem Sinne weitergezüchtet; die meisten haben ihr Interesse einer immer mehr blaßblauen Varietät zugewandt, um zu der weißen Art zu gelangen. Auf diese Weise ist es gelungen, sehr abgeblaßte Individuen zu züchten von weißlicher oder fast weißer Farbe, die auf dem Rücken keine Spur mehr der ursprünglichen Wellenzeichnung aufwiesen, deren angedeutete Blaufärbungen der Bauchseite und der dunkle Ton der Schwanzfedern aber ihren Ursprung verrieten. Es bestehen daher berechtigte Zweifel, den weißen Sittich dadurch erzielen zu können, daß man die Zuchtwahl unter denjenigen Tieren trifft, die das hellste Blau aufweisen. Eine Aufhellung der Farbe ist noch keine Farbenänderung! Um eine Farbenänderung durch Zuchtwahl zu erreichen, genügen wenige Generationen; handelt es sich aber nur um Aufhellung, so sieht man stets in der Nachkommenschaft einzelne Tiere, die mehr oder weniger auf die Abstammungsfarbe hinweisen. Es liegt übrigens gar keine Veranlassung vor, die Entstehung der weißen Spielart als unmöglich hinzustellen, denn die gelbe und blaue sind doch tatsächlich zustande gekommen. Sollte sie sich auf dem Wege des Albinismus ergeben, so würde der weiße Wellensittich durch das vollkommene Fehlen jeglicher Färbung ausgezeichnet sein und ein rotes resp. pigmentloses Auge besitzen. Eine derartige Form ist jedoch bis heute noch nicht gezüchtet. Wohl trat eine Varietät mit roten Augen vor vierzig Jahren in Belgien auf; dieselbe ist ebenfalls auf der Farbentafel abgebildet, die ich bei dem blauen Sittich erwähnte; sie zeigt ein einförmig gelbes Gefieder ohne die geringste Spur von Querbänderung. Bei allen bis jetzt bekannten Farbenspielarten dieses Sittichs hat sich die Färbung der Wellenzeichnung in gleicher Weise geändert wie die des übrigen Gefieders. Während diese Zeichnung bei der grünen Art scharf markiert und ausgesprochen schwarz erscheint mit gelber Umrandung, hat sie bei der olivenfarbigen eine bronzeartige Tönung; bei der maigrünen (jade) geht die Schwarzfärbung in das Gelb des Randes über; die Zeichnungen sind verschwommen, bei der gelben Art noch eben angedeutet, ja, sie können bei dieser sogar vollkommen fehlen. Beim blauen Vogel ist diese Querbänderung grau; beim tiefblauen ist sie dunkel, und je mehr die Hauptfarbe verblaßt, desto heller wird auch diese, so daß bei dem nahezu weißen Tier dieselbe fast ganz fortfällt. Infolge dieser Farbenmodulationen in der Wellenzeichnung ist es möglich, beim blauen Sittich eine sehr schöne Farbenspielart zu erreichen von azurblauem Gefieder mit zarten Wellenzeichnungen gleicher Farbe auf weißem Grunde.

Grauedelsänger × Kanarienvogel.
Aufnahme von A. Adlerspparre (s. S. 476).

Außer den verschiedenen Farbenwellensittichen, die wir bis jetzt kennen, wird von Blanchard noch die gelungene Zucht der malvenfarbigen und der grauen Spielart angekündigt. So eigenartig diese Abweichungen auch erscheinen mögen, erklärlich sind sie doch. Ausführliche Versuche an einer Anzahl von Tieren haben ergeben, daß die Farbenabweichungen durch die Natur und den Aufbau der Farbenelemente bedingt werden, die jeder Art eigen sind. Jede trägt in sich die Möglichkeit späterer Variationen; eine Farbe kann nur dann auftreten, wenn sie schon in irgendeiner Zusammenstellung im Gefieder des ursprünglichen Vogels vorhanden ist. So erklärt es sich, daß aus der Grünfärbung, die

aus blauen und gelben Farbelementen zusammengesetzt ist, einerseits die gelbe Variante durch Verschwinden des blauen und die blaue durch Ausfall des gelben Elements entstand. Weiterhin zeigt sich, daß die Farbenänderung der Wellenzeichnung mit der Änderung ihrer Umrandung Hand in Hand geht; so verblaßt beim blauen Sittich gleichzeitig mit dem Auftreten der grauen Querbänderung auch die Umrandung derselben und geht von Gelb in Weiß über. Die graue Spielart ist also in der Weise entstanden, daß die Graufärbung, die beim blauen Vogel auf die Wellenzeichnung beschränkt ist, sich über weitere Teile des Gefieders ausgedehnt hat. Die Entstehung der malvenfarbigen Art beruht auf einem ähnlichen Vorgang, denn bei aufmerksamer Beobachtung des grünen Sittichs findet man in seinem Gefieder malvenfarbige Töne. Ich habe mich immer gewundert, daß die Schriftsteller, die diesen Vogel beschrieben, alle denselben Irrtum begehen und den Wangenfleck als blau bezeichnen; wenn man sich diese Flecke etwas genauer ansieht, so bemerkt man, daß dieselben höchstens indigofarbig sind, beim blauen Vogel mehr violett, beim gelben mehr malvenfarbig. Zum Schluß möchte ich noch bemerken, daß im allgemeinen die gelben Sittiche die größten, die olivenfarbigen die kleinsten der Art sind.

So weit die Ausführungen des französischen Liebhabers. Sie bilden ein anregendes Kapitel zur Zucht des Farbenwellensittichs, wenn sich auch über die eine oder andere der geäußerten Ansichten streiten läßt. Zur Zeit werden in England der blaue Wellensittich für 8 Pfund, der kobaltblaue für 20 Pfund das Paar angeboten.

Meine Erfahrungen mit Zusammenhalten verschiedener Vogelarten in der Voliere.

Von A. Krabbe.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Um ein Bild zu geben, welche Arten die große Voliere gemeinsam bewohnen, zähle ich diese kurz auf. Es sind dies, teils in Paaren, teils zu einzelnen oder mehreren Exemplaren, Wellensittich, Katharinasittich, grünbürzliger, blaubürzliger und mexikanischer Sperlingspapapei, tarantinischer Unzertrennlicher, Nymphensittich, südafrikanischer Paradies-, Dominikaner-, Königs-, Hahnschweif-, Gelbrücken-, Rotschulter- und Spiegelwidafink, Atlasfink, Oryx-, Flammen-, Orange-, nördlicher und südlicher Taha-, dottergelber, Larven-, Gilb-, aethiopischer Blutschnabel-, Heuglins-, rotbrauner, Goldkopf-, Kaffern- und weißköpfiger Viehweber; Schnurrbärtchen, Braunrückengoldsperling, kleiner Kubafink, Zebrafink, Schmetterlingsfink, Erlenzeisig, Hänfling, Kanarie und einige noch unbestimmbare Weber. Die zweite Voliere beherbergt Rußköpfchen, die dritte ebenfalls Rußköpfchen, ferner Orangeköpfchen, blauen Wellensittich und Königsglanzstar. Rosenpapageien bewohnen einen Käfig für sich.

Wellensittiche habe ich zu allen Zeiten gehalten. Als ich vor zwei Jahren 10 Paare mitfliegen ließ, die über 100 Junge brachten, hatte ich unter Kämpfen der Weibchen zu leiden, die um irgend einen Nistkasten entstehen und nur zu oft mit dem Tode eines dieser Megären enden. Insbesondere habe ich dies bei gelben Wellensittichen gefunden. Gelbe Wellensittiche neigen zu Inzuchterscheinungen und müßten zeitweise mit grünen gekreuzt werden, wobei grüne Rückschläge nicht zu vermeiden sind. Mit allen anderen Vögeln haben sich die Wellensittiche gut vertragen, und wurden sie einmal in Plänkeleien verwickelt, so waren sie bestimmt nicht die Angreifer. Mit Singsittichen habe ich üble Erfahrungen gemacht. Als ich im Vorjahre die neu ausgestattete große Voliere besetzte, ließ ich versuchsweise ein Singsittichmännchen mitfliegen, dessen Weibchen ich wegen Unpäßlichkeit im Käfig zurückhielt. Das Männchen, ein sehr schönes Tier, gebärdete sich nach dieser zwangsweisen Trennung sehr aufgeregt, flog lockend in der Voliere umher, ohne anscheinend von den Mitbewohnern Notiz zu nehmen. Der Versuch endete dann damit, daß ich binnen 2 Tagen



Ungepaartes Zebrafinkenmännchen von ihm erbrütete junge Mövchen fütternd.
Aufnahme von A. Adlerspar re (s. S. 476).

je einen Zebrafink, Königswidafink und Goldbauchammer tot auflesen mußte. Da ich das Pärchen gleich darauf abgab, so kann ich über weitere Erfahrungen mit Singsittichen nicht berichten. Durchaus empfehlen kann ich Katharinasittiche. Diese reizenden Papageichen habe ich nie angriffslustig gesehen. Am Futternapf ziehen sie bisweilen besonders Gefräßige an den Schwänzen rückwärts oder befördern ihnen lästige Mitfresser durch Schnabelgriff am Flügel aus ihrer Nähe. Vor den dreisten Sperlingspapageien nehmen sie Reißaus; bisweilen sind kleine Zusammenstöße nicht zu vermeiden, wobei die Katharinas den kürzeren ziehen und abfliegen. Eine merkwürdige Freundschaft hat das Männchen zu den grünbürzligen Sperlingspapageien gefaßt, denn es sitzt den ganzen Tag auf oder neben dem Nistkasten und läßt sich so und so oft vertreiben, um gleich darauf seinen Posten wieder einzunehmen. Die Grünbürzel haben sich an den närrischen Kauz bereits gewöhnt und beachten ihn immer weniger. —

Von den Sperlingspapageien sollen die grünbürzligen ihrer Verträglichkeit, Munterkeit und leichten Züchtung wegen die empfehlenswertesten sein. Ich

bemerke vorweg, daß sich alle Sperlingspapageien bei mir vertragen, möchte aber doch die Grünbürzel als die friedlichsten von allen nicht hinstellen. Hierin stehen sie den mexikanischen — Ps. cyanopygia — bedeutend nach. Die Grünbürzel und Blaubürzel haben jede ihren Nistkasten in einer Entfernung von zirka $1^1/_2$ m bezogen — erstere einen Meisen-, letztere einen Singsittichnistkasten — und sind bestrebt, sich gegenseitig fernzuhalten. Sie begnügen sich zumeist damit, sich wütend anzuzwitschern. Bei Zusammenstößen, wie sie anfänglich in der Brutzeit vorkamen, sind die Grünbürzligen die Überlegenen. Als im Vorjahre ein junger Grünbürzel totgebissen wurde, fing ich auf alle Fälle die Blaubürzel heraus, ohne behaupten zu können, daß diese die Täter waren. Wenn ich in diesem Jahre noch Junge erziele, so werde ich scharf beobachten müssen, um etwaigen Verlusten vorzubeugen. Die weit ruhigeren Mexikaner beteiligten sich an keinem Streit und können auch nach Erfahrungen anderer Liebhaber mit Prachtfinken zusammengehalten werden. In großen Volieren ist das Halten mehrerer Paare Sperlingspapageien sehr wohl möglich, im Käfig nur ausnahmsweise. Von je einem Paar Grün- und Blaubürzel verlor ich im Käfig von 75 cm Länge einen Grünbürzel, den ich zerfleischt aus dem Schlafkasten zog. Gegen andere und besonders kleinere Vögel sind sie in der Voliere friedlich, größere gehen sie in der Nähe ihres Nistkastens mutig an und vertreiben sie auch vom Futternapf. Es sieht komisch aus, wenn das Grünbürzelmännchen den aus seinen Futternapf naschenden Nymphensittich zu Leibe geht und hoch aufgerichtet versucht, nach dessen Kopf zu hacken. Alles in allem kann ich empfehlen, in größeren Räumlichkeiten Sperlingspapageien mitfliegen zu lassen, in kleinen Volieren können sie gefährlich werden und Prachtfinken die Beine zerbeißen. Für Einzelkäfig ist paarweise Haltung die beste.

Über tarantinische Unzertrennliche sind bisher recht wenig Erfahrungen bekannt gegeben worden. Untereinander vertragen sich diese Unzertrennlichen vorzüglich und können in Flügen gehalten werden. Da sie die Gewohnheit haben, zu mehreren in ein- und demselben Nistkasten unterzukriechen, so ist zur Brutzeit mit der Möglichkeit von Beißereien zu rechnen, ähnlich wie bei den Wellensittichen. Ich hörte allerdings von einem bekannten Herrn, daß auch nach dem Legen zwei Weibchen denselben Kasten benutzten. Aus dem Freileben wissen wir sehr wenig, doch halte ich es für unwahrscheinlich, daß sie ihre Jungen in gemeinsamen Bruthöhlen aufziehen. Die Männchen — ich besitze zwei Paare — sind die friedlichsten Geschöpfe, die man sich denken kann. Sie lassen kleine Vögel zwischen den Beinen durchkriechen und gestatten den Sperlingspapageien ihren Futternapf zu besetzen; auch sind sie zahm und zutraulich ihrem Pfleger gegenüber. Die Weibchen sind gerade das Gegenteil. Es sind wahre Hexen, die ich nur mit beschnittenen Schwungfedern in die Voliere lassen konnte. In der kleineren Voliere verlor ich ein durchaus friedliches Männchen mexikanischen Sperlingspapagei durch ein Weibchen taranta. Ein Paar flugunfähige Orangeköpfchen mußte ich sofort wieder entfernen, da die auf dem Boden ängstlich hin- und herhopsenden Krüppel wütend verfolgt und mit Schnabelhieben traktiert wurden. Eine leidige Gewohnheit aller Unzertrennlichen und Sperlingspapageien ist das Hacken nach den Füßen des Gegners, zumal ein gut ausgeteilter Biß ein Bein glatt abtrennen kann. Die beiden Weibchen benehmen sich jetzt sehr gesittet und ich habe bisher zu Klagen keinen Anlaß gehabt. Ich hoffe sogar, daß sich die Tiere so an das Leben in der Voliere gewöhnt haben, daß sie auch im Besitz ihrer vollen Flugkraft keine bösartigen Angriffe mehr unternehmen. Die Vögel

Sperlingspapagei.

nehmen sich vor den Weibchen in acht und hüten sich vor ihrer nächsten Nähe. Junge Wellensittiche konnten ungehindert ausfliegen und wurden weder im Nistkasten noch draußen belästigt. Ich würde auch bedauern, wenn ich die hübschen und stattlichen Tarantiner wegen Zankhaftigkeit entfernen müßte. Unter sich also friedfertig, gegen andere Unzertrennliche bissig, in größeren Räumlichkeiten zum Zusammenhalten mit Sittichen u. a. unter Umständen geeignet, so lautet mein vorläufiges Urteil über tarantinische Unzertrennliche.

Als friedlich habe ich stets die orangeköpfigen Unzertrennlichen gefunden, sowohl mit andern ihrer Gattung als auch mit Sittichen und Finkenvögeln. Diese niedlichen, kontrastreich gefärbten Wichte sind fast ohne Temperament und führen ein stilles behagliches Dasein. Rußköpfchen und blaue Wellensittiche sind ihre Genossen.

Ein Idealvogel ist das Rußköpfchen. Unter sich und gegen andere stets friedfertig, immer voller Leben, leicht zur Brut schreitend, könnte dieser Unzertrennliche ein ernsthafter Konkurrent des Wellen-

sittichs sein, wenn er überhaupt importiert und zu erschwinglichen Preisen zu haben wäre. Ich besitze mehrere Paare, die in diesem Jahre trotz fleißigen Brütens bisher nur negative Erfolge erzielt haben. Für Einzel- und Gesellschaftskäfig ist das Rußköpfchen ebenso empfehlenswert wie für die Vogelstube und Außenvoliere.

Das Gegenteil davon ist ein weiterer Unzertrennlicher, der Rosenpapagei. Ich pflege seit Jahren mehrere dieser hinsichtlich Färbung wohl am ansprechendsten aller Agapornidae. Zurzeit halte ich in einem Käfig von 1 × 1 × 0,60 2,1, die sich sehr gut vertragen. Mehrere Paare kann man zusammensetzen, doch nicht ohne weiteres solche mit überzähligen Männchen, besonders dann nicht, wenn Zuchtversuche beabsichtigt sind. Es entstehen sonst ernsthafte Beißereien, die den Verlauf der Brut stören und mit Beinschäden enden. Vor der Schnabelkraft der Rosenpapageien habe ich einen mächtigen Respekt bekommen. Mit andern Vögeln sind sie nicht zusammenzuhalten, eignen sich also vorwiegend zur paarweisen Käfigung. Im vorigen Jahre entkam ein Männchen durch Umbiegen einer schlecht befestigten Ecke im Drahtgeflecht, während ich zufällig anwesend war. Sofort war eine arge Beißerei mit den Tarantinern im Gang, der ich mit dem Fangnetz ein kurzes Ende bereitete.

Die Nymphensittiche, 1- resp. 2jährige Tiere, benehmen sich gesitteter als ich von vornherein annehmen zu können glaubte. Selbst friedlich, gehen sie jedem Angriff aus dem Wege und sind rechte Hasenfüße, die ängstlich umherflattern, wenn sie erschreckt werden. Nymphen eignen sich bekanntlich vorzüglich zum Zusammenhalten mit Wellensittichen, womit sie sich in angenehmen Gegensatz zu den ungleich schöneren und intelligenteren Singsittichen stellen. Mit kleinen Vögeln wird man sie nicht zusammensetzen, schon wegen des Größenunterschiedes und der dadurch bedingten Beängstigung der Kleinen.

Vor etlichen Jahren hielt ich ein Paar graue Kardinäle, die durch ihr anziehendes Gebahren auf dem Boden sehr zur Belebung der Voliere beitrugen. Im Käfig wirken diese großen Gesellen klobig, für die Freivolieren sind sie wie geschaffen. Die Kaptäubchen, die ich damals hielt, verfolgten sie zeitweise so heftig, daß ich diese herausfangen mußte. Als sie danach auch andere Vögel zeitweise verfolgten, fing ich die schönen Vögel heraus und gab sie ab. Im allgemeinen sind Kardinäle friedfertige Vögel, die man mit gleichgroßen zusammenhalten kann. Mein Pärchen war brutlustig und deswegen erregt, weil sie sich beim Bau ihres Nestes, das über die Anfänge nicht hinauskam, von andern gestört fühlten.

Zum Schluß will ich noch einen Bewohner meiner Vogelstube erwähnen, der mir in der kurzen Zeit seines Besitzes ganz besonders ans Herz gewachsen ist und über den ich später ausführlicher berichten werde, den Königsglanzstar — Cosmopsarus regius. Dieser bewohnt die dritte Voliere mit den Orangeköpfchen, blauen Wellensittichen und Rußköpfchen, mit welchen er sich vortrefflich verträgt oder besser gesagt, um die er sich überhaupt nicht kümmert. Das Wellensittichmännchen, das sich durch das schimmernde Gefieder angezogen fühlt — so will es mir wenigstens scheinen —, singt ihm des öfteren vor und kommt dabei so nahe, daß er dem unerwünschten Liebhaber den aufgesperrten Schnabel entgegenstrecken muß, eine Aufforderung, die sofort verstanden wird. Ich hoffe binnen kurzem ein Weibchen hierzu nebst einigen weiteren Arten der schönsten Glanzstare zu erhalten, mit denen ich Zuchtversuche anzustellen beabsichtige.

Nymphensittiche.

Nach Tagebuchaufzeichnungen von 1923 u. 1924.

Von Adolf Günther, Lommatzsch.

(Nachdruck verboten.)

Ankunfts- und Abgangszeiten der Vögel werde ich, abgesehen von außerordentlichen, nicht mehr anführen. Es sind ja mit geringfügigen Verschiebungen immer wieder dieselben. In den allermeisten Fällen wird sich's nicht einmal um Verschiebungen handeln, sondern man merkt eben die angekommenen Vögel nicht sofort. Man kann ja nicht beständig auf der Lauer liegen, oft hindert ungünstige Witterung oder dringende Abhaltung an der Beobachtung. Bei mir beschränkt sie sich infolge Überlastung meist auf die Zeit der Gartenarbeit und die des Weges zur beruflichen Arbeitsstätte und zurück. Ungünstige Witterung drückt auch auf die Vögel selbst, so daß sie

dann mit ihren gesanglichen Darbietungen zurückhalten. Man hängt also bei Feststellung der Ankunft der Vögel oft genug vom Zufall ab. Aber die Übereinstimmung der Ankunftszeiten ist so groß — ich schreibe sie seit über 20 Jahren auf —, daß eine Gesetzmäßigkeit unzweifelhaft daraus hervorgeht. In der ersten Märzwoche meldet sich eben die Singdrossel, in der letzten treffen ein Rot- und Blaukehlchen, im ersten Aprildrittel erscheint die Rauchschwalbe, gegen Ende der Kuckuck, in der ersten Maiwoche der Segler, in der zweiten rote Würger, Gelbspötter, Gartengrasmücke usw., in den letzten Julitagen verschwinden die Segler, und so wiederholt sich's alljährlich mit derselben genauen Regel- bzw. Gesetzmäßigkeit. Einzelne Vögel, in denen sich der Zugtrieb zu anderer Zeit oder gar nicht regt, müssen als Aufnahmen außer Betracht bleiben.

Und die Ursache solcher Gesetzmäßigkeit? Wird sie sich aufhellen lassen? Wie ich schon vor Jahren schrieb, drängt sich einem der Gedanke auf, daß zwischen Vogelzug und Erdbewegung um die Sonne Zusammenhänge bestehen. Nur etwa 5 Wochen, nachdem durch diesen Flug die Sonne begonnen hat, sich langsam aus unsern Breiten zurückzuziehen, drängt auch die Vogelschar ihr nach, denselben Weg, südwärts, obgleich ihr der Tisch noch überreichlich gedeckt ist, und nur etwa 7 Wochen nach der Wintersonnenwende treffen die ersten Sänger (Feldlerchen und Stare) wieder hier ein. Wie steht es um diese Bewegung der Vögel südlich vom Wendekreis des Steinbocks? — Zum ersten Male kann ich die Dorngrasmücke am Rande meines Gartens tagelang recht gut beobachten. Ich habe dort Salweiden für meine Bienen angepflanzt. Sie gefallen der Dorngrasmücke, einem lebhaften Vögelchen, dessen Schnabel nicht viel still steht. Oft hebt es beim Singen die Kopffedern.

Einen Finken sehe ich einen Maikäfer zerstückeln. Am 18. 8. bringen Kinder einen Gelbspötter mit hängendem Flügel. Am 23. stirbt er. Es ist unglaublich, wieviele Vögel sich die zarten Flügelknochen an den Drähten zerschlagen oder sich in anderer Weise verletzen. Seit 1909, dem Gründungsjahr unseres Museums, forderte ich unsere Schüler und von Zeit zu Zeit im Lommatzscher Anzeiger auf, mir alle toten und verletzten Vögel zuzutragen. Wieviele habe ich seitdem aus meinem kleinen Beobachtungskreis erhalten! Viele dieser bedauernswerten Geschöpfe habe ich gekräftigt, viele dann verschenkt, viele schwerverletzte getötet, einen Teil ausstopfen lassen, andere geheilte wieder freigelassen. Leider habe ich nur einen verhältnismäßig geringen Teil davon in meinen Aufzeichnungen vermerkt, sonst könnte ich mit Zahlen dienen. Wenn in allen Schulen aufgefordert würde, jeden toten oder verletzten Vogel aufzuheben und mitzubringen: ihre Zahl würde eine deutliche Sprache reden, obgleich natürlich nur ein verschwindend kleiner Teil der Verunglückten gefunden werden würde. Das den Erdball immer mehr umspinnende Drahtnetz bedeutet für die Vogelwelt eine furchtbare Gefahr.

Im März 1924 erleidet eins meiner beiden Schwarzplättchen einen Schlaganfall. Ich erhielt es 1915 als alten Vogel und berichtete bereits früher, wie ihm dabei ein Füßchen verrenkt wurde. Dieser Schaden war völlig ausgeheilt. Der Schlaganfall bringt eine Lähmung desselben Beinchens. Altersschwäche! Der Vogel kann nur noch auf der Schublade umherrutschen. Der Atem geht schnell und trotzdem singt das Tier oft laut. In meinen Auseinandersetzungen mit Rausch im Jahre 1909 würde es für mich zeugen. Mit innerer Bewegung töte ich es schnell und schmerzlos. Vor Jahren wurde einmal, wenn ich nicht irre, in der „Gef. Welt" die Meinung vertreten, daß es unrecht sei, einen leidenden Vogel zu töten. Man solle ihn sterben lassen, wie man den Menschen sterben ließe. Ich vertrete also eine andere Ansicht und bin überzeugt, daß mir der dem Tode geweihte Vogel, wenn er könnte, die Abkürzung seiner Qualen danken würde. Ich könnte es nicht! hört man oft ausrufen. Auch mich kostet's Überwindung, aber ich tue es, weil ich's für die größere Barmherzigkeit halte. Hier möchte ich einmal meine Leser an ein anderes geistig viel höher stehendes Tier erinnern, den Hund. Als ich ihn nur vom grünen Tisch kannte, habe ich über manche Hundeliebhaber gelächelt, wohl auch gespöttelt. Heute kenne ich dieses Tier aus jahrzehntelangem Umgang, und heute ist es mir Ehrensache, die Treue, die es mir gab, auch wieder zu vergelten, namentlich dann, wenn es schwer fällt. Was ist barmherziger, menschlicher, edler: den altersschwach gewordenen Lebensgefährten sich monate- oder jahrelang abzappeln oder ihn an einem Strick zum Abdecker zerren zu lassen (das Benehmen eines solchen Hundes läßt vermuten, daß ihm ein Sinn oder Instinkt sagt, wohin die Fahrt geht) oder ihm ein schnelles Ende zu bereiten?

(Schluß folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Einen Transport brasilianischer Vögel erhielt Mitte des Monats Herr Kleinert. Neueinführungen befanden sich, abgesehen von Pitylus grossus *(L.)* nicht darunter, wohl aber eine Anzahl seltener im Handel befindlichen Vögel, die für die Vogelliebhaberei wertvoll sind. Tangaren waren in vier Arten vertreten: die Purpurtangare, Abttangare, Trauertangare und Kronentangare; an finkenartigen Vögeln Jakarinifinken in mehreren Paaren, die üblichen Safranfinken, Morgenammerfinken und die wegen ihres ammerartig gebauten, aber dabei klobigen Schnabels auffallenden Riesenpfäffchen und Falzschnabelpfäffchen, außerdem eine Anzahl Habias. Von drosselartigen Vögeln befanden sich Köhleramsel, Weißkehl- und Rotbauchdrossel darunter, ferner einige Tyrannen, Rotrückenkassiken, Blauraben, Braunohrsittiche und eine große Anzahl Paare des Rosttäubchens, die fälschlich als Sperlingstäubchen bezeichnet wurden.

Abb. S. 471. **Bastard-Grauedelsänger ♂ × Kanarienvogel ♀** aus einer zufälligen Kreuzung der Eltern. 5 junge ♂♂ wurden ausgebrütet, in Farbe überwiegend an den Vater erinnernd, aber von intermediärer Körpergröße. Vom Kanarienvogel ererbt war in allen 5 Fällen gelber Bürzel, außerdem bei einem Bastard nur ein oder zwei gelbe Fleckchen, bei den anderen außerdem ein oder zwei weiße Schwingen oder Schwanzfedern.

Abb. S. 472. **Ein ungepaartes, halbjähriges Zebramännchen von ihm selbst erbrütete Mövchenjunge fütternd.** Der Zebrafink saß mit den alten Mövchen in demselben Käfig zusammen, schlich in der Dämmerung auch ab und zu in das Nest hinein, was die Mövchen bei Tageslicht nicht zuließen. Die Mövchen legten, brüteten, und der Zebrafink verhielt sich ziemlich ruhig. Da plötzlich eines Tages, als die Eier ungefähr halb bebrütet waren, wurden die Mövchen aus dem Neste verjagt, der Zebrafink nahm deren

Platz ein, vollendete die Bebrütung und zog allein die jungen Mövchen tadellos auf. Ein Stück Vogelpsychologie, welches mir einer Aufnahme wert erschien!

Abb. 467. Gewöhnlicher **Mohrenkopf**, meiner Erfahrung nach einer der angenehmsten unter den mittelgroßen Papageien, sehr zutraulich, wenn man ihn jung erhält und sich ein klein wenig mit ihm beschäftigt. Er hörte bald mit Schreien auf, lernte ziemlich gut ein paar Worte sprechen.

A. Adlersparre.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

J. Bock, Hamburg 22, Hamburger Str. 3a: Blaukopf-Häher (Mexiko), amerikan. Spottdrossel, Mönch-Sittich, sprechend, Glanzstare, 1,1 Sperlingstäubchen.

Eugen Müller, Küllstedt im Eichsfeld: 1,1 Schnurrbärtchen, 1,0 Rotkopfamadine, 1,1 Singsittiche, 1,0 Larvenweber in Pracht, 1,0 Goldstirnblattvogel, 1,0 Klarino.

Frau Klara Neugebauer, Wellensittich-Züchterei, Deutsch-Lissa: Himmelblaue Wellensittiche.

Jos. Porzelt, München, Klarastr. 3: 0,1 Singsittich.

Gustav Rambausek, Wien XVIII/1, Martinstraße 88/4: 1,0 Singsittich.

K. Rinke, Stargard i. Pom.: 0,1 Haussperling, 0,1 Albino, 1,0 Feldsperling mit 2 Jungen.

Off. unter „Berlin" an die Expedition der „Gef. Welt": 1,0 Lazulifink, 1,0 Alariofink, 1,1 Orangeblaufink.



Herrn F. R., Sulingen. Die junge Schopfwachtel ist einer Magen-Darmentzündung erlegen, vielleicht eine Folge der naßkalten Witterung. — Das Ei war das eines Sperbers — Accipiter nisus. Eier dürfen nicht an den Polen angebohrt werden, sondern stets seitlich.

Herrn F. F., Düsseldorf; Herrn J. K., Berlin N; Herrn L. G., Danzig: Beiträge dankend erhalten.

Herrn G. H., Hamburg; Herrn J. L., Mainz, ist brieflich Auskunft erteilt.

Herrn M. Sch., Sprottau. Die weit fortgeschrittene Fäulnis der inneren Organe, besonders der Verdauungsorgane, in so kurzer Zeit läßt den Schluß zu, daß der Vogel infolge einer Erkrankung der letzteren eingegangen ist. Sichere Feststellungen ließen sich nicht machen. Äußeren Verletzungen ist der Vogel nicht erlegen. Eine Freimarke lag der Sendung nicht bei.

Herrn A. S., Troppau. Die erkrankten Vögel müssen warm gehalten werden. Es ist zu versuchen, ob Darbietung erwärmten Getränkes, am besten Pfefferminztee, Abhilfe schafft. Der Tee wird täglich 3—4mal gereicht und wenn der Vogel den Durst gestillt hat, jedenfalls vor dem Erkalten entfernt. Außerdem wird empfohlen, einem derartig erkrankten Vogel vielleicht dreimal täglich den Inhalt eines gekochten Mehlwurms einzuflößen. Die beschmutzten Federn sind sorgfältig mit lauwarmem Wasser zu reinigen.

Herrn H. St., Hannover. 1. Der Quesal gehört zu den Klettervögeln, Familie Nageschnäbler — Trogonidae, Gattung: Pfauentrogon — Pharomachrus. Es gibt davon sechs Arten, die in Mittel- und dem nördlichen Südamerika leben. Der Quesal — Ph. concinna ist prächtig metallgrünglänzend gefärbt, der Unterkörper ist rot. Zwei lange, bandförmige mit ziemlich starren Schäften versehene Oberschwanzdeckfedern haben die mehrfache Länge des Schwanzes, dessen sechs mittleren Federn schwarz, während die drei äußeren auf jeder Seite weiß sind. Einige Flügeldecken sind verlängert und haben sichelförmige Gestalt. Die Kopffedern sind zerschlissen und bilden eine Art Helm; der Schnabel ist gelb. Diese Art lebt in Guatemala und Panama auf den höchsten Bäumen der Bergwälder in Höhen von etwa 2000 m. Die Nahrung bilden hauptsächlich Beeren und Früchte, zuweilen auch Insekten; er nistet in Baumhöhlen. Seine Stimme ist zum Teil klangvoll. Flug und Bewegungen äußerst zierlich. Es ist mir nicht bekannt, ob der Vogel geschützt ist. Es wäre dies immerhin möglich, aber es würde dadurch wohl nur verhindert, daß er oder seine Federn auf den Markt kommen. 2. In Zukunft werden die englischen und soweit möglich die französischen Namen beigefügt werden. 3. Teazle bedeutet Weberkarde — Dipsacus fullonum, oder Kardendistel — D. silvestris, die zum Aufrauhen von Geweben verwendet werden. Das Verbum bedeutet aufrauhen, in übertragenem Sinne necken, quälen, plagen.

Frau E. St., Schweidnitz. Die geschilderte Krankheit tritt in Kanarienhecken bei Witterungswechsel, wenn auf hohe Wärme kaltfeuchtes Wetter folgt, häufig, meist seuchenartig auf. Zu retten sind dann nur die wirklich noch gesunden Vögel, die einzeln gekäfigt, in warmen Räumen untergebracht, bei Trockenfütterung und Verabreichung von erwärmtem Haferschleim gehalten werden müssen. Die Knollenbildung an den Füßen, deren Entstehungsgrund ich nicht feststellen kann, hat mit der Krankheit nichts zu tun, sondern ist eine zufällige Begleiterscheinung.

Herrn M. E., Demmin. Im Heft 29, S. 338 ist die Züchtung der Tarantin. Bergpapageien geschildert. Ein Wellensittichnistkasten mit einer dünnen Schicht Sägemehl auf dem Boden der Höhlung wird auch von ihnen zum Brüten benutzt. Als Futter wurden Sonnenblumenkerne, Spitzsamen, Hirse, Hafer, wenig Hanf, Ameisenpuppen, in Milch erweichter Zwieback und auch Obst gereicht. Wenn Wellensittiche und Bergpapageien zum Nisten kommen, ist es fraglich, ob das friedliche Verhältnis bestehen bleibt. Wellensittiche, besonders Weibchen, durchsuchen gerne auch die Nistkästen anderer und es kann dann leicht zu Störungen kommen. Die Vögel können zusammen in dem Raum überwintert werden, vorbehaltlich des vorher Gesagten.

Herrn Dr. R. P., Klagenfurt. 1. Der tarantinische Unzertrennliche—Agapornis taranta *Stanl.* ist schon vereinzelt in früheren Jahren eingeführt, meist durch italienische Händler aus der Erythräa. Herr Prof. Janda berichtet in der Gef. Welt 1906 über ein von ihm gehaltenes Paar. Im Jahrgang 1924 der Zeitschrift wird über eine gelungene Züchtung berichtet und auch im laufenden Jahrgang, Heft 29 S. 338, wird über eine Züchtung berichtet. Über Verträglichkeit mit anderen kann noch kein abschließendes Urteil gefällt werden, da ja nicht nur Arteigenheiten, sondern recht häufig individuelle Veranlagung dabei mitspricht. Eine farbige Darstellung des rotstirnigen Männchens brachte der Jahrgang 19 der Gef. Welt, sie ist auch in „Fremdländische Stubenvögel" von K. Neunzig vorhanden. Dem Weibchen und den jungen Vögeln fehlt das Rot. Der oben angeführte Name oder der Name „Bergpapagei" sind die üblichen, während die Bezeichnung „rotstirniger Zwergpapagei" oder „rotstirniger Unzertrennlicher" irreführend sind. 2. Bei dem Zusammenhalten dieser Papageien mit Wellensittichen zu Züchtungszwecken dürften Störungen besonders durch Wellensittiche zu befürchten sein. In einem sehr großen Raum könnten Webefinken mit ihnen gehalten werden. 3. Mit Zwergohreulen sind wiederholt Züchtungserfolge erzielt worden (s. Gef. Welt 1888 S. 366 und 1889 S. 386). Jetzt Verkaufspreise für diese Vögel anzugeben, ist sehr schwer. 20—25 M. für das Stück wäre wohl angemessen. 4. Es handelt sich wohl in beiden Fällen um Weißkehlpfäffchen. Das hellere Männchen ist ein frisch gemausertes Stück. Es haben dann alle Federn der Oberseite außer der Stirn, Flügelfedern und die Federn der Kopfbänder hellgraue Säume, so daß der Vogel viel heller erscheint als ein unvermauserter Vogel der gleichen Art.

Herrn E. F., Offenbach. In der einschlägigen Literatur ist überall die Angabe zu finden, daß die Entleerungen einer gesunden Amazone oder eines gesunden Graupapageies aus einem festeren wurmförmigen, schwarzgrünen und einem wässerigen oder breiigen Teil bestehen. Die Amazone, bei der nur der feste Teil der Entleerung vorhanden ist, dürfte durch reichliche Eingabe von Obst (Apfel, Trauben) bald normale Entleerungen haben. Die andere muß warm gehalten werden und es ist ihr als Getränk täglich dreimal erwärmter, dünner Haferschleim zu reichen, der fortgenommen wird, wenn die Amazone den Durst gelöscht hat. In den Anfragen hätte angegeben werden müssen, wie die beiden Amazonen ernährt werden.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

ang 54 1. Oktober 1925 Heft 40

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Ornithologische Skizzen aus Südtirol. Von W. Bacmeister, Heilbronn. (Schluß.)

Neueinführungen und Seltenheiten. Von K. Neunzig. (Forts.)

Meine Körnerfresser. (Schluß.)

Farbenwellensittiche. Aus dem Französischen übersetzt von Dr. Luig.

Meine Erfahrungen mit Zusammenhalten verschiedener Vogelarten in der Voliere. Von A. Krabbe. (Schluß.)

Nach Tagebuchaufzeichnungen von 1923 und 1924. Von Adolf Günther, Lommatzsch.

Kleine Mitteilungen - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Ausstellung - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

utz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

wieder Vorträge zu halten, was lebhaft begrüßt wurde. Herr Oberlehrer Oertel, der als Gast in unserer Mitte weilt, ladet die Versammlung zu den Vorträgen der Ornithologischen Gesellschaft ein, die gewöhnlich am 3. Freitag im Monat in den Pschorrbräubierhallen, Neuhauser Straße, Saal 4, stattfinden und meist über unsere einheimische Vogelwelt gehalten werden. Wer die Vorträge besuchen will, soll seine Adresse Herrn Engel angeben, der dann Tag und Thema durch Karte bekannt gibt. Rudolf Engel, 1. Schriftf.

Der Ausschuß. R. Engel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Käfige u. Gerätschaften

Vogel-Mistelleim

zum Fangen schädlicher Vögel,

Ia klebend bei jeder Witterung, garantiert gebrauchsfähig, Dose 2.— M. fr. von

A. Freitag Nchf., Frankenberg i. S. 6.

Wiederverkäufer hohen Rabatt. [1276

Futtermittel

Mehlwürmer

(Versand beginnt Anfang Oktober)

Ia Ameiseneier

1925er, Pfund 4.50 M.

Ia Weißwurm, 1925er, Pfund 4.50 M.

Ia Muska-Zecken Pfund 1.50 M.

Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen Pfd. 0.75 M.

Die Preise sind freibleibend, ab Lager, ohne Porto und Verpackung. Bei Anfrage Rückporto beifügen. [1277

Bei größerer Abnahme hoher Rabatt.

Karl Claus, Mutterstadt II (Hauptbahnhof).

Mehlwürmer

gegen Voreinsendung von 5.60 M 1 Pfund franko; bei Abnahme von 6 Pfd. 5 M p. Pfd. Porto u. Verp. frei.

Ia Ameiseneier

1925er, 4.50 M per Pfd.

Ia Weißwurm,	1925er	4.50 d. Pfd.
Ia Muska-Zecken		1.50 d. Pfd.
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen		0.75 d. Pfd.
Ia Garnelen, gemahl.		0.35 d. Pfd.

ff. Universalfutter

Alectwa I für Nachtigallen M 2.—
„ II für Grasmücken M 2.—
„ III für Drosseln . . M 1.50

das Pfund ab hier, ausschl. Verp.; bei größeren Mengen billiger. [1278

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser

A. Eckrich II, Waldsee (Pfalz).

Mehlwürmer

veget. gefüttert, 1/4 Pfd. 1.75 M., 1/2 Pfd. 3.25 M., 1 Pfd. 5.60 M.

Wiederverkäufer Rabatt.

Getrock. Ameisenpuppen

à Pfund 5.50 Mark.

Ia Muska (Zecke) à Pfd. 2.00 M.
Ia Weißwurm à Pfd. 4.50 M.

Franko geg. Voreinsend. des Betrages.

Th. Witte, Niederndodeleben bei Magdeburg. [1279

Mehlwürmer Ia Pfd. 5.— M (ohne Spesen) 1/2 Pfd. 3.— M frk. Voreinsend. Jeitner, Breslau, Weinstr. 12. [1280

Zücherwaren:

Verbesserte „L. K.-N."	1/2 kg	Mk. 1,50
Rübsen Ia, 1924er	„	„ 0,50
Rübsen Ia, 1925er	„	„ 0,40
Glanz, Marokko	„	„ 0,50
Hanf, deutscher	„	„ 0,30
Hafer, gesch.	„	„ 0,30
Negersaat	„	„ 0,35
Leinsaat	„	„ 0,40
Silberhirse, weiß	„	„ 0,45
Marokko-Hirse	„	„ 0,30
Senegalhirse	„	„ 0,30
Sonnenrosenkerne	„	„ 0,35
Ia Mischfutter	„	„ 0,45
Blau-Mohn	„	„ 0,70
Ameiseneier, getrocknet	„	„ 4.—

Andere Sämereien auf Wunsch zu billigsten Tagespreisen.

1281] Preise freibleibend!

Lorenz, Dresden, Drehgasse 5.

„ORNIS" Freie Bezugsvereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands.

Gegründet 1912 ∴ Fernsprecher 4198 [1282

Fachgemäße Belieferung mit Vogelfutter („Reform-Normal", individuelle Zusammensetzung bei restlosem Verbrauch; stets frisch gemischt). Hunderte von Liebhabern füttern seit über einem Jahrzehnt mit bestem Erfolg nur „Reform-Normal".

Reform-Normal-Käfige Mod. ORNIS 1925, neue Preisliste erschienen. — Modern eingerichtete Käfig-Bauanstalt mit elektrischem Betrieb.

Anschrift: Ornis-Haus, Halle-Saale. Der Geschäftsführer: Martin Sperling.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.—Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. D. Waschinski & Co., Biesenthal I (Mark). [1283

Ein Versuch

überzeugt jeden von der Güte meines Universalfutters. Preis 2 M. p. Pfd. Sämtliche Futtersorten für Exoten, Wald- und Kanarienvögel zu billigsten Tagespreisen. Versand geg. Nachnahme. Verpackung und Porto werden billigst berechnet. [1284

P. H. Kirsten, Leipzig 3, Zeitzer Str. 53. Fernruf 31445.

Vogelfutter [1285

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,

Tröndlinring 1. Telephon 14958.

Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Ameiseneier

Ernte 1925, Pfd. 5 M.

Weißwurm, Ernte 1925, Pfd. 5 M.
Muska . . . . . „ 3 M.
Universalfutter für Weichfresser
Mischung Ambrosia Pfd. 2.50 M.
„ Luscinia „ 2.— M.
„ Turdus „ 1.20 M.

Frieda Gust. Müller, Berlin SW 61, Blücherstr. 61. [1286

Vogelfutter

Ameiseneier, Weißwurm Muska

Ehe Sie Ihren Bedarf eindecken, lassen Sie sich meine Preisliste einsenden.

E. W. Lenger, Berlin N 58,

Schönhauser Allee 70a. [1287

Vögel

Gesangs-Kanarien

gold. Med. präm., neueste Veredelung, empfehle, solange Vorrat reicht, äußerst billig. Schöne, tiefe, tourenreiche Zuchthähne à 8—10—12 M., 3 Stück zus. 25 M., hochf. Vorsänger à 15—18—20 M., 3 Stück zus. 40 M. sowie beste Zuchtweibchen à 3 M., 6 Stück 15 M. Viele Dankschreiben im Besitz. [1288

Fritz Schönfelder

Kanarienzüchterei

Dresden-Kaditz 5.

Stieglitze,

Zeisige, Hänflinge, Girlitze usw.

Liste nur gegen Freimarke.

J. Beck, Stuttgart,

Tierimport. [1289

Verkaufe dauernd junge

Wellensittiche Ia befiedert, kerngesund, i. Freiflug gezüchtet, grün u. gelb, à 5 M.

Saller, Planegg bei München, 1290] Hofmarkstraße 8.

Friedrich von Lucanus „Das Leben der Vögel".

Über diese hervorragende Neuerscheinung unterrichtet eine Ankündigung, die der heutigen Nummer der „Gefiederten Welt" beiliegt. Der Verfasser ist durch seine Forschungen des Vogelzugs weiten Kreisen bekannt geworden und ist auch den Lesern der „Gefiederten Welt" kein Fremder. Aus jahrzehntelangen Forschungen ist eine neue Gesamtbiologie der Vogelwelt entstanden. Der Preis von 24 M. für das glänzend ausgestattete Werk ist nicht teuer. Im Ausnahmefalle bin ich bereit, an mir bekannte Herren das Werk in drei Monatsraten zu liefern.

Alfred Troschütz,

Buchhändler und Antiquar,

Hannover, Große Aegidienstraße 4, Postscheckkonto Hannover 200 (Cruse's Buchhandlung). [1291

Blankopf-Häher (Mexiko) Stck. 15.—
Jg. Gelbhauben-Kakadu Stck. 25.—
Jg., zahmer spr. Gelbkopf Stck. 75.—
Amerikan. Spottdrossel Stck. 50.—
Mönch-Sittich, sprech. l., Stck. 10.—
Papstfinken, in Pracht Paar 20.—
dito (etwas defekt im Gefieder, sonst gesund) . . . Paar 15.—
Indigofinken . . . . Stck. 15.—
Gelbe u. grüne Wellensittiche, Prima Zuchtpaare . 15.— bis 18.—
Glanzstare . . . . . Paar 12.—
Rote Kardinäle, Ia Sänger Stck. 25.—
1 Paar **Sperlingstäubchen** 10.—
Japanische Mövchen, Zuchtpaar 15.—
Ab 1. Okt. **Tiroler Schwarzplatten,** Ia Sänger und andere Waldvögel.
Große Papageitäfige Stck. von 15.— M. an.

1292] **J. Bock, Hamburg 22,** Hamburger Str. 3a.

Voranzeige!

Ab 1. Oktober lieferbar:

Nachtigall, Sprosser, Gelbspötter, Grasmücken, Zaunkönig, Goldhähnchen, Sperbergrasmücken, Trauerfliegenschnäpper, Kuckuck, Zwergrohrdommel, Stieglitze, Zeisig, Rothänfling, Rotkehlchen.

E. Schöndube, Berlin N,

Elisabethkirchstr. 1. [1293

1,0 wirklich Ia prima kleine böhmische **Gebirgs-Singdrossel,** Frühjahr 23, selten schön im Gefieder, völlig zahm, nimmt Wurm aus der Hand, seit Anfang August laut und fleißig im Gesang. Ein besonders angenehmer, lieblicher Zimmer- u. Wintersänger, auch bei Licht, hat von Januar bis April in mondhellen Nächten geschlagen. Seit Frühjahr 24 ununterbrochen im Gesang (während der Mauser halblaut). Wird auch sogleich nach Ankunft singen. Gebe selbige nur in gute Hände ab zum festen Preis von 60.— Mark, einschließlich Verpackung, Porto, Eilboten und 1 Pfd. prima Weichfutter zur Eingewöhnung. [1294

Peter Matzen, Göttingen.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 8. Oktober 1925 | Heft 41

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Von meinen Vögeln.

Von Fritz Braun.

(Nachdruck verboten.)

Recht pharisäerhaft machte ich mich meiner Frau gegenüber mitunter darüber lustig, daß die Frauen so gern Preisverzeichnisse von Mey und Edlich, Gerson und wie diese Geschäfte alle heißen mögen, durch- und durchstudieren, und daß Einkäufe für sie schon an und für sich, ganz ohne Rücksicht auf den durch sie zu erzielenden Nutzen, eine Lust bedeuten. Das war wirklich recht phärisäerhaft, denn was die Vögel und den Vogelhandel angeht, ward ich ja selber immer wieder dieser Sünde bloß. Wie manches Mal schob ich vor jenen vierzig Jahren den Julius Cäsar zur Seite, um die Preisliste von Bode-Leipzig fast auswendig zu lernen, von den Berberlöwen an der Spitze bis zu den winzigen Senegalfinken am Schluß. Mittlerweile ist auch die Welt schon ein Stück älter geworden, und die Preislisten der Tierhändler sehen anders aus. Der Karolinasittich, von dem man damals ein Pärchen für zwölf Mark erstehen konnte, ist aus der Welt der Lebenden verschwunden und führt nur noch im neuem Brehm ein unberechtigtes Dasein, und der lärmende Reisstar oder Paperling, der für fünf bis sechs Mark ausgeboten wurde, ist nachgerade im Vogelhandel eine Seltenheit geworden, so daß ich ordentlich lebhaft wurde, als ich neulich in der „Gef. Welt" einen ausgeboten fand. Mit dem blauen Hüttensänger, dem Rosenbrustknacker und anderen Arten mehr verhält es sich ganz ähnlich.

Am meisten wundere ich mich eigentlich, daß wir über die ursächlichen Zusammenhänge aller dieser Dinge so wenig unterrichtet wurden; wenigstens vermöchte ich nicht bei allen Arten mit Sicherheit anzugeben, ob ihr Fernbleiben vom deutschen Vogelmarkt durch Ausfuhrverbote zu erklären ist oder ob die Art so stark gezehntet wurde, daß sie heute nur noch selten angeboten werden kann. Daß bei dem allen Farmern verhaßten Reisstärling ein Ausfuhrverbot in Frage kommt, ist z. B. doch von vornherein ausgeschlossen. Die „Gef. Welt" hat sicherlich auch in den Vereinigten Staaten von Amerika den einen oder anderen Leser. Da wäre es nun mir und wohl auch vielen Gesinnungsgenossen eine große Freude, wenn diese Zeilen amerikanische Vogelliebhaber dazu veranlassen möchten, uns über solche Fragen einmal einen ausführlichen Bericht zu erstatten. Ist es außerdem nicht auch merkwürdig, daß solche Vögel, die in Nordamerika unsere europäischen Arten in dem Naturhaushalt vertreten (z. B. die artenreiche Familie der Ammerfinken, alle jene Spezies, die in den Prärien die Rolle unserer Lerchen spielen, amerikanische Walddrosseln u. a. m.), so selten im deutschen Vogelhandel angeboten werden, obgleich sie doch namentlich dem geographisch geschulten Liebhaber, der bei ihrem Anblick auch die ganze Umwelt vor seinem geistigen Auge aufsteigen sähe, recht viel zu sagen hätten.

Machte ich eingangs die Bemerkung, daß vielen Frauen der Einkauf von Waren an sich schon Freude bereite, so würde dieser Vorwurf, soweit Vögel dabei in Frage kommen, auch mir gemacht werden können. Wenn Gefiederte für mich unterwegs sind, bin ich immer in einer gewissen Spannung, die dann am höchsten wird, wenn das Kistchen vor mir auf dem Tische steht und es gilt, die Gaze abzureißen, um den ersten Blick in das Innere des Behälters zu werfen.

Oft genug versetzt mich schon der Versandkäfig selbst in gelinden Ärger, wenn ich feststelle, daß dies Kistchen wieder einmal keine Türe an der Schmalseite hat. Meiner Meinung nach sollte kein Händler andere Versandkäfige gebrauchen. Kosteten die wirklich zwanzig oder dreißig Pfennige mehr, so würde dieser höhere Preis überreichlich dadurch aufgewogen, daß man die gefiederten Reisenden dann viel leichter in den für sie bestimmten Käfig bringen kann, als wenn man darauf angewiesen ist, die Gaze von der schrägen Vorderseite abzureißen. Ich für meine Person greife dann allerdings stets zum Messer und breche ein Stück Brett aus der Rückseite heraus, denn wenn ich die schräge Vorderseite vor die Käfigtüre hielt, kam es immer wieder vor, daß die Vögel den rechten Augenblick wahrnahmen und in das Zimmer flogen. Das ist in jedem Falle ärgerlich, bei frischangekommenen Vögeln, die nach längerer Reise der Ruhe bedürfen, aber doppelt. Und für mich ist solch ein Ereignis besonders mißlich, weil die Vogelkäfige auf einem Boden stehen, dem der schräge, wohl neun Meter hohe Dachraum, den mächtige Balken kreuzen, ein beinahe kapellenartiges

Aussehen gibt. In diesem weiten Gelaß einen Vogel zu fangen, ist eine recht schwierige Sache, und verkriecht sich ein Neuling dort hinter Kisten und Kasten und Bodenrummel, so gebe ich für sein Leben nicht mehr allzuviel. Außerdem besteht dabei immer die Gefahr, daß der Flüchtling vollends entwischt, denn zwischen den Dachziegeln sind, namentlich hoch oben an der Firste, eine ganze Anzahl zollgroßer Löcher, durch die sperlingsgroße Vögel bei gutem Willen schon entwischen können. Aber dennoch nutzen nur wenige diese Gelegenheit; in der Regel sind das solche Arten, die auch draußen das Schlüpfen und Huschen durch Löcher und schmale Lücken gewohnt sind: Sperlinge, Meisen, Rotkehlchen und ähnliche mehr. Doch auch für die gilt das nicht ausnahmslos und nur während der ersten Zeit der Gefangenschaft. Ich persönlich hatte immer den Eindruck, daß die frische Luft denen den Weg weist, während der schon Jahr und Tag im Käfig lebende Vogel darauf gar nicht mehr achtet. Gelingt es solchen Tieren, aus ihrem Behälter zu entfliehen, so sind in der Regel alle ihre Sinne auf die Vogelkäfige und deren Insassen gerichtet. Fortwährend hängen sie an den Drahtwänden und streben denen auch zu, wenn sie verfolgt werden. Dagegen fliegen sie nur selten in die Höhe, um das Gebälk in dem verhältnismäßig dämmerigen Dachraum aufzusuchen. Dorthin gehen sie zumeist nur, wenn sie schlafen wollen. Schütteln sie sich frühmorgens den Schlaf aus den Federn, so fliegen sie auch schon wieder zu den Käfigen hinab und denken gar nicht daran, hoch oben an der Dachfirste nach einem Weg ins Freie zu suchen. Augenblicklich treiben sich auf dem Bodenraum ein Wellensittich und ein Feldspatz herum. Den Grünrock, der in seinem Käfig ein- und ausfliegt, könnte ich allstündlich fangen, aber er sitzt dann so mißmutig da, daß ich ihm immer wieder selbst die Tür zur Freiheit öffne. Bei dem Feldsperling besteht das entgegengesetzte Verhältnis. Dieses Spätzlein denkt gar nicht daran, in einen Käfig zu gehen, und da er überall verstreutes Futter und Wassernäpfe vorfindet, besteht für mich auch gar keine Möglichkeit, den Ausreißer durch Hunger und Durst zur Ruckkehr zu zwingen. So wird er denn wohl sein freies Leben, das für ihn ersichtlich ein Leben voller Wonne bedeutet, solange fortsetzen, bis die Vögel im November in ein Wohnzimmer übersiedeln und dann der Hunger dem Spätzlein den Weg in das Bauer weisen wird.

In diesen Bodenraum entschlüpfte neulich auch ein eben angekommenes Webermännchen, das mit vielen Genossen in einem türenlosen Versandkäfig gereist war. Eine Weile flog der Vogel von Käfigwand zu Käfigwand, aber als ich ihn dort haschen wollte, schwang er sich plötzlich ins Gebälk hinauf und stieg von Balken zu Balken empor, bis ich ihn dicht unter einer Dachziegelscharte aus den Augen verlor. Weil ich ihn hierauf nicht mehr erspähen konnte, nahm ich als sicher an, daß er sich empfohlen habe und pfiff entsagungsvoll: „Behüt dich Gott usw.“.

Am nächsten Morgen saß er aber doch auf dem Fensterbrett und schlüpfte im Handumdrehen in einen kleinen Käfig, dessen Boden mit Hirse bestreut war. Anfangs erschien er mir etwas verstört und miesepetrig, als er aber drei dicke Mehlwürmer zu sich genommen hatte, wurde er zusehends spannkräftiger.

Als ich in der Kladde soweit gekommen war, ging ich für einen Augenblick auf den Boden, um nach meinen Gefiederten zu sehen, und siehe da, der Zufall schien mich bei dem Thema, das ich gerade behandelte, unterstützen zu wollen, denn auf dem nächsten Flugbauer saß ein Rothänfling, der eben erst ausgerückt war. Weil es schon dämmerte, beschloß ich zu warten, bis er seinen Schlafplatz aufgesucht hätte. Dabei wunderte ich mich nun, wielange auch der Feldspatz mit dieser Maßregel zögerte. Erst als es schon ganz gehörig schummerte, schwang er sich zu den Dachbalken empor. Mein Rothänfling aber suchte sich, dem Licht entweichend — die Gelehrten nennen das negativ heliotrop —, fürs erste einen anderen Schlafplatz aus. Er ließ sich auf einem Käfig, der in einen kunstvoll gedrechselten Holzknauf ausläuft und hoch oben auf einem Flugbauer thront — ein Safranfink ist sein Insasse —, in der Weise nieder, daß er, vom Lichte abgewandt, schräge rechts vom Fenster mit dem Holzknauf zu einem Gebilde zu verschmelzen schien. Hätte ich den Vorgang nicht beobachtet, so würde ich den Vogel dort sicherlich nicht gefunden haben. Leider versuchte ich zu früh den Hänfling zu erhaschen. Da folgte er, unsicher flatternd, dem Sperling in das Dachgebälk, um dort im Dunkeln zu verschwinden. Mir aber gab die Wahl seines ersten Schlafplatzes — dieser Vogel ist erst zwei Monate in der Gefangenschaft — doch mancherlei zu denken. Genau so mögen es die Rothänflinge draußen in dem Gezweig der Tannenschonung machen, um sich vor Entdeckung zu sichern.

Von Neulingen, denen meine besondere Teilnahme gehört, möchte ich vor allem zwei nordafrikanische Weißwangenlerchen nennen. Wenn im Ruß von denen gesagt wird, sie seien kaum so groß wie ein Feldsperling, so hat der Verfasser jenen Vogel gewiß nicht zufällig zu dem Vergleich herangezogen, denn als mein ornithologischer Genosse Wiesner neulich diese Lerchen zum erstenmal sah, gebrauchte er unwillkürlich denselben Vergleich. Wenn man nicht genau hinsieht, erinnern die dickschnäbeligen Gesellen mit dem sattbraunen Rücken und den weißen Wangen wirklich sehr an unsere Feldspatzen.

Die eine der beiden Weißwangenlerchen, die ich erhielt, erscheint munter und spannkräftig und der Kot, der auf dem Boden ihres Behälters herumliegt, ist echter, rechter, harter, wurmförmiger, schneeweißer Lerchenkot. Die andere macht zwar nicht den Eindruck eines kranken Tieres, sieht aber, wenn sie so dasitzt, wesentlich breiter und flacher aus, als ihre frischere Artgenossin, fast so wie die Bleientlein aus dem Spielzeugkasten, die in der Waschschüssel hinter dem unwiderstehlichen Magnetstabe einherschwimmen. Auch ihr Kot gefällt mir nicht; mitunter ist er vorschriftsmäßig; dann aber wird er wieder lichtgelb und dickflüssig, so daß ich mich der Annahme nicht verschließen kann, daß in dem Darm des Vogels allerlei Kokken ihr Unwesen treiben. Obgleich ich mir über die Zweckmäßigkeit solches Verfahrens nicht recht im klaren bin, gebe ich dem Vogel doch

reichlich Mehlwürmer, denn ich sage mir, es ist vorläufig die Hauptsache, die Lerche bei Kräften zu erhalten. Wenn die Lerchen zurzeit auch noch vollkommen schweigsam sind, haben sie sich doch durch ihr vernünftiges, zutrauliches Wesen und ihr hübsches Gefieder sofort meine Zuneigung erworben. Sehe ich sie dicht vor mir so ruhig und besonnen umhertrippeln, ohne je hastig aufzufliegen, so denke ich unwillkürlich an alle die ungestümen, fast tobsüchtigen Alpen- und Kalanderlerchen, an deren Behältern ich keinerlei Hantierung vornehmen konnte, ohne vor Aufregung über die Wildfänge einen roten Kopf zu bekommen. So wird es denn auch verständlich, daß ich mir sofort zwei weitere Weißwangenlerchen bestellte und recht traurig war, als ich die Nachricht erhielt, sie seien schon ausverkauft. Traurig, obgleich ich mir sagen mußte, daß vier Lerchenbauer neben meinen achtzehn anderen Käfigen doch etwas reichlich seien. Zusammensetzen könnte ich die schmucken Zwerge aber wohl kaum, denn sie bekamen sich schon in dem Versandkäfig in die Federn.

Sehr viel schmucker als diese Nordafrikaner sieht allerdings der Braunkehlammer aus, der in meiner sonnendurchglühten Veranda hängt, und auch jetzt, da ich dies schreibe, etwas verschlafen zu mir herabblickt. Daß ich ihn kommen ließ, lag wohl an meinen Konstantinopeler Erinnerungen, denn am Bosporus gehörten diese schönen Ammern mit der kurzen, vollen Flötenstrophe zu dem eisernen Bestand meiner Vogelstube. Aber die Frau Erinnerung zeigte auch hier ihren alten, vielgerügten Erbfehler, Vergangenes in allzu sattem Goldglanz zu zeigen, denn mein neuer Braunkopfammer ist das, was seine Vorgänger vor fünfundzwanzig Jahren sicherlich auch waren, ein richtiger Stumpfbold. Am liebsten sitzt der kerngesunde, ranke und schlanke Vogel am Käfigboden, so daß ich auch jetzt von meinem Platz am Verandatisch aus in aller Muße seine Pulsschläge an der gleichmäßigen Bewegung der Rückenfedern zählen könnte. Wenn er das noch ein paar Monde so treibt, wird er wohl aufgehört haben, so rank und schlank zu sein. Doch weil es mir selber ähnlich ergangen ist, will ich ihm daraus keinen allzuschweren Vorwurf machen.

Die Eingewöhnung des großen Raubwürgers (Lanius excubitor).

Beitragsstudie zur Charakteristik des großen Raubwürgers.

Von Arthur Dresler.

(Nachdruck verboten.)

Ich wollte wissen, was an dem Vogel war, den u. a. die materialistischen Philosophen mit Vorliebe als Beweis für die Grausamkeit eines ev. Schöpfers heranzogen. Auch in den ornithologischen Zeitschriften und Büchern figurierte er charakteristischerweise mit den kleinen, von ihm erjagten und auf lange starke Dornen von ihm aufgespießten Vögeln, an derem qualvollen Zucken er sich in infernalischer Lust weiden sollte. Nur in seinem kleineren Verwandten, dem grauen Würger (Lanius minor) hatte er ein gewisses grausames Seitenstück, der aber mehr Fliegen- und Käferfresser ist. Wie denn die ganze Würgersorte: rotköpfiger Würger (Lanius senator), der ja auch jungen und alten Vögeln nachstellen soll, und der rotrückige Würger, ähnlich ethisch gefühlsmäßig bei allen Laien, die von ihrer Raub- und Mordsucht irgendwo gelesen oder gehört haben, bestens verabscheut wird. Nur der eigentliche Liebhaber des Vogelgesangs bzw. der Kenner unter ihnen, beurteilt sie nach dieser interessanten Eigenschaft als Käfigvögel, da die Würger vielfach ausgezeichnete Spötter sind, worunter einzelne von ihnen es bis zur getreuen Nachahmung von 15 verschiedenen Vogelgesängen bringen.

Auch der große Raubwürger soll in jeweiligen Stücken als fleißiger Sänger und Spötter sich

Raubwürger.
Aufnahme von Dr. O. und Frau M. Heinroth.

günstig eingeführt haben — und so wurde auch diese verbürgte Tatsache bestimmend für mich, in seinen Besitz zu gelangen.

Meinen Wunsch zu erfüllen, wollte der Vogelhändler seinem Fänger den Auftrag geben.

„Er tut es gern", sagte er. „Es ist da ein außerordentlich frecher starker Bursche von Raubwürger, der ihm schon zweimal die Lockvögel aus dem Fangkäfig geholt hat. . ."

Nach acht Tagen meldete er mir mit Genugtuung, daß der Raubwürger da wäre . .!

Frisch weg — wild aus der Natur, wie ich ihn haben wollte. Der Vogelhändler hatte ihn in einen verhältnismäßig kleinen und niedrigen Käfig getan, versteckt vor der großen Anzahl der übrigen Vögel, die vor ihrem grausamen Feinde nicht erschrecken sollten. Da saß er etwas scheu geduckt, ängstlich —

unter sich am Boden des Käfigs die Flügel und Steuerteile zerrissener toter Vögel, die der Vogelhändler ihm für den ersten Hunger vorgelegt. . .

Wirklich: es war ein prächtiges starkes Exemplar von Raubwürger!

Zu Hause hatte ich für ihn einen Käfig von 1 m Länge, 18 cm Breite und 25 cm Höhe eingerichtet, derart, daß in der Mitte desselben ein zweizölliger nackter Tannenstamm, gut befestigt, angebracht war, dem ich zwei kürzere Seitentriebe belassen, wovon der eine, entsprechend der Gewohnheit des Raubwürgers, zum Aufspießen seines Fraßes, der Vögel und Mäuse, bestimmt war, während der zweite Sproß dem ersten so nahe und so weit seitlich entfernt stand, daß er ihn bei seiner Arbeit als Sitz benutzen konnte.

Es war das alles vorher genau gesehen und erwogen, daß ich dem Raubwürger als Wildling mit dieser Einrichtung auch das erforderliche Zweckmäßige für seine Natur bot, und nicht erst nachträgliche umständliche Änderungen vorzunehmen hatte — was eben bei der Wildheit und Stärke des Vogels mißliche Momente ergeben konnte. Außerdem hatte sein Käfig noch zwei reguläre Sprungstangen.

Sofort bestätigte er meine Fürsorge. Denn wie ich ihn aus dem kleinen Transportkäfig herausgriff, um ihn seiner dauernden Wohnung einzuverleiben, versetzte er mir mit seinem leichtgebogenen spitzen Schnabel einen blutigen Riß über den Handballen. Dann tobte er gegen das Gitter des großen Käfigs nach der Seite des Lichtes. Es erwies sich als nötig, ihn mit einer großen Decke von der Lichtquelle und dem Zimmerraum abzuschließen — aber ich wollte ihn doch beobachten, und ließ zu dem Zweck in der Decke nach der Tür des Zimmers hin einen Spalteinblick frei, der mir von dem Standpunkt hinter der nur angelehnten Tür gestattete, sein Gebaren zu übersehen.

Der Raubwürger hatte seit seinem Einfangen bei dem Vogelhändler nur ein schmales Frühstück, wie erwähnt, in Gestalt zweier kleiner toter Vögel, zu sich genommen; er mußte sehr hungrig sein. Ich legte ihm zwei tote Mäuse auf den Boden seines Käfigs, entfernte mich, ihm sichtbar, aus dem Zimmer, um still meinen Beobachtungsposten hinter der angelehnten Tür einzunehmen, da der Raubwürger sich nicht dazu verstehen wollte, unter meinen Blicken zur Ruhe zu kommen bzw. den Fraß anzunehmen. Mißtrauisch lugte er durch den schmalen Spalt der seinem Käfig umhüllenden Decke mit dem Ausdruck eines schlauen Verbrechers nach der Tür hin, und es dauerte eine geraume Zeit, bevor der Vogel glaubte die Sicherheit zu haben, daß er bei seinem Fraße, und was dazu nötig war, nicht überrascht wurde. Begehrlich blickte er auf die Mäuse, besah sich den Freßgalgen, sprang ein paarmal auf dessen Auswüchse, packte eine Maus, um sie zwei-, dreimal, immer mit dem Blick nach der Tür, hinter welcher ich gespannt stand, mißtrauisch wieder fallen zu lassen. Aber sein Hunger war stärker — plötzlich stürzte er sich auf seinen pelzigen Fraß, sprang damit auf den Galgen, und begann mit Energie und Eifer zu arbeiten, nach rückwärts zu zerren, wobei er seine Flügel wie zwei kleine Propeller sausen ließ. . . Dann sprang er auf die Seitenstange des Käfigs zurück. Aber nur einige Augenblicke. Den nächsten Moment saß er wieder auf dem Galgen und riß heftig ab: er war beim Fraße. . . Doch nur vier-, fünfmal hackte er zu, um danach wieder die Seitenstange einzunehmen. . . Es hielt mich nicht länger mehr hinter der Tür — als ich langsam zu ihm trat und von oben in den Käfig blickte, duckte sich der Vogel im Hin- und Widersprung. Mit Freude erkannte ich, daß der Raubwürger meine Einrichtung begriffen und benutzt hatte, ein Stück Offenbarung seiner Natur: die Maus war von ihm von ihrem Hinterteile aus bis zum Hals ihrer ganzen Körperlänge nach auf den gespitzten, etwa bleistiftdicken Seitentrieb des Tannenstammes aufgezogen, der abgerissene Kopf der Maus lag am Boden, der blutige Stumpf ihres Halses ragte zum Fraße des Raubwürgers. Noch duckte er sich wie ängstlich. Merkwürdig: der Vogel verriet deutlich ein schlechtes Gewissen. Ich ließ ihn in Ruhe. Nach einer Stunde etwa bemerkte ich von der Maus nur noch den vorher abgebissenen Kopf, die Füße und den Schwanz, die im Sand des Käfigs lagen. Später stieß er das unverdaute Fell der Maus aus, gleichwie die kleineren Artgenossen die unverdaulichen Reste an Käferhorn und Leder usw. als Ballen auswerfen.

Gleich darauf holte er sich die zweite Maus, um sie in der beschriebenen Weise ebenfalls sehr geschickt auf den Dorn zu spießen. So verzehrte er den Tag über vier, auch fünf Mäuse, die offenbar eine sehr begehrte, zarte, blutreiche Nahrung für alle mäusejagenden Raubtiere darstellen.

Ich sagte oben, daß das Gebaren des Raubwürgers bei seinem Fraße deutlich ein übles Gewissen erkennen ließ — (hoffentlich löst diese meine Bemerkung kein Lächeln aus!), das er übrigens mit den meisten Raubvögeln und Raubtieren gemeinsam hat, die, noch in Wildheit, das beobachtende Auge des Menschen nicht gewöhnt sind: im Unterschied von unseren harmlosen gefiederten Sängern, die, frisch eingefangen, zuerst zwar etwas hastig ängstlich ans Futter gehen, aber doch nicht diese markanten Zeichen eines schlechten Bewußtseins verraten. Es ist dies bei den Tieren unverkennbar und ein interessantes psychologisches Moment, dessen Identität mit höheren Bewußtseinsstufen der Lebewesen aufsteigend festzustellen ist.

Erst nach 14 Tagen konnte ich die den Käfig verhüllende Decke — ihn allmählich von Tag zu Tag freier davon machend — gänzlich entfernen. Aber noch weiterer 8 Tage bedurfte es, bevor der Raubwürger ohne besondere Scheu in meiner — nicht allzu nahen — Gegenwart seine Arbeit des Aufziehens und des Fressens vornahm. Seine Raubnatur und Freiheitsinstinkte, da er nunmehr ja gefüttert wurde und keine Gelegenheit mehr hatte sie in aller Schärfe einzusetzen, schliefen ein. (Fortsetzung folgt.)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

In der Arbeit „Aus dem Vogelhause des Berliner Zoologischen Gartens“ (s. S. 457) ist bereits darauf hingewiesen, daß sich dort drei Arten einer

kleinen Nashornvogelform, des Toko befinden, die wohl geeignet sind, auch in den Reihen der Vogelliebhaber, welche über größere Räume verfügen, Verehrer zu finden. Man täusche sich nicht über die Größe der Vögel.

Der Rotschnabeltoko — Lophoceros erythrorhynchus *Tem.*

(s. Abb. S. 457) hat von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze gemessen, eine Länge von 400 bis 500 mm, unsere Elster ist 450 mm lang. Wenn weiter in Betracht gezogen wird, daß der Schwanz des Rotschnabeltoko etwa 200 mm lang, daß der Hals ziemlich lang und der Schnabel 70—90 mm mißt, so haben wir in den Tokos nicht etwa allzu große Vögel vor uns, deren Größe sie für die Haltung im Zimmer nicht geeignet erscheinen ließe. Für die Haltung in Gesellschaft kleiner Vögel, etwa in einer bevölkerten Vogelstube, sind sie natürlich ebensowenig geeignet wie die meisten großen Papageien oder Rabenvögel. Hier würden sie wie ihre größeren Verwandten keine Gelegenheit vorübergehen lassen, um einen ihnen nahen kleinen Vogel wegzuschnappen und zu verzehren. Sie gehören in einen großen Käfig von etwa 1 m Länge mit zwei dicken Sitzstangen. Das genügt dem Bewegungsbedürfnis der Tokos, die durchaus keine langweiligen Vögel sind, wenn sich der Pfleger mit ihnen soviel beschäftigt wie es bei der Haltung großer Papageien geschieht. Sie lassen dann sehr wohl ahnen, welche absonderlichen Gesellen sie eigentlich sind, wenn sie auch nur selten ihre Stimme so laut vernehmen lassen wie in der Freiheit, während der Fortpflanzungszeit. Seine Stimme besteht aus einem einzigen Laut, der sehr oft kurz hintereinander, zuweilen minutenlang ausgestoßen wird. Die einen nennen diesen Laut „wohltönend", nach Heuglin ist er aber etwas hart und mißtönend, aber voll und pfeifend und klingt etwa wie „tlui—dui, tlui—diu, tlui—diu" in allen möglichen Variationen und Steigerungen. Jeder Laut wird von einer nickenden Kopfneigung begleitet, deren Schnelligkeit sich ebenso steigert wie die Schnelligkeit der nach dem Ende seines Vortrages hervorgestoßenen, kurz hintereinander folgenden Rufe.

Sehr merkwürdig ist das Brutgeschäft der Tokos, wie aller Nashornvögel. Die Nashornvögel wählen zu Nistständen eine weite Baumhöhle, deren Öffnung das brütende Weibchen nach Reichenow mit dem eigenen Kote, nach andern mit Lehm, Erde, Kuhmist, nach Brehm aus einem Gemisch von Lehm, und dem eigenen Kot zumauert, so daß nur eine kleine Öffnung übrigbleibt, durch welche das brütende Weibchen vom Männchen gefüttert wird. Auch über die Größe der verbleibenden Öffnung gehen die Mitteilungen auseinander. Livingstone fand die Öffnung so groß, daß der Vogel noch gerade durchschlüpfen konnte, während Fischer ein Nest in der Höhlung einer alten Akazie fand, deren spaltartige Öffnung mit Lehm fest verstopft, nur eine kleine rundliche Öffnung fand, so groß, daß größere Heuschrecken durchgebracht werden konnten. Während des Brütens mausert das Weibchen vollständig und öffnet die Nisthöhle erst, wenn die erbrüteten Jungen, anscheinend 2—3, völlig flugfähig sind. Man sieht dann Alte und Junge in Flügen vereint, die an Zahl stets zunehmen und oft nach Hunderten zählen, durch den Wald ziehen. Nach Brehm verzehren sie dann die am Boden umherliegenden reifen Baumfrüchte. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich in Früchten, die auch aus den Pflanzungen geraubt werden, Beeren, Knospen, Raupen, Käfern, Schmetterlingen und Gradflüglern, besonders Heuschrecken. Um die Beute in den Schlund zu befördern, ergreift er sie mit der Schnabelspitze, wirft den Kopf etwas zurück und läßt sie in den Schlund heruntergleiten. Niemals fliegen die Tokos über weite Strecken. Ihr Flug ist ein leicht wellenförmiger Gleitflug, der durch einige kräftige geräuschvolle Flügelbewegungen eingeleitet wird. Die Haltung des aufgebäumten ist sehr zierlich. Der meist wagerecht gehaltene Kopf ruht auf dem S-förmig zurückgelegten Hals, der lange Schwanz hängt fast senkrecht herab.

Rotschnabeltoko.
Aufnahme des Zoologischen Gartens in Berlin.

Sie sind wie alle Gattungsverwandte Baumvögel, welche den lichten Buschwald, Hochbäume, an Regenstrombetten dem dichten Hochwald vorziehen. Ein hervorstechender Zug ihres Wesens ist ihre Neugierde. Sie achten auf alles, was in ihrer Nähe vorgeht und zeigen eine wirkliche oder vermeintliche Gefahr durch lautes Geschrei an. Trotz dieser steten Aufmerksamkeit sind sie durchaus nicht scheu und zeigen sich bei ihren Streifereien, häufig vereinigt mit verwandten Arten auch in der Nähe der menschlichen Niederlassungen.

Gefiederbeschreibung: Oberkopf schwarzgrau; übrige Oberseite braunschwarz, längs der Mitte des Oberrückens ein weißes Band; übrige Teile des Kopfes, Hals, Unterseite weiß; Ohrgegend, zuweilen auch der nach hinten verlängerte Augenbrauenstreif fein schwarz gestrichelt; kleine Flügeldecken braunschwarz mit weißen Flecken, große weiß; Schwingen mit Ausnahme der weißen mittleren Armschwingen schwarz; Handschwingen mit weißen Flecken auf beiden Fahnen, die bei den ersten außen, bei den innern auch ganz fehlen; die inneren Armschwingen wie oberseits mit weißen Säumen; die äußere mit weißen Flecken auf beiden Fahnen; äußere Schwanzfedern weiß, an der Wurzel schwarz, zuweilen auch mit schwarzem Querband; die vier mittleren schwarz, zuweilen mit weißen Spitzenflecken außer an den beiden mittelsten, die nächste schwarz mit breiter weißer Spitze, zuweilen noch mit schwarzer Querbinde, die folgenden beiden weiß, an der Wurzel schwarz, zuweilen am Enddrittel mit schwarzer Querbinde oder schwarzem Fleck; nackte Augengegend gelblich, Kehlseiten fleischfarben; Auge braun bis strohgelb; Schnabel mit Längsfurchen ohne hornartigen Aufsatz (s. Abb. S. 483) rot, Wurzel, zuweilen auch Spitze gelblich; Firste zuweilen, Unterschnabel an der Mitte bis zur gelblichen Wurzel schwarz; Füße schwärzlich; Lg. 400–500, Fl. 170—195, Schw. 190—230, Schn. 70—90, Lf. 35—40 mm.

Die Verbreitung des Rotschnabeltoko ist eine sehr ausgedehnte. Er lebt in Nordostafrika, Senegambien, Südostafrika (Transvaal bis zum Zambesi) und in Südwestafrika (Benguella, Damaraland). Die Verbreitung des

Gelbschnabeltoko — Lophoceros flavirostris *(Rüpp.)*

ist eine beschränktere. Seine Heimat ist Nordostafrika (Abessinien, Schoa) und Teile von Ostafrika. Heuglin beobachtete ihn in den heißen Tälern von Schoa auf Hochbäumen und im Gebüsch, welches die Brunnen umgibt, oder an den Ufern der Wildbäche wächst. Die Ernährung ist anscheinend die gleiche wie die der rotschnäbligen Art. Er wurde in Flügen von 5—6 Vögeln oder paarweise beobachtet. Speke charakterisiert seine Stimme als ein „sonderbares, an Froschgequarr erinnerndes Geschrei".

Gefiederbeschreibung: Oberkopf schwarzgrau mit Weiß gemischt; Oberseite braunschwarz, weißer Längsstreif auf Oberrücken; Kopfseite, Unterseite weiß, breiter Augenbrauenstreif an Stirn bis zum Genick, Streif in der Ohrgegend, Kopfseiten, Vorderhals fein schwarz gestrichelt; Flügeldecken braunschwarz mit weißen Tropfenflecken; Schwingen schwarz, auf jeder Fahne ein großer weißer Fleck, der auf den mittleren weiß gespitzten Armschwingen sehr ausgedehnt ist und auf den Außenfahnen der ersten Handschwingen fehlt; innere Armschwingen schwarz mit weißen Säumen; Unterflügeldecken weiß; mittelste vier Schwanzfedern schwarz, die übrigen schwarz mit breiter weißer Mittel- und schmaler weißer Endbinde; Auge hellgelb, nackte Umgebung dunkel, nackte Kehlseiten rot bis rotgelb; Schnabel gelb, Wurzel orange; Schneiden, Spitze schwärzlichrot; Füße schwarzbraun; Lg. 480—540, Fl. 190—210, Schw. 240—260 mm.

Der

Bindentoko — Lophoceros fasciatus *(Shaw)*

ist ein Bewohner des nicht zu dichten sonnigen Waldes Westafrikas (Gabun bis Kongo) und des äquatorialen Afrika. Er hält sich gern an Flußufern und auch in der Nähe menschlicher Niederlassungen auf. Es sind gleichfalls gesellige Vögel, die man paarweise oder in Flügen von 6—8 Vögeln sieht. Ihre Stimme besteht nach Reichenow" in kurzen Schrillauten, die so dünn sind, daß man sie nicht für die Stimme eines so großen Vogels zu halten geneigt ist." Die Nahrung ist die der anderen Arten, ebenso der Flug.

Gefiederbeschreibung: ♂ schwarz mit etwas Glanz auf Oberrücken und Flügeln; Brust und Bauchmitte, Vorderseite der Schenkel, Unterschwanzdecken, Fleck am Flügelrand weiß; Außenfahne der zweiten und dritten Schwanzfedern weiß; Auge braun, nackte Umgebung schwarz; unbefiederte Haut an Kehlseite und Unterschnabelwinkel blau; Schnabel mit niedrigem, leistenförmigem Aufsatz kalkweiß, Spitze rot oder rötlichschwarz, längs der Schnabelseite zwei ebenso gefärbte Binden, Dillenkante und Unterkante der Unterkieferäste meist ebenso gefärbt. Füße schwarz.

♀ nackte Hautstellen an der Kehle hellgrünlich- bis orangegelb, die Zeichnungen des kalkweißen Schnabels schwarz. Lg. 500—620, Fl. 230—275, Schw. 200—270, Schn. 80—105, Lf. 32—38 mm. (Fortsetzung folgt.)

Die weiße Bachstelze (Motacilla alba L.) und die gelbe Bach-, Vieh- oder Schafstelze (Budytes flavus [L.]) und anderes.

Von Wilhelm Schreitmüller, Frankfurt a. M.

(Nachdruck verboten.)

Beide Arten sind nahe verwandt miteinander; beide gleichen sich in ihren Bewegungen und Gewohnheiten; beide ahmen im Fluge das Auf und Nieder der Wellen nach und beide drücken durch fortwährendes Schwanzwippen ihre Empfindungen und Gefühle aus. — An den Ufern der Gewässer emsig trippelnd, kopfnickend und schwanzwippend entlang laufend, bald hier, bald da eine Mücke oder ein Würmchen aufnehmend, stoßen sie plötzlich, scheinbar ohne alle Ursache, kerzengerade in die Luft, um irgendein Insekt im Fluge zu erhaschen, mit dem sie sich ebenso steil und schnell wieder herab auf einen Stein am Flußufer fallen lassen, wo sie sich von den spielenden Wellen Zehen und Beine bespülen lassen. Ununterbrochen beweglich, trippeln diese Vögel, oftmals plötzlich flatternd vorwärts rennend — um ein nahe dem Boden schwebendes Insekt zu erhaschen —, an den Ufern auf und nieder; ruhelos, immer beweglich, kopfnickend, zappelnd und trippelnd, schwanzwippend, flatternd und eilend. — Der ewig wippende, sich auf- und abwärts neigende Bachstelzenschwanz ist sozusagen eine Art „Perpetuum mobile", welches (bei Tage) nie stillsteht. Er stellt nicht nur, wie man annehmen könnte, einzig und allein einen Steuerapparat während des Fluges dar, sondern er drückt hauptsächlich auch die wechselnden Empfindungen dieser Vögel aus. Sämtliche seelischen Erregungen und Empfindungen wie: Angst, Zorn, Liebe, Haß, Furcht, Neid, Eifersucht und andere, äußern sich bei den Bachstelzen in dem bald wippenden, bald nickenden Schwanzspiel, das nie zur Ruhe kommt und bald stärker, bald schwächer zum Ausdruck gelangt, weil sich das Empfinden und die seelischen Eindrücke dieser Vögel ständig ändern und immer wieder anders äußern. Während des Fluges bleibt der Bachstelzenschwanz geschlossen.

Aufgescheucht, erheben sich die Bachstelzen plötzlich in die Lüfte und schießen in stark wellenartigen Bogenlinien dahin, wobei sie erregte, aber nicht unsympathische Laute von sich geben.

Raubvögeln gegenüber zeigt sich die Bachstelze äußerst tapfer und angriffslustig. Mutig werden alle Arten Raubvögel verfolgt und angegriffen, wobei sich oftmals 10—20 Vögel (Bachstelzen) dieser Art an

einem Angriff beteiligen. Fast senkrecht steigen die Tiere unter aufwärtsschnellenden, bogenartigen Flugstößen bis zu dem Ziel ihres Angriffs empor, wobei sie ein zeterndes Geschrei und laute Lockrufe erschallen lassen. Gewandt weichen sie dem Gegenstoß des Raubvogels aus und ruhen nicht eher, bis sich dieser entfernt hat.

Ihre Nester errichten sie in Reisighaufen, Holzstößen, auf Dachbalken, in Mauerlöchern, Steinhaufen, im Gebälk von Scheunen, Ställen und Schuppen, aber auch oft freistehend am Boden zwischen überhängenden Grasbüscheln oder an liegenden Baumstämmen usw. — Verschiedentlich fand ich auch schon Nester dieser Arten in sogenannten Mistbeeten zwischen Gurken- und Melonenpflanzen vor, ebenso sah ich solche schon hinter Fensterläden, in Heustapeln und an anderen Orten.

Der Fang der Bachstelze bietet keine besonderen Schwierigkeiten; vermittelst Leimruten (am Wasser), mit dem Schlaggarn durch Mehlwürmer geködert, kann man diese Vögel unschwer fangen. Junge, aus dem Nest genommene Exemplare, lassen sich leicht mit frischen Ameisenpuppen, Insekten und Mehlwürmern usw. aufziehen und werden sehr zahm.

Alt eingefangenen Vögeln dieser Art reicht man (im verhängten Käfig) zuerst frische Ameisenpuppen und Mehlwürmer und gewöhnt sie nach und nach an ein Mischfutter, bestehend aus: Ameisenpuppen, Musca, Weißwurm, geriebenem Eierbrot und Möhre. Nebenbei gibt man ihnen Insekten aller Art und hauptsächlich auch im und am Wasser lebende Insektenlarven, wie: solche der Zuckmücke (Chironomus plumosus), der Büschelmücke (Corethra plumicornis), der Stechmücke (Culex pipiens) und andere.

Besonders die Larven des Chironomus plumosus sind für alle am Wasser Nahrung suchenden Vögel (Wasseramsel, Wasserpieper, Eisvogel, Bachstelzen usw.) wegen ihres hohen Hämoglobingehaltes ein nicht zu unterschätzendes, gesundes und nahrhaftes Futter, welches bisher viel zu wenig bekannt und gewürdigt wurde.

Die Insektengattungen Musca und Chironomus gehören nämlich zu den wenigen, welche denselben Blutfarbstoff wie Wirbeltiere führen, und zwar nicht an Zellelemente (Blutkörperchen) gebunden, sondern gelöst vom Blute. Letzterer Umstand erklärt auch die Tatsache, daß das Wasser über stehengelassenen, aber noch am Leben befindlichen roten Mückenlarven bald einen rötlichen Schein bekommt. Es scheint fast, daß bei in ihren Lebensfunktionen irgendwie ungünstig beeinflußten Tieren (Mückenlarven) eine kleine Menge roten, gelösten Blutfarbstoffes durch die, die Membran darstellende Haut der Chironomus-Larven hindurchwandert oder „diffundiert". — Nicht alle Chironomus-Arten führen Hämoglobin in ihren Larven; sogar die Mehrzahl der Arten dieser Gattung hat ungefärbte Larven.

Im Jahre 1868 bestätigte Lankaster in einer Notiz im „Journal of Anat. and Physiol." 2, 1868, S. 194, Rollets Mitteilungen über den Hämoglobingehalt von roten Chironomus-Larven, so daß es überflüssige Arbeit und Zeitvergeudung wäre, diese Angabe nochmals nachzuprüfen. Auch an Regenwürmern, deren Nährwert für viele Vögel und Fische von manchen Züchtern angezweifelt wurde — wenn allerdings nicht als einzigste Ernährung für Vögel und Fische angewandt werden sollte —, wurde Hämoglobin isoliert; die Analyse solchen Hämoglobins ergab nach A. B. Griffiths, „Proc. Roy. Soc. of Edinbourgh", Bd. 18, 1890, S. 288 bis 294, folgende Zahlen: Kohlenstoff 53,86—53,91%, Wasserstoff 7,02—7,10%, Stickstoff nicht bestimmt worden, Schwefel 0,37—0,47%, Eisen 0,39%. Hämoglobin aus dem Blute von Wirbeltieren ergab nach Hammaster, „Lehrbuch der physiol. Chemie", 1895, S. 144, folgende Zahlen: Kohlenstoff 51,15—54,87%, Wasserstoff 6,76—7,39%, Stickstoff 16,17—17,94%, Schwefel 0,39—0,85%,

Kopf des Rotschnabeltokos (s. S. 481).
Aufnahme des Zoologischen Gartens in Berlin.

Eisen 0,33—0,59%. Über die eigentliche Formel des Hämoglobins ist ein endgültiges Urteil wohl noch nicht abgeschlossen; (?) nur soviel sei an dieser Stelle gesagt, daß das Eisen im Hämoglobin chemisch gebunden ist und nicht als eine Beimengung anzusehen ist. Die blutbildende Nährkraft und Heilwirkung für manche Vögel und Fische durch Kost von der roten Larve von Chironomus plumosus, dem sogenannten „Bloodworm" der Engländer, wird durch den Gehalt an eisenhaltigem Hämoglobin, dem roten Farbstoffe, genugsam erklärt und wahrscheinlich gemacht.

Ich möchte an dieser Stelle noch darauf hinweisen, daß man rote Chironomus-Larven (lebende) auch abtöten*), trocknen und als Beimengfutter (zerrieben) den Vögeln reichen kann. Lebende Chironomus-Larven kann man in allen besseren Vogel- und Zierfischhandlungen während der Zeit von Anfang September bis Ende April eines jeden Jahres bekommen und die Vogelfreunde sollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, um Versuche in dieser Hinsicht anzustellen. In gleicher Weise kann man

*) Durch Überbrühen mit heißem Wasser. Der Verf.

auch getrocknete Daphnien (Wasserflöhe) verwenden. — Doch von dieser Abschweifung zurück zu den Bachstelzen.

Diese sind im Käfig gehalten, recht muntere, liebenswürdige Geschöpfe. Man biete ihnen möglichst geräumige Käfige mit Wachstuchdecke, die nicht zu kurz sein sollen. Die Sitzstangen befestige man so, daß sie in genügender Entfernung von den Seitenwänden des Käfigs angebracht sind, damit sich die Vögel ihre langen Schwänze nicht bestoßen. Ein größerer Stein wird auf den Boden des Käfigs gelegt, auf welchen sich die Bachstelzen gern niederlassen (ebenso wie die Lerchen und Pieper usw.).

Diese Vögel halten sich ebenso wie Lerchen und andere, viel am Boden umherlaufend auf, weshalb man für peinliche Sauberkeit im Käfig zu sorgen hat. Wenn man als Bodenbelag Fließpapier, welches täglich erneuert werden muß, nicht verwenden will oder kann, so sorge man dafür, daß als Bodenbelag ständig eine reichliche Menge sauberer, trockener Sand vorhanden ist, damit sich die Vögel ihre Füße mit dem Kot nicht verschmutzen und verkleben. Badegelegenheit ist reichlich und oft zu bieten. Ein größeres Badehäuschen (mindestens 20×15×15 cm) ist deshalb am Käfig anzubringen. Außer diesem gab ich stets noch einen flachen, etwa 12—14 cm im Durchmesser haltenden glasierten Blumenuntersetzer mit ca. $1\frac{1}{2}$—2 cm hohem Wasserstand in den Käfig hinein, in welchem ich täglich (soweit möglich) einen Kaffeelöffel voll lebender Chironomus-Larven gab, die von den Bachstelzen ständig herausgeholt und verzehrt wurden.

Als Nahrung erhalten sie ein Mischfutter, wie vorher angegeben und außerdem täglich noch 5—6 Mehlwürmer pro Kopf. Während des Sommers muß man auch diesen Arten reichlich frische Ameisenpuppen,

Weibchen. Bachstelze. Männchen.

Insekten, kleine glatte Räupchen, kleine Schaben, Spinnen und anderes bieten, wenn sie die Mauserzeit gut überstehen sollen.

Im Verhältnis zur weißen Bachstelze (s. Abb. S. 484) ist die gelbe-, Vieh- oder Schafstelze (s. Abb. S. 485 und S. 486) etwas empfindlicher. Beiden Arten sollte man, sobald sie eingewöhnt und zutraulich geworden sind, öfter Gelegenheit geben, einige Stunden des Tages (alle 2—3 Tage) frei im Zimmer oder in der Vogelstube umherzufliegen, was zu ihrem Wohlbefinden sehr viel beiträgt. Wer es ermöglichen kann, sollte diese Vögel während des Sommers in einer geräumigen Freilandvoliere, in

welcher sich ein größeres, flaches Wasserbassin befindet, unterbringen; letzteres wird von ihnen oft und freudig benützt.

Im Sommer 1910 sah ich in der großen Freilandvoliere einer mir bekannten Dame weiße Bachstelzen sogar brüten. Die Vögel hatten daselbst ihr Nest in einem halboffenen Nistkasten, wie solche für Rotschwänzchen in Gebrauch sind, angelegt und brachten auch wirklich vier Junge hoch, trotzdem in der Voliere noch eine ganze Anzahl anderer Vögel vorhanden war.

Im kleineren Behälter sollte man Bachstelzen nicht mit anderen zarten und empfindlichen Vögeln zusammenhalten, da erstere, wenn die Futterfrage in Betracht kommt, oft streitsüchtig und zänkisch sind.

Den Namen „Schaf- oder Viehstelze" erhielt die gelbe Bachstelze aus dem Grunde, weil sich gerade diese Art sehr gern auf dem Rücken des weidenden Viehes niederläßt, woselbst sie Bremsen, Stechfliegen, Zecken und anderes Ungeziefer ablest und verzehrt.

Gelbe Bachstelze ♂.

Namentlich die gelbe Bachstelze leistet hierin in Gemeinschaft von Staren, Wiedehopfen und anderen besonders viel, während die weiße Bachstelze dieser Arbeit weniger häufig obliegt. Ich habe oftmals stundenlang dem Treiben der anmutigen Vögel zugesehen, wenn sie von Schafen, Kühen und Ziegen die Insekten herunterfingen. Die Säugetiere lassen es sich ruhig gefallen, wenn die Vögel auf ihnen herumlaufen, und sie von ihren Plagegeistern befreien. (Wir haben hier einen ähnlichen Fall wie bei den Beziehungen des sogenannten Krokodilwächters zum Krokodil und des afrikanischen Kuhreihers zum Elefanten, welche ihren Wirten ebenfalls die Schmarotzer vom Körper ablesen.) Auch Dohlen und sogar Elstern, Fliegenschnäpper und Rotschwänze beobachtete ich öfter bei der gleichen Beschäftigung. Besonders interessant ist es, die gelben Viehstelzen bei dieser Arbeit zu beobachten; trippelnd, kopfnickend und schwanzwippend laufen sie auf dem Rücken der Weidetiere auf und ab und säubern diese von blutsaugenden Schmarotzern. Hierbei kann man häufig beobachten, daß die Vögel plötzlich jäh in die Höhe schießen, um irgend ein in der Luft fliegendes Kerbtier zu erhaschen, mit dem sie sodann auf den Rücken des Viehes zurückkehren, wo sie es verzehren. Ununterbrochen sind diese munteren, flinken und fleißigen Vögel in Bewegung und man wird nicht müde, ihrem interessanten und nützlichen Treiben zuzusehen. Im Vertilgen von Schnaken, Bremsen, Zecken, Stechmücken, glatten Räupchen und anderen schädlichen Schmarotzern leisten gerade die Bachstelzen Unglaubliches, weshalb sie auch zu den nützlichsten Vögeln und besten Freunden des Menschen zählen und überall da, wo sie auftreten, geschont und gehegt werden sollten, denn sie verdienen dies im hohen Maße.

Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten.

Von J. Kuntzendorff, Berlin.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Die Eingewöhnung ist am besten folgendermaßen vorzunehmen: Man mengt kleingeschnittene Früchte oder Beeren, in der Anfangszeit sind Bananen hierfür ratsam, geriebenes, hartgekochtes Ei mit geriebenem Eierbiskuit, und füge diesem Gemenge kleine, nach und nach zu vergrößernde Mengen Ameiseneier bei, die man später durch ein gutes Universalfutter ersetzt, um gleichzeitig die Fruchtgaben allmählich zu verkleinern und geriebene Möhre hinzuzufügen. Neben diesem Fruchtfutter sind noch reichliche Gaben von Obst zu reichen. Als Beigabe ist eine geringe Anzahl Mehlwürmer, 3—5 Stück pro Tag und Kopf, zu geben. Je mehr sie sich an ein Universalfutter gewöhnen, desto leichter gestaltet sich naturgemäß auch die Reinhaltung der Käfige, da die geringere Fruchtnahrung und die vorzugsweise animalische Kost die Entleerungen fester machen. José-Maria Parejo sagt über die Ernährung dieser Arten etwa folgendes:

(Wochenschrift für Liebhaber 1925 S. 102.): „Sie fressen eine große Menge Früchte, für sie sind süße Früchte ohne Säure, wie Birnen, Äpfel, Weintrauben, ein ausgezeichnetes Futter. Saure Früchte, wie Apfelsinen, müssen mit Vorsicht gegeben werden, ebenso auch die sehr nährenden und mehlreichen Früchte, wie Bananen." Mit diesem erkläre ich mich im allgemeinen einverstanden, mit Ausnahme des letzten Zusatzes. Während meiner ganzen Praxis konnte ich in keiner Beziehung irgendeine Schädigung des Gesundheitszustandes der Tangaren durch Fütterung mit Bananen oder ähnlicher mehlhaltiger Früchte feststellen. Genannter Liebhaber führt des weiteren das bei ihm gebräuchliche Futtergemisch an, das mit einem in England hergestellten Pulver — gemeint ist wahrscheinlich Insektenschrot*) — zur Hälfte mit trockenen Insekten oder Ameiseneiern gemischt wird; diesem werden geriebene Möhre und gemahlene, trockene, mit kochendem Wasser überbrühte Feigen beigemengt. Man sieht, im großen und ganzen dürfte dieses Futtergemisch von dem bei uns gebräuchlichen, wie auch dem von mir benutzten, nicht wesentlich verschieden sein. Eine große Furcht hat dieser Vogelwirt vor dem Allzufettwerden der Tangaren, doch meine ich, nach meinen Erfahrungen ist dieses z. T. wenigstens unbegründet. In Flugräumen lebende — und um solche handelt es sich bei den betreffenden Ausführungen — sind sie bei ihrer Lebhaftigkeit und der dort gebotenen Bewegungsmöglichkeiten kaum in Gefahr, durch Ansatz von Fettpolstern zu Schlaganfällen oder Leberkrankheit mehr als gewöhnlich zu neigen, da die stete Bewegung einen solchen Ansatz in den meisten Fällen verhindert. Allerdings, bei in Käfigen gehaltenen Vögeln ist es schon eine andere Sache, da diesen die ausgiebige Bewegung fehlt und sie, im Gegensatz zur Voliere, nur allzu ruhig sind. Hier dürfte der Rat, auch mit den Bestandteilen des Universalfutters möglichst zu wechseln, ein sehr befolgenswerter sein.

Nun ist allerdings darauf hinzuweisen, daß Eichlam bei einer Fütterung mit Bananen als Hauptfutter, eingeweichtem Eierbrot, eihaltigem Weichfutter und hin und wieder einem kleinen Käfer die Erfahrung gemacht hat, daß Tangaren, speziell die Abttangare (Tanagra abbas), innerhalb eines Jahres daran zugrunde gingen, daß sie bei bester Körperbeschaffenheit erblindeten, indem ein dicker, weißer Belag plötzlich die Augen überzog und diesem Krankheitssymptom dann nach einigen Tagen das Eingehen folgte. Genannter Vogelwirt mutmaßt, daß die beobachtete Hinfälligkeit und die Krankheitserscheinung nur auf unrichtiger Ernährung basiert, die eine Blutzersetzung zur Folge hatte. Fügt man diesem die Warnungen José-Maria Parejos hinzu, so kommt man zu dem Schluß, daß an der Mahnung, mit dem Verfüttern mehlhaltiger Früchte vorsichtig zu sein, doch etwas Wahres, zum mindesten etwas Beachtenswertes sein könnte. Mir persönlich ist das Abraten von Eifütterung, Bananen usw. nicht recht verständlich, da ich bei dieser Art der Fütterung nie schlechte Erfahrung gemacht habe und bei mir solche Krankheitserscheinungen niemals eingetreten sind. Eine Mitteilung des Berliner Zoologischen Gartens, der ja gerade der Eifütterung in erhöhtem Maße huldigt, könnte vielleicht über diesen Punkt Aufschluß geben. Es ist somit die Fütterungsweise der Tangaren ein noch gar dunkles Kapitel, und es ist sehr zu bedauern, daß so wenig Pfleger solcher Vögel bisher mit ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit getreten sind. Ein öfteres Publizieren derselben würde viel zur Klärung solcher Fragen beitragen und vielleicht gar manches Vogelleben vor dem Tode retten. Im Interesse der Allgemeinheit wäre es also sehr zu begrüßen, wenn die Liebhaber, die Tangaren verpflegt haben oder verpflegen, die allzu große Bescheidenheit von sich würfen und etwas mehr aus sich herausgingen. (Fortsetzung folgt.)

Weibliche Schafstelze.

*) Vermutlich ein Irrtum des Verfassers. Es handelt sich um ein fein gemahlenes Gebäck. N.

Nach Tagebuchaufzeichnungen von 1923 u. 1924.

Von Adolf Günther, Lommatzsch.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Wer es nicht selbst kann, der gehe mit ihm zum Tierarzt. Und dazu noch etwas. Werde ich gebeten, einen Hund zu erschießen — es ist schon oft geschehen — so rede ich seinem Herrn stets zu, das Tier in seiner letzten Stunde nicht zu verlassen. In seines Herrn Nähe fühlt es sich geborgen, und in solchem Gefühle soll ihm die Kugel im Bruchteile einer Sekunde Bewußtsein und Leben zum Verlöschen bringen. Es handelt sich um unsern und unsrer Kinder Gespielen, um unsern Wächter und Schützer, unsern Gehilfen bei vielerlei Arbeit, auf Jagd und Weide, im Polizei- und Sanitätsdienst, um unseren Gefährten, dessen Lebensaufgabe darin besteht, für seine Herrschaft in vorbildlicher Treue aufzugehen. Wieweit ihm das zum Bewußtsein kommt, bleibt für mich außer Frage. Es wird sich nicht feststellen lassen. Aber es handelt sich um ein geistig so hochstehendes Wesen, daß mir der Gedanke, es könne sich auf seinem letzten Gange zum Hundeschlächter von seiner Herrschaft verlassen fühlen, eine quälende Erinnerung bleiben würde.

Um falscher Beurteilung zu begegnen, will ich dazu noch etwas erzählen. Als ich meine 14jährige todkranke Dachshündin auf tierärztlichen Rat erschoß — ich tat es in einem Augenblick, als sie sich nichtsahnend sonnte — und ich das Gewehr in die Wohnung zurücktrug, da rief meine Frau, ob „Pia" gleich tot gewesen wäre. Ich wollte bejahen, aber meine Stimme versagte, und ich schloß mich einige Minuten ein, um mich erst wieder, ich will sagen, zu sammeln. — Und trotzdem weiß ich, daß ich meinen jetzigen 13jährigen Dachshund, wenn ich ihn überlebe, die Treue, wie ich sie verstehe, in derselben Weise halten werde.

Ich töte also auch jeden Vogel, dessen Zustand mir aussichtslos erscheint. Daß es unmenschlich wäre, Vögel mit schweren Verletzungen fortleben zu lassen, steht für mich fest. Wenn übrigens die Menschen, die den Vorzug genießen, sich bis zu ihrem letzten Augenblick in Schmerzen winden zu dürfen, die Gesetzgebung beeinflussen könnten, dann würden sicher viele Anträge auf Abkürzung solcher Leiden und Qualen kommen.

In meiner Laube nistet ein Zaunkönig. Einmal höre ich ihn seine ganze Strophe im Fluge vortragen. Später hocken die jungen Zaunkönige unten umher, die reizenden kleinen Kerlchen! Ob sie Katzenfutter werden? Die Katzenfrage ist immer noch nicht gelöst. Und doch gibt's für mich nicht den geringsten Zweifel, daß, wenn die Katzenfrage nicht gelöst wird, fast der ganze Vogelschutz für — die Katze ist. Wir können uns um Vermehrung unsrer Singvögel bemühen, soviel wir wollen, wenn wir die Katzen so fort würgen lassen unter dem jungen Nachwuchs, dann schade um alle Bemühungen. Wir liefern damit den Katzen nur reiche Abwechselung in ihrer Beköstigung. Wenn sich die Katzensteuer nicht durchsetzen kann, dann müßte wenigstens für die Brutmonate eine allgemeine Katzensperre angeordnet werden, am besten von Mitte April bis Mitte Juli. Indessen wäre schon viel gewonnen, sie auf Mai und Juni zu beschränken. Hundesperren dauern viel länger. Die bestehende Gleichgültigkeit und Untätigkeit läßt sich nur aus Unkenntnis der Verhältnisse, bzw. Mißstände erklären. Wer dort wohnt, wo die meisten Vogelkinder aufwachsen — sollen und die Warnrufe der Vögel kennt, der weiß Bescheid. Vielleicht versucht einmal unsre rührige Verbandsleitung, die Reichsregierung dafür zu interessieren. Von den Gemeindevertretungen ist nach den bisherigen jahrzehntelangen Erfahrungen nichts, gar nichts zu erhoffen.

Ende August machen mich die Hühner auf 3 große nach dem Süden zu hoch schwimmende Raubvögel aufmerksam.

In diesem Herbste zeigen sich viele Trauerfliegenschnäpper. Ich beringe einige.

Meine beiden Gänse fressen Erde, und zwar so eifrig, daß man auf starkes Bedürfnis danach schließen muß. Ich habe es auch schon an Käfigvögeln, Amseln und Singdrosseln beobachtet.

Ein junger Turmfalk wird mir gebracht. Zu fünf sind sie dem Nest entnommen worden, nur 2 sind leben geblieben, einer wird mir angeboten, weil seine Verpflegung zu teuer wird. Nach einigen Wochen lasse ich ihn, nachdem ich ihm einen Ring angelegt habe, fliegen. Der Versuch mißglückt. Ein lieber Kerl, der sich gern mit uns unterhält. Mäuse sind ihm am willkommensten. Doch frißt er auch Ratten, die kleinere Art, die schwarze Hausratte, die von der stärkeren Wanderratte vertrieben sein sollte, zieht er vor. Auch die schlanke Dach- oder Schiffsratte nimmt er gern. Kleine Vögel nimmt er auch, größere nicht gern. Einmal gebe ich ihm eine fette Raupe des Weidenbohrers. Er greift sie nur zögernd, zerrupft und frißt sie schließlich doch. Aber man sieht es deutlich, der Hunger zwingt ihn dazu. Jetzt ist er im Dresdener Zoologischen Garten. Den Ring ließ ich ihm.

Am 13. Dezember liest ein Bekannter einen braunkehligen Wiesenschmätzer auf. 2 Tage später erhalte ich ihn. Im Käfig liegen Speck, Wurstschalen und Brot. Ich stopfe den Todeskandidaten mit Ei und Mehlwürmern und bringe ihn recht hübsch wieder auf die Beine. Er verzehrt auch mit Appetit Mischfutter, stirbt aber nach ungefähr einer Woche. Also Mitte Dezember ein Braunkehlchen. Das muß ein Irrtum sein. Ich suche in meiner Fachliteratur, ohne Klarheit zu erlangen, und so sende ich den Vogel Herrn Neunzig. Seine Antwort: Der Vogel ist ein ♂ braunkehl. Wiesenschmätzer. Der späteste Termin des Antreffens dieses Vogels in Deutschland war bisher der 15. September. Die schwarzkehlige Art überwintert zuweilen in einzelnen Stücken bei uns, von dem Braunkehlchen ist es nicht bekannt.

Kleine Mitteilungen.

Weiße Wellensittiche. Die seltenste Farbenspielart des Wellensittichs, den weißen Wellensittich, erhielten wir aus unseren diesjährigen Farbenzuchten. Ein aus vier Eiern bestehendes Gelege erbrachte drei weiße und einen blauen Vogel. Echte Albinos sind die weißen Vögel glücklicherweise nicht; sie besitzen keine farblosen roten, sondern die Augen des Wildvogels und kommen auch in der Größe und Flugkraft letzterem gleich. Das im übrigen weiße Gefieder zeigt die diesem Vogel typische Wellenzeichnung

in schwachschattierter Abtönung. Auch die Wachshaut des Schnabels ist beim Männchen leuchtend blau, die Kinnflecken dagegen sind nur hellblau angedeutet. Und das Wesentlichste: keine Spur von Entartung, sondern lebenskräftige Vögel mit schwalbenartig reißendem Flug! Von einem vierten blauen Nestling unterscheiden sich seine weißen Geschwister durch größeren und kräftigeren Körperbau. Jener war gegen sie ganz auffällig zurückgeblieben. Gerade das Gegenteil hätte man erwarten sollen.

Neuß am Rhein, Sept. 1925. Stefani & Sohn.

Milbenvertilgungsmittel „Milbol". Die Milbenplage ist für jeden Vogelzüchter eine große Sorge, wieviel Mühe und Arbeit hat es in jedem Zuchtjahr gekostet, dieses grausamen Feindes Herr zu werden, und wieviel Früchte und Arbeit der Züchter hat die Plage vernichtet, sowie manche Hoffnung zerstört. Welcher Züchter griff nicht zu diesem oder jenem Mittel, welches aber viel Mühe und Arbeit kostete, und immer vergebens war. Jeder Züchter kann seine Lieblinge vor diesen unersättlichen Blutsaugern schützen. Es ist der chem. Industrie gelungen, auf diesem Gebiet ein glänzend bewährtes Radikalmittel herzustellen, welches unter Garantie für den Vogel unschädlich ist, dasselbe wird sehr viel zur Milben- und Ungeziefervertilgung nach den Tropen exportiert.

Wer reine und gesunde Tiere züchten will und den Erfolg sowie das Zuchtinteresse haben will, sollte einen Versuch mit dem glänzend bewährten Mittel „Milbol" machen. Einmaliger Gebrauch hält lange vor, 1/4 Liter Milbol wird mit 5 Liter Wasser verdünnt, die Heckeinrichtungen und Käfige werden mit dieser Lösung gut eingepinselt, kleine Käfige stellt man am besten in ein größeres Gefäß mit Lösung, das Verfahren ist im Verhältnis billiger als alle anderen Methoden. Gebrauchsanweisung liegt jeder Sendung bei. Auf das in Nr. 39 der „Gefiederten Welt" erschienene Inserat wird hiermit hingewiesen. Wegen Portoersparnis Voreinsendung erbeten.

A. Köhler, Cöthen, Kl.-Anhalt.

Bücher- und Schriftenschau.

Meine Lieblinge, die Falken von Dr. Fritz Engelmann. Mit 30 Textabbildungen. 1925. Verlag J. Neumann, Neudamm. Brosch. 3.— M.

In fesselnder Darstellung gibt Verfasser ein Bild einer größeren Zahl deutscher Raubvögel, die er durch langjährige Beobachtung in der freien Natur und liebevolle Pflege in der Gefangenschaft kennengelernt hat, ein Bild, das recht häufig von der landläufigen Anschauung und Beurteilung der gefiederten Räuber abweicht. Im ersten Abschnitt werden die Aare (Weihen) geschildert, und zwar Adler, Mäusebussard, Gabelweihe, Weipenbussard, Hühnerhabicht, Sperber, Wiesen-, Korn- und Rohrweihe. Die „Echten Falken" behandelt der zweite Abschnitt — Turm-, Baum- und Wanderfalk. Er enthält auch Betrachtungen zur Anatomie, Wesensart und Systematik dieser Vögel. Eine Reihe guter Abbildungen zeigt die Schönheit der Aare und Falken, andere dienen zur Veranschaulichung des Textes. Der Verfasser tritt warmherzig für seine besonderen Lieblinge ein und ihrer falschen Beurteilung entgegen. Für den Rückgang des Raubvogelbestandes macht die mangelhaften Schutzgesetze, die zu spät gekommen seien, die mangelhafte Kenntnis der Raubvögel seitens der Jäger und die Sucht, alles Raubzeug zu vernichten, verantwortlich. Allerdings sei in den letzten zwei Jahrzehnten dank des Eindringens des naturwissenschaftlichen Gedankens in viele Kreise die Verfolgung des Raubzeuges gedämpft worden. Daß für das Abschießen der alljährlich von Osten her nach Deutschland vordringenden Adler das „neue" Deutschland verantwortlich gemacht wird, ist unverständlich. Im „alten" Deutschland war es doch nicht anders. Durch eine weite Verbreitung des sehr hübschen Buches wird sich die Ansicht immer mehr Geltung verschaffen, daß, wer die Tiere der Felder und des Waldes durch Vernichtung ihrer Feinde, des Raubzeuges, schützen will, kein Freund, sondern ein Feind der Natur und ihrer schönsten Geschöpfe ist, denn auch die „Räuber" unter den Tieren, besonders aber die Raubvögel, sind schöne, charakteristische Gestalten unserer Heimat und dürfen nicht ausgerottet werden. Das Buch wird unseren Aaren und Falken neue Freunde werben, ei Erfolg, den auch das Wiederaufleben der „Falknerei", de ein Teil des Buches gewidmet ist, herbeiführen wird.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten

R. Aeschbach, Zürich IV, Pflanzschulstr. 95: Steinröte
G. Behnke, Berlin O 34, Petersburger Straße 29: Sprosser Drosselrohrsänger, Pirol, Wiedehopf, Teichrohrsänger Schilfrohrsänger, Sperbergrasmücken, Müllergras mücken, Bachstelzen, weiße und gelbe, Blaukehlche Halsbandregenpfeifer, Steinkauz, rotrückige Würger.
J. Bock, Hamburg 22, Hamburger Str. 3a: Blaukopfhäh (Mexiko), amerikan. Spottdrossel.
Frank, München, Gabelsbergerstr. 9: 1,1 rote Kardinäle 1,0 Kappensai, 1,0 Dreifarbentangare, 1,0 Blaukappen tangare, 1,0 Blaunackenorganist, 1,0 Hahnenschweif witwe, 1,1 violettblaue Organisten, 1,0 Wagler Trupial, 1,0 Olivendrossel, 1,0 Bülbülamsel, 1,0 Har lekinwachtel, 1,0 Einfarbdrossel, 1,1 gr. Kubafinken 1,0 Dayaldrossel.
H. v. d. Höh, Köln, Veledastr. 2: Steinkäuzchen.
E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a Edelpapageien.
Friedr. Gust. Müller, Berlin SW 61, Blücherstr. 61 Kaprötel, Sperbergrasmücken, Dorngrasmücken, Drossel rohrsänger, Schilfrohrsänger, rotrückige Würger, Blau kehlchen
E. Schöndube, Berlin N, Elisabethkirchstr. 1: Sprosser Trauerfliegenschnäpper, Kuckuck, Zwergrohrdommel
Eduard Schütze, Eystrup (Weser): 1,1 Rußköpfchen.
Paul Sommer, Leipzig, Elisenstraße 82 I: 2,2 klein Kubafinken, 1,1 Schnurrbärtchen.



Herrn J. L., Mainz. Di mir übersandte Mitteilun hat mich sehr interessiert Aber diese Doktor-Eisenbart kur möchte ich doch nicht weiter empfehlen. Der Verlau dürfte nicht immer ein so günstiger sein, wie es bei den geschilderten Vorkommnis der Fall war. Außerdem ist e doch nicht zu empfehlen, derartige Maßnahmen anzuneh men, wenn vorher nicht ermittelt ist, ob das Übel, das mai bekämpfen will, überhaupt vorliegt.

Herrn H. Wodurch der Federausfall am Hinterkörpe des Würgers verursacht ist, ließ sich nicht feststellen. Frage steller hätte mitteilen müssen, wie der Vogel gefüttert wird ob er ihn schon mit dem kahlen Hinterkörper und wann e ihn erhalten hat. Es kommt jetzt darauf an, den Voge kräftig zu füttern, aber zugleich dafür zu sorgen, daß e nicht zu fett wird. Sodann ist er in gleichmäßiger Wärm von etwa + 20° C zu halten und so aufzustellen, daß e von den herbst- und winterlichen Sonnenstrahlen getroffe wird. Dann ist anzunehmen, daß er sich bei der Mause im Januar und Februar wieder gut befiedert.

Herrn E. M., Berlin-Friedenau, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn St., Neuß; Herrn A. T., Hannover: Beiträg dankend erhalten.

Herrn G. St., Frankfurt a. M. Chrisomitris cardueli ist unser Stieglitz, Ch. tristis, der Trauerzeisig aus Nord amerika, kommt sehr selten zu uns und gilt als weichlich. Car podacus sinaiticus ist eine Form des Karmingimpels, welch auf der Sinaihalbinsel lebt und bisher noch nicht leben nach Europa gelangt ist. Pyranga rubra *(L.)*, die Feuer tangare brütet in den östlichen Staaten der Union, lebt in Winter in Mittel- und Teilen Südamerikas. Sie komm wie die folgende Art selten nach Europa. Pyranga rubricep lebt in Kolumbien und Westekuador. Calospiza tatao, di Siebenfarbentangare aus Französisch und Holländisch Guian kommt selten vereinzelt nach Deutschland.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

rgang 54 8. Oktober 1925 Heft 41

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Von meinen Vögeln. Von Fritz Braun.
Die Eingewöhnung des großen Raubwürgers (Lanius excubitor). Von Arthur Dresler.
Neueinführungen und Seltenheiten. Von K. Neunzig. (Forts.)
Die weiße Bachstelze (Motacilla alba L.) und die gelbe Bach-, Vieh- oder Schafstelze (Budytes flavus [L.]) und anderes. Von Wilhelm Schreitmüller, Frankfurt a. M.
Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten. Von J. Kuntzendorff, Berlin. (Forts.)
Nach Tagebuchaufzeichnungen von 1923 und 1924. Von Adolf Günther, Lommatzsch. (Schluß.)
Kleine Mitteilungen – Bücher- und Schriftenschau – Vom Vogelmarkt – Redaktionsbriefkasten – Aus den Verbänden – Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

utz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung d. Vogelliebhaber, Landesverband Preußen. 1. Vors. Karl Gumprich, Berlin W 50, Nürnberger Str. 44 III; Geschäftsstelle: 1. Schriftf. P. Böhme, Berlin O 17, Rüdersdorfer Str. 69; Kassierer: Erich Merz, Bln.-Friedenau, Wilh.-Hauff-Str. 14. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt". Schriftwechsel grundsätzlicher Art ist an den 1. Vors., im übrigen an die Geschäftsstelle (2. Vors.) zu richten. Geldsendungen: Postscheckkonto Berlin NW 7 Nr. 46155 für Erich Merz.
Nächste Sitzung: Montag den 12. Oktober 1925.

Aus den Vereinen.

Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Postscheckkonto Hannover 56714; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10.

Anmeldungen zur A. Z. bitte ich an den Präsidenten Herrn Horst Wagner in Bruchmühle bei Fredersdorf a. Ostbahn, Lindenstr. 32, zu richten. — Angemeldet sind die Herren Othmar Gabriel, Automerkstätten, Wien V, Laurenzgasse 13; Joseph Heinzmann, in Christian Nissens Kontor, Helsingfors (Finnland), Esplanadg. 21. — Aufgenommen ist Mitgl. Nr. 173 n Karl Rist, Konditoreibesitzer, München, Blumenstraße 15. — Nachstehend die Nummern derjenigen Mitglieder, die trotz schriftlicher Aufforderung den rückständigen Beitrag von 1924 und 1925 nicht bezahlt haben und infolgedessen in der Mitgliederliste gestrichen wurden: Nr. 10, 52, 54, 57, 96, 106, 112, 116, 127, 146, 152, 169, 187, 201, 215, 225, 228, 231, 239, 248, 249, 257, 259, 267, 285, 286, 297, 334, 347. Von folgenden Mitgliedern wird, falls sie es nicht vorziehen umgehend 3,30 M. auf obiges Postscheckkonto einzuzahlen, der rückständige Beitrag durch Postnachnahme eingezogen: Nr. 7, 24, 29, 32, 40, 41, 46, 53 n, 55, 59 n, 76, 92, 97, 101, 105, 109, 117, 123, 138, 139, 142, 145, 149, 157, 158, 160, 165, 167, 174, 176, 177, 185, 190, 194, 195, 198, 208, 223, 227, 242, 252, 265, 268, 274, 276, 277, 283, 287, 288, 293, 294, 309, 310, 315, 316, 318, 319, 321, 322, 327, 329, 336, 340, 357, 363, 366, 367, 368, 375, 376, 384, 388, 390, 395, 399. Es ist dem Vorstand unmöglich für das neue Jahrbuch zu disponieren, wenn die rückständigen Beiträge nicht eingezogen werden. Diejenigen Mitglieder, die die Nachnahme zurückweisen, werden ohne weiteres aus der Liste gestrichen. — Das neue Jahrbuch soll inhaltlich noch umfangreicher werden als das vorige, weswegen ich um baldige Anmeldung von Beiträgen bitte. J. A.: A. Krabbe.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögeln in Apterbeck. Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, in der Wirtschaft Sprave, früher Fritz Lecking, Kirchstraße. Fritz Lecking, 1. Vors.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37 a. Gäste stets willkommen.
J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke, Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde und Geflügelzucht Breslau. Vogelliebhaber Breslaus, wollt ihr euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei nicht endlich auch zusammenschließen, wie es in anderen Städten schon längst geschehen ist? Ein Stamm von erfahrenen Vogelpflegern ist vorhanden, jedoch können Fortschritte nur erzielt werden, wenn alle noch abseits Stehenden sich uns anschließen und unsere mit belehrenden Vorträgen verbundenen Vereinsabende besuchen. Auskunft ert. bereitwilligst P. Spitzner, 1. Schriftf., Ofener Str. 26.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Dessau und Umgegend. Gegründet März 1925. Vereinslokal „Fürst Blücher", Ecke Antoinetten-Leopoldstr. Versammlung jeden 2. Mittwoch, abends 8 Uhr. Nächste Versammlungen am 14. u. 28 Oktober. Exkursion nach Aken unter Führung des Herrn Krietsch am Sonntag den 11. Oktober. Gäste zu den Versammlungen und sonstigen Veranstaltungen gern willkommen. J. A.: Dielitzsch, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Restaurant „Zum Löwentor", Königswall 75.
J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung Freitags, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Blasewitzer Hof". Liebhaber willk. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Eliesenhof", Eliesenstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Mittelthüringens Sitz Erfurt. Sitzung jeden 2. Mittwoch und jeden letzt. Sonnabend im Monat im Vereinsl. „Stadt Chemnitz", Thomasstr. 57. Näh. Auskunft erteilt Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 20. Oktober. A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599

Die Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber hat einen Posten guter, gesunder Abfall-Datteln erwerben können, die sie in erster Linie an ihre Mitglieder, dann aber auch an andere Vogelfreunde und Händler verkaufen will. Solches Fruchtfutter wird schon seit Jahren mit bestem Erfolge von den Hannoverschen Mitgliedern verfüttert, entweder zwischen die Stäbe gesteckt oder zerkleinert dem Futter beigemischt. Die Datteln können lose oder in Kilo-Tüten verpackt zum Preise von 1,20 M. für das Kilo ab Hannover geliefert werden. Aufträge sind an Cruses Buchhandlung, Inhaber A. Troschütz, Gr. Aegidienstr. 4, zu senden. — 57. Mitgliederversammlung am 10. September 1925 im Landesheim, Volgersweg. Anwesend 26 Personen. Neu aufgenommen: Nr. 166. Schotts, Franz, Pastor, Hameln. Nr. 167. Allien, Otto, Landesobersekretär, Hannover. Die Erledigung der zahlreichen Eingänge nahm viel Zeit in Anspruch. Wir haben für unsere Mitglieder allerhand wertvolles Futter preiswert erwerben können. Näheres darüber bringt die nächste Nummer des Mitteilungsblattes. Was nach deren Erscheinen nicht innerhalb weniger Tage bezogen wird, soll von uns künftig ständig an Händler abgegeben werden, damit uns nichts verdirbt. — Unser Mitglied Dr. Weigold schlägt vor, daß jeder regelmäßig kurze Erlebnisse, die er mit seinen Vögeln gehabt hat, aufzeichne. Wir sammeln diese kleinen Berichte und geben sie auch a. Dr. Weigold zur weiteren Verarbeitung. — Der Vorstand besteht bis auf weiteres aus folgenden Mitgliedern: Appe, Determann, Greite, Neuwerth, Schnetter, Schütz, Troschütz. — Das Provinzial-Museum bringt im Oktober eine groß angelegte Naturschutz-Ausstellung anläßlich des Niedersachsentages. Wir haben unsere Mitarbeit zugesagt, wollen für lebhaften Besuch sorgen, während der Ausstellung zur Belebung des aufgestellten Futterhauses lebende Vögel zur Verfügung stellen, und einzelne Mitglieder werden auch tätig bei den Vorbereitungen helfen. — Unser Mitglied Gerbermann hielt einen warmherzigen, gut ausgearbeiteten Vortrag über „Vogelschutz". Er führte aus, daß man Vogelschutz einmal aus Zweckmäßigkeitsgründen treiben müsse, daß die Vögel die besten Ungeziefervertilger wären und daß der Landwirt, Gärtner, Siedler und Forstmann ohne Vogelschutz einfach keine zufriedenstellenden Erfolge aufweisen kann. Wo Vögel richtig geschützt werden, könne sich die verheerenden Waldkrankheiten wenig ausbreiten

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite)

Dabei ist zu berücksichtigen, daß einzelne Bäume von einzelnen Vogelarten besonders bevorzugt werden. Ein Meisenpaar kann 900 qm von schädlichen Insekten reinhalten. In den großen Gärten um Kassel sind beinah 3000 Nisthöhlen aufgehängt, und seitdem das geschehen ist, hat sich die Vogelzahl etwa verzehnfacht. Man kann auch ohne teuere Nisthöhlen mancherlei Nistgelegenheiten durch Brettchen, Überdachungen schaffen und soll die Vögel auch schützen, wenn sie sich gefährliche und ungeeignete Nistplätze aussuchen, wie z. B. Bahnwagen, leere Kisten und dergleichen. In Ergänzung des Vortrages wurde darauf hingewiesen, daß für den Vogelschutz die Schaffung von flachen Wasserstellen zum Baden und Trinken außerordentlich wichtig ist, und zu den merkwürdigen Niststellen brachte Dr. Weigold vor, daß ein Rotkehlchenpaar unter den ausgebreiteten Flügeln eines ausgestopften Birkhahnes eine Brut ausgebracht hat. — Zur Beobachtung des Vogelzuges sollen hin und wieder Nachtwanderungen gemacht werden. — Das Mitglied Böttcher rät dringend, die Vogelkäfige mehr, als es bisher geschieht, durch Einstecken und Auflegen von grünen Zweigen — vor allem eignet sich hierfür die Weymouthskiefer — zu verschönen. Der Vogel freut sich zudem, wenn er Plätze findet, wo er sich etwas verstecken kann. Appel.

Der Hannoversche Vogelschutzverein zu Hannover, gegr. 1881, wirkt mit sichtbarem und anerkanntem Erfolge für Vermehrung und Schutz der Vogelwelt bei Hannover durch Aufhängen von jährlich einigen hundert Nistkästen aller Art, durch Erweckung von Interesse und Liebe für die Vogelwelt mit monatlich, zur Gesangszeit wöchentlich stattfindenden Belehrungsspaziergängen und durch Vorträge und Austausch der Beobachtungen in den jeden dritten Dienstag des Monats stattfindenden Vereinsversammlungen. Seine Bestrebungen dienen also lediglich gemeinnützigen Zwecken. Mitgliederzahl rund 1200, jährlicher Beitrag nur 1 M. Meldungen an den Vorsitzenden Herrn Fritz Becker, Hannover, Boedekerstr. 1 F. — In der Sitzung vom 15. September erstattete zunächst Herr Arens Bericht über die Spaziergänge des Vereins. Es haben seit Juli 1924 im ganzen 19 solcher stattgefunden, darunter 7 in der Gesangszeit des Frühjahrs. Neben einigen interessanten einschlägigen Beobachtungen wurden dabei 77, teils seltene Vogelarten angetroffen, eine geringere Zahl als andere Jahre, was durch fast stete ungünstige Witterung verursacht war. Es beteiligten sich bei den Spaziergängen in Summa 54 verschiedene Personen. Ganz besonders interessiert stets die Leineniederung beim Dorfe „Loatzen", welche im März alljährlich einen Ruhepunkt für nordische Durchzügler bildet, an dem sie passende Verhältnisse für ihre nordische Heimat abwerten. Man findet dann dort regelmäßig neben zahlreichen Kleinvögeln Tausende von Wasser- und Sumpfgeflügel vereint, darunter auch oft genug ganz besondere Seltenheiten. So auch in diesem Jahre. Darauf hielt Herr Hagemann einen interessanten Vortrag über die Vögel, welche den Ländern rings um den Nordpol gemein sind, also in der alten und neuen Welt vorkommen. Eingehend und unter Vorlage der betreffenden Naumannschen Tafeln verbreitete sich der Vortragende über die Vogelarten Deutschlands, die auch in einigen Nordstaaten der amerikanischen Union vorkommen. Abgesehen von den Meeresvögeln waren es fast 50 gemeinsame Arten, die teils als Brut- und Durchzugsvögel, teils als Irrgäste in den Faunenlisten beider Länder geführt werden. Zum Schlusse wurde noch der amerikanischen Vögel gedacht, die mehr oder weniger häufig als Irrgäste in Europa, vornehmlich in Irland und England erbeutet wurden. — Die nächste Sitzung findet Dienstag, den 20. Oktober, abends 8 Uhr, im Landesheim zu Hannover, statt. Vortag des Herrn Ottens über: „Die Vögel der Leineniederung". Nächster Spaziergang: Sonntag, den 25. Oktober, in die Eilenriede, Treffpunkt 9½ Uhr am Kriegerdenkmal. Becker.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste willk. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Versammlung aller 14 Tage Sonnabends. Vereinslokal: Gasthaus „Zur Krone", Jena, Grietgasse. Gäste stets willkommen. Jena besuchende Vogelliebhaber treffen jeden Sonntag vorm. den Schriftführer Adolf Voigt, Jena-Ost, Feodorastraße 13, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube freundlichst eingeladen. Adolf Voigt, Schriftf.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Ges. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an!

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 15. Okt. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Laßner im Volkshaus-Nord, Glogauer Str. 20. Liebhaber willk. J. A.: Friedrich.

Verein der Vogelfreunde Linden. I. Vors. P. Winkel. Linden, Fröbelstraße 9. Sitzung vom 23. September 1925. Anwesend 16 Mitglieder. Unser Vorsitzender hielt einen ausgezeichneten Vortrag über Ameisen. Er erzählte viel Neues, auch über tropische Arten; unter anderem von solchen, deren Bisse wie Feuer brennen, wovon die brasil. Orchideensucher ein Liedchen zu singen wissen. — Nach Besprechung der Eingänge gab Herr Kerl zum besten, auf welche Art und Weise er seine Pflegebefohlenen erworben hatte. So von einem Buchfink, den er aus einem großen Terrarium einer hiesigen zoologischen Handlung zwischen Ringelnattern, Eidechsen und Fröschen herausgekauft hatte. Er hatte vorm Schaufenster den Buchfink schlagen hören und entdeckte ihn in der „gemischten Gesellschaft". — Dann entspann sich eine lebhafte Aussprache über Mimikry. — Der Vortrag über dieses Thema von Herrn Klocke, den Herren unseres Vereins als Gäste im Hann. Verein mitangehört haben, hat gar nicht befriedigt! Es wurde seitens des Referenten wohl über die bekannte und vielumstrittene Schutzfärbung bei Tieren gesprochen, aber nicht über Mimikry. — Die Nachäffung irgendwie geschützter Tierformen durch andere, nicht geschützte, wird seit Bates mit Mimikry bezeichnet; ein Ausdruck, der nach Doz. E. Schild häufig genug unrichtig, zu weit gegriffen angewandt wird. — Auf welch morschen Pfeilern die phrasenschildernde Lehre von der Schutznachäffung ruht, weist neuerdings an der Hand eines reichhaltigen Beweismaterials der Wiener Forscher Heikertinger nach, unbekümmert darum, daß seine Forschungen der Mimikryidee das Lebenslicht ausblasen und die Köpfe ihrer wortfreudigen, streitbaren Verfechter in helle Verwirrung bringen.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Sitzung aller 14 Tage im Restaurant „Zum Neckarstrand", Messeplatz 1. Liebhaber willkommen. Joh. Daubmann, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Käfige u. Gerätschaften

Vogel-Mistelleim

zum Fangen schädlicher Vögel,

Ia klebend bei jeder Witterung, garantiert gebrauchsfähig, Dose 2.— M. fr. von **A. Freitag Nchf., Frankenberg i. S. 6.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [1317

Futtermittel

Mehlwürmer

1 Pfd. 5 ℳ ab hier,
geg. Voreinsendung 1/4 Pfd. 2 ℳ franko.
Großabnehmer Rabatt.

Ia Ameiseneier

1925er, Pfund 4.50 M.

Ia Weißwurm, 1925er, Pfund 4.50 M.

Ia Muska-Zecken Pfund 1.50 M.
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen Pfd. 0.75 M.

Die Preise sind freibleibend, ab Lager, ohne Porto und Verpackung. Bei Anfrage Rückporto beifügen. [1318

Bei größerer Abnahme hoher Rabatt.

Karl Claus, Mutterstadt II
(Hauptbahnhof).

Mehlwürmer

vegetf. gefüttert, 1/4 Pfd. 1.75 M., 1/2 Pfd. 3.25 M., 1 Pfd. 5.60 M.

Wiederverkäufer Rabatt.

Getrock. Ameisenpuppen

à Pfund 5.— u. 5.50 Mark.

Ia Muska (Zecke) à Pfd. 2.00 M.
Ia Weißwurm à Pfd. 4.50 M.

Franko geg. Voreinsend. des Betrages.

Th. Witte, Niederndodeleben
bei Magdeburg. [1319

Mehlwürmer Ia Pfd. 5.— ℳ (ohne Spesen)
1/2 Pfd. 3.— ℳ frk. Voreinsend.
Jeltner, Breslau, Weinstr. 12. [1320

Mehlwürmer

gegen Voreinsendung von 5.60 ℳ 1 Pfund franko; bei Abnahme von 6 Pfd. 5 ℳ p. Pfd. Porto u. Verp. frei.

Ia Ameiseneier

1925er, 4.50 ℳ per Pfd.

Ia Weißwurm, 1925er 4.50 d. Pfd.
Ia Muska-Zecken . . 1.50 d. Pfd.
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen 0.75 d. Pfd.
Ia Garnelen, gemahl. 0.35 d. Pfd.

ff. Universalfutter

Alleckwa I für Nachtigallen ℳ 2.—
„ **II für Grasmücken ℳ 2.—**
„ **III für Drosseln . . ℳ 1.50**

das Pfund ab hier, ausschl. Verp.; bei größeren Mengen billiger. [1321

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser

A. Eckrich II, Waldsee (Pfalz).

Ein Versuch

überzeugt jeden von der Güte meines **Universalfutters.** Preis 2 M. p. Pfd. Sämtliche Futtersorten für Exoten, Wald- und Kanarienvögel zu billigsten Tagespreisen. Versand geg. Nachnahme. Verpackung und Porto werden billigst berechnet. [1322

P. H. Kirsten, Leipzig 3,
Zeitzer Str. 53. Fernruf 31445.

„ORNIS" Freie Bezugsvereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands.
Gegründet 1912 .·. Fernsprecher 4198 [1323

Fachgemäße Belieferung mit Vogelfutter („Reform-Normal", individuelle Zusammensetzung bei restlosem Verbrauch; stets frisch gemischt). Hunderte von Liebhabern füttern seit über einem Jahrzehnt mit bestem Erfolg nur „Reform-Normal".

Reform-Normal-Käfige Mod. ORNIS 1925, neue Preisliste erschienen. — Modern eingerichtete Käfig-Bauanstalt mit elektrischem Betrieb.

Anschrift: Ornis-Haus, Halle-Saale. Der Geschäftsführer: Martin Sperling.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.—Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,**
Biesenthal I (Mark). [1324

Vogelfutter [1325

für **Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser.** Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 18 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.

Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Ameiseneier

Pfund 5.— Mark. [1326

Weißwurm	Pfund 6.— M.
Muska	Pfund 2.50 M.
ff. Eigelb	Pfund 3.00 M.
Waldvogelfutter	Pfund 0.60 M., 5 Pfund 2.50 M.
Zeisig- u. Stieglitzfutter	Pfund 0.75 M. 5 Pfund 3.50 M.
Kanarien-Singfutter	Pfund 0.60 M. 5 Pfund 2.50 M.
Papageifutter	Pfund 0.80 M. 5 Pfund 2.50 M.
Weichfutter	Pfund 1.— M., 5 Pfund 4.50 M.
Orig. Lucullus	1/2 Pfund 1.25 M. 5 Pakete 6.— M.

sowie sämtliche Sämereien aus dem Inserat Nr. 36 der „Gef. Welt". Verpackung frei. Porto extra. Zahlungen erbitte auf mein Postscheck-Konto Berlin Nr. 46657. Bedienung prompt und reell.

Fritz Krüger, Zoologische Handlung, **Charlottenburg,** Pestalozzistraße 87.

Offeriere Vogelfutter in prima Qualität:

Getr. Ameiseneier . .	à Pfd. 3.80 M. 10 Pfd. 36.— M. franko
Weißwurm	Pfd. 4.— M.
Con. Eigelb	Pfd. 2.— M.
Karottengrieß	Pfd. 0.70 M.
Drosselfutter	Pfd. 0.80 M.
Lucullus extra Mischung	1/2-Pfd.-Paket 0.95 M., weiße Packung 0.80 M.
Senegalhirse	Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Silberhirse	Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Algierhirse	Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Kerbtiernahrung f. Kanarien	Pfd. 1.30 M.

Versand per Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. [1327

Paul Tzornack,
Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189.
(Postscheck-Konto Nr. 652 65)
Gegründet 1905.

Mehlwürmer

geg. Einsendung v. 2 M. 1/4 Pfd. franko.
Ameiseneier, Pfd. 4.50, gesiebt 5 M.
Weißwurm . . . . . Pfd. 5 M.
Muska . . Pfd. 2 M., gesiebt 3 M.

Universalfutter

1328]

	I	II	III
Pfund	2.—	1.40	0.80

Waldvogelfutter . . . . Pfd. 0.60
Papageifutter . . . . . Pfd. 0.80
Bei Abnahme von 10 Pfund portofrei.
Händler und Vereine erhalten Rabatt.

W. Hiltmann, Berlin S 14, Dresdener Str. 24.

Prima deutsche Ameiseneier

à Pfund 6.—, bei 5 Pfund à 5.75 M.
Paul Schindler, Inh. B. Schindler, **Berlin N 24,** Elsasser Str. 78. [1329

Vogelfutter Ameiseneier, Weißwurm Muska

Ehe Sie Ihren Bedarf eindecken, lassen Sie sich meine Preisliste einsenden.

E. W. Lenger, Berlin N 58,
Schönhauser Allee 70a. [1330

Vögel

Stieglitze,

Zeisige, Hänflinge, Girlitze usw.

Liste nur gegen Freimarke.

J. Beck, Stuttgart,
Tierimport. [1331

Verkaufe dauernd junge

Wellensittiche Ia befiedert, kerngesund, i. Freiflug gezüchtet, grün u. gelb, à 5 M.

Saller, Planegg bei München, 1332] **Hofmarkstraße 8.**

Gesangs-Kanarien

gold. Med. präm., neueste Veredelung, empfehle, solange Vorrat reicht, äußerst billig. Schöne, tiefe, tourenreiche Zuchthähne à 8—10—12 M., 3 Stück zus. 25 M., hochf. Vorsänger à 15—18—20 M., 3 Stück zus. 40 M. sowie beste Zuchtweibchen à 3 M., 6 Stück 15 M. Viele Dankschreiben im Besitz. [1333

Fritz Schönfelder
Kanarienzüchterei
Dresden-Kaditz 5.

Grüne Wellensittiche

sehr kräftige, blutsfremde Vögel,

ausgefärbte Zuchtpaare	Paar 15.— M.
einzelne Weibchen	Stück 9.— M.
Jungvögel	Paar 12.— M.

gibt ab [1334

Max Kasten, Schwenningen a. N.

Verkaufe

da zu viel Bestand:
1,1 Dayaldrosseln, wundervolle Tiere, bereits 2 Jahre gekäfigt, pro Paar 65.—
1,1 mexik. Graudrosseln, 3 Jahre gekäfigt, herrlich im Gesang und Gefieder, pro Paar 45.—
1,0 Nachtigall, 2 Jahre gekäfigt, aalglatt, wundervoller Schläger, 18.—
1,0 Rotkehlchen, 2 Jahre gekäfigt, aalglatt, sehr guter Sänger, 5.— [1335
Preise sind ab hier ohne Verpckg. u. Porto.
Dr. Sammet, Eisenberg in Thür.

Verkaufe als überzählig mehrere Zuchtpaare (à P. 20 M.) blaubüttige grüne, kerngesunde [1336

Wellensittiche.

B. Schaeffer, A. Z.-Mitgl. 296.
Berlin-Lichterfelde, Marschnerstr. 33.

Waldvögel!

Vom 1. Oktober 1925 bis 1. Februar 1926 kaufe gangbare, eingewöhnte männliche Waldvögel. Tausche gegen **Berliner Flugtauben** aller Art. Auch kleinste Angebote an [1337

Frahm's Zoolog. Handlg.,
Neukölln, Knesebeckstr. 7.

Ia Waldvögel

Rote Gimpel . .	Stck. 5.— M.
Kreuzschnäbel . .	Stck. 4.— M.
Stieglitze	Stck. 3.50 M.
Rote Hänflinge . .	Stck. 2.50 M.
Zeisige	Stck. 2.50 M.
Buchfinken	Stck. 2.— M.

andere Sorten billigst. Händler Extrapreise. Versand per Nachnahme. [1338
In Vertretung: **Paul Würker, Merseburg** bei **Halle a. S.,** Sand 16.

Waldvögel

Stieglitzhähne	3.00 M.
Zeisige, gelb	2.50 M.
Hänflinge	2.50 M.
Buch-, Berg- und Grünfinken	1.50 M.

Garantie für Männchen und lebende Ankunft. Weibchen die Hälfte des Preises. Falls dringende Sendung gewünscht, Porto 5.40 M. [1339

Rudolf Rose, Meuselbach
(Thüringer Wald).

Yorkshire-Kanarien,

importierte Vögel, bietet an [1340

C. Balser, Fulda.

Prima Edelroller

mit tiefen Hohltouren. Große Auswahl, mäßige Preise. 2 Staatsmedaillen. Kanarienfeinzucht seit 1876. [1341

P. Holzky, Cöthen i. A.

Vertausche Rotkehlch., Gartenrotschwanz, Gartengrasmück., Sperbergrasmück., Stieglitz, Goldammer, alles gesunde Männchen, 1342] gegen Ameisenpuppen.

Riedel, Gitterfee, Dresdener Str. 19.

20 Wellensittiche

satinglänzend, 3—4 Monate alt, kräftig, gesund und tadellos befiedert, Stück 10.— Mark. Halbausgefärbte, blutsfremde Paare à 24.— Mark.

Garantie für lebende Ankunft.

K. Uhmann, Hüttenhof

P. Glöckelberg i. Böhmerwalde
Tsh. Sl. R. [1343

Grüne Kanarien, winterh., Paar 8 M., 15 Wellensf. à 3.50 M., [1344
Goldfas. 8,0 à 14 M., diesjähr.
Schlößt. Allersberg b. Nbg.

Gelbmantelloris,

auserlesenes Paar, [1345
Pennantsittiche, Molukkenkakadus (Port-Lincoln-Sittich), gibt ab

C. Balser, Fulda.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 15. Oktober 1925 | Heft 42

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Mein Haidijo.

Von Karl Kepp.

(Nachdruck verboten.)

Schwarzplättchen mit gutem Sang und Schlag hört man öfter in den Gärten unserer Stadt. Und der Schwarzkopf, den ich als meinen besten bisher erstanden hatte, leistete wirlich Gutes in beiden Teilen seines Liedes. Was aber mußte das für ein Wundervöglein sein, von dem Matthias Rausch in seinem „Fürstenbuch" berichtet! Ich hielt es fast für ein Märchen und die berühmten Laute für eine allzu liebevolle Übersetzung ins Menschliche.

Endlich ein Angebot in der „Gefiederten". Auskunft vertrauenerweckend, also mag's kosten, was es will, her mit ihm. Unruhe und Sorge. Endlich, nachts zwischen elf und zwölf vor dem 1. März rüttelt der Eilbote das Haus wach. Der Reisende aus Süddeutschland ist eingetroffen. Wie mag er's überstanden haben?

Der Schindlerbauer steht schon bereit, der Reisekasten wird vorgehalten und — heraus spaziert der kleine Kerl. Aalglatt. Keine Spur von Müdigkeit. Der Sprung wird ausprobiert. Die Scheitelfedern richten sich auf und legen sich wieder zusammen. Er scheint befriedigt und kennt sich aus. Also gesund ist er, und eingewöhnt wird er morgen oder übermorgen sein. Warum auch nicht? Drei Jahre kannte er den Menschen als Pfleger und offenbar als guten.

Ob er nun noch gelockt hat und ein paar Wassertropfen genommen, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, daß ich vollkommen glücklich war und das Tierchen zärtlich liebte, ehe ich seinen Gesang hörte, denn es war wirklich zum Lieben.

Bildschön war das Kerlchen, blitzsauber, tadellos im Gefieder, tadellos gebaut, eher kleiner als groß. Leben in jeder Zehenspitze und voller Grazie. Eine bezaubernde Vereinigung von Zartheit und Kraft.

Die braunen Augen lebhaft ohne Unruhe; umgeben vom schönsten Perlenkranz sahen sie so eigenartig kindlich unter dem samtschwarzen Scheitel hervor. Man sieht's ihm an, das ist die echte Künstlerseele.

Und sie war's in der Tat. Nachdem ich ihn einmal gehört habe, konnte ich nicht begreifen, wie man die Schwarzplättchen, die man sonst hört, hier, in Frankreich, in Flandern, im Osten, noch sonderlich schätzen kann. Allein der Schmelz seines Tones, dessen Jubelstimmung ein ganz zarter Hauch von Leid beigemischt erscheint, war so köstlich und hat mich immer im Tiefsten ergriffen.

Aber zunächst noch einige Farben, die sein Bild lebendig machen. Immer war er sauber und adrett. Anziehend in seiner ganzen Erscheinung, in seinem ganzen Wesen. Jugendfrisch, harmlos und heiter, so recht ein kindlich Gemüt. Immer munter und guten Muts. Ein Schuß Leichtsinn und Sorglosigkeit. Ein Glückskind, das aller Herzen im Sturm gewann.

Ein Zug von Behaglichkeit war ihm nicht fremd. Er liebte wie alle seiner Art mit dem Bauche auf der Stange, dem ovalen Rundholz zu sitzen. Wurde dann der neue Futternapf eingeschoben mit kleingeschnittenen Äpfeln, Birnen, einem Bananenstück, Sultaninen oder einem Dutzend kleiner Feigenstückchen an den Rand des langen Glasgefäßes geklebt — nur wenig Mischfutter und immer viel Holunderbeeren, frische oder eingeweckte —, so erhob er sich gemächlich, reckte sich, indem er das Fersengelenk fast nach vorn durchbog, plusterte sich, machte sich glatt, und indem er blitzschnell die Flügel lüftete, sprang er erst einmal seinen Kreuzsprung durch, ehe er das erste Feigenstückchen mit Energie vom Glasrand löste.

Mehlwürmer bekam er übrigens nicht, dagegen nahm er gern zwei, drei kleine Grashüpfer.

Selbstverständlich erhielt er seine frischen Puppen, ferner Spinnen, Motten und was sonst an lebender Nahrung zusagte. Aber von allem Futter außer Apfel und Holunderbeeren nur wenig.

Er badete nicht wie die anderen mit Gespritz, sondern pflegte sich ganz still der Länge nach ins Wasserglas zu legen, wie ein Vogel auf dem Neste sitzt. Nach einiger Zeit hüpfte er dann heraus und schüttelte sich trocken.

War niemand im Bauer zu sehen, so wußte ich schon, wo er war, und stellte das Wechselglas mit frischem Wasser bereit, damit er hernach kein Badewasser zu trinken brauchte.

Er hatte zu regelmäßigen Zeiten Freiflug, aber er entfernte sich nicht lange und nicht weit von seiner Wohnung.

Er liebte den Schatten und vermied die Sonne. Während andere sich aufplusterten, um die Sonnenstrahlen möglichst auf die Haut kommen zu lassen, fing er alsbald an zu jappen und ins letzte Schattenecken zu flüchten. Das bestimmte dann den Platz für seinen Bauer.

Ich habe wenig besondere Erlebnisse mit ihm gehabt. Nur eins ist mir lebhaft gegenwärtig. Sein Bauer stand hinter dem geschlossenen Fenster. Plötzlich allgemeine Stille im Vogelzimmer nebenan, und ich sehe, wie der Sperber am Haus vorüber fliegt. Mein Haidijo aber war auf den Boden seines Bauers geplumpst, saß da auf dem Bauche und atmete hastig. Erst als ich ihn nach einer Weile anstieß, sprang er wieder hoch und war so munter wie zuvor.

Wie früher erwähnt, war er nicht sehr mutig. Er vermied Gesellschaft. Aber im Gesangswettkampf ließ er sich nicht stillmachen.

Ich erinnere mich, daß ich seinem Wesen und Treiben oft mit leisem Lächeln zusehen mußte, verursacht wohl durch das Gefühl des Kindlichen, das er auslöste.

Übrigens hatte er ein Merkmal, das mit leiser Komik wirkte: Seine Schwanzfedern gabelten sich etwas. Wir haben nicht feststellen können, ob sie so wuchsen oder sich durch sein Anspringen an die Stäbe des Bauers allmählich bogen.

Oft zeigte er in seinen Bewegungen jenes unmerkliche Sichdrehen, Sichwenden, Anhalten, Hin und Her, ein Nicht-gerade-auf-das-Ziel-Losgehen, das wie fahrig erscheint und mir auch bei anderen Mönchen, bei Garten- und Dorngrasmücke, beim Müllerchen aufgefallen ist und wohl im Zusammenhang mit ihrer Lebensweise steht.

Eine erheiternde Stellung nahm er bisweilen an, wenn er während des Freifluges in der Fensterbank war und etwas da draußen seine Aufmerksamkeit erregte. Dann reckte er sich gerade auf und lugte mit seitwärts geneigtem Köpfchen sehr angelegentlich hinaus, während sich die Scheitelfedern sträubten.

Dabei berührten seine gegabelten Schwanzfedern den Boden wie die Zipfel eines sehr langen Frackes, und da er zwar den Hals, nicht aber das Bäuchlein langmachen konnte, so erinnerte er sehr an den Herrn mit den kurzen Beinchen, dessen wohlgepflegtes Bäuchlein sich aus dem Frack hervordrängt. Ein Anblick, der mit seinem munteren Wesen im stärksten Widerspruche stand.

Er war ein fleißiger Sänger, der, wenn ich mich recht erinnere, nur im trüben November auf einige Zeit gänzlich schwieg. Er begann dann wieder mit dem leisen Vorgesang, aus dem sich allmählich Töne des lauten Schlages lösten. Nach der Jahreswende war der Schlag schon zu hören, mit dem Frühling begann er den Vorgesang zu verdrängen. Der Sänger wurde leidenschaftlich und seine Stimme außerordentlich voll und stark. Jetzt war die Zeit, wo sich die Kunst des Schlages voll entfaltete. Damit war der Höhepunkt der Jahresleistung überschritten. Es folgte nun ein Abschnitt, in dem er fast nur noch laut schlug. Es waren laute Bruchstücke, die immer seltener hervorgestoßen wurden, um mit der Mauser allmählich ganz zu schwinden. Hernach begann wieder der leise Gesang, aus dem sich gelegentlich einmal wie ein Erinnerungsmotiv Töne des Schlages erhoben.

Ortswechsel beeinträchtigte seinen Gesang nicht.

(Schluß folgt.)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Die ausländischen Meisen, welche nach Europa gelangen, sind an Zahl und Arten sehr gering. In früheren Jahren war die Buntmeise — Parus varius aus Japan zeitweise ein häufiger Gast in den Käfigen der Liebhaber, häufiger kamen die Kronenmeise — Machlolophus xanthogenys *Vig.* aus Vorderindien, die ja auch jetzt noch vereinzelt eingeführt wird, die indische Graumeise — Parus cinereus *Vieill.* und die Bergmeise — P. monticolus *Vig.* aus Indien. Besser daran als die deutschen Vogelpfleger sind die englischen Liebhaber. Ihnen werden doch häufiger seltenere Formen Indiens und Südafrikas zugänglich. So gelangte eine Anzahl sehr zierlicher Meisen aus dem Himalajagebiet nach England, die leider nur kurze Zeit am Leben blieben.

Da ist vor allem eine kleine Schwanzmeise, die Engländer nennen sie Red-headed Tit. = Rotkopfmeise, die wohl besser

Rostköpfige Schwanzmeise — Aegithalus erythrocephalus *Vig.*

genannt wird, eine kleine sehr zierliche und ansprechend gefärbte Meise, deren Gestalt und Farbenverteilung die Abb. auf S. 491 zeigt. Ihre Heimat ist das Himalajagebiet von Gazara bis Butan. Jerdon beobachtete sie in der Umgebung seines Wohnortes Darjeeling 1750 m hoch sehr häufig, fand sie aber noch in Höhen von 2500 m. In kleinen Flügen vereinigt, durchstreift sie Gebüsche, Hecken, aber auch höhere Bäume nach Insekten. Ihr Nest wurde im April und Mai gefunden, zuweilen wird aber schon im März mit dem Nestbau begonnen. Es ist kugelförmig oder länglich eiförmig wie das unserer Schwanzmeisen, mit seitlichem Eingang in der oberen Hälfte. Aber es war nicht immer auf und an Zweigen erbaut. Hutton fand ein Nest an einem Abhang unter überhängendem grobem Gras, ein anderes war im Efeu erbaut, welcher um einen Baumstamm emporwuchs. Häufig hängt es zwischen Zweigen einer niedrigen kümmernden Steineiche oder es ist in eine Zweiggabel eingeklemmt. Man fand es auch im Rhododendrongebüsch und herabhängenden Zweigen einer Cypresse. Dieses Nest stand 3,5 m über dem Boden, während das erstere sich dicht am Boden befand. Als Baustoff des Nestes werden grünes Moos, Flechten und Mooswurzeln verwendet. Häufig wird es außen bekleidet mit Pflanzenwolle, Daunen verschiedener Art und Insektengespinnst. Im Innern ist es gut mit vielen weichen Daunen und Federn ausgepolstert. Das Gelege besteht in fünf, meist 6—8 rötlichweißen, mit einigen veilchenfarbenen Punkten und Spritzern gezeichneten Eiern, die am dickeren Ende kranzförmig angeordnet sind.

Gefiederbeschreibung: Oberkopf kastanienbraun, nach der Nackenmitte in Rostgelb übergehend; Zügel, Umgebung des Auges, Band über die Kopfseiten, Fleck auf der

Kehle tiefschwarz; breiter weißer Augenbrauen- und Kehlstreif; Kinn und ein von diesem ausgehender Streif auf den Halsseiten reinweiß; übriger Vorderhals, Vorderbrust rahmweiß; übrige Unterseite weinrötlich bis auf die weißen Spitzen der Unterschwanzdecken, an den Körperseiten am lebhaftesten; Rücken blaugrau, Flügelbecken, Schwingen braungrau mit blaugrauen Säumen; Afterflügel, Handdecken dunkelbraun; Unterflügeldecken weiß; Schwanzfedern braungrau, äußerste mit weißer Außenfahne und Spitze, letztere auch bei den übrigen graugesäumt, nur mittelste einfarbig braungrau; Auge gelblich; Schnabel schwarz; Füße bräunlichgelb; Lg. 100—110, Fl. 50—54, Schw. 52—58, Schn. 7, Lf. 15 mm.

Zwei kleine südafrikanische Beutelmeisen, die an Farbenschönheit der europäischen Beutelmeise bei weitem nachstehen, aber in ihrer Kleinheit doch ungemein zierlich sind, waren schon einmal durch Ruhe-Alfeld im Jahre 1913 in wenigen Stücken eingeführt, und zwar die

Kapbeutelmeise — Anthoscopus minutus (*Shaw*),

eine Bewohnerin des Gestrüpps an der sandigen Westküste des Kaplandes und der niedrigen Büsche der Hochebene. Außerordentlich beweglich und lebhaft umherflatternd durchsucht diese kleine Meise Zweige und Blätter nach kleinen Kerfen und deren Bruten. Nach Stark ist der Lockruf „ein schwaches, fast unhörbares „Schirp". Nur beim Auffliegen lassen sie einen lauteren Ruf hören. Der Flug geht nach Meisenart nur über kurze Strecken von Busch zu Busch. In der Brutzeit, im September und August, sondern sich die Paare und beginnen mit dem Nestbau. Das Nest gleicht fast völlig dem unserer Beutelmeise. Es ist ein geschlossener Beutel aus Schafwolle, da wo Schafe geweidet werden, sonst aus Pflanzenwolle gefilzt. Die Zweige oder Staudenstengel, an denen es frei hängt, sind in die Seitenwände eingefilzt. Seitlich oben befindet sich das Schlupfloch mit kurzer Eingangsröhre, welche das Weibchen, wenn es das Nest verläßt, mit dem Schnabel zusammendrücken soll. Unter dieser befindet sich eine flache napfförmige Vertiefung; in dieser soll das Männchen, nach Angabe der Eingeborenen, während der Brut ruhen.

Das Gelege besteht aus 7 reinweißen Eiern (14×14,5×9—10 mm).

Gefiederbeschreibung (s. Abb. S. 493), Stirn-Zügelfedern dunkelbraunschwarz mit weißen Spitzen; Oberkopf, Vorderrücken grau, letzterer mit olivgelbem Anflug; übrige Oberseite olivgelb; kurzer Augenbrauenstreif, Wangen, Kinn trübweiß; Ohrgegend dunkel gestrichelt; Unterseite schwefelgelb; Flügelbecken graubraun, großen außen und Spitze heller; ebenso Armschwingen, Handschwingen braun mit schmalem weißlichem Saum an der Außenfahne, ebenso Schwanzfedern; Auge gelbbraun; Schnabel schwarz; Lauf graubraun; Lg. 85—95, Fl. 50—52, Schw. 35—39.

♀ matter und trüber.

Engl.: Cape Titmonse; franz.: petite Mésange du Cap de Bonne-Espérance. Das Verbreitungsgebiet ist das Kapland durch Transvaal bis zum Sambesi.

Die

Weißstirnbeutelmeise — Anthoscopus caroli *Sharpe*

bewohnt Damaraland und Ostafrika (Swasiland bis Usambara). In ihrem Wesen dürfte sie sich wenig von vorstehender Art unterscheiden.



Rotköpfige Schwanzmeise (s. S. 490).

Gefiederbeschreibung (s. Abb. S. 495): Stirn, Kopfseiten weiß; oberseits blaß graubraun, Oberschwanzdecken rostrot verwaschen; Vorderhals, Oberbrust rahmweiß, allmählich in die rostrote Färbung der Unterseite übergehend. Flügelbecken blaßgraubraun, Schwingen dunkler mit helleren Außensäumen; Unterflügeldecken bräunlichweiß; Schwanzfedern braun, außen weißlich gesäumt; Auge braun; Schnabel schwärzlich, Spitze heller, Lauf schiefergrau; Lg. 80—90, Fl. 50—55, Schw. 30 mm.

Dr. Karl Ruß erhielt im Jahre 1873 ein Pärchen der stattlichen

Mohrenmeise — Parus niger *Vieill.*,

welche Jamrach, London, eingeführt hatte. Das Paar war schlecht befiedert und es gelang nicht, sie längere Zeit am Leben zu erhalten. Ruß nennt sie eine der schönsten Meisen. Sie gleicht im Benehmen anscheinend völlig unseren Waldmeisen. Stark beobachtete sie im Kapland überall im bewaldeten und mit Gebüsch bestandenen Gelände. Bevorzugt wurden höhere Bäume. Durch ihren scharfen Lockruf, der bei einer nahestehenden nördlichen Form von Heuglin als ähnlich dem unserer „Sumpf- und Spiegelmeise" geschildert wird, verrät sie ihre Anwesenheit. Das Betragen sei weniger lebhaft. Das Nest fand Ayres

in einer alten Spechthöhle. Ei auf weißem Grund sparsam blaßrot gefleckt (17×13—14 mm). Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich über Südafrika, im Westen nördlich bis zum Kunene, im Osten bis zum Pangani.

Gefiederbeschreibung: ♂ oberseits schwarz, der Kopf, Vorderrücken mit bläulichem Metallglanz; Kopfseiten, unterseits grauschwarz, zuweilen bräunlich angeflogen; Unterschwanzdecken mit weißen Säumen; Schenkelfedern mit weißlichen Spitzen; Flügelfedern schwarz, mittlere Deckfedern mit breiter weißer Spitze, zuweilen ganz weiß; größere mit weißem Außen- und Spitzensaum; Schwingen außen schmal, innen breit weißgesäumt; Unterflügeldecken weiß, längs des Flügelrandes schwarz gefleckt, Achselfedern weiß; Schwanz schwarz, äußerste mit weißem Außen- und Spitzensaum, andere mit oder ohne weißen Spitzensaum; Auge braun; Schnabel, Füße schwarz; Lg. 155—170, Fl. 75—88, Schw. 65—83, Schn. 9—10, Lf. 17—21 mm; ♀ unterseits braun, Säume der unteren Schwanzdecken gelblich (Abb. S. 497).

Franz: Mésange noire; engl.: Black African Titmouse.

(Fortsetzung folgt.)

Versuche die Gründe des Weißwerdens bei einem gefangenen Granatastrild zu analysieren und ein paar Worte über das Gefangenleben der Art.

Von A. Adlersparre.

(Nachdruck verboten)

Schon früher habe ich in dieser Zeitschrift (17/18, 1923; 32, 1925) ein paar Fälle von stärkerem Ergrauen und Weißwerden bei Stubenvögeln in größter Kürze erwähnt*). Ehe wir zur näheren Untersuchung der Ursachen schreiten, welche dieser Veränderung bei einem mir gehörigen Granatfink zu Grunde liegen können, dürften ein paar allgemein orientierende Worte über Pigmentierung nicht unangebracht sein.

Zuerst fragen wir uns: Was ist Pigmentierung von dem besonderen Gesichtspunkt aus gesehen, von dem aus wir die Angelegenheit betrachten wollen? Pigmentierung — wie so unendlich viele andere Lebensäußerungen — ist eine spezifische Reaktion des Organismus auf gewisse Reize unserer Umwelt und als solche eine sog. vererbbare Anlage. Diese Anlage, diese Reaktionsfähigkeit kann indessen bei sonst in der Regel pigmentierten Arten individuell fehlen (gewisse Arten von völligen und teilweisen Albinismus bei Mövchen, Kanarien u. v. a.). Da natürlich eine Sache nicht von irgendeinem gegeben werden kann, der dieselbe nicht selbst besitzt, ist es in solchen Fällen nicht die Tätigkeit, sondern die Unfähigkeit der vorhandenen Reaktion (also die Albino-Anlage), welche auf den Nachkommen dieser Abnormitäten vererbt wird.

Die Pigmentierung als Endresultat der Reaktion kann indessen in mancher Weise auch von der variablen Zusammenstellung (Konstellation) der Umweltfaktoren beeinflußt werden. Die von außen kommende Zufuhr des Primärmateriales für die Reaktion (Aufbaumaterial, Spezialstoffe) kann beispielsweise als beschränkt oder als gehemmt gedacht werden. In solchem Falle ist der Organismus mangels des Materiales zeitlich verhindert Pigment zu bilden, während die Pigmentbildungsfähigkeit (bei Materialzugang) selbstverständlich unvermindert bleibt und auch auf den Nachkommen vererbt wird. Möglicherweise liegt der Grund einiger sonst schwer erklärlicher, vermutlich gleichzeitig durch andere Faktoren komplizierter Verbleichungen bei Stubenvögeln in Umständen besprochener Art. Als ein komplizierender Faktor kann man dabei beispielsweise an Veränderungen der Bewegungsintensität denken. Die besonders bei trägeren Arten bedeutend verminderte Beweglichkeit in der Gefangenschaft beschränkt die Abnutzung der körperlichen Organe und gleichzeitig den Zugang an Abnutzungs- oder Abfallstoffen — als solche werden eine ganze Reihe lipochromer Pigmente aufgefaßt. Ich habe vor etwa 10 Jahren einen derartigen Fall gesehen: Ein Sonnenvogelmännchen, von Natur aus sehr beweglich, wurde wegen schweren Unfuges in der Voliere in einem kleinen Käfig (50×50×25 cm) isoliert; seine Farben wurden mit der Zeit merkbar schwächer, unklarer, weibchenähnlich; später, in eine Voliere gebracht, bekam der Vogel nach der Mauser seine mehr gesättigten Farben wieder. Variation anderer Reize als der Beweglichkeit lag in diesem Falle, soweit erkennbar, nicht vor. Aber es gibt, wie gesagt, Fälle, für deren Erklärung die verminderte Beweglichkeit allein nicht als Erklärungsgrund ausreicht.

In noch anderen Fällen kommt es vor, daß von der Außenwelt mehr oder minder giftige Stoffe dem Organismus direkt oder indirekt zugeführt werden, welche Stoffe Abänderungen oder gröbere Störungen des Pigmentstoffwechsels verursachen. Ein paar erläuternde Beispiele kann ich aus der Pathologie des Menschen anführen: Arsenmelanose, nach langdauerndem Eingeben von Arsen und Bronzehautkrankheit nach (durch bakteriellen Einfluß) gestörter innerer Sekretion der Nebennieren. Zu dieser Gruppe wäre ich nebenbei am meisten geneigt die von Schreitmüller in zwei sehr interessanten Veröffentlichungen (Ges. Welt 19 und 31, 1925) angeführten Schwarzfärbungen von Dompfaffen, Distelfinken u. a. zu rechnen. Der Annahme des geehrten Verfassers, daß diese Schwarzfärbungen als senile Veränderungen zu verstehen wären, kann ich nicht beitreten. Meines Erachtens lassen sie sich ungezwungener auf sich allmählich entwickelnde rein pathologische Prozesse, den oben angeführten vergleichbar, als auf mehr physiologische Altersveränderungen zurückführen. Das Senium (Greisenalter) allein für sich, von anderen auf den Organismus einwirkenden Faktoren isoliert, bedeutet ja mehr Rückgang, Verlust früherer Fähigkeiten als Steigerung oder Neuerwerb von solchen. Für die Deutung des Schwarzwerdens als krankhafte Prozesse spricht außerdem entschieden der von Schreitmüller angeführte Umstand, daß einige der Vögel mit dem Schwarzwerden von Krämpfen befallen waren und daß andere bald nachher eingingen — Krämpfe sind nicht für hohes Alter besonders charakteristisch, wohl aber für Vergiftungen u. a. m. Bemerkenswert ist, daß der von Schreitmüller angeführte Spalingersche Fall insoweit mehr an das Krankheitsbild der Arsenmelanose erinnert, als

*) Professor Braun erwähnt in Heft 31 einen Edelsänger, welchen er „lange vor dem Weltkrieg" erhielt und welcher noch heute lebt, also von einem auch für einen Fink sehr respektablen Alter sein muß. Es wäre von großem Interesse, wenn der geehrte Verfasser gelegentlich an dieser Stelle uns liebenswürdigst mitteilen wollte, inwieweit er bei diesem Vogel Verbleichungen oder sonstige Alterserscheinungen gefunden.

die Pigmentierungen der letzteren nach Aufhören der Arseneingaben meistens über kurz oder lang verschwinden; die anderen angeführten Fälle erinnern dagegen mehr an die Bronzehautkrankheit insoweit als die Pigmentierungen bei dieser Krankheit meistens bis zum Tode bestehen bleiben.

Setzen wir nach dieser Abweichung unsere kleine Übersicht fort, so kann weiter der Fall vorkommen, daß der zentrale Pigmentbildungsprozeß ungestört ist, daß aber verschiedene Schäden [Narbenbildung in den Federpapillen, Altersinvolution, psychisch bewirkte Ernährungsstörungen innerhalb der Papille (Troponeurosen) usw.] den Endprozeß und Weitertransport des Pigmentes in die Feder hemmen. Lokaler (partieller) Albinismus hängt hiervon recht oft ab (so beispielsweise bei einem früher erwähnten Braunrückenelsterchen in meinem Besitz; Insektenbisse können wohl auch auf toxischen Weg, ebenso andere vorausgegangene tiefgreifende Irritationszustände (Reizzustände) der Haut, ähnliche regressive Veränderungen der Papille hervorrufen). Schließlich kann auch die Feder selbst von gewissen Veränderungen betroffen werden, welche wirklich oder scheinbar die Pigmentierung derselben beeinflussen.

Kombinationen von diesen Ursachen können natürlich sehr wohl vorkommend gedacht werden. Ganz beiseite gelassen sind der Argyrie des Menschen — Silberablagerungen in der Haut nach Silbersalzeingaben — gewissermaßen vergleichbar, die durch gefärbtes Futter mehr direkt herbeigeführten Färbungen der Feder (Cayennekanarien, Anilinwellensittiche, Anilintauben).

Der betreffende Granatfink (s. Abb. 377, 378) war gleichwie einige andere seit vielen Jahren in meinem Besitz befindliche nunmehr ergrauende Vögel ursprünglich normal pigmentiert (vgl. K. Neunzig: „Fremdl. Stubenvögel"), wurde anfänglich vor der Mauser hie und da zeitweise weißfedrig, zeigte schließlich in größerer Zahl dauernd weiße oder weißfleckige Federn (vgl. auch „Gef. Welt" S. 379).

Nun fragt sich: Könnte „Unvollständigkeit" des Futters dieser Veränderung zugrunde liegen? Höchst unwahrscheinlich! Erstens dürfte kein Fall sicher bekannt oder sogar physiologisch gesehen wahrscheinlich sein, in welchem melanine Pigmentierung mangels Spezialstoffen bei gemischter vegetabilischer und animalischer Kost und im übrigen vorschriftsmäßiger Haltung ausfällt. Zweitens habe ich, wie es aus meinen früheren Veröffentlichungen über Fütterungstechnik hervorgeht, seit vielen Jahren meinen Vögeln ununterbrochenen Zugang an bekannten Spezialstoffen wie Vitaminen, wichtigeren Aminosäuren usw. zielbewußt zu sichern versucht. Drittens traten die Verbleichungen nicht, wie es in Fällen von vermutlichem Spezialstoffmangel jedoch die Regel sein dürfte (Papstfink, Hänfling u. a.), nach der ersten Mauser in der Gefangenschaft auf, sondern erst nach mehr als einem halben Dutzend Jahren und seitdem der Vogel wohl mehr als 50 % seiner physiologischen Lebenslänge zurückgelegt hat. Viertens zeigen andere melanoid pigmentierte Arten (u. a. ein Männchen der rotwangigen Form Blauastrild), die sich länger in meinem Besitz befanden als es für erstes Auftreten der Verbleichungen beim Granatfink und beim Weibchen des blauwangigen Blauastrild (s. S. 379) erforderlich war, noch keine merkbaren Verbleichungen. Fünftens sind Junge von Uraeginthus bengalus ♂ × (anscheinend) Uraeginthus angolensis ♀ schon vor mehr als 20 Jahren in ziemlich großer Zahl von mir gezüchtet; fehlte es an Spezialstoffen, müßten natürlich alle diese Jungen, die also nie und nimmer das erforderliche primäre Aufbaumaterial erhalten, schon von Anfang an stark weißfedrig gewesen sein. Das war aber nicht der Fall (ist wohl auch nicht bei anderen Züchtern vorgekommen).

(Fortsetzung folgt.)

Kapbeutelmeise (s. S. 491).

Die Eingewöhnung des großen Raubwürgers (Lanius excubitor).

Beitragsstudie zur Charakteristik des großen Raubwürgers.

Von Arthur Dresler.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Hatte ich dem großen Raubwürger bisher ausschließlich tote Mäuse zur Nahrung gegeben — die ja ohne weiteres einen Beweis seiner Nützlichkeit in der Freiheit für die von diesen kleinen, oft massenhaft auftretenden Nagetieren geschädigten Landwirte ergibt, so daß er bis hierher mit Recht als kein schlimmerer Schädling angesehen werden kann, wie etwa die Eulen, Bussarde, Falken u. a., die auch große Mäusevertilger sind, aber ebenfalls den kleinen Vögeln mit Eifer nachstellen, wie auch die Krähen, Eichelhäher —: es blieb noch festzustellen, ob dieser so allgemein als grausamster Verfolger und sadistischer Quäler der kleinen Vögel verschrieene und bestgehaßte große Raubwürger in der Tat diese Eigenschaft in hervorragendem Maße, seiner Natur nach, besaß!

Wie wir eingangs sahen, hatte er nach seinem Einfangen im Besitz des Vogelhändlers sich sogleich

über die ihm vorgelegten toten Vögel hergemacht —, wozu ihn zweifellos sein großer Hunger zwang. Jetzt wollte ich das Experiment mit ihm vornehmen, neben dem Mäusefraß, und ich würde sehen, welcher Fraß die Vorliebe des großen Raubwürgers habe.

In der Freiheit sollte er ja ganze Reihen von kleinen Vögeln z. T. lebend auf langen starken Dornen aufspießen und sie (zu seinem Vergnügen?) sich zu Tode zappeln lassen, auch ohne die Not seines Hungers... Die anderen kleineren Würger machten es mit den Käfern und Kerfen nicht anders: ja wir wissen, daß der graue, der rotköpfige und rotrückige Würger zur Nistzeit vielfach die Nester der Singvögel plündern, indem sie den jungen Bruten den Kopf abhacken und das Gehirn herausfressen. Das sind die schlimmen und wilden Freiheitstriebe und Sünden der von den Vogelliebhabern oftmals als gute Spötter bevorzugten kleineren Würger als Käfigvögel.

Der große Raubwürger aber sollte diese Artgenossen, neben den erwähnten anderen Raubvögeln, seiner grausamen Art nach, noch weit übertreffen. Danach müßte er eine besondere Vorliebe für den Vogelmord und Fraß haben.

Auch der Gesang der Würger sollte ja diesen ihren Jagd- und Fraßinstinkten dienen, indem sie sich den anderen Vögeln, welche sie gern zu ihren Opfern machten, scheinbar als harmlose herzfröhliche Sänger darstellen, die listig die naturgetreu nachgeahmten Gesänge ihrer gefiederten Umgebung dazu benützen, sie an sich heranzulocken, oder sich jenen zu nähern, um dann plötzlich über sie herzufallen. Das mag in einzelnen Fällen zutreffen, die Würger aber haben eine zu markante Maske erhalten, als daß sie den gefährdeten kleineren Vögeln instinktmäßig nicht sofort als Räuber und Mörder erkennbar wären.

Freilich ist es eine bekannte Tatsache, daß ein bestimmter Vogelgesang und Lockruf auf die Artgenossen sympathisch anziehend wirkt, daß dies das Hilfsmittel der Vogelfänger ist, wenn auch das Käuzchen und der zu diesem Zweck seinem Feinde nahe gebundene Würger, der durch sein ängstliches Geschrei die Vögel der Nähe neugierig teilnehmend herbeilockt, das Hauptlockmittel bleiben.

Zunächst will mir die Hypothese, nach welcher die Würger durch ihre Spöttergabe die kleineren Vögel anlocken, um sie zu erjagen, aus dem Grunde nicht logisch d. h. ursächlich genug erscheinen, weil die Würger diese Teilgesänge der Vögel in ihren übrigen Gesang verweben, sie also (zum Zweck!) nicht dauernd artmäßig (individuell) allein vortragen. Auch in dieser Beziehung ist — neben ihrer auffälligen charakteristischen Maske und Schnabelbildung — an eine durchweg gelungene Täuschung der kleinen speziellen Vogelarten insoweit nicht zu glauben, daß sie sich ihm in übertriebener Sorglosigkeit sozusagen freiwillig zum Fraße anbieten. Vielmehr ist richtig beobachtet, daß die schwächeren Vögel die Nähe dieser Raubvögel meiden, und wo sie sich einfinden, nehmen sie allen natürlichen Schutz des Waldes usw. in Anspruch, außer wenn sie durch ihr Gelege und Junge gefühlsmäßig stark gebunden sind, wo dann die Raubvögel und anderes Raubzeug allerdings leichteres Spiel haben.

Ferner spricht gegen diesen Raubvogeltäuschungsgesang die Tatsache, daß die gekäfigten Würger fleißiger singen wie in der Freiheit: das Argument also, daß sie aus Hunger zur Täuschung sich verstehen, fällt für den satten Würger weg! Folglich kann der Gesang der Würger grundursächlich triebmäßig nur in ihrer Lust am Gesang, in ihrer Spötterbegabung und Fertigkeit hierzu, wie bei jedem andern Vogel, der Sänger ist, zu suchen sein. Die Annahme, welche eine rein physische Identität des Gesanges und der Spöttergabe der Würger mit ihrer Raubnatur (zum Zweck!) konstruieren will, ist eine übertriebene und irrige, diktiert von blindem Abscheu und Haß gegen diese Vögel, indem man darin vielfach einer aufgebrachten Legende folgt. Trotzdem soll der Einzelfall der faktisch erreichten Täuschung der andern Arten der Vögel durch diese Spöttergabe der Würger nicht bezweifelt werden. Richtiger vielmehr ist, daß der große Raubwürger, wie die andern Raubvögel, einer regelrechten Jagd auf kleinere Vögel obliegt, und daß die günstige Gelegenheit sie ihm erleichtert, wobei die Jahreszeit, die Wetterumstände bzw. der Mangel an anderer, ihm besser behagender Beute, also sein grimmigster Hunger und Selbsterhaltungstrieb, den Ausschlag geben. Anders kann man dem großen Raubwürger, wie auch manchem der Raubvögel, die jeweilig kleinen Vögeln nachstellen, in der Hauptsache aber eine andere Ernährungsweise bevorzugen, nicht gerecht werden. Meine Fütterungsexperimente beim Raubwürger belegen dies. Hatte ich den Raubwürger, um ihn naturgemäß einzugewöhnen, zunächst ausschließlich mit toten Mäusen versorgt, so versiegte die mir unverdächtige Bezugsquelle hierfür bald ganz, eine Quelle, von der ich sicher wußte, daß die gefangenen toten Nager vor dem Fange nicht irgendwo Gift gefressen hatten. Auch wollte ich mit ihm zur reinen gebräuchlichen Fleischnahrung übergehen, um sie mit der Insektenfütterung zu verbinden, so in dem Halten des Raubwürgers als Zimmervogel einen für den eigenen und fremden Anblick mehr angenehmen ästhetischen Hausgenossen zu schaffen.

Als der Vogel zum ersten Male kleingeschnittenes rohes Rindfleisch in den Freßnapf erhielt, ließ ich ihn eine kurze Zeit allein. Als ich wieder ins Zimmer trat, sah ich zu meiner Überraschung, wie er inzwischen die lange Sitzstangenleiste seines Käfigs etwa in einer Länge von 75 cm gleichmäßig mit den Fleischstücken ausgeputzt hatte. Das erinnerte ebenfalls an seine Manier, die Dornen zur Aufspeicherung seines Fraßes zu benutzen. Es waren nun aber hier keine kleinen Vögel, keine lebenden Tiere, die er, überlegend, dazu bestimmte, ihm zum späteren beliebigen Fraße zu dienen, und man konnte diesem Wesen gegenüber vielleicht von einer mechanisch gewohnheitsmäßigen Triebhandlung des Würgers, von Artvererbungstrieb sprechen. Und so wie der Raubwürger die aufgespeicherten Fleischstückchen nach seinem Appetit oder Hunger, von dem ihnen angewiesenen Platze nahm und verzehrte, so war diese seine Manier in der Freiheit mit erjagten Vögeln auch als nichts anderes aufzufassen, nämlich, daß er sich einen gewissen Vorrat an Nahrung anlegte — wie viele Tiere u. a. die Eulen, welche in ihren Schlupf-

winkeln für die Zeit der Not, so bei andauernd sehr schlechtem Wetter, wo sie nicht jagen können, ganze Reihen von toten Mäusen aufzuweisen haben. Von dieser Überlegung der Vorsorge wird auch der Raubwürger geleitet, sowie auch seine ähnlich hamsternden kleineren Artgenossen, so daß sie, auch ohne den direkten Antrieb des Hungers, die sich bietende günstige Gelegenheit wahrnehmen, etwas zu erjagen, eben weil diese Gelegenheit sehr oft fehlt, und sie vom Hunger gequält werden. Die bewegliche Beute soll ihnen nicht mehr entkommen, und so benutzen sie das natürliche Hilfsmittel des Dornes, um sie durch ihn festzuhalten. Daß es dabei vorkommt, daß dieses und jenes lebende Objekt bei der Jagd und dem Aufspießen nicht die tötliche Verletzung erhielt, kann wohl das Mitleid und Verwerfung des Menschen wachrufen, aber nicht die der Tiere, die als Raubtiere bzw. Raubvögel in ihrer Wildheit und dem Eigenerhaltungstrieb derartige Anwandlungen nicht kennen. Aus diesem Grunde geht es nicht an, bei den Würgern und andern Raubvögeln von Mordsucht und einem dämonischen Triebe zu sprechen.

Für mein Experiment kam es nun darauf an, festzustellen, ob der Raubwürger in der Tat kleinere Vögel als Fraß bevorzugt, und so stellte mir der Vogelhändler für den Zweck einige tote Vögel zur Verfügung. Ließ ich den Raubwürger nun nicht gerade hungern, so hielt ich ihn doch knapper; nach der Nachtruhe sollte diese Nahrung sein erstes Frühstück sein. Unruhig genug gab sich der Würger — ich legte ihm die beiden toten Vogelleiber auf dem Boden des Käfigs und wartete in einiger Entfernung von ihm gespannt . . noch weiter trat ich zurück, da der Vogelfresser nicht die geringste Miene machte, zum Fraß überzugehen — ja er beachtete die toten Vögel nicht einmal. . . Spielte der Würger Komödie? Ich wartete noch eine Weile — ich verließ das Zimmer, um es mit einer toten Maus im Papier wieder zu betreten: Die toten Vogelleiber lagen noch auf der Stelle, wo ich sie hingelegt. Mich durchzuckte eine gewisse Genugtuung, und freudig reichte ich ihm die Maus in den Käfig. Ein Sprung des Raubwürgers, und er hielt seine leckere begehrtere Beute im Schnabel, ein zweiter Sprung zum Galgen — und die eifrige kräftige Arbeit des Spießens seines Fraßes begann. (Schluß folgt.)

Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten.

Von J. Kuntzendorff, Berlin.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Nach dieser kleinen Abschweifung wende ich mich wieder unserem Thema zu. Von den zu Tanagrella gehörenden Tangaren habe ich die

schwarzblaue Tangare — Tanagrella cyanomelaena (*Wied.*) (s. Abb. S. 496),

verpflegt. Die Heimat dieses Vogels ist Ost- und Mittelbrasilien, wo sie in kleinen Flügen die großen Urwälder der Küstengebiete bevölkert. Über das Freileben ist so gut wie nichts bekannt, doch dürften sie darin, nach ihrem Verhalten im Flugraum zu urteilen, den Schillertangaren gleichen, denen sie im Wesen und Benehmen beinahe gänzlich gleichen. Die schwarzblaue Tangare ist in ihrer Gefiederfärbung äußerst schön und zugleich auch nicht auffallend und grellbunt gefärbt. Die Geschlechter sind nicht verschieden: Schmaler Stirnstreif, Kopfseiten, Kehle, Oberschwanzdecken leuchtend zyanblau, bei bestimmtem Lichteinfall glänzend hellbläulichgrün; die Stirn selbst, Unterrücken, Bürzel goldigbraunorange, bei bestimmter Beleuchtung silbriggrün; um die Kehlfärbung ein ganz schmales zyanblaues Band; großer, mit der Kopfzeichnung in Verbindung stehender Halsfleck dunkel zyanblau; übrige Oberseite samtschwarz, ein ebensolches Band umfaßt, von hier ausgehend, die blaue Kopf- und Kehlzeichnung; übriger Unterkörper hell silbrigviolettblau, nach hinten

Weißstirnbeutelmeise (s. S. 491).

zu dunkler werdend; Bauchseiten, den Unterschwanzdecken zu, hell bläulichgrün; diese, Aftergegend, Bauchmitte kastanienbraun; kleine Flügeldecken leuchtend zyanblau, mittlere und große tiefschwarz mit zyanblauen Rändern; Schwingen tiefschwarz, fein zyanblau gerandet, diese Ränder erscheinen bei gewissem Licht bläulichgrün, Wurzelteil der Innenfahne der Schwingen weißlich gerandet; Schwanzfedern tiefschwarz, außer dem äußersten Paar zyanblau, bei gewisser Beleuchtung bläulichgrün, an der Außenfahne schmal gerandet. Auge braun, Schnabel und Füße schwarz. Maße nach Neunzig: Lg. 137, Fl. 75, Schw. 57 mm. Die Maße meines Balges sind: Lg. 140, Fl. 71, Schw. 59 mm.

Im Käfig ist die schwarzblaue Tangare ein verhältnismäßig lebhafter und beweglicher Vogel. Schon Ruß bezeichnet ihn 1894 als einen solchen, der recht unruhig im Bauer umherspringt und förmliche Purzelbäume schießt. Wenngleich ich letzteres im Käfig bei meinem Exemplar nicht beobachtet habe, so konnte ich im Flugraum zur Genüge ihre turnerischen Leistungen bewundern, und wundersam sah es aus, wenn sie an den Zweigen regelrechte Bauchwellen ausführte. Der Flug ist gewandt, schnell und meisenähnlich. Im Flugraum hielt sich die

Tangare im Gebüsch auf und benutzte aber gleichfalls auch freistehende Äste. Auf die Felsgruppe kam sie nur um zu trinken oder zu baden. Sie war äußerst beweglich und lebhaft, huschte gewandt durch die Zweige, flog mit großer Geschwindigkeit von einem Gebüsch zum anderen und sonnte sich gerne auf von der Sonne beschienenen Ästen. Das Badebedürfnis dieses Vogels ist ein überaus großes. Der Gesang besteht aus kurzen Pfeiftönen mit nachfolgendem, längerem Gezwitscher, ist also in keiner Weise ein Kunstprodukt zu nennen. Harmlos und friedfertig vertrug sie sich mit den übrigen Tangaren und den anderen Insassen der Voliere ausgezeichnet.

Die Eingewöhnung gestaltete sich nicht besonders schwierig. In der ersten Zeit erhielt die Tangare in der Hauptsache Fruchtfutter, daneben

Schwarzblaue Tangare.

reichte ich ihr ein Gemisch aus klein gehacktem Obst, geriebenem Eierbiskuit, einer kleinen Ration Ameiseneier, etwas hartgekochtem Ei, welchem ich nach und nach in dem gleichen Maße die Obstportion entzog, als ich die der Ameiseneier erhöhte, denen ich dann allmählich mein gewohntes Universalfutter beifügte. So gewöhnte ich den Vogel, wie ich es stets mit allen Tangaren zu tun pflegte, ganz sachte an das Universalfutter, dem ich jedoch für Tangaren immer eine größere Portion Eierbiskuit als den anderen Vögeln beifügte. Die stets reichliche und abwechselnde Fruchtnahrung erhielt sie, wie ihre Verwandte, immer in an besonderen Haltern angebrachten, großen Obststücken von Bananen (eine besondere Delikatesse), Äpfeln, Birnen, Pflaumen, Pfirsichen u. dgl., ebenso wie auch Beeren nicht fehlten. Die durchschnittlich lange Lebensdauer meiner Tangaren führe ich darauf zurück, daß ich sie alle stets an ein reines Insektenfutter mit reichlicher Biskuitbeigabe möglichst gewöhnte und Obst separat verfütterte. Die bei Eichlam und Parejo vorgekommenen erwähnten Krankheitsfälle sind bei mir niemals aufgetreten. Gut eingewöhnt und bei einem kräftigen und abwechslungsreichen, reichlich obsthaltigen Futter ist die schwarzblaue Tangare ein ausdauernder und recht widerstandsfähiger Vogel.

Als die am meisten eingeführte Art der Schillertangaren ist die

Dreifarbentangare — Calospiza seledon (*Müller*)

zu erwähnen. Ihr Verbreitungsgebiet dehnt sich über Ost-, Süd- und Mittelbrasilien aus, wo sie die Urwälder der Gebirgsgegenden ebenso bevölkert wie die Waldungen der Tiefebenen. In Flügen, sehr zu einander haltend und sich ständig lockend, durchstreifen sie lebhaft ihr Gebiet, in der heißen Tageszeit aber verhalten sie sich, in den Kronen der Bäume sitzend still und regungslos. Sie sind wenig scheue Vögel die auch die Gärten, besonders zur Fruchtreife, aufsuchen. Ihre Hauptnahrung bilden die mannigfaltigsten Früchte, doch nehmen sie auch Kerbtiere zu sich. Ihre Lautäußerungen sind eigentlich kaum ein Gesang zu nennen, sie hören sich wie gurgelnde oder halb verschluckte Töne an. Das Nest wird zwischen Stämmen und Blattstielen, zwischen Früchten herabhängender Fruchtkolben, auf abgeschnittenen Stämmen aus Stengeln, Gräsern, Binsen und Blättern hergestellt und mit Halmen und Haaren ausgelegt. Auch Rinde, Bast und Baumwolle wird zum Bau des Nestes verwendet. Es ist napf- und muldenförmig. Das Gelege besteht aus 2—3 hellfleischfarbigen, vielfach mit dunklen Punkten bedeckten Eiern.

Das Gefieder ist äußerst prächtig und weist sehr glänzende Farben auf. ♂: Stirnrand schwarz, Oberkopf, Kopfseiten grünlichblau, in bestimmter Beleuchtung bläulichgrün; Nacken, Halsseiten, Oberrücken goldgrün, geschuppt erscheinend, da diese Färbung weisenden breiten Federränder nur mehr oder wenige die schwarze Grundfarbe der Federn decken; über die Mitte des Rückens ein schwarzes Band; Unterrücken goldorange bis orangerötlich, nach hinten grünlich werdend, Bürzel, Oberschwanzdecken glänzend hellgrün mit schwachem goldigem Einschlag; Kinn grünlichblau, in bestimmter Beleuchtung bläulichgrün; Kehle schwarz mit bläulichem Schimmer; Kropfgegend, Brust, vorderer Teil des Unterkörpers silbrig blaugrün, in bestimmter Beleuchtung silbrig grünblau; übrige Unterseite gelblichgrün, in bestimmter Beleuch

tung glänzend hellgrün; Schenkel blaugrün; Flügeldecken purpurblau; Schwingen schwarz, Armschwingen mit breiten gelblichgrünen bzw. glänzend hellgrünen Handschwingen mit schmalen blaugrünen bzw. grünblauen Säumen, Afterflügel, Bug, breite Ränder der Arm- und Handdecken purpurblau; Schwanzfedern schwarz, alle Federn außer dem äußersten Paar an Außenfahne blaugrau gesäumt und mittelstes Paar an der Spitzenhälfte tief dunkelblaugrün bzw. tief dunkelgrünblau; Auge braun, Schnabel schwarz; Füße schwärzlichbraun. Das ♀ ist in allen Farben etwas matter und durch die grünlicheren Ränder der Halsfedern und die blaugrünen Handdecken vom ♂ unterschieden. Nach Neunzig Lg. 130, Fl. 117 (?), Schw. 52 mm. Meine männlichen Bälge messen Fl. 70 und 74, Schw. 54 und 57 mm, und der weibliche Balg Fl. 74, Schw. 53 mm. Besonders bemerkenswert bei dieser Art ist die bei verschieden



Mohrenmeise (s. S. 491).

einfallendem Licht verschiedene Färbung der blauen und grünen Körperteile und daß die des Unterrückens äußerst veränderlich ist. Ich besaß Stücke, die von reinem Hochgelb bis zum Orangerötlichen mit Goldgelb vermischte Zwischenstufen aufwiesen. Desgleichen variieren die Flügelfederränder stark in der Farbe, mal sind sie heller, mal dunkler, jedoch unabhängig von den übrigen Farbenzeichnungen. Es ist also nicht bedingt, daß Vögel mit hellem Unterrücken z. B. auch helle Flügelzeichnung haben, es kommen in diesem Falle Stücke vor mit bedeutend tieferen Schwingenrändern. Dieselben Variationen finden wir auch bei den Schwanzfedern. Ich besitze einen männlichen Balg, bei dem nur das zweitletzte Steuerfederpaar und die Saumteile an der Spitze der übrigen die blaugrüne resp. grünblaue Färbung zeigen, zur Federwurzel hin sind die Säume gelblichgrün resp. leuchtend hellgrün. (Fortsetzung folgt.)

Vogelleben bei Fritzlar.

Von Werner Sunkel, Marburg (Hessen).

(Nachdruck verboten.)

Wem die heimische Natur ans Herz gewachsen ist, und für wen sie ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Teil der Heimat ist, dem wird es ähnlich gehen wie mir: Die Freude, das Leben der Geschöpfe zu belauschen, wird erhöht und bekommt einen persönlichseelischen Einschlag an Orten, die durch die Geschichte geheiligt sind. Die Landschaft, die geologische und geschichtliche Vergangenheit, die Volks- und Stammeseigenart, Sprache, Sitten und Gebräuche der Mitmenschen, die Pflanzen und Tiere, die auf demselben Fleckchen Erde leben, sind Werte, die wir Deutschen in dem wundersam zarten und doch kraftvollen Wort „Heimat" zum Ausdruck bringen. Für mich als bewußten Freund unserer hessischen Natur und Heimat haben Tier-, besonders Vogelbeobachtungen immer einen eigenartigen Reiz gehabt, die ich an geschichtlich hervorragenden Orten unseres Hessengaues anstellte. Der Hoheit jener Stätten wird durch diese Betrachtungen wohl kaum etwas vergeben, war doch schon dem Wodan, dem obersten Gott unserer heidnischen Vorfahren, der alten Chatten, der Kolkrabe geweiht und somit ein heiliger Vogel. In der Gegend von Fritzlar, dessen zwölfhundertjähriges Jubiläum im Juni dieses Jahres gefeiert wurde, waren einst die Hauptkultstätten der heidnischen Chatten und gerade das benachbarte Gudensberg dem Wodan geweiht, dessen schwarze gefiederte Gesellen, die stattlichen Kolkraben, den Sturz der Donareiche bei Geismar noch lange Jahrhunderte überlebten; erst in jüngster Vergangenheit sind diese stattlichen Vögel in Hessen ausgestorben, verdienen aber als ehemals nicht seltene Bewohner unserer Bergwälder und heimatgeschichtlich bedeutsame Vertreter der Vogelwelt des Eddergebiets um Fritzlar einen ehrenden Nachruf. — Wenn ich neben Wodans Raben noch einen historischen Gesichtspunkt dafür ins Feld führen darf, daß mich Fritzlars Jubiläum zu einer Schilderung seines Vogellebens veranlaßt, so erinnere ich daran, daß in der dortigen Stiftskirche der Sachsenherzog Heinrich I. zum deutschen König geweiht wurde: Heinrich der Finkler oder Vogelsteller, dem seine Wahl zum Herrscher des damals noch großen Deutschland verkündet wurde, als er am Finkenherde saß und Vögel fing.

Die Zeiten haben mancherlei Wechsel gebracht. Das Schicksal der Donareiche hat mancher Baum geteilt. Die Forstkultur duldete keine alten hohlen Bäume mehr und beraubte damit zahlreiche Tiere, besonders die auf den hohen Wipfeln horstenden Raubvögel und Reiher, ihrer Nistplätze. Die Zeiten, in denen in den zerklüfteten Felsen des Eddertals der Uhu und im Hochwald Fischadler, Schwarzstorch und Kolkrabe horsteten, sind vorüber. Mit dem Sinn für die Natur, die sich im Vogelfang, in der Jagd und der Vogelliebhaberei ausdrückte, schwand mehr und mehr auch die Fürsorge für die Tiere. Welch herrliche, reichbevölkerte Reiherkolonien boten bei Wabern und sonst in Hessen den Fürsten und Adeligen Gelegenheit zu edlem Weidwerk, zur uralten Beizjagd; als das Interesse dafür erstarb, war auch das Geschick der prächtigen Tiere besiegelt.

Vor 6 Jahren, um die Pfingstzeit, wanderte ich mit meinem ornithologischen Freunde Dr. Otto Schnurre von Marburg nach Fritzlar. Bei der Durchquerung des Burgwaldes unterhielten uns die Rufe der Waldkäuze und Ohreulen und die nächtlichen Lieder der Heidelerche; auch beobachteten wir eine Auerhenne. Bei Frankenberg machte sich in der Zusammensetzung der Vogelwelt der Einfluß des Edderflusses bemerkbar: auf den feuchten Wiesen sangen die in Hessen sonst seltenen Wiesenpieper, im Ufergebüsch die Sumpfrohrsänger und Rohrammern. Im Talsperrengebiet fiel uns damals eine große Armut an Wasservögeln auf; sie war wohl aus dem Fehlen einer eigentlichen Ufervegetation und dem wechselnden Wasserstand zu erklären. Als ich später im Frühjahr 1925 mal wieder an den Eddersee kam, konnte ich bei Herzhausen zahlreiche Wildenten und auch einige Reiher beobachten.

Siebenfarbentangare.

Man rottete sie fast ganz aus. Ähnlich erging es den gefiederten Recken, den größeren Raubvögeln. Es hat wohl erst dahin kommen müssen, daß manche Tierarten aussterben, bis die Menschen einsehen, was sie mit ihrer Naturverödung angerichtet haben. Erst zaghaft, dann immer tatkräftiger erwachte das Naturverständnis in den heimatbewußten Volksgenossen und raffte sich auf zu dem Willen, von der alten ehemals so reichen Natur unseres Vaterlandes zu retten und zu erhalten, was noch zu retten ist: Naturschutz ist Heimatpflicht, Volkspflicht; denn die Natur ist die Grundlage der Heimat und diese Seele, die Mutterseele des Volkslebens.

Viele Werte der heimischen Natur sind zwar schon vernichtet, und doch ist es keine Überhebung, wenn ich sage: Unser Hessenland ist noch reich an Naturschönheiten und ein Beweis dafür, daß echte Kultur (wir haben in Hessen eine alte Kultur im Vergleich zu anderen, besonders östlichen Teilen Deutschlands) keine Feindin der Natur zu sein braucht, ja wohl nicht sein kann. Sehen wir einmal zu, was das altehrwürdige Fritzlar an Vogelgestalten in seinen grauen Mauern und seiner Umgebung beherbergt.

Wie man mir erzählte, sind wenigstens die Enten dort Brutvögel, während mir von der Auffindung eines Reiherhorstes nichts bekannt wurde. Die Reiher dehnen ihre Jagdflüge weit aus und erscheinen regelmäßig auch bei Fritzlar am Ufer der Edder, die mit ihren verschiedenen Flußarmen, besonders oberhalb der altertümlichen Stadt, ein selten reiches Vogelleben aufweist. Dichtes, von Schlingpflanzen umsponnenes Buschgestrüpp und Weidicht bieten den zahlreichen, in Sträuchern nistenden Singvögeln die besten Brutplätze, zumal Schilf, Kletten, Disteln und mannshohe Brennesseln wesentlich mit dazu beitragen, einen lebenden Schutzwall um die Vogelbruten zu bilden. Hier herrscht an Frühlings- und Sommertagen ein einzigartiges Vogelkonzert. Wir hören verschiedene Arten Laubsänger, Grasmücken, Buch-, Grün- und Distelfink, Braunelle, Zaunkönig, mehrere Meisenarten, Rohr- und Goldammer, Bach- und Gebirgsstelzen, Braunkehlchen, das seltene Schwarzkehlchen, Wasseramsel und Rotkehlchen und vor allem die wasserliebenden Teichrohrsänger, für die mein Freund Schnurre wegen ihres unaufhörlichen lärmenden Singsangs den Namen „Rohrprolet" geprägt hat. In den Obstbäumen, Weiden

und Pappeln leben Elstern, Wendehals, Grün-, Grau- und Buntspechte, Raubwürger und Fliegenfänger. Am Ufer trippeln auf den Kiesbänken zierliche Flußuferläufer umher und eilen, wenn wir ihnen nahen, mit hastigen Flügelschlägen zum jenseitigen Gestade, wo ein in der Sonne buntschillernder Eisvogel auf einem dürren Weidenzweig hockt und nach Beute (Wasserkerbtieren und kleinen Fischen) späht. In den saftigen Wiesen schlagen die Wachteln ihr „Bück den Rück — Fürchte Gott!", darüber schwebt ein Storch und die stattliche Gabelweihe, die neben den Falken unter den heimischen Raubvögeln wohl das schönste Flugbild hat. Am genußreichsten waren uns bei Fritzlar (trotz der Stechmücken!) die Abend- und frühen Morgenstunden. Um recht früh aus dem Gasthaus herausgelassen zu werden, mußten wir dem Wirt erst am Abend einen langen Vortrag über den wissenschaftlichen Grund unseres Nichtausschlafenwollens halten; aber die Folge war ein verwundertes Kopfschütteln, am nächsten Morgen — eine doch verschlossene Tür und Naturforscher und Feld-, Wald- und Wiesenmenschen wissen sich immer zu helfen!) unser Ausbruch aus dem Haus durch die Fenster. Dann eilten wir wieder zur Edder, ohne jedoch unterwegs die Beobachtung dessen zu vernachlässigen, was sich uns in der Stadt bot.

Die im Blütenschmuck leuchtenden und duftenden Gärten sind schon erfüllt von tausendfachem Vogelübel. Aus dem wechselvollen Chor entziffert unser Ohr die Gesänge vom Baumläufer, vom Gartenspötter und Girlitz; dieser einst südländische, mit dem Kanarienvogel nahe verwandte Fink ist ein Neuling in der deutschen Vogelwelt; er ist dem Obstbaum gefolgt und so durch die mittelalterliche, besonders klösterliche Kultur in unseren Gau gelangt. Auch das Hausrotschwänzchen, das von allen Dächern Fritzlars herab seine heiteren Weisen zum besten gibt, verdankt hier der menschlichen Kultur seine Lebensbedingungen. Ursprünglich ein Bewohner von natürlichen Felsen, hat der Rotschwanz in den Steinbauten, zunächst wohl in den Burgen, Kirchen und Klöstern neue Nistplätze gefunden. Auch für die ‚Fritzlars Türme umkreisenden Mauersegler' und die hellrufenden Dohlen sind die alten hohen Bauwerke nichts als Felsen, in denen man" nisten kann. Selbst die Vogelwelt einer Gegend hat ihre „Geschichte", und daß das Schicksal unserer gefiederten Freunde eng verknüpft ist mit der Geschichte und Kulturentwicklung der Menschen, wird uns gerade an dem Beispiel einer alten Stadt wie Fritzlar deutlich.

Schnell waren wir wieder an der Edder und lauschten den Liedern mehrerer Nachtigallen und Heuschreckensänger und eines Blaukehlchens; diese drei Singvögel gehören bei uns zu den seltensten Arten. Da nach der brieflichen Mitteilung eines Vogelkenners bei Fritzlar außerdem die Nachtschwalbe, das Teich- und Wasserhuhn und der seltene Wiedehopf (in Hessen „Wudewud" genannt) vorkommt, ist unsere alte Chattenstadt für die heimische Vogelwelt ein wahrer Garten Eden. Möge diese Landschaft an der Edder noch lange in ihrer Ursprünglichkeit erhalten bleiben, keine Flußregulierung oder ähnliche Vergewaltigung der Natur Wasseramsel, Eisvogel, Wiedehopf und die vielen kleinen Singvögel vertreiben, damit der stolze Raubvogelschrei, das „Kuwitt" des Ridewißchens (Steinkauz), das „Fürchtegott!" der Wachtel, der Heuschreckensang des Schwirls, die Radaulieder der Rohrspatzen, der kunstvolle Gesang des Blaukehlchens und das Flöten der Nachtigall noch manchen Lenz in den Edderauen erklingen und die Freunde unseres teueren Hessenlandes und seiner herrlichen Natur mit edler Freude an der schönen Heimat erfüllen, wenn sie pilgern nach Fritzlar, dem durch seine ehrfurchtheischende Vergangenheit und liebliche Natur ausgezeichneten Sitz der hessischen Stammesvorfahren.

Kleine Mitteilungen.

Vogelversand betreffend. Nach der bayerischen Verordnung zum Schutze der Vögel vom 5. Mai 1913 (G.V.Bl. 19, S. 189 ff.) ist in Bayern das Fangen und Erlegen von Waldvögeln sowie der Ankauf, der Verkauf, das Feilbieten und die Ein-, Aus- und Durchfuhr von solchen Vögeln in lebendem oder totem Zustande während des ganzen Jahres verboten. (An diesen Text reiht sich die Aufführung der in Betracht kommenden Vögel.) Dann heißt es weiter: Die Postanstalten werden angewiesen, Sendungen nach Bayern, deren Inhalt hiernach als verbotswidrig erkannt sind, von der Annahme auszuschließen. Auch Pakete mit Waldvögeln nach Orten außerhalb Bayerns, die durch Bayern geleitet werden müssen, sind von der Beförderung auszuschließen.

Mehlmilben in den Mehlwurmzuchtkisten können den Erfolg der Zucht völlig in Frage stellen. Ihrem Aufkommen beugt man durch Verwendung einwandfreier trockener Weizenschalen vor, die man am besten vor der Verwendung etwa eine halbe Stunde lang trockener Hitze aussetzt, die aber nicht so stark sein darf, daß die Weizenkleie verbrennt. Das Aufkommen der Milben ist durch Aufstellung des Zuchtbehälters an einem trockenen Ort in gewöhnlicher Stubenwärme unschwer zu verhindern. Feuchtigkeit befördert ihre Entwicklung, die zu den übelsten Folgen für die Zucht führen kann. Etwa schon in dem Mehlwurmsatz vorhandene Mehlmilben entfernt man in folgender Weise: Man stellt den Zuchtbehälter auf den warmen Herd so, daß die Wärme vom Boden des Behälters aus aufsteigt. Die Milben suchen der Wärme zu entgehen und den Behälter zu verlassen, dessen Wände von der Menge der entfliehenden Milben wie von einem grauen Schimmel überzogen erscheinen. Man überdeckt die Hecke, von der der Deckel entfernt ist, mit einem weißen Tuch, in das die Milben in Massen flüchten. Das von Milben dicht besetzte Tuch wird entfernt und mit kochendem Wasser übergossen, um sie zu töten. Zweckmäßig ist es, diese Maßnahme nachtsüber vorzunehmen und am Morgen das Tuch, mit dem wie oben angegeben verfahren wird, zu wechseln. Außerdem kann die Zuchtkiste auch am Tage im Freien aufgestellt und den Sonnenstrahlen ausgesetzt werden. Mehrmalige Vornahme der Maßnahme führt zur völligen Vertreibung der Milben.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Die kurze Mitteilung in Heft 39 über die geglückte **Zucht von Buchfink × Kanarien-Bastarden** gibt mir Veranlassung, meine Erfahrungen auf diesem Gebiet ebenfalls bekanntzugeben. Drei Jahre habe ich jetzt vergeblich versucht, einen Erfolg zu erzielen. Trotz alljährlich häufig beobachteter Paarungen sind nicht ein einziges Mal befruchtete Eier gelegt worden. Ich habe nicht etwa mit denselben Tieren meine Versuche angestellt, sondern zwei verschiedene Buchfinkenhähne und nur erprobte Kanarienweibchen eingeworfen. Der Einwand, daß die Tiere zufällig zuchtunfähig waren, kann also nicht gemacht werden. Die Zucht ist demnach nicht so einfach, wie sie in verschiedenen Büchern über Kanarien-Bastardzucht geschildert wird. Die Mitteilung, daß derartige Mischlinge dutzendweise gezüchtet worden sind, ist also wirklich mit aller Vorsicht aufzunehmen. Es wäre im Allgemeininteresse wünschenswert, wenn noch andere Züchter ihre Erfahrungen bekanntgeben würden.

P. Spitzner, Breslau.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Max Dähnick in Berlin NO 18, Gr. Frankfurter Str. 90, Ecke Markusstr. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

Aufnahme haben in den Reichsverband gefunden die Herren: 1. Julius Müller in Mannheim; 2. Wilhelm Wissel in Braunschweig; 3. Heinrich Groebel in Koblenz und 4. August Simons in Münster i. W. J. V.: Petters.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

C. Balser, Fulda: Wellensittiche in allen Farben, auch blaue und blaublütige; weiße und schieferblaue Kanarien, Gelbmantelloris, Pennantsittiche, Port-Lincoln-Sittich, Yorkshire-Kanarien.

Wilhelm Hiltmann, Berlin S 14, Dresdener Straße 24: Goldaugentimalie, Rotbauchdrossel, Ringdrossel, Dorngrasmücken, Müllergrasmücken, Sumpfrohrsänger, grauer Fliegenschnäpper, Wiesenschmätzer, Bergpapageien, Feuerflügelsittiche, Braunohrsittiche, Tovisittiche, Pfäffchen, Lazulifinken, Morgenammerfinken, Orangeblaufinken, Kaptäubchen.

S. Lichtenstaedt, Berlin-Friedenau, Kaiser-Allee 137: Katharinasittiche, Mohrenkopfpapageien.

M. Quicker, Dessau (Anh.), Askanische Straße 19: 1,1 Senegaltauben.

E. Schulz, Stettin-Neuwestend, Johannesplatz 5: 1,1 Schwarzkappenpfäffchen.

E. Thieß, Zwenkau: 0,1 Spitzschwanz-Amadine.

P. Tzornack, Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189: Edelpapageien von Neu-Guinea, Zwergara, Marakana, Taubenhalsamazonen, Tovisittiche, Feuerflügelsittiche, tarant. Unzertrennliche, afrik. Langschwanzstare, Senegal-, Kap- und Sperbertäubchen, afrik. Goldsperlinge, Braunstärlinge, Schuppenköpfchen, Stahlfleckentäubchen.

K. Uhmann, Hüttenhof, P. Glöckelberg i. Böhmerwalde, Tsh. Sl. R.: Wellensittiche, satinglänzend.

Max Wischendorff, Lübeck, Hüxstraße 89: 2,0 Hänflingsbastarde, 2,2 Isabell-Kanarien.



Herrn H. B. Das Männchen Sperlingspapagei ist der bekannten mit Abzehrung verbundenen Ernährungsstörung erlegen. Um dieser Erkrankung gleich bei ihrem Auftreten begegnen zu können, müßte fortlaufend durch Wägungen festgestellt werden, ob der Vogel an Gewicht zu- oder abnimmt. Wenn letzteres der Fall ist, besteht die Gefahr, daß der Vogel an der angegebenen Ernährungsstörung erkrankt ist, und es ist in solchen Fällen, bei rechtzeitigem Erkennen der Gefahr, gelungen, durch Futterveränderung dem Weiterfortschreiten der Krankheit vorzubeugen. Im übrigen müssen die Vögel so verpflegt werden, wie das ja häufig genug in dieser Zeitschrift mitgeteilt wird (s. auch die einschlägigen Bücher). Es ist zweckmäßig, Ersatz für den eingegangenen Vogel zu beschaffen.

Herrn Prof. M., Elberfeld. Der Kardinal ist infolge einer heftigen Darmentzündung eingegangen. Ob die Krankheit schon vor etwa 4 Wochen bestand, läßt sich ebensowenig feststellen wie die Ursache der Erkrankung. Die gegebenen Anregungen werden gern berücksichtigt werden. Atlasfink wird der zu den Webefinken gehörige Vogel wie auch der Jakarinifink genannt. Der Name sollte nur auf ersteren angewendet werden. Der Lazulifink wird auch lieblicher Papstfink genannt.

Herrn K. F., Neukölln; Herrn J. St., Lößnitz; Herrn E. Sp., Oldenburg; Herrn E. M., Bln.-Friedenau; Herrn W. Sch., Frankfurt a. M.: Beiträge dankend erhalten.

Herrn P. R., Rochlitz. Es ist zu versuchen, ob der Vogel durch eine Gabe von gekochten Mehlwürmern (nur den Inhalt in den Schnabel drücken) und warmem Pfefferminztee zu retten ist. Er muß warm gehalten werden.

Herrn Dr. B. Das Singsittichmännchen war ein schwächliches, blutarmes Tier. Vergiftung oder Verletzung durch Sturz aus dem Nistkasten lag nicht vor. Vermutlich ist der Vogel infolge allgemeiner Lebensschwäche eingegangen.

Herrn K. B., Eisenach. 1. Die in dem Brief ausgesprochene Ansicht über die Todesursache des Elfenastrildweibchens ist zutreffend. Die Verbreitung des Elfenastrildes erstreckt sich von Südafrika bis zum Nordosten. Man unterscheidet mehrere Unterarten, die sich durch den verschiedenen Ton der Gefiederfärbung und stärkere Gegensätze in der Farbe unterscheiden. 2. Daß der Indigofink vom Kehlkopfwurm befallen war, ist wenig wahrscheinlich. Es liegen dafür nach dem Befund keinerlei Anhaltspunkte vor. Die Bekämpfung dieser Wumparasiten ist schon bei großen Vögeln (Fasanen) sehr schwierig, bei kleinen halte ich sie für ziemlich ausgeschlossen. Die „Verfärbung" eines Vogels geht immer durch Mauser vor sich. In dieser Zeit sind die Vögel meist recht empfindlich. Die Lunge des Vogels war in ihren unteren Teilen fest, leberartig, die vorderen Teile waren von bleicher gelblichgrüner Färbung. Ob diese durch das Eindringen des Heilmittels in die Lungen herbeigeführt wurde, kann ich nicht ermitteln. Jedenfalls litt der Vogel an einer Erkrankung der Lungen.

Herrn W. B., Polzin. S. unter Kl. Mitteilungen.

Herrn W. Sch., Hannover. Zweimalige Darbietung des Getränks, am besten erwärmter dünner Haferschleim, genügt völlig. In der Ernährung bleiben Obst, Grünes und dergl. fort. Neben dem Samen ist ab und zu ein Stück trockenen Zwiebacks zu reichen.

Herrn F. B., Osnabrück. 1. Von den amerikanischen Farbenfinken kommen etwa fünf Arten in den Handel, davon zwei Arten sehr selten. Über die Verträglichkeit der letzten beiden (Lazuli- und Vielfarbenfink) liegen bisher keine Erfahrungen vor. Es ist aber anzunehmen, daß sie wie Papst- und Orangeblaufink im ganzen verträglich sind. In der Brutzeit werden sie naturgemäß angriffslustiger. Das ist besonders bei dem Indigofinken der Fall, der auch sonst weniger verträglich ist als die andern. Sie eignen sich alle für große Flugkäfige wie für den Einzelkäfig. Außer Papst- und Orangeblaufink, welche bei richtiger Haltung und günstigen Licht- und Luftverhältnissen ihr prächtiges Federkleid dauernd tragen, legen alle andern ein unscheinbares Herbstkleid an. 2. Mexikan. Karmingimpel sind ruhige, ihren nicht besonders hervorragenden Gesang fleißig vortragende Vögel. Um Enttäuschungen zu vermeiden, muß man sich vor dem Ankauf der Vögel über diese unterrichten. 3. Diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, was Fragesteller „biologisch interessant" nennt. Für mich sind das alle Vögel. Ich weiß auch nicht, ob die Vögel, welche ich ev. nennen könnte, sich so einrichten werden, daß zu jeder Jahreszeit ungefähr vier im Gesang sind. Von Vögeln, welche in nördlichen Breiten leben kämen außer den heimischen Arten der rote Kardinal, Karmingimpel, Papst-Indigofink, Hakengimpel in Betracht. Andere Arten werden nicht eingeführt.

Herrn P. F., Werder (Havel). Ein normaler Sumpfrohrsänger hat ein Körpergewicht von etwa 14 g. Jetzt muß er, damit er den Winter übersteht, schon etwas Fett angesetzt haben, d. h. er müßte schwerer sein als oben angegeben. Der übersandte Vogel wog 9 g. Er litt an der leider häufigen Erscheinung, daß ein Vogel abmagert, ohne daß das bemerkt wird und dann infolge von Entkräftung eingeht. (S. die Arbeit über den Sumpfrohrsänger S. 58.)

Herrn Th. O., Cleve. Dohlen haben gewöhnlich schmatzende Laute. Worauf beruht die Vermutung, daß die Vögel krank sind? Anfragen müssen nicht an die Druckerei, sondern an den Herausgeber gerichtet werden.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

hrgang 54 15. Oktober 1925 Heft 42

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Mein Haidijo. Von Karl Kepp.

Neueinführungen und Seltenheiten. Von K. Neunzig. (Forts.)

Versuche die Gründe des Weißwerdens bei einem gefangenen Granatastrild zu analysieren und ein paar Worte über das Gefangenleben der Art. Von A. Adlersparre.

Die Eingewöhnung des großen Raubwürgers (Lanius excubitor). Von Arthur Diesler. (Forts.)

Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten. Von J. Kuntzendorff, Berlin. (Forts.)

Vogelleben bei Fritzlar. Von Werner Sunkel, Marburg (Hessen).

Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Ausstellungen - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellungen.

Der **Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden**, gegr. 1906 (vorm. Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden), veranstaltet in diesem Jahre vom 4. bis 7. Dezember seine Vogelschau im Italienischen Dörfchen. Ausgestellt werden einheimische und fremdländische Sing- und Ziervögel. Auch in der diesjährigen Vogelschau soll der Gedanke, wie die Vogelpflege und der Vogelschutz geübt werden, veranschaulicht werden. Alle Vogelliebhaber sind herzlich willkommen.

Die Ausstellungsleitung.

Aus den Vereinen.

Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Postscheckk. Hannover 56714; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10. Aufgenommen ist unter Mitgl. Nr. 186n Herr Othmar Gabriel, Auto-Werkstätten, Wien V, Laurenzgasse 13; Mitgl. Nr 189n Herr Joseph Heinzmann i. Fa. Chr. Nissen, Helsingfors (Finnland), Esplanadg. 21. — Zusätzlich zu der Bekanntmachung in Heft 41 wird mitgeteilt, daß denjenigen Mitgliedern, die den rückständigen Beitrag bezahlen resp. die Postnachnahme einlösen, nach Eingang des Betrages das Jahrbuch zugestellt wird, falls dies noch nicht geschehen sein sollte. — In Ausführung des letzten Versammlungsbeschlusses wird die Jahresversammlung in München stattfinden. Der Vorstand rechnet hierbei auf volle Unterstützung der Münchener Mitglieder und wird das Ergebnis der Verhandlungen rechtzeitig bekanntgeben. J. A.: A. Krabbe.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögeln in Aplerbeck. Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, in der Wirtschaft Sprave, früher Fritz Lecking, Kirchstraße. Fritz Lecking, 1. Vors.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.

J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke, Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde und Geflügelzucht Breslau. Vogelliebhaber Breslaus, wollt ihr euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei nicht endlich auch zusammenschließen, wie es in anderen Städten schon längst geschehen ist? Ein Stamm von erfahrenen Vogelpflegern ist vorhanden, jedoch können Fortschritte nur erzielt werden, wenn alle noch abseits Stehenden sich uns anschließen und unsere mit belehrenden Vorträgen verbundenen Vereinsabende besuchen. Auskunft ert. bereitwilligst P. Spitzner, 1. Schriftf., Ofener Str. 26.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Dessau und Umgegend. Gegründet März 1925. Vereinslokal „Fürst Blücher", Ecke Antoinetten-Leopoldstr. Versammlung jeden 2. Mittwoch, abends 8 Uhr. Nächste Versammlung am 28. Oktober. J. A.: Dielitzsch, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Restaurant „Zum Löwentor", Königswall 75.

J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung Freitags, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Blasewitzer Hof". Liebhaber willk. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Eliesenhof", Eliesenstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Mittelthüringens Sitz Erfurt. Sitzung jeden 2. Mittwoch und jeden letzt. Sonnabend im Monat im Vereinsl. „Stadt Chemnitz", Thomasstr. 57. Näh. Auskunft erteilt Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Vereinigung einheimischer Waldvogelliebhaber zu Görlitz und Umgegend. Zusammenkunft jeden 3. Sonnabend im Monat im Restaurant „Zum Bismarckgarten", Bismarckstraße. 1. Vors. W. Lücker in Görlitz, Konsulstr. 7. Vogelliebhaber als Gäste willk. J. A.: Erich Rothe, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 20. Oktober. A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Der Hannoversche Vogelschutzverein zu Hannover, gegr. 1881, wirkt mit sichtbarem und anerkanntem Erfolge für Vermehrung und Schutz der Vogelwelt bei Hannover durch Aufhängen von jährlich einigen hundert Nistkästen aller Art, durch Erweckung von Interesse und Liebe für die Vogelwelt mit monatlich, zur Gesangszeit wöchentlich stattfindenden Belehrungsspaziergängen und durch Vorträge und Austausch der Beobachtungen in den jeden dritten Dienstag des Monats stattfindenden Vereinsversammlungen. Seine Bestrebungen dienen also lediglich gemeinnützigen Zwecken. Mitgliederzahl rund 1200, jährlicher Beitrag nur 1 M. Meldungen an den Vorsitzenden Herrn Fritz Becker, Hannover, Boedekerstr. 1F. — Die nächste Sitzung findet Dienstag, den 20. Oktober, abends 8 Uhr, im Landesheim zu Hannover, statt. Vortag des Herrn Ottens über: „Die Vögel der Leineniederung". Nächster Spaziergang: Sonntag, den 25. Oktober, in die Eilenriede, Treffpunkt 9½ Uhr am Kriegerdenkmal. Becker.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste willk. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Versammlung aller 14 Tage Sonnabends. Vereinslokal: Gasthaus „Zur Krone", Jena, Grietgasse. Gäste stets willkommen. Jena besuchende Vogelliebhaber treffen jeden Sonntag vorm. den Schriftführer Adolf Voigt, Jena-Ost, Feodoraстraße 13, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube freundlichst eingeladen. Adolf Voigt, Schriftf.

Der Verein für Vogelschutz und -pflege Jena hielt am Sonnabend, 3. Oktober seine erste Versammlung in dem neuerwählten Vereinslokal „Zur Krone" ab. 14 Mitglieder und 5 Gäste waren erschienen. Herr Jahn hielt einen Vortrag: Die Aufgaben des Vogelfreundes im Herbst und Winter. Er sprach kurz über die Käfigvögel und ausführlich über den nötigen Winterschutz der freilebenden Vögel. Sehr ausgiebig war die Aussprache, die sich bis gegen 11 Uhr hinzog und alle Arten des Vogelschutzes streifte. Die nächste Versammlung findet am 17. Oktober statt. Herr Bischoff wird einen Vortrag über Vogelkäfigung halten. Auch dieser Abend soll als Werbeabend für die Vogelliebhaberei gelten. Es ist uns weniger darum zu tun, Mitglieder für den Verein zu werben, so lieb uns solche auch sind, als der Sache zu dienen. Gerade Thüringen bedarf dringend der Aufklärung über die Ideale der Vogelhaltung. Sitzen doch gerade hier die ärgsten Feinde derselben neben unendlich vielen Vogelliebhabern, darunter auch solchen, die durch Unverstand (zu kleine Käfige) unserer Sache furchtbar schaden! A. Voigt.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vors.; Boppel, 1. Schriftf.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an!

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 15. Okt. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Laßner im Volkshaus-Nord, Glogauer Str. 20. Liebhaber willk. J. A.: Friedrich.

Verein der Vogelfreunde Linden. 1. Vors. P. Winkel, Linden, Fröbelstr. 9.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Sitzung aller 14 Tage im Restaurant „Zum Neckarstrand", Messeplatz 1. Liebhaber willkommen. Joh. Daubmann, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Achtung! Am 15. d. M. erhebt die Post die Bezugsgebühr für Nov. Wir bitten den Betrag bereit zu halten, damit die Quittungen beim ersten Vorzeigen eingelöst werden und keine Unterbrechung in der Belieferung eintritt. Wo der Briefträger die Quittungen nicht vorzeigt, ist er daran zu erinnern. Bei Bestellung nach dem 25. erhebt die Post eine Extragebühr von 20 Pfg., die vermieden werden kann, wenn die Zeitschrift rechtzeitig bestellt wird.

viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per ℔ od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

ogel-Mistelleim
um Fangen schädlicher Vögel, Abend bei jeder Witterung, garangebrauchsfähig, Dose 2.— M. fr. von reitag Nchf., Frankenberg i. S. 6. derverkäufer hohen Rabatt. [1360

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark ¼ Pfd. franko versend. D. Waschinski & Co., Biesenthal I (Mark). [1363

Mehlwürmer Ia Pfd. 5.— ℳ (ohne Spesen) ½ Pfd. 3.— ℳ frk. Voreinsend. Jeltner, Breslau, Weinstr. 12. [1364

Mehlwürmer
beget. gefüttert, ¼ Pfd. 1.75 M., ½ Pfd. 3.25 M., 1 Pfd. 5.60 M.
Wiederverkäufer Rabatt.

Mehlwürmer
1 Pfd. 5 ℳ ab hier, Voreinsendung ¼ Pfd. 2 ℳ franko.
Großabnehmer Rabatt.

Ameiseneier
1925er, 4.50 ℳ per Pfd.
Weißwurm, 1925er 4.50 d. Pfd.
Ruska-Zecken . . 1.50 d. Pfd.
Seidenraupen-puppen, gemahlen 0.75 d. Pfd.
Garnelen, gemahl. 0.35 d. Pfd.
f. Universalfutter
Extra I für Nachtigallen ℳ 2.—
„ II für Grasmücken ℳ 2.—
„ III für Drosseln . . ℳ 1.50
Pfund ab hier, ausschl. Verp.; bei größeren Mengen billiger. [1361
Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
Eckrich II, Waldsee (Pfalz).

Ameiseneier
1925er, Pfund 4.50 M.

Weißwurm, 1925er, Pfund 4.50 M.
Ruska-Zecken Pfund 1.50 M.
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen Pfd. 0.75 M.
Preise sind freibleibend, ab Lager, Porto und Verpackung. Bei Anfrage Rückporto beifügen. [1362
größerer Abnahme hoher Rabatt.
Karl Claus, Mutterstadt II (Hauptbahnhof).

„KAPPEL"

Schreibmaschine

Erstklassiges Erzeugnis ∴ ∴ Strapaziermaschine

Letzte Neuerung:
Geräuschloser
Wagenrücklauf

Maschinenfabrik Kappel A.-G.
Chemnitz-Kappel

Getrock. Ameisenpuppen
à Pfund 5.— u. 5.50 Mark.
Ia Muska (Zecke) à Pfd. 2.00 M.
Ia Weißwurm à Pfd. 4.50 M.
Franko geg. Voreinsend. des Betrages.
Th. Witte, Niederndodeleben bei Magdeburg. [1365

Vogelfutter [1366
für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 18 über Vogelfutter umsonst.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1 Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Ein Versuch
überzeugt jeden von der Güte meines Universalfutters. Preis 2 M. p. Pfd. Sämtliche Futtersorten für Exoten, Wald- und Kanarienvögel zu billigsten Tagespreisen. Versand geg. Nachnahme. Verpackung und Porto werden billigst berechnet. [1367
P. H. Kirsten, Leipzig 3, Zeitzer Str. 53. Fernruf 31445.

Offeriere Vogelfutter in prima Qualität:
Getr. Ameiseneier . . à Pfd. 3.80 M.
10 Pfd. 36.— M. franko
Weißwurm . . . . . Pfd. 4.— M.
Con. Eigelb . . . . . Pfd. 2.— M.
Karottengrieß . . . . Pfd. 0.70 M.
Drosselfutter . . . . Pfd. 0.80 M.
Lucullus extra Mischung ½-Pfd.-Paket 0.95 M., weiße Packung 0.80 M.
Senegalhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Silberhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Algierhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Kerbtiernahrung f. Kanarien Pfd. 1.30 M.
Versand per Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. [1368
Paul Zornack,
Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189.
(Postscheck-Konto Nr. 852 65)
Gegründet 1905.

„ORNIS“

Freie Bezugsvereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands.
Gegründet 1912 .·. Fernsprecher 4198 [1369

Fachgemäße Belieferung mit Vogelfutter („Reform-Normal“, individuelle Zusammensetzung bei restlosem Verbrauch; stets frisch gemischt). Hunderte von Liebhabern füttern seit über einem Jahrzehnt mit bestem Erfolg nur „Reform-Normal“.

Reform-Normal-Käfige Mod. ORNIS 1925, neue Preisliste erschienen. — Modern eingerichtete Käfig-Bauanstalt mit elektrischem Betrieb.

Anschrift: Ornis-Haus, Halle-Saale. Der Geschäftsführer: Martin Sperling.

„Naturell“

das seit Jahrzehnten in Liebhaberkreisen eingeführte und bestens anerkannte Futter für edle Weichfresser ist wieder in bester Friedensbeschaffenheit lieferbar! **„Naturell“ ist Qualitätsware,** auf Grund langjähriger Erfahrungen zusammengestellt und durch Autoritäten bestens beurteilt. [1370

Preis: kg 6.— M. Probesendungen gegen Einsendung von 1.— M. in Briefmarken. Drosselfutter kg 2.— M.

Empfehle außerdem bestes Körnerfutter für Einheimische und Exoten, ferner Ia Ameisenpuppen, Weißwurm usw.
Nur direkt zu beziehen von

Wilhelm Dietze, Leipzig, Kurprinzstr. Nr. 15.

Mehlwürmer

geg. Einsendung v. 2 M. 1/4 Pfd. franko.
Ameiseneier, Pfd. 4.50, gesiebt 5 M.
Weißwurm . . . . . Pfd. 5 M.
Muska . . Pfd. 2 M., gesiebt 3 M.

Universalfutter

1371] I II III
Pfund 2.— 1.40 0.80
Waldvogelfutter . . . Pfd. 0.60
Papageifutter . . . . Pfd. 0.80
Bei Abnahme von 10 Pfund portofrei.
Händler und Vereine erhalten Rabatt.

W. Hiltmann, Berlin S 14, Dresdener Str. 24.

Ia Elbweißwurm (1925er)
Ameiseneier (1925er)
Muska (Zecke) (1925er)

liefert ab Lager **Schandau** i. Sachsen jedes Quantum billigst [1372

Rudolf Frolik,
Rongstock-Nestersitz a. E.,
Cechosl. Republik.

20 Liter trockene **deutsche Ameiseneier**
à Liter 1.75 *M*.
Jos. Ehrlich, Würzburg,
Weißenburgstraße. [1373

Stieglitze,

Zeisige, Hänflinge, Girlitze usw.
Liste nur gegen Freimarke.
J. Beck, Stuttgart,
Tierimport. [1374

Prima Edelroller

mit tiefen Hohltouren. Große Auswahl, mäßige Preise. 2 Staatsmedaillen.
Kanarienfeinzucht seit 1876. [1375
P. Holzky, Cöthen i. A.

Grüne Wellensittiche

sehr kräftige, blutsfremde Vögel,
ausgefärbte Zuchtpaare Paar 15.— M.
einzelne Weibchen Stück 9.— M.
Jungvögel Paar 12.— M.
gibt ab [1376
Max Kasten, Schwenningen a. N.

Afrik. Kalanderlerchen

Stück 15 *M*, die beste Sängerin, große Stieglitze Dutzend 30 *M*, Stück 4 *M*, Rothänflinge Dtzd. 25 *M*, Stück 4 *M*, Stieglitz-Weibchen Dutzend 18 *M*, Buchfinken Dutzend 20 *M* und noch vieles andere. Anfragen nur gegen Marke.
Beck, Tierimport, Stuttgart. [1377

Wegen Platzmangel verk.:

1,0 Star, zahm, 2jährig 15.— M.
1,0 Amsel, junge, studiert 6.— M.
1,0 rotrück. Würger, zahm 8.— M.
1,0 Feldlerche im Gesang 6.— M.
1,0 Stieglitz im Gesang . 6.— M.
4,0 Harzer Roller,
grüne u. gelbe . . . à 12.— M.
2,4 z. Zucht, **prima** fütternd, zusammen 30.— M.
Bitte wo möglich Versandkäfige senden.
Anfragen erbitte Rückporto.
Ernst Grub, München,
1378] Schleißheimerstr. 87/3.

Suche

Steinrötel, Orpheusgrasmücke, Blaudrossel, Gouldamadinen, kl. **Tangaren.** [1379
Dr. Höft, Altona (Elbe),
Flottbeker Chaussee 58.

Verkaufe

[1380
aus Freivoliere folgende gesunde u. einwandfrei befiederte Vögel:
1 kl. Gelbhaubenkakadu . . 35.—
1,1 zuchterpr. kl. Schopfwachteln 40.—
1,1 Paradieswitwen i. Pracht 7.—
1,1 Blutschnabelweber i. Pr. 6.—
1,1 rotgeh. Kardinäle . . . 15.—
2,1 Amaranten . . . . . 6.—
1,1 kleine Elsterchen . . . 4.—
3 Stück Grauedelsänger . . 8.—
1,1 Bandfinken . . . . . 5.—
1 Papstfink . . . . . 10.—
Junge Wellensittiche
1 Kreuzschnabel . . . . . 4.—
1 Stieglitz . . . . . 6.—
1,2 Kanarien . . . . . 15.—
Erich Richter, Bernstadt i. Sa.

Verkaufe

1 Ia Rotkopfwürger, 1 Schwarzstirnwürger, 1 Rotrückenwürger, 1 Nachtigall, 1 Blaukehlchen, alles gesunde und klassige Vögel. [1381
Rob. Thiele, Altona (Elbe),
Lohmühlenstr. 6 II.

Verkaufe oder vertausche

1,0 Kaprötel gegen **Niltawa,** braunbr. **Blauschn., Schama** od. andere **Ausl. Kracht, Freiburg** i. Br., [1382
Kaiserstr. 154.

Blaudrosseln

Singdrosseln, Nachtigallen, Schwarzplatten, prima echte Tiroler Gebirgsvögel für verwöhnte Liebhaber abzugeben. [1383
Rich. Heydenreich,
Bad Suderode (Harz).

Himmelblaue
Wellensittiche

prima blutsfremde einjährige Zuchtpaare, à Paar 120 *M*, abzugeben. [1384
Rich. Heydenreich,
Bad Suderode (Harz).

Suche

alle Arten **Vögel** und **Tiere** zu kaufen. Preisangebote an [1385
Josef Krah, Vogel- u. Tierhandlung,
Frankfurt a. M., Kühgasse 7.

Aus meiner Farbenwellensittichzucht

gebe ich zuchtreife P… ab: Grüne 20 M., … 22 M., oliv 40 M., dunkle 80 M., orangegelbe je nach Wellenzeichnung 40 bis 80 … jade 60.— M. das Paar. Meine sämtlichen Wellensittiche führen blaues Blut, … die gelb., u. hab. geschloss. Fußringe, die den Abstammungsnachweis ermöglichen. … sind sowohl zur Reinzucht wie zur Kreuzung u. Blutauffrischung sehr geeig…
1386] **Richard Schwarzkopf, Ingelfingen** (Württbg.), A.Z.-Mitgl. …

Kreuzschnäbel

blutrote, gelbe und bunte, sehr schön ausgefärbte Männchen, per Stück 4 *M*, per Dtzd. 40 *M*, Weibchen 20 *M* per Dtzd., Alpensteglitze, garant. Männchen, per Stck. 3 *M*, p. Dtzd. 30 *M*, Weibch. 15 *M* p. Dtzd., goldgelbe Zeisige p. Stck. 2 *M*, p. Dtzd. 22 *M*, Dompfaffen, rot, per Stück 5 *M*, p. Dtzd. 55 *M*, Weibch. p. Stck. 2.50 *M*, p. Dtzd. 28 *M*, Blauhänflinge, Männchen, p. Stck. 2.50 *M*, per Dutzend 28 *M*, Buchfinken p. Stck. 1.50 *M*, per Dutzend 16 *M*, Berg- und Grünfinken p. St. 1 *M*, p. Dtzd. 11 *M*. Verpackung und Porto extra. Für Geschlecht und lebende Ankunft leiste ich Garantie. Versand per Nachnahme.
Arno Jahn, Großbreitenbach/Thür.
Postfach 41. [1387

Verkaufe

1,1 Indigofinken, ausgefärbt, 20 *M*, 1,0 Hahnschweifwida in Pracht 35 *M*, 1,1 Paradieswida in Pracht 9 *M*, 0,3 Kanarien, 1924er, 3 *M* (Vögel üb. 1 Jahr gekäf. und Ia befiedert), junge Wellensittiche, grün und gelb, t. Freiflug gezüchtet, Ia befiedert, à 4 *M*. [1388
Saller, Planegg, Hofmarkstraße 8.

Prachtw. Alpen-Ringdrossel (Turdus torquatus alpestris) 10 *M* od. Tausch gegen ♂ **Kampfläufer** oder andere kl. Sumpfvögel. **Bauer, München,**
Westendstraße 139/0. [1389

Verkaufe

wegen Anschaffung einer Nachtigall einen schönen skandinavischen Sprosser (1924er Frühjahrswildfang), da für mich zu laut, für den Preis von 30 *M* inkl. Verpackung. Garantie für Männchen.
Gotthold Gröbe,
Berggießhübel i. Sachs. [1390

10 Paar Zebrafinken

à Paar 15.— Mark. [1391
Mehrere selbstgezüchtete Maskenamadinen unbestimmten Geschlechts abzugeben.
Grosse, Magdeburg, Sieverstorstr. 42.

Guatemalasittich,

schön im Gefieder, sehr zahm, fängt an zu sprechen, verkauft in gute Hände für 30 *M*
Fr. Loose, Hamburg, [1392
Neumünsterstraße 40.

Suche 1,0 guten **Hänfling** × **Kanarie** zu kaufen oder zu tauschen gegen **Vogelbücher.**
H. Eberhardt, Nordhausen,
Altendorf 36. [1393

Gebe ab:

pr. Steinrötel, Sprosser, Nachtigall, Drossel, Sperbergrasmücke, Schw… plättchen. **Suche:** Schama, Kalan… lerche, Graupapagei, auch andere. [1…
Strauß, Breslau 3, Bergstr. 3

Abzugeben:

1,1 Spitzschwanzamadine, bl…
fremd, zuchtfähig, 45.— *M*.
1,1 Weißkehlpfäffchen 12.— *M*.

Gesucht:

Einige Männchen olivgr. Afri…
Amerik. Zeisige, einzeln od. i. Paa…

Walter Voigt, Jena

Feodorastraße 13. [1…

Verkaufe:

Naumann, 400… 85.— *M*; **Heugl,** Ornith. Nordostafrikas 65.— *M*; **Brel…** Vogelfang 55.— *M*; **Rey,** Eier 55.— … **Brehm,** Thierleben 1. Aufl. 55.— … u. a. m. [1…
E. Albrecht, Bischofswerda (Sac…

Ia Schwarzdrossel,

1 J. gek., fleiß. Naturfänger, wied. … aalgl. **15 M.; m. zerlegb. Kä…** 100×45×55 cm, **zus. 30 M.** [17
P. Peschteich, Finsterwalde N…

Billige Bücher

für die langen Winterabende:
Brehms Tierleben, 3 Bde., … 1100 Abb., vollständig nur 15 *M*
Allg. Erdbeschreibung, 2 B… 2400 S., 10 *M*.
Auf der Höhe, intern. Revue … Sascher-Masoch, 6 Bde., 12 *M*
Westermanns illustr. Mono…hefte, Orig.-Einband, 14 Bde., … Bd. 800 S., pro Bd. 2 *M*.
W. Müller, Friedersdor… (Kreis Beeskow). [18

Mauserpistole

6,35 m. rindlederner Tasche vertauscht …
Waldvögel
Schuhhaus Barth, Götting…

Inserate

für das am 22. Oktober 1925 …
Ausgabe gelangende Heft 43 …
Gef. Welt erbitten bis 17. Oktob…

Himmelblau

die Sehnsucht jeden Wellensittichzüchters! Dieses Thema der Farbenzucht finden Sie ausführlich behandelt in der neuen Auflage des soeben erschienenen Werkes:

Der Wellensittich

von Dr. K. Ruß, 7. gänzlich neubearbeitete u. vermehrte Auflage mit 2 Farbentafeln und 31 Abbildungen von Karl Neunzig.

Jeder Züchter, auch der Besitzer der alten Auflage, muß sich diese neue, auf der Höhe der Forschung stehende zulegen. Der Preis ist in Hinblick auf die zu erwartenden Erfolge durch richtig angelegte systematische Zucht gering. Er beträgt nur 3.50 M., und was kostet dagegen ein Farbenwellensittich?

Bestellen Sie daher noch heute.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg
Postschließfach 148. Postscheckkonto: Magdeburg 3148.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 22. Oktober 1925 | Heft 43

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Mein Haidijo.

Von Karl Kepp.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Von seinem Vorgesang weiß ich wenig mitzuteilen. Ich erinnere mich nur, daß er sehr angenehm war und daß mich mehr der Klang seiner Stimme gefangen nahm, der so viel Empfindungen mitschwingen ließ.

Der (laute) Schlag ließ deutlich zwei Teile unterscheiden. Eine kürzere oder längere Reihe von wechselnden flötenartigen Tönen bildete den ersten Teil. Er leitete vom Vorgesang hinüber in jenen zweiten und Hauptteil des Schlages, in dem die ganze Steigerung ihren Abschluß fand und dessen Töne silbenähnlich waren.

Oft setzte der Schlag ohne weiteres mit diesen silbenähnlichen Lauten ein.

Der Schlag wurde temperamentvoll und froh jubelnd vorgetragen, gegen Ende der Sangesperiode leidenschaftlich bewegt; also nicht eigentlich langsam und tiefflötend, wie es Rausch verlangt. Die Stimme erschien mir im allgemeinen eher hell als dunkel und hatte jene Beimischung, die wir als „silbern" bezeichnen.

Während der Monate der besten Sangesleistung war der Sänger unermüdlich. Alsbald nach dem Schlage begann wiederum der Vorgesang.

Das Ideale wäre gewesen, das Lied im Phonographen aufzufangen. Leider ging es nicht an, ich mußte mich vielmehr mit der alten Methode begnügen und aufzeichnen, was wortähnlich war und sich einigermaßen in unseren Silben wiedergeben läßt.

Ich versuche also jene ausdrucksvoll, stark rhythmisch und mit ganzer Kraft vorgetragenen Töne wiederzugeben, die den Höhepunkt des Liedes, den Hauptteil des Schlages bildeten und im Gegensatz zu den vorhergehenden Tönen wie Silben der menschlichen Sprache erschienen.

Eben sie sind es, die den Schlag des Haidijo so verschieden machten von dem, den wir sonst als Schlag der Schwarzplättchen hören, da wir dort wohl Flötentöne oft mit sprechartigem Rhythmus, nie aber, soweit meine Erfahrung reicht, silbenartige Tonfolgen hören.

Ich will nun erst die Elemente geben, die ich nach manchen Aufzeichnungen herausgefunden habe, und dann einige seiner besten Schläge.

Zunächst und am häufigsten war der eigentliche haidijo-Laut. Sobald diese Tonfolge kam, nahm er alle Kraft zusammen, der ganze, kleine Körper war durchrüttelt, und das jubelnde hai stieß er so stark hervor, daß man meinte, den Hauchlaut zu hören.

Dieses haidijo-Gebilde erschien in folgenden Abwandlungen: hai (auch als langer oder kurzer, stark betonter Schlußlaut), haïdi oder haï-dï, haidijo, haidïjodi (haidïjidä) haidïjodïjodï (~ jidä), haidïjodïz, haidïjodïzpidï, haidïjodïzpäïrä. Die Schlußlaute pidï und päïrä erscheinen nur als Umwandlungen von haidi und haidïjä.

Ich will hieran gleich die Lautfolge haideli schließen, die in fideli überging und hier zu fidelicae erweitert wurde.

Der schöne tiefe huï-Laut wurde seltener vorgetragen. Ich habe angemerkt huï, huihö, huïhä, huïdï, huïdijo, huïdijodï, dieser uï Laut erschien auch in der Verbindung zwuïdr-hä, zwuïdr-hïjä und ähnlichen sowie in der Verbindung zwuïdr ïssäk.

Der tijihö war sehr selten. Ich nehme die Laute pïjö, pïjä, pijihä, hïjä, twïjä als Abänderungen davon an.

Als ganz verschieden hoben sich ab die Lautgruppen: trafik, terrifik, terripifik (kurzsilbig endbetont) und filipp, schilipp.

Als besondere Endlaute möchte ich noch erwähnen tjä und tjörr, da sie eine ähnliche Bedeutung zu haben schienen wie der Schnapper des Buchfinken.

Aus dem ersten Teile des Schlages möchte ich Laute erwähnen, die wie pali, cili, widlzä, tellijä und ähnliche bereits zu sehr in unsere Silben übersetzt sind.

Nun will ich einige Reihen seiner Schläge in systematischer Ordnung bringen und nochmals erinnern, daß sie außerordentlich stark rhythmisch und so vorgetragen werden, daß die Ausdrucksmöglichkeit in ihnen nicht mehr zu steigern schien.

1. haïdijo haïdïjo haïdïjodï
2. „ „ haïdijodïz
3. „ „ haïdijodïzpïdï
4. „ „ haïdijodïzpäïrä
5. haïhijihö hijihö | haïdijodizpidi
6. haihijiho haihijiho haïdijodizpäïrä

7. haidijodijodĭ | haidijodĭ
8. " haidijodiz
9. " haidijodizpidi
10. haidijodizpidi haidijodi (Umkehrung)
11. haidi haidijodihi haidi
12. hāi-dĭ
13. haidijodizpäiirä | haidĭ
14. haidijodiz
15. haidijodizpidi } haidijodizpäiirä
16. pĭdĭ pidi pidi | haidijodizpidi pidi
17. haidijodizpädidjä
18. haidijodizpidi tjörr.
19. pijŏ pijŏ haidijodizpidi
20. hijŏ hijihä haidijodizpäiirä
21. tĭjĭhŏ haijĭhŏ haidijodizpidi
22. haidijodizpidi tijiho haidijodizpäiirä
23. hŭĭ—hŏ twijä haidijodizpidi
24. huĭdijŏdĭ huĭ
25. huidijŏ tijĭhŏ tijiho huidijodizpidi
26. haidijodizpäiirä haidĕlĭ
27. haideli haideli haideli ziä
28. fidelicae päräirä fidĕlĭ fideli fidelĭciä
29. fideliciä fideliciä haidijodizpäiirä
30. haijŏ twiä haidĕlĭ | fidĕlicä päräirä haidijodizpĭdĭ
31. haidijodi träfĭk
32. haidijodizpidi terrifik haidijodizpäiirä
33. haidijodijodijodĭ terrifik haidijodizpäirä
34. haidijodizpäiirä terrifik haidijodizpäiirä
35. haidijodizpidi terrifik terrifik haidijodizpidi
36. terripifik haidijodizpäiirä
37. haidijodijodi terrifik haidijodiz
38. haidijodizpidi filĭpp haidijodizpidi
39. filip filip filip haidijodizpäiirä fideli
40. filip filip filip terripifik
41. hŭi hŏ zwŭidr issäk haidijodizpidi
42. hijŏ zwuidr issäk haijihĭ haidijodizpidi
43. haidijo zwuidr hijo
44. hui ho zwuidr hijo haidijodizpäiirä
45. pijŏ pijo zwuidr hijä haidijodizpidi
46. zwuidr hijä | hhütdijodizpĭdĭtjä
47. hŭidijŏ hŏŭ hŏŭ | haidijodĭ.

Diese ungewohnten Silben werden klingen, werden lebendig werden, wenn man sie laut liest und sich in ihren natürlichen Fluß einzufühlen versucht; kurz, wenn man sie rhythmisch-melodisch vorträgt.

Man wird dann vielleicht auch den eigentümlichen Beiklang des Sentimentalischen gewahren; jene zarte und schmerzliche Empfindung des Vergehens, die den freudigen Jubel durchwebt und die den Schlag so wertvoll macht. (Man vergleiche etwa den einfach kräftigen und vollen Schlag des Buchfinkens.)

Man sieht ferner, wie der Schlag mit wenig Mitteln Mannigfaltigkeit erreicht: Erweiterungen, Umstellungen, Abwandlungen, Wechsel der Verbindungen, Tonwechsel, Verkürzung, Verlängerung desselben Tones treten deutlich hervor.

Ich bin mir bewußt, wie unzulänglich meine Aufzeichnungen sind, und ich möchte kurz andeuten, wie ich mir eine ernsthafte Beobachtung vorstelle.

Zunächst müßte man den Gesang nicht für sich betrachten, sondern als eine der Lebenserscheinungen des Tieres und verbunden mit ihnen.

Man müßte versuchen, von den Lebensvorgängen im Organismus des Tieres ein möglichst genaues Bild zu gewinnen und auf ihre Veränderungen achten. Man müßte die Einflüsse, die auf diesen Organismus einwirken, ständig beobachten und aufzeichnen, z. B. Nahrung, Standort, Klima, Gesellschaft und seelische Einflüsse.

Was den Gesang betrifft, so möchte ich ihn als Ausdruck einer allgemeinen und veränderlichen Lebenssteigerung im Organismus auffassen. (Lassen sich nicht Spannungs- und chemische Veränderungen feststellen?)

Man müßte die Kurven zu zeichnen versuchen, in denen der Gesang des Jahres und der Gesang während der ganzen Lebenszeit verläuft.

Man müßte aufschreiben, wie lange und wann der Vogel an den einzelnen Tagen singt. Die wechselnde Dauer und Stärke des Gesanges müßte beobachtet werden, die Zahl und Art der Motive, ihre Verflechtung und Wechsel während eines Vortrages oder während des Tages, des Jahres und in den verschiedenen Lebensjahren. Heute z. B. wiederholt der Sänger häufig ein Motiv, das morgen zurücktritt und das übernächste Jahr verschwunden ist, während neue auftauchen. Vielleicht ändert er das Motiv oder bringt es in verschiedenen Stimmungen verschieden.

Man müßte den wechselnden Umfang des Ausdrucks vom Zartesten bis zum Kräftigsten beachten und die Gefühlsqualitäten, die ihnen entsprechen.

Lassen sich musikalische Gesetze oder andere für den Aufbau des Gesanges und die Abfolge der Töne erkennen?

Und endlich käme die Frage nach dem Schönheitswert.

Nun wohl, wir sehen uns wie bei jedem Lebewesen Unendlichkeiten gegenüber und es könnte wohl den einen oder anderen Liebhaber reizen, den Versuch einer solchen Monographie zu schreiben. Aber wir anderen Liebhaber sind bescheidener.

Ich frage mich, worauf kommt es uns Liebhabern meistens an? Ich denke, wir wollen von unseren Pfleglingen eine Lebensanregung erhalten, die jedes Tierchen nach seiner Eigenart gibt, und die wir in der Empfindung aufbewahren, auch wenn längst das Bild unseres Lieblings geschwunden und sein Gesang verstummt ist.

Und aus der Empfindung heraus möchten wir den uns vermittelten Lebensgehalt oder wie wir es nennen: das Wesen, den Charakter unserer Gefährten lebendig machen, indem wir das benutzen, was wir mit ihnen erfahren haben.

Und wie ist es mit dem Gesang? Gewiß reizt es uns, ihn in allen Einzelheiten zu erfassen und in möglichst eindeutigen Zeichen festzuhalten. Aber wie verhalten wir uns gewöhnlich? Wir lauschen ihm und lassen uns gleichsam durchdringen von diesen Tönen, wir erleben ihn als Stimmung, wir erfahren seinen Charakter und sind froh, wenn wir uns und anderen jene Teile des Gesanges verdeutlichen können, die am meisten jenes Empfindungserlebnis bestimmten.

Nun habe ich noch einige Fragen. Wie kommt es, daß der Schlag des Haidijo so sehr von dem der anderen Schwarzplättchen verschieden ist; ist er Naturgesang oder etwa doch Kunstgesang? Ist er auf die Sänger des Wiener Waldes beschränkt? Ich bemerke, daß ein hier großgezogenes Nestjunges den Haidijoschlag nicht angenommen hat, obwohl es den Haidijo einige Jahre als Vorschläger hörte.

Mein Haidijo wird keineswegs der beste Schläger gewesen sein, aber vielleicht kann ihn der Wiener Liebhaber nach dem Mitgeteilten einschätzen und vielleicht auch mit Hilfe der aufgezeichneten Schläge anschaulich machen, wie die Einteilungen bei Matthias Rausch, zweite Auflage, S. 124, zu verstehen sind.

Ist nur Nr. 47 ein Überschlag?

Lieber kleiner Haidijo, du hast dein Alter erreicht — 14 Jahre in Pflegschaft — aber dann wuchs das Zeichen des Leides aus deiner Melodie hervor, wir mußten Gnade üben und dich vom Leben befreien.

Lieber kleiner Haidijo, warst du auch nicht der Erste deiner Art, so warst du doch ein gar köstliches Geschöpf. Die gestaltende Kraft machte dich einzigartig und wird dich nicht wiederholen in deiner Wesenheit so wie gerade du warst. Möge sie nur deinen Stamm lebendig erhalten. Möge der Ruf nicht aussterben, der Lebenerhöhende, Kümmernisscheuchende, den du fortjubelst in mir:

Haidijo, Haidijo, Haidijodi!

Biene und Lori. — Ein Papageienliebhaber.

Von Emil Kaforke, Berlin.

(Nachdruck verboten.)

In Australien und der polynesischen Inselwelt wohnen die Loris, mehr oder weniger rote, blau, grün und schwarz geschmückte, lebhafte, anmutige Papageien, die sich anatomisch von ihren Artgenossen durch den Schnabel ohne Feilkerben und eine bewimperte Zunge unterscheiden. Dieses merkwürdig ausgerüstete Organ ist vorzüglich geeignet, den Hauptnährstoff leicht und schnell zu erlangen.

Der Lori lebt in der freien Natur wie die Biene besonders von Blütenstaub und nebenbei von Blütennektar sowie süßen, saftigen Früchten. Letztere besucht auch die Biene, sobald sie eine bereits offene Zugangsstelle vorfindet. Was Professor K. Sajó über Bienen sagt, gilt auch für die hier in Betracht kommenden Krummschnäbel.

„Der Blütenstaub ist den Bienen eigentlich noch wichtiger als der Nektar, weil dieser sehr wenig Stickstoffverbindungen enthält, der Blütenstaub dagegen mit seinem bedeutenden Gehalt an eiweißartigen Stoffen zum Aufbau des Bienenkörpers, also in erster Linie unentbehrlich ist. Ohne Blütenstaub gibt es gar keine richtige Bienennahrung. Somit liefert der Blütenstaub die eigentliche Grundlage des Bienenlebens."

Der Auf- und Abbau von Eiweiß im Organismus heißt Lebensprozeß. Das Bedürfnis schafft sich seine Organe. Was die Biene mit dem Fersenglied, das besorgt der Lori mit der Zunge, er streift den Pollen von den Staubgefäßen. Für mich ist kein zwingender Grund vorhanden, anzunehmen, daß durch die Gewinnung des Honigs aus den Nektarien der Pflanze sich gerade eine breite Bürstenzunge gebildet haben sollte, da ja alle Papageien namentliche Leckermäuler sind und gern den Saft süßer, zuckerreicher Früchte schlecken. Mit welchem Behagen und welcher Leichtigkeit Jakos und Araras süße Weinbeeren ausschlürfen, erlebe ich täglich.

Um Loris in der Gefangenschaft gesund zu erhalten, gilt es, den eiweißhaltigen Pollen durch eine andere leicht assimilierbare eiweißreiche Nahrung zu ersetzen. Hierzu wird von den Importeuren gekochter und gezuckerter Reis gewählt, der aber nach meiner Erfahrung einmal wegen des schnellen Verderbens und dann wegen der durch den Kochprozeß veränderten Eiweißkörper auf die Dauer nicht nur unzureichend, sondern sogar schädlich ist. Die Reismansche vertausche ich durch wirklich sachgemäß hergestelltes, lockeres, eingeweichtes und wieder ausgedrücktes Eierbrot, Ameisenpuppen und Sämereien. Nebenher werden vollreife süße Früchte des In- und Auslandes, wie sie die Jahreszeit bietet, gereicht. Als Getränk erhalten bei mir alle Papageien ohne Ausnahme bis zur völligen Eingewöhnung ungesüßten Haferschleim, der täglich zweimal frisch bereitet und durch meine Zunge und Reagenspapier auf einwandfreie Beschaffenheit geprüft wird. Loris und Papageichen halte ich nur dann für lebensfähig, wenn sie an Samenfutter gewöhnt sind. Obwohl mir bewußt, daß letztere Ansicht für einen Irrtum erklärt wird, kann ich von meiner Erfahrung nicht abweichen. Man pflegt den kerbenlosen Schnabel für Sämereien als nicht geeignet zu bezeichnen, indes, abgesehen davon, daß Dr. Finsch im Magen von Trichoglossus ornatus Sämereien fand, vermag ein Lorischnabel Spitzsamen, Sonnenblumenkerne, Hirse, Hanf und Hafer ohne jede Schwierigkeit zu

Rotkehlchen, 7 Tage alt (s. S. 504).

enthülsen und zu zerkleinern. Er ist zwar kein Microglossusschnabel, aber immerhin doch ein Papageienschnabel.

Bemerkt sei noch, daß es nicht zulässig, die Futtergefäße täglich mit allen möglichen Leckerbissen zu füllen, sondern gemessen, abwechslungsreich muß der Pfleger den Tisch beschicken. Als Richtschnur für das Menu beachte die Beschaffenheit der Entleerungen.

Der Aufbau des Körpers erfordert vieles, aber nicht viel. Es sterben mehr Individuen durch Überfütterung als durch Hunger. Das war das Geheimnis der Erfolge, welche der ideale Vogelliebhaber und logisch denkende Forscher, unser hochverehrter Dr. Karl Ruß, erzielte. Sein gesunder Menschenverstand schuf unvergängliches, trotzdem er die wissenschaftlich bedeutenden Vitamin- und anderen Forschungen auf dem Gebiete des Ernährungsproblems nicht kannte.

Von großem Wert für das Wohlbefinden der Loris und Papageichen ist auch ein mit verschieden starken Stäben versehener geräumiger Käfig, der den hurtigen Tieren reichliche Bewegung gestattet, die wiederum den Stoffwechsel lebhaft fördert. Be-

züglich der Temperatur genügen die Wärmegrade unserer Wohnräume, ich habe Loris gesehen, welche sich nach Herzenslust im Schnee tummelten. —

Obgleich nach Ben Akiba alles schon einmal dagewesen, dürfte folgendes Erlebnis doch zu den Episoden zählen, die sich nicht alle Tage ereignen.

Im Theater einer größeren Stadt des Auslandes betrat nach der Vorführung dressierter Papageien ein eleganter Herr die Bühne, um den besten gefiederten Artisten, einen großen Gelbhaubenkakadu, käuflich zu erwerben. Mit dem Bescheide der Besitzerin, daß das Tier in dem Ensemble unentbehrlich sei, verließ der Vogelfreund das Haus. Am nächsten Abend wiederholte sich dasselbe Spiel, nur schenkte der Fremde der Dompteuse kleinen Tochter einen Dollar. Mit den Worten: „wir brauchen kein Geld, wir verdienen ja Geld," war auch dieser Versuch abgeschlagen. Trotz alledem erschien nach der dritten Vorstellung der unermüdliche Held noch einmal, überreichte in liebenswürdigster Weise dem begehrten Papagei ein Stückchen, dem jungen Fräulein eine Tafel Schokolade und verschwand. Noch an demselben Abend starb der Kakadu, während Mutter und Kind zwar nach dem Genuß der edlen Gabe erkrankten, jedoch verhältnismäßig schnell sich wieder erholen konnten.

Diese wahre Begebenheit ist das Werk eines immerhin begeisterten Papageienliebhabers, der sich leider infolge seiner überaus sensiblen Natur und seines schwachen Charakters grausam rächte. Ihm möchte ich ins Stammbuch schreiben:

„Mußt du denn besitzen, was dich erfreut? —
Unerreichbar wandeln die Sterne ihre Bahn, und jeder
freut sich ihrer dennoch!"

Über eine Rotkehlchenbrut in der Gefangenschaft.

Von Helmut Hampe, Braunschweig.

Mit 4 Aufnahmen des Verfassers.

(Nachdruck verboten.)

Viele Vogelkenner, Liebhaber wie Händler, glauben das Geschlecht bei Rotkehlchen nach deren Äußern sicher erkennen zu können. Die Exemplare, bei denen das Rot intensiver und von einem bläulichen Rand umgeben ist, während sich die Vögel gleichzeitig aufrechter halten und im ganzen größer sind, sollen Männchen sein. Manche machen sich die Sache noch bequemer, indem sie in dem Vorhandensein oder Fehlen der bekannten gelblichen Spitzenflecken auf den Armdecken ein Geschlechtsmerkmal erblicken. Beide Verfahren sind jedoch gänzlich unzuverlässig. Dafür einige Beispiele.

Ein mit allen Kennzeichen der Männchen einschließlich der Flecken versehener Frühjahrsfang, der mir auch als sicheres Männchen verkauft wurde, und zwei ebensolche von mir 1924 aufgepäppelte Tiere, die obendrein vom Herbst an sehr viel leise sangen, legten sämtlich im Mai Eier; dagegen war ein anderes Rotkehlchen, das in unserem Garten sein Revier hatte, sehr unscheinbar gefärbt und recht klein; trotzdem war es, wie sein lauter Gesang bewies, ein Männchen. Ich konnte dies Tier ganz genau beobachten, da es sich wochenlang mit einem in einer meiner Gartenvolieren gehaltenen, im Gegensatz zu ihm sehr schön gefärbten Männchen bekämpfte, das eine außen, das andere im Gitter. Wenn sie dann wütend am Maschendraht hochliefen, so konnte ich ganz dicht herankommen und sie so genau betrachten. Ein Irrtum ist also ausgeschlossen.

Diese wenigen Beispiele mögen genügen, die Richtigkeit meiner obigen Behauptung zu erweisen. Es ist reiner Zufall, wenn ein intensiv gefärbtes Rotkehlchen ein Männchen ist; ebensooft ist es umgekehrt. Mit voller Sicherheit läßt sich das Geschlecht nur dann bezeichnen, wenn das Männchen in lautem Gesang ist, bzw. wenn das Weibchen gelegt hat.

Diese Einleitung hat zwar direkt nichts mit meinem Thema zu tun, indirekt aber doch insofern, als es nicht so einfach ist, ein richtiges Zuchtpaar zu bekommen. Mehrere Male hatte ich zwei Weibchen oder zwei Männchen verpflegt, und in diesem Jahre habe ich auch nur durch Zufall ein richtiges Paar erhalten. Meine beiden aufgepäppelten Vögel hielt ich und jeder, der sie sah, für Männchen; daher besorgte ich mir im April noch zwei Frühjahrsfänge, von denen der eine sich bald als Weibchen erwies, der andere aber glücklicherweise ein laut und sehr gut singendes Männchen war. Während zwei Weibchen im Zimmer, ohne daß ein Männchen dabei gewesen war, legten, das wilde eine Ei, das aufgezogene deren fünf — ein Nest hatte es sich in einem Kanariennistkasten gebaut — paarte sich das andere aufgepäppelte mit dem schönen Hahn in einer gut 5 m langen Gartenvoliere, die sie zunächst mit einigen Wellensittichen und Nachtigallen, später aber allein bewohnten, da sie die Nachtigallen zu arg befehdeten und die Sittiche ungebührlich viel von den Mehlwürmern und frischen Ameiseneiern verzehrten. Das Nest wurde aus Moos und alten Nestern, die zu diesem Behuf gereicht waren, vom Weibchen allein erbaut, und zwar in einem Wellensittichnistkasten, der bis zum Schlupfloch angefüllt wurde. Die Nestmulde war sehr tief und mit Haaren und Ähnlichem gepolstert. Am 20. Mai war der Nestbau vollendet. Begattungen konnte ich am 22. und 26. Mai, abends nach 8 Uhr, beobachten; sie fanden stets auf dem Erdboden statt; beide Gatten lockten sich dazu mit leisem Singen. Ab 22. Mai wurden sieben Eier gelegt, aber erst am 28., als das Gelege vollzählig war, begann das Weibchen mit Brüten, das Männchen beteiligte sich nie daran; es bekümmerte sich überhaupt wenig um sein Weibchen, sang aber sehr viel und kämpfte mit seinem oben erwähnten Nebenbuhler außerhalb der Voliere. Am 10. Juni, also nach 13 Tagen, kamen sechs Jungen aus, die zuerst vom Weibchen allein gefuttert wurden; das Männchen blickte zwar öfters in den Kasten, beteiligte sich aber erst vom 12. Juni ab an der Fütterung, später fütterte es dann sogar mehr als das Weibchen. Leider entwickelten die Jungen sich nicht gut, sie wuchsen langsam und die Rachen waren krankhaft blaß, anstatt leuchtend gelb gefärbt. Es mag dies daran gelegen haben, daß infolge der damaligen kalten Witterung Ameiseneier nicht genügend in einwandfreier Beschaffenheit gegeben werden konnten, und die Tiere in der Voliere auch nur wenig Insekten fanden. Obendrein begann das Weibchen am 19. Juni ein

neues Nest in denselben Kasten auf die Jungen darauf zu bauen. Wenn es dann mit Nistmaterial ankam, so sperrten die Jungen und verschlucken oft etwas davon, so daß ich, als sie bald darauf eingingen, den Magen einzelner vollkommen mit Moos ausgefüllt fand. Ein Versuch, die Tiere aufzupäppeln, mißlang, da sie schon zu sehr geschwächt waren.

Um die nächste Brut besser beobachten zu können, vertauschte ich den Wellensittichnistkasten mit einer v. Berlepschen Halbhöhle, die sofort angenommen wurde. Am 22. Juni sah ich wieder eine Begattung und am 23. Juni lag das erste Ei im Nest, dem noch vier weitere folgten. Wieder brütete das Weibchen allein und erst vom letzten Ei ab. Am 11. Juli, also diesmal nach 14tägiger Bebrütung, kamen vier Junge aus, ein Ei war faul. Um nun nicht wieder kränkliche Junge zu bekommen, beschloß ich, die beiden Alten das Futter dafür aus dem Garten sich selbst holen zu lassen. Daß sie fortfliegen würden, war ja nicht anzunehmen, höchstens konnten sie sich verfliegen bzw. gefangen werden. Und tatsächlich fand ich eines Tages das Weibchen auf der Bodentreppe unseres Hauses! Ein Glück, daß ich es gleich bemerkte; auf solche Weise habe ich schon verschiedentlich freifliegende Vögel verloren. Diesmal ging es aber gut; die beiden gewöhnten sich bald an das Ein- und Ausfliegen, durch eine etwa 15 × 20 cm Futterklappe und vom 17. ab brachten sie regelmäßig Raupen, Mücken u. dgl. an, wobei die Jungen natürlich vorzüglich gediehen. Nachtsüber sperrte ich der Katzen wegen die Alten ein; dann wurden natürlich Ameiseneier und Mehlwürmer gegeben. Das Weibchen verließ tagsüber nur selten den Garten, während das Männchen viel auf der Straße, die mit Linden bestanden ist, zu sehen war. Das Weibchen nahm mir auch draußen den Wurm aus der Hand. Im übrigen fütterte es bedeutend seltener als das Männchen. Als am 26. Juli die Jungen ausflogen, wurden die Eltern nicht mehr herausgelassen; ab 30. Juli begannen die Kleinen schon Mischfutter aufzunehmen und nach weiteren zehn Tagen waren sie vollständig selbständig und an Mischfutter ohne frische Ameiseneier gewöhnt. Natürlich sind alle vier recht zahm; merkwürdig aber ist, daß zwei beträchtlich blasser wie die andern gefärbt sind. Ob das nun wohl ein Geschlechtsmerkmal ist? Ich glaube es kaum. Jedenfalls will ich aber von jeder Sorte eins solange behalten, bis sich das Geschlecht einwandfrei bestimmen läßt und dann darüber an dieser Stelle berichten.

Versuche die Gründe des Weißwerdens bei einem gefangenen Granataftrild zu analysieren und ein paar Worte über das Gefangenleben der Art.

Von A. Adlersparre.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Könnte denn eine Veränderung der Höhenlage (in erster Reihe des Luftdruckes) die Schuld tragen? Bei mir hat der Vogel auf 30—40 m über dem Meer gelebt, wobei für möglichst reichlichen Sauerstoffzugang, fleißige Durchlüftung, im Sommer Tag und Nacht offene Fenster, Sorge getragen wurde. Das natürliche Verbreitungsgebiet des Granataftrilds: Südafrika vom Oranjefluß*) nordwärts bis Benguela und bis zum Sambesi**) zeigt starke Höhenvariationen. Die Küstenzone und der niedere Lauf des Limpopo und des Sambesi sind verhältnismäßig tieflandig (0—500 m ü. d. M.). Dann folgen eine innere Küstenzone und ein zentrales sich von Südwest bis Nordost erstreckendes Gebiet von 500—1000 m. Sehr große Gebiete im Nordwest, Norden und Südost liegen zwischen 1000 und 1500 m, kleinere Gebiete hie und da zerstreut erheben sich sogar mehr als 1500 m über den Meeresspiegel. Primäre barometrische Angaben vom inneren Südafrika stehen mir nicht zur Verfügung. Setzt man aber die mittlere



Schematische Darstellung der Höhenschichten Südafrikas.

*) Entspringt in den Drakensbergen unweit der Ostküste, durchquert das Land in westnordwestlicher Richtung und mündet an der Westküste.

**) Entspringt mit mehreren Quellen in den drei nördlichen Landhöhen (s. Karte).

Höhe auf 12—1300 m*), berückſichtigt man ferner den Breitengrad, dürfte man — allerdings mit Vorbehalt — die durchſchnittliche Druckſenkung auf annähernd 100 mm zu ſchätzen wagen.

Hier gibt es alſo die Möglichkeit, den Höhenunterſchieden irgend einen Einfluß auf die Farben zuzuſchreiben. Daß ein ſolcher Einfluß wirklich beſteht, glaubt man ſchon längſt bemerkt zu haben. Gebirgsvögel ſind oft dunkler, kräftiger pigmentiert im Vergleich zu nächſtverwandten Formen des Flachlandes. Ich bin jedoch nicht ſo ſehr geneigt, dies allein auf Luftdrucksunterſchiede zurückzuführen. Zwar bewirkt, wie es ſich bei Tierverſuchen gezeigt, das wirkliche und auch das künſtliche Höhenklima an und für ſich ſehr beachtenswerte Veränderungen innerhalb des Zirkulationsſyſtems, denen ſehr wohl eine ſekundäre Einwirkung auf die Pigmentierung zugedacht werden könnte. Aber gleichzeitig ſpielen auch andere Umweltfaktoren, die mit der Höhenlage mehr oder minder parallel verändert werden, eine ſicher beachtenswerte Rolle. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Licht dürften zu den wichtigſten unter ihnen gehören. Sie werden unten einzeln für ſich unterſucht.

Reagiert nun der Granataſtrild auf Höhenunterſchiede, iſt man natürlich berechtigt zu erwarten, daß er auch in ſeiner in dieſer Hinſicht ſehr verſchieden gearteten Heimat mehrere geographiſche Variationen aufweiſt! In der mir bisher zugänglichen Literatur finde ich indeſſen nur eine Angabe, welche möglicherweiſe zur Begründung dafür genommen werden könnte, daß auch andere Aberrationen vorkommen könnten, nämlich: „The intensity of the lilac colour on the face and the extent of black on the abdomen vary considerably in a series of male birds“**) (Cat. Birds Brit. Mus.)***). Hier intereſſieren uns, wie geſagt, mehr die Variationen im Weiß und die Vertretung des Braun durch Grau auf der Rückenſeite. Möglicherweiſe könnte größeres Material der Muſeen Aufklärung in dieſem Punkte geben.

Alſo, ſolange man keine Variationen in vorliegender Hinſicht bei im Freien tieflandbewohnenden Granataſtrilden gefunden, gibt es meines Erachtens keinen Grund die Veränderungen meines Exemplares auf ein Leben allzu nahe am Meeresſpiegel zurückzuführen. So auffallende Veränderungen, wie diejenigen, von welchen hier die Rede iſt, wären wohl ſchon längſt in der Literatur vermerkt worden — ſofern man ſie nicht möglicherweiſe irrtümlich für poſtmortale (nach dem Tode eingetretene) Verbleichungen gehalten hat.

Auch die Luftfeuchtigkeit variiert in Südafrika erheblich. Im Weſten niederſchlagsarme Steppen mit einer jährlichen Regenmenge geringer als 125 mm; im inneren Hochlande auch ſehr trockene Luft, im Oſten dagegen eine Niederſchlagsmenge von 1000—2000 mm pro Jahr. Reagiert nun der Granatfink auf Feuchtigkeitsunterſchiede, wären gleich wie inbetreff der Höhenunterſchiede geographiſche Variationen zu erwarten. Vögel vom mehr feuchtem Klima ſind nämlich meiſtens dunkler gefärbt als Verwandte von Steppen und Wüſtengebieten*). Ein uns wohlbekanntes Beiſpiel hierfür gerade aus Südafrika finden wir im Blauaſtrild: Im Weſten verblaßter faſt graubrauner Ton der Oberſeite (Damarensis-Form), im Oſten mehr geſättigtes Braun (Angolensis-Form). Außerdem ſpricht Fehlen (ſoweit mir bisher bekannt) von verbleichten oder weißfleckigen Granatformen aus dem weſtlichen Verbreitungsgebiete gegen Einwirkung allzu trockener Luft in meinem ſpeziellen Fall der Umſtand, daß der Granatfink täglich, im Sommer wie im Winter, Badewaſſer in der Voliere hatte, welches er auch fleißig benutzte. Gleichwie die andern Vögel hat er ſich mehrmals des Tages gründlich durchnäßt.

Die Bewegungsmöglichkeiten des Vogels im Vergleich zu denen im Freien ſind natürlich außerordentlich ſtark beſchränkt geweſen. Wenn ich deſſenungeachtet den Beweglichkeitsunterſchieden keine urſächliche Bedeutung in vorliegendem Fall zuzuſchreiben geneigt bin, geſchieht dies aus dem Grunde, daß teils eine größere oder geringere Abnutzung von, gelinde geſagt, ſehr fraglicher Bedeutung für die Entſtehung melaniner Pigmente ſein dürfte, teils auch die Verbleichungen ſich nicht im Zuſammenhang mit der ſchroff veränderten Umweltkonſtellation (Freileben-Käfigleben) einſtellten, ſondern erſt mehr als ein halbes Dutzend Jahre ſpäter. Die Art gehört übrigens nicht zu den träge Daſitzenden, ſondern hat die Bewegungsmöglichkeiten (geringſter Sitzſtangenabſtand 0,75 m) überaus fleißig ausgenützt.

Irgendein Fall, in welchem die Variation der atmoſphäriſchen Elektrizität und mit welcher Wahrſcheinlichkeit auf die Pigmentierung eingewirkt hat, dürfte nicht bekannt ſein. Dieſer Umweltfaktor kann alſo außer Betracht gelaſſen werden. Anders verhält es ſich mit der Temperatur. Tropiſche Vögel ſind ja oft weit intenſiver gefärbt als Arten aus temperiertem Klima und polare Vögel ſogar periodiſch oft weiß. Sicher haben, wie es im Leben meiſtens der Fall iſt, hierbei eine ganze Reihe Faktoren außer der Temperatur mitgewirkt. Daß aber die letztere an und für ſich eine ſpezifiſche Wirkung in angedeuteter Richtung haben kann, dürfte unzweifelhaft ſein. Elie Metchnikoff, der Nobelpreisgewinner, vermutete beim Weißwerden die Tätigkeit ſeiner Freßzellen (Chromophagen), welche von der Kälte aktiviert in die Federn einwanderten, Pigmentpartikelchen aufnahmen, vernichteten oder wegtransportierten. In die Hohlräume dringt dann Luft ein, was, nach den Darlegungen anderer, die Federn min-

*) Von bekannteren Orten des Binnenlandes liegen beiſpielsweiſe Pretoria auf rund 1350, Johannesburg auf rund 1750 m ü. d. M.

**) „Die Stärke der violetten Farbe am Kopf und die Ausdehnung des ſchwarzen Gefieders am Bauch variiert erheblich, wenn man eine Reihe männlicher Vögel vor ſich hat.“

***) Vor allem wäre man wohl geneigt, die ſchon im Typkleid „weißlichen“ (Reichenow: Die Vögel Afrikas) Säume der Schwingen als Verbleichungsherde anzuſehen.

*) Herr Schreitmüller gibt an, daß Vögel auch dunkeln könnten, wenn ſie in zu trockener Wärme gehalten werden (S. 221). Formen, die in trockenem Klima ihre dunklen Farben beibehalten, kennt man ja. Meines Erachtens dürften aber in ſolchen Fällen andere Faktoren dominiert haben. Die verbleichende Wirkung der Trockenheit läßt ſich, ſcheint mir, ziemlich leicht erklären. Schwerverſtändlicher iſt ein Dunkelungsprozeß. Es wäre wertvoll geweſen, wenn der geehrte Verfaſſer hätte angeben wollen, wie er ſich den Gang eines ſolchen Prozeſſes gedacht.

der wärmeleitend und für ein kaltes Klima zweckmäßiger macht. Zum Verblassen dürfte meines Erachtens wohl auch der automatische Wärmeregulierungsprozeß der Warmblüter — reflektorische Erweiterung der Hautgefäße usw. bei Wärme (gesteigerte Durchblutung und Nahrungszufuhr zur Federpapille), Verengung der Hautgefäße bei Kälte (verschlechteteren Ernährung der Papillen) — wirksam haben beitragen können.

Auch primäre Temperaturangaben stehen mir nicht zur Verfügung. Da indessen die mittleren Jahresmaxima (Jan.) und Jahresminima (Juli) auf den Meeresspiegel berechnet angeblich im Schatten resp. + 38° und + 5° sind, können wir, da für unseren Zweck absolut präzise Ziffern durchaus nicht nötig sind, — eine geringe Temperaturvariation spielt keine praktische Rolle — getrost approximieren und mit Rücksicht auf die Höhe (zirka 1300 m) im Sommer annähernd 10, im Winter etwas weniger von vorstehenden Temperaturen subtrahieren. Mit den so erhaltenen Zahlen (zirka + 30° und — 2°) stimmt recht gut die Angabe, daß die Gewässer im Hochlande im Winter ab und zu eisbelegt sind. Nun sind die mittleren Jahresmaxima bei mir (+ 26° C Schatten, Max. des verfl. Juli sogar + 29°) den oben angeführten so nahe kommend, daß der Unterschied bei erwachsenen Warmblütern sicher bedeutungslos ist. Die mittleren Jahresminima (+ 16° C) sind dagegen bedeutend höher als die in der Heimat des Vogels. Irgendeine verblassende Einwirkung der Temperatur scheint deshalb nicht annehmbar, eher könnte man wohl eine Kräftigung erwarten.

(Fortsetzung folgt.)

Die Eingewöhnung des großen Raubwürgers (Lanius excubitor).

Beitragsstudie zur Charakteristik des großen Raubwürgers.

Von Arthur Dresler.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Mit diesem Resultat noch nicht zufrieden, setzte ich ihm einige Tage später einen kranken Fink, der sicher eingehen mußte, in den Käfig. Was anders war eine lebende gefiederte Beute! . . Der kranke Fink würde unter dem starken Schnabel des großen Raubwürgers sehr schnell seine Erlösung finden. . . Nur mit innerstem Widerspruche verstand ich mich dazu. Unter Vogelliebhabern hatte man mir geraten, die tägliche natürliche Nahrung für den Raubwürger durch Fangen von Sperlingen mittels ausgelegten Leimruten zu beschaffen. . .

Mitleidigen Herzens erwartete ich eine schnelle Katastrophe. . . Ich sehe noch, wie der kranke Fink, ohne eine Spur von Angst, zu dem großen Feind über sich auf der Stange fast wie prüfend neugierig — oder war es Todesschwäche — hinaufblinzelt, während der Würger nicht die geringste Bewegung macht, sich auf seine Beute zu stürzen — ja wiederum beachtet er sie kaum! . . Da, mit einem schnellen Griff entschließe ich mich, das kleine Todesopfer herauszunehmen, um es friedlich sterben zu lassen. . .

Diese Tatsachen erbrachten für mich den Beweis, daß der große Raubwürger in der Freiheit nur dann auf kleinere Vögel jagt, wenn ihn Mangel an Nahrung, also der äußerste Hunger, dazu treibt, anders ist er ein eifriger Mäusevertilger, der in dieser Nützlichkeit den übrigen genannten kleineren Raubvögeln, unter welchen sich ja auch Vogelmörder befinden, in keiner Weise nachsteht. Die unterrichteten Landwirte folgen denn auch bestimmten Grundsätzen, diese Vögel, wie Turmfalk, Mäusebussard, Käuze, Ohreule, Schleiereule, nicht unbedingt zu den schädlichen zu rechnen; auch der Forstmann läßt sich von gleichen Erwägungen leiten, und reguliert nur die zu starke Vermehrung derselben.

Unsere Würger sind nicht minder eifrige Vertilger von Forst- und Landwirtschaft schädlichen Käfern und Kerbtieren, und so sollten vernünftige

Rotkehlchen, 10 Tage alt (s. S. 504).

Maßnahmen auch sie vor der radikalen Vernichtung schützen, die eine übertriebene Antipathie befürwortet. Zudem sind sie Sänger und hübsche Vögel, welche den Vogelfreunden viel Freude machen, so daß wir die Würger zur Belebung der Landschaft nicht vermissen wollen. Ihrer zu starken Vermehrung kann man durch Fang und Ausnehmen der Nester begegnen.

Bereits Dr. Karl Ruß redete dieser Einsicht mit Entschiedenheit das Wort.

Wird dem großen Raubwürger noch nachgesagt, daß er, gekäfigt, in der Vogelstube durch seine wilden Schreie den andern gefiederten Insassen ein Schrecken sei, so habe ich zu dieser Beanstandung bei dem von mir gehaltenen Exemplar keine Veranlassung gehabt. Mir mußte es sogar interessant sein, die kleinen gekäfigten Vögel dem Raubwürger etwas näher zu bringen, um die beiderseitige „Notiznahme" zu beobachten: ich tat das offen und versteckt. Aber weder, daß der Raubwürger sich irgendwie auffällig um die nahen kleinen Vögel kümmerte, noch sie um ihn. Ja wird man lächelnd einwerfen —, weil sie wußten, — daß er ihnen nichts tun kann, und ihr schlimmer Feind wußte dasselbe! . . .

Die eigentliche Eingewöhnung des Raubwürgers an ein mit Fleisch durchsetztes Insektenpulver machte einige Geduld nötig, da er eine geraume Zeit lang die geringste Beimischung zu seinem rohen Fleisch mit Widerwillen konsequent ablehnte. Erwähnenswert ist noch, daß er Fleisch- bzw. Körperteile von

einer frisch geschossenen Krähe mit sichtlichem Ekel betrachtete, ja er schüttelte sich förmlich davor. Das war doch auch Fleisch — Vogelfleisch! Nun wohl, ich wollte es ihm listig, tüchtig gemischt, durch sein bereits gewöhntes Insektenfutter beibringen. Zu meinem Erstaunen erkannte der Raubwürger das ihm widerwärtige Krähenfleisch auch in dieser Form; er weigerte sich entschieden, das Futter anzunehmen. . . Kam ihm bei dieser Feststellung sein Geruch zu Hilfe?

Danach war für ihn Fleisch nicht einfach „Fleisch": er machte darin einen Unterschied. Wieso aber nahm er neben seinen Mäusen anstandslos Rind- und Pferdefleisch? Stand diese Fleischnahrung ihm etwa in der Freiheit näher, denn das Fleisch eines Vogels, wie der Krähe? Also mochte es die besondere Beschaffenheit eines Fleisches sein, die ihn bestimmte, dieses oder jenes mehr oder minder zu goutieren, d. h. es appetitlicher, schmackhafter und nahrhafter zu finden, was ja bei allen Lebewesen den Ausschlag gibt. So verschmähte er in der Krähe vielleicht den Aasvogel — oder einen bitter gehaßten Feind? . . .

Endlich war der Raubwürger in zirka drei Monaten fest eingewöhnt, in dem Sinne, daß seine Ernährung in der Vogelstube ihn billiger und angenehmer machte. Dazu erhielt er täglich 40 Mehlwürmer in zwei Rationen, die immer in einem Augenblick vertilgt waren. Es sollte eine Leckerei, ein Anregungsmittel sein — eigentlich braucht er sie bei seiner Fleischnahrung nicht durchaus.

Der prächtige Vogel machte mir — im Anblick — viel Freude. Aber er ließ keinen Ansatz von Gesang hören. Das war der Grund, aus welchem ich ihn dem Vogelhändler nach sechs Monaten wieder zurückgab. Der hatte ihn etwa noch zwei Monate zu sitzen, fütterte ihn fast ausschließlich mit dem Restefutter von seinen Insektenfressern, das er glattweg nahm, und verkaufte ihn dann weiter. Auch bei dem Vogelhändler hat der Raubwürger nichts von Gesang merken lassen.

Jedenfalls bestätigte dieser Raubwürger, daß nicht alle Vögel dieser Art singen bzw. daß man sie nicht ohne weiteres als Sänger ansprechen kann, bevor sie nicht selbst die Proben davon abgeben.

Es liegt im Interesse der ornithologischen Wissenschaft, durch gleiche und weitere Experimente das eigentliche Wesen des großen Raubwürgers näher zu bestimmen, in dem Sinne, welcher auch für meine Experimente mit ihm leitend war. Ich bin der Meinung, daß man ihm Unrecht tut, wenn man ihn leichtfertig oder grundsätzlich zum Paria unter den Gefiederten stempelt.

Ornithologische Plauderei.

Von Franz Fuchs, Düsseldorf.

(Nachdruck verboten.)

Am ersten September brachten mir Kinder einen munteren, aus dem Nest gepurzelten Grünfink, welcher etwa 6—8 Tage vor dem Ausfliegen stand. Das erinnert mich an einen Fall vor ungefähr 18 Jahren, wo ich im Oktober noch ein Nest mit flüggen Grünfinken fand. Solch verspätete Bruten scheinen bei diesen Vögeln also häufiger vorzukommen. Es wundert mich nur, daß die Mauser Brut- und Futtertrieb nicht beeinträchtigt.

Zu meinem kleinen Vogelbestand kamen in diesem Jahr zwei prächtige weiße Bachstelzen (Geschwisterpärchen), welche ich von 5 Köpfen einer durch Ratten gefährdeten Brut großzog. In meinen Knabenjahren besaß ich schon einmal eine weiße Bachstelze, welche mir mit gebrochenen Beinen übergeben wurde. Der Bruch heilte schnell, und ich hatte viel Freude an dem freifliegenden zahmen Vogel. Auch heute noch interessieren mich Vögel, die keine große Gesangsgabe besitzen. Besonders Stelzen sind recht angenehme Vögel, wenn passend untergebracht, sie sind nicht weichlich und im Futter durchaus nicht wählerisch.

Nachtigallen besitze ich augenblicklich nicht, trotzdem ich mit meinem Gesangserfolge und langer Lebensdauer derselben, durchschnittlich 8 Jahre, sehr zufrieden war, und setzte zwei Nachtigallen vor drei Jahren aus; der Vogel als solcher ist mir nicht sehr interessant. Vielleicht kommt dies daher, daß ich sie

Junges Rotkehlchen sich sonnend (s. S. 504).

im Frühjahr, einige Minuten von meiner Wohnung entfernt, zur Genüge höre. Übrigens haben sich die Nachtigallen am Niederrhein, besonders in der Umgebung von Mörs, sehr vermehrt. Vielleicht wird der Tierschutzverein die Zunahme auf sein Konto buchen wollen? Ja, der fanatische Tierschutz! —

Händler und Liebhaber haben es hier in Düsseldorf nicht leicht. Dazu kommt, daß hier kein Zusammenschluß zu erreichen ist. Wir haben hier sehr tüchtige Liebhaber(innen), und zwar kleine, aber sehr reelle Händler, die nur den einen Fehler haben, daß sie kein anständiges Futter für Weichfresser führen. Der Tierschutzverein will ja die Vogelhaltung mit Stumpf und Stiel ausrotten. Auf der Münchener Tagung in diesem Sommer, wo Kassel für die Vogelhaltung sprach, waren Köln und Düsseldorf dagegen. Ich bezweifle, daß der Vorstand des Vereins solchen Beschluß fassen darf, indem er im Namen von tausenden Mitgliedern spricht, wodurch er stark ist. Er müßte doch erst seine Mitglieder fragen und abstimmen lassen, unter letzteren befinden sich manche praktischen Vogelliebhaber. Dazu kommen noch die Gleichgültigen, die überhaupt keinen Sinn für die Tiere haben. An irgendeinem Stammtisch zieht ein Werber den Block und wirbt; da der Beitrag nicht hoch ist, mögen viele dem Werber keinen Korb geben, und neue Mitglieder sind da. Das Paradoxeste ist, daß ich bei

einem Vorstandsmitglied schon Zeisig und Hänfling, bei einem anderen schon Stare, Meisen, Heidelerche, Kreuzschnabel und Zeisig fand. Ich, der Vogelliebhaber, gelte auch im Tierschutzverein als bester Vogelschützler, aber — ich bin machtlos. In der Umgebung meiner Wohnung sind unerhört viele Katzen, im Nachbarhause allein sieben Stück, die haben in den letzten Jahren die Bruten von Zaunkönig, Braunellen, Amseln u. a. m. zerstört. Nun nistete nur noch ein Hausrotschwänzchenpaar in nächster Nähe. Ein schwarzer Kater fing bestimmt zwei der flüggen Jungen, ich sah es selbst, ob die anderen durchgekommen sind, weiß ich nicht. Einen jungen Vogel fing der Kater, den ich noch eine Stunde nach dem Fang schreien hörte, weil die Katze ihn nicht tötete, sondern nur grausam quälte. Auf meine Klagen beim Verein nur ein bedauerndes Achselzucken, ein Glück, daß es noch Baldrian gibt!

Die Falknerei blüht hier und wird natürlich auch scheel angesehen. Kunstmaler R. Waller, der beste Falkner am Niederrhein, hielt seine diesjährigen Falken völlig frei, d. h. in dem Jagdgelände bei Lohausen ließ er die flüggen Falken nachts in den Bäumen sitzen, bis sie selbständig jagen konnten. Diese Vögel wurden besonders stark und fluggewandt, so daß Herr W. bald gute Resultate bei der Beize mit letzteren auf Elstern hatte. Jetzt natürlich kommen die Vögel nach der Jagd in den „Falkenhof". Ein Falke, der sich verstieß, kam nach acht Tagen wieder auf die Faust, als sein Herr ihn im Gelände antraf, trotzdem er vollgekröpft war. Er hatte sich also während dieser Zeit selbständig ernährt. Der Vogel muß schon anhänglich sein, es lag doch sonst keine Veranlassung vor, zu seinem Herrn zurückzukehren, da ihn nicht der Hunger trieb. Auch ist der Vogel sehr persönlich, er wäre ja sonst zu irgendeinem Fremden geflogen. Die Falken des Herrn W. sind Wanderfalken. Auch werden hier von Liebhabern, allerdings nicht als Beizvögel, vielfach Turmfalken gehalten. Im vorigen Jahre hatte Herr W. einen Turmfalken, der sich einer zahmen drolligen Rabenkrähe angeschlossen hatte. Tagsüber trieben sich die beiden Freunde immer zusammen auf den Dächern der Nachbarschaft umher. Ein zahmer Wanderfalke hat eine derartige Freundschaft mit dem Jagdhund (Heidewachtel), daß sein Herr den Vogel abschaffen will, er will nur immer zu dem Hunde, der die Anhänglichkeit des Vogels trotz dessen scharfen Krallen erträgt. Wird der Falke geworfen und erblickt er den Hund, so sind ihm Herr und Wild Nebensache, er muß zu dem Hunde, auf dessen Rücken er sich dann behaglich niederläßt. Schon als Nestling bettelte er den Hund immer an, vielleicht hielt er die rote Zunge für Atzung. Bei Kämpfen zwischen Krähen und Sperber, die ich beobachtete, gab es weder Sieger noch Besiegte, die Raufereien blieben meist unentschieden, um so mehr interessierte mich folgendes Ereignis: Der Sohn eines Freundes bemerkte eine Krähe mit einem größeren Vogel auf einem Baumaste, auf welchen er drauflosHackte. Der Junge schoß mit dem Flobert, traf jedoch nicht, oder die Krähe bekam nicht genug, kurz und gut, sie strich ab, und herunter fiel ein noch schwach lebender Sperber, dem die Krähe die Brust angeschnitten hatte? — Der Sperber war also kein Luder, ebenso waren andere Krähen nicht wahrzunehmen. Hatte nun die Krähe den Sperber allein besiegt? —

Sehr haben mich die Arbeiten über die Ernährung der Weichfresser interessiert, denn die Ernährungs- und Käfigfrage sind doch das Ja und Amen der Vogelhaltung. In den letzten Jahren bekämpft man den Mehlwurm nicht mehr so sehr. Trieben Bechstein, Brehm u. a. die Mehlwurmfütterung zu arg, sollte dieselbe plötzlich nach der Ansicht vieler Liebhaber fast verschwinden, man sprach dem Mehlwurm jeden Nährwert ab, und sollte er nur ein gefährliches Gesangsreizmittel sein. Selbstredend ist der Mehlwurm ein Nährmittel, wovon leben sonst Frischfänge tage- und wochenlang. Überall empfiehlt man den

Altes Weibchen Rotkehlchen außerhalb der Voliere sich sonnend (s. S. 504).

Mehlwurm in Mengen bei den mausernden Spöttern und Sumpfsängern, man will dann doch nicht zum Gesang treiben. Nie habe ich mit mäßiger Mehlwurmfütterung üble Erfahrungen gemacht. Für den Menschen halte ich ein Beefsteak auch für ein gutes Nährmittel, aber solches täglich morgens, mittags und abends genossen, würde dasselbe auch zu Erkrankungen führen. Die meisten Pflanzen müssen nach dem sommerlichen Blühen Ruhe haben und vertragen dann keine starken Düngemittel. Ich kenne die Abstammung des Mehlwurms nicht, aber so ganz unzugänglich ist er für manche freilebenden Vögel nicht. Ich verbrachte meine Schulferien (ach, wie lange ist's her!) viel in einer Mühle. Dort standen auf dem Speicher Säcke mit Mehl, oben in den Falten, wo die Säcke zugebunden, suchte ich immer Mehlwürmer für meine Terrarientiere. Diese Fundstelle kannten auch viele Vögel, Feldspatzen, Rotschwänzchen, Meisen und Stare, so wie mir erinnerlich auch Bachstelzen, sie kamen durch die geöffneten Fenster, um die begehrten Würmer zu suchen. Gibt es ein

Futter, das immer gut und frisch zur Hand ist, wie den Mehlwurm? Er ist ein Futter, analog dem Hanf für Körnerfesser, es darf kein Mißbrauch damit getrieben werden.

Wie wichtig Pünktlichkeit in der Vogelhaltung ist, sehe ich bei einem hiesigen Uhrmacher, welcher kein gutes Futter verwendet, jedoch seine Tiere gewissenhaft und pünktlich wie seine Uhren pflegt. Er hielt immer zwei bis drei Vögel, aber sie lebten lange, Amsel und Buchfink 14 Jahre, Heidelerche und Nachtigall 8 und Hänfling 9 Jahre. Ich bemerke noch, daß dies nicht Ausnahmen sind, er hatte nur diese Tiere.

Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten.

Von J. Kuntzendorff, Berlin.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Sechs Exemplare dieser Art habe ich im Laufe der Zeit besessen, zeitweise auch zwei zugleich, und stets habe ich diese prächtigen, in verschiedensten Farben schillernden Vögel mit Bewunderung und größtem Interesse beobachtet. Auch die Dreifarbentangare ist im Käfig recht lebhaft, meist ist sie, außer zur Mittagszeit, in steter Bewegung, wobei sie ihren eigenartigen, man möchte sagen, an bauchrednerische Künste erinnernden, dann wieder zirpenden Gesang hören läßt. Sie wird dem Pfleger gegenüber verhältnismäßig leicht zutraulich, jedoch nicht richtig zahm, da sie ein mißtrauischer Vogel ist. Das etwa vorhandene stürmische Wesen wird bei richtiger Behandlung schnell abgelegt. Im Flugraum entwickelt sie gleich der vorerwähnten Tanagrella eine für die etwas plumpe Gestalt erstaunliche Beweglichkeit und Gewandtheit; besonders des Morgens und des Abends ist sie in stetem hin und her. Dichteres Gezweige bevorzugt sie freistehenden Ästen, im allgemeinen sucht sie die höchsten Sitzgelegenheiten auf. Fels- und Gesteinsmassen meidet sie, es sei denn, sie kommt zum Baden auf dieselben. Ihre Verträglichkeit mit den übrigen Vögeln, wie auch mit ihren Verwandten ist groß, sogar mit ihresgleichen hält sie Frieden. Streitigkeiten, abgesehen von harmlosen Neckereien, habe ich nie feststellen können. Die Fütterungsart ist die gleiche wie die der vorigen Tangare. Die Eingewöhnung geschieht in derselben Weise wie sie bei jener angegeben ist, falls überhaupt eine solche notwendig ist, denn es gingen Stücke gleich an das richtige Universalfutter. Ein großer Leckerbissen und für die Dreifarbentangare, wie für alle anderen dieser Sippe, unbedingt erforderlich sind süße, reife Früchte und Beeren. Gut eingewöhnt, ist sie ein recht harter Vogel, der seinem Pfleger viel Freude, speziell im Flugraum, bereitet. Zu einem Zuchterfolg ist es bei mir nicht gekommen, da ich den weiblichen Vogel als solchen erst nach seinem Eingehen erkannte. Dagegen berichtet Parejo in der Wochenschrift 1925 S. 103 von gelungenen Züchtungen, deren erste 1888 stattgefunden haben soll. Ausführlich behandelt er eine solche, die Herrn Olivry in Frankreich geglückt ist. Das Nest wurde aus Gräsern, Wurzelfasern und Heu gebaut, drei grünlichweiße, rotbraune gefleckte Eier ergaben das Gelege; nach 22 Tagen befanden sich zwei Junge im Nest, die dieses erst nach etwa 30 Tagen verließen und sich noch im Alter von $2^1/_2$ Monaten von den Eltern füttern ließen. Bedauerlicherweise ist eine Beschreibung des Jugendgefieders nicht beigefügt. Als Aufzuchtfutter wurden Köder-Fleischwürmer (?) und deren Puppen, ein Universalfutter und hauptsächlich frische Ameiseneier verwandt.

Orangebrusttangare.

Die Vielfarbentangare — Calospiza fastuosa *(Less.)*.

Dieser schöne Vogel besitzt viel Ähnlichkeit mit der Dreifarbentangare, wirkt aber trotz seiner leuchtenden Farben wegen der Verteilung derselben bei weitem nicht so grellbunt wie jene. Das Männchen ist an Stirn, Oberrücken schwarz; Kopf, Hinterhals bläulichgrünspangrün, zum Rücken hin geschuppt erscheinend, da die breiten grünen Federränder die schwarzen Federteile nicht ganz bedecken; Unterrücken, Bürzel, Oberschwanzdecken leuchtend orangerot; Kinn, Gegend am Schnabelwinkel schwarz, dahinter ein mit

der Kopffärbung in Verbindung stehendes bläulichgrünspangrünes Band; Kehle schwarz; diese Färbung steht mit der des Rückens durch ein schmales, ungleichförmiges Band in Verbindung; Kropf und Vorderbrust hellsilbrigblau, Bauch und Unterleib nach hinten zu satter werdend; tief purpurblau; kleine und mittlere Flügeldecken glänzend bläulichgrünspangrün, Schulterfedern schwarz, Schwingen schwarz, Handschwingen mit schmalen, Armschwingen außer den drei letzten, die breite, leuchtend orangefarbene, nach der Spitze zu ins Bläulichgrünspangrüne übergehende Außensäume haben, mit breiten, purpurblauen Säumen an der Außenfahne; Schwanzfedern schwarz, außen glänzend blau gesäumt; Auge braun; Schnabel schwarz, Füße schwärzlichbraun. Das Weibchen soll in den Farben matter, am Kopf bläulicher gefärbt sein. Ruß mutmaßt bei diesem fahlbräunlichschwarzen, also nicht orangeroten Unterrücken, da er einen derart gefärbten Vogel besaß, ohne jedoch anzugeben, ob es wirklich ein Weibchen war. Die Länge wird mit 137—139, Fl. 70—78, Schw. 50 mm angegeben. Bei meinem Balg maß ich Männchen Fl. 74, Schw. 55 mm. Die Heimat dieses ausnehmend schönen und vornehm gefärbten Vogels ist Ostbrasilien. In ihrem Benehmen und Wesen soll sie der Dreifarbtangare gleichen, wie diese sich in den Wipfeln hoher Baume aufhalten und nur zum Fressen oder zum Nisten die hohen Lagen derselben verlassen. In der mir zur Verfügung stehenden Literatur habe ich weitere Angaben nicht gefunden.

In ihrem prächtigen Gefieder bildet diese Tangare eine wertvolle Zierde einer jeden Vogelstube, besonders im Sonnenschein leuchten ihre glänzenden Farben, daß man ob dieses Naturwunders nicht genug staunen kann. Sie ist ein munteres und ständig in Bewegung befindliches Vögelchen, lebhaft und schnell in ihren Bewegungen. Wenn Ruß von der Vielfarbtangare schreibt, sie wäre „still und ruhig, ja fast stumpfsinnig", so muß ich dem entschieden widersprechen. Dieses mein Urteil wird von der englischen Liebhaberin Karoline A. Hodgson bestätigt („Ges. Welt" 1897. S. 381), die den Vogel „beständig munter . . . . . ., eine schöne Zierde meines Flugkäfigs" nennt. Wenn auch der Unterschied zwischen dem Dr. Ruß' und meinen Beobachtungen ein gar gewaltiger, bei meiner Art beinahe nicht zu vereinender ist, so zeigt doch gerade dieser Fall, daß ich mit meinem Hinweis auf den Individualismus bei den Tangaren völlig recht habe, und daß gerade bei dieser Art das Temperament der einzelnen Individuen äußerst verschieden, ja, wie der Fall zeigt, direkt konträr sein kann. Im Käfig zeigte die Tangare, wie gesagt, eine ziemlich große Beweglichkeit, hin und her ging es, von einem Springholz zum andern. Scheu und ängstlich war sie von Anfang an nicht, sie lernte ihren Pfleger schnell kennen und nahm schließlich mit raschem Sprunge den mit der Hand gereichten Mehlwurm in Empfang. Also zutraulich wurde sie in gewisser Beziehung, aber zahm sein, war doch etwas anderes, und dieses ließ sich bei ihr trotz großer Geduld nicht erreichen. Gesanglich ist von ihr Nennenswertes nicht zu berichten, denn das, was sie produzierte, war kaum mit Gesang zu bezeichnen und bedeutungslos. Dagegen war ihr Wesen und Benehmen im Flugraum sehr interessant und beobachtungswert. Außer während der warmen Tageszeit war sie in ständiger Bewegung, schlüpfte mit großer Gewandtheit durch die Gebüsche des Außenfluges, flog meist pfeilgeschwind, zeitweise aber auch langsam, von diesen zu den Zweigen des Innenflugraumes, kam nur zur Nahrungsaufnahme auf den Boden und mied das Gestein gänzlich. Mit den anderen Insassen des Vogelhauses lebte sie im tiefsten Frieden und vertrug sich auch mit den übrigen Tangaren gut. Ernsthafte Zänkereien kamen nie vor. Auch bei der genannten englischen Liebhaberin benahm sich die Vielfarbtangare der großen Anzahl Prachtfinken gegenüber friedlich, so daß man diese Art als durchaus verträglich mit anderen Vögeln hinstellen kann. Die Eingewöhnung gestaltete sich mittels des angeführten Eingewöhnungsfutters nicht schwierig, und sie nahm das Universalfutter bald an. Die getrennt gereichte Hauptnahrung bildete aber selbstverständlich die in wechselnder Weise gereichten Früchte. Mehlwürmer galten bei ihr und den vorerwähnten Arten als Delikatesse und wurden gern angenommen. Alles in allem war es ein Vogel, der sich als ein angenehmer Käfig- wie auch Volierenvogel entpuppte und durch seine Farbenpracht zu den schönsten und wertvollsten Vögeln eines Flugraums zu zählen ist.

(Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Anläßlich eines Besuches eines mir befreundeten Tierarztes bei meinen Hunden, besichtigte der Herr auch meine **Jakos**, und teilte mir über seine Erfahrungen in seiner Praxis über diese Vögel kurz folgendes mit: Er hat häufig Jakos ärztlich behandelt. Bei 80% der Vögel lagen Verdauungsstörungen vor. Alle jungen Vögel haben äußerst empfindliche Magen- und Darmhäute. Auch bei richtiger Pflege können sie erkranken, wenn das Futter nicht völlig einwandfrei ist. Selbst bei größter Aufmerksamkeit können schlechte Kerne verfüttert werden. Ein solcher, welcher einer robusten Amazone kaum etwas Bauchgrimmen verursacht, kann beim Jako eine schwere Entzündung hervorrufen. Geweichter Mais ist nur trocken gerieben zu reichen. Herabgefallene Obstreste sorgsam vom Boden entfernen. Täglich zweimal den Käfigboden reinigen. Nie Leitungswasser reichen. Das beste Getränk ist dünner Tee, aus einer Mischung von Kamille und Pfefferminz. Derselbe wird dick aufgekocht, und vor dem Füttern mit abgekochtem Wasser verdünnt, so daß die Mischung schwach gefärbt ist. Der Tee reinigt und desinfiziert. Obst sparsam füttern. Apfel und Banane sehr zuträglich. Letztere wirkt beim Papagei etwas stopfend. Weintrauben führen ab. Vögel, welche leicht zu Durchfall neigen, letztere nicht füttern. Bei gutartigen Magen- und Darmkatarrhen wirkt verblüffend Wismut. (Bei mir genas ein an Durchfall erkrankter Jako in drei Tagen nach dem mir vom Arzte verschriebenen Wismutpulver, vier- bis fünfmal täglich je eine Messerspitze in einem Teelöffel Haferschleim, allerdings gewaltsam eingegeben.) Bei bösartigen Katarrhen (Bakterien, Sepsis usw.) ist Rettung so gut als ausgeschlossen.

Anfrage an mich; Herr Rechtsanwalt Herrmann, Leipzig, teilt mir mit, daß sein Jako die Füße schont. „Der Vogel ist nicht imstande, sich ständig auf den Beinen zu halten, und legt sich zeitweise." — Der Vogel leidet an Gicht. Bei Untersuchung wird festgestellt werden, daß die Füße geschwollen sind. Ich selbst besaß schon zweimal gichtkranke Vögel. Entstehungsursache mir unbekannt, denn meine Vögel werden richtig gefüttert. Auch bei jungen Jakos ist die Krankheit nicht selten. Heilung langwierig, doch nicht ausgeschlossen. Viel Obst, Vogel in kleinem Käfig halten. Getränk Lauchstädter Brunnen. Manchmal

tritt starke Abmagerung des Vogels ein, so daß der Vogel an allgemeiner Schwäche eingeht. — Ich möchte hiermit alle Liebhaber dringend bitten, in unserer „Gef. Welt" kurz über Krankheiten und Heilungen ihrer Lieblinge zu berichten. Vielleicht ist unser verehrter Schriftleiter so liebenswürdig, unter „Kleine Mitteilungen" eine eigene Rubrik: Krankenberichte, einzurichten, in welcher jeder Liebhaber kurz seine Erfahrungen niederlegt. S. Lichtenstaedt.

Beobachtungen. Daß Meisen während der Brutzeit sogar einen vorjährigen Winterfutterplatz am Fenster aufsuchen und dargebotenes Futter annehmen, habe ich heuer öfters beobachtet. — Seit September herrscht am Fensterbrett ein reges Leben und Treiben unter den Kohl- und Sumpfmeisen, nebst Kleibern, welche sich an den dargebotenen frischen Sonnenblumenkernen gütlich tun. Genannte Arten sind Brutvögel im Garten, und sind somit Sommer wie Winter an diesen gefesselt, und halten ihn von schädlichen Insekten frei. Kürzlich beobachtete ich einen Kleiber, ebenso eine Sumpfmeise, welche Sonnenblumenkerne in verschiedene Nistkästen trugen. Wahrscheinlich wollen sich diese Vögel einen kleinen Vorrat schaffen, wenn nicht für einige Tage, so etwa gar für die Zeit der größten Nahrungsnot im Winter. — Die letzte Gartengrasmücke beobachtete ich am 25. September, die letzten Rauchschwalben am 1. Oktober, etwa 20 Stück, und die letzte Schwarzplatte am 2. Oktober. Anton Luginger, Pfarrkirchen.

Bücher- und Schriftenschau.

Tiere im Zoo. Beobachtungen eines Tierfreundes. Von Dr. Th. Knottnerus-Meyer, Direktor des Zoologischen Gartens in Rom. VIII, 262 S. 42 Abbildungen auf 32 Tafeln. Gr. 8°. Preis in Halbleinen M. 12.—. Verlag von Dr. Werner Klinkhardt, Leipzig.

Verfasser hat in dem schön ausgestatteten Buch seine reichen Erfahrungen und eingehenden Beobachtungen niedergelegt, die er als Tiergärtner in jahrelangem Umgang mit Tieren sammeln konnte. Frei von langatmigen naturwissenschaftlichen Beschreibungen und unbeeinflußt von der modernen tierpsychologischen Forschung, die nur angeborene Triebe im Tier kennt, sind die Schilderungen der Tiere, die uns der Verfasser gibt, der bemüht ist, die Seele des Tieres zu ergründen und zu erkennen, soweit es „mit den ach so schwachen menschlichen Kräften möglich ist". Knottnerus spricht dem höherstehenden Tiere abstraktes Denken nicht ab. Er weist darauf hin, ein wie hoher Reiz im Leben mit Tieren liegt. Liebe und Anteilnahme für das Tier will er durch seine zwanglos niedergeschriebenen Beobachtungen und Betrachtungen wecken, die mit warmer und herzlicher Liebe fur die Tierwelt geschrieben sind. Eingehend werden im ersten Abschnitt des Buches die Affen und im besonderen die Menschenaffen in ihrem Verhältnis zu den Menschen und zu den Artgenossen geschildert. Der zweite Teil ist den großen Raubtieren gewidmet, der dritte den Heufressern und den kleinen Säugern. Die beiden folgenden Abschnitte behandeln die Vögel, unter denen neben anderen die ihr Badewasser rot färbenden Turakos, die Tukane, „nette Gesellschafter" ihres Pflegers, und die Papageien eingehender behandelt werden. Papageien werden im Zoologischen Garten in Rom nur in großen Flugkäfigen gehalten. Wir erfahren Näheres über die Züchtung von Nacktaugenkakadus, die im Jahre 1923 gelang. Eingehend wird Wesen und Gebaren anderer Kakadus, der Jakos, der Aras und anderer Sittiche geschildert. Die beigegebenen Bilder, die Wiedergabe photographischer Aufnahmen, gehören zu den besten Ergebnissen der Tierphotographie.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Max Dähnick in Berlin NO 18, Gr. Frankfurter Str. 90, Ecke Markusstr. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Bauer, München, Westendstraße 139/0: Alpen-Ringdrossel (Turdus torquatus alpestris).
Beck, Tierimport, Stuttgart: Kalanderlerchen.
Gotthold Gröbe, Berggießhübel in Sachsen: Sprosser.
Richard Heydenreich, Bad Suderode (Harz): Blaudrosseln, himmelblaue Wellensittiche.
Kracht, Freiburg i. Br., Kaiserstr. 154: 1,0 Kaprötel.
Fr. Loose, Hamburg, Neumünsterstraße 40: Guatemalasittich.
Erich Richter, Bernstadt i. Sa.: 1,1 zuchterpr. kl. Schopfwachteln.
Saller, Planegg, Hofmarkstraße 8: 1,0 Hahnschweifwida.
Richard Schwarzkopf, Ingelfingen (Württbg.), A. Z.-Mtgl. 216: Farbenwellensittichzucht, orangegelbe, jade.
Strauß, Breslau 3, Bergstr. 31: Steinrötel, Sprosser, Sperbergrasmücke.
Rob. Thiele, Altona (Elbe), Lohmühlenstr. 6II: 1 Rotkopfwürger, 1 Schwarzstirnwürger, 1 Rotrückenwürger, 1 Blaukehlchen.
Walter Voigt, Jena, Feodorastraße 13: 1,1 Spitzschwanzamadine, 1,1 Weißkehlpfäffchen.

Herrn H., Berlin. Es handelt sich um Rüppels Girlitz — Poliospiza tristriata *(Rüpp.)*, der mit einem der abessinischen Importe des Berliner Zoologischen Gartens eingeführt wurde. Die Art ist in Heft 23 des Jahrgangs 1924 der „Gef. Welt" beschrieben und abgebildet.

Frl. J. H., Lodz. Die große Zahl der gezüchteten Wellensittiche beweist doch wohl, daß es nicht gerade ein besonderer Glücksumstand ist, wenn Wellensittiche zur Brut schreiten. Besser ist es jedenfalls für den Anfänger 2 Paare in einem recht geräumigen Käfig zu halten. Auch in der Freiheit nisten Wellensittiche gesellig. Es kann auch kein Verkäufer eines Paares dieser Vögel sagen, „daß sie sehr fruchtbar" seien, wenn er nicht selbst mit diesem Paar schon gezüchtet hat. Aber wie bei der Vogelzüchtung überhaupt, muß man auch bei der Züchtung von Wellensittichen Geduld haben. Es läßt sich nichts tun, um sie zum Legen und Brüten zu veranlassen, außer sie richtig zu pflegen. Da das anscheinend geschieht, bedarf es nur noch einiger Geduld und der Geneigtheit der Wellensittiche, um den gewünschten Erfolg zu erzielen.

Herrn H., Leipzig; Herrn E. M., Küllstedt; Frau E. S., Schweidnitz; Herrn A. T., Wittenberg; Herrn L. K., Vegesack; ist brieflich Auskunft gegeben.

Herrn P. F., Werder. Die Gartengrasmücke war ein Männchen. Nahrung konnte sie nicht mehr aufnehmen, da der Oberschnabel an der Wurzel und der linke Arm des Unterschnabels gebrochen war. Die Schwellung wurde durch den Bruch verursacht.

Herrn A. K., Berlin; Herrn S. L., Berlin-Wilmersdorf; Herrn A. L., Pfarrkirchen; Herrn A. D., Berlin; Betrag dankend erhalten.

Herrn J. R., Rochlitz. Lebertran wird mit den Samen gereicht. Auf die Samen werden einige Tropfen des Lebertrans geschüttet. Durch Herumrühren der Samen wird bewirkt, daß sie mit einem Hauch von Lebertran überzogen sind. Man kann ebenso mit dem Weichfutter verfahren. Alle drei Arten sind zur Brutzeit ziemlich angriffslustig, besonders am Nest. Wenn die Vogelstube sehr geräumig ist und reichlich und gut verteilt Nistgelegenheiten vorhanden sind, können die drei Arten in einem Raum gehalten und gezüchtet werden, eventuell muß ein besonders angriffslustiges Paar wieder entfernt werden.

Herrn E. L., Kamenz. Ohne den Charakter einer Geschwulst zu kennen, ist es nicht möglich, einen Rat zu seiner Behandlung zu erteilen.. Öffnung der Geschwulst, Entleerung und darauffolgende Wundbehandlung hätte wohl nur Erfolg, wenn der Inhalt flüssig oder breiig wäre.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

rgang 54 22. Oktober 1925 Heft 43

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Mein Haidijo. Von Karl Kepp. (Schluß.)
Biene und Lori. — Ein Papageienliebhaber. Von Emil Kaforke, Berlin.
Über eine Rotkehlchenbrut in der Gefangenschaft. Von Helmut Hampe, Braunschweig.
Versuche die Gründe des Weißwerdens bei einem gefangenen Granatastrild zu analysieren und ein paar Worte über das Gefangenleben der Art. Von A. Adlerspare. (Forts.)
Die Eingewöhnung des großen Raubwürgers (Lanius excubitor). Von Arthur Dresler. (Schluß.)
Ornithologische Plauderei. Von Franz Fuchs, Düsseldorf.
Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten. Von J. Kuntzendorff, Berlin. (Forts.)
Kleine Mitteilungen - Bücher- und Schriftenschau - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Sitz Leipzig. 1. Vors. Hermann Höhne, Leipzig-Volkmarsdorf, Eisenbahnstraße 84 IV. 1. Schriftf. Max Hunger, Leipzig-Gohlis, Polizeigebäude Zimmer 196. Kassierer Ludwig Böttcher, Leipzig, Inselstr. 17 II. Girokasse Leipzig, Nr. 6317. — Die Vereine wollen es sich angelegen sein lassen, bei Abgängen von Mitgliedern für Einbehaltung der Reichsverbands-Mitgliedskarten besorgt zu sein. Einige Fälle, in denen ausgetretene Mitglieder ihre Karte nicht zurückgegeben haben, fordern erhöhte Beachtung dieses Punktes. — Die Liebhaber-Vereinigungen zu Schneeberg, Wilkau, Oschatz, Kamenz und Aue (beide Vereine) haben ihre Mitgliederlisten für das Geschäftsjahr 1925/26 trotz mehrfacher Mahnungen noch nicht eingesandt. Sie werden hiermit aufgefordert, diesem Ersuchen nun endlich zu entsprechen. — Die nächste Vorstandssitzung findet am 28. Oktober 1925 bei Herrn Petters, L.-Probstheida, statt.

Hunger, Schriftf.

Aus den Vereinen.

Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Postscheckk. Hannover 56714; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögeln in Apterbeck. Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, in der Wirtschaft Sprave, früher Fritz Lecking, Kirchstraße. Fritz Lecking, 1. Vors.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.

J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke, Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde und Geflügelzucht Breslau. Vogelliebhaber Breslaus, wollt ihr euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei nicht endlich auch zusammenschließen, wie es in anderen Städten schon längst geschehen ist? Ein Stamm von erfahrenen Vogelpflegern ist vorhanden, jedoch können Fortschritte nur erzielt werden, wenn alle noch abseits Stehenden sich uns anschließen und unsere mit belehrenden Vorträgen verbundenen Vereinsabende besuchen. Auskunft ert. bereitwilligst P. Spitzner, 1. Schriftf., Ofener Str. 26.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Dessau und Umgegend. Gegründet März 1925. Vereinslokal „Fürst Blücher", Ecke Antoinetten-Leopoldstr. Versammlung jeden 2. Mittwoch, abends 8 Uhr. Nächste Versammlung am 28. Oktober. J. A.: Dieltzsch, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Restaurant „Zum Löwentor", Königswall 75.

J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung Freitags, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Blasewitzer Hof". Liebhaber willk. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Eliesenhof", Eliesenstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Mittelthüringens Sitz Erfurt. Sitzung jeden 2. Mittwoch und jeden letzt. Sonnabend im Monat im Vereinsl. „Stadt Chemnitz", Thomasstr. 57. Näh. Auskunft erteilt Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Vereinigung einheimischer Waldvogelliebhaber zu Görlitz und Umgegend. Zusammenkunft jeden 3. Sonnabend im Monat im Restaurant „Zum Bismarckgarten", Bismarckstraße. 1. Vors. W. Lücker in Görlitz, Konsulstr. 7. Vogelliebhaber als Gäste willk. J. A.: Erich Rothe, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 3. November. A. Weber, Vors., Hamburg 1, Rabotsen 56, Hansa 9599.

Der Hannoversche Vogelschutzverein zu Hannover, gegr. 1881, wirkt mit sichtbarem und anerkanntem Erfolge für Vermehrung und Schutz der Vogelwelt bei Hannover durch Aufhängen von jährlich einigen hundert Nistkästen aller Art, durch Erweckung von Interesse und Liebe für die Vogelwelt mit monatlich, zur Gesangszeit wöchentlich stattfindenden Belehrungsspaziergängen und durch Vorträge und Austausch der Beobachtungen in den jeden dritten Dienstag des Monats stattfindenden Vereinsversammlungen. Seine Bestrebungen dienen also lediglich gemeinnützigen Zwecken. Mitgliederzahl rund 1200, jährlicher Beitrag nur 1 M. Meldungen an den Vorsitzenden Herrn Fritz Becker, Hannover, Boedekerstr. 1 F. — Nächster Spaziergang: Sonntag, den 25. Oktober, in die Eilenriede, Treffpunkt 9½ Uhr am Kriegerdenkmal. — Becker.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste willk. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Versammlung aller 14 Tage Sonnabends. Vereinslokal: Gasthaus „Zur Krone", Jena, Grietgasse. Gäste stets willkommen. Jena besuchende Vogelliebhaber treffen jeden Sonntag vorm. den Schriftführer Adolf Voigt, Jena-Ost, Feodorastraße 13, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube freundlichst eingeladen. Adolf Voigt, Schriftf.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an!

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Kaiser-Kaffee", Kaiserstr., Ecke Schnürlingsstr. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 5. Nov. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Laßner im Volkshaus-Nord, Flogauer Str. 20. Liebhaber willk. J. A.: Friedrich.

Verein der Vogelfreunde Linden. 1. Vors. P. Winkel, Linden, Fröbelstr. 9.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße.

Ekstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wst., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Sitzung aller 14 Tage im Restaurant „Zum Neckarstrand", Messeplatz 1. Liebhaber willkommen. Joh. Daubmann, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44

Die gespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Papageien-Käfige

und dauerhaft gearbeitet.
, viereckig, 36 cm hoch, **9.50 M.**
, 75 cm hoch, mit Stock **14 M.**
, 75 cm hoch, m. Messingvase **15 M.**
, 85 cm hoch, mit Sockel u. Säulen, Messingvase **25 M.** Kleine Harzer bauer, Reihe 7 Stück, **2.10 M.**

t. Müller, Hamburg 31,
Vogelgroßhandlung. [1400

Fliegenmaden-Zuchtapparate

1 Entwicklungsraum 20 *M*
2 Entwicklungsräumen 25 *M*
3 Entwicklungsräumen 30 *M*.
lungen nehme schon jetzt entgegen.

ann Fischer, Waldsassen,
Mitterteicher Straße 54. [1401

Vogel-Mistelleim

m Fangen schädlicher Vögel, ebend bei jeder Witterung, garan- ebrauchsfähig, Dose 2.— M. fr. von **eitag Nchf., Frankenberg i. S. 6.**
rverkäufer hohen Rabatt. [1402

Mehlwürmer

insendung v. 2 M. 1/4 Pfd. franko.
iseneier, Pfd. 4.50, gesiebt 5 M.
wurm . . . . . Pfd. 5 M.
ka . . Pfd. 2 M., gesiebt 3 M.

Universalfutter

	I	II	III
nd 2.—	1.40	0.80	

dvogelfutter . . . Pfd. 0.60
geifutter . . . . Pfd. 0.80
bnahme von 10 Pfund portofrei.
er und Vereine erhalten Rabatt.

Hiltmann, Berlin S 14, Dresdener Str. 24.

Mehlwürmer

1 Pfd. 5 *M* ab hier,
oreinsendung 1/4 Pfd. 2 *M* franko.
Großabnehmer Rabatt.

Ameiseneier

925 er, Pfund 4.50 M.

Weißwurm, 1925 er,

Pfund 4.50 M.

uska-Zecken Pfund 1.50 M.
a Seidenraupenpuppen,
emahlen Pfd. 0.75 M.
reise sind freibleibend, ab Lager, Porto und Verpackung. Bei An- Rückporto beifügen. [1404
größerer Abnahme hoher Rabatt.

arl Claus, Mutterstadt II
(Hauptbahnhof).

Mehlwürmer

insend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd.
versend. **D. Waschinski & Co.,**
Biesenthal I (Mark). [1405

„ORNIS"

Freie Bezugsvereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands.
Gegründet **1912** ∴ Fernsprecher **4198** [1406

Fachgemäße Belieferung mit Vogelfutter („Reform-Normal", individuelle Zusammensetzung bei restlosem Verbrauch; stets frisch gemischt). Hunderte von Liebhabern füttern seit über einem Jahrzehnt mit bestem Erfolg nur „Reform-Normal".

Reform-Normal-Käfige Mod. ORNIS 1925, neue Preisliste erschienen. — Modern eingerichtete Käfig-Bauanstalt mit elektrischem Betrieb.

Anschrift: Ornis-Haus, Halle-Saale. Der Geschäftsführer: Martin Sperling.



„Naturell"

das seit Jahrzehnten in Liebhaberkreisen eingeführte und bestens anerkannte Futter für edle Weichfresser ist wieder in bester Friedensbeschaffenheit lieferbar! **„Naturell" ist Qualitätsware,** auf Grund langjähriger Erfahrungen zusammengestellt und durch Autoritäten bestens beurteilt. [1407

Preis: kg 6.— M. Probesendungen gegen Einsendung von 1.— M. in Briefmarken. Drosselfutter kg 2.— M.

Empfehle außerdem bestes Körnerfutter für Einheimische und Exoten, ferner Ia Ameisenpuppen, Weißwurm usw.

Nur direkt zu beziehen von

Wilhelm Dietze, Leipzig, Kurprinzstr. Nr. 15.

„KAPPEL"

Schreibmaschine

Erstklassiges Erzeugnis ∴ ∴ Strapaziermaschine

Letzte Neuerung:
Geräuschloser
Wagenrücklauf

Maschinenfabrik Kappel A.-G.
Chemnitz-Kappel

Mehlwürmer

M 5.— das Pfd., ausschließl. Porto u. Verp.; bei Abnahme von 5 Pfd. Porto u. Verpackung frei.

Ia Ameiseneier

1925 er, 4.50 *M* per Pfd.

Ia Weißwurm, 1925 er 4.50 d. Pfd.
Ia Muska-Zecken . . 1.50 d. Pfd.
Ia Seidenraupen-puppen, gemahlen 0.75 d. Pfd.
Ia Garneien, gemahl. 0.35 d. Pfd.

tf. Universalfutter

Alleiwa I für Nachtigallen *M* 2.—
„ II für Grasmücken *M* 2.—
„ III für Drosseln . . *M* 1.50
das Pfund ab hier, ausschl. Verp.; bei größeren Mengen billiger. [1408

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
A. Edrich II, Waldsee (Pfalz).

Mehlwürmer

beget. gefüttert, 1/4 Pfd. 1.75 M., 1/2 Pfd. 3.25 M., 1 Pfd. 5.60 M.
Wiederverkäufer Rabatt.

Getrock. Ameisenpuppen

à Pfund 5.— u. 5.50 Mark.
Ia Muska (Zecke) à Pfd. 2.00 M.
Ia Weißwurm à Pfd. 4.50 M.
Franko geg. Voreinsend. des Betrages.

Th. Witte, Niederndodeleben
bei Magdeburg. [1409

Vogelfutter [1410

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Offeriere Vogelfutter in prima Qualität:
Betr. Ameiseneier . . à Pfd. 3.80 M.
10 Pfd. 36.— M. franko
Weißwurm . . . . . Pfd. 4.— M.
Con. Eigelb . . . . . Pfd. 2.— M.
Karottengrieß . . . . Pfd. 0.70 M.
Drosselfutter . . . . Pfd. 0.80 M.
Lucullus extra Mischung 1/2-Pfd.-Paket 0.95 M., weiße Packung 0.80 M.
Senegalhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Silberhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Algierhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Kerbtternahrung f. Kanarien Pfd. 1.30 M.
Versand per Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. [1411

Paul Tzornack,
Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189.
(Postscheck-Konto Nr. 652 65)
Gegründet 1905.

Heidelberger Vogelfutter

Braune Packung für Erdsänger u. ä. Vögel 250 g 2.75
Graue Packung f. Grasmücken 250 g 1.70
Blaue Packung für Drossel 250 g 1.10
empfiehlt [1412

Arthur von Ende,
Zoologische Handlung,
Jena (Thüringen), Magdelstieg Nr. 55.

Ein Versuch

überzeugt jeden von der Güte meines **Universalfutters.** Preis 2 M. p. Pfd. Sämtliche Futtersorten für Exoten, Wald- und Kanarienvögel zu billigsten Tagespreisen. Versand geg. Nachnahme. Verpackung und Porto werden billigst berechnet. [1413

P. H. Kirsten, Leipzig 3,
Zeitzer Str. 53. Fernruf 31445.

Deutsche selbstgetrockn. Ameiseneier, ff. Qualit., Pfd. 5 M. Verpack. 20 Pfg. Bei Eins. v. 5,30 M 1 Pfd. franko. **A. Reith, Wiesbaden,** Helenenstraße 24. [1414

Prima Edelroller

mit tiefen Hohltouren. Große Auswahl, mäßige Preise. 2 Staatsmedaillen. Kanarienfeinzucht seit 1876. [1415

P. Holzky, Cöthen i. A.

Suche

alle Arten **Vögel** und **Tiere** zu kaufen. Preisangebote an [1416
Josef Kraly, Vogel- u. Tierhandlung, Frankfurt a. M., Kühgasse 7.

Afrik. Kalanderlerchen

Stück 15 M, die beste Sängerin, große Stieglitze Dutzend 30 M, Stück 4 M, Rothänflinge Dtzd. 25 M, Stück 4 M, Stieglitz-Weibchen Dutzend 18 M, Buchfinken Dutzend 20 M und noch vieles andere. Anfragen nur gegen Marke.

Beck, Tierimport, Stuttgart. [1417

Stieglitze,

Zeisige, Hänflinge, Girlitze usw.
Liste nur gegen Freimarke.

J. Beck, Stuttgart,
Tierimport. [1418

Verkaufe laufend junge Wellensittiche, grün und gelb, i. Freiflug gezüchtet, Ia befiedert und kerngesund, à 4 M. [1419
Saller, Plauegg, Hofmarkstraße 8.

Eine Feldlerche

zu kaufen gesucht. [1420
Max Adam, Burg, Bz. Magdeburg.

Verkaufe aus diesjähr. Hecke: Ia Kanarienſänger à 15 M, ♀ 3 M, Stieglitz-Kanarien ♂ 12 M, ♀ 3 M, 1 wunderv. hellen Stiegl.-Kanarienhahn, Ia Sänger, 30 M, Stiegl. ♂, z. Bastardzucht geeign. à 6 M. Eltern davon, 13 Junge mir hochgebracht, 12 M, jg. Buchfink, ♀, ungef., 5 M. Reeller Versand. Nachnahme. Verpackung möglichst einsenden. [1421
Linda Hirsch, Aubstadt (Unterfrk.). A. Z.-Mtgl. Ornis RVB.

Stieglitzmännchen

2—3 M,
rote Dompfaffen à 6 M,
Girlitze 3 M,
Rothänfling 2.50 M.
Verpackung 1 M, per Nachnahme Porto 1.30 M (dringend 5.40 M).
A. Reith, Wiesbaden,
Helenenstraße 24. [1422

Für Liebhaber!

Gebe ab meine Ia **Amsel,** Prachtexemplar, Wildfang 1923, ausgez. herrl. fleiß. Sänger mit nur voll. reich. Stroph., jetzt leise, ab Januar bis Aug. in voll. laut. Schlag, 20 M; desgl. ff. **Reitzzugfink,** 2 J. gek., nur ganz edler Einschall. m. schön. Knorre u. sehr lang. feur. Schlag, aalgl., fester Preis 30 M. Für beide Vögel übernehme volle Garantie evtl. Zurücknahme ohne Abzug.
J. Decker, Oslebshausen. [1423

Kaufe

hervorragend gut und viel, dabei sehr deutlich sprechende und Lieder singende **Papageien.** [1424
Ernst Perzina, Berlin N4,
Schlegelstraße 23.

Einladung!

Der **Verein der Freunde von Sing- und Ziervögeln in Lübeck** erlaubt sich hiermit, alle Sports-Vereine und -Freunde zu seiner am **12. und 13. Dezember 1925** stattfindenden

Allgemeinen Ausstellung

ergebenst einzuladen.
Das Standgeld beträgt für Kanarien pro Kollektion 8 M, für Ziervögel pp. in Käfigen bis 50 cm Länge 1.50 M, bis 120 cm Länge 3 M pro Käfig. Anmeldeschluß: 1. Dezember 1925.
Als Preise kommen außer Ehrenpreisen 32 echte Medaillen (teilweise Senatspreise) zur Verteilung.
Nähere Auskunft erteilt der Schriftführer [1425

Herbert Müller,
Lübeck, Hüxstraße 119.

Versäumen Sie nicht das Abonnement der „Gefiederten Welt" zu erneuern!

Wichtel

zahm, diesjährig, vorzüglicher Lockvogel, zu verkaufen od. zu vertauschen. Suche **Ia Gebirgs-Singdrossel** mit guten Rufen, ebenso **einige russische** oder **Alpenstieglitze.** [1426

Prof. W. Kinast,
Ueberlingen a. Bodensee.

0,1 grünbürzl. Sperlingspapagei
1,0 Laufhühnchen
1,2 Schnurrbärtchen
2,2 Granatrilde
1,1 Tigerfinken in Pracht
0,2 Amaranten
0,1 Weißkopfnonne
1,1 tl. Elsterchen
1,0 Stieglitz
billig abzugeben.

Suche: 1,0 Orangepfäffchen, 1,1 Ringelastrilde.

Eduard Schütze,
Eystrup (Weser). [1427

Gebe ab

aus Freivoliere Ia grüne Wellensittiche, 1925er Zucht, à 4,50 M, ferner 1 Paar junge Wildtauben. Tausche auch auf Exoten und Waldvögel. [1428
Wilhelm Berkenhoff,
Bad Münster a. St. A. Z.-Mtgl. 94.

Tauschgesuch.

Suche eine gut eingewöhnte Nachtigall, wenn möglich überjährig. Gebe einen prima Kanarienhahn St. Seifert und vier dazu gehörende St. Weibchen. Garantiere für nur gutes Zuchtmaterial. Der Hahn bringt Din-Dau-Pfeife, Hohlrolle, markige Knorre, tiefe Schockel und Hohlklingel. [1429
Paul Malitte, Bremen,
Berliner Str. 15.

Japan. Seidenhühner

vertausche ich gegen **Vögel** (einheim. und exot.). [1430
Meyer, Kitzingen a. M.,
Königsplatz 5. A. Z.-Mtgl. 129 n.

Tannenhäher

(Corvus caryocatactes) à 16 M

1 Turmfalken 4 M
3 Steinmötel (Weibch.) à 20 M
verkauft [1431
Johann Rohracher, Lienz, Tirol.

Suche zu kaufen:

1 prima Sprosser, garant. erstklassig,
1 prima Nachtigall, garant. erstklassig.
Für Männchen u. erstklassige Schläger muß volle Garantie übernommen werden. [1432
Angebote mit Preis an **Gerhard Mehner, Lippersdorf,** Post Forchheim i. Erzgeb., erbeten.

Verschenke

fast meine **prächtige Blaustirnamazone,** spricht, lacht, pfeift, gibt Pfötchen, 60 M, mit **hochr. Käfig,** Meisterstück mit Turmaufbau u. reicher Bronzeverzierung, 15 M mehr.

Paul Würker,
Sorttiermeister, [1433
Merseburg a. S., Sand 16.

Junge diesjährige zahme Dohle, Prachtexemplar, 10 M franko bei freier Verpack., Nachnahme. Suche **Wellensittiche. M. J. Breuer, Elmpt b. Brüggen** (Rhld.). [1434

Verkaufe

1,0 Schama, guter Vogel, aalglatt und gesund, nimmt Wurm vom Finger, Preis 60 M, Verpack. frei, oder tausche gegen **1,0 Klarino,** gesund, gut vermausert und gut schlagend.
Frau Dr. Rosell, Ballenstedt (Harz), A. Z.-Mtgl. 89. [1435

---

1 prim. Gebirgs-Schwarzplättch., halblaut singend 8 M.
1 prim. Garten-Grasmücke 5 M.
Fr. Kinscher, Glatz,
Schwedeldorfer Straße 8. [1436

Bestellungen für November sofort der Post übergeben!
Bestellzettel für Deutschland.

Postbestellzettel.

Hiermit bestelle ich für den Monat **November 1925**
1 „Die Gefiederte Welt"
(eventuell mit Nachlieferung). — **Erscheinungsort Burg Bz. Mgdb.**

Name: .....

Wohnung: .....

Postquittung: ..... Mk. ..... Pf. sind heute bezahlt worden.

Ort: ..... den .....

Postannahme

.....

Aus Voliere in tadellosen Exemp
abzugeben: 1,1 kl. Kubafink 20
1,0 Zwergmaskenweber i. Pr.
0,1 Napoleonw. 0.50 M; 0,1 Sch
bärtchen 6 M; 0,1 Kanarie 1 M;
Heuglins Weber je 8 M; 2,0 Gold
weber (Pl. auricapillus) je 8 M;
Spiegelwida 1. Pr. 15 M; 1,0
kopfnehweber, zahm 10 M; 1,1
köpfchen, 1,1 Katharinasittich, 1,1
Sperlingspapagei mit 2 Jun
1 Orangeköpfchen (A. pullarius).
in RM. Nehme junge reinblaue Wel
Dreifarbenglanzstare u. Trupiale i.
A. Krabbe, Anklam i. Pom
Demminer Str. 10. A. Z.-Mtgl. 14.

Offeriere freifleiber

Laubgrüne Papageiamadinen	Paar	60.-
Spitzschwanzamadinen, garantiert eingewöhntes Zuchtpaar	„	60.-
Blaustirnamazonen, sehr gelehrig	Stück	50.-
Kleine weiße Gelbhaubenkakadus	„	35.-
Tarantin. rotköpfige Bergpapageien	Paar	16.
Feuerflügelsittiche, fingerzahm	Stück	16.-
Toviisittiche	Paar	16.
Grüne Wellensittiche	„	12.-
Schamaweibchen	Stück	50.
Tyran, schwefelgelbe	„	28.-
Weißkehldrosseln	„	10.-
Katzendrosseln	„	12.-
Blauraben	„	30.
Kronentangaren	Paar	10.-
Safranfinken, ausgefärbt	„	8.
Morgenammerfinken	„	8.
Jacarinifinken	„	25.
Riesenpfäffchen	„	12.
Pfalzschnäbel	„	12.
Japan. Möwchen	„	18.
Kanarienhähne, flott singend	Stück	12.
Kanarienweibchen	„	1.
Stieglitzhähne	„	8.
Bluthänflinghähne	„	3.
Buchfinken	„	2.
Zeisighähne	„	3.
Schwarzplatten, Frühjahrsfänge	„	10.
Schwarzplatten, Herbstfänge	„	6.
Gartengrasmücken	„	8.
Dorngrasmücken	„	3.
Rotkehlchen	„	3.
Gartenrotschwänze	„	4.
Hundpaviane, sitzend, 40 cm, zahm	„	140.
Schwarze Kapuziner, zahm	„	65.
Nonnenkapuziner, zahm	„	65.
Schwarze Makaken, handzahm	„	80.
Rhesusaffen, kleine u. größere	„	45.

Sämtliche Sorten **Futter** für **W und Körnerfresser** zu dem bill Tagespreis.

1458] **Tierhandlung**
Max Kleine
Berlin O 17
Strausberger Straße 13.
Fernruf Alexander 3313.

Offeriere

in gesunden gutbefiederten Exemp
Blaustirn-Amazonen, etwas sprechen
fingerzahm, Stück 40—50 M, Gel
Amazonen, Prachtexemplare, Stck.
Gelbbrust-Ara in Prachtgefieder,
150 M, Blaukopf-Häher (Mexiko)
15 M, Klarino, Stück 35 M,
Kanarien-Hähne von 10 M an
alle einheimischen Körner- und
fresser. Außerdem empfehle alle
Futter. Preisliste auf Wunsch.
Zoologische Handlung, B
Wilmersdorf, Uhlandstraße

---

5 Jahrgänge „Gefiederte W
1910—1914, à 10 M.
Tausche Vögel
W. Satz, Elmshorn i.
Ollusstraße 21.

Inserate

für das am 29. Oktober 192
Ausgabe gelangende Heft 4
Gef.-Welt erbitten bis 24. Ok

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 14
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 29. Oktober 1925 | Heft 44

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Mein Papageien-Fliegertrupp.

Von Dr. Walder, nördl. Schwarzwald.

(Nachdruck verboten.)

Durchblättert man unsere Zeitschriften, die sich mit der so manchem von uns ans Herz gewachsenen Vogelwelt beschäftigen, so findet man bei gleicher Liebe zu unseren geflügelten Freunden die Liebhaber selbst in zwei Lager gespalten.

Sucht auf der einen Seite alle Lust und Liebe eine Betätigung in Pflege und Haltung (Käfigung) unserer gefiederten Sänger, Sprecher, Farbenschönheiten usw., so finden wir auf der anderen das Bestreben, unsere Vögel vor Gefangenschaft zu bewahren und mit Hilfe von Naturschutzverwirklichung dafür zu sorgen, daß Arten und Individuen ungestört vom Menschen ihr natürliches Leben führen können.

Nun soll es nicht der Zweck meiner Zeilen sein, das Für und Wider, das sich in beiden aus Idealisten bestehenden Lagern finden läßt, heute zu erörtern, im Gegenteil, mein Beitrag will vielmehr vermittelnd wieder einmal darauf hinweisen, daß es uns bei Auswahl geeigneter Vogelarten möglich ist, beide Anschauungen zu verknüpfen und biologisch zu verwirklichen. — Ich hoffe mit Recht „wieder einmal" gesagt zu haben, denn ich nehme an — mir fehlt es an genügender Literaturübersicht —, daß ich, wenn auch vielleicht nicht auf Grund obiger Überlegung, so doch in der Ausführung manche Vorgänger habe.

Wir haben diese Möglichkeit, Vögel zu käfigen und zu pflegen zugleich verbunden mit natürlichem Freileben, vielleicht bei manchen Vogelarten, sicher aber bei einem großen Teil der Papageien. — Diese Tiere vereinigen hinsichtlich dieser Möglichkeit zweierlei. Einmal dominieren sie vermöge ihres Großhirns, dann aber sind sie zum großen Teil nicht nur Höhlenbrüter, sondern auch ständige Höhlenbewohner und somit schon rein instinktiv an das Halten einer festen Behausung in vielen Fällen gebunden.

Hat letztere Eigenschaft bereits bei der geistig niedriger stehenden Taube es mit sich gebracht, als Abkömmling der höhlenbewohnenden Felsentaube jene Art der Domestikation einzugehen, die wir heute in Form des Taubenfreifluges verbunden mit Seßhaftigkeit an einem bestimmten Ort haben, so liegt es an und für sich nahe, dies von den so viel höher stehenden, auch vielfach Höhlen bewohnenden Papageien ebenfalls erwarten zu dürfen.

Haben wir es hier auch nicht mit domestizierten Tieren, sondern mit reinen Wildlingen zu tun, so vermag doch anderseits gerade die geistige Überlegenheit dieser Tiere — nach vorheriger Zähmung — die Möglichkeit eines solchen Freifluges analog dem unserer Tauben zu erleichtern.

Von diesem Gedanken ausgehend habe ich zu Beginn dieses Jahres mit einem Paar Feuerflügelsittichen (Brotogerys pyrrhopterus) den Anfang gemacht. — Die Sittiche hatte ich dreiviertel Jahr zuvor bei Lenger, Berlin, erstanden, nachdem sie kurz vorher von Peru aus in Europa gelandet waren. Sie wurden bald soweit zahm, daß sie sich durch das Gitter meiner kleinen im Freien befindlichen Voliere gern aus der Hand füttern ließen. Dann waren sie, hierauf muß man beim Freiflug Wert legen, gut akklimatisiert und an jedes Wetter, Sturm, Nebel, Regen, jede winterliche Kälte, Tag und Nacht gewöhnt.

Der Freiflug gelang — die Tiere wurden zuerst abwechselnd freigelassen — infolge der sexuellen Bindung zum jeweils gefangen gehaltenen Partner sogleich gut.

Dies veranlaßte mich, denselben dann auch mit gelben und grünen Wellensittichen, deren geistiges Niveau etwas tiefer steht, zu erproben. — Auch dies gelang. Doch hatte ich hierbei einige Verluste, z. T. durch widrige Zufälle beim ersten Abflug, z. T. durch die damals nur gering vorhandene Bindung zu einem Partner und einmal durch die den Wellensittichen eigentümliche nächtliche Schreckhaftigkeit bei ausnahmsweise draußen in hohen Tannen übernachtenden Tieren infolge Aufkommens eines Sturmes.

Dann versuchte ich es mit tarantinischen Unzertrennlichen, von denen mir ein schönes Paar Gustav Müller, Hamburg, zuschickte. — Diese ließ ich in Anbetracht der starken geschlechtlichen Bindung sehr bald nach Ankunft frei, auch wieder mit vollem Erfolg.

So fliegt bei mir jetzt schon länger ein „Siebenertrupp" munterer kleiner Papageien:

ein Paar Feuerflügelsittiche, ein Paar tarantinische Unzertrennliche, ein Paar gelbe Wellensittiche und ein grünes Wellensittichmännchen.

Die Freude der Tiere am natürlichen Freiflug ist eine offensichtliche. Sie können besonders bei schönem Wetter oft kaum erwarten, daß ich des Morgens die kleine Voliere öffne, und fliegen dann jeder seiner Art entsprechend, oft sich den ganzen Tag herumtreibend, in einem Umkreis bis zu 2 km herum, um mittags oder abends, oft auch wiederholt am Tage, in ganz seltenen Ausnahmen erst den nächsten Morgen in ihre Behausung zurückzukehren.

Interessant ist es, die verschiedene Lebensweise dieser drei Arten zu beobachten.

Die Feuerflügelsittiche und ebenso die Unzertrennlichen stürzen sich beim Ausflug zumeist ziemlich senkrecht aus der in I. Stockhöhe befindlichen Voliere mit schrillem Geschrei oft fast zum Erdboden, um dann schnell steigend in einer der hohen Fichten aufzubäumen.

Die Feuerflügelsittiche, deren Zahmheit übrigens noch zunahm — sie kommen mir jetzt im Freien auf die Hand geflogen —, gebärden sich als Wipfeltiere. Dort in den höchsten Höhen der Bäume halten sie sich am liebsten auf, sofern sie nicht tiefer hängende v. Berlepschsche Starenkasten gründlich durchstudieren. Ihr Flug hat etwas fledermausähnliches, ist gewandt und schnell; und wenn sie sich nicht gerade zu zärtlichem Kosen auf einen Baum zurückziehen oder eifrig beschäftigt Zweige benagen und Blätter zupfen, hört man fast immer ihren lauten Lockruf oder ihren stimmlichen Ausdruck von Freude oder auch Ärger.

Die Tarantinischen leben im Gegensatz hierzu ganz geheim. Nach dem Ausflug sind sie im Nu den Blicken entschwunden; sie huschen im Dickicht der dichten Fichten, von Stamm zu Stamm weiter fliegend, oft auch größere Strecken schnell schwirrend durcheilend, und geben ihren kleiberähnlichen, etwas schrillen Lockton nur dann, wenn sie sich selbst untereinander für Augenblicke verloren haben. So kommt es vor, daß sie frühmorgens außer Sicht und Gehör kommen und erst abends mit schnellem Flug plötzlich und unvermutet am Käfig wieder erscheinen.

Wieder anders die Wellensittiche! Ihren geradezu schwalbenähnlichen Flug zu beobachten, ist zusammen mit dem Farbenspiel der gelben, graziösen, kleinen Körper gegen blauen Himmelsgrund ein ästhetischer Genuß, sie sind meine Höhenflieger. Waren sie aus besonderen Gründen einige Tage gesperrt gehalten, so gehen sie, besonders das gelbe Paar, in Kreisflügen steigend nach Art der Hochflieger unter den Tauben immer höher, die Kreise sehr gut über der Voliere als Mittelpunkt mit einem Durchmesser von ca. 100 bis 200 Meter haltend, um nach einer Flugdauer von einigen Minuten — das meiste waren bisher acht — sich senkrecht hinabzustürzen und in irgendeiner dichten Fichte — hier meist in mittlerer Höhe des Baumes — zu verschwinden.

Besonders interessant war es in diesem Herbst: als mein gelbes Wellensittichpaar, sobald es etwas höher stieg, sofort die Aufmerksamkeit der bereits in Verbänden fliegenden Schwalben auf sich zog. Diese eilten dann förmlich von allen Seiten herbei und umringten die Sittiche, die sich hierdurch nicht im geringsten beirren ließen, sondern anscheinend an diesen Verbandsflügen eine gewisse Freude hatten. — Zweimal konnte ich beobachten, wie ein solcher Verband von ungefähr 30 bis 40 Schwalben, in ihrer Mitte meine beiden gelben Wellensittiche, mit diesen immer höher stieg, zu einer Höhe, in der sonst eben nur Schwalben zu fliegen pflegen, meine Wellensittiche nur noch als gelbe kleine Punkte am blauen Sonnenhimmel erkennbar. Aus dieser Höhe kamen sie zuerst mit einigen Kreisgleitflügen etwas tiefer, um sich dann nach ihrer Methode pfeilschnell, senkrecht herabzustürzen. Nach ihrem Flug zu urteilen dürften sie jedem Raubvogel entgehen.

Gefällt dies alles dem Leser, so wird er mir aber jetzt vielleicht einen Hinweis auf menschliche Nachstellungen geben, auf die „erbärmlichen Flinten", wie Floericke es in seinem hübschen Papageienbüchlein als Äußerung Buxtons erwähnt. — Leider unter Umständen mit Recht; so wurde mir aus Unkenntnis im Frühling ein Feuerflügelsittichmännchen abgeschossen. Heute, wo sich meine Freiflughaltung mehr herumgesprochen hat, befürchte ich es kaum noch. Eine gewisse Aufklärung der Umgebung dürfte also doch zumeist hiervor schützen, so daß ich einen Gegengrund für den Freiflug hierin jedenfalls nicht sehen kann.

Den abgeschossenen Feuerflügelsittich ersetzte ich übrigens bald durch einen neuen; diesen ließ ich schon nach wenigen Wochen zugleich mit dem alten Weibchen, das ja eingeflogen war, heraus, sofort mit Erfolg.

Feuerflügel- und Wellensittiche haben den letzten Gebirgswinter in 650 m Höhe, wie ich oben schon erwähnte, vorzüglich überstanden, bei bestem Gefiederglanz und dauernder stimmlich sich äußernder Fröhlichkeit mitten in Schnee und Kälte, in Voliere und Freiflug.*)

Ich bin jetzt sehr gespannt, ob es mir gelingen wird, die aus Afrika stammenden tarantinischen Unzertrennlichen durch den kommenden Winter im Freien durchzubringen. Werden doch diese Vögel immer als zart, und der Feuchtigkeit gegenüber als empfindlich hingestellt. Bisher sind sie, trotz der niedrigen Temperaturen der letzten Wochen — zeitweise nicht höher als 7 Grad Celsius am Tag, dem Gefrierpunkt nahe des Morgens — und obwohl sie sich ruhig vom Regen durchnässen lassen, in bester Form. — Vielleicht berichte ich später noch einmal darüber.

Und nun zum Schluß! Es würde mich freuen, wenn meine Zeilen dazu beitragen würden, dieser besonderen Art der Vogelhaltung neue Freunde zuzuführen. — Möge also mein Bericht in diesem Sinne Ansporn und Anreiz sein. — Möge er aber

*) In den Inseraten liest man oft ein Angebot im Freiflug gezüchteter Vögel. Dieser Ausdruck ist unrichtig, gemeint sind nämlich nur Vögel aus Außenvolieren. Richtige Ausdrucksweise wäre hier wünschenswert.

auch zugleich als Aufforderung gelten, sofern andererseits auch Erfahrungen hierüber vorliegen, diese zu veröffentlichen. Erfahrungen, die manchen wertvollen Beitrag zur Psychologie der Vögel und zu ihrer Akklimatisationsfähigkeit geben können.

Dem Leser aber ein Glückauf zur Ausübung dieser besonderen Liebhaberei, die Käfigung und Freiheit des Vogels in so glücklicher Weise vereint, — und nicht gleich verzagen, falls zuerst Mißerfolge!

Das Liebhaberjahr.

Plauderei von J. Birk, Leipzig.

(Nachdruck verboten.)

Der 1. August. Träumend stehe ich, wie fast allabendlich, am Fenster, um die erfrischende Abendluft nach des Tages Hitze in vollen Zügen zu genießen, um die wohltuende Ruhe des scheidenden Tages den aufgeregten Nerven zukommen zu lassen. So stehe und träume ich oft, wenn sich der senkende Tag und die heraufziehende Nacht in milder Dämmerung nähern, wenn die Stimmen des Tages den Lauten der Nacht das Feld räumen müssen. Könnte doch jeder so glücklich sein und sein trautes Heim im Rahmen grünender Wiesen, rauschender Bäume am Ufer eines kleinen Wasserlaufes haben, wo der Schlag der Nachtigall, der Ruf des Kuckucks und Pirols, wo die Lieder des nimmermüden Volkes der Grasmücken, wo der Fasan mit seinem heiseren Schrei, wo in der Stille der Nacht die Käuze mit ihren schaurig schönen Tönen, wo allerlei Wassergeflügel mit Kreischen und Geschnattere, wo Frösche mit ihren monotonen Gequake zu einem fortwährenden Simmengewirr beitragen und sich gegenseitig Tag und Nacht ablösen, ja, wäre jeder so glücklich wie ich, so wäre die Sehnsucht nach dauernder Verbindung mit der alles neu belebenden Natur bei jedem Naturfreund in zufriedenstellender Weise gestillt. Aber leider ist dem nicht so, eingepfercht im Dunste und dem Häusergewirr der Großstadt bleibt dem, nach Natur Dürstenden und Hungernden nur der über ihm lachende blaue Himmel, der nur in einer kurzen Spanne Zeit im Kreislauf des Jahres von unzähligen Mauerseglern, den einzigen Zeugen von dem Leben im Haushalt der Natur in angenehmer Weise belebt wird. Diese schwarzen, schreienden, hastig jagenden Gestalten, haben es mir angetan, ihr Kommen und Gehen bildet stets einen Wendepunkt im Dasein des für Natur Sinn habenden Großstadtbewohners. Auch heute noch, trotzdem mich rußgeschwärzte Häuser und dunstige Straßen nach des Tages Arbeit nicht mehr gefangen halten, bin ich ihnen treu geblieben, den mir so traut und liebgewordenen flinken Gesellen und jedesmal, wenn sie von mir Abschied nehmen, wird mir so eigentümlich, als gälte es ein Nimmerwiedersehen, als wären sie die glücklichsten Geschöpfe, die in ein Land reisen können, wo es keinen Winter mit Frost, Eis und Schnee gibt. Dieses wehmutvolle Gefühl auch heute am 1. August. Gestern bis in den sinkenden Tag ein Schreien und Kreischen über der Niederung des kleinen Flüßchens, nicht ahnend, daß es das letztemal sein sollte in diesem Jahr, heute eine unheimliche Stille, die einem nur zu deutlich fühlen läßt, daß für den Vogelfreund heute am 1. August bereits der Herbst begonnen hat, trotzdem im Kalender, der für alle Menschenkinder die Jahreszeiten registriert, der 21. September als Herbstbeginn bezeichnet ist. Für mich und wohl für die meisten Ornithologen beginnt der Herbst mit dem Abzug der ersten südlichen Wanderer, der Mauersegler. Im Laufe des Monats August werden sich noch viele uns so lieb und vertraut gewordene Sänger aus Wald und Flur in unauffälliger Weise wie Mauersegler auf die südliche Reise begeben, bis endlich der Herbst nach und nach alle nach dem verlockenden Süden zu reichlichen Mahlzeiten, zu Lust und Sonnenschein — aber leider auch häufig in den sicheren Tod treibt. Wie viel schmerzlicher würde ich sie alle vermissen, die mich im blühenden und grünenden Frühling mit ihren Liedern erfreut haben, wenn ich nicht ein Herz für sie hätte, das mich unwiderstehlich zwingt, mir einige von diesen flüchtigen Wanderern für den langen Winter zurückzubehalten, wenn ich neben dem Ornithologen nicht auch gleichzeitig Stubenvogelliebhaber wäre. Vogel-

Feuerflügelsittiche. Heimkehr nach mehrstündigem Ausflug. Aufnahme noch außerhalb der Voliere (s. S. 513).

Stärkung nach dem Ausflug. Feuerflügelsittiche sind ausgesprochene Linksfüßer (s. S. 514).

liebhaberei du Inbegriff vieler unſagbarer Freuden, magſt du mir auch Leiden und Sorgen aufbürden, bringſt du mir auch ein ſchwer zu tragendes Verantwortungsgefühl, alles verblaßt gegen die Genüſſe die du mir verleihſt, du biſt mir ein unverſiegbarer Born, woraus ich im harten Fron des Alltags neue Lebenskraft und -mut ſchöpfe. Du biſt es, die mich in dem Wahne leben läßt als gäbe es nur lachenden Frühling, indem du mich in ſtetiger Hoffnung auf Vogelſang und kommenden Frühling an den rauhen Wintertagen ſchnell vorbei führſt, du biſt es, die mir vorzaubert Frühling und Winter gemeinſam zu erleben, nichts trennt beide als die Fenſterſcheibe, draußen das ſchneeweiße Leinentuch des Winters, das alles unter ſeine Decke ſchlummern und ruhen läßt, drinnen im Heim des Vogelliebhabers ein Schluchzen, Flöten, Jodeln, ein Stimmengewirr von Liedern unſerer herrlichſten heimiſchen Sänger, eine Fata morgana des im Maienſchmuck prangenden Auenwaldes.

Das Liebhaberjahr, wieviel Freuden bringt es dem Einen, wieviel Leiden, wieviel Enttäuſchungen dem Anderen, wievielen bringt es Beides, das Liebhaberjahr, es verdient wirklich einmal unter die Lupe genommen zu werden. Die letzten, noch in meinen Ohren gellenden Scheidegrüße der erſten ſüdlichen Wanderer, die gemahnen, daß ich nach Wochen wieder allein ſein werde mit meinen gefiederten Stubengenoſſen, daß ich nur ihren Liedern lauſchen kann mit der Hoffnung, daß es dereinſt wieder Frühling werden muß, ſie drücken mir die Feder in die Hand um zu plaudern, was die vielen durchlebten Liebhaberjahre gebracht und was mir die noch kommenden, hoffentlich nicht zu knapp bemeſſenen Liebhaberjahre, noch bringen können und bringt der von Sorgen und Kummer befreiende Tod einſt dem müden Erdenwanderer die verdiente Ruhe, ſo kommt er noch viel zu zeitig für den, der ſein Leben lebt, ſo, daß es verdient gelebt zu werden. Was wäre für mich das Leben voller Arbeit geweſen, wenn nicht eine ſorgende, treue Gattin, nicht eine geſunde, lebensfrohe Kinderſchar, nicht ein Heim mit jubilierenden Vogelgeſang mein eigen wäre, mein Glück im Winkel, ich würde es nicht vertauſchen, um alle irdiſchen Güter und Herrlichkeiten dieſer ſchnöden Welt, o könnten ſie alle, die ruhelos umherirren in Genuß- und Verſchwendungsſucht, wir würden wieder Menſchen bekommen, geſund im Schoße der Mutter Natur. Wir brauchten nicht zu ſchauen, wie die, für Natur blinden, mit ihren Nerven Raubbau treibenden, immer weiter ſich der Wohltat der Natur entfremdenden Menſchen in der Haſt nach großer Kilometerzahl die heimatlichen Fluren durcheilen, wie ſie in Genußſucht einer Degeneration des Menſchengeſchlechts entgegenſteuern. Vogelliebhaber kann nicht jeder ſein und werden, dies muß tiefer ſitzen, aber Freude an der Natur, ihren Geſchöpfen, ihren unergründlichen Wundern, das muß ſich die Menſchheit zu erhalten ſuchen, leider leider muß man bereits ſagen, zurückerobern, wenn Glück und Zufriedenheit den harten Kampf um das tägliche Brot erleichtern ſollen. Wird auch im Leben der Völker nie Etwas wie Ausgleich geſchaffen, dazu iſt der Egoismus, die Jagd nach dem Mammon eine zu große Krankheit am Volkskörper, aber ein Volk das Freude an der Natur, Liebe und Mitleid für ihre hilfloſen Geſchöpfe hat, wird geſund bleiben und ſich ſtets durchſetzen im Wettſtreit um geiſtige und körperliche Tüchtigkeit.

Leider verſuchen eigene Volksgenoſſen, indem ſie falſchen Naturſchutz predigen, der Stubenvogelliebhaberei das Grab zu graben, ihr Geſchrei nach einem gänzlichen Verbot hallt heute wieder ſtärker durch die deutſchen Lande; o, dieſe armen Laien auf dem Gebiete der Naturkunde, könnte ich ſie alle zu mir laden, um mit mir ein Liebhaberjahr zu verleben, ich glaube, ſie würden eine andere Meinung von dem Vogelpfleger und ſeiner Liebhaberei bekommen, als wenn ſie fern vom impulſiven Leben der Natur, am grünen Tiſche vernichtende Epiſtel verfaſſen gegen die harmloſe Naturliebhaberei, wie dies unſere Stubenvogelliebhaberei eine iſt. Ihnen allen müßte die Schamröte ins Geſicht ſteigen, wenn ſie Stubenvogelliebhaberei und Tierquälerei in einem Atemzuge nennen, wenn ſie ſehen könnten, welches große Maß von Liebe der Pfleger für ſeine gefiederten Stubengenoſſen aufbringt, wie beſorgt er um ihr Wohlbefinden iſt, wie er kein Opfer an Geld und Zeit ſcheut, um alle nur erdenklichen Leckerbiſſen auf ihren Speiſezettel zu bringen. Könnten ſie ſehen, wie der Liebhaber darnach trachtet, ſobald als möglich die erſten friſchen Ameiſenpuppen zu erlangen, wie er alle Futterhandlungen darnach durchſtöbert, wie er draußen im Walde die ihm bekannten Ameiſenhaufen nach dem koſtbaren Gut ſorgſam öffnet, wie er jedes erreichbare Inſekt freudeſtrahlend ſeinen Lieblingen zuträgt, wie er ihnen die erſten roten und ſchwarzen Holunderbeeren im Bewußtſein eines begehrten Genuſſes an den Käfig hängt, überhaupt wie er Freud und Leid mit ſeinen Pfleglingen teilt, indem er fühlt mit Stolz ihr Wohlbefinden, und trauert in Beſorgnis bei Krankheit eines ſeiner Lieblinge. Ja, wenn ſie alle, die der Vogelliebhaberei lieber heut wie morgen den Garaus machen möchten, miterleben könnten mit denſelben Gefühlen, was dem Liebhaber ſein Liebhaberjahr bringt, ſie würden nicht ausrufen: „Herr, wie danke ich dir, daß ich nicht ſo bin wie andere", ſondern „o laſſe mich ſo werden wie andere".

(Fortſetzung folgt.)

Verſuche die Gründe des Weißwerdens bei einem gefangenen Granataſtrild zu analyſieren und ein paar Worte über das Gefangenleben der Art.

Von A. Adlerſparre.

(Fortſetzung.) (Nachdruck verboten.)

Nun zum Einfluß des Lichtes, dieſer ſtrahlenden Energie. Daß das Licht einen ſehr bedeutenden Einfluß auf die melanine Pigmentierung ausübt, braucht man wohl in den Tagen des „Sonnenbadens" kaum darzulegen. Uns Vogelwirte hat die Erfahrung außerdem ſchon längſt gelehrt, daß das Licht auch einen gewiſſen Einfluß auf die lipochrome Pigmentierung ausübt — ich erinnere von den bekannten temporären Verbleichungen roter Farben bei Tigerfinken, Rotkardinälen u. a., welche Verbleichungen ſchon der Lichtverbeſſerung ziemlich vollſtändig weichen. Wie es den meiſten bekannt ſein dürfte, iſt indeſſen

der überwiegende Teil der strahlenden Energie für unseren Gesichtssinn nicht auffaßbar, gibt sich aber in anderer Weise kund (Wärmestrahlen, chemische Strahlen). Während für normale Augen nur Strahlen von einer Wellenlänge zwischen zirka 750 und 400 μμ (μμ = Millionstel Millimeter) sichtbar sind, hat man im Sonnenlicht ultrarote (Wärme-)Strahlen von einer Wellenlänge bis auf 8000 μμ und mehr gemessen und ultraviolette (chemische) Strahlen von so geringer Länge wie 100 μμ. Durch die klassischen Versuche des Nobelpreisgewinners Niels Ryberg Finsen ist es einwandfrei festgestellt, daß der Lichtfaktor, welcher den melaninen Pigmentstoffwechsel aktiviert, mit den kurzwelligen violetten und ultravioletten Strahlen identisch ist.

Nun fragt sich: Liegen Unterschiede zwischen der Uv-Strahlung im natürlichen Verbreitungsgebiet des



Goldpirol.

Vogels und der Uv-Strahlung bei uns vor? Gewiß, und sehr bedeutende Unterschiede zudem. Je breiter die Luftschicht ist, welche die Uv-Strahlen zu passieren haben, je mehr von ihnen wird unterwegs von der immer durstigen Atmosphäre ausgelöscht. Bei uns, wo das Licht mehr schräg einfällt, ist diese Passage natürlich bedeutend breiter als in tropischen und subtropischen Regionen und am allerbreitesten im Winter. Man hat die Intensität der tropischen Uv-Strahlung abzuschätzen versucht und gefunden, daß sie dort 10—20mal größer (je nach der Jahreszeit u. a. m.) als hier ist. Aber nicht genug hiermit. Die Intensität variiert aus oben angeführten Gründen auch mit der Höhe ü. d. Meer. Also weiter ein erhebliches Plus für die Heimat des Vogels. In gutem Einklang mit dem jetzt gestreiften steht die Tatsache, daß Tropenvögel (nicht selten auch Gebirgsvögel aus temperierten Zonen) weit allgemeiner als beispielsweise nördlichere Arten (oder bei uns heimische Tiefländer) in stark gesättigten, oft prachtvoll leuchtenden Farben prangen.

Richten wir nun unsere Aufmerksamkeit auf die Umweltbedingungen unserer Stubenvögel, so finden wir, daß außer der bedeutenden atmosphärischen Beschränkung des ultra-violetten Lichts weiter ein Minus zukommt in dem Maße, wie wir während eines größeren oder geringeren Teiles des Jahres aus klimatischen Gründen genötigt sind, unsere Vögel hinter Fensterglas zu halten. Glas läßt nämlich die kurzwelligsten Strahlen nicht durch — die Durchlässigkeitsgrenze liegt um 350 μμ, ein klein wenig variierend für verschiedene Glassorten. In allen diesen Umständen haben wir zweifellos den Grund einer mehr temporären Verbleichung bei verschiedenen Arten zu suchen, welche ich — und wohl auch andere — mehrmals während des Winters beobachtet. U. a. habe ich dabei Spitzenweiß im Blau bei Goulds gesehen, welche Veränderung aber bei jüngeren Individuen mit der Mauser wieder verschwanden, soweit sie nicht ausnahmsweise von beschädigten Papillen (beispielsweise nach Toben) herrührte. Wahrscheinlich war wohl auch ungenügendes Licht während der Überreife die Ursache derselben Erscheinung bei einer Anzahl frisch importierter Goulds, von welchen in dieser Zeitschrift — wenn ich mich recht erinnere — Horst Wagner irgend einmal berichtet hat.

Bis zu einem gewissen Grade können wir indessen den bei uns herrschenden Mangel an ultravioletem Licht dadurch ausgleichen, daß wir im Frühjahr, Sommer und Herbst, solange es das Wetter zuläßt, unsere Pfleglinge in den Genuß freien (von Glas unfiltrierten) Sonnenlichtes kommen lassen. Also in Flugkäfigen von verhältnismäßig geringer Tiefe die vor geöffneten Fenstern stehen! Die Uv-Strahlung des Sonnenlichtes ist nämlich von erheblich größerer Intensität als die des gewöhnlichen diffusen Tageslichtes. — Es ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, daß der Instinkt die meisten Vögel zum fleißigen Benutzen der Sonnenbadgelegenheiten in der Gefangenschaft nötigt. Allerdings baden sie ebenso gerne hinter Fensterscheiben als im freien Licht — über irgendeinen Unterschied hierbei haben sie natürlich während ihrer ganzen Entwicklungs-

geschichte im Freien niemals die geringste Erfahrung gemacht. In solchen Fällen kommt es deshalb auf uns an, nach unserem besseren Verstand einzugreifen, soweit wir nicht eigenen Interessen entgegenwirken wollen.

Auch der Granatfink hat sich während der dunkleren Jahreszeit nicht völlig farbenfest gezeigt. Weiße Federspitzen und Unterordnung des Braunes unter Grau habe ich zuerst während ein paar besonders dunkler rel. schneearmer Winter bemerkt. Diese Veränderung verschwand aber gleich wie bei anderen Vögeln nach der im Frühjahr stattfindenden Mauser völlig ohne andere Milieuveränderung als die des von Januar an täglich vermehrten Tageslichtes. Hier dürfte man deshalb berechtigt sein, an eine Ausfallserscheinung zufolge des temporär verminderten Lichtreizes zu denken, möglicherweise von einer schon zu der Zeit beginnenden Abschwächung des Pigmentierungsprozesses von anderer Art unterstützt. Da die Veränderungen nunmehr vergrößert und permanent geworden, trotzdem der Vogel von Mitte Februar an — also schon ein paar Monate vor der Mauser — in den Genuß von Sonnenlicht kommt, deutet nämlich dies, scheint mir, auf eine im Laufe der Zeit erworbene Hemmung des Pigmentierungsprozesses, welche nicht bloß von temporären Lichtreizveränderungen hat bewirkt werden können. (Forts. folgt.)

Volierenhaltung oder Einzelkäfigung?

Von J. Stöß, Lößnitz i. E.

(Nachdruck verboten.)

Zu den Äußerungen, die gerade in jüngster Zeit, obiges Thema betreffend, in der „Ges. Welt" gemacht worden sind, erlaube auch ich mir hiermit „meinen Dreier zu geben".

Gleich von vornherein will ich verraten, daß ich für Unterbringung der Vögel in geräumigen Volieren schwärme, obgleich ich mir der Schwierigkeiten und Nachteile derselben, besonders bei der Käfigung zarter Sänger, voll und ganz bewußt bin. Doch die Vorteile der Volierenhaltung überwiegen mir so, daß ich seit längerer Zeit den Einzelkäfig ganz aufgegeben habe, zumal ich Vögel nicht bloß ihres Gesanges wegen halte, sondern mich an ihrem gesamten Tun und Treiben erfreuen will. Das Ideal eines Gesellschaftskäfigs ist natürlich eine gutbepflanzte Gartenvoliere, womöglich mit laufendem Wasser. Wie eine solche gebaut sein muß, um etwaigen von außen und innen herkommenden Unannehmlichkeiten vorzubeugen, ist erst kürzlich in vorliegender Zeitschrift gesagt worden, kann mir also eine Wiederholung ersparen. Obgleich ich seit vielen Jahren eine mit dichtem Strauchwerk bewachsene, ca. 20 Raummeter fassende Gartenvoliere besitze, beherbergt diese doch augenblicklich nur noch den bereits an dieser Stelle vorgestellten, aber mit zunehmendem Alter leider nicht so harmlos gebliebenen, wie einst gepriesenen Turmfalken. Der einzige Grund für diese Verödung meiner Gartenvoliere ist ihre Altersschwäche und damit zusammenhängendes Lecksein. Eine heißbegehrte neue zu errichten, fehlen mir leider, offen gestanden, da ja bekanntlich unverschuldete Armut keine Schande ist, die Mittel. Habe den billigen Trost, neben so vielen anderen ein Opfer der Geldentwertung zu sein. — In der Gartenvoliere mit ihrer natürlichen Bepflanzung, im vollen Genusse von Sonne, Luft, Niederschlägen und manchem selbsterbeuteten Insekt gibt sich auch der Vogel in seinen ganzen Bewegungen und sonstigen Lebensäußerungen viel ungezwungener als im beschränkten Einzelkäfig, wo ihm ein bestimmter Sprung ein für allemal vorgeschrieben ist. Die ganz verschiedene Stärke, die dazu noch lebensfrischen Zweige sind auch nicht ohne Bedeutung und wohltuenden Einfluß auf die Fußpflege mancher in dieser Hinsicht besonders empfindlichen Arten. Das Gefieder des Lieblings bleibt unbestoßen und erglänzt in viel lebhafteren, satteren Farben, obgleich sich auch hier das Rot der Bluthänflinge, Birkenzeisige, Kreuzschnäbel nur in Ausnahmefällen erhalten hat, bzw. bei der Mauser wiedergekommen ist. Nach jahrzehntelangen Beobachtungen glaube ich auch behaupten zu können, daß die Volierenvögel in den Nächten der Zugzeit weit weniger toben als ihre einzeln gekäfigten Genossen, durch welchen Übelstand ja bekanntlich besonders das kaum glücklich erneuerte Gefieder der Wurmfresser oft schon in einer einzigen Nacht wieder in die Brüche geht, zum größten Leidwesen iher besorgten Pfleger. Mir sind allerdings auch schon Gesangsfanatiker begegnet, die mir auf mein geäußertes Bedauern ihrer gerupften Federbälle geantwortet haben: Das schadet nichts; der Vogel singt doch nicht mit dem Schwanze!

Ich bin leider aus den schon angeführten Gründen gezwungen, mich bis auf weiteres mit einer 3×0,60×3 m großen Zimmervoliere zu begnügen. Diese statte ich alle 14 Tage mit frischen Ästen aus, die in in die Wand geschlagene eiserne Krampen gesteckt werden. Einen herrlichen Anblick bieten da die roten Dolden der Ebereesche und des Hirschholunders und die des schwarzen Holunders. An den letzten beiden Beerenarten tuen sich besonders die Gartengrasmücke, Schwarzplatte, das Rotkehlchen, aber auch Schwarz-, Singdrosseln und Star gütlich, während mit den großen Ebereschenbeeren, aber nur der begehrten Körner wegen, bald die Kreuzschnäbel, das Fruchtfleisch liegen lassend, aufgeräumt haben. Ein Vorteil der Ebereschenzweige ist, daß sie auch zum Unterschiede vom Holunder das Laub verhältnismäßig lange halten. — Wird im Gesellschaftskäfig auch manches aus dem Freßnapf geschleuderte Körnchen oder sonstiges Futter von den Mitinsassen noch verzehrt, so kann man hier mit kräftigenden Nahrungsmitteln und Leckerbissen, wie Ameisenpuppen, Weißwurm, Ei, Fleisch, Mehlwürmern, zumal wenn die Bewohner der Voliere wie bei mir solche Größenunterschiede zeigen wie Drosseln und Grasmücken bzw. Erdsänger, nicht so haushalten wie im Einzelkäfig, will man die Schwächeren seiner Pfleglinge nicht der Gefahr der Unterernährung aussetzen und sie so womöglich zu Todeskandidaten stempeln. Durch die größere Bewegungsfreiheit im Flugkäfig wird natürlich auch wieder Verdauungsstörungen vorgebeugt, die ja die hauptsächlichsten Ursachen zur Einbuße unserer gefiederten Hausfreunde sind. — Zur Gesunderhaltung derselben gehört auch, die

nötige Sorgfalt der Wasserfrage zuzuwenden. Erscheint das dargereichte Flüssigkeitsquantum auch als ausreichend für die Anzahl der gekäfigten Tiere, so muß der Pfleger doch bedenken, daß das Badebedürfnis und manchmal die Matschsucht mancher Vögel so groß ist, daß der Behälter schon oft nach kürzester Zeit geleert ist. Auf Verunreinigungen der Wassergefäße und ihres Inhaltes will ich gar nicht näher eingehen, da doch daran den größten Teil der Schuld der Herr meist selbst trägt, indem er eben unpraktische oder unsachgemäß aufgestellte Behälter verwendet. Durch das täglich öftere Wassererneuern wird wenigstens bei mir die Zeit, die ich durch die Massenabfütterung erspare, reichlich aufgewogen, da ich nicht verschulden möchte, daß durch die Ausscheidungen der Tiere ihre Kameraden erkranken. — Um mich vor Verlusten durch Ansteckung zu bewahren, muß man auch neu einzuwerfende Vögel erst so lange einzeln käfigen, bis man sich von ihrem einwandfreien Gesundheitszustand überzeugt hat. — Der unwiderlegbar größte Nachteil des Zusammenhaltens von „Sängerfürsten" ist und bleibt der daraus folgende mangelhafte Gesang, und die Vollkommenheit ihres Liedes ist es ja gerade, die die mit der Haltung dieser Zärtlinge verbundenen Opfer an Zeit und Gut wert erscheinen läßt. Die, wenn auch nicht bösartigen Störungen durch die Mitinsassen gönnen dem einzelnen Sänger nicht die nötige Ruhe, seine Kunst voll und ganz zum Vortrag bringen zu können. Eine Übervölkerung der Voliere muß man, allen Lockungen, diesen oder jenen Vogel noch zuzugesellen, widerstehend, vermeiden. Besonders während der Brunstzeit muß man seine Aufmerksamkeit auf eventuelle Raufbolde gerichtet haben und sie möglichst entfernen, bevor sie Schaden stiften können. Je größer natürlich der Raum ist, desto geringer ist die aus Unverträglichkeiten entspringende Gefahr. Um ein allerdings unmaßgebliches Bild zu bringen, was man in einem immmerhin bescheidenen Raume alles zusammen halten kann, will ich als Schluß meiner heutigen Ausführungen die gegenwärtigen Insassen meiner Zimmervoliere vorführen: 1,0 Schwarzdrossel seit Weihnachten 1923, 1,0 Singdrossel seit Frühjahr 1923, 0,1 desgleichen seit Herbst 1924, 1,0 Star seit Frühjahr 1925, 1,0 Feldlerche seit Frühjahr 1922, 1,0 Schwarzplatte seit Frühjahr 1919, 1,0 Gartengrasmücke seit Frühjahr 1922, 0,1 desgleichen seit Herbst 1924, 0,1 Rotkehlchen seit Sommer 1923, 1,0 Rothänfling seit Herbst 1922,

Vielfarbentangare.

1,0 desgleichen seit Herbst 1923, 1,0 desgleichen seit Frühjahr 1925, 1,0 Stieglitz seit Herbst 1922, 0,1 desgleichen seit Herbst 1923, 1,0 Erlenzeisig seit Herbst 1922, 1,0 desgleichen seit Sommer 1925, 1,0 Birkenzeisig seit Herbst 1923, 1,0 Grünfink seit Winter 1923, 1,0 desgleichen seit Herbst 1924, 5,0 Buchfinken seit Herbst 1924, 2,0 Kreuzschnäbel seit Sommer 1925, 1,0 Haussperling seit Frühjahr 1925, 0,1 desgleichen seit Sommer 1925. In den kommenden Wochen gedenke ich noch manchen fehlenden Vertreter der heimischen Vogelwelt, besonders Körnerfresser, meiner Sammlung einzuverleiben, obgleich ich damit rechne, im nächsten Frühjahre, wenn sich der Geschlechtstrieb regt, manchen Störenfried wieder entfernen zu müssen. Davon vielleicht ein andermal.

Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten.

Von J. Kuntzendorff, Berlin.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Nicht selbst verpflegt, aber bei einem bekannten Liebhaber in einem Exemplar beobachtet habe ich die Siebenfarbtangare — Calospiza paradisea *(Sw.)* (Abb. S. 498).

Diese ist in Cayenne, Surinam und brasilisch Guayana beheimatet und dehnt ihr Verbreitungsgebiet südlich bis Bahia und nördlich bis Venezuela aus. Auch sie hält sich in den Wäldern in hohen Bäumen auf und dürfte sonst den beiden vorgenannten Arten in ihren Lebensbedingungen und in ihrem Wesen gleichen. Meines Erachtens ist diese Tangare der schönste der zu Calospiza gehörenden Vögel. Männchen: Stirn, Scheitel, Kopfseiten schuppenartig gelbgrün; Nacken, Halsseiten, Oberrücken, Schultern, Oberschwanzdecken samtschwarz; Unterrücken, Bürzel orangerot, nach hinten goldgelb; Kehle kobaldblau; Unterkörper türkisblau; Mitte, Steiß, Unterschwanzdecken, Schenkel schwarz; kleine Flügeldecken türkisblau, die übrigen Flügeldecken schwarz, große und mittlere Flügeldecken sowie Handschwingen türkisblau gesäumt; Schwanzfedern schwärzlich; Auge braun, Schnabel schwarz, Füße schwärzlich. Das Weibchen soll in allen Farben matter, graulicher und der Unterrücken und Bürzel gelb sein.

Die Tangare war in einem Drosselkäfig untergebracht, sehr lebhaft und glich in ihren Bewegungen gänzlich den beiden vorgenannten Arten. Sie war recht zutraulich, ohne aber wirklich zahm zu sein, legte im Gegenteil bisweilen, z. B. bei Anwesenheit Fremder, ein einigermaßen mißtrauisches Benehmen an den Tag. Der Gesang dieser Tangare ist gänzlich unbedeutend zu nennen und erinnert an den der Vielfarbtangare. Die Eingewöhnung fand ähnlich wie bei mir, mit einem guten Fruchtfutter statt, bestehend aus süßen, saftigen Früchten, Eigelb, Eierbiskuit, Quark und Ameiseneiern. Durch Hinzufügung von immer größer werdenden Portionen eines nahrhaften Universalfutters wurde der Vogel an ein solches gewöhnt. Zu gern hätte ich selbst mir eine solche Tangare angeschafft, denn es muß ein geradezu herrlicher Anblick sein, alle diese drei prächtigen, in leuchtendem Grün, Blau und Orange prangenden Vögel beisammen in einem Flugraum zu haben, aber leider wurde keine eingeführt. Ich bin an Hand der Drei- und der Vielfarbtangare gemachten Erfahrungen überzeugt, daß auch die Siebenfarbtangare zu den Vögeln gehören wird, die sich mit den anderen Insassen eines Flugraums, wie auch mit Tangaren vertragen wird.

Die Isabellentangare — Calospiza flava *(Gm.)*.

In dieser Tangare haben wir einen Vogel vor uns, der im Gegensatz zu den vorangegangenen drei Calospiza sich nicht durch seine schillernden Farben und gleißender Schönheit, sondern durch die prächtigen, ruhigen, in ihrer Zusammenstellung geradezu vornehm wirkenden Farben auszeichnet. Männchen: Zügel, Kopfseiten, Vorderhals, Brust- und Bauchmitte schwarz; ganze Oberseite goldig glänzend sandfarbengelb, an Hals- und Körperseiten bräunlicher werdend und ins Gelbbraune der Brust- und Bauchseiten, des Steißes und der Unterschwanzdecken übergehend; Flügel- und Schwanzfedern schwarz, breit schwach graulich himmelblau außen gesäumt; Unterflügeldecken schwarz; Augen braun, Schnabel hornbraun, Unterschnabel hellbräunlichgrau; Füße bräunlichgrau. Weibchen: Oberkopf rostgelblich; Vorderhals weißlich; Bauch, Steiß rostgelblich; übriger Körper grau, auf dem Rücken grünlich verwaschen. Flügel und Schwanz ähnlich denen des Männchens, sind aber mehr grünlichgrau; Schnabel und Füße sind heller. Lg. 145—150; Fl. 63—76, Schw. 5[illegible] bis 66 mm.

Isabelltangare.

Als Verbreitungsgebiet wird Nordostbrasilien angegeben; nördlich bis Bahia und südlich bis Paraguay. Sie kommt ebenso im dichtesten Walde, wie in Gärten und Obstanlagen vor, wo sie sich ihre Nahrung in saftigen Früchten sucht. Sie lebt einzeln oder in kleinen Flügen, wobei die Männchen sich stets allein halten. Im übrigen dürfte ihre Lebensweise mit der der übrigen Calospiza übereinstimmen.

Im Gegensatz zu den vorerwähnten Arten zeichnete sich die Isabellentangare im Käfig durch ihre wenig große Lebhaftigkeit aus. Meist saß sie auf einem Fleck und rührte sich nur, wenn man an den Bauer herantrat oder wenn sie ans Fressen ging. Unter solchen Umständen war es verständlich, daß einem die Lust zur Haltung eines solchen Ölgötzen verging, und wenn nicht die Farbenpracht und die Hoffnung, sie würde sich im Flugraum ändern, mich davon abgehalten hätten, sie hätte meine Vogelstube nicht lange geziert. In der Voliere verwandelte sich der Vogel mit einem Schlage; aus der langweiligen, beinahe träge zu nennenden Tangare wurde ein lebhafter beweglicher Vogel, der mit Vorliebe, besonders am Morgen und gegen Abend seine Künste zeigte

oder in raschem, geradem Fluge von einem Strauch zum andern strebte, dabei seinen wenig schönen und etwas schrillen Lockruf ausstoßend. Freie Zweige nur als Zwischenlandung benutzend, hielt er sich vorzugsweise im Gestrüpp auf, wo er munter von Ast zu Ast hüpfend sein Spiel trieb. Während die Tangare im Winter die im Innenflugraum befindliche Felspartie nie aufsuchte, trotzdem diese von der Sonne beschienen wurde, war es im Sommer ein Bild von geradezu packender Schönheit, wenn sie sich draußen auf dem Gestein im hellsten Lichte sonnte. Das schöne Blau der Flügel und des Schwanzes leuchtete prächtig im Gegensatz zu dem satten, goldigen Ockergelb und dem tiefen Schwarz, keine schreiende, aber desto sympathischere, beruhigende Farbenzusammenstellung. Besonderes Vergnügen schien es ihr zu bereiten, durch das feuchte Blätterwerk der im Außenflugraum befindlichen Sträucher nach dem Regen umherzuhuschen. Auch in ihrem zweiten Domicilium, in Frohnau, zeigte sie das gleiche Wesen und die gleiche Beweglichkeit. Mit Vorliebe saß sie



Lauchgrüne Papageiamadine. Neuerdings wieder eingeführt.

des Winters, sich sonnend, auf dem Fensterbrett oder auf den nächsten Zweigen, im Sommer auf den an dem Drahtfenster befestigten Ästen in der Sonne. Friedfertig mit ihren Gattungsgenossen und den übrigen Vögeln sah ich sie nie in einen Streit verwickelt. Das Eingewöhnungsfutter war das gleiche wie bei den anderen Tangaren; es währte nicht lange, so hatte ich sie fest an das Universalfutter gewöhnt. Von Obst bevorzugte sie weiche Birnen und Bananen am meisten. Richtig zahm ist sie nie geworden, sie war vielmehr bis zu einem gewissen Grade mißtrauisch, aber nicht scheu. Ein von Dr. Ruß verpflegtes Pärchen kam nicht zur Brut.

(Fortsetzung folgt.)

Ornithologische Beobachtungen auf meiner Dänemark-Schweden-Reise.

Vortrag gehalten im Verein „Agintha" von Max Dähnick.

(Nachdruck verboten.)

Meine Damen und Herren! Ich will Ihnen heute, so gut es mir möglich ist, meine ornithologischen Beobachtungen auf meiner diesjährigen Sommerreise bekanntgeben.

Am 6. Juni d. J. begann unsere Besuchsreise nach Dänemark und Schweden. Vorher wurde die Insel Rügen, nachher Bornholm angelaufen. Bei herrlichem Wetter ging es mit Sonderzug ohne Aufenthalt nach Stettin. Gar bald waren wir am Hafen, wo uns der Luxus-Schnelldampfer „Odin" mit „Herzlich Willkommen — gute Fahrt" aufnahm. Schnell wurde noch das Stettiner Logenheim besucht, und eigenartig war es, als bei der Begrüßungsansprache im Garten ein Buchfink unaufhörlich seinen leidlichen Schlag ertönen ließ. Punkt 2 Uhr setzte sich unser „Odin" langsam und schwerfällig in Bewegung. Bald waren die verschiedenen Werften passiert. Vorbei ging es am Rotorschiff, denn Kapitän Dr. Flettner weilte gerade mit seiner „Bukau" besuchsweise in Stettin. Wir schaukelten im Haff, an Swinemünde vorbei, dampften wir auf hoher See. Erst hier sah ich die ersten Seeschwalben, und zwar 5 Stück. Von Möwen keine Spur, möglich jedoch, daß uns schon im Haff einzelne Möwen begrüßten, doch muß mir dieses entgangen sein, da die Schiffsglocke zum Essen rief. Usedoms Bäder, wie Swinemündes Bad, Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin grüßten freundlich zu uns herüber. Bald tauchte die Greifswalder Oie aus den blauen Fluten der Ostsee auf. Jetzt brachten die Stewarts Kaffee an Deck, und viele opferten ihren Kuchen den Seeschwalben. Bald richteten sich unsere Ferngläser auf Rügens bewaldete Küste, auf Göhren, Sellin und Binz. Schnell näherte sich der Dampfer Saßnitz, dessen Häuser lieblich aus dunklem Grün hervorlugten. Schnell verließen wir das Schiff, um unser Quartier aufzusuchen, um uns zu erfrischen und zu stärken. Wir unternahmen noch einen kleinen Strandspaziergang und gaben uns ganz dem bezwingenden Zauber eines Abends am Meeresstrande hin. Der Vollmond schüttete seine Silberfülle auf die schweigende See; fern am Horizont blitzte das Leuchtfeuer der Greifswalder Oie, und jenseits der Bucht blinkten und winkten die Lichter von Binz. In das leise Säuseln der Bäume mischte sich das dumpfe Rauschen der Brandung zu einem ungewohnten, aber feinhörigen Akkord. Am nächsten Morgen $^1/_4$7 Uhr weckte mich der Gesang unseres Zaunkönigs, welcher im Fliederbusch vor unserem Schlafzimmer uns seinen Morgengruß entgegenschmetterte. Kleiner Kerl, wie kraftvoll ist deine

Stimme, und grad ich, der ich besonderer Liebhaber unserer Zarten der Zartesten bin, freute mich riesig. Buchfinken, aber nur mäßige Schläger, schlugen um die Wette. Auch hörte ich eine Amsel. In den Gärten am Hafen orgelten Gartengrasmücken, sangen Dorngrasmücken, auch einige schöne Spötter. Jetzt fuhr der größte Teil der Reisegesellschaft in zwei kleinen Küstendampfern nach Stubbenkammer, dessen leuchtender Kreidefelsen in wuchtiger Majestät steil aufsteigend sich 132 Meter über dem Meeresspiegel erhebt. Am Fuße dieses gewaltigen Felsens liegt das Wrack eines deutschen Dampfers. Auf beschwerlichen Schlangenwegen, die von grünen Laubbäumen umschattet wurden, ging es auf die Höhe des Felsens. Kräftige Jungen begleiteten uns, um gegen kleines Entgeld die Sage von Stubbenkammer zu erzählen. Die Aussicht von der Hochfläche ist überwältigend, und der entfesselte Blick schweift bewundernd über die unendliche See bis zum fernen Horizont, wo sich Himmel und Meer vermählen. Ein kurzer Abstecher zum sagenumwobenen Herschafen ließ in uns eine leise Ahnung von der gewaltigen Schönheit der urwüchsigen Laub- und Buchenwälder Rügens aufdämmern. In 1 1/2 stündiger Wagenfahrt durch schönen gemischten Wald kamen wir nach Saßnitz zurück. Auf dieser Fahrt hörte ich Graudrossel, Amsel, Pirol, unsere Konzertmeister Fitis und Zilp Zalp. Viele Platten, darunter solche mit hervorragend schönem Überschlag. Weiter orgelten Gartengrasmücken am Wege, es sangen Dorngrasmücken, ab und zu klapperte ein Müllerchen, sowie auffallend viele Goldammern. Der Gesang wurde immer spärlicher, denn es war bereits 11 Uhr. Als wir gegen 12 Uhr im Viktoria-Hotel unser Essen einnahmen, träumte im Garten ein Gelbspötter, vielleicht stöhnte auch er über die glühende Hitze. Bald befanden wir uns an Bord unseres Dampfers, der seinen Kurs nach Dänemarks Hauptstadt, Kopenhagen, richtete. Immer mehr verschwanden Kap Arkona und die Insel Hiddensöe, und allmählich stieg aus den Fluten die dunkle Küste der dänischen Insel Moen auf. Bald sichteten wir in nördlicher Richtung die schwedischen Orte Trelleborg und Falsterbo. Am Leuchtschiff „Falsterbo" vorbei dampfte unser „Odin" in den Sund, der von Seglern und Dampfern belebt war. Und erst hier umkreisten ca. 20 Möwen unser Schiff. Aus den grauen Schatten des Abends wuchsen die Türme Kopenhagens empor; nachdem wir den Lotsen an Bord genommen hatten, fuhr das Schiff in den Hafen und legte am Kai an. Rasch war die Zollstelle passiert, das Hotel war bald gefunden, und jeder nahm mit Vergnügen und Appetit die reichlich gehaltene Abendmahlzeit ein. Am anderen Morgen war Sammelpunkt am Rathausplatz. Die Straßenbahn brachte uns für 20 Öre auch bald nach dort. Auffallend für uns war der lebhafte Radfahrverkehr, der sich wie ein endloser Strom durch die engen Straßen ergoß. Hier am Sammelpunkt angelangt, fielen mir viele Tauben auf, welche vom Publikum gefüttert wurden. Hunderte Tauben wohnen im rechten Rathausflügel. Unten im Garten werden sie von der Stadt gefüttert. Für mich als begeisterter Tierliebhaber war dieses sehr interessant. Die Kopenhagener wachen mit Argusaugen auf die Fremden, damit ihren Tauben kein Leid angetan wird. Von hier unternahm man eine Rundfahrt durch die Stadt. Aber die Tauben gaben mir den Anstoß, daß wir uns von der übrigen Reisegesellschaft trennten und mit der Straßenbahn nach dem Zoologischen Garten fuhren. Eintritt eine Krone. Gleich am Eingang fiel uns ein großer Aussichtsturm auf. Nun, meine Herrschaften, was soll ich Sie länger aufhalten? Wer unseren Berliner Zoo kennt, darf dasselbe von dem Kopenhagener nicht erwarten. Jedoch war der Bestand sehr schön. An Großtieren war so ziemlich alles vertreten. Mir gefiel besonders eine Herde Präriehunde, kleine braune Kerle, welche nach Rattenart in selbstgegrabenen Erdhöhlen hausten. In einem großen ovalen Bassin waren zwei Seelöwen in dem klaren Wasser, ließen sich wunderbar beobachten; selbige scheinen sich dort sehr wohl zu fühlen, denn unaufhörlich zeigten sie uns ihre Schwimmkünste, auch hörte ich hier zum ersten Male Seelöwen bellen, welche selbige auch ausgiebig taten. Doch weiter ging die Runde, und bald erhöhte Papageigekreisch unsere Aufmerksamkeit. Auch wurde der Eingang zum Vogelhaus bald gefunden; dieses ist ein kleines Häuschen, ungefähr noch mal so groß wie unser Sitzungsraum hier im Berliner Aquarium. Von dem Mittelgang des Raumes lagen zu beiden Seiten je 5 Volieren, jede ungefähr schätzungsweise 1,50 lang, 1,80 tief und 2,50 hoch, jede hatte eine Tür ins Freie zu einer eben so großen Außenvoliere, damit die Insassen, wie es ihnen gefällt, auch sich sonnen können.

Sämtliche Flugkäfige waren nur mit ausländischen Vögeln besetzt. Wir sahen Prachtfinken, Weber, gelbe und grüne Wellensittiche, Turakos usw. Von hier ging ein korridorähnlicher Raum ab; hier standen 15 große Käfige mit verschiedenen Papageien und großen Sittichen. An jeder Stirnwand des Vogelhauses waren große Außenvolieren, jedoch unbesetzt. Wir hielten uns nicht lange auf, da mich ausländische Vögel weniger interessieren. Im Garten selbst sangen fast alle unsere einheimischen. Wir hörten Stare, Schwarz- und Graudrossel, alle Laubsänger, auch fast alle Grasmücken, Stieglitz, Hänfling, Buch- sowie Grünfink, Goldammer, Gartenrotschwanz, weiße Bachstelzen, auch hörten wir den Pirol. Jetzt sahen wir auch ein Plakat mit einer Eidechse. Aha, hier muß auch ein Terrarium sein, und richtig, im Eingangsgebäude war es untergebracht. Auch dieser Raum war nicht groß, nicht mal so lang als unsere Krokodilhalle. Auf jeder Seite neun Behälter, besetzt mit Nattern, Vipern, Eidechsen, Lurchen, Schildkröten, weißen Mäusen, Riesenschlangen, kleinen Krokodilen und anderem. In der Mitte befand sich ein ungefähr 3 Meter langes Bassin, die Hälfte Sandteil, während der Rest eine Wasserlache darstellte. Dieses war mit einem Drahtdach überdeckt; hier hausten zwei Hechtalligatoren. Fische waren nicht zu sehen. Ein Vergleich mit unserem Berliner Aquarium ist nicht zu ziehen. Auch befürchte ich, daß die Tiere nicht lange aushalten, da die natürliche Einrichtung fehlt. Doch wir hatten genug gesehen und mußten weiter. Ein Auto, welche, nebenbei bemerkt, sehr billig fahren, brachte uns zu den Karlsberg-Brauereien. Dort wurden wir liebenswürdig durch den Betrieb

geführt. Dieser Betrieb hat eine Tagesproduktion von $1^3/_4$ Millionen Flaschen. Zum Schluß wurden wir ausgiebig bewirtet. In dieser Brauerei werden größtenteils deutsche Maschinen, und zwar Mannheimer benutzt. Alle Räume sind künstlerisch ausgeführt und von peinlicher Sauberkeit. Der Brauer Jacobsen, dem das Unternehmen gehörte, hat sein Eigentum dem Staat vermacht. Der erzielte Gewinn dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken. Abends fand sich alles im weltbekannten Vergnügungspark Tivoli zusammen, und erfreute sich an den Attraktionen einer ausgelassenen Heiterkeit. — Tivoli. Denken Sie an unseren Lunapark, es ist schließlich dasselbe, nur ist der Tivoli gärtnerisch schöner. Auf unserem Rundgang sahen wir gleich hinter der Berg- und Talbahn einen erleuchteten Grottenbau. In diesem Rundell sind zu beiden Seiten je zwei große Zementbecken. Diese sind sehr schön bepflanzt und mit Schleierfischen, Goldorfen, Goldfischen, Karpfen, sowie mit Hellerie-, Tetera- und Danio-Arten, sogar Berliner Kreuzungen besetzt. Die Mitte stellt eine Landschaft mit rieselnder Quelle dar. Am Eingang der Grotte war ebenfalls ein größeres Becken mit Schildkröten und kleinen Alligatoren. Für die Deutschen war auffallend die große Zahl der dänischen Matrosen, Land- und Seesoldaten, sowie der englischen Matrosen, deren Schiffe, 22 Stück, im Hafen lagen. Bei herrlichem Sonnenschein verließ unser Dampfer am anderen Morgen den Hafen. Wir fuhren an der dänischen „Riviera" entlang, vorbei an Hellerup, Klampenborg und Skodsborg. Die Ortschaften lagen alle im freundlichen Grün eingebettet. Natürlich wurden wir von einer stattlichen Anzahl Möwen begleitet. Bald erschien am Ausgange des Sundes die Stadt Helsingör mit dem schönen alten Schloß Kronberg. Hier wendete das Schiff und fuhr nach der schwedischen Küste.

(Schluß folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Meine Heidelerche hat im vorigen Jahr nicht gemausert. Lerchenliebhaber sagten mir, daß sie eingehen wird, oder möglicherweise im Frühjahr mausert. Doch was geschah? Gleich nach Weihnachten begann die Lerche erst abends bei Licht leise an zu singen, später auch am Tage, dabei immer lauter werdend, das abends Beilichtsingen stellte die Lerche mit zunehmender Stärke ein, dafür sang sie jedoch morgens bei Licht, sie sang nun den ganzen Frühling und Sommer hindurch ohne zu mausern. Die Fütterung war die übliche, die Zahl der Mehlwürmer vermehrte ich bis zu 10 Stück täglich, frische Ameisenpuppen gab ich nicht, ich hatte die Absicht, der Lerche an einem schönen Spätsommertag die Freiheit zu geben, doch fand ich nie den rechten Tag, weil das Wetter immer unbeständig war. Die Lerche sang auch immer noch und Ende August fing diese an zu mausern. Doch nun das Merkwürdige, sie hat nur die großen Federn erneuert, die alten, trockenen Kiele vom arg zerstoßenen Schwanz, wie auch von den Flügeln sind alle ausgefallen und haben neuen normalen Federn Platz gemacht, vom Kleingefieder ist auch nicht eine Feder gefallen. In der ersten Zeit der Mauser sang die Lerche noch, doch jetzt ist sie still, aber gesund und leider immer noch, besonders mir gegenüber, sehr scheu. Paul Kunzke.

Die erste Ausstellung einheimischer Vögel in Dortmund. Vom 3. bis 6. Oktober dieses Jahres veranstaltete der Verein der Vogelliebhaber von Dortmund und Umgegend in den Lokalitäten des Wirtes Abe, Königswall 75, eine Herbstausstellung von in- und ausländischen Vögeln. Es war das erstemal, daß der Dortmunder Verein sich dieser schweren Aufgabe unterzog, eine Ausstellung von einheimischen Vögeln in die Tat umzusetzen. Schon lange bestand die Absicht, einmal mit den gefiederten Lieblingen an die Öffentlichkeit zu treten. Leider war dieses bisher wegen zu geringen Vogelbestandes nicht möglich. Nach langer mühevoller Arbeit und Aufopferung war es dann endlich gelungen, am 3. Oktober dieses Jahres eine Ausstellung zu eröffnen. Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß der Dortmunder Verein z. Z. nur aus 12 Mitgliedern besteht und nur 11 sich an der Ausstellung beteiligen konnten. In verschiedenen Käfigsystemen waren 61 gesunde und tadellose Exemplare untergebracht. Vertreten waren von einheimischen Arten: 3 Nachtigallen, 1 Blaukehlchen, 1 Schwarzplättchen, 1 Dorngrasmücke, 1 Weidenlaubvogel, 7 Rotkehlchen, 1 Flußuferläufer, 3 Singdrosseln, 2 Amseln, 1 Weindrossel, 2 Stare, 1 Steinschmätzer, 2 Heckenbraunellen, 1 Feldlerche, 2 Gartenrotschwänze (♀ und ♂), 2 Blaumeisen (Pärchen), 9 Rothänflinge, 5 Buchfinken, 5 Erlenzeisige (1 ♀), 3 Goldammern (1 ♀), 1 Rohrammer. Exoten waren leider nur 4 Arten vertreten: 1 Blaustirnamazone, 1 Paradieswitwe, 2 Elsterchen und 3 Astrilde. Die Exotenliebhaberei scheint hier in Westfalen noch keinen festen Fuß gefaßt zu haben. Im großen und ganzen machte die Ausstellung einen sehr guten Eindruck. Die Herren Preisrichter sowie Rektor Weimann aus Dortmund, ein langjähriger Beobachter und Kenner der einheimischen Vogelwelt, sprachen sich lobend über die Ausstellung aus. Manchen Besucher wird dieselbe noch lange in Erinnerung bleiben. Verschönert wurde die Ausstellung noch durch verschiedene präparierte Raubvögel, sowie ein natürlich anmutendes Futterhäuschen. Außerdem hatte ein ausgestopftes Reh, umgeben von frischem Tannengrün, inmitten der lustigen Sängerschar, Aufstellung genommen. Wenn auch der Besuch durch gewisse Umstände viel zu wünschen übrigließ, so haben doch die Dortmunder Vogelpfleger der Öffentlichkeit gezeigt, daß sie wahre Freunde, Liebhaber und Kenner der einheimischen Vogelwelt sind. Erfreulicherweise haben sich auch verschiedene noch fernstehende Liebhaber bereit erklärt, dem Verein beizutreten. Ein Zeichen, daß die Begeisterung zu unseren gefiederten Lieblingen noch nicht ganz erloschen ist. Auf zu neuer Arbeit!

Emil Lappe, 1. Vors., Mengede b. Dortmund, Ronheide 2.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 23: Seit 1910 besitze ich zwei Mehlwurmkisten von Friedrich Fries. Fries nannte diese Kisten „Taunite". Diese Kisten haben sich bei mir bis jetzt gut bewährt. In diesem Sommer jedoch, wohl infolge Übervölkerung oder zeitweise zu knappen Futters, haben sich die Würmer durchgefressen, und ich kann diese auch äußerlich hübschen Kisten nicht mehr verwenden. Wo erhalte ich nun derartige Kisten heute? Paul Kunzke.

Frage 24: Bin im Besitze einer Blaustirnamazone. Dieselbe ist gut im Gefieder und kräftig gebaut, leidet an einer Augenentzündung. Das Augenleiden macht sich bemerkbar durch eine Kruste auf dem linken Auge und scheinbare Erblindung des rechten Auges. Bitte um Rat, wie zu behandeln. Ludwig Kreite.

Herr John Kuntzendorff, Berlin N 54, Zehdenicker Str. 7a, wünscht mit Pflegern nachstehend genannter Vögel in Verbindung zu treten: Gemeiner Fächerschwanz — Ripidura tricolor; Langbeinschnäpper — Miro australis; Zwergtrauerfliegenschnäpper — Muscicapulla maculata; Zwergblauschnäpper — Muscicapulla superciliaris; Scharlachbrüstiger Felsschnäpper — Petroica multicolor; Orangebrüstiger Felsschnäpper — Petroica phoenica; Japanischer Blauschnäpper — Cyanoptilla bella; Rotbauchfliegenschnäpper — Niltava sundara; Zwergniltavaschnäpper — Niltava macgrigoriae; Riesenprachtschnäpper — Niltava grandis; Zedernvogel — Bombyciphora cedrorum; Trauervogel — Phainopepla nitens; Kleiner Mennigvogel — Pericrocotus peregrinus; Mennigvogel — Pericrocotus speciosus.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Max Dähnick in Berlin NO 18, Gr. Frankfurter Str. 90, Ecke Markusstr. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Beck, Tierimport, Stuttgart: Kalanderlerchen.

Wilhelm Berkenhoff, Bad Münster a. St., A. Z.-Mitgl. 94: 1 Paar junge Wildtauben.

M. J. Breuer, Elmpt b. Brüggen (Rhld.): Zahme Dohle.

Linda Hirsch, Aubstadt (Unterfrk.), A. Z.-Mtgl., Ornis RVB.: Stieglitz-Kanarien, heller Stiegl.-Kanarienhahn.

Prof. W. Kinast, Ueberlingen a. Bodensee: Wichtel.

Max Kleinert, Berlin O 17, Strausberger Straße 13, Fernruf Alexander 3313: Laubgrüne Papageiamadinen, Spitzschwanzamadinen (eingewöhntes Zuchtpaar), taran. rottöpfige Bergpapageien, Feuerflügelsittiche, Tovisittiche, Schamaweibchen, schwefelgelbe Tyran, Weißkehldrosseln, Katzendrosseln, Blauraben, Kronentangaren, Morgenammerfinken, Jakarinifinken, Riesenpfäffchen, Pfalzschnäbel, Dorngrasmücken, Gartenrotschwänze.

A. Krabbe, Anklam i. Pomm., Demminer Str. 10, A. Z.-Mtgl. 14: 1,1 kl. Kubafink, 1,0 Zwergmaskenweber i. Pr., 0,1 Napoleonweber, 0,1 Schnurrbärtchen, 2,0 Heuglins Weber, 2,0 Goldkopfweber (Pl. auricapillus), 1,0 Spiegelwida, 1,0 Weißkopfviehweber, 1,1 Rußköpfchen, 1,1 Katharinasittich, 1,1 blaub. Sperlingspapagei mit 2 Jungen, 1 Orangeköpfchen (A. pullarius).

Johann Rohracher, Lienz (Tirol): Tannenhäher (Corvus caryocatactes), 1 Turmfalken, 0,3 Steinrötel.

Eduard Schütze, Eystrup (Weser): 0,1 grünbürzl. Sperlingspapagei, 1,0 Laufhühnchen, 1,2 Schnurrbärtchen.

Zoologische Handlung, Berlin-Wilmersdorf, Uhlandstraße 69: Gelbbrust-Ara, Blaukopf-Häher (Mexiko), Klarino.



Herrn M. G., Tasdorf. Der Stieglitz war stark abgemagert. Er wog 11 g, während ein St. seiner Größe ein Normalgewicht von 18 g hat. Er litt an der häufiger auftretenden Stoffwechselkrankheit, die meist nicht rechtzeitig bemerkt wird, da der Vogel sein Benehmen kaum ändert und nicht krank erscheint. Siehe auch S. 500, Redaktionsbriefkasten unter „Herrn H. B.".

Herrn B. R., Stendal. Die auf S. 521 abgebildeten lauchgrünen Papageiamadinen sind bereits einige Male gezüchtet worden. Häufig bereitet die Eingewöhnung derselben einige Schwierigkeiten, da die importierten Vögel nur Reis in Hülsen zu sich nehmen. Diese Nahrung ist auf die Dauer den Vögeln schädlich, da ihnen nicht die nötigen Nährstoffe zugeführt werden. Die Vögel müssen vorsichtig an andere Sämereien, wie Hirse und Spitzsaat, gewöhnt werden. Die Geschlechter der Papageiamadine sind leicht zu unterscheiden. Dem weiblichen Vogel fehlt die prächtige bläuliche Färbung des Gesichts und der Kropfgegend, desgleichen die rote der Unterseite. Im männlichen Kleide gibt es zwei Färbungsphasen, abgesehen von der roten eine gelbliche. Es handelt sich hier keineswegs um zwei Formen, die geographisch getrennt sind. Beide Phasen leben nebeneinander.

Herrn J. K., Berlin N. Bei der Goldaugentimal ist der Schnabel schwarz, die Nasengruben sind tief gel das Auge ist braun, nach außen gelb, der Lidrand leuchten orange, bei jungen Vögeln ist der Schnabel schwarzbraun das Auge fahlbraun; das Gefieder einjähriger Vögel i heller und mehr rostfarben als das älterer Vögel. Gol augentimalien von Nepal sind dunkler als südliche Vöge bei welchen sich die Farbe des Kopfgefieders nicht von de des Rückengefieders unterscheidet. Die in den Gebiete zwischen Himalaja und Südindien lebenden stehen in de Färbung zwischen der südlichen und nördlichen Form. D auf Ceylon lebende Pyctorhis natalis *Legge* unterscheid sich in erster Linie von der vorstehenden Form durch gan schwarzen Schnabel, also auch die Nasengruben sind schwar das Auge ist goldgelb, die Lider chromgelb. Außerde soll das Rotbraun der Flügel fahler sein. Die in Jerdo „Birds of India" angeführte Form aus Bengalen P. longi rostris *Hors.* ist in keiner der neuen Veröffentlichungen au rechterhalten, auch nicht im Brit. Cat. und nicht in der neue Handlist von 1903.

Herrn Prof. F. B., Langfuhr; Herrn A. A., Stoc holm; Herrn M., Gersensbach; Herrn A. D., Berlin Herrn Th. W., Davos-Wolfgang; Herrn Dr. O. St., Köln Herrn W. L., Kassel; Herrn E. M., Bln.-Friedenau: Bei träge dankend erhalten.

Herrn K., Bensheim. Ein Vogel ist nicht krank, wei er nicht mausert, sondern er mausert nicht, weil er kran ist. Der Kardinal muß gequollene oder besser gekeimt Samen erhalten, dazu täglich 2—3 Mehlwürmer, Obs (Apfel) und Zweige mit schwellenden Knospen von Laub und Nadelhölzern. Trockene Sämereien in bekannter Weis mit Lebertran sind gleichfalls zuträglich, auch einige Tropfe Zitronensaft im Trinkwasser. Der Grad der Luftfeuchtigkei hat wenig Einfluß auf den Eintritt der Mauser. Wen sich die neuen Federkeimlinge nicht entwickelt haben, ist e ganz gleich, ob ein Vogel in trockener oder feuchter Luft ge halten wird, dann mausert er in keinem Fall. Hohe Wärm ist dem roten Kardinal nicht zuträglich.

Herrn H., Brüssel. Der Vogel ist die Senegalform der Weißwangenlerche — Pyrrhulanda leucotis melano cephala *(Lcht.)*, welche sich durch die bräunlichweißen ode weißen kleinen, die helleren Säume der größeren Flügel decken, das hellere Rotbraun des Rückens, das viel breiter weiße Nackenband und den schwächeren und helleren Schnabe von der nordostafrikanischen P. leucotis *(Stanl.)* unterscheidet Das auf der Unterseite heller gefärbte Silberschnäbelchen i zweifellos die östliche Form A. cantans orientalis, die i letzterer Zeit wiederholt eingeführt wurde.

Herrn A. B., Jena; Herrn A. D., Berlin; Herrn W Dörnhagen Bez. Kassel: Beiträge dankend erhalten.

Herrn O. G., Großschönau, ist brieflich Bescheid zu gegangen.

Herrn H. B., Gardeyien. Das einzig zuverlässige Er kennungszeichen für das Männchen der Singdrossel ist de Gesang. Alle anderen Kennzeichen sind unzuverlässig. Di dunklen Brustflecke sollen beim Weibchen blasser, größe und weniger zahlreich vorhanden sein. Das Braungelb a den Unterflügeldecken matter. Die Spitze des Oberschnabel soll beim Männchen länger als die des Unterschnabels sei und hackig übergebogen, beim Weibchen sollen beide Spitze gleichlang sein. Daß auch das Weibchen größer sein soll ist ebensowenig begründet wie die Angabe über die Kürz des Oberschnabels. Singdrosseln variieren sehr in der Größe.

Herrn K. P., Landsberg/Warthe. Die nach Angab des Fragestellers von Schwer in Brieg (Bez. Breslau) Piastenstraße 3, zum Pfundpreis von M. 6.— bezogene „deutschen Ameiseneier" sind schlecht gesammelt und schlech getrocknet, so daß sie zum Verfüttern an insektenfressend Vögel nicht verwendbar sind. Der Verkäufer wird, wi alle ehrlichen Kaufleute, die schlechte Ware zurücknehme und den gezahlten Kaufpreis erstatten.

Herr E. Sch., Eystrup. Die drei gesandten Vöge sind unter den gleichen Krankheitserscheinungen eingegangen Bei allen war die Leber stark vergrößert, und das Muskel fleisch und alle inneren Organe zeigten rötlichgelbe Färbung (Gelbsucht). Das Elsterchen war ein Heuglins Elsterchen — Spermestes scutata (*Heugl.*). Es ist im allgemeinen den Kleinelsterchen ähnlich, aber ihm fehlen die sattbronze-farbenen Flecke auf den Körperseiten. Den Mitteilungen über die Züch tung von Psittacula cyanopygia sehe ich mit Interesse entgegen

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.

Jahrgang 54 29. Oktober 1925 Heft 44

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Mein Papageien-Fliegertrupp. Von Dr. Walder, nördl. Schwarzwald.

Das Liebhaberjahr. Plauderei von J. Birk, Leipzig.

Versuche die Gründe des Weißwerdens bei einem gefangenen Granatastrild zu analysieren und ein paar Worte über das Gefangenleben der Art. Von A. Adlersparre. (Forts.)

Volierenhaltung oder Einzelkäfigung? Von J. Stöß, Lößnitz i. E.

Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten. Von J. Kuntzendorff, Berlin. (Forts.)

Ornithologische Beobachtungen auf meiner Dänemark-Schweden-Reise. Vortrag gehalten im Verein „Agintha" von Max Dähnick.

Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Ausstellungen - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellungen.

Der Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden, gegr. 1906 (vorm. Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden), veranstaltet in diesem Jahre vom 4. bis 7. Dezember seine Vogelschau im Italienischen Dörfchen. Ausgestellt werden einheimische und fremdländische Sing- und Ziervögel. Auch in der diesjährigen Vogelschau soll der Gedanke, wie die Vogelpflege und der Vogelschutz geübt werden, veranschaulicht werden. Alle Vogelliebhaber sind herzlich willkommen.

Die Ausstellungsleitung.

Der Verein der Freunde von Sing- und Ziervögeln in Lübeck erlaubt sich hiermit, alle Sports-Vereine und Freunde zu seiner am 12. und 13. Dezember 1925 stattfindenden Allgemeinen Ausstellung ergebenst einzuladen. Das Standgeld beträgt für Kanarien pro Kollektion 8 M., für Ziervögel pp. in Käfigen bis 50 cm Länge 1.50 M., bis 120 cm Länge 3 M. pro Käfig. Anmeldeschluß: 1. Dezember 1925. Als Preise kommen außer Ehrenpreisen 32 echte Medaillen (teilweise Senatspreise) zur Verteilung.

Herbert Müller, Lübeck, Hüxstraße 119.

Aus den Verbänden.

Vereinigung d. Vogelliebhaber Landesverband Preußen. 1. Vors. Karl Gumprich, Berlin W 50, Nürnberger Str. 44 III; Geschäftsstelle: 1. Schriftf. P. Böhme, Berlin O 17, Rüdersdorfer Str. 69; Kassierer: Erich Merz, Bln.-Friedenau, Wilh.-Hauff-Str. 14. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt". Schriftwechsel grundsätzlicher Art ist an den 1. Vors., im übrigen an die Geschäftsstelle (2. Vors.) zu richten. Geldsendungen: Postscheckkonto Berlin NW 7 Nr. 46155 für Erich Merz. — Aufgenommen Herr K. Neunzig, Schriftleiter der „Gef. Welt", Berlin-Hermsdorf. Ausgeschieden Herr G. G. Kunthal, Berlin-Wilmersdorf, und Herr Fr. Nyncke, Berlin. — Vorstandssitzung vom 12. Oktober 1925. Der Vorsitzende, Herr Gumprich, eröffnet die Sitzung um 8^{15} Uhr mit der Begrüßung der erschienenen Vorstandsmitglieder. Zunächst kamen die letzten beiden Protokolle zur Verlesung und Annahme. Eine Anzahl eingegangener Schreiben kam zur Verlesung und Besprechung. Hervorzuheben ist besonders ein Fall aus Mauselbach über Unstimmigkeiten im Postversand lebender Vögel. Ferner ein Schreiben des Reichsverbandes in Sachen „Tauschvermittlung". Der Reichsverband hat den Wunsch, die Jahresversammlung des Preußenverbandes mit der Jahresversammlung des Reichsverbandes gemeinsam in Leipzig stattfinden zu lassen. So sympathisch die Sache anmutet, läßt sie sich leider nicht verwirklichen. In Kürze werden die Mitgliederverzeichnisse des Preußenverbandes fertiggestellt sein. Der Vorstand hat die Absicht, je ein Exemplar direkt den einzelnen Mitgliedern zugehen zu lassen. Ein neuer Statutenentwurf ist vom Vorsitzenden entworfen; derselbe wurde einer eingehenden Besprechung unterworfen. Diese geänderten Statuten werden in der Jahresversammlung zur Annahme empfohlen werden. Mit großem Bedauern wurde festgestellt, daß die eingesandten Mitgliederlisten der Ortsgruppen nicht lückenlos sind, ein Verein überhaupt kein Verzeichnis eingesandt hat. Die Verantwortung dafür trifft den betreffenden Vorstand oder Schriftführer. Das Mitgliederverzeichnis wird alle zwei Jahre neu herausgegeben. Alle Änderungen über Zu- und Abgang im Mitgliederbestand der Ortsgruppen wolle man gefl. dem Schriftführer des Verbandes, Herrn P. Böhme, Berlin, Rüdersdorfer Str. 69, mitteilen. Der Vorstand hat weiter die Absicht, im Interesse der Wissenschaft zu arbeiten. Gegenstand soll sein Vogelberingung, Vorkommen der Vogelarten in den einzelnen Provinzen usw. Der Vorsitzende schließt die Sitzung um $11^1/_2$ Uhr. Nächste Sitzung Montag, den 9. November 1925, im „Königgrätzer Garten", Königgrätzer Str. 111. P. Böhme.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Sitz Leipzig. 1. Vors. Hermann Höhne, Leipzig-Volkmarsdorf, Eisenbahnstraße 84 IV. 1. Schriftf. Max Hunger, Leipzig-Gohlis, Polizeigebäude Zimmer 196. Kassierer Ludwig Böttcher, Leipzig, Inselstr. 17 II. Girokasse Leipzig, Nr. 6317. — Die angeschlossenen Vereine wollen bei Einzahlungen die im Kopf des Landesverbandes angeführte Postscheck-nummer der Giro-Kasse mit angeben, damit eventuell Rückgänge von eingezahlten Beiträgen vermieden werden. Hunger, Schriftf.

Aus den Vereinen.

Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Postscheckk. Hannover 56714; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10. Zusätzlich zu der Bekanntmachung in Heft 41 wird mitgeteilt, daß denjenigen Mitgliedern, die den rückständigen Beitrag bezahlen resp. die Postnachnahme einlösen, nach Eingang des Betrages das Jahrbuch zugestellt wird, falls dies noch nicht geschehen sein sollte. — In Ausführung des letzten Versammlungsbeschlusses wird die Jahresversammlung in München stattfinden. Der Vorstand rechnet hierbei auf volle Unterstützung der Münchener Mitglieder und wird das Ergebnis der Verhandlungen rechtzeitig bekanntgeben. — Die Mitglieder, die an unserm diesjährigen Jahrbuch mitarbeiten wollen, werden höflichst um sofortige Anmeldung der Beiträge gebeten. Die Konzepte müßten bis zum 1. Dezember eingereicht werden. Erwünscht sind auch reproduktionsfähige Aufnahmen von Volieren, seltenen Vogelarten, Nestanlagen usw. J. A.: A. Krabbe.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögeln in Alperbeck. Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, in der Wirtschaft Sprave, früher Fritz Lecking, Kirchstraße. Fritz Lecking, 1. Vors.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37a. Gäste stets willkommen.

J. A.: P. Böhme, Schriftf., O 17, Rüdersdorfer Str. 69.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke, Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde und Geflügelzucht Breslau. Vogelliebhaber Breslaus, wollt ihr euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei nicht endlich auch zusammenschließen, wie es in anderen Städten schon längst geschehen ist? Ein Stamm von erfahrenen Vogelpflegern ist vorhanden, jedoch können Fortschritte nur erzielt werden, wenn alle noch abseits Stehenden sich uns anschließen und unsere mit belehrenden Vorträgen verbundenen Vereinsabende besuchen. Auskunft ert. bereitwilligst P. Spitzner, 1. Schriftf., Ofener Str. 26.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Dessau und Umgegend. Gegr. März 1925. Vereinslokal „Fürst Blücher", Ecke Antoinetten-Leopoldstr. Versammlung jeden 2. Mittwoch, abends 8 Uhr. J. A.: Dielitzsch, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Restaurant „Zum Löwentor", Königswall 75.

J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammlung Freitags, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Blasewitzer Hof". Liebhaber willk. J. A.: Matth. Meys, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Elisenhof", Elisenstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Mittelthüringens Sitz Erfurt. Sitzung jeden 2. Mittwoch und jeden letzt. Sonnabend im Monat im Vereinsl. „Stadt Chemnitz", Thomasstr. 57. Näh. Auskunft erteilt Franz Heinrich, 1. Schriftf.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Vereinigung einheimischer Waldvogelliebhaber zu Görlitz und Umgegend. Zusammenkunft jeden 3. Sonnabend im Monat im Restaurant „Zum Bismarckgarten", Bismarckstraße. 1. Vors. W. Lücker in Görlitz, Konsulstr. 7. Vogelliebhaber als Gäste willk. J. A.: Erich Rothe, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 3. November. A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Der Hannoversche Vogelschutzverein zu Hannover, gegr. 1881, wirkt mit sichtbarem und anerkanntem Erfolge für Vermehrung und Schutz der Vogelwelt bei Hannover durch Aufhängen von jährlich einigen hundert Nistkästen aller Art, durch Erweckung von Interesse und Liebe für die Vogelwelt mit monatlich, zur Gesangszeit wöchentlich stattfindenden Belehrungsspaziergängen und durch Vorträge und Austausch der Beobachtungen in den jeden dritten Dienstag des Monats stattfindenden Vereinsversammlungen. Seine Bestrebungen dienen also lediglich gemeinnützigen Zwecken. Mitgliederzahl rund 1200, jährlicher Beitrag nur 1 M. Meldungen an den Vorsitzenden Herrn Fritz Becker, Hannover, Boedekerstr. 1 F. Becker.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um 8 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste willk. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Versammlung aller 14 Tage Sonnabends. Vereinslokal: Gasthaus „Zur Krone", Jena, Grietgasse. Gäste stets willkommen. Jena besuchende Vogelliebhaber treffen jeden Sonntag vorm. den Schriftführer Adolf Voigt, Jena-Ost, Feodorastraße 13, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube freundlichst eingeladen. Adolf Voigt, Schriftf.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an!

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal bei Gastwirt Lapschies, Kaiserstr. 46a. Gäste sind willkommen. Ernst Reinboldt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 5. Nov. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Laßner im Volkshaus-Nord, Glogauer Str. 20. Liebhaber willk. J. A.: Friedrich.

Verein der Vogelfreunde Linden. 1. Vors. P. Winkel, Linden, Fröbelstr. 9.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wst., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Sitzung aller 14 Tage im Restaurant „Zum Neckarstrand", Messeplatz 1. Liebhaber willkommen. Joh. Daubmann, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung Dienstags nach dem 1. und 15. im Monat, abends 8 Uhr, beim Mitglied Louis Meinel im „Grünen Tal", an den Bergkellern. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Paul Schmidt, 1. Vors., Bosenstr. 44.

Anzeigenteil

...iergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per ...ob. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

...fige u. Gerätschaften

...gel-Mistelleim
...r Fangen schädlicher Vögel,
...end bei jeder Witterung, garan... brauchsfähig, Dose 2.— M. fr. von ...ttag Nchf., Frankenberg i. S. 6. ...verkäufer hohen Rabatt. [1441

...ringe-f. Wellensittiche
...cht in Qualität, Spezialerzeugnis, Wellensittiche in allen Farben, ...laue u. blaublütige, sowie weiße ...hieferblaue Kanarien empfiehlt C. Balser, Fulda. [1442

Futtermittel

Ameiseneier
...rzigem Geruch à Pfd. 4.— M, ...bei 10 Pfund 35.— franko
...bweißwurm Pfd. 4.50 M
...würmer gegen Einsendung von ...2.— M ¼ Pfund franko.
D. Busse, Magdeburg, Gr. Mühlenstraße 1. [1443

„ORNIS" Freie Bezugsvereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands.
Gegründet 1912 ∴ Fernsprecher 4198 [1444
Fachgemäße Belieferung mit Vogelfutter („Reform-Normal", individuelle Zusammensetzung bei restlosem Verbrauch; stets frisch gemischt). Hunderte von Liebhabern füttern seit über einem Jahrzehnt mit bestem Erfolg nur „Reform-Normal".
Reform-Normal-Käfige Mod. ORNIS 1925, neue Preisliste erschienen. — Modern eingerichtete Käfig-Bauanstalt mit elektrischem Betrieb.
Anschrift: Ornis-Haus, Halle-Saale. Der Geschäftsführer: Martin Sperling.

Bei Anfragen und Bestellungen bitten wir, sich auf die „Gef. Welt" zu berufen



„Naturell"
das seit Jahrzehnten in Liebhaberkreisen eingeführte und bestens anerkannte Futter für edle Weichfresser ist wieder in bester Friedensbeschaffenheit lieferbar! **„Naturell" ist Qualitätsware,** auf Grund langjähriger Erfahrungen zusammengestellt und durch Autoritäten bestens beurteilt. [1445
Preis: kg 6.— M. Probesendungen gegen Einsendung von 1.— M. in Briefmarken. Drosselfutter kg 2.— M.
Empfehle außerdem bestes Körnerfutter für Einheimische und Exoten, ferner Ia Ameisenpuppen, Weißwurm usw.
Nur direkt zu beziehen von
Wilhelm Dietze, Leipzig, Kurprinzstr. Nr. 15.

Mehlwürmer
1 Pfd. 5 M ab hier, geg. Voreinsendung ¼ Pfd. 2 M franko.
Großabnehmer Rabatt.
Ia Ameiseneier
1925er, Pfund 4.50 M.
Ia Weißwurm, 1925er, Pfund 4.50 M.
Ia Muska-Zecken Pfund 1.50 M.
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen Pfd. 0.75 M.
Die Preise sind freibleibend, ab Lager, ohne Porto und Verpackung. Bei Anfrage Rückporto beifügen. [1446
Bei größerer Abnahme hoher Rabatt.
Karl Claus, Mutterstadt II (Hauptbahnhof).

Grosser Posten Ia Rübsen!
Solange Vorrat reicht Ztr. 35 M.
Andere Sämereien zu billigsten Tagespreisen.
Vereinen ist jetzt Gelegenheit geboten, sich mit prima Ware einzudecken bei günstiger Zahlungsbedingung.
Lorenz, Dresden, Drehgasse 5. [1447

Mehlwürmer

à Pfund 5.60 ℳ, ¼ Pfund 2.— ℳ
franko gegen Voreinsendung

Ia Ameiseneier	Pfd. 4.— ℳ
Ia Muska	Pfd. 1.50 ℳ
Ia Weißwurm	Pfd. 4.50 ℳ
Seidenraupenschrot	Pfd. 0.75 ℳ
Garnelen gem.	Pfd. 0.35 ℳ

Alles diesj. Ware, à Pfund ab hier.
Th. Witte, Niederndodeleben
b. Magdeburg. [1448

Mehlwürmer

ℳ 5.— das Pfd., ausschießl. Porto u. Verp.; bei Abnahme von 6 Pfd. Porto u. Verpackung frei.

Ia Ameiseneier

1925er, 4.50 ℳ per Pfd.

Ia Weißwurm, 1925er	4.50 d. Pfd.
Ia Muska-Zecken	1.50 d. Pfd.
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen	0.75 d. Pfd.
Ia Garnelen, gemahl.	0.35 d. Pfd.

tf. Universalfutter

Alleckwa I für Nachtigallen ℳ 2.—
" II für Grasmücken ℳ 2.—
" III für Drosseln . . ℳ 1.50
das Pfund ab hier, ausschl. Verp.; bei größeren Mengen billiger. [1449

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
A. Eckrich II, Waldsee (Pfalz).

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark ½ Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.**, Biesenthal I (Mark). [1450

Offeriere Vogelfutter in prima Qualität:

Betr. Ameiseneier . . à Pfd. 3.80 M.	
10 Pfd. 36.— M. franko	
Weißwurm . . . . . Pfd. 4.— M.	
Con. Eigelb . . . . . Pfd. 2.— M.	
Karottengrieß . . . . Pfd. 0.70 M.	
Drosselfutter . . . . Pfd. 0.80 M.	
Lucullus extra Mischung ½-Pfd.-Paket 0.95 M., weiße Packung 0.80 M.	
Senegalhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko	
Silberhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko	
Algierhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko	
Kerbtiernahrung f. Kanarien Pfd. 1.30 M.	

Versand per Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. [1451

Paul Tzornack,
Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189.
(Postscheck-Konto Nr. 652 65)
Gegründet 1905.

Vogelfutter [1452

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Züchterurteil

Bitte senden Ste mir sofort nach Erhalt des Briefes (also postwendend) 2 Postpakete Vogelfutter. Da ich mit der letzten Futtersendung sehr zufrieden war in bezug auf Qualität und Beschaffenheit, als wie staubfrei, frei von Unkrautsämereien und vor allen Dingen frisch, kein verlegenes und dumpfiges Futter, auch meine Vögel jedes Körnchen fressen, ein Beweis von der Güte Ihres Futters, so habe ich Sie auch bei meinen Vereinskollegen bestens empfohlen. [1453

Kamenz i. Sa., d. 15. Oktober 1925.
Camillo Lehmann,
Kanarien- und Exotenzüchter.

Lorenz, Dresden,
Drehgasse 5.
Das Original obiger Zuschrift hat uns vorgelegen.
Die Schriftleitung der „Kanaria".

Unübertroffen ist

Heidelberger Vogelfutter,

hergestellt nach Vorschrift
und unter Kontrolle von
Professor Dr. Otto Fehringer
durch
GENO-WERK ~ Mannheim
Rheinkaistraße 8 b.

Anfragen über die Pflege einheimischer Vögel werden gerne beantwortet. Rückporto beilegen. [1454

In der Zeit vom

2. Oktober bis 28. Februar

ist der An- und Verkauf wie das Feilbieten von **in Europa einheimischen Vögeln — mit Ausnahme der Meisen, Kleiber, Baumläufer und Spechte** — zulässig, es können daher in dieser Zeit derartige Inserate in der „Gefiederten Welt" zum Abdruck gelangen! Der Insertionspreis für die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum beträgt 0.20 Gm. Aufträge erbeten an

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg
Postschließfach 148

Ein Versuch

überzeugt jeden von der Güte meines **Universalfutters.** Preis 2 M. p. Pfd. Sämtliche Futtersorten für Exoten, Wald- und Kanarienvögel zu billigsten Tagespreisen. Versand geg. Nachnahme. Verpackung und Porto werden billigst berechnet. [1455

P. H. Kirsten, Leipzig 3,
Zeitzer Str. 53. Fernruf 31445.

Deutsche selbstgetrockn. Ameiseneier, ff. Qualit., Pfd. 5 ℳ. Verpack. 20 Pfg. Bei Eins. v. 5.30 ℳ 1 Pfd. franko. **A. Reith, Wiesbaden,** Helenenstraße 24. [1456

Vögel

Kalif. Schopfwachteln
Zuchtpaar 50.— ℳ, einzelne Hähne 20.— ℳ. [1457
Walter Hoesch, Neukirchen Altm.

Prima Edelroller

mit tiefen Hohltouren. Große Auswahl, mäßige Preise. 2 Staatsmedaillen. Kanarienfeinzucht seit 1876. [1458

P. Holzky, Cöthen i. A.

Stieglitzmännchen

2—3 ℳ,
rote Dompfaffen à 6 ℳ,
Girlitze 3 ℳ,
Rothänfling 2.50 ℳ.
Verpackung 1 ℳ, per Nachnahme Porto 1.30 ℳ (dringend 5.40 ℳ).
A. Reith, Wiesbaden,
Helenenstraße 24. [1459

Verkaufe laufend junge Wellensittiche, grün und gelb, i. Freiflug gezüchtet, I a befiedert und kerngesund, à 4 ℳ. [1460
Saller, Planegg, Hofmarkstraße 8.

Offeriere in tadellosen Exemplaren:

Schamadrosseln	Weibch. 50.—	Blaustirnamazonen, sprech.	60—80.—
"	Männch. 60.—	Braunohrsittiche	Stück 15.—
Rotbauchdrosseln	" 12.—	Feuerflügelsittiche	" 15.—
Ringdrosseln	" 12.—	Tovisittiche	" 8.—
Schwarzdrosseln	" 10.—	Wellensittiche	Zuchtpaar 15.—
Singdrosseln	" 8—20.—	Bergpapageien	" 20.—
Pirol, goldgelb	" 20.—	Paradieswida in Pracht	Paar 8.—
Seidenschwanz	" 10.—	Dominikanerwida i. Pracht	" 8.—
Drosselrohrsänger	" 10.—	Tigerfinken in Pracht	" 8.—
Nachtigallen	" 20.—	Orangeweber in Pracht	" 6.—
Schwarzplättchen	" 10—15.—	Blutschnabelweber in Pracht	" 4.—
Gartengrasmücken	" 8.—	Silberfasänchen	" 4.50
Dorngrasmücken	" 6.—	Elsterchen	" 4.—
Müllergrasmücken	" 5.—	Amaranten	" 4.—
Gartenrotschwänze	" 4.—	Astrilde	" 3.50
Rotkehlchen	" 3—5.—	Atlasfinken	" 5.—
Gebirgsbachstelze	" 10.—	Bandfinken	" 4.50
Feldlerche, prima	" 10.—	Papstfinken	Stück 18.—
Kernbeißer	" 5.—	Lazulifinken	" 20.—
Kreuzschnäbel	" 5.—	Safranfinken	" 8.—
Alpenstieglitze	" 5—6.—	Grauedelsänger	" 3.—
Gartenstieglitze	" 3—4.—	Pfäffchen	" 6.—
Rothänflinge	" 4—5.—	Kaptäubchen	" 3.—
Girlitze	" 3.—	Zaunkönige	" 6.—
Erlenzeisige	" 3.—	Goldhähnchen	" 6.—
Buch-, Berg- u. Grünf.	" à 2.—	Rotr. Würger	" 8.—
Goldammern	" 3.—		

Verpackung, Porto 3.50 Mark, Dringend 3 Mark mehr.

W. Hiltmann, Berlin S 14, Dresdener Straße 24.
Postscheckkonto: Berlin 849 68. [1461

Offeriere freibleibe

Lauchgrüne Papageiamadinen	Paar	60.
Spitzschwanzamadinen, garantiert eingewöhntes Zuchtpaar	"	60.
Blaustirnamazonen, sehr gelehrig	Stück	50.
Kleine weiße Gelbhaubenkakadus	"	35.
Tarantin. rotköpfige Bergpapageien	Paar	16.
Feuerflügelsittiche, fingerzahm	Stück	16.
Tovisittiche	Paar	16.
Grüne Wellensittiche	"	12.
Schamaweibchen	Stück	50.
Tyran, schwefelgelbe	"	28.
Weißkehldrosseln	"	10.
Katzendrosseln	"	12.
Blauraben	"	30.
Kronentangaren	Paar	10.
Safranfinken, ausgefärbt	"	8.
Morgenammerfinken	"	6.
Jacarinifinken	"	25.
Riesenpfäffchen	"	12.
Pfalzschnäbel	"	12.
Japan. Möwchen	"	18.
Brasilian. Rosttäubchen	"	7.
Kanarienhähne, flott singend	Stück	12.
Kanarienweibchen	"	1.
Stieglitzhähne	"	3.
Bluthänflinghähne	"	3.
Buchfinken	"	2.
Zeisighähne	"	3.
Schwarzplatten, Frühjahrsfänge	"	10.
Schwarzplatten, Herbstfänge	"	6.
Gartengrasmücken	"	8.
Dorngrasmücken	"	3.
Rotkehlchen	"	3.
Gartenrotschwänze	"	4.
Hundspaviane, sitzend, 40 cm, zahm	"	140.
Schwarze Kapuziner, zahm	"	65.
Nonnenkapuziner, zahm	"	65.
Schwarze Makaken, handzahm	"	80.
Rhesusaffen, kleine u. größere	"	45.

Sämtliche Sorten **Futter** für **und Körnerfresser** zu dem bi Tagespreis.

1462] **Tierhandlung**
Max Kleine
Berlin O 17
Strausberger Straße 13.
Fernruf Alexander 3313.

Stieglitze,

Zeisige, Hänflinge, Girlitze
Liste nur gegen Freimarke.
J. Beck, Stuttga
Tierimport.

80 Stück

grüne Wellensitti

in Freivoliere gezüchtet und bluts besonders kräftig — **unausgef pro Stück 5.00 M., ausgef pro Stück 6.00 M.**
Porto u. Verpackung Selbstkoste
Rich. Huth, Perleb

Abzugeben: 1,0 Laz 20 ℳ, 1,0 A **finkt** 12.50 ℳ, 1,1 **Orangeb** 30 ℳ. Off. unter „Ornis" an d schäftsstelle der Gefiederten Welt.

Schönfelders Kanar feinzucht, Dresden-Trachau

gold. Med. präm., Urstamm Seifert empfiehlt tiefe Hohlroller, Kn Schockel, schöne tiefe Flöten, Zuch und ff. Tag- und Lichtfänger à 18 M., 3 Stück zus. 40 M., erst Vorsänger und Ausstellungshähne 25, 30 M., 3 Stück zus. 60 M., Zuchtweibchen à 4 M. Versuch Hunderte von Dankschreiben.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 14
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 5. November 1925 | Heft 45

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Über Zusammenhalten und Verträglichkeit der Vögel.

Von Eduard Spille.

(Nachdruck verboten.)

In Nr. 39 und 40 der „Gef. Welt" spricht sich Herr A. Krabbe über die Zusammenhaltung und Verträglichkeit der verschiedenen Vögel aus. Über meine Erfahrungen auf diesem Gebiete möchte ich einiges mitteilen.

Ich habe etwa 20 Jahre in meinem Hause in der engeren Stadt eine Vogelstube unter dem Dach gehalten, in welcher alle Arten Prachtfinken, kleine Weber mit Wellensittichen, Unzertrennlichen (ausgenommen Rosenköpfe), Plattschweifen und Sperlingspapageien, verschiedenen Arten Täubchen und Graukardinälen zusammen im bunten Durcheinander hausten und auch vielfach erfolgreich brüteten. Ich hatte auf einer Fläche von etwa 36 qm etwa 80—100 Köpfe. Es waren nur Körnerfresser beieinander; irgendwelche Streitigkeiten von Bedeutung habe ich nie beobachtet, bis ich eines Tages mehrere Tangaren erhielt, welche nur Weichfutter nahmen. Von dem Augenblick an war der Friede gestört. Die Körnerfresser taten sich am Weichfutter gütlich, was ihnen aber von den Tangaren sehr übel genommen wurde. Mord und Totschlag herrschten, so daß ich gezwungen war, die Tangaren wieder abzuschaffen, so leid es mir um die prächtigen Tiere war. Auch die Versuche, andere Wurmfresser, wie Mainastare, Brillen- und Panther-Vögel, einzusetzen, schlugen fehl, und so bin ich denn bei den Körnerfressern geblieben.

Im Jahre 1912 zog ich in die Vorstadt und kam dabei zu einem Garten. Damit war mein Wunsch, die Vögel im Freien zu halten, erfüllt. Bei meinen öfteren Besuchen bei Hagenbeck in Stellingen hatte ich stets fleißig Umschau gehalten, wie ich wohl die Anlagen am besten herstellen könnte. So baute ich drei Volieren. In der ersten hielten sich alle möglichen Arten Prachtfinken, kleine Weber und Täubchen mit Wachteln auf. Mehrere Arten Wida waren unverträglich, sowohl mit den anderen Vögeln, wie auch mit ihren Artgenossen; nur die Paradieswida war friedlich. Die Täubchen zankten sich wohl gelegentlich, doch hatten die Streitigkeiten keine Bedeutung. Selbst in der Voliere II, welche mit Papageien besetzt war, ging es friedlich zu. Ich habe lange Jahre alle Arten Plattschweife, die ich bezahlen konnte, gehalten, wie Rosella, Pennants, Buntsittiche, Königs-, Sing- und Schönsittiche mit Gebirgslori, Wellensittichen, Grauköpfchen, Orangegesichtchen, Sperlingspapageien und Nymphen. Ein kleiner Streit um die Nistkästen kam wohl mal vor, hatte aber nie irgendwelche bösen Folgen, es kostete wohl nur einige Federn. Fast alle Vögel haben vielfach genistet, obgleich ein Nistkasten neben dem andern hing.

Die Papageien hätte ich auch unbedenklich mit den Bewohnern der Voliere I zusammengehalten, ohne Mißhelligkeiten zu befürchten, nur wären die Bäumchen und sonstige Anpflanzungen den Schnäbeln der Papageien in wenigen Stunden zum Opfer gefallen. Gerade bei Finken und Täubchen kann man die Voliere mit Pflanzen so hübsch ausstatten, in denen sich die Vögel so gern aufhalten.

Meine dritte Voliere enthielt Zwerghühner, Fasanen, Fächertauben, Schopftauben zusammen mit den größeren Turteltäubchen und Graukardinälen. Auch hier herrscht eitel Friede. Anfänglich hatte ich in diesem Raum auch verschiedene hiesige Finken untergebracht, welche aber stets im heftigsten Streit miteinander lagen, weswegen ich sie wieder fliegen ließ.

Das Zusammenhalten hiesiger Finken mit Exoten will mir nicht recht gefallen. Die kleinen, zierlichen Prachtfinken passen doch eigentlich nicht recht zu den größeren und plumpen Buchfinken u. dgl.

In früheren Jahren hielt ich alle Exoten warm, bis ich bei Hagenbeck sah, daß die Kinder der Tropen auch Kälte vertragen können. Ich erzählte dies einem Verwandten, der Australien kennt. Er wunderte sich nicht darüber und teilte mir mit, daß dort Nächte mit Eis und Schnee nicht so selten wären. Darauf wagte ich es, meine Vögel unterm Schieferdach ohne jede Heizung zu halten, und ich kann wohl sagen, ohne jeden Schaden für die Tiere. Sie waren so munter wie zu jeder anderen Jahreszeit. Allerdings möchte ich nicht raten, Vögel, welche im Herbst angeschafft sind, selbst bei gutem Wetter ins Freie zu setzen, was sie wohl kaum vertragen können. Doch im späten Frühjahr, wo es schon warmen Sonnenschein gibt, darf wohl jeder Vogel aus fremdem Land in die Freivoliere gesetzt werden, wenn mit dem freien Raum ein Schutzraum verbunden ist, welcher mit reichlich viel Nestern ausgestattet, den Vögeln des Nachts

Schutz gewährt. Wird in diesem Innenraum auch das Futter gereicht, so suchen die Tiere bei sehr schlechtem Wetter ihn ganz von selbst auf.

Ebensowenig wie hiesige Vögel mit Exoten zusammen gehören, lassen sich Körnerfresser mit Wurm- oder Fruchtfressern vereinigen. Die Prachtfinken und Täubchen würden nur an das Weichfutter gehen, und die Vögel, für die es bestimmt ist, hätten das Nachsehen. Das Weichfutter ist, wenn es reichlich gegeben wird, für Prachtfinken, wenn auch gerade nicht schädlich, nur angebracht während der Brutzeit. Ich habe früher viel Weichfutter gegeben, aber kaum einmal Bruterfolge erzielt. Seitdem ich nur Körner füttere und zur Nistzeit Muska und trockene Ameisenei biete, habe ich sehr viel Erfolg gehabt.

Besonders meine Papageien werden recht kurz gehalten. Hirse, Glanz, Hafer und etwas Sonnenblumenkerne, nebst viel Vogelmiere, ist ihre einzige Nahrung. Gibt man Weichfutter, werden die Tiere so üppig, daß sie nicht nisten oder nur unbefruchtete Eier legen. Bei meiner Futterweise habe ich schon mehrere tausend kleine Papageien aller Art im Laufe von 40 Jahren gezogen. Ich habe überhaupt festgestellt, daß alle Vögel sich bei einfachem Futter, welches natürlich in nur bester Beschaffenheit geboten werden soll, gesund auf viele Jahre hinaus erhalten lassen. Gibt man ihnen hin und wieder ein Stückchen Biskuit, so wird es natürlich mit lebhaftem Dank angenommen. Alle kleinen Papageien kann man auch mit einem Stück gekochter Möhre sehr erfreuen, selbst halbgare Kohlrabi und Steckrüben werden gern genommen.

Das Liebhaberjahr.

Plauderei von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Nun so wollen wir das Liebhaberjahr im Geiste an uns vorüberziehen lassen, was uns jeder Monat bringt an Freuden und Leiden, was uns bewegt, wonach wir trachten und streben müssen es kennen zu lernen, wenn wir ein würdiges Glied der Gilde der Vogelliebhaber sein wollen. Denn ein wirklich wahrer Vogelliebhaber sein sei die Losung für jeden, der die Natur um ein Geschöpf beraubt, das Anrecht hat auf Freiheit und Leben, und nicht auf Gefangenschaft, Siechtum und Tod. Sterben und vergehen muß alles, was die Natur hervorgebracht hat, und in Erfüllung dieses Naturgesetzes können wir den Tod nicht fernhalten von den uns anvertrauten Lieblingen, aber wir müssen unsere in unserer Macht liegende Pflicht und Schuldigkeit tun, um ihnen den Verlust der Freiheit mit fürsorgender Pflege zu entgelten, um ihnen so lange wie möglich in dem als Wohnung zugewiesenen Käfig ein sorgenloses Asyl zu schaffen. Seine Freude muß man an der Liebhaberei haben, ganz gleich zu welcher Jahreszeit. Ist jetzt auch die Gesangsperiode, sicherlich die schönste Zeit, und mit ihr in Ermangelung frischer Ameisenpuppen auch die bequemste Zeit vorbei, so harrt unser wohl eine Zeit harter Prüfung, denn die Überwinterung unserer zarten Insektenfresser bringt uns sorgenvolle Tage, aber wollen wir einmal aufrichtig sein, was die Gesangsperiode uns an Genüssen als Lohn für sorgsame Pflege bringt, das bringt uns die Überwinterung Interessantes in der Erprobung bewährter Pflegekunst. Was ist dem Liebhaber wertvoller, was bringt ihm mehr freudigen Stolz, sein im Gesang befindlicher Sprosser-, Nachtigallen- oder Gelbspötterfrischfang, oder seine überwinterten Vögel gleicher Art, die lebensfroh im freudigen Gesange kundtun, daß es ihr Pfleger mit seinen Kenntnissen verstanden hat, sie durch die Tage kritischer Mauser- und Winterszeit zu bringen? Die Antwort wird wohl eine einstimmige sein, denn aller Ehrgeiz in der Liebhaberei konzentriert sich auf eine sachgemäße und recht oftmalige Überwinterung der gefiederten Stubengenossen. Nur nach den Erfolgen auf diesem Gebiet der Vogelliebhaberei schätzt man den mit Kenntnissen ausgestatteten Vogelpfleger ein, und nicht nach der großen Anzahl der mit Frischfängen besetzten Käfige. Mit Geld kann man sich alles erkaufen, nur nicht Gesundheit und Leben, so ist es auch in der Vogelpflege. Ersatz für die Bewohner durch eigene Schuld leer gewordener Käfige bringt stets ein voller Geldbeutel, niemals aber die ruhmvolle Ehre des Pflegers langjährig erhaltener Pfleglinge. Wenn ich einen Liebhaber besuche, interessiert es mich stets außerordentlich zu wissen, wieviel Frischfänge, wieviel ein- oder mehrjährige überwinterte Vögel seine Käfige zieren. Nicht nach dem äußeren Schein soll man den Pfleger einschätzen, sondern nach seinen Taten, und solche sind es, wenn ich bei einem Liebhaber viele Jahre gekäfigte Vögel antreffe, sie sagen mir mehr als viele Worte des Liebhabers.

Die Gesangsperiode haben wir im Monat August hinter uns, selbst die im Gesang am längsten ausdauerndsten Weichfresser sind verstummt und mausern. Die Körnerfresser singen zum Teil noch fleißig, wenn auch ihre Mauser teilweise bereits im Gange ist. Einzelne Vögel, die bereits gemausert haben, singen wieder leise. Solange noch frische Ameisenpuppen zur Verfügung stehen ist dies zur Beendigung der Mauser sehr zweckdienlich, darum versorge man in der Mauser befindliche Weichfresser solange als möglich mit frischen Puppen, damit sie glatt vermausern. Abgemauserte gewöhne man nach und nach ans Mischfutter, denn die frischen Puppen werden knapp, für den, der sie blank damit gefüttert hat.

Frischfänge brauchen vor allen Dingen eine Blankfütterung; am dienlichsten nach Einstellung des Gesanges, um die Mauser zu beschleunigen. Man warte mit der Einfütterung ans Mischfutter ja nicht zu lange, damit nicht ein Ausbleiben der frischen Puppen zu einem plötzlichen, schnellen Übergang zwingt, denn die Übergewöhnung verlangt mindestens eine Frist von einer Woche, sollen dem Vogel durch den Futterwechsel keine Beschwerden entstehen. Schweren Herzens sieht der Liebhaber sein kostbarstes Gut in der Vogelpflege, die frischen Ameisenpuppen, zur Neige gehen; für beerenfressende Vögel, alle Grasmücken- und Drosselarten haben wir ja bereits im roten Traubenholunder ein gutes Naturfutter, die Beeren werden von ihnen sehr gerne genommen, selbe sind auch sehr förderlich für die Mauser. Rotkehlchen machen sich, trotzdem sie auch Beeren fressen, nicht viel aus ihnen, auch andere Arten, wie Sprosser, Nachtigall, Gelbspötter, Blaukehlchen, Gartenrot-

schwanz usw. naschen gerne an den Beeren, selbstverständlich müssen sie selbe erst kennenlernen. Manche Vögel dieser Arten nahmen überhaupt keine Notiz von den Beeren. Im August ist auch die günstigste Zeit für den Liebhaber, sich vom roten Traubenholunder einen genügenden Wintervorrat einzutragen, denn getrocknete Beeren sind ein gutes Naturfutter für die Überwinterung, nicht nur weil sie billiger zu beschaffen sind, sondern auch weil sie sehr anregend auf die Verdauung wirken und obendrein noch nahrhaft sind. Rote Holunderbeeren, die, wie bekannt, sehr wasserhaltig sind, trocknet man am besten, indem man die Trauben an einer Schnur aufhängt, damit von allen Seiten Luft dazu kann, breit gelegt, schimmeln sie meistens an der Stelle, wo sie aufliegen. Bei der Fütterung mit frischen Beeren, gleich ob schwarze oder rote Holunderbeeren, lasse man das Hauptfutter niemals fehlen, denn nur ausschließlich mit Beeren gefütterte Vögel, speziell bereits überwinterte, vertragen sie, ohne Schaden für ihre Gesundheit zu nehmen, nicht auch Frischfänge gut ist es, wenn man die Vogelstube die ganze Nacht beleuchten könnte, damit die Vögel sich auf den Sitzstangen hin und her bewegen können. Ein Radikalmittel gibt es nicht, die Folgen des Zugtriebes gänzlich zu verhindern, ja ich halte die vollständige Auswirkung des Wandertriebes beim Käfigvogel sogar für die Gesundheit des Vogels für notwendig. Gerade Frischfänge werden dies unbedingt nötig haben, bei öfters überwinterten Vögeln schwächt sich der Wandertrieb ja nach und nach etwas ab, selbst jung aufgezogene Vögel werden vom Wandertrieb befallen.

Im September müssen, da nun frische Ameisenpuppen gänzlich fehlen, alle Vögel an ein gutes Winterfutter gewöhnt sein. Mehlwürmer reicht man nur als abwechselnden Leckerbissen, speziell bei Sprosser und Nachtigall, um sie nicht vorzeitig zu treiben. Verschiedene Vögel, wie überwinterte Schwarzplättchen, lassen sich wieder im leisen Gesang hören, Rotkehlchen sowie Blaukehlchen singen verschiedentlich bereits wieder laut, beide sind echte Herbstsänger, ebenso

Bergmeise (s. S. 536).

können bei zu reichlichem Beerengenuß abmagern. Der Monat August bringt uns von vielen Arten vor ihrem Wegzuge noch Frischfänge, und gar mancher Liebhaber nimmt die Zeit noch wahr, um die leeren Käfige verschwinden zu lassen. Herbstfänge sind ja bei dem extremen Gesangsliebhaber nicht so beliebt, weil da unabgehört Sänger und junge Vögel mit in die Käfige wandern. Eine der gefürchtetsten Erscheinungen in der Liebhaberei, die Zugzeit, macht sich im August bereits stark bemerkbar, die Vögel ziehen bereits des Nachts im Käfig stark, und das Frage- und Antwortspiel, werden sie alle im Gefieder einwandfrei die Zugzeit überstehen, veranlaßt den Liebhaber an jedem Morgen den ersten Blick auf die Gefiederbeschaffenheit zu werfen. Es gibt wirklich kein Mittel, die Käfigvögel vor den eventuellen Folgen der Zugzeit zu schützen. Eigentümlich ist, daß selbst arge Tober im Gefieder einwandfrei bleiben, wiederum aber auch der sonst ruhigste Vogel in einer Nacht das Gefieder total zerstößt. Für zweckdienlich halte ich, die Vögel durch Verdunkeln der Käfige oder des Zimmers vor jeglichem Lichtschein zu bewahren, ferner lasse man die Vögel ja sich genügend sättigen vor Dunkelwerden, dann sind sie etwas ruhiger. Sehr Lichtfänger. Wer einen fleißigen Lichtfänger haben will, muß sich jetzt ein junges Rotkehlchen einstecken, sie sind lange nicht so eigensinnig wie die alten Rotkehlchen. In diesem Monat nimmt die Winterfütterung ihren Anfang, man achte daher gleich von vornherein darauf, welche Maßnahmen der Körperzustand eines jeden Vogels erfordert, Gelbspötter, Sumpfrohrsänger, auch Nachtigallen und Sprosser dürfen keinesfalls mager sein. Ist dies der Fall, so helfe man mit Weißwurm, Quark, Hühnerei, rohem Rinderherz oder magerem Rindfleisch nach; meistens genügt schon, wenn man Quark und Weißwurm in reichlicherem Maße zusetzt. Ebenso kann man mageren Vögeln, speziell Sprosser und Nachtigall, ohne Gefahr für eventuelle Fußkrankheiten, stets ein erhöhtes Quantum Mehlwürmer geben, während ich wiederum bei zum Fettwerden neigenden Vögeln die Mehlwürmer in der gesangslosen Zeit gänzlich weglasse. Trotzdem hatte ich meistens bereits im Dezember-Januar schlagende Nachtigallen. Dieser Monat ist der letzte Termin zur eventuellen Eindeckung mit Herbstfängen von Schwarzplättchen sowie der übrigen Grasmücken, die jetzt meistens in den Beerenbüschen noch anzutreffen sind. Der Lieb-

haber kann da Schwarzplättchen, Rotkehlchen, Gartenrotſchwänze, Singdroſſeln und Amſeln beobachten. Kein Wunder, wenn dieſer oder jener in Verſuchung fällt, ſein Glück zu probieren. Der Fang mit Beeren iſt im Herbſt der beſte, da faſt alle Vögel darnach gehen, ſelbſt Nachtigallen habe ich im Auguſt vielfach unter den Gäſten getroffen, die in den Beerenbüſchen zu Gaſte waren. Es gibt wirklich intereſſante Stunden, wenn man ſich in gedeckter Stellung auf die Lauer legt und das Leben und Treiben, das Kommen und Gehen in den Beerenbüſchen beobachten kann, genau ſo ſpannend wie wenn man im ſchattigen Walde an einer viel benutzten Tränke auf Beobachtung liegt. Man ſtaunt einfach, was da alles ſaufen kommt, darum ſind auch von den Fängern derartige Tränken geſucht. Alle Vögel müſſen in dieſem Monat mit der Mauſer fertig ſein, ausgenommen Körnerfreſſer, die aber, wenn nicht ſchon fertig, ſo doch dem Ende der Mauſer zugehen.

(Fortſetzung folgt.)

Verſuche die Gründe des Weißwerdens bei einem gefangenen Granataſtrild zu analyſieren und ein paar Worte über das Gefangenleben der Art.

Von A. Adlerſparre.

(Fortſetzung.) (Nachdruck verboten.)

Welches können nun dieſe neuen Reize ſein? Doch kaum allgemeine oder lokale Ernährungsſtörungen, welche von Kummer oder dergleichen veranlaßt ſind. Der Vogel findet ſich mit der Umwelt anſcheinend ſehr gut ab. Trotz ſeines hohen Alters iſt er äußerſt beweglich, aufmerkſam und mit einem ſehr anpaſſungsfähigen Intellekt und ſehr gutem Gedächtnis ausgerüſtet. Er macht in keiner Hinſicht den Eindruck, als ob er krank wäre, iſt auch nicht zum nächtlichen Toben geneigt; ein Grund, etwa Storzverletzungen der Federpapillen anzunehmen, liegt nicht vor. Eher könnte man wohl an Inſektenbiſſe denken. An und für ſich können die Biſſe oder Stiche gewiſſer Schmarotzer mehr oder minder giftig wirken, auch kann es natürlich eintreffen, daß Bißwunden wohl gelinde, aber für Veränderungen innerhalb der Papille ausreichend infektiert werden können. Nun ſind Wildvögel oft recht ſtark vom Ungeziefer geplagt. Kürzlich hat uns Kracht (S. 380) berichtet, wie es ſich mit den Alpenſeglern in dieſer Hinſicht verhält. Und ein Bekannter von mir, der zufällig Gelegenheit hatte, einen Transport von Amazonen aus Mexiko unterwegs zu ſehen, teilte mir mit, daß große, widerliche Läuſe in Menge unter den Federn dieſer Vögel krabbelten. — In der Gefangenſchaft haben indeſſen die Vögel wegen ſtark verminderter Nahrungsſorge recht gut Zeit, gut Toilette zu machen. Und was beſonders die Prachtfinken anbetrifft, unterſtützen die meiſten von ihnen einander in entgegenkommendſter Weiſe bei Säuberung des Gefieders. Iſt der Käfig aus Metall, die Sitzſtangen und übrige Ausſtattung einigermaßen verſtändig gewählt und wird Badewaſſer gereicht, halten ſich dieſe Vögel, wenigſtens ſo lange ſie geſund ſind, in der Regel ſehr ſauber. Ich habe indeſſen ſowohl den Granatfink als den Blauaſtrild eingefangen und unterſucht, ohne etwas Verdächtiges zu finden. An Federlinge, die im Innern der Federn hauſen, glaube ich auch nicht, denn bei Vorkommen von ſolchen findet man wohl in der Regel die eine oder andere angegriffene Feder auf dem Käfigboden. Auch dieſen Verbleichungsfaktor können wir folglich in vorliegendem Falle beiſeite laſſen.

Alſo dürfte nur das Alter übrig bleiben. Aus Gründen, welche ich in früheren Veröffentlichungen angedeutet habe, ſchätze ich dieſes auf mindeſtens zirka 10 Jahre. Für das Alter als Verbleichungsurſache ſpricht, daß die Permanenz der Veränderungen ſich verhältnismäßig ſpät einſtellte, ferner auch, daß andere melaninpigmentierte Vögel, die ſehr lange bei mir gelebt, aber, aus mehreren Gründen zu beurteilen, jünger ſind, noch nicht irgendwelche Verbleichungen aufweiſen. — Das Alter, bei welchem die ſenilen Federveränderungen ſich einſtellen, die Verbreitung derſelben und die Form, unter welcher ſie zum Vorſchein kommen — Lockerung der Zellenverbände mit Eindringen von Luft, Pigmentſchwund aus verſchiedenen Gründen oder beide in Vereinigung — wechſelt anſcheinend. Bei von mir gezüchteten Goulds habe ich z. B. in feſtgeſtelltem Alter von $10^1/_2$ Jahren nur ſehr unbedeutende Weißfedrigkeit finden können. Ein anſcheinend ſehr altes Clarkeſches Goldbrüſtchen, das ebenfalls ſeinen ſechſten Sommer bei mir verbringt, zeigt bisher keine Verbleichungen. Bei einer Rotſchulterwitwe (nunmehr in Deutſchland), deren Alter ich auf zirka 15 Jahre ſchätzte, waren, ſo lange ſie ſich in meinem Beſitz befand, im Prachtkleid (zirka 10 Monate des Jahres getragen) keine grauen oder weißen Federn zu ſehen. Die phyſiologiſche Lebenslänge des letzteren verhältnismäßig ſehr großen Vogels iſt aber wahrſcheinlich etwa doppelt größer als die der Granat-, Gould- und Charke-Finken. — Beim Menſchen kann man auch eine offenbar vererbbare Dispoſition für ſehr frühzeitiges (prämatures) Ergrauen innerhalb beſtimmter Familien ſpüren, welches dem ererbten partiellen Albinismus ziemlich naheſtehen dürfte. Ganz unmöglich iſt wohl nicht, daß eine ſolche frühzeitige Verbleichung auch bei Vögeln ab und zu vorkommen könnte, beſonders bei denjenigen Arten, die ſtärker ausgeprägte Ergrauungstendenzen gezeigt haben.

Ich will nun hier eine kurze Zuſammenfaſſung deſſen zu machen verſuchen, welches meines Erachtens dem Weißwerden meines Granataſtrilds zugrunde gelegen hat:

Wahrſcheinlich nicht: Spezialſtoffmangel, Veränderungen der atmoſphäriſchen Elektrizität, Feuchtigkeit, Temperatur, Beweglichkeitsbeſchränkung, Storzverletzungen, Inſektenbiſſe, lokale Ernährungsſtörungen oder Krankheit überhaupt.

Möglicherweiſe beitragend: Veränderung der Höhenlage, vorausgeſetzt, daß Weiß- und Grauwerden auch in tiefländigen Gebieten im Freien vorkommt.

Wahrſcheinlich unterſtützend: Größere temporäre Veränderungen der Ultraviolett-Strahlung.

Hauptſächlich aber: Hohes Alter.

Alſo, verhältnismäßig ſehr ſtarkes Weißwerden dürfte als Alterserſcheinung beim Granatfink vorkommen, was meines Wiſſens in der einſchlägigen Literatur bisher nicht vermerkt wurde.

Wiſſenſchaftliches Intereſſe haben Fragen von vorliegender Art zunächſt aus phyſiologiſchen Geſichtspunkten. Hier habe ich aber vor allem dieſelben deshalb berührt, weil vorſtehende kleine Analyſe allgemeine Geſichtspunkte für eine — betreffend auch andere nicht minder wichtige Umweltreize als Futter — planmäßig geordnete Pflegetechnik gibt*), welche Richtpunkte nicht ohne praktiſche Bedeutung für zielbewußt arbeitende Vogelwirte ſein dürften, die erfolgreich in ihrer Arbeit werden wollen und die ſo wenig als möglich dem launiſchen Zufall überlaſſen wollen.

Zuletzt nur ein paar Worte, veranlaßt durch die Frage in Heft 28: „Welche Beobachtungen haben Liebhaber an Granataſtrilden gemacht? Vor allem ſind dieſelben, auch nach der Gewöhnung, recht weichlich?“ Aus eigener langjähriger Erfahrung möchte ich antworten: Die von mir bisher gepflegten Granataſtrilde haben zu den allerwiderſtandskräftigſten unſerer kleineren Exoten gehört. Der Genauigkeit may appear to be in South Africa, it cannot staud the damp, chill athmosphere of our cold months“. Butler ſtreift mit dieſen Worten eine ſehr intereſſante Frage: Sind wir wirklich berechtigt, aus der oft zitierten Ausſage von Stark über das winterliche Niſten, auf welches Butler anſpielt, und aus dem oben von mir erwähnten Vorkommen der Art Granataſtrild in den verſchiedenſten Küſten- und Hochlandsklimaten ſichere Folgerungen über die Anpaſſungsbreite aller bei uns gekäfigten Granataſtrilde zu ziehen? Das wäre, glaube ich, ein klein wenig voreilig. Wollen wir eingedenk ſein, daß das Verbreitungsgebiet des Grauaſtrilds — Afrika zwiſchen 12° und 30° ſ. Br. — ungeheuer groß iſt, ein Areal von zirka 4000000 qkm. hat, alſo annähernd zehnmal größer als Deutſchland oder Schweden iſt. Die verſchiedenen Vogelindividuen durchſtreifen ſicher nicht ſtändig dieſes große, hier und da von hohen Felſengebirgen durchzogene Gebiet, ſondern ſind wahrſcheinlich in kleineren, klimatiſch einigermaßen einheit-

Dorngrasmücke.

lalber finde ich mich aber verpflichtet, gleichzeitig arzulegen, daß die Meinungen, die in der Fachiteratur über die Anpaſſungsfähigkeit der Art Granatſtrilde an unſer Klima zum Vorſchein gekommen, eteilt ſind. Im unübertrefflichen Werk K. Neunzigs eißt es: „Ausdauernd, hart, nicht weichlich oder mpfindlich gegen geringere Wärmegrade“ und ſo iemlich dasſelbe ſagt der ausgezeichnete franzöſiſche Stubenvogelkenner Decoux: Cet Astrild s'est montré ssez robuste en captivité**). Aber der kürzlich erſtorbene Altmeiſter der engliſchen Vogelhaltung Dr. phil. A. G. Butler, deſſen ausgeſuchte Liebenswürdigkeit und bereitwilliges Entgegenkommen in vikulturellen Angelegenheiten von Bedeutung ich ür immer in dankbarſter Erinnerung bewahren werde, ar der entgegengeſetzten Meinung: „His opinion scilicet Mr. Phillipps) agrees with my own that, owever hardy it (scilicet Granatina granatina)

lichen Teilen desſelben ſeßhaft geworden. Mit anderen Worten, es hat ſich während des Laufes der Jahrtauſende etwas herausgebildet, was ich klimatiſche Raſſen heißen möchte, und eine jede dieſer Raſſen hat ſich ihrer ſpezifiſchen Umwelt angepaßt. Wie verhalten ſich nun Granataſtrilde aus den feuchttriefenden heißen Umgebungen des niederen Sambeſi beiſpielsweiſe dem oft grimmigen Höhenklima Johannesburgs (zirka 1750 M. ü. d. M.) oder der Wüſtendürre der Weſtküſte zueinander? Wir wiſſen es nicht, können aber einiges vermuten. — Soweit ich zu wiſſen glaube, werden die meiſten Granataſtrilde aus dem innerem Hochland exportiert; dieſe ſind anſcheinend ſehr widerſtandskräftig und müſſen natürlich nach den Anforderungen ihres ſtets ſchwankenden Heimatklimas eine ziemlich weite Anpaſſungsbreite beſitzen. Aber ab und zu kommt es wohl auch vor, daß zerſtreute Oſtvögel nach hier kommen. Dieſe könnten ſehr wohl, den Anforderungen ihres ſtets warmen uſw. Klimas entſprechend, von knapperer Anpaſſungsbreite, alſo weichlicher ſein. Sind wir hier nicht möglicherweiſe der Urſache des abſonderlichen Umſtandes auf der Spur, daß ein paar Vogelwirte, die auf der Höhe der zeitigen Technik ſtanden,

*) Oben iſt ausſchließlich vom Pigmentſtoffwechſel die rage geweſen; ſelbſtverſtändlich greifen die Umweltfaktoren uch in unendlich viele andere Lebensprozeſſe ein, was er Vogelwirt in eigenem Intereſſe beachten muß.

**) Dieſer Aſtrild hat ſich in der Gefangenſchaft als cht dauerhaft erwieſen.

schlechte Erfahrungen mit dieser Art gemacht, mit welcher vor beinahe 200 Jahren Madame de Pompadour und die derzeitige sehr primitive Technik schon ziemlich befriedigende Resultate erreichte? Höchst wahrscheinlich gibt es eben klimatische Rassen vom Granatastrild, die verschieden große Anforderungen an eine Anpassung an die Gefangenschaftumwelt entsprechend der Umwelt ihres Wildlebens stellen!

(Fortsetzung folgt.)

Etwas über die Dorngrasmücke.

Von Lothar Gribkowski, Danzig.

(Nachdruck verboten.)

Von allen bei Danzig vorkommenden Arten der Gattung Sylvia ist die Dorngrasmücke die häufigste, eben darum vielleicht auch die mir vertrauteste, deren Lebensweise mir auf meinen Exkursionen in der Natur oft zum Studium dienen mußte.

Wenn je ein Geschöpf Frohsinn des Gemütes verkörperte, so ist es die singende Dorngrasmücke im blühenden Brombeerstrauch. In reicher Abwechslung sprudelt und perlt ihr Liederbächlein aus dem stachlichten grünen Unterholz, und welch Jubilieren der Töne findet der weißkehlige kleine Vogel mit den rostroten Schwingen, wenn er, ganz Lenzeslust, in hüpfendem Fluge von den Buschspitzen auf- und niederflattert. Rasch und gedrängt folgen die Töne im Dorngrasmückengesang aufeinander, wobei ein Ausruhen und Dehnen eines Tonmotivs nicht stattfindet. Aber ein gewisser Rhythmus im Gesang ist unverkennbar, und immer überwiegen die Flötenlaute im Gesangsvortrag dermaßen, daß die vielen zirpenden und gepreßt klingenden Töne vom aufmerksamen Zuhörer eher unterhaltend als störend empfunden werden.

Dorngesträuche sind dieser Grasmücke liebster Aufenthaltsort. Bevorzugt werden von ihr vor allem die dichten Gehege der Brombeere. Ist diese vorhanden, so trifft man die Dorngrasmücke auch an den Rändern von sumpfigem Bruch an. Meist allerdings ist das Gelände, wo dieser Vogel sich aufhält, von größter Trockenheit. Dabei scheint ihr Vorkommen ganz von dem Vorhandensein von Dornbüschen abhängig zu sein.

Zum Nisten bevorzugt Sylvia cinerea nach meinen Erfahrungen weniger die Innen- als die nach Osten zu gelegenen sonnigen Randpartien der Dorngestrüppe. Hier findet man in ausgewachsenem, vorjährigem Gras, halb überkrautet von neuem Pflanzenwuchs oder überrankt von Brombeerzweigen, eine Handbreit über dem Boden das gut versteckte Nest. Auch nur in trockenem Unkraut, in einiger Entfernung von Dorngebüsch, habe ich das Nest dieses Vogels gefunden.

Die Dorngrasmücke besitzt in hohem Grade die Gabe, Feinde vom Nest wegzulocken. Nähert sich ein Störenfried dem brütenden Vogel auf 2 bis 3 Schritte, so flattert dieser in der Regel vom Nest auf und am Boden entlang, dabei spähenden Augen in täuschender Weise sich fluglahm stellend. Ein uneingeweihter Beobachter wird sich wohl des eigentlichen Zweckes, dem das Verstellungsmanöver des Tierchens gilt, gar nicht bewußt werden und nur sein Augenmerk auf den am Boden flatternden Vogel richten. Dieser aber bleibt dem Auge des Beschauers plötzlich verschwunden, und die Grasmücke fliegt auf Umwegen zum Nest zurück, um das unterbrochene Brutgeschäft ungestört fortzusetzen.

Auf dieselbe Weise gelingt es dem Vogel zweifellos auch, beutelüsterne Vierfüßler, wie Katzen, Wiesel und anderes Raubgesindel vom Nest abzulenken.

Als nächsten Nachbar der Dorngrasmücke kann man wohl den rotrückigen Würger ansprechen. Einträchtig bewohnen beide Arten oft dieselben Dornhecken, und nie habe ich irgendwelche Angriffe des letzteren auf die Brut der Grasmücke wahrnehmen können. Vielleicht erklärt sich dies Harmonieren beider Vogelarten z. T. aus ihrer verschiedenen Insektennahrung. Dem rotrückigen Würger dienen hauptsächlich größere fliegende Kerfe zur Nahrung, die er gern von seiner Warte im Fluge erbeutet, während die Dorngrasmücke zumeist kleineren kriechenden Insekten im Pflanzendickicht nachstellt.

In der ornithologischen Literatur wird die Dorngrasmücke besonders häufig in ihrer Rolle erwähnt junge Kuckucke großziehen zu müssen. Leider ist es mir bisher nicht geglückt, eine gleiche Feststellung aus eigener Anschauung zu machen, obwohl es im Frühjahr hier in Wald und Feld von Kuckucksrufen allerwärts widerhallt.

Sobald die erste Brut im Dorngrasmückennest flügge ist, was bei uns Mitte Juni der Fall zu sein pflegt, wird der Gesang dieser Grasmücke immer seltener und kürzer vernommen. Bei der zweiten Brut im Juli geht die Dorngrasmücke viel stiller und verborgener zu Werke. Der Gesang des Männchens ertönt dann nur noch abgebrochen, und die beginnende Mauser des Kleingefieders läßt diesen Vogel bald völlig verstummen.

Im August kann man noch flügge Dorngrasmücken gemeinsam mit den Alten auf der Streife im Unterholz des lichten Waldes beobachten.

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Ein sehr hübsches, farbenprächtiges, meisenartiges Vögelchen ist das in Teilen des Himalajagebietes (Gilgit-Botan) in den westlichen Provinzen Chinas und in Afghanistan lebende

Flammenköpfchen — Cephalopyrus flammiceps *(Burton)*,

der „Flame-fronted Flower-Pecker" = Feuerstirniger Blütenpicker oder „Fire-cape" = Feuerkopf der Engländer. Es ist der einzige Vertreter seiner Gattung, welche Hartert in „Die Vögel der palaearktischen Fauna" zwischen Beutelmeisen und Goldhähnchen stellt. Von den Beutelmeisen unterscheidet es sich durch den kürzeren Schwanz und die längeren Flügel sowie durch die steifen, schmalen Federn des Vorderkopfes und die durch Federn nicht bedeckten Nasenlöcher, außerdem durch die Lebensweise. Das Flammenköpfchen nistet in Baumhöhlen. Man fand die Nester gegen Ende Mai in einer Höhlung eines morschen Sykomore etwa 3,7 m über dem Boden. Es war ein napfförmiger Bau, hauptsächlich aus

feinem Gras. Es enthielt vier flügge Junge. In einem anderen Fall wurde das Nest in einer alten Kastanie gefunden etwa 3 m über dem Boden. Es war ähnlich gebaut, und da es ungefähr um dieselbe Zeit gefunden wurde wie das oben erwähnte, waren gleichfalls schon flügge Junge vorhanden, und zwar fünf Stück. Die Eier sollen einfarbig dunkelblau sein. Im Himalajagebiet lebt der kleine Vogel in Höhen von 750—2225 m. Im Winter sucht er die Ebenen Indiens auf.

Gefiederbeschreibung: Vorderkopf bis zur Mitte des Scheitels, Kinn feuerrot; Wangen, Vorderhals, Vorderbrust goldgelb; übrige Oberseite gelblichgrün, nach hinten auf Bürzel und Oberschwanzdecken gelblicher; übrige Unterseite heller gelb, Mitte und Unterschwanzdecken weißlichgelb; Flügel-, Schwanzfedern dunkelbraun mit grüngelblichen Außensäumen; Schnabel bleigrau; Lauf graubraun; Lg. 100, Fl. 60—62,5, Schw. 30—34 mm.

Weibchen oberseits grünlicher, unterseits matter, das rote Gefieder des Männchens gelbgrün.

In der Gefangenschaft wäre der zierliche Vogel wie unser Goldhähnchen zu verpflegen.

Buntmeise (s. S. 536).

Aus der Gattung der Waldmeisen gelangte die

Langschopftannenmeise — Parus melanolophus *Vig.*

nach England, eine Verwandte unserer Tannenmeise, von welcher sie sich, soweit plastische Merkmale in Betracht kommen, hauptsächlich durch den aus den stark verlängerten Scheitelfedern gebildeten Schopf unterscheidet. Sie bewohnt den westlichen Himalaja und Teile von Afghanistan. Im Himalaja brütet sie in Höhen von 2000—4000 m. Im Benehmen hat sie anscheinend viel Ähnlichkeit mit dem unserer Tannenmeise. Nach der Brutzeit wurde sie in Flügen umherstreifend in bewaldeten Tälern beobachtet, häufig vergesellschaftet mit dem vorstehend besprochenen Flammenköpfchen. Die Brutzeit erstreckt sich über die Monate März bis Juni. Das Nest steht in Höhlungen von Bäumen, in Mauerlöchern, Steinwällen, auch zwischen Steinen. Es hat meist einen sehr engen Eingang und kann meist nur entdeckt werden, wenn man die Vögel aus- oder einschlüpfen sieht. Allzu große Höhlungen werden durch Eintragen häufig recht großer Mengen frischen, weichen, grünen Waldmooses verkleinert. In dieses Moos wird dann aus mehr oder minder großen, dick verfilzten Flocken von Tierwolle und auch kurzen Tierhaaren, etwas Moos und zuweilen Pflanzenwolle ein dickwandiges Nest gebaut, dessen Baustoffe nicht immer allzu sorgfältig miteinander verflochten sind. Aber man fand auch sehr sorgfältig gebaute Nester, die nur aus feiner, grauer Tierwolle und kurzen Tierhaaren zusammengefilzt waren. Ein besonders sorgfältig gebautes Nest fand man lediglich aus grauen Haaren eines kleinen Säugers, vermutlich einer Ratte, erbaut. Das Gelege besteht in der Regel aus 6 bis 8 Eiern von rötlich-weißer Grundfarbe mit zahlreichen, lebhaft braunroten Flecken und Punkten (15,5× 11,9 mm). Die Eier haben schwachen Glanz.

Gefiederbeschreibung: Oberkopf mit langer Haube, längste Feder mit weißen Spitzen, Seiten des Nackens schwarz mit stahlblauem Schimmer; Nackenmitte weiß; übrige Oberseite bleigrau, nach hinten lichter; Kopf-, Halsseiten weiß, Vorderhals, Brust schwarz; Unterkörper aschgrau, Fleck auf der Brustseite lebhaft rostfarben; Unterschwanzdecke hell rostgelb, die längsten nur an den Spitzen, sonst grau; Flügeldecken, innere Armschwingen grau, mittlere und große Deckfedern mit rundlichem, hellrostgelbem Spitzenfleck; übrigen Schwingen braungrau, mit aschgrauen Säumen; Armschwingen mit schmälerem weißen Spitzenfleck; Unterflügeldecken hellrostrot, Achselfedern dunkler; Schwanzfedern wie Schwingen; Auge braun; Schnabel schwarz; Füße bleigrau; Lg. 106—115, Fl. 60—63, Schw. 43—46 mm.

Engl. Name: Crested-Black-Tit.

Unter den eingeführten Senegalvögeln sind häufiger auch Gimpellerchen zu finden, welche in ihrer Färbung wesentlich von den eingeführten und bekannten ostafrikanischen Gimpellerchen abweichen. Es handelt sich um die

westafrikanische Weißwangenlerche — Pyrrhulauda leucotis melanocephala (*Lcht.*).

Sie unterscheidet sich von der östlichen Weißwangenlerche durch weiße oder bräunlichweiße kleine Flügeldecken, helleres Rotbraun des Rückens, breiteres weißes Nackenband und schwächeren Schnabel von weißlicher Färbung, während der der östlichen Form mehr ins Graue geht. Die Verbreitung erstreckt sich über Westafrika nach Osten bis zum Weißen Nil.

Ein prachtvoller Pirol, der in den tropischen Gebieten Afrikas lebt, gelangte in den Zoologischen Garten von London, der

Goldpirol — Oriolus oriolus auratus *Vieill.*).*

*) Französisch: Loriot doré.

Er bewohnt die warmen, waldigen Gebiete Westafrikas (Senegambien bis Kamerun) und Ostafrikas. Man sieht ihn meist paarweise auf hohen Bäumen in der Nähe von Bächen und Sümpfen. Er scheint Strandvogel zu sein. In seinem Wesen und auch in seinem Ruf unterscheidet er sich nicht von unserem Pirol.

Gefiederbeschreibung: (s. Abb. S. 517) ♂ prächtig goldgelb; Zügel, Umgebung der Augen, Schläfenstreif tiefschwarz; kleine Flügeldecken goldgelb, große innen schwarz, Außenfahne und Spitzensaum goldgelb; Armschwingen schwarz mit breitem, die äußeren mit schmalem End- und Spitzensaum; Handschwingen schwarz mit schmalem gelbem Endsaum; Handdecken schwarz; Unterflügeldecken gelb; mittelste Schwanzfedern schwarz mit schmalem gelbem Endsaum, übrige schwarz, Spitzen teils gelb; Auge rot; Schnabel braunrot bis rot; Füße dunkel bleigrau bis schwarz; Lg. 230—250, Fl. 130—145, Schw. 85—95, Schn. 27—30, Lf. 22—23 mm.

♀ olivengelb, Vorderhals heller, übrige Unterseite heller goldgelb; Brust zuweilen dunkel gestrichelt; die beim ♂ tiefschwarzen Zeichnungen des Kopfes schwärzlichgrau; kleine Flügeldecken olivgelb, mittlere große und Schwingen schwarzbraun; z. T. olivgelb verwaschen und mit schmalen olivgelben Säumen; Schwanzfedern düster olivgelb bis olivbräunlich, außer den mittleren mit gelbem Ende der Innenfahnen und gelbem Innensaum. (Forts. folgt.)

Trauerbachstelze (s. S. 536).

Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten.

Von J. Kuntzendorff, Berlin.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Kubatangare — Spindalis pretrii *(Less.)*.

Sie ist weniger prächtig und mit nicht so leuchtenden Farben von Mutter Natur bedacht, doch ist das Federkleid sehr ansprechend und durch die scharfe Trennung der einzelnen Farben auf keinen Fall unschön zu nennen (s. Abb. S. 462). Das Männchen ist an Stirn, Scheitel, Kopfseiten und Ohrgegend schwarz, ein breiter Augenbrauenstreif sowie vom Schnabelwinkel ausgehend, ein Wangenstreif weiß; Kinn gleichfalls weiß, an den Seiten mit dem Wangenstreif in Verbindung stehend; Kehle goldgelb, beiderseitig von einem schwarzen, vorn spitzen, nach hinten zu sich verbreiternden, dreieckigen Streifen begrenzt; ein breites Kropfband, das seitlich sich als schmäleres Band über den Nacken fortsetzt, satt orangebraun, welches zur Brust hin goldgelb wird; übrige Oberseite oliv; Rücken mit goldigem Schimmer; Bürzel, Oberschwanzdecken orangebraun; Brust- und Bauchmitte dunkel zitronengelb, Brust- und Bauchseiten orangebraun, hinteren Teil des Bauches; Unterschwanzdecken weiß; Schulterfedern olivbraun, am Grunde schwarz; kleine Flügeldecken dunkel kastanienbraun, mittlere schwarz mit breiten olivgrünen Spitzen, große schwarz mit breiten weißen Säumen an der Endhälfte der Außenfahne; Armschwingen schwarz, die inneren mit breiten weißen, die äußeren mit schmalen weißen bis hellgelblichen Säumen an Innen- und Außenfahne; Handschwingen schwarz mit noch schmäleren weißen oder sehr hellgrauen Säumen; die längsten Handschwingen in der Mitte der Außenfahne mit weißem Fleck, bei zusammengelegtem Flügel einen Spiegel bildend; Schwanzfedern schwarz, das innerste Paar mit weißem Saum an der Innenfahne, das nächste ganz schwarz, die zwei folgenden Paare mit sich nach außen vergrößerndem Endfleck auf der Innenfahne und das äußerste Paar schwarz mit weißer Endhälfte, die wiederum schwarz gespitzt ist; Auge dunkelbraunschwarz, Schnabel schwärzlich, Unterschnabel dunkel bleigrau, Füße schwärzlich hornfarben. Lg. 127,5, Fl. 72—75, Schw. 57,5, Schn. 11, Lf. 17—19 mm. Weibchen oberseits olivgrau, die Kopfzeichnung, die beim Männchen schwarz-weiß ist, ist beim Weibchen grau-oliv und nur schwach angedeutet; Kehle, Bauch schmutzig gelblichweiß; Brust, Körperseiten, Aftergegend gelblichgrau mit grauolivfarbenem Anflug; kleine Flügeldecken wie der Rücken; Flügel- und Schwanzfedern schwarzbraun mit gelblichgrünen Rändern an der Außenfahne. Die Basis der größten Schwungfedern ist weiß, wodurch ein kleiner Flügelspiegel gebildet wird, jedoch kleiner als beim Männchen, Ränder der großen Deckfedern weißlichgelb; Schwanzfedern ohne jedes Weiß. Das Jugendkleid ähnelt dem des Weibchens: Oberseite olivgrün, am Kopfe dunkler, am Steiß mehr gelb, die Wurzeln der Federn grau; Augenbrauenstreif, Kehle olivgrünlichweiß;

übrige Unterseite schmutzig weiß, gelblich überlaufen; Flügel schwarz, kleine Deckfedern mit blaßgrünbräunlichen, große mit weißen, gelbgesäumten Rändern; die fünf größeren Schwingen mit feinem weißen Rande, an der Basis nur mit sehr kleinem, weißem Fleck; größere Schwingen von der Mitte an grün gerandet; Unterseite grau; Schwanzfedern mit grünlichem Außenrande, die zwei äußeren jeder Seite an der Spitze mit weißem Fleck.

Nach Gundlach (Journal f. Ornith. 1872) ist der Vogel auf Kuba gemein. Fälschlich wurde behauptet, er hielt sich im Gebüsch auf, sein Aufenthalt sind vielmehr ausschließlich die hohen Bäume. Zur Paarungszeit leben diese Vögel gesellig in kleinen Schwärmen von 6—12 Stück und liegen dann eifrig unter stetem Locken der Nahrungssuche ob. Es sind scheue Vögel. Der Gesang ist leise und angenehm und hat Ähnlichkeit mit dem des Girlitz. Das Nest wird in den äußersten Zweigen hoher Bäume gebaut. Die Eier sind weiß mit einzelnen großen braunen und kleineren schwarzbraunen Flecken. Die Nahrung besteht aus allerlei Beeren, Früchten und auch aus den reifen Schalen der Kaffeebeere. In seiner Heimat wird er viel gekäfigt und dann mit reifem Pisang ernährt.

Hat die Eingewöhnung der vorangegangenen Tangaren an mich keine exhorbitanten Anforderungen gestellt, so machte die der Kubatangare hierin jetzt eine Ausnahme und gestaltete sich bedeutend schwieriger. Das bei den anderen erprobte Eingewöhnungsfutter sowie Eigelb, im Wasser oder Milch eingeweichtes Eierbiskuit wurde absolut nicht angerührt, Mehlwürmer erfreuten sich weiter ihres Daseins. Ich versuchte es deshalb, auf folgende Weise den Vogel am Leben zu erhalten: ich reichte zweierlei Futtergemische, deren erstes in der Hauptsache aus kleingehacktem Obst bestand, vermischt mit von etwas Zucker versetztem, geriebenem Eierbiskuit und einer ganz geringen Menge Ameiseneier. Das zweite Gemisch bestand aus mit Zucker vermengtem Eigelb, etwas Käsequark, etwas kondensierter Milch, etwas Honig, alles mit Eierbiskuit gut vermengt und mit dem Saft einer süßen, reifen Frucht, z. B. Birne, übergossen. Anderes Obst reichte ich nicht. Ganz allmählich bequemte sich der Vogel, diese für einen Vogelgaumen gewiß lukullische Nahrung, erst in ganz geringer Quantität, hernach in größeren, zu sich zu nehmen, so daß ich nach und nach die Menge des ersten Futters verringerte und schließlich beide Arten vereinigen konnte und zu folgendem Mischfutter überging: hartgekochtes, feingehacktes Ei (mit Eiweiß), Eierbiskuit, Quark, Ameiseneier, kondensierte Milch, gut vermengt und, falls erforderlich, mit etwas Wasser angefeuchtet; daneben reichte ich Obst separat. Den Ameiseneiern fügte ich allmählich Universalfutter bei, in dem Maße, als ich Ei, Quark und kondensierte Milch fortließ. Nach 8—9 Wochen hatte ich sie endlich so weit an das den anderen Fruchtfressern gereichte Mischfutter gewöhnt, so daß ich den Vogel im Flugraum fliegen lassen konnte. Aber die Freude dauerte nicht lange, denn er ging mir an Blutarmut ein. Die Zusammensetzung der Nahrung mußte also nicht die ganz richtige gewesen sein, da jene dem durch die Strapazen geschwächten Körper nicht die nötige Kraft zuführen konnte, um die Bluterneuerung zu beschleunigen. Meine sonstigen Beobachtungen decken sich mit denen, die ich an nachfolgender Art gemacht habe. Ich fasse daher den Bericht beider, das Gefangenleben behandelnd, zusammen.

(Fortsetzung folgt.)

Ornithologische Beobachtungen auf meiner Dänemark-Schweden-Reise.

Vortrag gehalten im Verein „Agintha" von

Max Dähnick.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Das industriereiche Helsingborg und die Insel Hoen sichteten wir, und zu schnell legte der Dampfer im Hafen von Malmö an. Die Schweden empfingen uns auf das herzlichste. Und zu schnell wurden wir unter den Klängen einer schwedischen

Feuerschwanzamadine (s. S. 536).

Husarenkapelle nach Kungsparken geführt. Dieser Park ist natürlich angelegt und schließt eine große Gastwirtschaft ein. Auch hier im Königspark sangen fast alle unsere einheimischen Sänger. Es war um die Mittagszeit, und schläfrig orgelten einige Gärtner. Buchfinken schlugen, auch flötete eine Amsel. In der Mitte des Parkes war eine große Freivoliere sehr schön mit künstlichem Wasserfall angelegt, hier hausten gelbe und grüne Wellensittiche. Bald unternahmen wir einen Rundgang durch die Stadt, und zum Schluß wurden wir von den schwedischen Freunden in ihrem stattlichen Heim bewirtet. Am Kai wurden noch gegenseitige Hochrufe auf Schweden und Deutschland ausgetauscht, und unter den Klängen des „Deutschlandliedes" verließ der Dampfer den Hafen. Wir fuhren an den mit Panzertürmen gespickten dänischen Küstenforts vorbei und liefen bald wieder in den Hafen von Kopenhagen ein. Selbstverständlich war es wieder eine stattliche Zahl Möwen, welche uns das Geleit gab. Den Abend benutzte jeder dazu, um Dänemarks Hauptstadt näher kennenzulernen. Um neun Uhr am nächsten Morgen verließ unser „Odin" den Hafen mit Kurs

auf Bornholm. Nun wurde wieder an Deck geplaudert und gegessen, gefilmt und photographiert. Die schwedische Küste mit ihren dunklen Wäldern und freundlichen Ortschaften blieb lange Zeit in Sicht, bis schließlich im Osten ein grauer Streifen aus dem Meere wuchs: Bornholm. Immer näher kamen wir, und bald war die steile Felsenküste zu erkennen, an deren Klippen sich schäumend die Brandung brach. In Hammershafen gegenüber der Hammershuisruine ankerte das Schiff. Wir hatten das Glück, in Blanchs Hotel, nicht weit von der alten Ruine, Quartier zu nehmen. Des Abends unternahm man noch kleine Strandpartien, um die tosende, donnernde Brandung an den Klippen schäumen und sprühen zu sehen, und bei dieser Wanderung höre ich wieder das eigentümliche Doeck-Doeck. Ja, höre ich denn recht? Gewiß doch, ich hatte ja meine Frau schon beim Ausbooten darauf aufmerksam gemacht. Ohne Zweifel, hier sind Sprosser. Wir gingen dem Schall nach, doch war nichts mehr zu hören, es war auch schon zu dunkel. Im Hotel machte ich dem Zimmermädchen begreiflich, daß ich punkt ½4 Uhr geweckt werden will. Doch ich konnte nicht schlafen, und gegen 3 Uhr war ich auf den Beinen. So schnell wie möglich verließ ich leise unser Zimmer. Ist das aber ein Gesang hier, ja hier ist ein Dorado für unsere Weichfresser. Das Gelände fällt nach der See zu auf ungefähr 100 m ab, ein undurchdringliches Dickicht von Tannen, Birken, Weißdorn, Flieder, Brom- und Himbeeren und vieles mehr. Ein Eindringen ohne zerrissene Hosen unmöglich. Und hier singt alles; ohne jede Scheu ließen mich meine Lieblinge ziemlich dicht heran. Jetzt höre ich wieder Kot-kot-kot-kot-tack! Ich konnte nicht weiter, wie gebannt mußte ich stehen bleiben. Ja, das sind Sprosser, und in welcher Zahl? Bald einer beim andern. Wissen Sie, wie einem begeisterten Vogelliebhaber zumute ist, der in Gottes freier Natur, das erstemal im Leben, Sprosser und in so großer Zahl schlagen hört? So war es mir auch möglich, die verschiedenen Schläger abzuhören. Deutlich unterscheide ich den Davidsprosser, welcher meist als Schlußtour Tonk-tonk-tonk-tonk! bringt, während der Judithschläger als Schluß, seine Presse ungefähr Tkrrrrrrrtack, tief metallisch hervorstößt. So etwas muß man erlebt und gehört haben, erst dann weiß man so recht, was einem seine Lieblinge daheim im Käfig wert sind. Und mit noch größerer Sorgfalt und Liebe wird man seine Stubengenossen pflegen. Doch jetzt vorwärts, schnell und doch vorsichtig pirschte ich mich den taunassen Pfad empor, und bald stand ich mitten im Sprosserrevier, ich zählte eins, zwei, drei, ja bald 20 Stück stellte ich unterhalb der Hammerhuisruine fest. Mir kam es so vor, daß der eine schöner und feuriger als der andere schlug. Ich wagte mich nicht zu rühren, denn ich darf meine Lieblinge nicht stören. Schade, schade, daß ich nichts mit hatte, denn hier wäre die Wahl schwierig gewesen. Wohl länger als eine Stunde lauschte ich. Und dort sitzt einer, welcher sich gut im Geäst eines Fliederbusches beobachten ließ. Dieser feurige Daaaavidschläger ließ mich gut auf ungefähr 3 m heran, ehe er tiefer ins Gebüsch hüpfte, ohne sich im Gesang stören zu lassen. Doch ich muß zurück, auf dem wohl 20 Minuten langen Weg hörte ich Schwarz- und Graudrossel, Zilp, Zalp, Fitis, Spötter, Buchfink, Goldammer, Kuckuck, Wiesenschmätzer, weiter orgelte Gärtner, sangen Dorngrasmücken, klapperten Müllerchen, weiter sah ich Krähen, Spatzen, graue Bachstelzen, auf einem Wiesenpfahl den grauen Fliegenschnäpper, ich hörte Schwarzplatten, aber nur mäßige Schläger, Hänflinge, Stieglitze, Feldlerchen, und wer weiß was mir noch alles entgangen ist. Doch ich hatte Eile, schnell wurde das Frühstück eingenommen, denn die Inselbahn wartet nicht. Mit dieser Bahn fuhren wir nach Helligdommen. Wir besichtigten die Klippen von Helligdommen, hohe zerrissene Granitfelsen, von der Brandung zernagt, und ziehen durch waldige Schluchten, an romantischen Klippenpartien vorbei, über Hotel Stammershalde zum nächsten Bahnhof, auf dem uns der Sonderzug erwartete. Auf diesem Wege sahen wir Nester der Uferschwalben, sowie einen krähengroßen Vogel. Unser Führer sagte, es wäre der Tolk? Am Nachmittag unternahmen wir eine Autofahrt und besichtigten noch viele und schöne Sehenswürdigkeiten. Auf dieser Fahrt hörten wir Feldlerchen, Goldammern und Wiesenschmätzer. Jedoch am Abend ließ ich es mir nicht nehmen, wieder zur Hammershuisruine zu wandern, wo mir die Sprosser den Abschied sangen.

Rotohramadine. (s. S. 536).

Als wir am nächsten Morgen eingebootet hatten, ahnte mancher nicht, daß ihm ein schwerer Tag bevorstand. Was mancher, der die Ostsee für einen „Schwanenteich" hielt, sich sehnsüchtig gewünscht hatte, wurde uns nun beschеert: „Schwere See". Ihre Wirkungen waren auch bald zu spüren. Nach und nach opferten die meisten dem Meeresgott ihren Tribut, und es gab da oft für den Unbeteiligten drastische und tragikomische Bilder. Wer aber von diesem Übel verschont blieb, dem gewährte das bewegte Meer ein erhabenes Naturschauspiel von majestätischer Größe. Die schäumenden Wellenberge rollten drohend heran, brachen sich donnernd am Bug und hoben und senkten das Schiff mit unsichtbarer Gewalt. Soweit der Blick reichte, war ein Auf- und Niederwogen von weißen Schaumköpfchen und dunklen Wellentälern, die der Wind in ungestümer Wucht vor sich aufbäumen ließ. Im Schutze der deutschen Küste ließen die heftigen Bewegungen des Schiffes nach, und bald konnte im Swinemünder Hafen und Stettiner Haff das Essen aufgetragen werden. Bald war die Stettiner Zollstelle passiert und ein Sonderzug brachte uns nach Berlin.

Die Reise, die uns in kurzer Zeit an so viele sehenswerte Punkte führte, war reich an herrlichen Erinnerungen, schönen Bildern, vergnügten Stunden und lehrreichen Eindrücken, und nie werde ich es vergessen, daß ich auf dieser Fahrt das erstemal in meinem Leben Sprosser in Gottes freier Natur und in so großer Zahl schlagen hörte.

Kleine Mitteilungen.

Auslandsbericht. Zu dem Artikel „Farbenwellensittichzucht" von Bailly-Maitre bringt das Augustheft des „L'Oiseau" noch einige Ergänzungen verschiedener Züchter. Unter anderem schreibt Frau Lecallier: „In meiner Voliere, in der sich nur grüne und olivenfarbige Vögel befinden, wurden vor ca. drei Jahren malvenfarbige ausgebrütet, ohne daß je solche Spielarten eingesetzt wurden. Im letzten Jahre wurden davon zwanzig Stück großgezogen. Untereinander ergaben diese ihrerseits graue Sittiche, fast ohne jegliche violette Tönung. In einer anderen Voliere fliegen grüne und gelbe, die blaue und malvenfarbige hervorbringen; kürzlich wurden nun von diesen weiße Wellensittiche erbrütet mit violetter und blauer Tönung." — Ebenso sind bei dem hervorragenden, kürzlich verstorbenen englischen Züchter Astley im Jahre 1921 und 1923 in einem Flugraum mit grünen und blauen Vögeln fast rein weiße ausgeflogen. — J. H. Marsden schreibt: „Ein weißer Wellensittich, den Herr Bradsten aus einem grünen und einem blauen zog, hat keine Spur von Wellenzeichnung und nur einen blauen Schimmer am Bauch und zwischen den Beinen; als ich ihn sah, hatte er noch nicht gemausert, doch nehme ich an, daß er nach der ersten Mauser rein weiß sein wird; der Bürzel ist absolut weiß. Ich glaube, es ist der vollkommenste weiße Wellensittich, der in England gezüchtet wurde. Von grünen Sittichen, die von blauen Eltern stammten, erhielt ich ein blaugrünes Weibchen mit weißen Schwungfedern und gelbem Schwanz! Das Tier lebte allerdings nicht lange." Im Septemberheft des „Oiseau" macht Tavistock über die Lebensdauer der Nektarvögel in Gefangenschaft folgende Angaben: „Meine Mutter besitzt heute noch einen Purpurnektarvogel (Cinnyris asiatica), den sie von mir zwei Jahre vor Kriegsbeginn erhielt." Also jetzt 13 Jahre alt! Andererseits gibt Mrs. Goddard an, daß sie 1912 ein Paar Purpurhonigsauger (Cyanerpes coeruleus) erhielt, von denen das Männchen heute noch lebt; das Weibchen starb im vorigen Jahre an Altersschwäche. Über Lutinismus bei einer Amazone teilt Tavistock im letzten Heft des „Avicult. Magazine" mit, daß er vor einigen Wochen eine prachtvolle Blaustirnamazone erhielt, deren Gefieder folgende Abweichung zeigt: Die Hauptfärbung, die bei dem bekannten Vogel grün ist, ist hier tief goldgelb; alle sonst blauen Federn sind weiß und das Rot nur ganz schwach angedeutet. Das Auge ist rot, der Schnabel und die Füße cremefarbig. Das Tier ist ganz zahm und vollkommen gesund. Das noch massenhafte Vorkommen von Zebrafinken in Australien erhellt aus einem Schreiben, das ich vor einigen Tagen von einem dortigen Liebhaber erhielt: „Ich ersehe aus Ihrem Brief, daß Sie auch einige Zebrafinken halten. Diese werden bei uns von Liebhabern nicht gekäfigt; sie brüten hier so zahlreich und vermehren sich so ungeheuer, daß sie zu einer wahren Plage werden und alle Nester mit Beschlag belegen. Einer meiner Freunde hatte vor drei Jahren zwei Paare in seinem großen Flugraum belassen; im vorigen Monat fing er 120 Stück heraus; es sind mindestens noch ebensoviele darin, alles Nachkommen der beiden ursprünglich eingesetzten Paare." Wer sich übrigens für dieses Tiergebiet interessiert, dem sei das 1923 erschienene hübsche, mit guten Farbentafeln illustrierte Büchlein empfohlen: „An Australien Birdbook", herausgegeben vom Vorsitzenden der Australischen Ornithologischen Gesellschaft Dr. Leach. Man findet in diesem Buch eine klare und geordnete Übersicht der heute noch so überaus reichen Avifauna dieses Erdteils. Das große, schon einmal erwähnte Werk von Mathews ist für den einzelnen Liebhaber unerschwinglich. Ein anderes kleines Buch, ebenfalls vom Jahre 1923, behandelt die Vogelwelt des westlichen Nordamerikas: „Western Bird Guide", recht handlich, mit Angaben über Vorkommen, Lebensweise und Nestbau. Preis 1,75 Dollar. Wer sich für die Vogelwelt Ceylons interessiert, greife zu dem kürzlich erschienenen Buch von W. E. Wait: „Birds of Ceylon", mit zwanzig Schwarzdrucktafeln. Es gibt eine vollkommene Übersicht aller dort vorkommenden Vögel mit genauen Angaben und Maßen. Preis 15 Shilling.

Dr. Luig.

Bücher- und Schriftenschau.

Mein Freund der Regenpfeifer. Das neue Buch von Bengt Berg. Mit Vergnügen denke ich manchmal an die Zeit zurück, in der meine Vogelstube einen jungen Mornell-Regenpfeifer beherbergte. Woher ich ihn hatte, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, aus Süddeutschland war er gekommen. Jung noch, kräftig, reichlich täppisch und unbeholfen. In den ersten Wochen guckte er sich den Betrieb meist aus den Ecken an, unternahm Entdeckerfahrten, fand die Futternäpfe aber schon am ersten Tage. Mit der Freßlust wuchs die Kraft und der Mut, und nun brachte er Flußregenpfeifer, Bachstelzen und Lerchen ganz gehörig in Schwung. Wenn er jene abgehetzt, was ihm mit seinen kräftigen Beinen nicht schwer fiel, mundete ihm das Futter nochmal so gut. Die Angstrufe der Flußregenpfeifer gingen mir, als die Sache sich öfter am Tage wiederholte, doch auf die Nerven und der kleine „Goliath", dem die Hetze sichtlich Spaß machte, wurde verkauft. An diesen Pflegling erinnert mich das neue Buch von Bengt Berg, das mir der Verleger, Dietrich Reimer, Berlin, zur Besprechung in der „Gef. Welt" zuschickte. Wenn man die l . . . . . Zeiten, die wir jetzt durchmachen, bedenkt, so muß man sagen, daß der 111 Seiten starke hübsche Leinenband geradezu verschwenderisch mit Bildern geschmückt ist. Die 74 Bilder sind hervorragend gut ausgewählt, bemerkenswert geschickt aufgenommen und tadellos gedruckt auf feinem Kunstdruckpapier. Sie zeigen jede Einzelheit und geben die Farbenwerte sehr gut wieder. Wer Bengt-Berg-Filme und -Bilder noch nicht kennt, erlebt hier eine Überraschung. Weshalb aber der Bilderreichtum? Dem Leser soll die geradezu unglaubliche Vertrautheit des Mornell-Regenpfeifers glaubhaft gemacht werden. Wenn man liest, wie der Wildvogel auf den in der offenen Hand Bengt Bergs befindlichen Eiern weiterbrütet, sich streicheln läßt, die Regenwürmer aus den Fingern des Beobachters nimmt, so hält man das alles für kaum möglich, wenn es die prächtigen Bilder nicht beweisen würden. „Die größte Schwierigkeit für den Menschen sich mit einem Tier auf guten Fuß zu stellen, liegt in seinem Mangel an Geduld." Bengt Berg hat diese in reichem Maße. Daraus erklären sich seine fabelhaft guten Erfolge im Beobachten und Bebildern freilebender Tiere. Dazu kommt noch seine prächtige Schilderungsgabe, der scharfe Blick für Besonder- und Einzelheiten.

„Gott hat allen Tieren befohlen, daß die Mutter bei den Jungen bleiben soll", sagt Aslak der Lappe, Bengt Bergs Begleiter. Diese köstliche Sittenlehre umzustoßen und zu zeigen, daß beim Mornell-Regenpfeifer tatsächlich das Männchen brütet und die Jungen großzieht, mußte der schwedische Forscher dem Naturmenschen erst mühsam beweisen, um Glauben zu finden. Bengt Berg war meines Wissens früher Volksschullehrer und hat es, was bei uns nicht möglich, durch seine prachtvollen Aufnahmen und Bücher zum wohlhabenden Mann gebracht. Mehr über den Inhalt seines neuen Buches mitteilen möchte ich nicht. Der Preis von M. 7.— ermöglicht vielen Vogelfreunden die Anschaffung. Eine der nächsten Nummern der „Gef. Welt" wird Bengt Bergs und des Tierhelden seines Buches Abbildung bringen und ein kurzer Abschnitt wird den Leser in der gleichen Weise erfreuen, wie mich selbst das ganze schöne Buch. A. Troschütz, Hannover.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Max Dähnick in Berlin NO 18, Gr. Frankfurter Str. 90, Ecke Markusstr. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

Im Monat Oktober 1925 wurden aufgenommen die Herren: 1. Arthur Henderkott in Bremen; 2. Felix Kassel in Penzig O./L.; 3. Carl Leimroth in Göttingen; 4. Josef Hartl in Regensburg und 5. Josef Rieger ebenda.

J. A.: Petters.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Frau E. Birkner, Crimmitschau, S., Annenstr. 38: 1,0 schneeweiße Amsel.

W. Hiltmann, Berlin S 14, Dresdener Straße 24: Wbch. Schamadrosseln, Mchn. Rotbauchdrosseln, Ringdrosseln, Pirol, goldgelb, Seidenschwanz, Drosselrohrsänger, Dorngrasmücken, Müllergrasmücken, Gartenrotschwänze, Gebirgsbachstelze, Kernbeißer, Braunohrsittiche, Feuerflügelsittiche, Tovisittiche, Bergpapageien, Lazulifinken, Pfäffchen, Kaptäubchen, Zaunkönige, Goldhähnchen, rotr. Würger.

Walter Hoesch, Neukirchen, Altm.: Kalif. Schopfwachteln.

Max Kleinert, Tierhandlung, Berlin O 17, Strausberger Str. 13, Fernruf Alexander 3313: Lauchgrüne Papageiamadinen, Spitzschwanzamadinen, tarant. rotköpfige Bergpapageien, Feuerflügelsittiche, Tovisittiche, Schumaweibchen, Tyran, schwefelgelbe, Weißkehldrosseln, Katzendrosseln, Blauraben, Kronentangaren, Morgenammerfinken, Jakarinifinken, Riesenpfäffchen, Pfalzschnäbel, brasilian. Rosttäubchen, Dorngrasmücken, Gartenrotschwänze.

Petry, Coblenz, Casinostraße 6: 0,1 Steinkauz.

E. Schöndube, Berlin N 4, Elisabethkirchstr. 1: 1 Sprosser, Sperbergrasmücken, Dorngrasmücken, Sumpfrohrsänger, Drosselrohrsänger, Trauerfliegenschnäpper, Zaunkönige, Goldhähnchen.

Gustav Steudtner, Niederoderwitz b. Zittau i. Sa.: 1,0 Goldfasan.

„Ornis" an die Geschäftsstelle der „Gef. Welt": 1,0 Lazulifink, 1,0 Alariofink, 1,1 Orangeblaufink.

Herrn G. Sch., Adlershof. Rabenvögel können ohne weiteres im Freien überwintert werden, zumal es sich ja um heimische Arten handelt. Futter- und Trinkgefäße müssen an geschützten Stellen aufgestellt werden. An kalten Tagen ist mehrmalige Fütterung notwendig. Durch Anbringung eines Schutzdaches kann den Vögeln Schutz gegen Wind und Schnee geschaffen werden.

Herrn L. M., Breslau. Die genannten Prachtfinken können ohne weiteres in einem größeren Flugkäfig untergebracht werden. Sie werden am besten paarweise eingesetzt. Die Weibchen der Blauastrilde sind an der geringeren Ausdehnung der blauen Färbung kenntlich.

Herrn E. St., Quelle. Die Mönchgrasmücke war stark abgemagert. Sie wog 11 g. Das Normalgewicht einer M. beträgt 18 g. S. vorstehende Auskunft unter „Herrn M. G., Tasdorf". Fußkrankheiten können verschiedene Ursachen haben. Es können gichtische Erscheinungen sein, sie können auf leichten kaum beachtlichen Verletzungen des Fußes beruhen. Sie können auch rheumatischer Natur sein usw. Die mehr gelbliche Befiederung der Unterseiten zeigen jüngere Vögel, ältere haben mehr blaugraue Färbung an diesem Körperteil.

Herrn P. K., Döbern. Die Kanarienzüchter verwenden meist das Dr. Riegersche Nährsalz. Ob die von Frieß in der Zeit vor dem Kriege in den Handel gebrachten Mehlwurmzuchtkisten noch erhältlich sind, ist mir unbekannt. Die Frage ist im Sprechsaal (Heft 44) veröffentlicht worden. Über die Wirkung des Venecin liegen wenig Mitteilungen vor. Meist sind keine Krontrollversuche gemacht. Seidenraupenschrot kann ein gutes Futtermittel sein, wenn es einwandfrei hergestellt ist. Meist hat es einen widerlichen Geruch, ein Zeichen, daß halbfaule, abgestorbene Seidenspinnerpuppen dabei Verwendung fanden.

Herrn A., Berlin; Herrn H. W., Bruchmühle; Herrn A. T., Hannover; Herrn M., Lübeck, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn A. T., Hannover; Herrn W. Sch., Frankfurt/M.; Herrn Dr. L., Brüssel; Herrn M. R., Breslau; Herrn O. G.; Herrn A. J., Biberach; Herrn H. W., Kinzenbach: Beiträge dankend erhalten.

Herrn L. K., Vegesack. Die Bekämpfung der Milbenplage ist im laufenden Jahrgang hinreichend erwähnt worden, s. S. 10, 20, 212, 296 usw.

Herrn M. T., Wiesbaden. Die auf S. 532 abgebildete Trauerstelze brütet in England, Schottland, Irland, im westlichen Holland, Belgien und im westlichen Frankreich. Im nördlichen Teil des Brutgebietes ist sie nur Brutvogel, der in Südfrankreich, Spanien, Portugal und Marokko überwintert. Im Sommerkleid ist sie von unserer weißen Bachstelze durch den schwarzen Rücken, im Herbstkleid durch dunkelgrauen Rücken zu unterscheiden. Im Handel ist sie sehr selten.

Herrn P., Berlin. Die auf S. 527 und S. 531 abgebildeten, auf S. 490 erwähnten Meisen sind die Bergmeise, welche im Himalajagebiet östlich bis ins westliche China brütet, und die Buntmeise. Erstere ist der Kohlmeise ähnlich, kleiner und lebhafter gefärbt. Sie wird auch jetzt ab und zu eingeführt, während die Buntmeise schon seit langem auf dem Vogelmarkt fehlt. Ihre Heimat ist Japan (Jesso und Hondo), Korea. Sie ist oberseits blaugrau, die dunklen Teile der Zeichnung sind schwarz, unterseits hell kastanienbraun, über den Nacken ein kastanienbraunes Band, die hellen Gefiederteile sind rahmfarben.

Frau A. L., Kopenhagen. Feuerschwanz (Abb. S. 533) und Rotohramadine (Abb. S. 534) werden kaum nach Europa gelangen. In Australien verbieten die Gesetze die Ausfuhr der Vögel. Die in früheren Jahren unternommenen Versuche, die Vögel einzuführen, scheiterten stets an der Hinfälligkeit dieser Vögel, die meist während der Schiffsreise eingingen. Die wenigen Stücke, welche nach Deutschland gelangten, gingen stets sehr bald ein.

Herrn P. H., Bonn. Bezugsquellen kann ich an dieser Stelle nicht angeben. — Der ähnlich der Federbildung einer Perückentaube gebildete Federkragen des im Besitze des Fragestellers befindlichen Blaukehlchens, der auch nach der Mauser wieder vorhanden war, ist vermutlich durch irgendeine Hautverletzung des Vogels am Hinterkopf hervorgerufen.

Frau K. N., Deutsch-Lissa. Der Nymphensittich ist einer Magen- und Darmentzündung erlegen. Die Ursache der Krankheit konnte nicht ermittelt werden.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

hrgang 54 5. November 1925 Heft 45

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Über Zusammenhalten und Verträglichkeit der Vögel. Von Eduard Spille.
Das Liebhaberjahr. Plauderei von J. Birk, Leipzig. (Forts.)
Versuche die Gründe des Weißwerdens bei einem gefangenen Granatastrild zu analysieren und ein paar Worte über das Gefangenleben der Art. Von A. Adlersparre. (Forts.)
Etwas über die Dorngrasmücke. Von Lothar Gribkowski, Danzig.
Neueinführungen und Seltenheiten. Von K. Neunzig. (Forts.)
Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten. Von J. Kuntzendorff, Berlin. (Forts.)
Ornithologische Beobachtungen auf meiner Dänemark-Schweden-Reise. Vortrag gehalten im Verein „Agintha" von Max Dähnick. (Schluß.)
Kleine Mitteilungen - Bücher- und Schriftenschau - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Ausstellungen - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

reutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld p
Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweck

Käfige u. Gerätschaften

Vogel-Mistelleim

zum Fangen schädlicher Vögel, Ia klebend bei jeder Witterung, garantiert gebrauchsfähig, Dose 2.— M. fr. von A. Freitag Nchf., Frankenberg i. S. 6. Wiederverkäufer hohen Rabatt. [1481

Futtermittel

Mehlwürmer

veg. gez., 1/4 Liter franko gegen Voreinsendung von RM. 2.—. [1482

Bonitas-Versand, Rostock i. M. 3.

Mehlwürmer

(das ganze Jahr hindurch) M 5.— das Pfd., ausschließl. Porto u. Verp.; bei Abnahme von 6 Pfd. Porto u. Verpackung frei.

Ia Ameiseneier

1925er, 4.— M per Pfd.
Postkolli 9 Pfd. netto 31.50 M franko.

Ia Weißwurm, 1925er 4.— d. Pfd.
Ia Muska-Zecken . . . 1.50 d. Pfd.
Ia Seidenraupen-puppen, gemahlen 0.75 d. Pfd.

ff. Universalfutter

Alecwa I für Nachtigallen M 2.—
" II für Grasmücken M 2.—
" III für Drosseln . . M 1.50
das Pfund ab hier, ausschl. Verp.; bei größeren Mengen billiger. [1483

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
A. Eckrich II, Waldsee (Pfalz).

Mehlwürmer

1 Pfd. 5 M ab hier,
geg. Voreinsendung 1/4 Pfd. 2 M franko.
Großabnehmer Rabatt.

Ia Ameiseneier

1925er, Pfund 4.50 M.

Ia Weißwurm, 1925er, Pfund 4.50 M.

Ia Muska-Zecken Pfund 1.50 M.
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen Pfd. 0.75 M.

Die Preise sind freibleibend, ab Lager, ohne Porto und Verpackung. Bei Anfrage Rückporto beifügen. [1484

Bei größerer Abnahme hoher Rabatt.

Karl Claus, Mutterstadt II
(Hauptbahnhof).

Mehlwürmer

à Pfund 5.60 M, 1/4 Pfund 2.— M franko gegen Voreinsendung

Ia **Ameiseneier**	Pfd. 4.—	M
Ia **Muska**	Pfd. 1.50	M
Ia **Weißwurm**	Pfd. 4.50	M
Seidenraupenschrot	Pfd. 0.75	M
Garnelen gem.	Pfd. 0.35	M

Alles diesj. Ware, à Pfund ab hier.

Th. Witte, Niederndodeleben
b. Magdeburg. [1485

Heidelberger Vogelfutter

Braune Packung für Erdsänger u. ä. Vögel
250 g 2.75
Graue Packung f. Grasmücken 250 g 1.70
Blaue Packung für Drossel 250 g 1.10
empfiehlt [1486

Arthur von Ende,
Zoologische Handlung,
Jena (Thüringen), Magdelstieg Nr. 55.

Unübertroffen ist

Heidelberger Vogelfutter,

hergestellt nach Vorschrift und unter Kontrolle von
Professor Dr. Otto Fehringer
durch
GENO-WERK ~ Mannheim
Rheinkaistraße 8 b.

Anfragen über die Pflege einheimischer Vögel werden gerne beantwortet. Rückporto beilegen. [1487

Bei Anfragen und Bestellungen bitten wir, sich auf die „Gef. Welt" zu berufen

„ORNIS"

Freie Bezugsvereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands.
Gegründet 1912 ∴ Fernsprecher 4198 [1488

Fachgemäße Belieferung mit Vogelfutter („Reform-Normal", individuelle Zusammensetzung bei restlosem Verbrauch; stets frisch gemischt). Hunderte von Liebhabern füttern seit über einem Jahrzehnt mit bestem Erfolg nur „Reform-Normal".

Reform-Normal-Käfige Mod. ORNIS 1925, neue Preisliste erschienen. — Modern eingerichtete Käfig-Bauanstalt mit elektrischem Betrieb.

Anschrift: Ornis-Haus, Halle-Saale. Der Geschäftsführer: Martin Sperling.



„Naturell"

das seit Jahrzehnten in Liebhaberkreisen eingeführte und bestens anerkannte Futter für edle Weichfresser ist wieder in bester Friedensbeschaffenheit lieferbar! **„Naturell" ist Qualitätsware,** auf Grund langjähriger Erfahrungen zusammengestellt und durch Autoritäten bestens beurteilt. [1489

Preis: kg 6.— M. Probesendungen gegen Einsendung von 1.— M. in Briefmarken. Drosselfutter kg 2.— M.

Empfehle außerdem bestes Körnerfutter für Einheimische und Exoten, ferner Ia Ameisenpuppen, Weißwurm usw.

Nur direkt zu beziehen von

Wilhelm Dietze, Leipzig, Kurprinzstr. Nr. 15.

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.—Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [1490

Vogelfutter [1491

für **Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser.** Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 18 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Offeriere Vogelfutter in prima Qualität:
Petr. Ameiseneier . . à Pfd. 3.80 M.
10 Pfd. 36.— M. franko
Zecke . . . . . Pfd. 2.50 M.
Con. Eigelb . . . . . Pfd. 2.— M.
Karottengrieß . . . . Pfd. 0.70 M.
Drosselfutter . . . . Pfd. 0.80 M.
Lucullus extra Mischung 1/2-Pfd.-Paket 0.95 M., weiße Packung 0.80 M.
Senegalhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Silberhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Algierhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Kerbtiernahrung f. Kanarien Pfd. 1.30 M.
Versand per Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. [1492

Paul Szornack,
Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189.
(Postscheck-Konto Nr. 652 65)
Gegründet 1905.

Züchter-Urteile:

Ihr Brief und die Futterprobe sind gut angekommen; es ist doch für Roller? Ihr Futter ist das beste, welches ich jemals versucht habe. Ich bekomme natürlich genug Kanarienfutter, welches als echt deutsches verkauft wird. Habe mehr als 500 Kunden auf meiner Liste und will einem jeden von ihnen eine Probe schicken. Können Sie mir für 10 Dollar schicken? Ich will die Kosten wissen und wie ich das Futter werde verkaufen können. Sie setzen keinen Preis fest. Da jetzt keine große Nachfrage ist, werde ich Ihnen wegen der Kanarienvögel später schreiben.

G. Ashton, Gateshead (England).

Bin mit der letzten „L. K."-Sendung sehr zufrieden. Die Vögel haben sie gern gefressen und fühlen sich äußerst wohl dabei. Spreche hierdurch meinen herzlichsten Dank aus. Bitte hiermit um weitere Zusendung von 2 Paketen „L.-K.-Nahrung" u. einer Probesendung von 10 Pfund Ia Rübsen und 5 Pfund Glanz.

Stendal, 25. 10. 1925. Karl Nahrstedt.

Lorenz, Dresden,
Drehgasse 5. [1493

Die Originale obiger Zuschriften haben uns vorgelegen.

Die Schriftleitung der „Kanaria".

Grosser Posten Ia Rübsen

Solange Vorrat reicht Ztr. 35 M.
Andere Sämereien zu billigste Tagespreisen.
Vereinen ist jetzt Gelegenheit geboten, mit prima Ware einzudecken bei günstiger Zahlungsbedingung.

Lorenz, Dresden
Drehgasse 5. [14

Ameiseneier,

gute Qualität, Ernte 1925, à Pfd 3,50 M., bei 10 Pfund franko.

Weißwurm,

Ia, Pfund 5.00 M, bei 10 Pfund fran
Versand per Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. [1

Friedr. Gustav Mülle
Berlin SW 61, Blücherstraße
Postscheckkonto Berlin Nr. 153990
Fernsprecher: Moritzplatz 2689.

Ia Ameiseneier

mit würzigem Geruch à Pfd. 4.— bei 10 Pfund 35.— franko
Ia Elbweißwurm Pfd. 4.50
Mehlwürmer gegen Einsendung 2.— M 1/4 Pfund franko.

W. Busse, Magdeburg,
Gr. Mühlenstraße 1. [

Ein Versuch

überzeugt jeden von der Güte me
Universalfutters. Preis 2 M. p.
Sämtliche Futtersorten für Exo
Wald- und Kanarienvögel zu billig
Tagespreisen. Versand geg. Nachnah
Verpackung und Porto werden bi
berechnet. [
P. H. Kirsten, Leipzig 3,
Zeitzer Str. 53. Fernruf 31

Vögel

Papagei,

Sprechkünstler, spricht auf der H
gesund, prächtig im Gefieder, ver
mit neuem Käfig für nur 125 M. [
W. Müller,
Friedersdorf, Kr. Beeskow

Sprosser

Nachtschläger

vollständ. befiedert. Vogel mit ga
gesunden Füßen, zu kaufen ge
Es kommt nur ein Tier in Fr
das im bes. des Nachts gesun
hat. Porto usw. postwendend ver
O. Böneker, Hannov
1499] **Rambergstr. 36 A II.**

Suche

1,1 Orangeblaufinken un
0,1 Papstfink.
C. Balser, Fuld

Stieglitzbastard

gesund, kräftig, vielsingend, v
Kurzweg, Berlin, Prenzlauer Alle
1501]

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 14
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 12. November 1925 | Heft 46

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Lauchgrüne und gelbbäuchige Papageiamadinen.

Von H. Wagner, Bruchmühle.

(Nachdruck verboten.)

Diese schönen Vögel, die im ausgefärbten Zustand das Entzücken jedes Liebhabers sind, wurden vor kurzer Zeit endlich mal wieder auf den Markt gebracht. Früher so häufig angeboten, fehlten die Lauchgrünen in den Nachkriegsjahren in Deutschland gänzlich auf dem Markt, und es ist sehr zu begrüßen, daß ein tatkräftiger, sonst sehr zu empfehlender Händler die Gelegenheit nicht vorbei ließ, uns Liebhabern mal wieder etwas Besonderes bot. Ich schrieb sogleich in meiner Freude über den Transport an mehrere mir gut bekannte Prachtfinkenliebhaber und hätte gedacht, die Lauchgrünen würden bestellt werden wie die warmen Semmeln. Dem war aber doch nicht ganz so, da bei vielen Vogelfreunden diese Art etwas verrufen ist, und ich möchte durch diese Zeilen mich mal wieder etwas näher darüber auslassen, um durch Aufklärung über die Eingewöhnung die Liebhaber für diese schönen Kerle etwas zu erwärmen. Sie verdienen es auf alle Fälle, von allen Liebhabern farbiger Exoten verpflegt zu werden.

Vor dem Kriege, in Heft 17 Jahrgang 43, schrieb ich bereits einmal über diese Art, und meine weiteren Erfahrungen, die ich dann noch sammelte, will ich hier in kurzen Worten mitteilen. Käfigte ich oder auch andere Liebhaber vor meinen Eingewöhnungsverfahren lauchgrüne Papageiamadinen und fütterte mit dem gewöhnlichen Hülsenreis und Spitzsamen (letzterer wurde übrigens fast nie angenommen), so war das Resultat immer dies, daß die anfangs recht lebhaften Vögel mit der Zeit immer ruhiger wurden. Ich schrieb seinerzeit: „Was für einsilbige und langweilige Vögel sind es doch, wenn sie nur mit hartem Reis gefüttert, langsam einem sicheren Tode entgegengefüttert werden. Sie werden schwächer und schwächer, können zuletzt kaum noch fliegen, ohne daß man den Tieren sonst eine Krankheit ansieht. Die Nägel wachsen infolge ihres Stillsitzens rasch, und alle Augenblicke hängt eine lauchgrüne Papageiamadine!“ Die Vögel halten sich dann meist im dunkelsten Teil der Vogelstube auf, singen wohl noch, aber bewegen sich, wie erwähnt, so gut wie gar nicht, es bilden sich häufig Schnabelwucherungen, die man beschneiden muß, und soeben noch singende Männchen konnte man in der nächsten Minute plötzlich tot am Boden liegen sehen. Ein Herz- oder Gehirnschlag oder was sonst noch beendete ihr Leben. Dies war natürlich im ganzen kein erfreulicher Zustand, und deshalb waren die Lauchgrünen früher nicht so besonders beliebt. Daß hieran die Reisfütterung die Schuld hatte, war mir bald klar, da doch über die ungünstige Wirkung einer ausschließlichen oder auch nur reichlichen Reisfütterung bei anderen Vögeln und Tieren schon manches geschrieben worden ist. Ich hielt es daher für unbedingt erforderlich, die Lauchgrünen sobald als irgend möglich an Hirsefütterung zu gewöhnen, und der Erfolg gab mir recht.

Wie stumpfsinnig und geradezu hilflos werden Lauchgrüne bei Trockenreisfütterung und wie außerordentlich lebhaft sind und bleiben sie nach bestandener Eingewöhnung. Schwanzwippend und schwanzzitternd umtänzeln sie die Weibchen, und im schnellsten Fluge durcheilen sie die Vogelstube und durchstöbern Nistkästen. Ein Bild des Wohlbehagens, welches man erst nicht für erreichbar gehalten hätte. Wenn ein Vogel richtig ernährt wird, nistet er auch in Gefangenschaft, wenn die Bedingungen dafür nur halbwegs gegeben sind. Warum also auch nicht die Lauchgrünen? Ich hatte die Freude, diese Art sowie die gelbbäuchige Papageiamadine in einigen Bruten zu züchten. Der Kriegsausbruch 1914 machte der Zucht ein Ende und bei meiner Einziehung zum Heeresdienst war ich genötigt, Alte sowie Junge billig wegzugeben. Ich habe mich damals von den Lauchgrünen recht ungern getrennt. Über die Zucht selbst verweise ich für Interessenten nochmals auf den anfangs erwähnten Artikel, um mich nicht wiederholen zu müssen. Ich erwähnte darin auch die Zucht der gelbbäuchigen Art (Männchen) mit Weibchen Lauchgrüne. Ich war seinerzeit auf die Ausfärbung der Jungen gespannt. Sie wurden alle Lauchgrüne, von gelb keine Spur. Um sicherzugehen, sandte ich die Vögel seinerzeit per Boten auch noch zu Herrn Neunzig, doch auch dort konnten keine Farbenunterschiede festgestellt werden, sie bekamen nur das Lob mit auf den Weg, daß sie besonders schön und tief ausgefärbt seien. Auch bei dem jetzigen kleinen Transport waren 2 Exemplare mit olivgrünem Bürzel dabei, unausgefärbt. Der Nichtkenner würde sie

ohne Zweifel als Weibchen angesprochen haben, da ich aber, wie früher erwähnt, niemals Weibchen dieser Abart resp. Farbenvarietät entdecken konnte und auch bis jetzt noch von keinem Liebhaber eine Meldung über ein Weibchen gelbbäuchige Papageiamadine erfuhr, kaufte ich ein Exemplar ruhig als Männchen und am anderen Tage sang es auch.

Die Lauchgrünen machen dem Liebhaber in den ersten Wochen einige Mühe, aber diese lohnt sich reichlich und ist bald vergessen, wenn uns diese liebenswürdigen Gesellen Junge bringen. Heute, wo die erstrebenswerten rotköpfigen und dreifarbigen Papageiamadinen für uns arme Deutsche nur noch im Traume erscheinen können, ist die lauchgrüne resp. gelbbäuchige Papageiamadine der beste Ersatz dafür. Jedenfalls sind sie mir gleich lieb. Der jetzt von Kleinert geforderte Preis von 60 Mark ist ja vielleicht manchem Liebhaber etwas hoch erschienen gegen früher, doch zeigte mir K. seinen Einkaufspreis für diesen Transport, und danach war der Preis angemessen resp. niedrig. Ich erfuhr nun dieser Tage, daß wieder ein neuer Transport Lauchgrüne kommen soll, wobei der Einkaufspreis und somit der Verkaufspreis bedeutend niedriger sein soll als neulich, und wenn dies tatsächlich der Fall ist, wäre dies recht erfreulich, um die Pflege der Lauchgrünen mehr zu verbreiten. Also auf zur Zucht der Lauchgrünen!

Die Eingewöhnung der lauchgrünen Papageiamadine möchte ich also wie folgt empfehlen: Hat man diese Art erworben, so gebe man nach einigen Tagen gequellten Reis in Hülsen. Hat man kranke Exemplare erhalten, was ja bei allen importierten Vögeln, gleichviel welcher Art, oft der Fall sein kann, gebe man den gequollenen Reis erst dann, wenn eine etwaige Magen- oder Darmkrankheit auskuriert ist. Ist eine Heilung der Krankheit nicht möglich, fange man auch nicht erst mit dem Quellfutter an. Bei gesunden Tieren gebe ich ungefähr am vierten oder fünften Tag gequellten Reis. Je nach Beschaffenheit des Reises ist eine verschiedene Quellzeit erforderlich. In kaltem fließendem Leitungswasser (ein besonderer Quellkasten stand seinerzeit zur Verfügung) brauchte der Reis früher ca. 14 Tage, bevor er weich war. Der jetzt käufliche Reis ist über die Hälfte enthülst, und ich quelle daher nur etwa acht Tage in Wasser mit Stubentemperatur, da ich den enthülsten Reis nicht länger im Wasser liegen lassen möchte. Ich komme mit der verkürzten Quellzeit durch das etwas wärmere Wasser aus. Jedenfalls diene als Anhalt, daß der Reis so weich sein muß, wie dies Hirse nach dreitägigem Kaltquellen ist. Man benötigt also dazu acht Gläser oder Näpfe, die täglich zweimal frisches Wasser bekommen müssen. Den Reis selbst gibt man wie alles Quellfutter täglich in zwei Portionen, da im warmen Zimmer gequollenes Futter leicht säuerlich und dann natürlich dem Vogelmagen verderblich wird. Ungefähr nach weiteren vier bis fünf Tagen (auf einen Tag mehr oder weniger kommt es natürlich absolut nicht an) gebe ich gequellte Hirse (drei Tage kaltquellen) und gequellten Hafer (nur über Nacht anquellen lassen). Schließlich kann man den Hafer auch trocken reichen. Man mache jedoch nicht den Fehler, anfangs den trockenen Reis ganz wegzulassen. Dieser plötzliche Umschwung in der Ernährung kann keinesfalls gut sein. Man gibt demnach den Vögeln immer noch einige trockene Reiskörner, und nur allmählich, nach vielleicht 14 Tagen bis drei Wochen Eingewöhnung, lasse man den harten Reis ganz weg. Bald wird man die Freude erleben, daß die Lauchgrünen an Hafer und Hirse gehen, und dann hat man gewonnen. Die Reisportion wird immer mehr verringert, gequellte und daneben auch trockene Kolbenhirse wird gereicht, und man wird sehen, daß sich die Lauchgrünen bei dieser Ernährung äußerst wohlfühlen. Die Eingewöhnung selbst ließ ich immer im Käfig erfolgen, wenigstens so lange, bis ich mit Sicherheit feststellen konnte, daß genügend Hirse gefressen wurde. Dann erst ließ ich die Lauchgrünen in die Vogelstube fliegen. Ich gesellte dieser Art ab und zu als Anlerner zum Hirsefressen gern ein Paar japanische Möwchen zu. Aber jetzt passierte es einer eifrigen Liebhaberin, daß die Möwchen nun gerade Reis fraßen, so daß dieser Versuch gerade das Gegenteil erreicht haben würde. — Sind die Lauchgrünen so weit, daß sie dem Reis keine Beachtung mehr schenken, sind die Vögel als eingewöhnt zu betrachten. Die sonst immer verhängnisvolle Mauser wird dann sicher glatt vor sich gehen, und man wird an diesen Vögeln seine dauernde Freude haben.

Das Liebhaberjahr.

Plauderei von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der Oktober verlangt vom Pfleger bereits die größte Aufmerksamkeit, denn jetzt machen sich die Anzeichen der Mischfutterdarreichung bemerkbar, und nun ist es Zeit, daß genau darauf geachtet wird, welche Wirkung die Fütterung bei jedem Vogel hervorbringt und dementsprechend muß individuell gefüttert werden. Wie bekannt, neigt ein Vogel in bezug auf seine Artzugehörigkeit leicht zur Fettbildung, während wieder eine andere Art, trotz besten Futters, immer etwas mager bleibt. Dabei darf man aber nicht übersehen, daß auch Individuen einer Art dementsprechend trotz gleichen Futters in der Körperbeschaffenheit differieren. Darum muß man bereits bei Beginn der Winterfütterung, sobald man die diesbezüglichen Eigenschaften seiner Pfleglinge erkannt hat, mit der individuellen Fütterung einsetzen. Auch hier ist Verhindern viel leichter als Versehenes wieder gut machen. Da die Tage im Oktober bereits wieder bedeutend kürzer werden, so muß man stets darauf achten, daß sich alle Vögel gut sättigen können und während der langen Nächte nicht hungern, besonders beachte man, daß sich magere Vögel stets abends bei Licht noch sättigen können. Wenn wir von Fettbildung sprechen, so müssen wir einen Trennungsstrich machen zwischen ihr und Fettsucht. Denn ganz besonders muß hervorgehoben werden, daß jeder Weichfresser ruhig eine kleine Fettschicht am Körper haben kann als Reserve für eventuelle kritische Tage. Gerade bei zarten Sängern, wie Gelbspötter, Sumpfrohrsänger usw., ist es eine unbedingte Notwendigkeit, daß sie sehr gut ernährt sind, denn tritt, wie so oft, eine Futterannahmeverweige-

rung von mehreren Tagen ein, so ist ein kleines Fettbäuchlein sehr wertvoll. Grasmücken dagegen neigen zur Fettsucht, darum gilt diesen in dieser Hinsicht ein besonderes Augenmerk. Vor allen Dingen achte der Vogelwirt darauf, daß die Vögel beim Hellwerden früh gefüllte Futternäpfe vorfinden und nicht erst warten müssen, bis sich ihr Pfleger zur Fütterung bequemt; ganz besonders sündigen sonntags viele Liebhaber, indem sie aus Bequemlichkeit bedeutend später füttern als üblich; auch vermeide man gerade sonntags das Großreinemachen, um die Vögel nicht unnötig zu stören, wenigstens halte ich es so. Warum? Nun weil für mich der freie Tag einen möglichst reichen Gesangsgenuß bringen soll. Der Oktober bringt noch nicht viel Gesang, höchstens junge Vögel singen schon fleißig halblaut, in

Martinique-Gimpel (Text im nächsten Heft).

Ausnahmefällen bereits auch alte, überwinterte Vögel, ab und zu auch bereits laut.

Der gefährlichste Monat im Liebhaberjahr ist der November, der Vogel kennt weiter keine Beschäftigung, an den Futternapf, auf die Sitzstange zur Verdauung. Völlig teilnahmslos und ruhig sitzen sie im Käfig, keinen Vergleich findet man mehr an den meisten aufgeplustert dasitzenden Vögeln mit ihrem Benehmen als Frischfänge. Ja, manche Vögel, die durch die Zugzeit arg im Gefieder gelitten haben, verursachen wirklich keinen ästhetischen Anblick. Wo ist all der Lebensmut, wo sind die behenden Bewegungen der Vögel geblieben? Für mich ist der November der traurigste Monat im Liebhaberjahr; die dämmerigen Tage legen sich schwermütig auf das Gemüt des Menschen, ihre diesbezügliche Wirkung scheinen sie auch auf unsere Stubenvögel auszuüben. Jetzt zeigt es sich, wie weit der Liebhaber die Kunst einer sachgemäßen Pflege meistert. Die kurzen Tage erfordern eine ausgiebige, nahrhafte Ernährung, wiederum aber auch eine Verhütung der Fettsucht. Die meisten Mißerfolge in der Stubenvogelliebhaberei, besonders im Gesangserfolge, haben ihre Ursache in einer systematischen Mästung der Vögel, verfettete Vögel sind gesangsfaul und machen dem Pfleger viele Schwierigkeiten, besonders beim Eintritt der Mauser. Gelingt es, die Vögel normal zu halten im Körperzustand, so verblassen die sonst gefürchteten Schwierigkeiten bei der Überwinterung ganz merklich und ein normaler Eintritt in den Gesang, und sofern es sich um sogenannte „Wintermauserer" handelt, auch in die Mauser sind die erfreuenden Erfolge. Alle Vögel, die im Winter, Januar bis März, mausern sollen, können nun auch täglich, falls sie ihnen vorenthalten wurden, was ich für am richtigsten halte, einige Mehlwürmer erhalten. Am bedürftigsten, aber auch am unschädlichsten sind Mehlwürmer bei der Überwinterung für den Gelbspötter; auch Sumpf- und Teichrohrsänger vertragen sichtlich eine reichlichere Würmergabe, niemals aber Sprosser und Nachtigall in der gesangsstillen Zeit. Alle Wintermauserer bewahre man vor Kälte, indem man sie vor großen Temperaturschwankungen bewahrt. Am dienlichsten dürfte ihnen eine Zimmerwärme von 15 bis 18 ° R sein.

Der Dezember, falls er uns eine die Saaten schützende Schneedecke beschert, bringt wieder Helligkeit in die Vogelstube. Die düsteren, nebligen Tage des November müssen hellen, frostigen Tagen weichen. Der Vogelpfleger atmet erleichert auf, denn von Tag zu Tag werden die Vögel wieder lebhafter, auch das Studium des Gesanges nimmt greifbarere Formen an, und gar mancher Sänger bringt neues Leben ins stille Heim, indem er sein Stimmorgan bereits in voller Stärke hören läßt. Die schlimmste Zeit für den Pfleger ist vorbei. Ebenso wie im November die Vögel durch ihre phlegmatische Ruhe für Zunahme des Körperumfanges in zu reichlichem Maße sorgten, tun sie dies jetzt in entgegengesetzter Richtung durch die lebhafteren Bewegungen. Selbstverständlich darf der Pfleger dem nicht entgegenwirken, indem er nicht füttert, sondern mästet. Jetzt ist es

Zeit, daß eventuell verfettete Vögel durch entsprechende Einstellung der Qualität des Futters nach und nach wieder auf normal zurückgebracht werden. Vögeln, die bereits anfangen zu singen, reiche man wieder Mehlwürmer und steigere dieselben mit der Zunahme der Gesangsstärke Schritt haltend nach und nach auf das für die betreffende Art höchst zulässige Quantum. „Wintermauserern", wie Gelbspötter, Sumpfrohrsänger, rotrückiger, Würger, Garten- und Sperbergrasmücken, Pirol, Stein- und Blaudrossel steigere man gleichfalls das tägliche Quantum Mehlwürmer, vorausgesetzt, daß die Vögel nicht verfettet sind. Am Tage sollen sie sich alle nur ausschließlich ans Mischfutter halten, daher verteile man das Mehlwürmerquantum auf zwei Rationen, eine früh und eine abends, denn sonst kommt es zu leicht vor, daß sie verwöhnt werden und Mischfutter vollständig ignorieren und weiter nichts fressen wollen als Mehlwürmer. Welcher Pfleger zarter Sänger kennt nicht die kritischen Tage der Mischfutterverweigerung, es sind Tage der Sorgen für den Pfleger. Falsch wäre es nun, seine Gelbspötter, Sumpfrohrsänger usw. durch Entziehung der Mehlwürmer zur Annahme des Mischfutters zu zwingen und demzufolge hungern zu lassen. Wenn auch in der Vogelpflege das Sprichwort: „Hunger ist der beste Koch" zum Teil seine Berechtigung hat, so kommt es vor, daß derartige hartnäckige Mischfutterverweigerer lieber hungern und nach und nach matter werden, als das dargebotene Futter zu fressen. Etwas anderes ist es, wenn es sich um eine sogenannte „Selbstentfettung" der Vögel handelt. Die verfetteten Vögel verweigern plötzlich jegliche Futterannahme, selbst Mehlwürmer verschmähen sie und zehren von ihrem aufgespeicherten Fett. Dabei werden sie nicht etwa hinfällig, sondern im Gegenteil von Tag zu Tag lebhafter in ihren Bewegungen und beginnen nach Vollendung der „Entfettungskur" meistens mit dem Gesange.

(Fortsetzung folgt.)

Versuche die Gründe des Weißwerdens bei einem gefangenen Granatastrild zu analysieren und ein paar Worte über das Gefangenleben der Art.

Von A. Adlersparre.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Auch der Granatastrild ist unter ungünstigem Zusammentreffen der Umweltfaktoren Störungen seiner Gesundheit unterworfen. Besonders natürlich während der physisch und psychisch so außerordentlich Anforderungen stellenden Zeit, welche dem Einfangen und der Ausfuhr nach fremden Weltteilen folgt. Eine recht interessante Krankheit, welche man außer beim Granatastrild auch bei einigen anderen Südafrikanern oder via Südafrika eingeführten Arten (beispielsweise Tigerfink) finden kann und welche nebenbei oft recht bald zum Tode führen soll, zeigt in früheren Stadien als auffallendste Erscheinung eine gelblichrote, nach Eintrocknen beinahe rubinrote, vom Gallenfarbstoff Bilirubin erinnernde*) Weißfärbung der ihrer Konsistenz nach ziemlich normalen Entleerungen.

In Südafrika vermutet man laut Angabe hier die Einwirkung der einheimischen Boermannahirse. Direkte Mißfärbungen der Entleerungen, von Futterfarbstoffen herrührend, sind, wie es einem jeden erfahrenen Vogelpfleger bekannt sein dürfte, durchaus nicht außergewöhnlich. Zum Beispiel grünliche Färbung nach reichlichen Gaben von Grünfutter, Rot-, Blau- und Violettfärbung nach Beerenfütterung usw. Auch nach Verabreichung von gefärbten Hirsearten kann man derartiges beobachten: Hellgelbliche Verfärbung nach ausschließlicher Verfütterung von gelber Hirse, rötliche Verfärbung nach beispielsweise Algierhirse. Es liegt aber in der Natur der Sache, daß solche unkomplizierten Mißfärbungen der Entleerungen bald nach Wegnahme des diese verursachenden Faktors verschwinden müssen. Das ist auch in der Praxis der Fall, wie ich mich mehrmals während des Laufes der Jahre überzeugt habe.

Sobald es mir bekannt wurde, daß man wirklich das Futter ernst in Verdacht hatte, setzte ich meinen kranken Granatfink ausschließlich auf Silberhirse. Es war jedoch keine Veränderung wahrzunehmen! Also muß die Ursache tiefer liegen.

Man könnte nun, wenn man an der Boermanna festhält, an giftige Stoffe, die in diesem Futter enthalten sind, denken, welche dauernde Störungen der Gesundheit bewirken könnten. Ich habe indessen zu verschiedenen Zeiten Boermanna zweier Jahrgänge teils den für die Krankheiten empfindlichen, aber gesunden Vögeln wie Granatastrild, Blauastrild, Braunkopfamarant, Tigerfink, teils auch mehreren Goulds und anderen Nichtafrikanern als ausschließliches Körnerfutter gereicht, jedoch ohne die Krankheit bei einem einzigen Vogel erzeugen zu können! Völlig bindend ist dieser Beweis allerdings nicht — da aus verständlichen Gründen keine diesbezüglichen Kontrollproben vorgenommen wurden. Man kann natürlich einwenden, daß alle diese verschiedenen Individuen und Arten schon vor Einleitung der Versuche giftfest waren. Den Schluß dürfte man jedoch wagen, daß es nach diesen Versuchen sehr unwahrscheinlich ist, daß die Boermannahirse die Schuld an der Krankheit hat, um so mehr als wenigstens meines Wissens keine verdächtigen Gifte weder in dieser Pflanze noch in anderen Hirsearten festgestellt sind.

Recht unwahrscheinlich erscheint mir auch eine eventuelle Annahme, daß es sich um Ausscheidung eines Überschusses des Federpigmentes handeln könnte. Ich will jedoch hier nicht den Raum durch ein näheres Eingehen auf das, was gegen diese Annahme spricht, in Anspruch nehmen.

Halten wir dagegen an dem fest, welches uns in der Bilirobinähnlichkeit gegeben wurde, und fragen uns: Ist es wahrscheinlich, daß eine gesteigerte Ausscheidung von Gallenfarbstoffen vorliegen könnte, müssen wir uns zuerst darüber klar werden, wie die Gallenfarbstoffbildung zustande kommt. Als Muttersubstanz wird allgemein Blutfarbstoff angenommen — Zerstörung roter Blutkörperchen hat sowohl bei Tierversuchen wie in anderen Fällen stets zu bedeutend gesteigerter Bildung von Gallenfarbstoffen geführt, welche unter solchen Umständen — normal kommt dies nicht vor — auch in den Urin (das Weiße der Vogelentleerungen) und Kot übertreten können. Das

*) Auch andere z. T. noch nicht näher bekannte Gallenfarbstoffe gibt es bei Tieren, besonders bei kranken, in großer Zahl.

trifft besonders bei gewissen Krankheiten vom Malariatyp zu. Hier müssen wir uns also noch weiter fragen: Kommt Malaria unter Vögeln vor? Ja, mehrere Arten, besonders in tropischen Gebieten, aber auch hier und da bei uns in Europa. Verhältnismäßig oft heimgesucht sind Kleinvögel, nicht selten aber auch Tauben und Raubvögel. Ronald Roß, der Nobelpreisgewinner, führte gegen Ende vorigen Jahrhunderts einige seiner berühmten Untersuchungen über die Entwicklung der Malariaparasiten eben auf einem Erreger der Vogelmalaria: Proteosoma und auf Kleinvögel aus — zuerst in Indien, dann in Südafrika.

Meines Erachtens läßt sich die jetzt besprochene Krankheit, soweit sie uns bisher bekannt ist, also durch die Annahme, daß Parasiten irgendwelcher Art, bzw. durch iterierte Blutzerstörung die dauernde Mißfärbung der Entleerungen erzeugen, ungezwungener erklären als durch die Annahme, daß es sich hier, wo jedoch so viel dagegen spricht, um Dauerwirkungen giftiger Bestandteile in der Boermannahirse handeln könnte.

Der Granatfink, der hier in Frage kam, ging verhältnismäßig bald ein und wurde, da er gut befiedert war, intakt dem Naturhistorischen Reichsmuseum zu Stockholm überreicht. Gegen Ende seines Lebens zeigte der Vogel immer häufiger sich wiederholende Anfälle von Schüttelfrost, jedoch ohne auffallende Periodizität. Da nur einer der Granataftrilde, die ich im Laufe der Jahre gehalten, in dieser Weise erkrankt gewesen, liegt es nahe, zu vermuten, daß die Krankheit nur in gewissen Gebieten Südafrikas vorkommt nnd daß Vögel aus anderen Orten davon frei bleiben. Vielleicht ist Herr Mörs, falls er etwas über die Sache weiß, von der Liebenswürdigkeit, uns an dieser Stelle hierüber gelegentlich Auskunft geben zu wollen, als er nun schließlich seine sehr interessanten Beobachtungen über den Brutparasitismus der Widafinken zu veröffentlichen begonnen — welch letzteres nebenbei auch das Gute mit sich führt, daß ich nunmehr unverhindert sein dürfte bekanntzugeben, daß „die neueren Forschungen über ihr Wildleben", worauf ich mich in meinen Mitteilungen über denselben Gegenstand in Jhrg. 1922 S. 10 und in 1925 S. 26 bezogen, besonders betr. Königswitwe, Paradieswitwe und sog. Atlasfink samt deren Wirtstieren, eben auf die Beobachtungen von Mörs abzielten, mit dem ich vor 4—5 Jahren über Brutparasitismus verschiedener Vögel in Briefwechsel stand und auf dessen ausdrücklichen Wunsch die kurze vorausgeschickte Mitteilung in der „Ges. Welt" von mir abgefaßt und veröffentlicht wurde.

Was das Futter anbetrifft, teile ich völlig die Ansicht, daß importierte Vögel mit den Sämereien ernährt werden wollen, an welche sie vom Freien gewöhnt sind, bin aber, wie es aus früheren Veröffentlichungen hervorgehen dürfte, gar nicht überzeugt, daß dieses darauf beruht, daß gerade diese Sämereien und keine anderen diejenigen Bestandteile und Salze enthalten, welche die Vögel benötigen. Ganz sicher enthalten auch andere Futtersorten erforderliche Spezialstoffe — glücklicherweise für uns Vogelwirte muß man sagen! Denn wäre es nicht so, wäre es mit anderen Worten für die Ernährung des Vogels notwendig, daß er gerade diejenigen Futterstoffe erhält, welche im Freien seine Nahrung bilden — und diese können wir bekanntlich nicht einmal unseren einheimischen Arten vollständig verschaffen — dann müßten wir den Tierüberschützlern recht geben: Vogelhaltung wäre mehr noch minder eine einwandfreie Tierquälerei! Statt dessen ist aber ernährungsphysiologisch gesehen das wichtigste, daß der Vogel in verdaulicher Form diejenige Energiemenge erhält, welche er für seine tägliche Bewegung usw. braucht, und diejenigen Spezialstoffe, die für Erhaltung seines Organismus notwendig sind. Aus welchen Orten und Breiten diese dann kommen, das ist von diesem Gesichtspunkt aus von untergeordneter Bedeutung.

(Schluß folgt.)

Blaue Nachtigall (Text im nächsten Heft).

Der Kanarien-Stieglitz.

Von Paul Arens.

(Nachdruck verboten.)

In den Nummern des ersten diesjährigen Vierteljahres der „Gef. Welt" ist des öfteren vom Bastarde des Stieglitzes und Kanarienvogels die Rede. Es dürften den Lesern der „Gef. Welt" deshalb die folgenden Mitteilungen nicht uninteressant sein, zumal sie verschiedenes Unerwartetes, Rätselhaftes bringen.

Eine Zeitlang war ich leidenschaftlicher Kanarienzüchter, sogar gewissermaßen en gros, denn das eine Jahr habe ich einmal über 500 Junge in einer geräumigen Dachkammer gezogen, in der, nebenbei bemerkt, der Stamm überwintert war und zeitweilig 5° R Kälte ohne Verlust ausgehalten hat, dabei Schnee als Tränke bekam, sich darin sogar lustig hätschelnd badete, also durchaus nicht kältescheu war. Natürlich kam auch eine Zeit, wo mich „Bastardzucht" reizte. Zunächst wurden aus einem Grünlingsneste drei Junge aufgezogen und im nächsten Jahre ein Hahn mit einem grünen Kanarienweibchen in einem Heckbauer zusammengetan. Trotz eifrigem Aufforderns zum Treten seitens des Kanarienweibchens blieb der Grünling aber kalt wie eine Hundeschnauze, und die bald gelegten Eier erwiesen sich dann auch gänzlich unbefruchtet, nicht besser ging es in den folgenden Hecken. Ein Grünlingsweibchen wurde in die fliegende Hecke getan. Hier verhielt es sich anfangs gänzlich indifferent, aber dann zur Zeit der dritten Hecke der Kanarienvögel schritt es zum Nestbau. Durch das Guckloch konnte mehrfach beobachtet werden, daß es die Kanarienhähne, gleichviel ob sie gelb oder grün waren, zum Treten aufforderte, aber diese, sonst ja keineswegs spröde, machten nicht die geringste Anstalt, den Lockungen zu folgen. Es erwiesen sich denn auch die dann gelegten Eier als „unbefruchtet!". Der Versuch mit dem Grünling versagte wider Erwarten nach beiden Seiten hin.

Von befreundeter Seite wurde mir versichert, daß die Sache mit dem Stieglitz viel leichter vonstatten ginge, bloß pflegten die Stieglitze die fatale Angewohnheit zu haben, die Eier ihrer Weibchen anzuhacken und zu zerstören. Dem mußte also auf alle Weise vorgebeugt werden. Infolgedessen wurde der geräumige Heckbauer mit dem ungleichen Paare, „Stieglitzmännnchen eingewöhnter Wildfang des vorhergehenden Jahrs, und Kanarienvogelweibchen gelb und kräftig", in meiner Schlafkammer dem Bett gegenüber, mit vier Schritten erreichbar, aufgehangen. Sonnenschein erreichte den Bauer nicht, auch war die Kammer nicht übermäßig hell. Trotzdem gewahrte ich zu meiner Freude bald, daß sich der Stieglitz gegenüber den Lockungen des Kanarienweibchens durchaus nicht gefühllos verhielt und bald konnte sogar vollendetes Treten beobachtet werden. Als dann das Weibchen soweit war, daß es anderen Tages das erste Ei legen mußte, da hieß es, sich in den frühen Morgenstunden wach zu erhalten, um etwaigen räuberischen Gelüsten des Hahnes zuvorzukommen. Sobald das Weibchen nach dem Legen das Nest verließ, da war ich so flink wie möglich am Bauer, um das Ei zu sichern, aber schon war der Stieglitz mir zuvorgekommen und hatte es angehackt. Das Einfachste wäre ja gewesen, ihn vom Weibchen abzutrennen, aber das wagte ich nicht in der Meinung, die folgenden Eier würden dann unbefruchtet sein. Meine naturwissenschaftlichen Kenntnisse waren damals noch nicht so weit gediehen, zu wissen, daß die Eier viel früher befruchtet werden. Kurz, er blieb darin, aber meine Aufmerksamkeit verdoppelte sich. Am folgenden Tage stand ich schon neben dem Bauer, als das zweite Ei gelegt wurde und konnte es glücklich bergen, ebenso die drei weiteren, die das kräftige Weibchen noch legte. Sie wurden in der Flughecke einem anderen Weibchen untergelegt, die ihre Stiefkinder auch getreulich aufzog. Als dann die Stieglitzehefrau zur zweiten Brut schritt, da gelang es mir, drei Eier unversehrt zu bergen, das vierte verpaßte ich im Schlafe befangen abermals. Es fiel den Gelüsten des Stieglitzes richtig wieder zum Opfer. Daß das fortgesetzte Zwingen zum Wachbleiben für einen jugendlichen Menschen mit seinem noch regen Schlafbedürfnisse nicht angenehm war, läßt sich begreifen, überdies hatte ich ja schon 7 Bastardeier geborgen und konnte sehen, was daraus entstanden war. Kurz entschlossen wagte ich das gefährliche Experiment, das ungleiche Paar versuchsweise in der fliegenden Hecke der Dachkammer frei zu lassen. Daß ich den Rest des freien Tages, an dem das geschah, bis auf die notwendigsten Pausen am Guckloche verbrachte, versteht sich von selbst. Aber höchst verwunderlicherweise machte der Stieglitz nicht die geringste Miene, sich irgendwie an den zahlreichen Eiern zu vergreifen. Auch in der Folge hat er kein Ei angerührt. Wer erklärt den seelischen Beweggrund dieses veränderten Verhaltens? Es sollten aber noch mehr solcher Rätsel zu lösen sein.

Der Stieglitz hielt sich fernerhin stets zu seinem angestammten Weibchen, das sehr bald zur dritten Hecke schritt. Ihre da gelegten 4 Eier entpuppten sich aber später trotzdem als — reine Kanarienvögel —! Also „variatio delectat", muß auch mal anders gemacht werden! Es sollte aber noch toller kommen.

Trotz der Untreue seines Weibchens half der Stieglitz seine Stiefkinder mit aufziehen, erfüllte seine vermeintlichen Vaterpflichten durch eifriges Futtern ohne Unterbrechung. Am nächsten Sparren an derselben Sitzstange hatte ein teilweise grünes Kanarienweibchen sein Nest gebaut, nachdem es schon zwei Bruten mit Kanarien hinter sich hatte. Nun — wer sollte es glauben — dem dritten Gelege entsprossen vier Stieglitzbastarde, die es, ohne daß sich der Vater darum kümmerte, aufzog! Noch einmal: „Variatio delectat".

Dennoch erzielte ich also elf Stieglitzbastarde. Davon waren zehn Hähne und nur einer ein Weibchen. Trotz des gelben ersten und des bunten zweiten Weibchens war das Äußere der Hähne übereinstimmend eine Mischung von Stieglitz- und grünen Kanarienfarben, also keineswegs so bunt als man erwarten konnte, wenn auch die Zeichnung des Stieglitzes deutlich zu erkennen war, aber mit weit unscheinbareren Farbentönen. Das Weibchen war ein Teilalbino, im übrigen weit grauer als die Hähne; der Gesang ein Mittelding von Stieglitz und Kanarienvogel, die Strophen trotz der Kanarienvorsänger mehr stieglitzartig, aber satter und voller.

Nun zur Frage der Fruchtbarkeit: Diese Bastarde sind insofern „unfruchtbar", als sie zwar Geschlechtsprodukte ausreifen, also treten und Eier legen, diese aber nicht die Befähigung haben, lebensfähige Junge zu zeitigen. Das Weibchen legte in der fliegenden Hecke einmal vier Eier, sie waren zwar befruchtet, aber es bildeten sich darin keine lebensfähigen Embryonen. Bei zwei in verschiedenen Heckbauern mit Kanarienweibchen zusammengesetzten Bastardmännchen ging es ebenso. Auch deren Eier waren befruchtet, aber es entstand kein einziges Vögelchen daraus! Weitere Bastardversuche konnten nicht gemacht werden, weil die Kanarienzucht eines Umzuges wegen mangels passender Räumlichkeit in der neuen Wohnung aufgegeben werden mußte.

Es kann in der „Ges. Welt" auf dieses interessante Kapitel natürlich nicht näher eingegangen werden, aber es ist doch bemerkenswert, daß der Hergang bei den Salmoniden ganz derselbe war wie bei den Stieglitzbastarden. Man darf sich also nicht dadurch, daß Bastarde regelrecht treten und Eier legen, zu der Annahme verleiten lassen, sie seien fruchtbar. Das Entscheidende ist vielmehr, daß aus den Geschlechtsprodukten lebensfähige Nachkommen entstehen.

In Nr. 30 wurde gefragt, ob die Bastardkanarien ihren Gesang von selbst lernten oder ob ihnen Vorsänger gegeben werden müßten.

In meinem vorstehenden Beitrage über den Stieglitzbastard habe ich diese Frage kurz gestreift,



Waldlaubvogel

Weidenlaubvogel

Fitislaubvogel

(s. Redaktionsbriefkasten unter „Herrn M. K., Berlin.")

Ein Jahrzehnt später wandelte die stete Neigung, hinter die Geheimnisse der Natur zu kommen, die Liebhaberei, Kanarien zu züchten, in die Anlage einer größeren Forellenzuchtanstalt. Auch da wurden Versuche mit Bastardierung von Salmoriden gemacht, die hierbei ja insofern erleichtert sind, als die Salmonideneier wie bekannt künstlich befruchtet werden. Es zeigte sich auch hier dasselbe Bild. Die Mischung wenig verwandter Arten führte zwar zur Befruchtung der Eier, aber nicht zu lebensfähigen Formen. Näher verwandte Arten, wie z. B. Lachs und Forelle, brachten zwar 60—70 % lebensfähige Fische, die wieder sehr vertrauenerweckende Geschlechtsprodukte ausreiften, aber doch unfähig waren, lebensfähige Nachkommen hervorzubringen. Bei den Forelleneiern kann man infolge der durchsichtigen Eihülle die Entwickelung leicht und fortgesetzt verfolgen, sie differenzierte sich um so früher, je weniger verwandt die Arten waren.

indem ich bemerkte, daß dessen Gesang insofern ein Mittelding zwischen dem der Eltern sei, als er zwar vorherrschend die Strophen des Stieglitzes erkennen ließe, aber in fetteren, weniger zwitschernden Tönen. Ich möchte dem noch hinzufügen, daß die Bastarde den Gesang ihres Vaters, also des Stieglitzes, abgesehen von ihrer ersten Jugend nicht gehört hatten, sondern lediglich den der Kanarien. Nach Dr. Heinroth, Berlin, sollen allerdings Vögel, welche den Gesang ihres Vaters auch nur im Neste gehört haben, ihn später rein aus dem Gedächtnisse nachahmen können. Eine gewisse Stütze dieser an sich etwas befremdend anmutenden Ansicht kann in dem folgenden Ereignisse gefunden werden: Ein Rotkehlchen eines Bekannten, mit besonders eifrigem und lautem Gesange begabt, hatte den Schlag eines Buchfinken im benachbarten Garten oft gehört und bemühte sich verwunderlicherweise, ihn in seinen

vollendeten natürlichen Gesang mit einzureihen, was ihm in den Eingangsstrophen auch leicht gelang, nicht aber in der schweren Schlußstrophe, dem bekannten „Reutschja". Diese bestand bei ihm fortgesetzt nur in einigen zischelnden Lauten. Dieses Rotkehlchen wurde mir für eine längere Abwesenheit des Bekannten kurz vor Weihnachten in Pflege gegeben, hörte bei mir nie einen Finken schlagen, übte aber dessen Gesang fortgesetzt weiter, mit dem Erfolge, daß es im folgenden Februar dem zurückgekehrten Bekannten mit den vollem, durchaus deutlichen und ausdrucksvollen „Reutschja" des Buchfinkenschlages wieder abgeliefert werden konnte. Es hatte also den Schluß des Schlages rein aus dem Gedächtnisse nachgelernt. Das spricht allerdings für ein ausgeprägtes musikalisches Gedächtnis der Vögel. Nebenbei bemerkt hat dieses Rotkehlchen mit einem Weibchen-Wildfange wiederholt Junge erzeugt.

Notizen aus vergangenen Jahren.

Von A. Jena, Biberach/Riß.

(Nachdruck verboten.)

Ein glücklicher Zufall spielte mir ein Bündel alter Aufzeichnungen in die Hand, die mir so wertvoll erscheinen, daß ich sie durch die „Ges. Welt" einem größeren Interessentenkreise zugänglich machen muß. Diese Notizen stammen von dem verstorbenen Schmiedemeister Jakob Glöckler, der am 15. Oktober 1815 geboren wurde und später Besitzer der sogenannten „Stadtschmiede" in Biberach war, er starb ebenda am 9. Juni 1895 im 80. Lebensjahre. Sein Sohn Karl Glöckler lebt noch als ehrbarer Sattlermeister in der alten Biberstadt, ist wie sein Vater begeisterter Vogelliebhaber und deshalb ein guter Freund von mir. Von ihm habe ich auch die Notizen zur Sichtung erhalten, die vor allem erkennen lassen, daß der Schreiber derselben, von früher Jugend an bis zu seinem Tode, ein echter Vogelliebhaber gewesen ist. Seine Aufzeichnungen beginnen mit dem Jahre 1839, als er 24 Jahre alt war, und endigen mit dem Jahre 1891, obwohl er bis zu seinem Tode 1895 noch eine Nachtigall, eine Grasmücke und einen Bluthänfling, den er Geschos nennt, gepflegt; aber die schwere, abgearbeitete Schmiedehand war in den letzten Jahren nicht mehr fähig die Feder zu führen, man sieht es auch der Schrift von 1891 an, daß es ihm Mühe machte. — Diese Aufzeichnungen erstrecken sich also über einen Zeitraum von 52 Jahren und sind peinlich genau geführt. In der Hauptsache behandeln sie die Gesangsdauer der von ihm gekäfigten Vögel, und da er fast immer die gleichen Arten pflegte, so hat man hier ein sehr interessantes Bild über die Verschiedenartigkeit der Gesangsdauer, wie sie sonst kein Buch bietet. Aber auch allerhand andere wertvolle Notizen sind es, die uns fesseln, besonders die Briefe über den Sprosser- und Nachtigallenhandel, der ungarische Sprosserhändler, die damaligen Preise und was für die Biberacher Avifauna von großer Bedeutung ist: Das Vorkommen der Nachtigall. Sie wurde von ihm und seinen Freunden wiederholt gefangen. Heute ist sie verschwunden und man muß Glück haben, wenn man sie als Durchzügler in den Gärten des Ratzengraben beobachten kann. Dies zur Einleitung!

Beschrieb über meine Vögel.

Geschrieben den 14ten Sept. 1839.

1839. Eine Schwarzblatt hatte ich noch als mein Vater lebte, die habe ich ganz jung aufgezogen und habe sie 7 Jahre gehabt in einem Thurmkäfig. Jetzt habe ich 1 Singdrossel 1 Jahrlang und ist auch erst so alt, denn ich habe sie v. Kiefer Zink ganz jung gekauft. 1 Geschos (= bluthänfling) 1 Jahrlang, 1 Zeisig von Rattig. Den 19. Sept. Vom Georg Maier 1 Finken geschenkt bekommen, den 27. Sept. Vom Rach 1 Nachtigall gekauft; er hatte sie vom Wachszieher Ilg, der hatte sie 6 Jahre und hatt sie selbst in Pflummers Salzbüchsle gefangen vor 6 Jahren, sie soll ganz gut schlagen. Den Handel habe ich mit dem Rach so beschlossen, ich muß ihm 4 fl. für sie bezahlen, zwei mußte ich ihm gleich geben u. die andern zwei, wenn ich sie hole. Er muß sie mir füttern unentgeldlich bis Weihnachten oder wenn ich sie bälder hole, muß er mir die Klemmereier bis dorthin unentgeldlich liefern und 1 Maas muß er mir auch weiter geben, also kostet sie mich, die Klemmereier abgerechnet, 3 fl. 36 Kr. Am 27. Sept. habe ich sie zu haus genommen, jetzt mußte er mir also noch für die 12 Wochen bis Weihnachten 12 halbe und 12 viertels Schoppen geben, denn er hatt auf die Woche $\frac{1}{2}$ u. $\frac{1}{4}$ Schoppen gerechnet, dieses macht also zusammen noch 9 ganze Schoppen, folglich 53 krz. u. kostet mich also jetzt baar Geld 1 Kronenthaler. Kauft habe ich sie von meinem Stahlgeld, denn von diesem Geld kaufe ich das Futter u. die Vögel. Den 20. Okt. Von Rapp 1 Schwarzblatt gekauft, ist noch eine ganz junge, hatt gekostet 15 Kreuzer. Vom Kiefer Zink 1 Wachtel um 48 Kr.

1840. 1 junge Amsel und 1 Lerchen habe ich von einem bauernbuben gekauft 1 Viertelstund von Mittelbuch auf dem Weg nach Bebenhaus. Sie hatten gleich denselben Tag gesungen beide, es war am 11. März. Am 21. März wieder v. Rettig



Schwingenverhältnisse beim Fitis-, Weiden-, Waldlaubvogel

1 Distelfink gekauft, er hat ihn von seinem Lehrjungen, der hatt ihn vor 3 Wochen gefangen, kostet 24 Kr. Die Wachtel, wo ich von Kiefer Zink gekauft habe, war ganz heiser geworden und war nichts mehr wert. Dann habe ich von dem Kuhhirten Wäscher für die Wachtel eine Schwarzblatt und eine Grasmück bekommen, beide sind Männchen und singen ganz gut, also einen guter Handel gemacht. Im Juni habe ich vom Rach 2 Bastardnachtigallen gekauft um 1 fl. 12 Kr. (Spottvögel), eine ist ganz jung aus dem Nest genommen worden, die Eltern davon sind cabut worden; die andere ist eine alte und ist aber auch wahrscheinlich erst einjährig; die junge singt und ist also ein Männchen; am 24ten

Spielnest des Zaunkönigs.

Nov. hatt die junge wieder anfangen singen. Den 1. Januar 1840 habe ich die 1. Maas Klemmereier und dann noch gleich eine Maas dazu gekauft um 24 Kr., also 2 Maas geholt und gleich damit angefangen zu füttern. Den 9ten März hatte die Nachtigall zum erstenmal anfangen schlagen. Im Juni hatte sie wieder aufgehört. Den 14ten November ist dieser herrliche Vogel leider gestorben, den Tag vorher war er noch ganz wohlauf; am Morgen, wo ich ihm füttern wollte, war er cabut. Sie war ganz fett u. überhaupt schön und hatte den Tag vorher immer gut gefressen; es ist demnach nichts anderes schuld, als daß sie zu alt war. Sie war alt geworden 7 Jahre, nehmlich solange hatte man sie schon im Zimmer, wie alt sie war, als man sie fing, wußte man nicht. Als ich in meiner Naturgeschichte nachsuchte über die Krankheiten dieser Vögel, fand ich, daß sie an der Fettdrüsen starb; sie wurde zu fett und mußte ersticken.

Den 16. November bekam ich gleich wieder eine andere von meinem Freund Rettig, diese schlägt zwar nicht bei Nacht und nicht so laut, aber sehr rein und hatte vergangenes Jahr bei ihm 6 Monate geschlagen. Ich mußte ihm für sie bezahlen 1 Kronthaler, habe aber zu der Nachtigall noch $3^1/_2$ Maas Klemmereier bekommen die 96 kr. wert sind. Nun ist also die Zeit, wo sie alle Stund anfangen schlagen kann, das sie ist also noch wert, wo auch die Strichzeit vorbei ist. Am Anfang Dezember hatt sie anfangen schlagen. Von Rettig 1200 Mehlwürmer gekauft um 21 Kr.

1841. Den 1ten Mai als ich der Bastardnachtigall die ersten grünen Klemmereier fütterte, fing sie gleich an zu singen. Im Juli ist die herrliche Singgrasmücke vom Wäscher cabut worden. Im August sind beide Spottvögel cabut worden und sie noch grüne Klemmereier bekommen. Den 5ten Oktob. hab ich bei dem Rach für die Nachtigall 4 Maas dürre Klemmereier gekauft, die Maas zu 16 Kr.

1842. 31ten Januar hatt meine Nachtigall wieder anfangen schlagen. Im Februar an Lichtmeß hatt die Grasmücke angefangen, die Schwarzplatte schon an Weihnachten 1841, den 6ten Februar habe ich vom Rach wieder 1 schönen Distelvogel und 1 Hänfling gekauft zusammen um 48 Kr. Den 31 Dezember hatt die Nachtigall vom Rettig wieder anfangen schlagen.

1843. An Jakobi hatten die beiden Nachtigallen, die Grasmücke, Schwarzblatten u. Spottvogel aufhören zu singen. Anfangs September war mir der Hänfling beim Misten durchgekommen, es war ein vorzüglicher Sänger.

1844. Im Januar hatt die alte Nachtigall anfangen schlagen, an Lichtmeß die Grasmücke und der Lerch. Im Februar bin ich in Verlegenheit gekommen, es sind mir die Klemmereier ausgegangen und bekam sie nirgends, in Ulm u. Stuttgart keine; dann endlich habe ich von Memmingen bekommen, der Konduktör Lieb hatt mir's herüber genommen, sie waren so schön wie wenn sie grün wären, weil sie so schon waren habe ich . . . . Maas gekauft, die baierische Maas kostet 18 Kr, nach unserem Maß kam mich der Schoppen auf . . . Kr. Im Januar hat mir der Schreiner Rapp ein neues hohes Käfig gemacht mit 2 Abteilungen, weil ich um das hinter dem Ofen gekommen bin. Der Vogelhändler, wo in Österreich zu hause ist, an der ungarischen Grenze, hatt mir seine Adresse gegeben:

Andreas Biller, Vogelhändler
aus Ungarn im Orte Wiesen
Oedenburger Kometat.

1845. Im Dezember habe ich vom Wachszieher Ilg, alt, ein Schwarzblatt gekauft. dafür bezahlt 1 f. (=Gulden); sie soll ganz guten Schlag haben.

(Fortsetzung folgt.)

Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten.

Von J. Kuntzendorff, Berlin.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Pinostangare — Spindalis pretrii pinus *(Bang, Zappay).*

Diese Tangare gleicht im allgemeinen der Spindalis pretrii, ist aber weniger farbenprächtig als jene und verwaschener gefärbt. Beim Männchen ist die Kehle gelb und nicht goldgelb, das Kropfband ist mehr olivorangebräunlich und ist im Nacken weniger scharf abgegrenzt von der bräunlichdunkel-

Purpurtangare.

oliven Färbung des Rückens, der bei dieser Art den goldigen Schimmer entbehrt; Bürzel von der Farbe des Kropfbandes, nach dem Rücken hin gelblicholiv; der Schnabel ist stärker als der der Kubatangare. Lg. bedeutender 138—146, Fl. 70—76, Schw. 55—60 mm. Beheimatet ist sie auf der Insel Pinos. Ihr Freileben stimmt mit dem der Kubatangare überein.

Die Pinostangare wurde mir mit anderen Vögeln zur Bestimmung zugesandt und hielt ich sie anfangs für eine Kubatangare, bis mich die Unterschiede in der Gefiederfärbung auf diese Spezies brachte. Bei ihr hatte ich während der Eingewöhnungsperiode mit genau denselben Schwierigkeiten zu kämpfen, wie bei jener. Die Eingewöhnung wurde in gleicher Weise vorgenommen, nur dauerte es bei der Sp. pre. pinus noch bedeutend länger, bis ich sie als fest ans Futter gewöhnt betrachten konnte. Daß aber die Eingewöhnung sich nicht bei jedem Individuum dieser beiden Arten so schwer gestaltet, beweist eine briefliche Notiz, die ich zu der Zeit von einer mir bekannten schweizerischen Liebhaberin, Frau Reuter-Sulzer, erhielt. Bei dieser Dame hat sich die Kubatangare so schnell eingewöhnt, daß sie schon nach kurzer Zeit in den Flugraum gelassen werden konnte. Auch hier wieder eine Bejahung meiner Anfangs gemachten Ausführungen. Fest ans Futter gewöhnt, ist jedoch meines Erachtens der Vogel nicht viel weichlicher als die schon angeführten Tangaren, natürlich in der Voraussetzung, daß es sich um gesunde Exemplare handelt. Aber in Betracht ziehen muß man, daß diese Arten, nach den mir bekannten Stücken zu urteilen, in der Eingewöhnung mehr Mühe bereitete als die Calospiza.

Im Käfig sind beide sehr langweilige Vögel. Meist sitzen sie am selben Fleck, ohne sich viel zu rühren, und Bewegung kommt nur dann in sie, wenn sie ans Futter oder zum Baden gehen. Bemerkenswert ist die Art, wie sie Obst fressen; mit einer gewissen Gier lösen sie ziemlich große Stücke, die sie dann im Handumdrehen verschlungen haben. Daher ist es erklärlich, daß sie im Verhältnis zu den anderen beschriebenen Arten eine weit größere Menge Früchte konsumieren. Fest eingewöhnt waren sie auf in Milch eingeweichtes, überzuckertes Eierbiskuit sehr erpicht, das sie dann und wann als Abwechslung erhielten. Solange ich sie im Käfig hielt, ließen sie keinen Ton hören, stumm, wie ein Olgötze, und still und starr

wie Lots Weib, saßen sie da, nur wenn der Magen sie daran erinnerte, daß es Zeit wäre, auch ihm wieder Arbeit zu verschaffen, kam zeitweilig Leben in die regungslose Gestalt. Als Käfigvögel sind Sp. pretrii und Sp. pr. pinus die langweiligsten Tangaren, die ich je verpflegt und je zu Gesicht bekommen habe. Im Flugraum waren sie bedeutend lebhafter und beweglicher, wenngleich sie mit den vorgenannten Arten nicht zu vergleichen waren. Die hielten sich meist in den obersten Zweigen der dichten Gebüsche beider Flugräume auf und mieden einzeln angebrachte Äste. Ihre gänzliche Harmlosigkeit bewiesen sie durch Verträglichkeit mit den übrigen Volierenin sassen und dadurch, daß sie selbst schwächeren Vögeln gegenüber das Feld räumten, sowie diese sie etwas energisch dazu aufforderten. Ihr ansprechendes Gefieder kommt besonders im Sonnenschein zur Geltung. Der Gesang, der mit dem Moment des Fliegenlassens im Flugraum sich einstellte, ist angenehm, melodiös und hat gewisse Ähnlichkeit mit dem der Gelbbauchammer — Emberiza flaviventris *Steph.* Wie alle mir bekannten Tangaren, so zeigen auch die Kuba- und die Pinustangare eine gewisse Zurückhaltung dem Pfleger gegenüber. Zutraulich sind sie bis zu einem gewissen Grade, denn betritt man die Voliere, so halten sie sich fast stets in der Nähe auf und fliegen auch nicht fort, wenn man sich unter ihrem Sitzplatz zu schaffen macht. Aber zahm wurden sie nicht, sie daran gewöhnen zu wollen, Leckerbissen aus der Hand zu nehmen oder gar auf den Finger zu kommen, wäre verlorene Liebesmühe. Sie bevorzugten freistehende Zweige dichter Gebüsche in den höchsten Lagen und flüchteten bei vermeintlicher Gefahr in das sicheres Versteck bietende Gestrüpp. Auf die Felspartie kommen sie nur zum Trinken und Baden, auf den Boden, wo sie sich hüpfend bewegen, nur zur Nahrungsaufnahme. Beim Obstfüttern sind sie eine der ersten, die sich bei den Obsthaltern einfinden; sie besitzen eine erstaunliche Ausdauer im Vertilgen der Früchte und lassen sich so leicht von anderen Vögeln nicht von dem einmal auserwählten Obststück vertreiben. Mehlwürmer rühren beide nicht an, auch habe ich nicht feststellen können, daß sie Sämereien zu sich nehmen.

Von den in der Folge zu erwähnenden Tangaren fasse ich die Gattungen

Samttangaren — Ramphocoelus *Derm.* und Tangaren — Tanagra *L.*

in der Allgemeinbeschreibung zusammen, da diese beiden Gattungen in ihrer Ernährung und ihrem Wesen vieles gemeinsam haben. Ist bei den vorerwähnten das Obst als Nahrung in den Vordergrund getreten, so nimmt bei diesen beiden Gattungen entschieden die animale Kost mehr den Hauptbestandteil in der Ernährung ein, wenngleich auch Obst und Beeren wie bei allen Fruchtfressern einen wichtigen Bestandteil derselben ausmachen. Nach meinen Beobachtungen und meiner Überzeugung tritt die Fruchtnahrung bei diesen Vögeln bedeutend mehr in den Hintergrund, was besonders bei der Eingewöhnung zu merken ist, und ist, trotz der großen Vorliebe für dieselbe, erst an zweiter Stelle zu nennen. Während von anderer Seite mitgeteilt wird, sie würden hin und wieder auch Sämereien fressen, habe ich solches nicht beobachtet; diese wurden von ihnen bei mir nie angerührt. Sie kommen im tropischen Amerika vor, wo sie dichte Wälder ebenso wie Gärten und Pflanzungen bevölkern. Sie bevorzugen die höchsten Äste und die Wipfel der Bäume, zur Brutzeit aber suchen sie die niederen Teile derselben auf und bauen dort ihre Nester, da diese hier besseren Schutz und günstiger versteckte Lage ihnen bieten. Im großen und ganzen gilt das bei den vorerwähnten Gattungen Gesagte auch für diese beiden. Im Käfig gehalten zeigen sie sich als etwas phlegmatische, ruhige Vögel, die dem Vogelwirt eigentlich nur durch die Farbenschönheit des Gefieders Interesse abgewinnen. Im Flugkäfig oder Flugraum hingegen entfalten sie ihr natürliches und interessantes Wesen in vollem Maße und entpuppen sich als bewegliche und temperamentvolle Vögel. Im allgemeinen gelten die Tanagra-Arten als verträglich, während dagegen die Samttangaren für das Gegenteil, für unverträglich, gehalten werden.

Die Purpurtangare — Ramphocoelus brasilius *(L.)* (s. S. 546).

Dieser zu den Samttangaren gehörende Vogel gehört mit zu den schönsten dieser Familie, hat er doch nicht nur den Vorzug, in der herrlichsten Farbenzusammenstellung zu prangen, sondern auch den, daß er dieses Farbenkleid das ganze Jahr über trägt und sich zum Winter nicht in ein unscheinbares, grünes verfärbt. Das Männchen ist leuchtend blutrot am ganzen Körper außer an Flügel, Schwanz und Schenkel, die tiefschwarz sind; Auge rot, Schnabel schwarz, Unterschnabel an der Wurzelhälfte bläulichweiß, Füße schwarzbraun. Lg. 170—187, Fl. 82 bis 84, Schw. 70—84 mm. Das Weibchen ist am Oberkopf und Oberrücken dunkelbraun mit rötlichem Schein; übrige Oberseite schwärzlichbraun; Bürzel rosttrötlich; Kehle matt gräulichbraun; übrige Unterseite düster braun, rötlich schimmernd; Flügel und Schwanz oliv- bis schwärzlichbraun; Auge rot, Schnabel heller braun mit blassem Unterschnabel, Füße fahlbraun. Das Verbreitungsgebiet ist Ost- und Südbrasilien. Die Vögel aus den südöstlichen Gebieten haben dunkleren, purpurroten Rücken (R. b. dorsalis *Sel.*). Die Purpurtangare lebt im Flachland in den Gebüschen der ausgedehnten, mit Schilf bestandenen Sümpfe an den Mündungen der Flüsse und an diesen selbst, ebenso auch in den angeschwemmten Gebieten dieser Gegenden, besucht auch wohl die mittleren Höhenlagen der Gebirge, meidet dagegen die Gebirgstäler in den höchsten Lagen. Man findet sie in kleinen Schwärmen, aber nur lose miteinander verbunden, so daß man sie nur einzeln, bald Männchen, bald Weibchen, im Blätterwerk beobachten kann. Das Nest wird im Gebüsch, auf mit Riedgrasbüschen bestandenen, vom Sumpf umgebenen Hügeln, zwischen den Halmen gut versteckt, angelegt und hat eine flache, muldenartige Form. Es wird ziemlich kunstlos aus Blütenstengeln, Binsen, Schilfblättern, Wurzelchen, Halmen und Moos gebaut und ist mit feinen, zarten Stengelchen gepolstert. Das Gelege besteht aus 2—3 glänzenden, grünlichblauen, tiefschwarz oder schwärzlichbraun gefleckten Eiern.

Es ist ein seit alters her bekannter Vogel, der aber später infolge der Verwechslung mit anderen roten Vögeln bei Beginn der Liebhaberei für fremdländische Vögel völlig vom Markte verschwunden war und erst wieder in späterer Zeit bekannter wurde.

(Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Bastarde von Buchfinkweibchen × goldgelbes Kanarienmännchen. Die verschiedenen Mitteilungen über Bastarde Buchfink × Kanarienvogel in den letzten Heften der „Gef. Welt" 1925 veranlassen mich mitzuteilen, daß Herr Ulysse Haldy-Nyon (Schweiz) in den „Mitteilungen über die Vogelwelt" 1923, Heft 1, Seite 22 ebenfalls einen diesbezüglichen Zuchterfolg meldete. Er schreibt daselbst unter anderem wie folgt: „ . . . . . , dagegen glückte mir eine Zucht Buchfinkenweibchen × goldgelbes Kanarienmännchen. Das Finkenweibchen brütete gut aus, aber die fünf Jungen (drei Männchen und zwei Weibchen) habe ich dann doch lieber einem zuverlässigen Kanarienbrutpaar untergelegt, das sie auch alle gut aufzog. Die Bastarde waren sehr merkwürdige, in der Färbung höchst aparte Vögel." Vielleicht läßt sich Herr Haldy herbei, über diese interessanten Bastarde einmal näher in der „Gef. Welt" zu berichten. Wilhelm Schreitmüller, Frankfurt a. M.

Zucht von Feldsperlingmännchen mit Haussperling-Albino-Weibchen. Unter Bezugnahme auf meine Mitteilung auf Seite 247 teile ich Ihnen mit, daß die beiden diesjährigen Sperlingsbastarde die Mitte zwischen der Färbung eines Haus- und Feldsperlings halten und ohne jede weiße Feder sind. Im vorigen Jahre hatte ich mehrere Junge, die vereinzelte ganz weiße Federn hatten.

Karl Rinke.

Aus dem Kreise Isenhagen (Lüneburger Heide). Seit 15 Jahren konnten wieder der graustirnige Würger und zum ersten Male überhaupt der Zwergfliegenfänger, letzterer im Hagen bei Isenhagen, festgestellt werden. Dort konnte ich auch eine Rabenkrähe mit grauweißen Flügelspitzen beobachten; sie hielt sich von den übrigen Geschwistern des Geleges gesondert. Den Dompfaff, den ich jahrelang nicht mehr beobachtet hatte, konnte ich in drei Pärchen zur Brutzeit bestätigen. Die Gebirgsbachstelze ist Brutvogel an der Emmener und der Hofemühle sowie am Klosterbach in Isenhagen. Der Wiedehopf ist bei Wittingen gesehen worden. Der Schwarzstorch, über dessen Erscheinen an der Ilmenau bei Bockel ich bereits berichtete, ist in einem fiskalischen Forstbezirk, dessen Namhaftmachung ich absichtlich vermeide, Horstvogel. Bliebe er dies, so könnte man sich fast über das endgültige Verschwinden des Schreiadlers als Horstvogel im Forstbezirk Hagen bei Sprakensehl hinwegtrösten. Hübner, Oschersleben (Bode)

(in Deutsche Jägerzeitung 1925).

Bei dem sich an den Besuch des „Naumann-Museum" am 4. Oktober anschließenden Ausflug des Vereins für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Dessau nach den **Trebbichauer Teichen** wurden u. a. festgestellt: 1 Buchfink, im vollen Schlag, Bergfinken, 2 Grauammern, Bachstelze, Feldlerche, Wiesenpieper, Rohrammer, Goldhähnchen, Stare, Sumpfschnepfe, gr. Buntspecht, 5 rote Milane, Bläßhuhn, Trauer-Seeschwalbe, weiße Seeschwalbe, Haubentaucher, Schwarzhalstaucher, Rothalstaucher, Zwergtaucher, Schellente, Moorente, Tafel-, Stock-, Krick- und Knäckente. Erich Dielitzsch.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 25: Seit Anfang September besitze ich einen Grauedelsänger, gekauft ohne Geschlechtsgarantie. Ob es nun ein Männchen oder Weibchen ist, konnte ich bis jetzt noch nicht feststellen, er läßt seinen Lockruf laut und auch sehr fleißig von früh bis abends ununterbrochen hören, aber an ein Singen denkt er nicht. Lockt ein Weibchen auch? In welchen Monaten fällt die Gesangszeit der Grauedelsänger? Mit welchem Vogel könnte ich ihn im Käfig zusammenhalten? Sein Käfig ist 40 cm lang, 30 cm hoch und 23 cm tief. Als Futter erhält er Hirse, Glanz und Mohn, auch Vogelmiere. Ist die Fütterung richtig? Welcher Liebhaber würde mir genauen Aufschluß geben?

Alexander Eckhold.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Max Dähnick in Berlin NO 18, Gr. Frankfurter Str. 90, Ecke Markusstr. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten

F. M. H. Daßler, Gera-Reuß, Hohenlohestraße 1: Nachtigall-Edel-Kanarien.

Knapp, Lübeck, Eschenburgstraße 16: Isabellkanarien.

Dr. med. Wilh. Uter, Lübeck, Breitestraße 181I: Isabellkanarien, cayennegefütterte Kanarien (Yorkshireabstammung).



Herrn H. H., Braunschweig. Die Hoden der Vögel haben verschiedene Form. Bei manchen Arten sind sie oval, bei anderen kugelförmig usw. Ihre Größe ist abhängig vom Alter der Vögel und der Jahreszeit, ihre Farbe in der Zeit der Begattung meist gelblich, sonst grau. Es kommt auch schwarze Pigmentierung vor, die bei beiden Organen nicht gleichmäßig zu sein braucht.

Herrn A. L., Pfarrkirchen; Herrn H. H., Braunschweig; Herrn H. W., Bruchmühle; Herrn J. K., Berlin N: Beiträge dankend erhalten.

Herrn A. G., Tiengen. Der Brief ist mit Adresse versehen weiterbefördert worden.

Herrn A Sch., Dresden-A. Der Kadaver ist hier nicht eingetroffen.

Herrn M. K., Berlin. Die drei bei uns vorkommenden Laubvogelarten (s. Abb. S. 543) werden am sichersten durch Form und Länge der Schwingen unterschieden. Die Schwingenverhältnisse stellt die Abb. S. 544 dar.

Herrn K. R., Rochlitz. Eine Wärme von + 18—20° C ist in einer mit ausländischen Vögeln bevölkerten Vogelstube notwendig. Das nächtliche Sinken der Wärme auf + 10 bis 12° C ist nicht nachteilig. Für Schmetterlingsfinken und andere dünnschnäblige Webefinken ist neben gekeimten und halbreifen Sämereien das beste Aufzuchtfutter frische Ameisenpuppen, kleine frischgehäutete Mehlwürmer u. dgl., in der kälteren Jahreszeit gibt man ein Gemisch von Vogelbiskuit, auch Erbsenmehlgebäck, gequollenen, trockenen Ameisenpuppen und hartgekochtem Hühnerei, feingehackt. Die Bestandteile zu gleichen Teilen. Importierte Zebrafinken kann man sofort zur Brut schreiten lassen. Das ♀ des Braunkopfamaranten ist schwer von dem der kleinen Amaranten zu unterscheiden. Es ist meist dunkler.

Fräulein J. H., Lodz. Bezugsquellen können an dieser Stelle nicht angegeben werden. Antwortkarte einwenden.

Herrn E. L., Neukölln; Herrn B. Sch., Halle a. S.: ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn S., Leipzig. Der Vogel ist der Braunstärling — Molothrus badius *(Vieill.)* aus Argentinien.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Lauchgrüne und gelbbäuchige Papageiamadinen. Von H. Wagner, Bruchmühle.

Das Liebhaberjahr. Plauderei von J. Birk, Leipzig. (Forts.)

Versuche die Gründe des Weißwerdens bei einem gefangenen Granatastrild zu analysieren und ein paar Worte über das Gefangenleben der Art. Von A. Adlersparre. (Forts.)

Der Kanarien-Stieglitz. Von Paul Arens.

Notizen aus vergangenen Jahren. Von A. Jena, Biberach/Riß.

Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten. Von J. Kuntzendorff, Berlin. (Forts.)

Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Ausstellungen - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellungen.

Der Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden, gegr. 1906 (vorm. Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden), veranstaltet in diesem Jahre vom 4. bis 7. Dezember seine Vogelschau im Italienischen Dörfchen. Ausgestellt werden einheimische und fremdländische Sing- und Ziervögel. Auch in der diesjährigen Vogelschau soll der Gedanke, wie die Vogelpflege und der Vogelschutz geübt werden, veranschaulicht werden. Alle Vogelliebhaber sind herzlich willkommen.

Die Ausstellungsleitung.

Der Verein der Freunde von Sing- und Ziervögeln in Lübeck erlaubt sich hiermit, alle Sports-Vereine und Freunde zu seiner am 12. und 13. Dezember 1925 stattfindenden Allgemeinen Ausstellung ergebenst einzuladen. Das Standgeld beträgt für Kanarien pro Kollektion 8 M., für Ziervögel pp. in Käfigen bis 50 cm Länge 1.50 M., bis 120 cm Länge 3 M. pro Käfig. Anmeldeschluß: 1. Dezember 1925. Als Preise kommen außer Ehrenpreisen 32 echte Medaillen (teilweise Senatspreise) zur Verteilung.

Herbert Müller, Lübeck, Hüxstraße 119

Aus den Verbänden.

Vereinigung d. Vogelliebhaber Landesverband Preußen. 1. Vors. Karl Gumprich, Berlin W 50, Nürnberger Str. 44 III; Geschäftsstelle: 1. Schriftf. P. Böhme, Berlin O 17, Rüdersdorfer Str. 69; Kassierer: Erich Merz, Bln.-Friedenau, Wilh.-Hauff-Str. 14. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt". Schriftwechsel grundsätzlicher Art ist an den 1. Vors., im übrigen an die Geschäftsstelle (2. Vors.) zu richten. Geldsendungen: Postscheckkonto Berlin NW 7 Nr. 46155 für Erich Merz. — Aufgenommen wurde Herr Franz Krones, technischer Beamter, Rathenow a. d. Havel, Leimfabrik.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Sitz Leipzig. 1. Vors. Hermann Höhne, Leipzig-Volkmarsdorf, Eisenbahnstraße 84 IV. 1. Schriftf. Max Hunger, Leipzig-Gohlis, Polizeigebäude Zimmer 196. Kassierer Ludwig Böttcher, Leipzig, Inselstr. 17 II. Girokasse Leipzig, Nr. 6317. Postscheckkonto Nr. 53319. — Die angeschlossenen Vereine wollen bei Einzahlungen die im Kopf des Landesverbandes angeführte Postscheknummer der Giro-Kasse mit angeben, damit eventuell Rückgänge von eingezahlten Beiträgen vermieden werden. Hunger, Schriftf.

Aus den Vereinen.



Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Postscheckk. Hannover 56714; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10.

Angemeldet sind die Herren Franz Feitback, Fabrikbesitzer, Hannover, Andertensche Wiese 20; Bruno Goldschmitt, München, Leopoldstr. 40 II; M. Reichard, Berlin W 30, Nollendorfstr. 15 III; — Im Gegensatz zu der Voranzeige von der Münchener Jahresversammlung gebe ich nachstehend den wohlerwogenen Beschluß des Vorstandes bekannt: **„In Anbetracht der schlechten Wirtschaftslage und des damit verbundenen Ausfalles der Vogelschauen hat sich der Vorstand veranlaßt gesehen, die im November geplante Jahresversammlung zu verlegen und dafür im nächsten Jahre eine gemeinsame Pfingstfahrt nach Hamburg-Stellingen-Großvorstel, der Hochburg des Exotenhandels, mit gleichzeitiger Generalversammlung zu beschließen. Der Vorstand hofft im Sinne der Mitglieder gehandelt zu haben."** Den Mitgliedern wird rechtzeitig zum 1. Dezember, dem Schluß des Vereinsjahres, die Liste für die Bestandsangaben zugehen. Ich bitte schon heute um achtsame Behandlung derselben und Rücksendung bis spätestens den 10. Dezember, da am 15. Dezember die Ablieferung an die Druckerei erfolgen muß. Stichtag für die Bestandsaufnahme ist der 1. Dezember 1925. A. Krabbe.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögeln in Apierbeck. Sitzung jeden 1. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, in der Wirtschaft Sprave, früher Fritz Lecking, Kirchstraße. Fritz Lecking, 1. Vors.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstraße 37 a. Gäste stets willkommen. — Sitzung vom 15. Oktober 1925. Die gut besuchte Sitzung eröffnet der Vorsitzende, Herr Merz, um 8¾ Uhr mit der Begrüßung der Mitgleder und im besonderen des Herrn Milke vom Verein „Aegintha". Nachdem das Protokoll, der Bericht über das 30. Stiftungsfest und die eingegangenen Schreiben und Offerten erledigt waren, nimmt Herr Merz das Wort zu seinem angekündigten Vortrag: „Die Orpheusgrasmücke". Der Herr Vortragende spricht über diesen Vogel, in erster Linie über Käfigleben, Ernährung, Gesang, Mauser, Vorkommen, Angebot, Preis usw. Alle Vögel, welche er bisher gekäfigt hat, haben seinen Erwartungen nicht entsprochen. Der Herr Vortragende erntete reichen Beifall. Zur Debatte erhält zunächst Herr Wagner das Wort. Der Herr Redner spricht über das Freileben der Orpheusgrasmücke. Auf seinen langjährigen Reisen habe er diesen Vogel hauptsächlich in den Küstengegenden von Dalmatien, Italien, Spanien und Algier angetroffen, dagegen nicht in Bosnien und der Schweiz in der Gegend am Gardasee. Die Vögel in Monte Carlo, in Spanien, in Malaga und Granada waren gesanglich minderwertig, dagegen in der Riviera und Algier gesanglich gut. Daß die Liebhaber keine guten Sänger erhalten, mag daran liegen, daß entweder junge Vögel zum Versand kommen oder während der Brut gefangene. Örtlichkeitsvögel mögen auch eine Rolle spielen. Der Vortragende, Herr Merz, hatte vom Naturhistorischen Museum zwei präparierte Vögel zur Stelle, ein Weibchen aus Tunis, ein Männchen aus Spanien. Herr Rückert ist der Ansicht, daß hier ein Irrtum vorliegt. Er halte beide Vögel für Männchen, dagegen den Vogel aus der Vereinssammlung, welcher als Männchen bezeichnet ist, für ein Weibchen. Seine Erkennungszeichen sind die äußeren Schwanzfedern der Vögel, welche beim Männchen rein weiß sind, beim Weibchen dagegen matter und verwaschen. Mehrere Mitglieder teilen die Ansicht des Herrn Rückert. Herr Milke erklärt dazu, daß an den Angaben der Wissenschaft wohl nicht zu zweifeln sei, denn die Vögel würden auf das Geschlecht hin untersucht. Es ist erwünscht, wenn sich zu dieser Sache die Liebhaber in der „Gef. Welt" äußern. Das Pathologische Institut in Berlin befaßt sich mit der Untersuchung kranker, eingegangener Vögel auf Parasiten. Herr Milke als Gast vom Verein „Aegintha" bittet die Mitglieder der Vereinigung, gemeinsam mit den Mitgliedern der „Aegintha" die Sache zu unterstützen durch Übersendung eingegangener Vögel zu Händen des Herrn Prof. Noelle. Zu diesem Zweck verteilte Herr Milke fertig adressierte Kartons zur Einsendung der Vögel. Im weiteren teilt Herr Rückert die Beobachtung einer großen Anzahl nahrungsuchender Wildgänse mit und den Zug zahlreicher Rotkehlchen, welche er in so großen Massen noch nie gesehen hat. Die sehr lehrreich verlaufene Sitzung wird um 11¼ Uhr geschlossen. P. Böhme, Schriftf.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke, Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Verein für Vogelkunde und Geflügelzucht Breslau. Vogelliebhaber Breslaus, wollt ihr euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei nicht endlich auch zusammenschließen, wie es in anderen Städten schon längst geschehen ist? Ein Stamm von erfahrenen Vogelpflegern ist vorhanden, jedoch können Fortschritte nur erzielt werden, wenn alle noch abseits Stehenden sich uns anschließen und unsere mit belehrenden Vorträgen verbundenen Vereinsabende besuchen. Auskunft ert. bereitwilligst P. Spitzner, 1. Schriftf., Ofener Str. 26.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Dessau und Umgegend. Gegr. März 1925. Vereinslokal „Fürst Blücher", Ecke Antoinetten-Leopoldstr. Versammlung jeden 2. Mittwoch, abends 8 Uhr. — Nächste Versammlung am 25. November. Gäste zu allen Veranstaltungen stets willkommen. J. A.: Dieltzsch, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Restaurant „Zum Löwentor", Königswall 75.
J. A.: P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Versammluna jeden Freitag, abends 8 Uhr, im Vereinsl. „Bienenkorb", Schloßstr. Vogelliebhaber als Gäste jederzeit willkommen. J. A.: E. Schubert, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Eliesenhof", Eliesenstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Mittelthüringens Sitz Erfurt. Sitzung jeden 2. Mittwoch und jeden letzt. Sonnabend im Monat im Vereinsl. „Stadt Chemnitz", Thomasstr. 57. Näh. Auskunft erteilt Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Vereinigung einheimischer Waldvogelliebhaber zu Görlitz und Umgegend. Zusammenkunft jeden 3. Sonnabend im Monat im Restaurant „Zum Bismarckgarten", Bismarckstraße. 1. Vors. W. Lücker in Görlitz, Konsulstr. 7. Vogelliebhaber als Gäste willk. J. A.: Erich Rothe, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 17. November. A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Der Hannoversche Vogelschutzverein zu Hannover, gegr. 1881, wirkt mit sichtbarem und anerkanntem Erfolge für Vermehrung und Schutz der Vogelwelt bei Hannover durch Aufhängen von jährlich einigen hundert Nistkästen aller Art, durch Erweckung von Interesse und Liebe für die Vogelwelt mit monatlich, zur Gesangszeit wöchentlich stattfindenden Belehrungsspaziergängen und durch Vorträge und Austausch der Beobachtungen in den jeden dritten Dienstag des Monats stattfindenden Vereinsversammlungen. Seine Bestrebungen dienen also lediglich gemeinnützigen Zwecken. Mitgliederzahl rund 1200, jährlicher Beitrag nur 1 M. Meldungen an den Vorsitzenden Herrn Fritz Becker, Hannover, Boedekerstr. 1 F.
Becker.

Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber. Die nächste Vereinssitzung findet am 12. November im Vortragssaal des Provinzial-Museums als Lichtbilder-Vortrag statt. Herr Schüz spricht über „die Rätsel des Vogelzugs". Kostenlos für Mitglieder, Angehörige und Vogelfreunde. Die Dezember-Versammlung am 10. wird wieder im Landesheim abgehalten.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel Hörde. Gegr. 1920. Vereinslokal: Ungewitter, Bruchstr. Versammlung regelmäßig aller 14 Tage, von Oktober bis April um 6 Uhr abends, in den Sommermonaten um 8 Uhr abends. Gäste willk. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Versammlung aller 14 Tage Sonnabends. Vereinslokal: Gasthaus „Zur Krone", Jena, Grietgasse. Gäste stets willkommen. Jena besuchende Vogelliebhaber treffen jeden Sonntag vorm. den Schriftführer Adolf Voigt, Jena-Ost, Feodorastraße 13, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube freundlichst eingeladen. — Die am 31. Oktober abgehaltene Versammlung war von 12 Mitgliedern und 2 Gästen besucht. Herr Bischoff hielt einen Vortrag über die Berechtigung der Käfigung von einheimischen Stubenvögeln. Der Schriftführer trug einige Artikel aus dem „Tag" über das Verhalten der Vögel bei Blitzgefahr und über den Uhu als Jagdgehilfen vor. Die nächste Versammlung findet am Sonnabend den 14. Nov. statt. Herr A. Voigt wird über ausländische Zier- und Singvögel berichten.
Adolf Voigt, Schriftf.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an!

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal bei Gastwirt Lapschies, Kaiserstr. 46 a. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 19. Nov. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Laßner im Volkshaus-Nord, Glogauer Str. 20. Liebhaber willk. J. A.: Friedrich.

Verein der Vogelfreunde Linden. 1. Vors. P. Winkel, Linden, Fröbelstr. 9.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße.
gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Sitzung aller 14 Tage im Restaurant „Zum Neckarstrand", Messeplatz 1. Liebhaber willkommen. Joh. Daubmann, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Der Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. hat sein Vereinslokal von Mitte November d. J. ab nach der Gastwirtschaft Augustusburg, inn. Leipziger Straße, verlegt. Nächste Versammlung im neuen Vereinslokal am 20. November 1925, abends 8 Uhr. Im übrigen finden die Versammlungen jeden Freitag nach dem 1. und 15. im Monat statt.
Paul Schmidt, 1. Vors.

Achtung! **Am 15. d. M. erhebt die Post die Bezugsgebühr für Dez. Wir bitten den Betrag bereit zu halten, damit die Quittungen beim ersten Vorzeigen eingelöst werden und keine Unterbrechung in der Belieferung eintritt. Wo der Briefträger die Quittungen nicht vorzeigt, ist er daran zu erinnern. Bei Bestellung nach dem 25. erhebt die Post eine Extragebühr von 20 Pfg., die vermieden werden kann, wenn die Zeitschrift rechtzeitig bestellt wird.**

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld p
Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zwec

Käfige u. Gerätschaften

Baue auf Bestellung
Käfige jeder Art
und ganz nach Wunsch für jeden Vogel. Saubere Handarbeit, keine Massenware. Bei Bestellungen und Anfragen bitte Rückporto. [1526
A. Klaus, Seifhennersdorf 179.

Vogel-Mistelleim
zum Fangen schädlicher Vögel, Ia klebend bei jeder Witterung, garantiert gebrauchsfähig, Dose 2.— M. fr. von **A. Freitag Nchf., Frankenberg i. S. 6.** Wiederverkäufer hohen Rabatt. [1527

Futtermittel

Mehlwürmer
veg. gez., 1/4 Liter franko gegen Voreinsendung von RM. 2.—. [1528
Bonitas-Versand, Rostock i. M. 3.

Mehlwürmer
(das ganze Jahr hindurch)
M 5.— das Pfd., ausschießl. Porto u. Verp.; bei Abnahme von 6 Pfd. Porto u. Verpackung frei.

Ia Ameiseneier
1925er, 4.— *M* per Pfd.
Postkolli 9 Pfd. netto 31.50 *M* franko.
Ia Weißwurm, 1925er 4.— d. Pfd.
Ia Muska-Zecken . . 1.50 d. Pfd.
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen 0.75 d. Pfd.

ff. Universalfutter
Alleckwa I für Nachtigallen *M* 2.—
„ **II für Grasmücken** *M* 2.—
„ **III für Drosseln** . . *M* 1.50
das Pfund ab hier, ausschl. Verp.; bei größeren Mengen billiger. [1529
Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
A. Eckrich II, Waldsee (Pfalz).

Mehlwürmer
à Pfund 5.60 *M*, 1/4 Pfund 2.— *M* franko gegen Voreinsendung

Ia Ameiseneier	Pfd. 4.— *M*
Ia Muska	Pfd. 1.50 *M*
Ia Weißwurm	Pfd. 4.50 *M*
Seidenraupenschrot	Pfd. 0.75 *M*
Garneten gem.	Pfd. 0.35 *M*

Alles diesj. Ware, à Pfund ab hier.
Th. Witte, Niederndodeleben b. Magdeburg. [1530

Mehlwürmer
1 Pfd. 5 *M* ab hier,
6 Pfd. franko und Verpackung frei,
geg. Voreinsendung 1/4 Pfd. 2 *M* franko.

Ia Ameiseneier
1925er, 1 Pfd. 4 *M*, 9 Pfd. 31.50 franko.

Ia Weißwurm, 1925er,
Pfd. 4.50 *M*, 9 Pfd. 36 *M* franko.

Ia Muska-Zecken
1531] Pfund 1.50 *M*.

Ia Seidenraupenpuppen
gemahlen Pfd. 0.75 *M*.
Großabnehmer Rabatt.
Karl Claus, Mutterstadt II
(Hauptbahnhof).

Unübertroffen ist

Heidelberger Vogelfutter,

hergestellt nach Vorschrift und unter Kontrolle von
Professor Dr. Otto Fehringer
durch
GENO-WERK ~ Mannheim
Rheinkaistraße 8 b.

Anfragen über die Pflege einheimischer Vögel werden gerne beantwortet. Rückporto beilegen. [1532

Bei Anfragen und Bestellungen bitten wir, sich auf die „Gef. Welt" zu berufen

„ORNIS" Freie Bezugsvereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands.
Gegründet 1912 .·. Fernsprecher 4198 [1533
Fachgemäße Belieferung mit Vogelfutter („Reform-Normal", individuelle Zusammensetzung bei restlosem Verbrauch; stets frisch gemischt). Hunderte von Liebhabern füttern seit über einem Jahrzehnt mit bestem Erfolg nur „Reform-Normal".
Reform-Normal-Käfige Mod. ORNIS 1925, neue Preisliste erschienen. — Modern eingerichtete Käfig-Bauanstalt mit elektrischem Betrieb.
Anschrift: Ornis-Haus, Halle-Saale. Der Geschäftsführer: Martin Sperling.

„Naturell"
das seit Jahrzehnten in Liebhaberkreisen eingeführte und bestens anerkannte Futter für edle Weichfresser ist wieder in bester Friedensbeschaffenheit lieferbar! **„Naturell" ist Qualitätsware,** auf Grund langjähriger Erfahrungen zusammengestellt und durch Autoritäten bestens beurteilt. [1534
Preis: kg 6.— M. Probesendungen gegen Einsendung von 1.— M. in Briefmarken. Drosselfutter kg 2.— M.
Empfehle außerdem bestes Körnerfutter für Einheimische und Exoten, ferner Ia Ameisenpuppen, Weißwurm usw.
Nur direkt zu beziehen von
Wilhelm Dietze, Leipzig, Kurprinzstr. Nr. 15.

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,** Biesenthal I (Mark). [1535

Offeriere Vogelfutter in prima Qualität:

Getr. Ameiseneier . .	à Pfd. 3.80 M.
	10 Pfd. 36.— M. franko
Zecke	Pfd. 2.50 M.
Con. Eigelb	Pfd. 2.— M.
Karottengrieß	Pfd. 0.70 M.
Drosselfutter	Pfd. 0.80 M.

Lucullus extra Mischung 1/2-Pfd.-Paket 0.95 M., weiße Packung 0.80 M.
Senegalhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Silberhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Algierhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Kerbtiernahrung f. Kanarien Pfd. 1.30 M.
Versand per Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. [1536
Paul Tzornack,
Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189.
(Postscheck-Konto Nr. 652 65)
Gegründet 1905.

Vogelfutter [1537
für **Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser.** Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.
W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Ia Ameiseneier
mit würzigem Geruch à Pfd. 4.— *M*, bei 10 Pfund 35.— franko
Ia Elbweißwurm Pfd. 4.50 *M*
Mehlwürmer gegen Einsendung von 2.— *M* 1/4 Pfund franko.
W. Busse, Magdeburg,
Gr. Mühlenstraße 1. [1538

Ein Versuch
überzeugt jeden von der Güte meines **Universalfutters.** Preis 2 M. p. Pfd. Sämtliche Futtersorten für Exoten, Wald- und Kanarienvögel zu billigsten Tagespreisen. Versand geg. Nachnahme. Verpackung und Porto werden billigst berechnet. [1539
P. H. Kirsten, Leipzig 3,
Zeitzer Str. 53. Fernruf 31445.

Grosser Posten Ia Rübsen!
Solange Vorrat reicht Ztr. 35 *M*.
Andere Sämereien zu billigsten Tagespreisen.
Vereinen ist jetzt Gelegenheit geboten, sich mit prima Ware einzudecken bei günstiger Zahlungsbedingung.
Lorenz, Dresden,
Drehgasse 5. [1540

Heidelberger Vogelfutte
Braune Packung für Erdsänger u. ä. Vö
250 g 2,
Graue Packung f. Grasmücken u. ä. Vö
250 g 1,
Blaue Packung für Drosseln u. ä. Vö
250 g 1,
Rote Packung für Stieglitze,
Zeisige, Kreuzschnäbel . 750 g 1,
Grüne Packung f. Hänflinge,
Gimpel, Girlitze . . 750 g 1,
Gelbe Packung für Kanarien 1000 g 1,
Generalvertreter für Sachsen u Thüringen [1
Arthur von Ende,
Zoologische Handlung,
Jena (Thüringen), Magdelstieg Nr.

Vögel

Offeriere freibleibend

Sprech. Graupapageien	. 200
Blaustirnamazonen	von 50—75
Schamadrosseln, Ia im Gefieder und Gesang	. . 80
David-Sprosser	. . v. 50—75
Deutsche Nachtigallen	v. 20—25
Schwarzplatten	. . v. 6—10
Gartengrasmücken	. . 8
Müllerchen	. . 6
Gartenrotschwänze	. . 6
Gelbspötter	. . v. 10—12
Singlerchen	. . 5
Alpenstieglitze, Männchen	. 4
Rothänflinge, Männchen	. 3
Zeisige, Männchen	. 3
Buchfinken, Männchen	. 2
Raubwürger	. 12
Rotrückiger Würger	. 12
Halsbandregenpfeifer	. 15
Blaukehlchen	. 12
Bachstelzen, gelbe	. 10

1542] u. a. m.
Versand per Nachnahme oder Vorh sendung des Betrages.
Porto u. Verpackung 3.50, als Dringe 6.50 M. Bei Anfrag. erbitte Rückpor
Zoologische Handlung
G. Behnke, Berlin O
Petersburger Str. 29.

Schönfelders Kanarie feinzucht,
Dresden-Trachau 37,
gold. Med. präm., Urstamm Seifert-W empfiehlt tiefe Hohlroller, Knorr Schockel, schöne tiefe Flöten, Zuchthä und ff. Tag- und Lichtsänger à 12, 18 M., 3 Stück zus. 40 M., erstklas Vorsänger und Ausstellungshähne à 25, 30 M., 3 Stück zus. 60 M., pri Zuchtweibchen à 4 M. Versuch lo Hunderte von Dankschreiben. [1

Hochfeine Edelroller
prämiiert mit goldenen, silbernen Staatsmedaillen,
in großer Auswahl zu mäßigen Prei Kanarienfeinzucht seit 1887.
Anfragen gegen Rückporto.
Heinrich Reinhardt, Eisenac
Charlottenstr. 7. [1

Gebe ab:

Gouldamadinen, rotköpfige . .	Paar 90 u. 80
Schamadrossel . . .	Paar 110
Maskenamadinen .	Paar 60
Zebrafinken	Paar 18

Offerten unter „Gouldi" an Geschäftsstelle der „Gef. Welt" erbet

Stieglitze [1
große Alpenvögel, Dutzend 30 *M*, Weibchen Dtzd. 18 *M*, Rothänflinge, g Zeisige Dtzd. 25 *M*, rote Dompfa Dtzd. 60 *M*, blaue Dtzd. 30 *M*, bei 6 S von einer Sorte 3 *M* teurer, gute kunft garantiert. Anf. nur geg. Ma
Bed, Tier-import, **Stuttgar**

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 19. November 1925 | Heft 47

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Erinnerungen eines Papageienliebhabers.

Von Pfarrer Möller.

(Nachdruck verboten.)

Für Papageien habe ich stets eine besondere Vorliebe gehabt. Kaum eine andere Vogelgattung bietet so viel interessanten Beobachtungsstoff als die der Papageien. Ihre Klugheit, ihre Nachahmungsgabe, ihre Schönheit und Munterkeit machen sie begehrenswert für manchen Liebhaber und es ist erfreulich, daß sie jetzt wieder in reicher Auswahl auf dem Vogelmarkt zu haben sind, schade nur, daß die Preise in den meisten Fällen recht hoch sind. Im Laufe der Jahre habe ich eine stattliche Anzahl Papageien besessen, von denen ich nachfolgend einiges erzählen möchte.

Den Reigen eröffnete — es sind mehr als 30 Jahre seitdem vergangen — ein kleiner Alexandersittich, den ich von einem Händler für wenige Mark erstanden hatte. Es war ein noch unausgefärbtes Exemplar, und ich hoffte bald einen recht zahmen und liebenswürdigen Zimmergenossen in ihm zu erhalten. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Wenn er nicht mit Fressen beschäftigt war, erfüllte der Sittich die Wohnung mit ohrenzerreißendem Geschrei, sodaß er sich bald höchst unbeliebt machte. Richtig zahm ist er in den Monaten, in denen ich ihn besaß, nicht geworden. Wohl nahm er Leckerbissen aus der Hand, aber er konnte sich nicht entschließen, auf den Finger zu steigen. Er blieb immer vorsichtig und zurückhaltend. Ließ man ihn heraus, so saß er bald auf der Gardinenstange, und es war dann sehr schwierig, seiner wieder habhaft zu werden. Seines unleidlichen Geschreies wegen mußte ich ihn schließlich wieder fortgeben. Ähnliche Erfahrungen habe ich auch später mit dem kleinen Alexandersittich gemacht, mit dem ich es immer mal wieder versuchte. Einmal brachte mir ein Bauer einen, den er in seinem Hühnerstall — gewiß ein seltener Fall — gefangen hatte. Es war gleichfalls ein junger Vogel mit vollständig kahlem Kopf. In wenigen Wochen hatte er sich tadellos befiedert und war ein schönes Tier geworden. Er war den ganzen Tag damit beschäftigt, den Verschluß seines Käfigs zu öffnen. Dies gelang ihm wiederholt und es mußten immer neue Maßregeln ergriffen werden, um dies zu verhindern. Aber er war mir immer wieder über. Eines Tages waren seine Bemühungen wieder von Erfolg gekrönt, und da das Fenster gerade offen stand, flog er, ohne sich lange zu besinnen und ohne Lebewohl zu sagen, still und geräuschlos in die weite Welt, machte auch nicht auf einem Baum der Nachbarschaft Halt, sondern verschwand reißenden Flugs in der blauen Ferne. Ich habe nie wieder etwas von ihm gesehen und gehört. Ich habe von dem kleinen Alexandersittich den Eindruck eines klugen, um nicht zu sagen listigen Vogels, der sich nicht leicht anschließt, der aber erst, wenn dies geschehen ist und der Pfleger sich viel mit ihm beschäftigt, viel Freude machen kann. Schade nur, daß er ein solch wüster Schreier ist.

Dem Wellensittich habe ich im kleinen Käfig niemals besonderen Geschmack abgewinnen können. Ununterbrochen ertönt das Gezirp, in dem recht schrille Töne häufig sich wiederholen. Bald rücken die Gatten des Paares einander auf den Leib, um sich zu schnäbeln, bald entfernen sie sich von einander, als seien sie uneinig geworden, es macht einen ziemlich stereotypen Eindruck und wirkt auf die Dauer langweilig. Etwas anderes ist es, wenn man den Wellensittich im größeren Flugkäfig halten kann, um ihn zu züchten. Hier kommt sein munteres, lebhaftes Wesen recht zur Geltung und ein ganzer Flug dieser schönen Vögel bietet dann einen reizenden Anblick. Mit der Zucht habe ich niemals Schwierigkeiten gehabt. Die Jungen wurden immer tadellos aufgezogen, und da dies lediglich mit Sämereien geschieht, so hat man auch keine Mühe mit Bereitung von Aufzuchtfutter.

Einen Zuchtversuch habe ich auch einmal mit dem Singsittich gemacht, der leider einen negativen Erfolg hatte. Das Männchen des Singsittichs ist durch seine lebhafte Färbung im Gegensatz zu dem düster und schlicht gefärbten Weibchen ein schöner Vogel. Es nimmt auch für sich ein durch seine klangvollen Rufe. Nach einigen Wochen war zu bemerken, daß das Paar, das sich bisher nicht umeinander gekümmert hatte, brutlustig war. Das Männchen umwarb das Weibchen und fütterte es aus dem Kropfe und öfters verschwand das Weibchen im Nistkasten. Schließlich kam es nicht mehr zum Vorschein, sodaß ich glaubte, es säße auf Eiern. Als ich nach einigen Tagen niemals das Weibchen erblickte, wurde mir die Sache verdächtig. Ich sah

nach und fand es tot in der Nisthöhle. Es war an Legenot eingegangen, hatte ein weichschaliges Ei nicht legen können. Da ich ein neues Weibchen nicht beschaffen konnte, gab ich das Männchen fort.

Von den Sittichen ist nur ein kleiner Schritt zu den „Unzertrennlichen". Grauköpfchen, die früher zu den gewöhnlichsten Eescheinungen des Vogelmarktes gehörten, aber jetzt ganz verschwunden zu sein scheinen, habe ich wiederholt verpflegt. Ich lernte sie meist als furchtsame, um nicht zu sagen scheue Vögel kennen, die niemals recht zahm und zutraulich werden wollten.

Ganz anders stand es in dieser Beziehung mit dem orangegesichtigen Unzertrennlichen. Ein Paar dieser reizenden Vögel gehört mit zu meinen schönsten Erinnerungen. Sie waren vollkommen zahm, sodaß man sie aus nächster Nähe beobachten konnte. Ihrem Namen „Unzertrennliche" machten sie alle Ehre, denn als das Weibchen nach einiger Zeit aus unbekannter Ursache plötzlich starb, trauerte das zurückgebliebene Männchen und segnete nach einigen Wochen gleichfalls das Zeitliche.

Nun aber zu den großen Vertretern der Ordnung, zu den Sprechern. Mit einer ganzen Reihe davon habe ich im Laufe der Jahre Bekanntschaft gemacht. Ein jeder hatte seine besondere Eigenart, sozusagen seine persönliche Note. Eine Grünbugamazone (Amazona amazonica) war ein lieber Kerl, zahm und zutraulich, lernte aber nicht sprechen. Dagegen konnte sie vorzüglich lachen, husten und bellen. Als sehr sprechbegabt erwies sich in den meisten Fällen die Rotbugamazone (A. aestiva). Fast alle, die mir durch die Hand gegangen sind, haben etwas gelernt, eine entwickelte sich zu einem vorzüglichen Sprecher und lernte sogar ein Lied singen. Sie wandte die Redensarten richtig an, sagte morgens: „Guten Morgen, gut geschlafen?" und abends vor dem Zudecken: „Gute Nacht, schlaf wohl." Trat man ins Zimmer, so grüßte sie mit „Guten Tag, wie geht's?" und beim Herausgehen rief sie „Adieu." Als einmal eine Besucherin — ich war damals Pfarrer in der Stadt — kein Ende finden konnte, rief Lore, die sich bisher schweigend verhalten hatte, plötzlich laut „Adieu!" Der Wink, der außerordentlich belustigend wirkte, wurde verstanden und befolgt. Dieser Vogel lernte sehr leicht und sprach recht deutlich, war aber sehr oft nicht zum Reden aufgelegt und dann war alle Mühe, ihn zu einer Äußerung zu veranlassen, vergebens. Als ich ihn als jungen Vogel bekam, konnte er nichts und ich entsinne mich noch der Freude, die ich empfand, als ich ihn zum erstenmal klar und deutlich „Lora" sagen hörte. Bei Papageien spielen Sympathien und Antipathien eine große Rolle, so wars auch bei dieser Amazone. Ich konnte mit ihr machen, was ich wollte, dagegen mußte meine Frau auf der Hut sein. Überhaupt konnte sie die Frauen nicht leiden, und als einmal eine Besucherin „Köpfchen krauen" machen wollte, erhielt sie einen Biß, daß das Blut floß, wozu Lora ein diabolisches Hohngelächter erschallen ließ.

Einen verwachsenen Jungen, der uns öfters besuchte, hatte das Tier ganz besonders ins Herz geschlossen. Es war rein närrisch vor Freude, wenn er das Zimmer betrat. Schon wenn man die Stimme des Knaben auf dem Flur hörte, begann die Aufregung. Der Papagei, der vielleicht ruhig dagesessen hatte, begann nervös auf der Stange hin- und herzutrippeln, sträubte die Nackenfedern, fächerte den Schwanz, während die Pupillen spielten. Er fing an zu schwatzen und zu singen und die Freude erreichte den Höhepunkt, wenn der Junge ihn aus dem Käfig nahm. Eine derartig intensive Zuneigung war wirklich erstaunlich. Einmal war die Amazone, was sonst nie vorkam, durch das offenstehende Fenster in den Garten geflogen und saß in der Krone eines hohen Baumes. Nun war guter Rat teuer. Ich rief und lockte, aber alles war vergebens, der Vogel dachte nicht daran, herunterzukommen. Da kam mir ein rettender Gedanke. Ich schickte schnell hin und ließ den besagten Jungen holen, der einige Straßen von uns entfernt wohnte. Kaum trat dieser in den Garten und rief Lore bei Namen, als der Vogel, ich möchte sagen, wie ein Stein, aus der Krone des Baumes sich herabstürzte und im nächsten Augenblick seinem Freunde auf dem Arm saß.

Auffällig sind die Größenunterschiede, die sich bei Individuen derselben Gattung finden. Die eben erwähnte Rotbugamazone war ein großer, stattlicher Vogel von gewiß 38 cm Körperlänge. Eine andere derselben Art, die mir von Hamburg zugeschickt war, war mindestens um $^1/_8$ kleiner, es war die kleinste Rotbugamazone, die mir bisher zu Gesicht gekommen ist. Aber auch dieser Zwerg war gelehrig und lernte sehr bald sprechen. Die Größe fällt also für die Beurteilung der Begabung nicht ins Gewicht.

(Schluß folgt.)

Das Liebhaberjahr.

Plauderei von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der Pfleger braucht, wenn es sich bei der Futterverweigerung um einen verfetteten Vogel handelt, nicht ängstlich zu sein. Ich habe schon Nachtigallen, Gartengrasmücken usw. gehabt, die bis zu sechs Tagen kein Krümelchen Futter anrührten, auch keine Mehlwürmer, und nach dieser Zeit plötzlich wieder fraßen und mit dem Gesang einsetzten. Wundern muß man sich, trotzdem es ein natürlicher Vorgang ist, wie dabei der auf schnelle und eine reichliche Menge eingestellte Verdauungsapparat der Insektenfresser ohne Schaden zu leiden fortkommt. Ja, die Natur mit ihren Wundern gibt uns auch hier wieder eine Probe ihrer wohlweislichen, alles in Berechnung ziehenden Einrichtung. Gegen Weihnachten zu schwimmt das Herz des Vogelliebhabers in immer größeren Hoffnungen auf Zunahme des Gesangskonzertes in Tonstärke und reichlicherer Besetzung. Hat der Pfleger es verstanden, seine Vögel bis zu dieser Zeit in normalem Körperzustand zu erhalten, so werden diese seine diesbezüglichen Hoffnungen meistens auch nicht getäuscht, vorausgesetzt, daß bereits ein- oder mehreremals überwinterte Vögel in Frage kommen. „Erstlingsüberwinterer", also die Frischfänge, lassen schon noch etwas lange auf lauten Gesang warten, trotzdem auch der zeitige Gesangsbeginn und -fleiß eine auf richtiger Pflege beruhende und speziell jüngeren Exemplaren anhaftende Eigen-

schaft ist, habe ich gefunden, daß sich hierin vielfach auch eine diesbezügliche individuelle Veranlagung ohne Rücksicht auf Alter offenbart; selbstverständlich spielen auch andere Nebenumstände, wie Licht, Temperatur usw., eine wichtige Rolle, ja, ich halte eine Vollkommenheit dieser Umstände gleichfalls für schwerwiegende Faktoren. Weihnachten, du Fest der Freude, was wärst du ohne lachende, jauchzende Kinderherzen, du bist nicht gut denkbar ohne Eis und Schnee, ohne den würzigen Tannenduft im Zimmer. Aber soll auch das Herz des Vogelliebhabers seine Weihnachten haben, soll ihm noch die größte Freude werden außer der, die ihm dieses Fest bringen kann, in Gestalt einiger Ruhetage im Familienkreise, so müssen ihm seine gefiederten Lieblinge die Erinnerung von den verflossenen und in neuer Sehnsucht zu erwartenden Tagen des Frühlings wachsingen. Wenn draußen Winter ist, wenn ein eisiger Nordwind über die Schneedecke fegt und drinnen im bescheidenen Heim ein Familienglück sich im Trubel und jauchzenden Lachen einer gesunden Kinderschar sonnt, das ist eine echte deutsche Weihnachten. Und schlägt beim strahlenden Lichterschein der würzigen Tanne die Nachtigall und dazwischen der helle Jodler des Schwarzplättchens — Vogelliebhaber, das ist deine Weihnachten, das dich zum glücklichsten, Kummer, Not und Sorge vergessenden Menschenkinde macht. Willst du offen sein, so mußt du gestehen, daß dich ebenso kindlichreine Freude umfängt, wie dereinst, als du nichtsahnend von den Tücken der schnöden Welt sorgenlos unter dem strahlenden Lichterbaum als Kind in unschuldiger Freude Weihnachten gefeiert hast.

Der Januar bringt bereits mehr Leben in die Vogelstube, nach und nach beginnen alle, außer denen, die vor der Mauser stehen, leise mit dem Gesang, wieder andere sind bereits in vollem Feuer, letzteren reiche man die Höchstzahl an Mehlwürmern, die je nach Artzugehörigkeit des Vogels verschieden ist, so z. B. genügen für Grasmücken 6—8 Mehlwürmer, Nachtigall und Sprosser bis 15 Mehlwürmer, wenn sie feurig singen, hingegen vertragen Gelbspötter, Sumpfrohrsänger schon noch etwas mehr, ja Gelbspöttern kann man ohne Bedenken bis 30 Stück reichen, ich halte dies sogar für eine Notwendigkeit. Daß Schwarzplättchen Mehlwürmer schaden, also demnach keine erhalten dürfen, halte ich für falsch. Dieser Standpunkt wurde dadurch genährt, daß es Schwarzplättchen gibt, die niemals, andere wieder die nur zeitweise, also nur in der Gesangszeit Mehlwürmer fressen. Meinen Schwarzplättchen reiche ich in der Gesangszeit, falls sie welche annehmen, täglich 3—4 Stück, ohne irgendeine schädliche Beeinflussung irgendwelcher Art wahrgenommen zu haben. Für ganz verwerflich halte ich das bei vielen Liebhabern übliche sogenannte „Treiben" der Vögel mit reizbaren Futtermitteln, besonders mit Mehlwürmern; manche denken, wenn der Vogel etwas lebhafter wird in seinen Bewegungen, öfters lockt, daß er nun jeden Tag mit dem Gesang beginnen muß, und er denkt in seiner Kurzsichtigkeit diese seine Hoffnung am schnellsten in die Tat umzusetzen, wenn er den „Mehlwurmtopf" stets bei der Hand hat. Bei mir erhalten nur magere oder mausernde Vögel außer der Gesangszeit regelmäßig Mehlwürmer, höchstens daß ich mir Sonntags den genußreichen Anblick verschaffe, zu sehen, wie jedem sein Mehlwurm schmeckt, indem ich jedem eine solche Delikatesse verabreiche. Ja leider ist es gerade dieser genußreiche Anblick, sowie Anwesenden zu zeigen, wie zahm die Vögel sind, indem sie den Mehlwurm aus der Hand nehmen, was den Liebhaber immer wieder verleitet, immer wieder einen Mehlwurm zu opfern, ohne daß er bedenkt, daß er mit diesem offensichtlichen Genuß für ihn und den Vogel, letzterem nur Schaden zufügt. Offen gesagt, es gibt Liebhaber, die viel zu viel mit dem „Mehlwurm-

Zwergara (s. S. 559).

topf" Vögel pflegen und dadurch sich um die Früchte einer sachgemäßen Pflege betrügen. Welcher Liebhaber würde nicht seinen Lieblingen jeden erreichbaren Leckerbissen verschaffen, keine Spinne, keine Fliege, keine Kellerassel usw. ist vor seinen nach ihnen ständig suchenden Blicken sicher, aber in der Mehlwürmerfrage hart sein und nur nach ihm greifen, wenn es am Platze ist, sei die Losung jedes sachgemäß verfahrenden Vogelliebhabers. Die Mauser der sogenannten Frühjahrsmauserer fällt in die Monate Januar bis März, und bereits im Januar macht sich der Beginn der Mauser eventuell durch Beginn des Federausfalls bemerkbar. Ich sage eventuell, denn vielfach ist in diesem Monat noch nichts davon zu spüren und der Liebhaber wird auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Die sogenannte „künstliche Mauser", die durch ein sachgemäßes Ziehen von Schwung- und

Schwanzfedern in die Wege geleitet wird, verpönt man am liebsten ganz aus der Vogelstube und wendet sie nur an, wenn es gilt, dadurch einen Vogel, der unbedingt mausern muß, wie Gelbspötter, Sumpfrohrsänger, Heidelerche, rotrückiger Würger usw. in die erste Käfigmauser zu verhelfen. Beachtet muß dabei werden, daß die künstliche Mauser erstens nur im äußersten Notfall und niemals bei mageren Vögeln angewendet, zweitens erst gegen Ende der normalen Mauserperiode und niemals schon zu Beginn derselben eingeleitet werden darf. Das Richtigste ist und bleibt individuell füttern und dadurch die Vögel annähernd normal halten, dies ist die beste Gewähr für den normalen Einsatz und Verlauf der Mauser. Ganz verwerflich sind die Methoden der sogenannten „Verschönerungskünstler", die stets gleich bei der Hand sind und jeden verstoßenen Schwanz durch Ziehen der Federstummel aufs neue hervorzaubern. Niemals lasse man sich verleiten, diese verwerfliche Methode anzuwenden, sondern sorge lieber dafür, daß durch eine sachgemäße Pflege eine normale Mauser Platz greift, die dies in naturgemäßer Form am besten besorgt. Daß alle Vögel vor Temperaturschwankungen bewahrt werden müssen, ist einleuchtend. Ganz besonders empfindlich sind in dieser Hinsicht alle im Winter mausernden Arten, darum ist eine ständige, mäßige Stubenwärme eine Vorbedingung einer normalen Wintermauser, ebenso wie eine kräftige Nahrung stets im Auge behalten werden muß. (Fortsetzung folgt.)

Neueinführungen und Seltenheiten.

Von K. Neunzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Arm an Neueinführungen ist in der Nachkriegszeit die Einfuhr körnerfressender Vögel. Abgesehen von einigen Webern und Prachtfinken aus Afrika und einigen wenigen Arten amerikanischer Ammerfinken kommen keine Vertreter der artenreichen Finkenfamilie, an der besonders die Vogelwelt Amerikas so reich ist, nach Europa.

In neuester Zeit bietet Hagenbeck-Stellingen einen Vogel an, der vor Jahren sehr begehrt war, sowohl wegen seines schönen Gefieders wie auch wegen seiner Neigung, sich in der Gefangenschaft fortzupflanzen, den

Pelzelns Fink — Sycalis pelzelni *Scl.*,

einen Verwandten des Safranfinken, von dem er sich aber durch seine Verträglichkeit und sein weniger ungestümes Wesen erheblich zu seinem Vorteil unterscheidet. Vor langen Jahren, ich kann nicht angeben wann es war, gelangten einige dieser Vögel in die Vogelstube des Prinzen Ferdinand von Koburg in Wien, des späteren Königs von Bulgarien, wo sie in mehreren Generationen ergiebig gezüchtet wurden. Von hier aus kamen sie in den Besitz anderer Vogelliebhaber, welche sie wegen ihrer Vorzüge sehr schätzten. Von diesen Pelzelns Finken ist wohl keiner mehr am Leben und es ist erfreulich, daß Hagenbeck sie jetzt wieder den Vogelliebhabern zugänglich gemacht hat. Er wird wie der Safranfink verpflegt. In seinem Wesen erinnert er an die Sperlinge, auch in seinem Gesang, den das Männchen in der wärmeren Jahreszeit fleißig vorträgt. Zwischen sehr schnell gebrachten harten Trillern und schrillem Gezirpe hört man kurze schrille Töne, ab und zu aber auch einen vollen, tiefen, angenehmer klingenden Ton. Im ganzen erinnert sein Gesang mehr an Insektengezirpe als an Vogelgesang. Ein Sperling ist er auch im Nestbau. Er baut es ähnlich dem Haussperling in Mauerlücken der Gebäude, mäßig umfangreich, innen mit Pferdehaaren gut ausgelegt. Auf dem Lande benutzt er gern die kunstreichen aus Lehm hergestellten backofenförmigen Nester des Töpfervogels, den er durch beharrliche Belästigungen und Angriffe schließlich dazu veranlaßt, das Nest dem lästigen Eindringling zu überlassen. In der Gefangenschaft bringt er sein kugelförmiges mit seitlichem Eingang versehenes Nest meist in einem Harzer Bauer unter. Das Nest ist innen gut ausgepolstert, zum Nestbau ist ihm jedes Baumaterial recht. Die Eier, meist 5 an der Zahl, gleichen denen des Safranfinken, nur sind sie kleiner.

Seine Verbreitung erstreckt sich über Südbrasilien, Argentinien und Bolivien.

Gefiederbeschreibung: Männchen oberseits gelb, Hinterhals, Oberrücken, Schulterfedern mit schwärzlichen Schaftstrichen; der einfarbige Hinterrücken und Bürzel grau verwaschen; Oberschwanzdecken mit bräunlichen Federmitten; Stirn tieforangegelb; Oberkopf, Zügel, Augengegend, Wangen, Unterseite, Schenkel leuchtend gelb, Ohrgegend trüber gelb; Seiten trüber, Flanken mit schwärzlichen Schaftstrichen; Flügeldecken wie Rücken, die großen mit schwärzlichen Schaftflecken; Afterflügel, Handdecken, Schwingen dunkelbraun, gelb gerandet; Unterflügeldecken, Achselfedern leuchtend gelb; Auge dunkelbraun; Schnabel dunkelhornfarben; Füße gelblichbraun; Lg. 127, Fl. 72—75, Schw. 50, Schn. 10, Lf. 15 mm. Weibchen kleiner, oberseits bräunlich, gelblich verwaschen, an Oberkopf, Hinterhals, Vorderrücken, Schultern mit schwarzbraunem Mittelstreif; Oberschwanzdecken graubräunlich mit dunklem Mittelfleck; Kopfseiten weißlich, Ohrdecken bräunlicher, mit Ausnahme des Zügels und Augengegend dunkelbraun gestrichelt; Kehle weiß; übrige Unterseite weißlichgrau. Flanken rostbräunlich, gelblich verwaschen, außer Bauch und Unterschwanzdecken braun gestreift; kleine Flügeldecken braun, grau gerandet, olivgelb verwaschen, übrige braun, weißlich gerandet; Afterflügel, Handdecken, Schwingen braungelblich, die innersten nach der Spitze zu weißlich gerandet; Achselfedern gelb, untere Flügeldecken grauweißlich, gelblich verwaschen; Schnabel hornfarben, Unterschnabel heller. Jugendkleid dem Weibchen ähnlich, grauer, Streifen der Unterseite kleiner und unbestimmter.

Eine Neueinführung ist ein Vertreter der Gattung Antillengimpel — Pyrrhulagra *Bp.*, der auf S. 534 abgebildete

Martiniquegimpel — P. noctis noctis (*L.*),

der „Martinique Bullfinch" der Amerikaner. Die Angehörigen der Gattung sind kleine oder mittelgroße Finkenvögel mit kurzem, mehr oder weniger starkem Schnabel, ziemlich kurzen abgerundeten Flügeln und Schwanz und einfarbigem, niemals gestreiftem Gefieder. Die Männchen sind schwarz mit roten Abzeichen an der Kehle, bei einigen Arten auch auf dem Scheitel und an den Unterschwanzdecken.

Die Weibchen sind den Männchen ähnlich, aber gewöhnlich matter gefärbt, bei einigen Arten wird das Schwarz des Gefieders durch Grau ersetzt. Ridgeway nennt 13 Arten, welche Westindien und Guiana bewohnen. Fast jede der Westindischen Inseln hat ihre besondere Form, die untereinander

fast alle in der Färbung ähnlich, während sie im Bau und in den Maßen, auch denen des Schnabels verschieden sind. Über das Freileben dieser Vögel ist wenig berichtet, über das in der Gefangenschaft ebensowenig. Jedenfalls haben wir schöne Kernbeißerfinken vor uns, die in ihrem Benehmen kaum von dem der zeitweise häufiger eingeführten und bekannteren Schwarzgimpelfinken — Melopyrrha nigra *(L.)* abweichen. Letzterer, dessen Gesang leise aber angenehm ist, wurde im Jahr 1924 in England gezüchtet.

Gefiederbeschreibung: Männchen über dem Zügel einen kleinen rötlichkastanienbraunen Fleck; Kinn- und scharfbegrenzter Kehlfleck von derselben Farbe; übriges Gefieder schwarz, an den Unterschwanzdecken zuweilen mit etwas Rotbraun; Unterflügeldecken weiß, zuweilen rostbraun verwaschen; Schnabel schwarz, Unterschnabel zuweilen bräunlich; Lf. dunkelhornfarben; Lg. 119—143, Fl. 70—72, Schw. 51—53 mm. Weibchen oberseits dunkeloliv, nach hinten in umbrabraun übergehend; unterseits tief olivgrau, am Bauch heller, Unterschwanzdecken breit, gelblicholiv oder rostbräunlich gesäumt; Flügelfedern dunkelgraubraun; große Deckfedern breit rostbraun gerandet, Schwingen mit hellolivfarbenen oder gelbbräunlichen Säumen; Schwanzfedern olivfarben mit hellen Rändern; Schnabel dunkel graubraun, Unterschnabelwurzel bräunlich.

Nach England und anscheinend auch nach Frankreich wurde ein schöner Erdsänger, die

blaue Nachtigall — Larvivora cyane *Hodgs.*,

in einigen Stücken eingeführt. Ihre Heimat ist Ostsibirien und Nordjapan. Sie überwintert nach Hartert auf der Halbinsel Malakka und der Insel Borneo, westlich gelangt sie bis Birma und Tenasserim. Hartert stellt sie zu der Gattung Luscinia *Forster* — Nachtigallen, Reichenow zu den Erdsängern — Erithacus *Cuv.* Den Gattungsnamen „Larvenfresser" gab ihr Hogdson, der sagt: „Wegen der Zahl der Insektennester und Larven, welche ich in ihrem Magen fand, gab ich ihr diesen Gattungsnamen. In Indien ist sie sehr selten beobachtet, wohl nur als gelegentlicher Durchzügler. Sie wurde hier in dem dichten unentwirrbaren Unterholz der Berge beobachtete, zumeist auf dem Boden. Nach Jerdon hat sie einen tiefen Lockruf ähnlich wie einige Arten von Steinschmätzern. In ihrem Wesen ähnelt sie nach Adams den Rotschwänzen. Sie ist eine Bewohnerin der Bergwälder, deren Hänge und Schluchten sie bevorzugt. Ihre Nahrung, Insekten, jagt sie am Boden, auf dem sie sich viel aufhält. Radde, der sie in den Uferweiden des Amur beobachtete, sagt, ihr Benehmen sei dem der Blaukehlchen ähnlich. Tagsüber halte sie sich in den künstlichen aus totem Strauchwerk hergestellten heckenartigen Umzäunungen der Gemüsegärten, die sie bei anbrechender Dämmerung verließe, um dann wenig scheu auf dem kurzen Rasen umherhüpfend, Insekten zu jagen. Radde hat nie eine singen gehört. Von dem Gesang sagt Hartert: „Soll einen prachtvollen, wegen seiner Mannigfaltigkeit unbeschreiblichen Gesang haben", Ingram (Ibis 1908 p. 137) nennt ihn aber nur ein „musikalisches Geschwätz". Das Nest steht an Hängen und Böschungen auf dem Erdboden und wird aus Moos und allerlei anderem Genist erbaut. Es soll überdacht sein mit seitlichem Eingang. Die in Indien brütende nahestehende Art baut nach Hume (Nest and Eggs) ein offenes Nest. Das Gelege wurde im Juni gefunden und besteht aus 5—6 einfarbig blauen Eiern (18—19 × 14,5 mm).

Gefiederbeschreibung: Männchen oberseits trüb dunkelblau, am Vorderkopf lebhafter; Zügel und Streif über Kopf- und Halsseiten bis auf die Brustseiten schwarz; Unterseite weiß; Deckfedern wie oberseits; Schwingen, Schwanzfedern dunkelbraun mit trübblauen Außenfahnen; Auge braun; Schnabel schwarz, Unterschnabelgrund braun; First bräunlichgelb; Lg 130, Fl. 75, Schw. 48, Lf. 26—27 mm.

Weibchen oberseits olivenbraun; Oberschwanzdecken mattblau; Kehle, Halsseiten rahmfarben; übrige Unterseite weiß, Seiten bräunlich verwaschen; Schwanzfedern mattblau.

(Fortsetzung folgt.)

Neuguinea-Edelpapageien (s. S. 559).

Versuche die Gründe des Weißwerdens bei einem gefangenen Granataftrild zu analysieren und ein paar Worte über das Gefangenleben der Art.

Von A. Adlersparre.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Was besonders die Salze angeht, ist zwar unendlich viel über sie geschrieben, aber verhältnismäßig wenig davon hat einer kritischen Prüfung standhalten können. Unser Wissen über diese ist, wie es auch in einem Passus der kürzlich veröffentlichten, wie immer außerordentlich interessanten und für unsere Praxis wertvollen Arbeit von Dr. med. Wagner dargelegt wurde, in mancher Hinsicht lückenhaft. Was wir von den Salzen jedoch wissen, dürfte indessen nicht der Annahme recht geben, daß in vorschriftsmäßiger, gemischter Körnerfresserkost irgendein für den Salzstoffwechsel bedeutungsvoller Stoff

fehlt. Sondern unsere Körnerfresserkost dürfte in bezug auf Salze normale Bedürfnisse gut erfüllen. Die Weichfresserkost dagegen, für welche in hohem Grade denaturierte (gekochte usw.) Futterstoffe benutzt werden, dürfte, wenn sie zugleich eintönig gehalten wird, mehr Aufmerksamkeit benötigen. Daß bei gewissen Krankheiten der Salzstoffwechsel Aufmerksamkeit erfordert, ist schließlich eine Sache für sich. Der Vogelliebhaber, der selten genügend eingehende Kenntnisse hat von dem, soweit wir es durch zahlreiche pharmakodynamische und therapeutische Versuche bei Tieren und Menschen kennengelernt haben, äußerst komplizierten Verhalten der Salze innerhalb des Organismus, sollte nicht auf eigenes Risiko mit Salzgaben experimentieren; der Ausgang könnte nur allzu leicht dem Gewünschten ganz entgegengesetzt werden.

Die Gründe, wegen welcher ich eine allgemeinere Anwendung von heimatlichen Futterstoffen in unserer Exotenfütterungstechnik befürworten möchte, sind vogelpsychologischer Natur. Unsere Kleinvögel sind meistens derart veranlagt, daß sie am liebsten beim Alten, Gewohnten bleiben. Deshalb kehren Entflohene gerne in die Gefangenschaft zurück. Deshalb hängen sie auch treu an gewohnten Futterstoffen. Neuheiten verursachen bei ihnen Bedachtsamkeit, wenn auch bei den allermeisten schließlich Futterneid und Neugier — bei Radikalkuren auch Hunger — den natürlichen Widerwillen besiegen. Dies ist, glaube ich, für den mitten unter zahlreichen giftigen Sämereien, Beeren und Insekten lebenden Wildvogel ein sehr nützlicher, sicher tief in der Vogelseele begründeter, konservativer Instinkt. Während der physisch und psychisch so äußerst anstrengenden Ausfuhr und Übergewöhnung an europäische Verhältnisse — welche Übergewöhnung unter keinen Umständen nach einigen wenigen Wochen für völlig beendet angesehen werden kann —, halte ich es deshalb für sehr zweckmäßig, daß wir in unserer Technik den psychisch beruhigenden Moment benutzen, welcher für den Vogel unzweifelhaft im Wiederfinden schon wohlbekannter heimatlicher Hauptfutterstoffe liegt. Am vorsichtigsten wäre es vielleicht, wenn man mit solchem Hauptfutter während des ganzen ersten Jahres füttert, wenigstens was die kleineren und möglicherweise auch einige der größeren Arten betrifft. Denn allzu radikale Übergewöhnungsversuche mit Vögeln, die wegen der imaginären*) Veränderung ihrer Umweltkonstellation nach dem Einfangen und wegen einer langdauernden Reise körperlich geschwächt und seelisch unlustbetont sein müssen, haben sicher einen nicht geringen Anteil an der allzu großen Sterbezahl frisch eingeführter Exoten. Die Übergewöhnung an neue Futtersorten habe ich deshalb in eigener Praxis stets möglichst hinausgeschoben und erst, wenn der Vogel sich der neuen Umwelt im übrigen völlig angepaßt, vorgenommen. Dann ist das Risiko am geringsten und irgendwelche Todesfälle durch Futterwechsel braucht man, wenn man sich nur von seinem Verstande leiten läßt, nicht länger zu befürchten. Auch während späterer Jahre bereitet man durch zeitweilige Darreichung von heimatlichen Futterstoffen seinen Pfleglingen offenbare Freude, denn sie erinnern sich und schätzen ihre Heimatskost anscheinend recht lange.

Nun ist es ein Nachteil mit der exotischen Hirse — japanischer, indischer, süd-, mittel- und nordafrikanischer —, daß sie von sehr verschiedenartiger Beschaffenheit sein kann, wenn sie bei uns eintrifft. Ich habe Boermannaseed — anscheinend frisch geerntet — von vorzüglicher Beschaffenheit erhalten, welche von allen Körnerfressern, sowohl Südafrikanern wie anderen, geradezu leidenschaftlich gefressen wurde. Ich habe aber auch Boermanna — und nebenbei auch Senegal — erhalten; welche unterwegs von Feuchtigkeit und Insekten so beschädigt waren, daß die Vögel nur einen geringen Teil davon fressen wollten. Dies hat indessen nur mit den Transportverhältnissen zu tun und diese könnten sich sicher ordnen lassen.

Was im übrigen die Fütterung eines Granatastrilds angeht, schätzt der Vogel folgende Nebenfutter sehr hoch: Blaumohn, frische Unkrautsämereien, wie Löwenzahn, Vogelmiere, Wegerich und verschiedene Gräserarten; für halbreifen vorsommerlichen Wiesenbocksbartsamen waren die meinigen zwar sehr interessiert, die Enthülsungsversuche aber meistens vergeblich. Vogelbrot nach meinem Rezepte hergestellt, fein gerieben und leicht angefeuchtet, wird gerne gefressen, so auch geriebenes Eierbrot, Blätter von Vogelmiere, ab und zu sogar ein klein wenig süßes saftreiches Obst wie Apfelsine oder gezuckerte Gartenerdbeeren u. dgl., nie aber Banane, welche meinen meisten Vögeln allzu schmierig oder in anderer Hinsicht unappetitlich zu sein scheint. Von Insekten frißt der Granatfink am liebsten sehr kleine Mehlwürmer oder ähnliche Larven; größere werden meistens nur entköpft, selten gefressen*). Als allgemeine Regel kann schließlich gesagt werden, daß die Fütterung stets planmäßig, zielbewußt sein soll, nie aber schablonenmäßig, was übrigens für die Verpflegung aller Stubenvögel gilt, wie dies auch Birk in einigen seiner trefflichen, von großer praktischer Erfahrung und warmer Liebe zur befiederten Welt zeugenden, fütterungstechnischen Veröffentlichungen in dieser Zeitschrift mit Schärfe betont.

Der Granatfink läßt sich in der Gefangenschaft außerordentlich leicht zum Nisten bringen und legt Eier massenhaft. So z. B. legte ein und dasselbe Pärchen bei mir in weniger als $^3/_4$ Jahr 32 Eier in 6 Bruten. Zu der Zeit hatte ich das Vergnügen, dem hiesigen Reichsmuseum eine Anzahl in Form stark — länglich bis rundlich — variierender, von einem und demselben im Separatheckkäfig gehaltenen Granatweibchen gelegte Eier zu überlassen — die Eiform wird bekanntlich von zufälligen Druck- und Spannungsverhältnissen in der Bauchhöhle während des Schalenbildungsprozesses stark beeinflußt, man sieht in der Gefangenschaft ziemlich oft und bei den verschiedensten Vögeln Beispiele hierauf. Während der häufigen Begattung, welche meistens auf der Sitzstange vor sich geht, hält sich das Männchen auffallend lange, wohl minutenlang, mit flatternden Flügeln auf dem Rücken des Weibchens fest und begattet das Weibchen

*) Das gilt auch für unsere einheimischen Arten!

*) Frische Ameisenpuppen sind hier nicht zu haben, wenigstens nicht in solcher Qualität, daß ein gewissenhafter Vogelwirt dieselben zu verabreichen wagt.

dabei anscheinend ein paar (drei) Mal mit kurzen wenige Sekunden dauernden Pausen. Das Nest wird am liebsten in der Nähe des Fensters gebaut. Beide Gatten brüten abwechselnd, in der Nacht oft gemeinsam. Einige Junge wurden bei mir auch ausgebrütet, aber leider bald verlassen. Dies beruhte meines Erachtens weniger auf Unvollständigkeit des Futters, als auf dem hitzigen, rastlosen Temperament der Art. Ein Granatfink befindet sich, falls völlig gesund, beinahe ständig in Bewegung, ruht verhältnismäßig selten, jagt während der Nistzeit gerne tyrannisch sowohl eigene Weibchen, andere Granate und mehr oder minder verwandte Arten wie Blauastrild, Amarant, Goldbrüstchen, Tigerfink usw., überhaupt alle, die ihm aus dem Wege gehen. Damit er kein Unheil verursache, soll man ihn deshalb am liebsten in sehr großen Flugkäfigen halten oder nur mit Arten zusammen, die er fürchtet, wie Elsterchen und größere Vögel, oder aber separat.

Als Sänger gehört der Granatfink zu den allerbesten unter den Prachtfinken und stellt seine zwar niedlichen, aber anspruchslosen Kollegen, wie Blauastrild und Tigerfink, weit hinter sich. Beide Geschlechter singen. Der Balzgesang des Weibchens ist kurz, nicht abgebrochen, fanfarenähnlich schmetternd wie der Gesang des Sonnenvogels, dessen Tonstärke er jedoch nicht völlig erreicht. In Ruhe singt das Weibchen leiser als das Männchen. Der Gesang des Männchens ist bedeutend länger, oft flötend und lerchenartig trillernd, in der Ruhe ab und zu abgebrochen, ein klein wenig volltöniger als der dünnere Gesang des Blauastrilds. Beim Locken läßt er ein schmatzendes Schiip oder Schiup hören, erregt (beispielsweise beim Jagen) ein wiederholtes Tschatt-Tschatt-Tschatt. Beide Geschlechter balzen singend, oft gleichzeitig voreinander, was recht komisch aussieht. Die Stirn- und Scheitelfedern sind dabei glatt angelegt, Nacken- und hintere Halsfedern gesträubt, oft werden auch Kopf und Schwanz nach ein und derselben Seite etwas schräg gestellt. Die Vorstellung wird meistens gleichwie beim Blauastrild von ein paar erregenden Schnabelstichen in die Seitenfedern des Gegenparts eingeleitet. Am liebsten balzen sie bei mir auf papierbelegtem Käfigboden, unter kurzen Sprüngen taktfest im Papier stampfend, so daß man dies auch in einem anderen Zimmer hört. Eine Feder oder dergl. halten sie dabei gerne im emporgerichteten Schnabel. Im Anschluß an Affektzuständen kommt auch eine besondere Flugart mit klatschendem Flügelschlagen vor.

Mein Urteil über den Granatastrild als Stubenvogel möchte ich so zusammenfassen: Wenn er auch ein paar kleine Fehler aufweist — welche Sonne hat nicht ihre Flecke? —, so überwiegen doch seine großen Vorzüge diese Fehler weitaus.

Stockholm, den 18. August 1925.

Notizen aus vergangenen Jahren.

Von A. Jena, Biberach/Riß.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

1846. Im Januar habe ich von Weingart eine braune große Grasmücke (=Gartengrasmücke) u. 1 Schwarzblatt gekauft. Die Grasmücke hatt anfangs Februar u. mein alte Schwarzblatt anfangen Singen. Im Januar anfangs habe ich vom Weber Röhm 2 Geschos (=bluthänfling) gekauft um 1 fl., dann habe ich eins wieder verkauft an den Heinrich Grauer und das andere ist hinausgekommen; dann habe ich eins wieder gekauft vom Weingart, er hatt's von Schussenried herunter, hab ihn dafür bezahlt 68 krz, dieser singt sehr gut. Im Januar habe ich vom Sigg von Oberdorf ein Geschos u. ein Finken gekauft, den nehmlichen Tag vom Sattler von Mittelbiberach ein sehr schönen Distel und singt ganz gut, schlägt den Finken, um 1 fl. Von dem Weingart habe ich auch eine kleine Mehlwurmkiste bekommen. Den Sonntag vor Weihnachten hatt meine alte Grasmücke und der junge Spottvogel (=Gelbspötter) anfangen singen; den Sonntag nach Weihnachten die braune Grasmücke vom Weingart. Im April haben ich und der Rach



Taubenhalsamazone (s. S. 559).

Büchsenmacher in des Rothgerber Lieb's Garten Vormittag 10 Uhr eine Nachtigall gefangen; ich habe sie den ganzen Sommer sowie auch den ganzen Winter gut gefüttert und hatt nie geschlagen; ich habe sie dann im März 1847 zu dem alten Rach hinunter gethan und hatt sich aber auch nicht hören lassen, so daß er sagte, ich solle sie fliegen lassen, wir haben halt das Weibchen bekommen und den Hahnen fortgelassen; ich sagte aber, ich habe sie jetzt ein ganzes Jahr gefüttert und jetzt müsse sie noch grüne Glemmereier fressen, wenn sie dann nicht bald schlägt, dann läßt man sie fort. Am Montag, den 12ten April, holte der Rach ein wenig grüne Glemmereier u. gab ihr auch zu freßen. Den andern Tag fing sie an zu schlagen herrlich.

1847. Den 5ten Märtz hatt mein Ungar (=Sprosser) anfangen schlagen. Im Herbst habe ich dann diese Nachtigall (=obigen Frischfang) an den bauren Namens Bohner in Mittelhaus bei Essendorf verkauft um 1 Kronthaler und den nehmlichen Tag habe ich den Christof Metzger die seine

abgekauft um 1 Kronthaler und gleich an den Stückle verkauft um 6 fl., er hatt sie an den Straßenknecht verkauft in Ochsenhausen, Konrad Roth. Januar d. 15ten hatt der alte Spötter wieder anfangen singen, im Februar hatt ich meine alte deutsche Nachtigall zum Rach hinunter getan, weil sie bei mir nicht wegen den andern Nachtigallen geschlagen hatte und die andere nicht wegen ihr, beim Rach hatt sie gleich gut anfangen schlagen. 14. Märtz an einem Sonntag bin ich und der alte Rach nach Ehingen gegangen, haben dem Schuhmacher Beck meine alte Nachtigall, die ich vor 6 Jahren vom Rettig gekauft habe und die braune Grasmücke vom Weingart und eine Schwarzblatte gebracht, nehmlich gegen einen Tausch u. zwar ich bekam dort von ihm auch wieder 1 Nachtigall, aber einen Auvogel oder einen deutschen Nachtvogel (Nachtschläger), bei Tag schlägt sie schon einige Monate, sie hatt einen vorzüglichen guten und lauten Schlag. Ich habe den Vogel im nehmlichen Käfig gelaßen, wo sie war, und der Beck hatte uns heraufgeführt. Im Januar habe ich vom Birkenherder 1 Lerchengeschos (=grauer Hänfling) gekauft um 15 kr. Vom Rach ein neugefangenen Distelfink, den er vom Allmendinger hatt gekauft, er singt sehr gut. Am 2ten Märtz habe ich den Distel, den ich vom Sattler v. Mittelbiberach gekauft hatte voriges Jahr, an den Weingart wieder verkauft um 1 fl. Auch habe ich von dem Ehinger noch einen Lerchen herauf, einen sehr guten Sänger, er hatte ihn voriges Jahr von dem Chirurg Hoschmann von hier gekauft.

1848. Am 10ten Januar hatt der jüngere Spotter, der Ehinger Lerch und mein altes Geschos anfangen singen, der Distel singt schon lange. Den 16. Januar die Grasmücke anfangen singen, die Schwarzblatte schon lange. Den 19ten Januar hatt der Ungar (=Sprosser) anfangen schlagen und der alte Spötter. 6ten März hatt die Ehinger Nachtigall anfangen schlagen. Ausgangs Februar ist mir der junge Spötter cabut worden; er hatt eine Krankheit in die Füße bekommen, daß er nimmer auf die Füße stehen konnte. Im Herbst ist ein Geschos cabut worden; ich habe dann eins vom Rach gekauft, ein frisch gefangenes.

1849. Januar hatt der Spötter anfangen singen, die Grasmücke auch und die Schwarzblatte; Februar Ausgangs der Sprosser.

1850. Anfangs Januar hatt die Schwarzblatte u. die Grasmücke angefangen zu singen, anfang Februar der Spotter, ausgangs Februar der Ungar (=Sprosser) u. die Nachtigall; dann habe ich vom Korbmacher ein Geschos gekauft; 1851 im Juni Cabut worden, vom Metzger Zink einen Feldlerchen im Sommer, von der Halde eine Heidelerche, 1851 wieder an ihn verkauft.

1851. Vom Rach ein junges Geschos gekauft um 68 kr. Ausgangs Januar hatt die Grasmücke angefangen und die Feldlerche und das Geschos zu singen. Ausgangs Februar der Spotter und 14. Märtz die Nachtigall, der Sprosser und die Schwarzblatte. Im Ausgang Juni ist der Sprosser in Mauserzeit kommen, hat also aufhören schlagen.

1852. Im Januar vom Stückle 1 Distelfink frisch gefangen gekauft, er hat ihn selbst gefangen, kostet 48 Kr. Ausgang Januar angefangen zu singen die Grasmücke, Schwarzblatt, Rothkehlchen, Distel, Geschos. Anfang Febr. der Ungar, den 12. Febr. die Lerch und der Spotter, Mitte April die Nachtigall. Am 26ten April Vormittag hatt der alte Gärtner Schott und ich in seinem Garten hinterm Haus eine Nachtigall gefangen. Ich habe ihm noch hinausbezahlt 1 fl. 30., es ist ein ganz junger, wahrscheinlich einjähriger Vogel. — Die Nacht darauf ist mir mein Ehinger Nachtschläger Cabut worden, ich hatte sie 5 Jahre; sie war aber schon sehr alt und hatte böse Füße. Den 6ten Juni ist mir meine zweite Ungarische Nachtigall Cabut worden, sie war noch den Tag zuvor ganz frisch und gesund, und hatte dieser nichts gefehlt so lange ich sie hatte, sie hatte in den 2 letzten Sommer noch viel bei Nacht geschlagen und es war

Taubenhalsamazone (s. S. 559).

überhaupt ein vortrefflicher Schläger. Sie hatte am morgens den Schnabel abgebrochen und hatte sich totgeblutet; wie es zuging, weiß ich nicht; ich hatte sie gerade 8 Jahr, denn im Juni 1844 waren diese Ungarische Vogelhändler hier. Den 9ten Mai hatt meine neugefangene Nachtigall anfangen schlagen, im Fruhjahr habe ich vom Taglöhner Beck 1 Geschos gekauft um 18 Kr. Im August vom alten Rach eine junge braune Waldgrasmücke gekauft um 48 Kr., sie hat gleich anfangen singen. Den 22ten November hatt meine Nachtigall wieder anfangen schlagen u. die junge Grasmücke, der Distel, die Schwarzblatte, das Rotkehlchen.

1853. Anfang Januar anfangen singen das Geschos; mitte Januar der junge Spotter, mitte März der Lerch, Schwarzblatt, das junge Rotkehlchen, alte Grasmücke, ausgangs Märtz der alte Spotter, der neue Distel.

1858. Am Pfingstmontag habe ich vom Verkäufer Staiff in Ulm eine Nachtigall gekauft, sie hatt auch gut geschlagen. (Forts. folgt.)

Zebrafinken.

Von M. Reimann, Breslau 16.

(Nachdruck verboten.)

Junge Zebrafinken, das Ideal jedes Prachtfinkenliebhabers. Wer unter den Züchtern hätte nicht dies schöne Ziel stets vor Augen, wen gelüstets nicht, eine ganze Schar dieser ewig lärmenden, ewig trompetenden kleinen Prachtfinken sein Eigen zu nennen. Welch reizendes Bild, eine ganze Gesellschaft dieser mäusegrauen, winzigen Knirpse mit dem lackschwarzen Schnäbelchen und dem schwarzweißen Schnurrbärtchen dicht aufeinander gedrängt auf schwankendem Ast sitzend. Die Alten fliegen auf den Boden der Voliere nach Grassamen und Eifutter und im Nu sitzt auch die ganze wilde Schar bei ihnen. Jetzt erhebt sich ein vielstimmiges Geschrei, Trompetenstöße durchtönen das Zimmer, jede andere Vogelstimme geht



Zebrafink.

in diesem Lärm unter. Die Alten stehen hochbeinig zwischen ihren Sprößlingen, eigentümliche Schlingbewegungen ausführend, und können nicht schnell genug das Futter aus ihrem Kropf in die vielen kleinen hungrigen Schnäbel befördern.

Doch ich will der Reihe nach erzählen. Es war Anfang August, da war ich so glücklich, ein Paar importierte Zebrafinken in tadelloser Verfassung zu erhalten. Die Vögel waren sehr scheu, besonders das Weibchen. Trotzdem begann das Männchen, bald darauf auch das Weibchen, in ihrem 75×50×75 großen Käfig in einem Badehäuschen mit Metallfassung, das ich unter dem Dach aufgehängt hatte, ihr Nest zu bauen. Unermüdlich trug besonders das Männchen Agavefasern in den Behälter. Alles wurde zugebaut bis auf ein kleines Einschlupfloch. Männchen und Weibchen brüteten abwechselnd, das Männchen eigentlich mehr als das Weibchen. Dieses war sehr oft lange draußen, so daß ich schon für die Brut fürchtete. Und richtig, es wurde zunächst auch nichts. Das Weibchen ging aus mir unerklärlicher Ursache nach 4tägigem Brüten nicht mehr ins Nest, das Männchen bemühte sich zunächst durchzuhalten, als aber die teure Gattin sich gar nicht mehr um die Eier kümmerte, mußte auch es die Sache für diesmal verloren geben. Es trug auch sofort alles, was es finden konnte, Grashalme, Vogelmiere usw. ins alte Nest auf die Eier drauf. 3 Eier waren bebrütet, 1 taub.

Nach diesem anfänglichen Mißerfolg wollte ich das zweitemal sichergehen. Ich stellte eine große Heckvoliere, die bis Ausbruch des Krieges von den verschiedensten Vögeln (selbstgezogenen Hänflings- und Stieglitzbastarden, selbstgezogenen Papstfink× Indigofinkbastarden usw.) bewohnt war, dann aber wegen seiner Größe überall im Wege war, in eine unbenützte helle Bodenkammer. Hier sollten die Vögel bald darauf in einer Pappschachtel (Kragenschachtel), die direkt unterm Dache angebracht wurde, zu diesmal erfolgreicher Brut schreiten. Ich betrat das Zimmer nur, um Futter und Wasser zu geben, im übrigen ließ ich die Zebrafinken machen, was sie wollten. Wieder wurde alles mit Niststoffen vollgestopft, zum Bauen wurden wieder nur Agavefasern verwandt. Hätte ich diese nicht gereicht, so hätten sie eben alles Erreichbare, Grashalme, Vogelmiere, Heu, dürre Ästchen zu Nest getragen. Ich hatte mir ungefähr berechnet, daß, wenn überhaupt, so Junge etwa am 10. September ausfallen müßten und reichte daher vom 7. ab schon Aufzuchtfutter, geriebenes hartgekochtes Hühnerei und, was ich allerdings schon vorher die ganze Zeit über gegeben hatte, feinen Grassamen, Vogelmiere und Wegerich. Hatte das Weibchen gelegentlich, wenn es einmal Ei bekam, das Gelbei für sich gefressen, so zog es jetzt zur Jungenfütterung das Weißei vor, ich kann wohl sagen, es nahm nur das letztere, wenn ich wegen Zeitmangels einmal das Ei in die Hälfte geteilt, also unzerkleinert in den Käfig gelegt hatte. Durch den Türspalt sah ich jetzt, daß beide Vögel öfter unten beim Futter waren, ich vermutete also stark, daß Junge aus-

gekommen waren, aber wieviel? Bald hörte ich die Kleinen im Neste zirpen, immer lauter und lauter. Aber so einen Skandal wie z. B. junge Mövchen machen sie doch nicht, ihre Stimme ist an und für sich anders als die anderer Nestvögel. Späterhin waren stets beide alte Zebrafinken zusammen beim Futter, im Grassamen, beim Ei und bei der Hirse, sie flogen auch gemeinsam in die Höhe, das Männchen ging dann regelmäßig zuerst ins Nest, fütterte, kam wieder heraus, dann erst folgte das Weibchen, setzte sein Futter bei seinen Kindern ab, kehrte zu seinem draußen es erwartenden Gatten zurück und nun gingen beide, sich für die nächste Atzung der Jungen die Kröpfe zu füllen. Es ist kein Irrtum möglich, wir, mein Bruder und ich, haben durch den Türspalt, ohne von den Vögeln gesehen zu werden, unabhängig voneinander dieselben Beobachtungen gemacht: das Männchen wurde stets vom Weibchen vornweg ins Nest gelassen, ja es sah sogar oft aus, als dränge letzteres das Männchen geradezu, zuerst hineinzufliegen. Wir sehen, hier hat der Mann den Vortritt, also einmal nicht tout comme chez nous.

In erster Linie wohl der Fütterung mit Grassamen verdanke ich den vollen Erfolg der Prachtfinkenzucht. Daß es Zebrafinken waren, das hat mich besonders gefreut. Es ist wohl auch nicht ganz so einfach, die Tierchen mit wirklichem Erfolg zur Zucht zu bringen, wenigstens heute nicht mehr, wo selten gute Vögel angeboten werden, Platzmangel wohl bei jedem Vogelliebhaber chronisch ist, und schließlich auch das Aufzuchtfutter schwieriger und auch nicht immer in einwandfreier Güte zu beschaffen ist. Die Zebrafinken waren übrigens nicht zu bewegen, außer den erwähnten Futterstoffen auch Mehlwürmer oder gequellte Ameisenpuppen oder süße Frucht anzunehmen.

Wie erstaunt war ich, als ich Anfang Oktober eines Morgens die Stube betrat. Drei wilde Vögel sausten in der Voliere, die beiden Alten, die völlig aus dem Häuschen zu sein schienen, und vorläufig mal ein Junges. Aber wie sah es aus? Nichts war zu sehen. Da Ruhe nicht eintrat, ging ich zurück auf meinen Lauscherposten und betrachtete das seltsame Tier aus respektabler Entfernung. Lackschwarzes Schnäbelchen, sonst mausgrau, nur den weißen Zügel der Alten hatte es. Ich schätzte die Zahl der Jungen nach den erlauschten Stimmen auf höchstens vier. Aber wie sollte ich mich freuen, als es allmählich in zwei bis drei Tagen erst zwei, dann vier, dann fünf und zu guter Letzt sechs wurden, die nach und nach ausflogen. Sie waren ebenso wild wie das zuerst auf der Bildfläche erschienene Junge. Sie waren vollkommen flugfähig, und wie ganz

Buchfink × Bergfink.

anders gut gehaltene Zebrafinken fliegen als z. B. Mövchen, wird jeder Kenner wissen. Die Jungen gingen übrigens auch tagsüber noch für einige Stunden ins Nest zurück, besonders, als noch nicht alle sechs ausgeflogen waren; denn wurden die im Nest zurückgebliebenen Jungen gefüttert, so sausten die anderen mit einer ungeheuren Gewandtheit und Schnelligkeit ins Nest zurück und wollten dort auch etwas erhalten.

Da mir Grassamen in großen Mengen zur Verfügung steht, war es wohl ein leichtes, die Jungen ans Selbstfressen zu gewöhnen. Heute, wo ich dies schreibe, sind sie außer Gefahr und möchten am liebsten schon selbst Nester bauen. Sie haben sich es jetzt endlich abgewöhnt, das Weibchen um Futter anzubetteln. Obwohl sie lange selbständig waren, taten sie das gar zu gern. Von dem Weibchen sage ich, wollten sie Futter; denn das Männchen vertreibt sie mit wütendem Zischen.

Die Jungen übernachten alle sechs stets im alten Nest, die alten Zebrafinken haben sich in einem

arzer Bauer ein neues Heim errichtet und — brüten, n den Jungen in dem großen Raum nach einigen troffenen Vorsichtsmaßregeln nicht behelligt.

Morgen für Morgen wecken mich Trompetenrufe s acht kleinen Schnäbeln, so laut, so eindringlich, s wollten die Vögelchen sagen: „Wer wird so nge schlafen? Wir sind schon lange wach!“ Ihre timmen mischen sich mit dem Geschrei meiner ngen Möwchen. Ein lang gehegter Wunsch ist füllt, wie glücklich bin ich! Welch Quelle reinster reude sind mir meine Zebrafinken!

Kleine Mitteilungen.

Die Firma Chapman in London hat von der stralischen Regierung die Erlaubnis erhalten, einen einaligen **Transport australischer Vögel nach Europa** veranstalten, jedoch unter der Bedingung, daß diese ögel nur an zoologische Gärten oder an Mitglieder issenschaftlicher Gesellschaften und anerkannter Zuchtreine abgegeben werden. Von dem Handelsgeschäft sollen e ausgeschlossen bleiben. Die Avicultural Society fordert an ihre Mitglieder auf, besondere Wünsche der Firma itzuteilen, die für die Beschaffung des erbetenen Materials rgt. Vielleicht benutzen auch deutsche Interessenten diese nmalige Gelegenheit und wenden sich direkt an Chapman. och besser wäre es meiner Ansicht, wenn der Vorstand er A. Z. die Angelegenheit in die Hand nähme und sich ir diejenigen ihrer Mitglieder, die besondere australische ünsche hegen, bei der Firma einsetzen wollte. Es wäre och wohl eher etwas zu erreichen. In Frage kommende iebhaber müßten sich mit dem Vorstand in Verbindung tzen. Wie denkt dieser über den Vorschlag? Dr. Luig.

In letzter Zeit kommen die früher sehr seltenen **Neuguinea-Edelpapageien** (s. Abb. S. 553) wieder vereinzelt auf den Markt. Es sind prachtvoll, vorwiegend ot in verschiedenen Schattierungen, gefärbte Papageien, on stattlicher Größe. Die Photographie kann die prächtige färbung natürlich nicht wiedergeben. Leider sind ihre aneren Eigenschaften nicht so anziehend. Sie sind ruhige, ngweilige Gesellen, lernen zwar einige Worte sprechen, nd aber in ihrem ganzen Wesen wenig anziehend. Ausahmen sollen vorkommen, sind aber selten. **Taubenalsamazone** (s. Abb. S. 555, 556). Gehört ebenfalls zu en seltener eingeführten Amazonen. Sie sind im Durchchnitt ruhig, weniger intelligent, lernen jedoch, wie ich nich persönlich überzeugte, einige Worte deutlich und klar prechen. Ein lebhafterer Kerl ist schon der **Zwergara** s. Abb. S. 551). Dieser Vogel wäre ein reizender Zimmerenosse, wenn er sich das verdammte unangenehme Schreien bgewöhnen könnte. Unser Bild zeigt den echten Zwergara Rotbugara), während auch ab und zu der noch kleinere Rarakana auf den Vogelmarkt kommt. Sämtliche Aufnahmen sind nach Tieren der bekannten Vogelhandlung Paul Tzornack, Berlin, gemacht. Lichtenstaedt.

Widerstandsfähigkeit der Vögel gegenüber schweren Lufterschütterungen. Es war vor vielen Jahren, als in er Werkstätte eines Bekannten, in welcher auch verschiedene Vögel untergebracht waren, eine Gasanlage explodierte. Im sich eine Vorstellung machen zu können, wie heftig iese Explosion war, sei erwähnt, daß die Gasglocke des Behälters mit solcher Wucht an die Decke geschleudert urde, daß diese den doppelten Boden glatt durchschlug. Der Besitzer wurde zu Boden geworfen und ihm das Trommelfell eines Ohres zerrissen. Eine Tür wurde samt Türstock aus der Mauer gedrückt und die übrigen aus den Angeln gerissen, sämtliche Fensterscheiben wurden total ertrümmert, während von den außen angebrachten Doppelenstern die Rahmen auf der Straße lagen. Die Detonation ar weithin hörbar, und trotz alledem erlitten die Vögel einen Schaden. Ein Käfig mit einer Schamadrossel wurde ogar zu Boden geschleudert, welche durch diese ungewohnte Ruhestörung in dieser Lage ihren Gesang aus voller Kehle ertönen ließ. Anton Luginger, Pfarrkirchen.

Ein Gegenstück zu Dr. Walders Papageien-Fliegertrupp. Vor einigen Jahren hatte ich Gelegenheit, freifliegende Prachtfinken zu beobachten. Ein mir bekannter Vogelpfleger in Coesfeld, Westfalen, setzte im Herbst ein Pärchen Grauastrilde zu seinen Finkenvögeln ins Flugbauer, das im Zimmer stand. Im kommenden Frühjahr wanderte die Gesellschaft in die Gartenvoliere. Der Volierendraht war aber so weitmaschig, daß die Astrildchen durchschlüpfen konnten. Es war nun allerliebst anzusehen, wie die kleinen munteren Tierchen aus- und einschlüpften, im Garten durch die Bäume und Sträucher huschten, sich sonnten und zum Füttern und zum Übernachten regelmäßig in die Voliere zurückkehrten. Die Tierchen haben sich sehr gut dabei gehalten und den folgenden Winter auf das beste überstanden. Der betreffende Herr hatte auch eine freifliegende Schwarzdrossel, die er im März ausließ und, nachdem sie im Garten eine Brut großgebracht, regelmäßig im Herbst sich mühelos wieder einfangen ließ und dann durch den Winter gefüttert wurde. Der Tod des betreffenden Herrn machte den interessanten Versuchen ein jähes Ende. B. Happe, Senden, Westfalen.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Gedankenlose Verhetzungspolitik. Wie wenig aufgeklärt und in falscher und verbohrter Ansicht noch eine große Mehrzahl unserer Mitmenschen, selbst eingefleischte und umsichtige Liebhaber anderer „Haustier“arten noch verfangen sind, zeigt ein „Wie erziehe ich meinen Hund“ betitelter Aufsatz von E. von Otto, veröffentlicht in der S.-V.-Zeitung und als Zweitdruck am 31. Oktober in der „Hundewelt“, Sportblatt und Ratgeber für alle Hundeliebhaber, Berlin SW 61, Blücherstraße 18. Der Verfasser läßt sich unter Bezugnahme auf das erste Kapitel „Der Fluch der Kultur“ der Schrift „Apologie der Technik“ von Dr. Graf R. N. Coudenhove zu folgender, nachstehend wörtlich angeführten Äußerung verleiten, die wahrlich seiner Aufgeklärtheit, Beobachtungsgabe und Belesenheit auf dem Gebiete der Vogelpflege und -haltung sein gänzliches Versagen in diesen Fragen dartut. Dieses ist um so mehr zu verwundern, als er in der Hundefrage nicht nur gesunde Ansichten vorbringt, sondern auch beweist, daß das von ihm Gesagte Hand und Fuß hat, und er somit zeigt, daß er ein verständiger Hundeliebhaber und -halter ist, dem jedoch trotzdem das richtige Verständnis für die Vogelliebhaberei, ihr Wirken und Streben abgeht. Traurig und sehr zu bedauern ist es, daß gebildete Menschen und wahre Tierliebhaber aus bisher nicht belehrbarer Unkenntnis oder aus vogelliebhaber- und -forschungsfeindlichen Absichten derartige, verwandte Liebhaberkreise schädigende Äußerungen, noch dazu in einer verbreiteten Zeitschrift tun. Jener Passus hat mich veranlaßt, zu ihm in der anfangs genannten Zeitschrift Stellung zu nehmen, und führe ich ihn zur allgemeinen Kenntnisnahme den Liebhabern an als Aufforderung, ihrerseits bei ähnlichen Gelegenheiten die Menschen von ihren falschen Ansichten zu heilen Der betreffende Passus lautet: „ . . . . Wie viele — oder wenige — Tierfreunde haben sich wohl schon die Frage vorgelegt, welches moralische Recht sie darauf besitzen, überhaupt ein Tier, das dem Menschen auf Gnade und Ungnade ausgeliefert ist, als Haustier zu halten? Es der Freiheit zu berauben? Das Recht des Stärkeren. Welch gedankenlose Grausamkeit und kalter Egoismus liegt darin, Vögel, denen Flügel gewachsen, in kleine Drahtkäfige einzusperren. Raubmörder kerkert man ein, um zu vergelten oder die Menschheit zu schützen. Was berechtigt uns, Vögel lebenslänglich hinter Gittern verkümmern zu lassen. Oder Fische in kleiner Kugel oder Glaskasten? Welcher Selbstbetrug des Besitzers, Gier nach gebrachtem Leckerbissen für Zuneigung zu halten! Man spricht von einem „Stück Natur im Hause“. Wer es damit ernst meint, schaffe sich Pflanzkasten und Blumentöpfe an, wecke im Kinde sinnige Freude am Wachsen und Blühen, lehre es Pflege, aber wehre jede Berührung von Tieren in der Natur oder gar Tötung für Sammelzwecke und Einsperren von Käfern. . . . . .“ Derartigen Ansichten und ihrer Verbreitung ist aufs schroffste und nachdrücklichste entgegenzutreten und durch Belehrung und

Einladung zu Besichtigungen von Vogelstuben dem Krebsleiden, der Lüge, zu Leibe zu gehen. Ich hoffe auf Unterstützung aus dem Leserkreise unserer „Gef. Welt".

John Kuntzendorff, Berlin.

Bücher- und Schriftenschau.

Seit dem Jahre 1924 erscheint im Verlage von Hugo Bermühler, Berlin-Lichterfelde, eine wertvolle naturwissenschaftliche Zeitschrift „Der Naturforscher", illustrierte Zeitschrift für das gesamte Gebiet der Naturwissenschaften, des naturgeschichtlichen Unterrichts und des Naturschutzes mit amtlichem Nachrichtenblatt der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen, herausgegeben von Prof. Dr. Walther Schoenichen. Es erscheinen vierteljährlich drei Hefte, die ungefähr je 50 Seiten stark sind. Die interessanten und lehrreichen Abhandlungen sind recht abwechslungsreich angeordnet und mit Bildern und schematischen Zeichnungen versehen, die ebenso wie der Text auf gutem holzfreien Papier gedruckt sind. Jeder, der sich auf dem Gebiete der Naturwissenschaften weiterbilden und unterrichten will, kommt hier zu seinem Recht, und die Zeitschrift muß jedem Naturfreunde, dem Laien wie dem Wissenschaftler, empfohlen werden. Aus der großen Anzahl der schon erschienenen Hefte seien einige Artikel erwähnt: Bauch, Die Vielgeschlechtlichkeit und ihre Vererbung bei den Pilzen; Steuburger, Neue Untersuchungen über das Leben der Motten; Der nördliche See-Elefant; Koeppen-Wegener, Die Klimate der geologischen Vorzeit; Plaßmann, Eine besondere Art der Nebelflecke; Arndt, Der Storch als Schützling des bulgarischen Volkes; Wettstein, Brutpflege bei Amphibien; Hölzel, Tiergeographie in der Briefmarke; Wachs, Entwicklungsmechanik; Drost, Der nächtliche Vogelzug und seine Wahrnehmbarkeit; Heinroth, Storch und Kranich, ihre Jugendentwicklung als Nesthocker und Nestflüchter; Heinroth, Zahme und scheue Vögel.

Rudolf Neunzig.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig.



1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Tauschvermittlung (T.-V.): Max Dähnick in Berlin NO 18, Gr. Frankfurter Str. 90, Ecke Markusstr. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

R. Aeschbach, Zürich IV, Pflanzschulstr. 95: Steinrötel.

R. Aumüller, Fabrikdirektor, Delitzsch: 1,0 Singsittich, 3,3 Tarantiner.

G. Behnke, Zoologische Handlung, Berlin O 34, Petersburger Str. 29: Schamadrosseln, Sprosser, Nachtigallen, Müllerchen, Raubwürger, rotrückiger Würger, Halsbandregenpfeifer, Blaukehlchen, gelbe Bachstelzen.

Josef Krah, Vogelhandlung, Frankfurt a. M., Kühgasse 7 (an der Konstablerwache): Tovisittiche.

Petry, Coblenz, Casinostr. 6: Baumfalk, 1,1 Steinkauz.

Pistor, Oberaula (Bez. Cassel): Stieglitzbastarde, Stieglitz×Grünlinge, 1,1 Mexikan. Schwarzkopfkernbeißer.

Max Reim, Altstadt Waldenburg 97 (Sachs.): 1,0 Girlitz×Kanarie, 0,1 Jagdfasan, 0,1 Mongolenfasan.

Johann Rohracher, Lienz (Tirol, Österreich): 1 Rauhfußkauz, 2 Raubwürger, Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes), Kirschkernbeißer.

Schmidtke, Zoologische Handlung, Neukölln, Nogatstr. 30: Sprosser, Nachtigall.

L. Trillhof, Jena, Markt 8: 1 Nachtigall, 3 Fitislaubsänger, 1 Braunelle.

Frau Lehrer Vogel, Zwenkau: 1,1 kleine Kubafinken, 0,1 Spitzschwanzamadine, 1,1 Tarant. Zwergpapagei.



Herrn F. B., Schwerin. Jeder kranke Vogel muß von den gesunden getrennt werden. Es ist schwer, nach einer kurzen Beschreibung die Krankheit zu erkennen. Da der Vogel aber sonst munter ist, handelt es sich vermutlich um eine leichtere Erkrankung der Atmungsorgane. Er wird am besten in einen kleineren Käfig in die Nähe des Ofens gebracht. Der Käfig wird mit Blattpflanzen umgeben, die vermittels eines Zerstäubers mehrmals täglich mit lauem Wasser benetzt werden. Die so entstehende feuchtwarme Luft wird zur Heilung beitragen. Als Getränk wird täglich viermal warmes, am besten mit Bienenhonig vermischtes Wasser gereicht. Statt des Honigs kann auch Zucker verwendet werden. Nach dem Löschen des Durstes wird das Wasser fortgenommen. — Falls der Vogel sehr fett ist, müßte durch knappere Kost für Entfettung gesorgt werden.

Herrn Prof. F. B., Danzig-Langfuhr; Herrn L. W., Frankfurt a. M.; Herrn A. J., Biberach-Riß; Herr Dr. L., Brüssel: Beiträge dankend erhalten.

Herrn P. B., Rügen, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn P. B., Ridgeville (Manitoba). Der American Goldfinch wird hier Trauerzeisig oder amerikanischer Stieglitz genannt. Er gilt hier als ein weichlicher Vogel. Er muß neben trockenen Samen auch gequollene und gekeimte erhalten. Das entspricht den natürlichen Verhältnissen in der Freiheit. Von Sämereien erhält er Mohn-, Salat-, Distel-, Hanfsamen, auch Nadelholz- und Grassämereien. Daneben erhält der Vogel kleine Insekten, besonders Blattläuse und frische Zweige mit Blattknospen.

Herrn v. B., Werder. Gilt als zuverlässig.

Herrn J. B., Düsseldorf. 1. Waldvogelliebhaberverein „Eintracht", Düsseldorf-Mitte, Vereinslokal „Wilhelm Bach", Luisenstr. 118, tagt am 1. Sonntag im Monat vorm. 10 Uhr. — „Vogelschutzverein 1906" zu Düsseldorf jeden 2. Sonntag im Monat vorm. 10½ Uhr bei „Wilhelm Landwehr", Blücherplatz. — Vogelschutz- und Liebhaberverein „Finkenklub" zu Düsseldorf-Oberbilk, jeden letzten Sonntag im Monat, Restaurant Snyter, Hildener Str. — 2. Der Fang ist auch in dieser Zeit verboten. Die Genehmigung sucht man unter Bezugnahme des § 5, 3 des Deutschen Vogelschutzgesetzes in Stadtkreisen beim Polizeipräsidenten bzw. Bürgermeister, in Landkreisen beim Landrat nach.

Frau H. S., Dinslaken. Wenn trotz vorhandenen Nistgelegenheiten das Bandfinkenweibchen die Eier stets auf den Boden des Käfigs legt, läßt sich nichts tun als abwarten. Später wird doch der Nistkasten aufgesucht werden. Gegen das Kahlwerden einzelner Körperstellen besonders bei Prachtfinken läßt sich nichts tun, als die Tiere richtig zu pflegen. Es tritt dann nach einiger Zeit die Wiederbefiederung dieser Stellen ein.

Frau D. K., Osnabrück. Alle die genannten kleinen Vögel bewohnen sehr große tropische bzw. subtropische Gebiete, in deren Teilen Klima und Brutzeit sehr verschieden sind. Die Brutzeit fällt stets mit der Regenzeit zusammen, und der Eintritt der Regenzeit ist in den einzelnen Teilen des Verbreitungsgebietes verschieden. Damit hängt auch die Erneuerung des Gefieders zusammen, die nach der Brutzeit einsetzt. Da uns fast stets unbekannt ist, in welchem Gebiet die Vögel gefangen sind, ist es unmöglich, die Mauserzeit zu bestimmen. Das stellenweise Kahlwerden hängt aber mit diesen Dingen kaum zusammen, sondern ist wohl eine Folge der Zimmerhaltung, bei der die Vögel den atmosphärischen Einflüssen ganz entzogen sind. Meist wird die allzu trockene Zimmerluft dabei mitwirken. Neben richtiger Ernährung und Haltung wird es nötig sein, stets für Zufuhr frischer Luft zu sorgen und, wenn dies durch Öffnen der Fenster nicht immer möglich ist, so wäre durch Aufstellen und häufiges Überbrausen von Pflanzen mit Wasser vermittels eines Zerstäubers für Luftveränderung und Durchfeuchtung der Luft Sorge zu tragen. Eine Wiederbefiederung der kahlen Stellen wird dann allmählich eintreten.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

Jahrgang 54 — 19. November 1925 — Heft 47

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Erinnerungen eines Papageienliebhabers. Von Pfarrer Möller.
Das Liebhaberjahr. Plauderei von J. Birk, Leipzig. (Forts.)
Neueinführungen und Seltenheiten. Von K. Neunzig. (Forts.)
Versuche die Gründe des Weißwerdens bei einem gefangenen Granatastrild zu analysieren und ein paar Worte über das Gefangenleben der Art. Von A. Adlersparre. (Schluß.)
Notizen aus vergangenen Jahren. Von A. Jena, Biberach/Riß. (Forts.)
Zebrafinken. Von M. Reimann, Breslau 16.
Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Bücher- und Schriftenschau - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Ausstellungen - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

reutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellungen.

Der **Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden**, gegr. 1906 (vorm. Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden), veranstaltet in diesem Jahre vom 4. bis 7. Dezember seine Vogelschau im Italienischen Dörfchen. Ausgestellt werden einheimische und fremdländische Sing- und Ziervögel. Auch in der diesjährigen Vogelschau soll der Gedanke, wie die Vogelpflege und der Vogelschutz geübt werden, veranschaulicht werden. Alle Vogelliebhaber sind herzlich willkommen.

Die Ausstellungsleitung.

Der **Verein der Freunde von Sing- und Ziervögeln in Lübeck** erlaubt sich hiermit, alle Sports-Vereine und Freunde zu seiner am 12. und 13. Dezember 1925 stattfindenden Allgemeinen Ausstellung ergebenst einzuladen. Das Standgeld beträgt für Kanarien pro Kollektion 8 M., für Ziervögel pp. in Käfigen bis 50 cm Länge 1.50 M., bis 120 cm Länge 3 M. pro Käfig. Anmeldeschluß: 1. Dezember 1925. Als Preise kommen außer Ehrenpreisen 32 echte Medaillen (teilweise Senatspreise) zur Verteilung.

Herbert Müller, Lübeck, Hüxtraße 119

Aus den Verbänden.

Vereinigung d. Vogelliebhaber Landesverband Preußen. 1. Vors. Karl Gumprich, Berlin W 50, Nürnberger Str. 44 III; Geschäftsstelle: 1. Schriftf. P. Böhme, Berlin O 17, Rüdersdorfer Str. 69; Kassierer: Erich Merz, Bln.-Friedenau, Wilh.-Hauff-Str. 14. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt". Schriftwechsel grundsätzlicher Art ist an den 1. Vors., im übrigen an die Geschäftsstelle (2. Vors.) zu richten. Geldsendungen: Postscheckkonto Berlin NW 7 Nr. 46155 für Erich Merz. — Aufgenommen wurde Herr Ernst Scheibe, Graveur, Osnabrück, Spindelstr. 18b. — Vorstandssitzung vom 9. November 1925 im Königgrätzer Garten, Königgrätzer Str. 111. Der Vorsitzende, Herr Gumprich, eröffnet die Sitzung um 8½ Uhr mit der Begrüßung der erschienenen Vorstandsmitglieder. — Hierauf wird das Protokoll der letzten Sitzung verlesen und angenommen. — Das neue Mitgliederverzeichnis dürfte wohl jetzt in den Besitz der Mitglieder gelangt sein. — Etwa aus den Ortsgruppen ausscheidende Mitglieder sind von den Vereinsvorständen aufzufordern, die in ihrem Besitz befindlichen Mitgliedskarten des Landesverbandes zurückzugeben. Die Karten sind zu vernichten. — Im weiteren Verlauf der Sitzung erstattet der Herr Vorsitzende Bericht über den geschäftlichen Briefwechsel. Der Vogel- und Aquarien-Liebhaberverein in Herne hat sich aufgelöst, und ist ein neuer Verein, bestehend nur aus Vogelliebhabern, gegründet worden. — In Vorarbeitung ist folgende Sache. In den Ortsgruppen sollen Mitglieder bestimmt werden, welchen bestimmte Ortsteile ihrer Städteumgegend zugewiesen werden, in denen sie die dort vorkommenden Vogelarten registrieren. Das gesammelte Material soll dann einer Zentralstelle zugeleitet werden. Weiter sollen nach Möglichkeit die Vereinsstatuten in ihren Grundpunkten einheitlich gehalten sein. Es bedarf dazu noch großer Arbeit. — Neu entstehende Vereine sollen bei Abfassung ihrer Satzungen dahingehende Unterweisung und Unterstützung vom Vorstand des Landesverbandes erhalten. — Eine längere Aussprache findet darüber statt, daß Einzelmitglieder sich unmittelbar dem Reichsverband anschließen. Nach Meinung des Vorstandes können sich Einzelmitglieder nur den betreffenden Länderverbänden anschließen, darüber muß Klarheit geschaffen werden. Diese Angelegenheit wird in den Jahresversammlungen behandelt werden. — Schluß der Sitzung um 10 Uhr. P. Böhme.

Aus den Vereinen.

Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Epstrup a. d. Weser; Postscheckk. Hannover 56714; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10. Den Mitgliedern wird rechtzeitig zum 1. Dezember, dem Schluß des Vereinsjahres, die Liste für die Bestandsangaben zugehen. Ich bitte schon heute um achtsame Behandlung derselben und Rücksendung bis spätestens den 10. Dezember, da am 15. Dezember die Ablieferung an die Druckerei erfolgen muß. Stichtag für die Bestandsaufnahme ist der 1. Dezember 1925. A. Krabbe.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögeln in Apelerbeck. Sitzung jed. 1. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, in der Wirtschaft Sprave, fr. Fritz Lecking, Kirchstr. F. Lecking, 1. Vors.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstr. 37a. Gäste stets willkommen. P. Böhme, Schriftf.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke, Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde und Geflügelzucht Breslau. Vogelliebhaber Breslaus, wollt ihr euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei nicht endlich auch zusammenschließen, wie es in anderen Städten schon längst geschehen ist? Ein Stamm von erfahrenen Vogelpflegern ist vorhanden, jedoch können Fortschritte nur erzielt werden, wenn alle noch abseits Stehenden sich uns anschließen und unsere mit belehrenden Vorträgen verbundenen Vereinsabende besuchen. Auskunft ert. bereitwilligst P. Spitzner, 1. Schriftf., Ofener Str. 26.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Dessau und Umgegend. Gegr. März 1925. Vereinslokal „Fürst Blücher", Ecke Antoinetten-Leopoldstr. Versammlung jeden 2. Mittw., abends 8 Uhr. — Nächste Vers. 25. Nov. Gäste zu allen Veranstaltungen stets willkommen. J. A.: Dielitzsch, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jed. 2. u. 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Rest. „Zum Löwentor", Königswall 75. P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Vers. jed. Freitag, abends 8 Uhr, i. Vereinsl. „Bienenkorb", Schloßstr. Vogelliebhab. als Gäste willkommen. E. Schubert, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Eliesenhof", Eliesenstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Mittelthüringens Sitz Erfurt. Sitzung jeden 2. Mittwoch und jeden letzt. Sonnabend im Monat im Vereinsl. „Stadt Chemnitz", Thomasstr. 57. Näh. Auskunft erteilt Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Vereinigung einheimischer Waldvogelliebhaber zu Görlitz und Umgegend. Zusammenkunft jeden 3. Sonnabend im Monat im Restaurant „Zum Bismarckgarten", Bismarckstraße. 1. Vors. W. Lücker in Görlitz, Konsulstr. 7. Vogelliebhaber als Gäste willk. J. A.: Erich Rothe, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 1. Dezember. A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Der **Hannoversche Vogelschutzverein zu Hannover**, gegr. 1881, wirkt mit sichtbarem und anerkanntem Erfolge für Vermehrung und Schutz der Vogelwelt bei Hannover durch Aufhängen von jährlich einigen hundert Nistkästen aller Art, durch Erweckung von Interesse und Liebe für die Vogelwelt mit monatlich, zur Gesangszeit wöchentlich stattfindenden Belehrungsspaziergängen und durch Vorträge und Austausch der Beobachtungen in den jeden dritten Dienstag des Monats stattfindenden Vereinsversammlungen. Seine Bestrebungen dienen also lediglich gemeinnützigen Zwecken. Mitgliederzahl rund 1200, jährlicher Beitrag nur 1 M. Meldungen an den Vorsitzenden Herrn Fritz Becker, Hannover, Boedekerstr. 1 F. — In der vergangenen Sitzung hielt Herr Lehrer Ottens einen sehr beifällig aufgenommenen Vortrag über die Vögel der Leineniederung bei Hannover. Zufolge des vielseitigen dortigen Geländes wäre diese von einem reichen Vogelleben bevölkert, nicht sowohl von längere Rast machenden Durchzüglern als ebenso von Brutvögeln.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Von den 163 festgestellten Arten unterwarf der Vortragende eine Reihe der bemerkenswertesten einer näheren Betrachtung. Ganz besonders würde im März der ungestörte, beim Dorfe Laatzen liegende Teil von Wasser- und Sumpfgeflügel regelmäßig zu längerem Aufenthalte benutzt, so daß man sich in der Zugzeit dort wie auf eine Vogelinsel des Meeres versetzt fühle. — Nächster Spaziergang Sonntag, den 22. d. M. in die Eilenriede, Treffpunkt 10 Uhr Kriegerdenkmal. Becker.

Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber. Die Dezemberversammlung am 10. wird im Landesheim abgehalten.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Der Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögel zu Hörde, gegründet im September 1920, hält seine Versammlungsabende in den Wintermonaten von Oktober bis April regelmäßig alle 14 Tage des Sonntags von nachmittags 5 Uhr an, in den Sommermonaten von April bis Oktober um 8 Uhr abends ab. Gäste und Liebhaber sind stets willkommen. Vereinslokal Restaurant Burghof, Besitzer H. Ungewitter, Bruchstraße. — Der Verein feierte am Sonntag dem 27. September 1925, in den Vereinslokalitäten seines Mitgliedes Ungewitter sein fünfjähriges Bestehen. Die Festrede hielt der 1. Vorsitzende, Herr Reyer. Er wies auf Entstehung und Werdegang des Vereins hin, der, in den schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen der Inflationszeit gegründet, trotz der drohenden Arbeitslosigkeit im Industriegebiet es verstanden habe, eine stattliche Mitgliederzahl zu werben und an sich zu fesseln. Zu Ehren der Gründer des Vereins soll im Vereinslokal ein Diplom aufgehängt werden mit den Namen der Gründer, der Herren Hallmann, Sandrok, Koch, Reyer, Lecking und unseres verstorbenen Mitgliedes Brinkmann. Das Fest war ganz dem Frohsinn gewidmet. Gute Musikvorführungen, hübsche Gesangsduette, heitere Couplets und ein von Vereinsmitgliedern aufgeführtes Lustspiel hielten die Mitglieder und Gäste in heiterster Stimmung und fanden lebhaften Beifall. Die Mitglieder Iffland, Lohs, Wedekind, die mitwirkenden Damen Frl. Laube, Lecking, Bechleitner, Obion leisteten Ausgezeichnetes, ebenso Herr Schröder jun und Herr Maffei. Für seine außerordentlich komischen Vorträge erntete Herr Wilhelm Schwickrath reichen Beifall. Später gab man sich dem Vergnügen des Tanzens hin, das alle Mitglieder und Gäste noch lange beisammen hielt.

Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Versammlung aller 14 Tage Sonnabends. Vereinslokal: Gasthaus „Zur Krone", Jena, Grietgasse. Gäste stets willkommen. Jena besuchende Vogelliebhaber treffen jeden Sonntag vorm. den Schriftführer Adolf Voigt, Jena-Ost, Feodorastraße 13, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube freundlichst eingeladen. Adolf Voigt, Schriftf.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an!

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal bei Gastwirt Lapschies, Kaiserstr. 46a. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 19. Nov. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Laßner im Volkshaus-Nord, Glogauer Str. 20. Liebhaber willk. J. A.: Friedrich.

Verein der Vogelfreunde Linden. 1. Vors. P. Winkel, Linden, Fröbelstr. 9.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wst., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Sitzung aller 14 Tage im Restaurant „Zum Neckarstrand", Messeplatz 1. Liebhaber willkommen. Joh. Daubmann, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. im Monat. Vereinslokal: Gastwirtsch. Augustusburg, inn. Leipziger Str. Nächste Vers. 20. Nov., abends 8 Uhr. P. Schmidt, 1. Vors.

Anzeigenteil

Viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Scheck od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

öfige u. Gerätschaften

Sehr guten
Papageikäfig
uft für 8 ℳ [1568
Ritter, Badeborn i. Anhalt.
A.Z.-Mtgl. 184.

Gebe ab

oliere, Drahtgeflecht, 1,27×77× gegen 0,3 Zebrafinken und Mövchen, halbjährig. [1569
Vollwein, München,
Renatastr. 19a IV r.

ringe f. Wellensittiche

eicht in Qualität, Spezialerzeugnis, Wellensittiche in allen Farben, blaue u. blaublütige, sowie weiße chieferblaue Kanarien empfiehlt
E. Balser, Fulda. [1570

Futtermittel



Mehlwürmer
veg. gez., ¼ Liter franko gegen Voreinsendung von RM. 2.—. [1571
Bonitas-Versand,
Rostock i. M. 3.

Mehlwürmer
à Pfund 5.60 ℳ, ½ Pfund 2.— ℳ franko gegen Voreinsendung

Ia Ameiseneier	Pfd. 4.— ℳ
Ia Muska	Pfd. 1.50 ℳ
Ia Weißwurm	Pfd. 4.50 ℳ
Seidenraupenschrot	Pfd. 0.75 ℳ
Garnelen gem.	Pfd. 0.35 ℳ

Alles diesj. Ware, à Pfund ab hier.
Th. Witte, Niederndodeleben
b. Magdeburg. [1572

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark ¼ Pfd. franko versend. D. Waschinski & Co., Biesenthal I (Mark). [1573

Gut erhaltener
Springbrunnen
zu kaufen gesucht. [1574
Lehmann, Leipzig, Hofmeisterstr. 7 II

Unübertroffen ist
Heidelberger Vogelfutter,
hergestellt nach Vorschrift und unter Kontrolle von
Professor Dr. Otto Fehringer
durch
GENO-WERK - Mannheim
Rheinkaistraße 8b.

Anfragen über die Pflege einheimischer Vögel werden gerne beantwortet. Rückporto beilegen. [1575

Über das neue Buch von **Bengt Berg, „Mein Freund, der Rege pfeifer"** unterrichtet die Leser der „Gefiederten Welt" die Beilage in der heuti Nummer. Ungemein liebenswürdig und ansprechend geschrieben, geradezu glänze bebildert, wird der hübsche Band für viele Vogelfreunde und deren Angehörige d beste Geschenk für diese Weihnachten sein. Bestellungen erbitte ich möglichst bald, da es ist die Möglichkeit vorhanden, daß die Auflage schon vor dem Feste zu Ende ge **Alfred Trotschütz,** Buchhändler u. Antiquar, **Hannover,** Große Aegidienstr. Postscheckkonto: Hannover 200 (Cruse's Buchhandlung). [1

Preis-Abbau!

Heidelberger Vogelfutter

nach Professor Fehringer

in bekannt hervorragender Qualität

kostet nur:

1.	1 kg	braune Packg.	für Erdsänger . .	M. 8.40
2.	1 „	graue „	„ Grasmücken usw.	„ 4.50
3.	1 „	blaue „	„ Drosseln usw. .	„ 4.00
4.	¾ „	rote „	„ Stieglitze usw. .	„ 1.45
5.	¾ „	grüne „	„ Hänflinge usw.	„ 1.50
6.	1 „	gelbe „	„ Kanarien . . .	„ 1.65

Packungen zu ca. 250 g mit kleinem Aufschlag. Versand gegen Nachnahme. Vertreter an allen größeren Plätzen gesucht. Wiederverkäufer Rabatt.

GENO-WERK m.b.H., Mannheim
Rheinkaistraße 8b. [1576

„ORNIS" Freie Bezugsvereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands.

Gegründet 1912 ∴ Fernsprecher 4198 [1582

Fachgemäße Belieferung mit Vogelfutter („Reform-Normal", individuelle Zusammensetzung bei restlosem Verbrauch; stets frisch gemischt). Hunderte von Liebhabern füttern seit über einem Jahrzehnt mit bestem Erfolg nur „Reform-Normal".

Reform-Normal-Käfige Mod. ORNIS 1925, neue Preisliste erschienen. — Modern eingerichtete Käfig-Bauanstalt mit elektrischem Betrieb.

Anschrift: Ornis-Haus, Halle-Saale. Der Geschäftsführer: Martin Sperling.

„Naturell"

das seit Jahrzehnten in Liebhaberkreisen eingeführte und bestens erkannte Futter für edle Weichfresser ist wieder in bester Friede beschaffenheit lieferbar! **„Naturell" ist Qualitätsware,** Grund langjähriger Erfahrungen zusammengestellt und durch A ritäten bestens beurteilt. [

Preis: kg 6.— M. Probesendungen gegen Einsendung von 1.— in Briefmarken. Drosselfutter kg 2.— M.

Empfehle außerdem bestes Körnerfutter für Einheimische und Exoten, ferner Ia Ameisenpuppen, Weißwurm usw.

Nur direkt zu beziehen von

Wilhelm Dietze, Leipzig Kurprinzstr. Nr.

Ia Ameiseneier

mit würzigem Geruch à Pfd. 4.— M, bei 10 Pfund 35.— franko

Ia Elbweißwurm Pfd. 4.50 M

Mehlwürmer gegen Einsendung von 2.— M ¼ Pfund franko.

W. Busse, Magdeburg,
Gr. Mühlenstraße 1. [1577

Offeriere Vogelfutter in prima Qualität:
Betr. Ameiseneier . . à Pfd. 3.80 M.
10 Pfd. 36.— M. franko
Zecke . . . . . Pfd. 2.50 M.
Con. Eigelb . . . . . Pfd. 2.— M.
Karottengrieß . . . . Pfd. 0.70 M.
Drosselfutter . . . . Pfd. 0.80 M.
Lucullus extra Mischung ½-Pfd.-Paket 0.95 M., weiße Packung 0.80 M.
Senegalhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Silberhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Algierhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Kerbternahrung f. Kanarien Pfd. 1.30 M.
Versand per Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. [1578

Paul Tzornack,
Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189.
(Postscheck-Konto Nr. 652 65)
Gegründet 1905.

Bei Anfragen und Bestellungen bitten wir, sich auf die „Gef. Welt" zu berufen

Allen Vogelliebhabern zur Kenntnis!

daß ich das Erzeugungsrecht für 6 Arten Vogelfutter für **Körner- und Weichfresser** nach Angaben des Herrn [1580

Professor Dr. O. Fehringer, Heidelberg

käuflich erworben habe. Das Futter gelangt nur in gesetzl. gesch. großen und kleinen Originalpaketen mit der Schutzmarke **„Zaunkönig"** unter dem Namen **„Ideal"** in den Handel. Der Versand erfolgt franko jeder Station frei Verpackung für Deutschland durch:

Fa. Oskar Adler's Nachfolger, Zittau i. Sa., Weberstraße.

Für Tschechoslowakei:

Stefan Quaiser, Reichenberg i. Böhmen, Herrengasse.

Jeder Vogelliebhaber wolle sich von der Qualität des **„Ideal"** überzeugen.

Vereine und Wiederverkäufer erhalten Rabatt!

Quaiser's Vogelfutter

in 6 verschiedenen Arten für **Weich- und Körnerfresser.**

Fürs Deutsche Reich Hauptverkaufsstelle:

Oskar Adler's Nachf.,
Zittau i. Sachsen,
Weberstraße 39.



in großen und kleinen Originalpaketen liefert franko frei Verpackung für die Tschechoslowakei:

Alleinerzeugung u. Versand:
Stefan Quaiser,
Reichenberg (Böhm.),
Herrengasse 10.

nach Angaben von Prof. Dr. O. Fehringer, Heidelberg!

Weichfresser:	Erdsänger und ähnliche Vögel,	Packung	gelb,	groß:	2.40,	klein: 1.30
	Grasmücken u. Schwarzplatten,	„	rosa,	„	2.25,	„ 1.20
	Drosseln u. härtere Weichfresser,	„	grün,	„	1.30,	„ 0.70
Körnerfresser:	Stieglitze und Zeisige,	„	rot,	„	0.75,	„ 0.40
	Hänflinge, Girlitze usw.	„	blau,	„	0.75,	„ 0.40
	Kanarien, beste Qualität,	„	weiß,	„	0.75,	„ 0.40

Jeder Liebhaber wolle sich von der Qualität des **„Ideal"** überzeugen! [1579

Vereine und Wiederverkäufer Rabatt!

Mehlwürmer

1 Pfd. 5 M ab hier,
6 Pfd. franko und Verpackung fr
geg. Voreinsendung ¼ Pfd. 2 M fra

Ameiseneier, 1925e

1 Pfd. 3.50 M, ab hier 9 Pfd. 31 M

Ia Weißwurm, 1925

Pfd. 4.50 M, 9 Pfd. 36 M franko

Ia Muska-Zecken

1584] Pfund 1.50 M.

Seidenraupenpuppen, gema

Pfd. 0.60 M ab hier.
Großabnehmer Rabatt.
Karl Claus, Mutterstadt
(Hauptbahnhof).

Mehlwürme

(das ganze Jahr hindurch)
M 5.— das Pfd., ausschließl. Porto Verp.; bei Abnahme von 6 Pfd. P u. Verpackung frei.

Ia Ameiseneie

3.50 M per Pfd.
9 Pfd. netto 30.— M franko.

Ia Weißwurm, 1925er 4.— d.
Ia Muska-Zecken . . 1.50 d.
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen 0.60 d.

ff. Universalfutter
Alleskwa I für Nachtigallen M
„ II für Grasmücken M
„ III für Drosseln . . M
das Pfund ab hier, ausschl. Verp. größeren Mengen billiger.

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
A. Schrich II, Waldsee (Pfa

Vogelfutter

für **Kanarien, Waldvögel, Ex Papageien, Weichfresser.** Anerk bewährteste Mischungen auf Grund jähriger Erfahrung. Liste 13 über V futter umsonst.

W. Göpel, Leipzig

Ernstlinring 1. Telephon 14
Bei Anfragen bitte auf die „Gefie Welt" Bezug zu nehmen.

Ein Versuch

überzeugt jeden von der Güte m **Universalfutters.** Preis 2 M. p. Sämtliche Futtersorten für Ex Wald- und Kanarienvögel zu bill Tagespreisen. Versand geg. Nachn Verpackung und Porto werden b berechnet.

P. H. Kirsten, Leipzig 3,
Zeitzer Str. 53. Fernruf

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdeb.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 26. November 1925 | Heft 48

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Erinnerungen eines Papageienliebhabers.

Von Pfarrer Möller.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Außer den Genannten kenne ich den Doppelgelbkopf und die Gelbnackenamazone aus eigener Erfahrung. Der Doppelgelbkopf, den ich als jungen, unausgefärbten Vogel erhielt, erwies sich als sehr gelehrig und lernte schnell und deutlich sprechen. Das gleiche kann ich von dem Gelbnacken berichten, gleichfalls einem noch jungen unausgefärbten Tier. Ich bezog diese Amazone im Frühjahr von Herrn P. Tzornack, Berlin, und wurde damit auf das beste bedient. Nach etwa 14 Tagen fing sie an zu sprechen und verfügt jetzt bereits über einen ansehnlichen Wortschatz. Monatelang war sie zurückhaltend und mißtrauisch mir gegenüber und wies alle Annäherungsversuche meinerseits in nicht mißzuverkennender Weise mit geöffnetem Schnabel zurück. Da ich sie aber mit immer gleichbleibender Ruhe und Freundlichkeit behandelte, schmolz schließlich das Eis, bis sie sich eines Tages, oder richtiger eines Abends in der Dämmerung das Köpfchen krauen ließ. Von da an biß sie nicht mehr nach dem Finger und stieg dann sehr bald ohne weiteres auf die Hand. Dies Verhalten ist ein Beweis für die hohe Intelligenz eines solchen Tieres. Es hat lange in Reserve beobachtet, bis es sich überzeugt hatte, daß man es gut mit ihm meint.

Eine Schattenseite hat der so sympathische Gelbnacken, das ist sein Naturgeschrei, das durch Mark und Bein geht. Man muß gute Nerven haben, um dabei ruhig zu bleiben. Hoffentlich wird's mit fortschreitender Erziehung in dieser Hinsicht besser werden. Zu drollig ist es, wenn der daneben-stehende Jako, sobald die Amazone zu lärmen anfängt, in strafendem Ton ruft: „Pfui, Lora, biste ruhig! Du, du!! Paß auf!" usw. Worauf Lora dann das „Pfui!" zurückgibt und ihrerseits „ruhig!" und „gehste weg, Dreckſack!" gebietet, so daß sich oft ein richtiges Schimpfduett zwischen den beiden entwickelt.

So gute Sprecher man unter den Amazonen findet — ich habe eine ganze Reihe solcher kennengelernt —, an den Graupapagei reichen sie nicht heran. Die Aussprache der Amazonen hat, soweit meine Erfahrung reicht, etwas Hartes, Monotones, mehr oder weniger Blechernes, vor allem, wenn der Vogel laut spricht. Die Modulations- und Ausdrucksfähigkeit, über die der Jako verfügt, erreicht die Amazone nicht. Der Jako betont dasselbe Wort in der verschiedensten Weise, artikuliert ganz genau, verschluckt und verwischt keinen Laut, er hat eine bewundernswerte Fähigkeit, die Worte genau so wiederzugeben, wie er sie hört und wie sie ihm in wechselnder Betonung vorgesprochen werden. Das bringt die Amazone in dem Maße nicht fertig, und während der Jako wirklich wie ein Mensch spricht, erinnert die Amazone mehr oder weniger an einen Sprechapparat, besonders wenn sie laut wird. Man sollte es sich deshalb zur Regel machen, mit seinem Papagei niemals laut oder gar schreiend, sondern stets in gedämpftem Ton zu sprechen. Je leiser die Amazone spricht, desto besser und menschenähnlicher klingt es. Beim Jako kommt's darauf weniger an, er spricht immer deutlich, falls es sich um einen begabten Vogel handelt. Da ich Amazone und Graupapapei nebeneinander habe, ist es mir möglich, in dieser Beziehung interessante Studien zu machen, auch bezüglich des Lernens der beiden. Meine Amazone lernt leicht und schnell, hat jeden Tag fast wieder etwas Neues aufgeschnappt und spricht im allgemeinen sehr gut und deutlich. Aber sie verwischt wohl auch einmal einen Laut und hat immer denselben Tonfall. Ganz anders der Jako. Ich möchte sagen, er übt systematisch und wiederholt ein neues Wort so lange, bis er's mit der verschiedensten Betonung ganz deutlich herausbringt. Bei dem Wörtchen „so" z. B. übte er zunächst den „S"-Laut. Dann sprach er minutenlang immer wieder „so", lang, gedehnt, kurz, hoch, tief, kurz in allen möglichen Nuancen. Ähnlich macht er's mit allem, was er bringt. Während der Gelbnacken, wie schon erwähnt, nach etwa 14 Tagen anfing zu sprechen, hat der Jako — er stammt gleichfalls von Herrn Tzornack — monatelang nichts verlauten lassen. Vor einigen Wochen fing er dann plötzlich an und ist jetzt sehr eifrig bei der Sache, so daß er zu den besten Hoffnungen berechtigt.

Da ich nun beim Graupapagei bin, darf ich vielleicht zum Schluß noch etwas aus meinen Jako-Erinnerungen auskramen. Es ist eigentlich ein recht trübes Kapitel, über das man schreiben könnte: Es ist

ein Ritter, der heißt Tod . . . Viele Graupapageien habe ich im Laufe der Jahre begraben und viel Geld dabei verloren. Ich war ganz mutlos geworden und hielt mit vielen andern den Jako für einen der hinfälligsten aller Gefiederten. Da kam im Frühjahr der Artikel des Herrn Lichtenstaedt „Mein Liebling, der Jako". Sofort stand mein Entschluß fest: Jetzt wird's noch mal versucht. Ich habe mich streng an die Anweisungen des genannten Artikels gehalten und bis jetzt den besten Erfolg damit gehabt.

Meinen ersten Jako erstand ich als Student von einem Seemann, der 4 Stück aus Afrika mitgebracht hatte, für 20 M. Als ich ihn in der Wohnung des biederen Seebären abholte, kletterte er mit seinen drei Geschwistern auf den Stuhllehnen herum. Ich hatte damals wenig Ahnung, gab dem Tier sofort Wasser und als Futter Hanf. Er hat sich dabei gehalten und ist ungefähr 5 Jahre alt geworden. Von Zeit zu Zeit bekam er Krampfanfälle, die ich mir damals nicht erklären konnte. Es war die Folge der ausschließlichen Hanffütterung. Einem solchen Anfall ist er dann schließlich zum Opfer gefallen. Die Jakos, die ich mir später anschaffte, haben meist nicht lange gelebt. Oft waren sie nur wenige Tage in meinem Besitz, bisweilen dauerte die Freude einige Wochen. Es lag an der unrichtigen Ernährung. Ein sehr begabtes Tier, das sozusagen vom Munde weg lernte, hörte plötzlich auf zu fressen und war am Abend des nächsten Tages tot. Ich lernte dann die Schriften des Dr. Otto kennen und richtete mich nach dessen Vorschriften. Nun starb mir keiner mehr an Verdauungsstörungen, dagegen gingen mir mehrere an Lungenentzündung ein. Den Vorschriften entsprechend erhielten die Tiere zweimal wöchentlich ein Dampfbad und eine Abspritzung. Das nahmen sie gewaltig übel. Trotzdem die Abspritzung mit warmem Wasser geschehen war und der Käfig nachher zum Abtrocknen an den Ofen gestellt wurde, war Lungenentzündung die Folge, die nach einigen Tagen den Tod nach sich zog. Ich habe damals mit den jungen Tieren — denn es handelte sich immer um solche — zu viel angestellt. Ich wollte nichts versäumen und hab's dadurch gerade versehen. Einen andern hatte ich mal im warmen Sonnenschein ans offene Fenster gestellt. Wahrscheinlich hat er, trotzdem es ganz windstill war, Zug bekommen. Er bekam prompt Lungenentzündung und war nach drei Tagen tot. So war ich schließlich ganz verzagt geworden und hielt die Aufzucht eines jungen Graupapageien für eine Kunst, die nur wenige Auserwählte verstehen. In Wirklichkeit ist es nicht so schwer, wenn man nur einen gesunden Vogel bekommt und sich vor Experimenten hütet. Nach den Anleitungen des Herrn Lichtenstaedt wird es jedermann möglich sein, einen jungen Jako hochzubekommen und seine Freude an diesem „König der Stubenvögel" — eine Bezeichnung, die nur voll berechtigt erscheint — haben.

Schließlich noch eins. Wer einen Papageien zum Hausgenossen haben will, muß Zeit für ihn haben bzw. viel zu Hause sein. Mehr als jeder andere Vogel tritt der Papagei sozusagen in ein persönliches Verhältnis zu seinem Pfleger. Nur wenn er das kann, entfaltet er seine hervorragenden Eigenschaften und zeigt sich immer wieder von einer neuen Seite, so daß man aus dem Staunen nicht herauskommt. Ich kann nicht verstehen, wie jemand einen Papagei für ein langweiliges Geschöpf halten kann. Wenn freilich sein Herr tagsüber von Hause abwesend ist oder wenn der Vogel sonstwie sich selbst überlassen wird, dann verkümmert er, und es wird nichts aus ihm. Je mehr man sich mit einem solchen Hausgenossen beschäftigen kann, desto besser ist es und desto größer ist die Freude.

Das Liebhaberjahr.

Plauderei von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der Februar, an dem die Tage bereits wieder merklich länger werden, sorgt nun vollends dafür, daß alles in den Gesang kommt, auch die Mauser bringt er vollends. Bringt er beides nicht, so ist irgendetwas nicht so, wie es sein soll, die Vögel werden durch irgendwelche Umstände ungünstig beeinflußt. Trotzdem muß erwähnt werden, daß es noch störrische, besonders ältere Wildfänge gibt, die noch hartnäckig schweigen; aber die fortschreitende Jahreszeit wird auch diesen Säumigen das kleine Herz höher schlagen lassen und ihnen die Kehle öffnen zum lustigen Singen. Von Tag zu Tag werden die bereits länger singenden Vögel lauter, manche sind bereits im vollen Feuer. Die Verhaltungsmaßregeln sind für den Pfleger dieselben, wie bis jetzt vermeide man jegliche Platzveränderung des Käfigs, jegliche Zugluft und Erkältung, besonders mit zu kaltem Trink- und Badewasser. Meine Vögel sind das ganze Jahr im Genusse von Badewasser; gibt man es nicht zu kalt, so hat dies keinerlei Nachteile, vorausgesetzt, daß es sich nicht um ausgesprochene „Wasserplanscher" handelt, wie dies öfters bei Rot- und Blaukehlchen der Fall ist, deren Gefieder keine Zeit hat zum Trocknen, denn ständig plätschern sie sich in dem kühlenden Naß. Mir ist klar, daß eine derartige dauernde Abkühlung des Körpers auf dessen Wärme schädlichen Einfluß haben muß und dadurch auch seinen Teil zur Zurückhaltung oder doch wenigstens zur nicht vollen Entfaltung des Gesangstriebes beitragen muß. Derartigen Vögeln biete man am besten nur einmal täglich Badegelegenheit. Auch der gern mit Mehlwürmern arbeitende Pfleger kommt jetzt zur völligen Befriedigung seiner Leidenschaft, ja er muß jetzt, will er seine gefiederte Schar weiter anfeuern und auf die völlige Höhe des Gesanges bringen, mehr in den „Mehlwurmtopf" greifen, als der Besetzung desselben zuträglich ist. Wer sich im Winter noch nicht mit den gewünschten Körnerfressern eingedeckt hat, benutze noch die kurze Spanne Zeit, denn schon im nächsten Monat lösen sich die zu Flügen vereinigten Verbände der Zeisige, Stieglitze und Hänflinge, werden dann selten gefangen und kommen daher seltener sowie auch teurer auf den Markt. Auch Lerchenfrischfänge bringt uns der Februar bereits bei günstigem Wetter. Ich halte eine rechtzeitige Eindeckung mit Feld- und Heidelerchenfrischfängen für vorteilhaft; nur bringe man

keinerlei bei Kälte gefangene Vögel in einen zu warmen Raum, da sie das nicht vertragen.

Der März, der den Frühling mit im Gefolge hat, zeigt uns eine singende, jubilierende Sängerschar in der Vogelstube. Alles steht nun bald in höchster Gesangsentfaltung, vorausgesetzt, daß alle Vorbedingungen gegeben sind. Sind noch fette Vögel vorhanden, so fahre man in der auf Entfettung hinzielenden Fütterungsweise fort, ebenso füttere man überhaupt ohne Veränderung die übrigen Vögel weiter, abgesehen von der Darbietung von Gesangsreizmitteln, sowie sich bietenden Leckerbissen. Leider bringt uns ein normaler Eintritt des Gesanges, welcher die beste Ableitungsquelle für alle diesbezüglichen Erscheinungen des Käfigvogels ist. Daher gelte bei der Überwinterung der Vögel stets die Losung: „Individuell füttern, normaler Körperzustand, normaler Mauser- und normaler Gesangeintritt." Gelingt es dem Pfleger, diesen vier Hauptgrundbedingungen der Vogelpflege gerecht zu werden, so sind für ihn die Schwierigkeiten der Vogelpflege und gerade der Überwinterung selbstverständliche, überwindbare Erscheinungen. Der März bringt uns die letzten Körnerfresserfrischfänge vor der Brutperiode, aber auch be-

Mornellregenpfeifer.
Aus Bengt Berg, „Mein Freund, der Regenpfeifer". Verlag: Dietrich Reimer, Berlin.

der März auch wieder den Zugtrieb der Käfigvögel, der sich aber durch den entfalteten Gesang nicht in einer so auffälligen Weise bemerkbar macht wie im Herbst. Die Triebe des Wanderns werden durch den Gesang abgeschwächt resp. abgeleitet. Trotzdem sind auch im Frühjahr manche Vögel stark im Zug und müssen, selbst frisch vermauserte Vögel, dem Zugtrieb mit dem zerschlissenen Gefieder ihren Tribut zahlen. Als einen gefährlichen Feind in der Vogelpflege, der vielfach Krankheitserscheinungen, wie Krämpfe, Geschwüre, kranke Füße, Abzehrung usw., mit sich bringt, habe ich den verhinderten Geschlechtstrieb in starkem Verdacht. Das einzige Gegenmittel für die schädlichen Folgen eines verhaltenen Geschlechtstriebes ist eine nicht zu hitzige Fütterung auch mit Gesangsreizmitteln, eine normale Körperbeschaffenheit, daher reits die ersten Weichfresserfrischfänge, wie Singdrossel, Rotkehlchen und zu Ende des Monats bei gegebener Witterung auch Blaukehlchen. Schon längst hat der Liebhaber, der nebenbei auch „Selbstversorger" ist, mit seinem sonst verborgenen „Netzchen" geliebäugelt, hat es wie einen alten Bekannten, der nach langer Zeit sich das erstemal wieder sehen läßt, begrüßt, und schmiedet mit ihm wieder, je nach der Leere seiner Käfige, die kühnsten Pläne, die manchmal wohl ausgeführt, aber leider nicht den gewünschten Erfolg bringen. Das Verbot des uneingeschränkten Vogelfanges ist gerecht, denn was sollte werden, wenn jeder Vogel „vogelfrei" wäre, aber ein durch Gründe der Zweckmäßigkeit gestatteter, eingeschränkter Vogelfang zu Stubenvogelliebhaberzwecken ist ein Gebot der Stunde. Bleibt das Verbot des Vogel-

fangs zu Käfigungszwecken weiter bestehen, so bleibt auch das Sprichwort beim Vogelliebhaber in Ehren: „Verbotene Früchte schmecken süß", wenigstens für den, der keine andere Gelegenheit hat und kennt, als sie sich selbst zu holen, diese verbotenen Früchte, nicht aus des Nachbars Garten, sondern aus dem großen Garten der Natur. (Fortsetzung folgt.)

Mein Freund, der Regenpfeifer*).

Von Bengt Berg.

(Nachdruck verboten.)

Soweit es, ohne den Vogel zu stören, möglich war, hatte ich mich auf einen Stein neben dem Nest hingestreckt, und da lag ich lange und schaute ihn an. Rings um uns webte die Wärme des Sommertages über dem Fjäll, und in meiner Hand brütete der kleine Vogel zutraulich seine Eier — so wie ich es geträumt und gewünscht hatte, daß er es tun möchte.

Durch die Halme in meiner Hand fühlte ich das Schlagen seines Herzens.

Einen bitteren Tropfen mag wohl jeder Becher enthalten. Ich hatte mich darauf gefreut, andern Menschen dies zeigen zu können — sie zu überzeugen, daß ein vollkommen wild lebendes Tier einem Menschen noch Vertrauen schenken kann und daß wir uns alle bemühen müßten, es zu verdienen. Da kam mir ein Gedanke.

Was würden wohl alle diese liebevollen Seelen dazu sagen, die ihr ganzes Herz an das Schoßhündchen und den eingesperrten Kanarienvogel hängen und die verdrehtesten Anschauungen über das Wohl und Wehe der Tiere haben? Hört nur!

Nun hat dieser gräßliche Mensch die Eier dieses allerliebsten, kleinen Vögelchens in die Hand genommen und das verschüchterte, arme Tierchen gezwungen, zu ihm hinzukommen.

Schön — es dreht sich also darum, ob der Vogel erschreckt war und unter Zwang handelte. Ich habe diese Einwendung vorausgesehen und mich darauf vorbereitet.

Der ruhige Blick des kleinen Regenpfeifers, wie er in meiner Hand brütet, deutet nicht auf Angst. Auch dürfte er nicht aus Zwang heraus gehandelt haben, als er um meine Hand herumging und die Eier rollte und wendete, um sie in die richtige Lage zu bringen. Aber nicht genug damit.

Wenn der Vogel, als er in meiner Hand saß, ängstlich gewesen wäre, wenn er sich nur im geringsten unsicher gefühlt hätte —, so würde er, in Übereinstimmung mit dem, was die meisten Menschen von den Tieren wissen, nicht so leicht ans Fressen gedacht haben.

Aber das tat er. Und nicht nur das! Das kleine Kerlchen war so verschüchtert, daß er sich von den Eiern in der Hand erhob und den Bissen, der ihm geboten wurde, nachlief.

Diejenigen, die sich auf Vögel verstehen, mögen ihn betrachten!

Da steht er breitbeinig über den Eiern.

Er sträubt die Brustfedern. — Also hat er sich soeben von den Eiern erhoben.

Man achte auf den aufgeplusterten Hals und das gesträubte Kehlgefieder. — Sehen ängstliche Vögel so aus?

Und als er später das Wurmstück nahm — wie eifrig zerrte er da! Er stemmte sich so stark mit den Füßchen an, daß die Eier sich verschoben; das erkennt man an der veränderten Lage der Flecken auf den Eiern.

Die Kraft, mit der er zog, mag meinethalben als Beweis von Tüchtigkeit, Sicherheitsgefühl oder Trotz ausgelegt werden. Aber ganz bestimmt ist sie nicht als Angst zu deuten.

Im übrigen sieht man auch hier wieder, wie er das Auge halb zukneift, was sagen will, daß die Sache ihm behagt.

Und weiter — wenn er wirklich unter Zwang gehandelt hätte, dann würde doch wohl irgendetwas in seiner Haltung oder seinem Benehmen darauf hingedeutet haben.

Man erinnere sich nur der meisten Aufnahmen von Vögeln, in all diesen Lebensbildern aus der Vogelwelt, die sich zu Nest begeben. An einigen Stellen in meinen Werken gibt es auch solche Bilder, wo die Vögel sich schmal und ängstlich mit unruhig spähenden Blicken zum Nest hinstehlen.

Das deutet darauf hin, daß sie etwas Fremdes ahnen — möglicherweise eine im Schilf oder Busch verborgene Gefahr. Wenn sie auch nicht ausgesprochen Furcht zeigen, so sind sie doch jedenfalls vorsichtig.

Ihre Haltung sagt das. Und da kann man natürlich behaupten, daß sie unter Zwang handeln, wenn sie zu Nest gehen. Wenn sich das Nest nämlich nicht dort befände, so würden sie irgendwo anders hinfliegen, und da könnte man jedenfalls keine Aufnahmen von ihrem wirklichen Benehmen am Nest machen — wenn sie nicht etwa, wie das in der Regel zu gehen pflegt, nach Verlauf einer Stunde oder eines Tages zurückkehren und nicht mehr an die Gefahr denken, die sich nicht weiter bemerkbar gemacht hat.

Wie stand es nun um die Besorgnis des Regenpfeifers, als er sich dem Nest näherte und merkte, daß die Eier in meiner Hand lagen? Man betrachte bitte wiederum die Bilder.

Der kleine Vogel war so wenig besorgt, daß er rund wie ein Ball aussieht. Bei einem Vogel ist nämlich das glatte Aussehen das sicherste Kennzeichen von Unruhe. Man sagt dann, „er macht sich schmal und ängstlich".

Wenn der Regenpfeifer aus Zwang herausgekommen wäre, so würde doch sein einziges Ziel gewesen sein, zum Nest zu gelangen. Aber nein — er machte sich so wenig Sorge um die Eier, daß er sich auf dem Wege zum Nest durch einen Wurm aufhalten ließ. Er schnappte ihn sofort. Und ging er, nachdem er das getan hatte, etwa zu Nest? Nein — er machte kehrt und lief auf die Heide, um ihn zu verspeisen. Das tat er, weil er Angst hatte, daß jemand anders ihm den Wurm fortnehmen wollte. Um die Eier hatte er jedenfalls keine so große Sorge.

Einmal, als er den Wurm gefaßt hatte, straffte ich ihn an, damit er ihn nicht sofort bekäme. Da

*) Aus dem neuen Buch von Bengt Berg, „Mein Freund, der Regenpfeifer". Verlag von Dietrich Reimer, Berlin.

hatte er seine Scheu so vollständig abgelegt, daß ein förmliches Tauziehen mit dem Wurm zwischen ihm und mir daraus wurde. Er zerrte und zog aus Leibeskräften. Man sieht an seiner patzigen Haltung, wie sicher er sich fühlte, die Oberhand zu behalten.

Unzählige Würmer werden ja täglich von unsern kleinen unschuldigen Singvögeln lebend verschlungen, ohne daß jemand sie bedauerte, und es ist sehr zweifelhaft, ob der Wurm es besser in des Regenpfeifers Magen hatte, als wenn er an ihm zog.

Aber mit Rücksicht darauf, daß irgend jemand den Wurm bemitleiden könnte, gab ich sogleich nach, und Láhol verschluckte ihn. Hätte ich das nicht getan, sondern festgehalten, so hätte ich den Vogel mit mir ziehen können, wohin ich nur wollte, geradeso, wie man einen Hund an einem Knochen, in den er sich verbissen hat, mit sich fortschleppen kann.

Mornellregenpfeifer.
Aus Bengt Berg, „Mein Freund, der Regenpfeifer". Verlag von Dietrich Reimer, Berlin.

Notizen aus vergangenen Jahren.

Von A. Jena, Biberach/Riß.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

1859. Im Februar hat sie wieder anfangen schlagen, ausgang Juli hatt sie aufgehört, hatt also ein halbes Jahr ausgezeichnet schön und fleißig und viel bei Nacht geschlagen, es ist eine sogenannte Wienernachtigall, der Steiff hatt sie von einem Offizier gekauft und dieser hatte den Vogel ein Jahr vorher von Wien bekommen. — Den 22ten Mai am Sonntag war ich in Ulm; es war der Ungarische Vogelhändler in Ulm mit echten Sprossern, Ungarische, und hatte auch gewöhnliche Nachtigallen, der Franz Biller, der jüngere von den 2 Brüdern, wo im Juni 1844 hier in Biberach waren. Der Ältere sagte er, sei vor 2 Jahren gestorben. Dann habe ich ihm einen ungarischen Sprosser abgekauft, ich hatte die Wahl von Allen, weil in Ulm er noch keinen verkauft hatte. Ich habe den Vogel von ihm bekommen um 6 fl. sonst verkauft er keinen anders als 3 Kronenthaler. Ich kam am Pfingstmontag wieder hinunter und da habe ich erfahren, daß er nur ein Stück (Sprosser) verkauft habe, weil er nicht billiger gab als 3 Kronthaler und die Ulmer hatten nicht viel Lust, weil die Sprosser Ihnen fast allemal Cabut wurden, den 23ten Mai war er in Ulm schon wieder fortgereist nach München, weil er keine Geschäfte machen konnte. Denn 2ten Tag darauf als ich den Vogel hatte, hatt er schon anfangen schlagen, er hatt eine schöne Stimme; aber sie schlagen das erste Jahr, weil es frisch gefangene Vögel sind, noch nicht so viel. Mitte Juli kam er in die Mauser u. hatt dann aufhören schlagen.

1860. Den 16. Febr. hatt er wieder anfangen schlagen; ausgang Juni hatt er aufhören schlagen an Peter & Paul das Letztemal, er kam dann in die Mauserzeit. Er hatt diesen Sommer viel bei Nacht geschlagen und namentlich um dieselbe Zeit als das Liederfest war, da hatt er um 10 1/2 Uhr abends angefangen u. die ganze Nächte durch schön geschlagen, er hatt eine sehr starke und schöne Stimme. Anfang Febr. hatt die Wienernachtigall wieder anfangen schlagen. Mitte Juli kam sie in die Mauser und hat aufgehört. NB. Ist bei Vögeln eine Zehe angefressen oder wund, bestreiche man diese mit Mandelöhl. In der Ulmer Naturgeschichte ist Nachtigallenfutter: Gelbe Rüben, Herz, Milchbrod und das Weiße vom Ei. Hier habe ich noch einige Nahrungsmittel aus dem nehmlichen Buch herausgeschrieben für diejenige Vögel, die ich gewöhnlich für immer halte. 1.) Nachtigall: Das beste Sommerfutter ist blos frische Ameiseneier u. täglich einige Mehlwürmer. Im Winter, wenn es keine frische Ameiseneier giebt, so giebt man ihnen gekochtes Rinderherz, gelbe Rüben, beides auf einen Rübeisen gerieben u. mit dörren Ameiseneiern vermischt; die gelben Rüben erhalten den Magen u. die Eingeweide geschmeidig und sie befinden sich recht wohl dabei. 2.) Bastardnachtigall: Das nehmliche Futter wie der Nachtigall. 3.) Waldgrasmücke: Kann man das erste Universalfutter, aber zuweilen muß man ihr auch das Nachtigallfutter geben, sie frißt auch

Johannis-, rothe u. schwarze Hollunderbeeren, auch Kirschenbeeren. 4.) Mönch oder Schwarzblatte: Er bekommt das gewöhnliche Universalfutter, wenn man ihm das Universalfutter von Semmelgries und zuweilen etwas gequetschten Hanf giebt, so befindet er sich 12—16 Jahr wohl, besonders wenn man ihm vom Juli bis in November mit roten u. schwarzen Hollunderbeeren füttert. Man kann ihm auch zur Erhaltung seiner Gesundheit im Winter gedörrte Hollunderbeeren in Wasser aufgequellt geben. 5.) Singdrossel: Gerstenschrot; aber noch besser Semmelbrod in Milch geweicht, ist eine vortreffliche Speise für sie; sie frißt auch Vogel-, Kreuzdorn, Wachholder und Mistelbeeren. 6.) Fink: Man gibt ihnen dörren oder beßer eingequellten Sommerrübsamen Jahr aus Jahr ein, man übergießt nehmlich soviel als man des andern Tags braucht, des Morgens vorher mit Wasser und giebt Ihnen dieses. Im Frühjahr, wenn sie scharf schlagen sollen, giebt man ihnen als Leckerbißen etwas gequetschten Hanfsamen; zur Geschmeidighaltung der Gedärme zuweilen etwas grünes, Kreuzwurz und Hühnerdarm, im Winter ein Stückchen Apfel. Hat man Mehlwürmer und Ameiseneier, so erfrischen sie diese auch ungemein. 7.) Distelfink: Sein gewöhnliches Futter ist Mohn u. Hanf, wenn man ihn herumlaufen läßt, nimmt er auch mit dem 3ten Universalfutter vorlieb, er frißt auch allerhand kleine Sämereien als Wegbreit, Salat, Kohl, Rüben, Distel, Lein u. Leindotter. Man gab ihnen auch zuweilen etwas grünes als Salat, Kohl, Kreuzwurz und Braunkresse. 8.) Hänfling: Sie bedürfen weiter nichts als Sommerrübsamen, fressen aber auch gern Hanf, Kohl, Mohn, u. Leindottersamen. Salz lieben sie, daher man zuweilen ihnen etwas unter das Futter giebt. Es ist ihnen dies ein vorzügliches Vorbeugungsmittel gegen verschiedene Krankheiten. Diejenigen, die man frei herumlaufen läßt, freßen mit den übrigen das gewöhnliche Universalfutter; etwas grünes giebt man ihnen auch zuweilen, sie baden sich im Sande u. im Wasser. 9.) Zeisig: Man füttert ihn mit Mohn, wo man ihm zuweilen gequetschten Hanf mischt; wenn man ihn frei herumlaufen läßt, verlangt er nichts weiteres als das zweite Universalfutter. Erstes Universalfutter, auch Nachtigallen u. andere zärtliche Vögel befinden sich nebst ein wenig Ameiseneier u. Mehlwürmer gut dabei: Man läßt sich nach Verhältnis der Anzahl Vögel auf ein Vierteljahr ungesalzene Semmel backen, diese müssen beim Bäcker altbacken werden, u. wenn abgebacken ist, noch einmal in den Ofen gesetzt und mit dem Ofen kalt werden lassen. Dann lassen sie sich im Mörsel gar leicht zu Gries stoßen, welcher sich ein Vierteljahr lang ohne Nachgeschmack erhält. Von diesem Gries nimmt man auf jeden Vogel des Tags einen starken Teelöffel voll u. gießt auf denselben laue oder kalte Milch u. zwar dreimal soviel als Semmelgries ist, wenn die Semmeln von gutem Mehl sind. Dieß läßt man nun quellen, woraus ein steifer Teich wird, den man auf einem Brett klar hakt. Dies Futter hält sich auch in der heißesten Witterung lange ohne sauer zu werden, wird nie so klebend als Semmeln u. Milch. (Fortsetzung folgt.)

Anfangsgründe und Grundrisse zur Weiterentwicklung in der Ausbildung des Kanariengesanges.

Vortrag, gehalten von Paul Holzky, Cöthen i. A.

(Nachdruck verboten.)

Das Wichtigste in der ganzen Kanarienzucht, in unserer Liebhaberei, dreht sich in der Haupsache um den Gesang. Ich will nun versuchen, besonders über die Anfangsgründe und weitere Entwickelung des Gesanges zu sprechen und wünsche, daß meine Worte bei verschiedenen Züchtern zur Klärung dieser Frage beitragen. Gerade in der heutigen Zeit, wo eine Überproduktion im Export eingetreten ist, ist es die höchste Zeit, sich besonders der Feinzucht zuzuwenden. Denn bessere Vögel eines guten Stammes werden auch unter den Züchtern zu höheren Preisen abgesetzt. Wer auf Ausstellungen einigermaßen in der Selbstzucht gut abgeschnitten hat, wird mit seinen besseren Vögeln nicht sitzen bleiben. Ausschuß gibt es natürlich mehr oder weniger auch in der Feinzucht. Dieser wird natürlich zuerst für den Export abgestoßen.

Wer kein angehender Gesangskenner ist, der wird es nie zu einem auserwählten Stamm bringen, auch dann nicht, wenn er Gelegenheit hatte, sich das allerbeste Material anzuschaffen. Aus diesem Grunde meine ich, daß sich jeder Züchter erst einmal mit den Grundlagen des Gesanges vertraut machen sollte. Denn was nützt einem Züchter das beste Material, wenn er nicht versteht die Nachzucht gesanglich auszubilden. Vorsänger desselben Stammes sind ja die besten Lehrmeister, obschon ein rein durchgezüchteter Stamm sich auch auf kürzere Zeit ohne Vorsänger behelfen kann. Aber das Ausmerzen der schlechten Vögel und das Zusammensetzen der männlichen Nachzucht muß der Züchter nach seinen gesanglichen Kenntnissen auf das sorgfältigste besorgen. So sollte es mich freuen, wenn ich auch hier diesbezüglich vielen Züchtern eine Belehrung geben könnte, die ihm ermöglicht, einen gesanglich gut veranlagten Stamm zu verbessern und hochzuhalten, und ihn in erster Linie veranlaßt, sich selbst gute gesangliche Kenntnisse anzueignen. Um also einen gesanglich guten Vogel zu kultivieren, ist es unbedingt nötig, daß die Nachzucht von vorzüglich veranlagten Eltern gefallen ist. Nur an letzteren lassen sich die einzelnen Touren am besten erlernen und erkennen.

Den Züchtern, welche mit der Zucht beginnen wollen, wird in der Regel der Rat gegeben, sich minderwertige Vögel anzuschaffen und erst nach und nach, wenn die Gesangskenntnisse bessere geworden sind, mit besseren Vögeln zu züchten. Ein solches Vorgehen halte ich nicht für richtig, wenigstens nicht, wenn er sich vornimmt, ein tüchtiger Gesangskenner zu werden. Denn erstens einmal frage ich, wie lange soll es wohl dauern, wenn ein so arbeitender Züchter überhaupt zu einem guten Vogel kommt, um die besseren Touren kennen zu lernen und zweitens, wie oft soll sich so ein Züchter neues Material kaufen? Also so einen Rat halte ich für falsch. Namentlich deswegen, weil der betreffende Züchter in der Gesangskenntnis nicht fest wird und immer ein Stümper bleiben wird, denn seine Gesangskenntnisse müssen

immer lückenhaft bleiben. Ist nun fraglicher Züchter Mitglied eines Vereins, wo öfter Vorträge über Gesangskunde an mitgebrachten Vögeln von erprobten Gesangskennern gehalten werden, dann ist es immerhin möglich, daß sich dieser oder jener Züchter bemüht, sich noch Gesangskenntnisse anzueignen, ohne sich merken zu lassen, daß seine Kenntnisse noch schwach sind. Aber wieviele Vereine gibt es, namentlich an kleinen Orten, wo man nur mangelhafte Gesangskenner oder gar keine findet, dann tappen die Züchter im dunkeln herum, denn ohne gute Anweisung läßt sich der zucht muß in erster Linie zu begreifen suchen, was der Vogel bringen darf. Denn was nützt ihm die Kenntnis und Benennung langer, flacher und scharfer Touren. Diese kennen zu lernen, dazu bietet sich ihm immer noch genügend Gelegenheit. Ebenso kann er die dünnen, spitzen näselnden Touren später noch Tag für Tag zu hören bekommen. Also zuerst das kennen lernen, was gut ist im Gesange. Schlechtes Zeug lernt man immer noch früh genug. So rate ich jedem strebsamen Anfänger, dem es darauf ankommt, zunächst den Gesang kennen zu

Spornammer.
Aus Bengt Berg, „Mein Freund, der Regenpfeifer". Verlag von Dietrich Reimer, Berlin.

Gesang nur sehr, sehr schwer erlernen, denn es läßt sich durch Worte gar nicht so wiedergeben, wie die Vögel uns ihr Lied vortragen.

Im großen Vorteil sind natürlich die Züchter, die ein musikalisches Gehör haben, oder gesanglich selbst auf der Höhe sind. Diese können ihre Vögel leicht auf der Höhe halten, und sie können auch im Notfalle mit Erfolg die Erläuterung der Gesangstouren übernehmen. Ein Primasänger hat nur wenige Touren und diese in erster Linie kennen zu lernen, muß für den Anfänger wichtiger sein, als alle möglichen schlechten Touren zu erfassen, welche ein minderwertiger Vogel vielleicht bringt.

Die Touren eines geringen Sängers folgen so kurz und schnell aufeinander, daß das ungeübte Ohr eines Anfängers das Gute im Gesang oft gar nicht herausfinden kann. Ein Anfänger in der Kanarienlernen und der auch mit seiner Zucht rationell wirtschaften will, seine Zucht nur mit einigen wenigen Hähnen anzufangen. Und zwar wählt man solche Vögel, die nicht zu vielseitig sind, lieber nehme man Hähne, welche eine gute Tour recht oft hören lassen. Also es wird sich schon um bessere Vögel handeln, die keine groben Fehler im Gesang haben. In erster Linie würde ich empfehlen einen Hohlroller zu nehmen, und zwar einen solchen, welcher das Hohl in mittlerer Lage bringt, dann einen Hahn, welcher die Hohlklingel als Hauptour bringt.

Wer mit dem Gelde nicht zu sehr zu rechnen braucht, kann sich noch einen Schockelvogel zulegen, und zwar einen solchen, der die Schockel recht abgesetzt bringt, damit er diese Tour von der Hohlklingel unterscheiden lernt. Alle diese Vögel, die ja möglichst einseitig sein können, werden noch etwas Knorre,

Klingel und Pfeifen hören lassen; an diesem Zuchtmaterial möge der Anfänger seine Gesangsstudien beginnen. Hat der Züchter nun Zeit und vor allen Dingen Geduld und Ausdauer und den nötigen Unterscheidungssinn, dann wird er schon im ersten Jahre bei der Einseitigkeit dieser Vögel die beste Gelegenheit haben, sich mit den Haupttouren des Kanariengesanges bekannt zu machen. Nun muß der Züchter mit voller Lust und Liebe jede Stunde seiner freien Zeit für seine Vögel zur Verfügung haben und sich bemühen, eingehend Kenntnis von den guten Touren seiner Vögel zu verschaffen. Was gut und was schlecht ist, wird er bald zu unterscheiden wissen. Zunächst kümmere sich der Anfänger gar nicht um alle schlechten Touren. Was schlecht ist im Gesange, findet man bald. Nur das Gute vom Schlechten zu unterscheiden und die Benennung für die Touren soll zunächst die Hauptaufgabe sein.

Im Laufe des ersten Jahres wird er den Eindruck der Vögel, ihre Eigenart und die Gangart derselben, ebenso wie den Unterschied der richtigen Tonstücke sich gut gemerkt haben. Er wird dann auch die verschiedenen Hohltouren zu unterscheiden wissen und sagen können, das ist eine Hohlrolle, dieses ist eine Hohlklingel und jenes ist eine Hohlschockel. Ferner wird er die Knorre, Klingel und Pfeifen, welche nicht schwerer zu begreifen sind, kennen gelernt haben. Er wird auch gefunden haben, daß dieser oder jener Hahn von der Nachzucht seiner Vögel eine bestimmte Tour, sagen wir z. B. eine Hohlrolle anders zu Gehör bringt als der andere. Hat der Anfänger Auffassungsgabe und hat er die einzelnen Touren erst erfaßt, dann nehmen die gesanglichen Kenntnisse mit jedem Tage zu. Er erkennt die gesanglichen Unterschiede genauer, die Tonfärbungen markieren sich immer schärfer und demzufolge auch genauer im Gedächtnisse. Das Verständnis für die Haupttouren und die damit verbundenen Variationen, wie die verschiedenen Gangarten, insbesondere auch alle verwandten Nebentouren, welche aus den Haupttouren entstehen, wird der Züchter im Laufe der Zeit auch immer mehr zu unterscheiden lernen. Fängt man mit letzterem an, also umgekehrt, wie ich vorschlage, so kann man sicher sein, immer ein Stümper zu bleiben in der Gesangskenntnis. Zum mindesten ist das Können solcher Züchter immer lückenhaft und sie entwickeln sich nur sehr langsam zum Gesangskenner. So meine ich, daß jeder Züchter sich zunächst befleißigen sollte, in erster Linie kennen zu lernen, was der Vogel singen soll und nicht, was der Vogel nicht singen darf.

Schneeammerneſt.
Aus Bengt Berg, „Mein Freund, der Regenpfeifer". Verlag von Dietrich Reimer, Berlin.

So stehe ich auf dem Standpunkte, daß diejenigen Züchter, welche nichts vom Gesang verstehen, auch keine guten Vögel, also Primaner, züchten können, am allerwenigsten aber können sie zur Veredelung des Gesanges beitragen. An der Veredelung können sich nur Züchter betätigen, welche es verstehen, sich gründliche Gesangskenntnisse anzueignen. Züchter, welche die Zucht mit minderwertigen Vögeln begonnen haben, werden Jahre gebrauchen, bevor sie zu einer richtigen Gesangskunst gelangen.

Ein großer Teil unserer hervorragenden Züchter und besten Gesangskenner ist in den letzten Jahren zur ewigen Ruhe eingegangen, und wir bedürfen der Heranbildung eines Nachwuchses neuer Kräfte und wirklich tüchtiger Kenner des Gesanges. Deswegen sollte es mich recht freuen, wenn meine Worte jüngeren Züchtern eine Anregung geben würden, sich recht zu befleißigen, den alten anerkannten Züchtern nachzukommen. Fleiß und Ausdauer gehören dazu, aber Segen ist der Mühe Preis. (Forts. folgt.)

Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten.

Von J. Kuntzendorff, Berlin.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Die Purpurtangare war der erste fremdländische Vogel, den ich besaß, und zwar erstand ich sie zusammen mit einem anderen Vogel, der das Weibchen dieser Art sein sollte, und sich nachher als Kurzschwanzwidafink — Urobrachya phanicla *(Heugl.)* entpuppte, auf einer Ausstellung der ornithologischen Gesellschaft, Zürich, veranstaltet im Helmhaus, durch die Farbenpracht des Vogels dazu veranlaßt. 20 Jahre wird es in nächster Zeit, seit ich dort zum ersten Male mit den Herren, die später meine näheren Bekannten und in der Pflege fremdländischer Vögel meine Lehrmeister wurden, den Herren E. Lutz und Dr. A. Tobler, beide zu den besten Schweizer Ornithologen gehörend, zusammentraf, die mich in freundschaftlicher Weise in die Freuden der Liebhaberei fremdländischer Stubenvogelpflege einführten. Viele genußreiche Stunden, speziell während der gemeinsamen Nachtigallbummel nach Eimeldingen im Badener Land und in der gemeinsam mit Herrn Dr. H. Steiner, Zürich, gegründeten „Aegintha Zürich" haben wir vier in gemeinschaftlichem Austausch der gesammelten Erfahrungen verlebt, einander weiterhelfend in der uns lieben Liebhaberei, einander unterstützend und ratend in trüben Verluststunden, die bei keinem Liebhaber ausbleiben. Herr Lutz war es, der mir auf jener Ausstellung jene Tangare verkaufte und durch seine glühende Begeisterung für all diese Fremdlinge eigentlich die Saat zu der meinigen für die exotischen Weichfresser legte. Denn es reihte sich gar bald dieser Tangare die Schama, der Sonnenvogel, der Goldstirnblattvogel und all die anderen an, bis das Vogelhaus entstand, das zum Schlusse 70 Insassen beherbergte.

Im Laufe der Jahre habe ich acht Purpurtangaren verpflegt, teils in Käfigen, teils in Flugräumen und will vorwegnehmen, daß ich bei allen im großen und ganzen die gleiche Erfahrung gemacht habe, besonders was ihr Verhalten in der Voliere anbetrifft. Im Käfig ist sie im allgemeinen nicht sehr lebhaft, ihre Bewegungen zeigen keine große Gewandtheit. Daher liegt der Reiz ihrer Haltung hauptsächlich in ihrer ausnehmenden Farbenschönheit, da sie auch gesanglich nichts Bedeutendes leistet. Daß jedoch in letzterer Hinsicht nicht alle Purpurtangaren unbedeutende Sänger sind, beweist die Angabe Herrn Neunzigs in seinem Buch „Fremdländische Stubenvögel", wo er einer dieser Tangaren Erwähnung tut, die drosselartige Rufe und rotkehlchenähnlichen, abwechslungsreichen Gesang hören ließ. Dergleichen habe ich bei allen meinen Stücken niemals gehört, es waren vielmehr ziemlich grelle Laute, die diese Vögel von sich gaben.

Schmucktangare.

Im allgemeinen ist diese Tangare als unverträglich und bösartig verschrien, und sie hat bei vielen Liebhabern bei der Unterbringung in einem Flugraum zusammen mit anderen Vögeln diese Verluste verursacht. Trotz dieses Renommees aber versuchte ich es doch mit dem Fliegenlassen im Vogelhaus, und ich war angenehm enttäuscht, als sich dieser Vogel als durchaus friedfertig gegenüber den anderen Insassen der Voliere herausstellte, unter denen sich auch eine Anzahl Tangaren befanden. Auch die anderen Exemplare, die ich im Flugraum hielt, erwiesen sich gleichfalls als durchaus verträglich. Nicht einmal habe ich ernste Streitigkeiten zwischen einer Purpurtangare und einem anderen Vogel beobachten, nicht ein einziges Mal habe ich feststellen können, daß schwächere, zartere Vögel, wie

Goldaugentimalie, Buschschmätzer, die verschiedenen Fliegerschnäpper, Pitpit, Brillenvögel unter der Purpurtangare zu leiden hatten oder daß diese den anderen Tangaren gegenüber sich als bösartig erwies. In der Hauptsache führe ich dieses den Vögeln anderer Liebhaber so ganz verschieden geartete Benehmen meiner Tangaren einesteils wiederum auf den so mannigfaltigen Individualismus der Tangaren zurück, andernteils will ich auch nicht außer acht lassen, daß ihnen bei mir ein großer Raum zur Verfügung stand (in Zürich während des Sommers 30 m², während des Winters 20 m² und in Frohnau 25 m²) und es den Vögeln stets durch lebende Pflanzen, wie auch durch reichliches totes Gestrüpp und Zweige an Sitzplätzen und auch Verstecken nicht fehlte. Außerdem war allen Vögeln durch reichliche Freßgelegenheit, besonders was Obst anbelangt, jede Gelegenheit Streitigkeit wegen des Futters vom Zaune zu brechen, genommen und allen genügende Zerstreuung geboten. Bei Vorhandensein all dieses Angeführten, die Unterbringung der Purpurtangare zu Berücksichtigenden dürfte sich dieselbe wahrscheinlich stets friedlicher benehmen, als wenn sie in Räumlichkeiten untergebracht wird, wo diese in Fortfall kommen. Wenngleich also das eben Erwähnte bei der Friedfertigkeit meiner Purpurtangaren mitspielen kann, so möchte ich nochmals wiederholen, daß meiner Ansicht nach die Hauptursache dafür in dem Individualismus, in den verschieden gearteten Charakteren zu suchen ist.

Ruß führt an, sein Pärchen hätte jeden roten Vogel zu Tode gejagt; gewiß, zur Zeit der Brutperiode will ich solches rauflustiges Benehmen nicht in Abrede stellen, wenngleich ich aus eigener Erfahrung darüber nicht urteilen kann, da ich keine Weibchen für meine Männchen erhalten konnte. Doch mutmaße ich vom Verhalten der Trauertangaren ausgehend, daß auch hier der Individualismus eine Rolle spielen wird und nicht alle Paare gleich bösartig sein werden. Diese meine Überzeugung wird durch die Beobachtung bestärkt, daß bei mir die Purpurtangare in zwei Exemplaren mit dem Mennigvogel, einem gewiß heiklen Vogel, zusammen war und es trotz der gleichen Gefiederfärbung eitel Friede herrschte. Diese von Ruß gemachte böse Erfahrung kann ich daher nur auf die durch die stark entwickelte Brutlust und den Trieb aufs äußerste gesteigerte Kampfeswut um das Brutgebiet und den Individualismus des Paares zurückführen, während welcher Zeit auch andere, sonst verträgliche Vögel unverträglich sind. Die Tatsache, daß ein Pärchen bei Prinzessin von Croy aus den Eiern geschlüpfte Junge raubte, ist ein weiterer Beweis, daß es bei diesen Vögeln unbedingt angebracht ist, zur Züchtung ihnen einen eigenen Raum anzuweisen. Hingegen ist die Haltung der Purpurtangare im Flugraum mit anderen Vögeln zusammen bei Frau Reuter, Sulza, ohne daß Verluste vorkamen, wiederum die Bestätigung meiner Beobachtung.

Feuerflügel-, Toviisittiche und Tarantiner Unzertrennliche. Aufnahme von S. Lichtenstaedt.

Das Benehmen der Purpurtangare im Flugraum ist von dem im Käfig zur Schau getragenen recht verschieden, ist sie doch dort ein recht beweglicher und lebhafter Vogel zu nennen. Denn besonders zur Morgen- und Abendzeit ist sie in steter Bewegung, aber auch unter Tags sitzt sie nicht still und langweilig da. Im Gebüsch weiß sie sich gewandt zu benehmen, doch bevorzugt sie die oberen Zweige desselben, wie auch die höher angebrachten Äste. Zeitweise, jedoch nur um sich zu sonnen, läßt sie sich auf dem Gesteinsmassiv nieder. Ihr Badebedürfnis ist ein recht großes, jedoch kein übermäßiges. Das bei der Purpurtangare allgemein gefürchtete und mit Recht unbeliebte Verblassen der schönen, roten Färbung, beeinträchtigt es doch gewaltig die Farbenpracht des Vogels, habe ich bei keinem der von mir verpflegten Stücke wahrgenommen, sie behielten im Gegenteil ihr leuchtendes Kleid, solange ich sie hatte.

(Fortsetzung folgt.)

Vogelschutz.

Vortrag gehalten im „Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln" vom 2. Vors. Herrn Dr. Stehle.

(Nachdruck verboten.)

Wenn wir über Vogelschutz sprechen, müssen wir uns bewußt sein, daß der Vogel das einzige Tier ist, das der Mensch zu schützen bestrebt ist, dessen sich der Staat durch Gesetz und ausübende Organe annimmt. Unsere einheimischen Nattern, die elegante Ringelnatter und die bissige Glattnatter nehmen sicher rascher ab, als die meisten unserer Vögel, doch niemand tritt für ihren Schutz ein. Der rührige Bergmann im Samtwämslein, der Maulwurf, nützt durch Vertilgen der schädlichen Engerlinge vielleicht nicht weniger als die nützlichsten unserer Vögel, allein niemand nahm sich seiner an, er blieb vogelfrei. Nicht die rasche Abnahme noch der wirtschaftliche Nutzen sicherten dem Vogel die Zuneigung des Menschen in solchem Maße, um so mehr tat dies die tiefe Wirkung auf das menschliche Gemüt, die vom Vogelleben ausgeht. Kein anderes Tier kann seinen Gefühlsregungen durch eine Kunstform, die Musik, Ausdruck verleihen als eben der Vogel. Und was das werbende Männchen aus jubelnder Brust seinem Weibchen zu versprechen scheint, das hält und erfüllt es auch auf das treulichste; beide Gatten widmen ihre ganze Kraft der Aufzucht der Nachkommenschaft und werden so den an sie gestellten Aufgaben der Natur in idealer Weise gerecht. So wird uns schwankenden Menschen, denen ja die Norm, in denen sich das Tierleben abspielt, fehlt, die Vogelehe zum Vorbild der uns als höchstes sittliches Ideal geltenden Einehe und Familie. Damit kommen wir aber zu dem Schluß, daß der Wert des Vogellebens für uns keineswegs nur im materiellen Nutzen besteht, sondern daß es sich um etwas viel höheres handelt, nämlich um einen idealen, einen ethischen Wert; daher ist die Erhaltung dieses Gutes eine Aufgabe, die der besten Kräfte unseres Volkes würdig ist. Pioniere des Vogelschutzes sollten alle diejenigen sein, die Gelegenheit haben, außerhalb der Großstadt auf dem flachen Lande zu wirken, denn nur dort kann sich der Vogelschutz praktisch betätigen; die Lehrer, Geistlichen und Forstleute, doch auch die Bahnbeamten, sollten sich seiner besonders annehmen, Voraussetzung dafür wäre natürlich, daß die Betreffenden eine sachgemäße Ausbildung erfahren hätten.

Wenn wir etwas schützen wollen, so müssen wir seine Feinde kennen und deren Wirken hemmen. Der größte Feind aller urwüchsigen Natur und dem sich in ihr abspielenden Vogelleben ist sicher der Mensch. Stellen wir uns einmal den Rhein ohne menschliche Einwirkung vor: zerteilt in viele Nebenarme würde sich in einer Breite von mehreren Kilometern langsam der Strom abwärts bewegen, bewaldete, üppige Vegetation aufweisende Inseln bespülend. In den Kronen der hohen Buchen, Weißtannen und Espen finden sich Reiherkolonien, in den Schilfwäldern der verlandenden Arme brüten reichlich die verschiedenen Rohrsänger, Sumpfgeflügel, von der zarten Ralle bis zur Rohrdommel, im Auwald anderes gefiedertes Volk von der Nachtigall bis zum Fischaoler und zur Rohrweihe; in den alten morschen Baumriesen, in Höhlen Meisen, Hohltauben, Uhu. Es war einmal .... Zwischen nackten Ufern eilt das zusammengedrängte Wasser hinab, auf beiden Seiten dehnt sich eine (kahle) Kulturstätte der Erzeugung von Brot dienend. Nur wenigen Vogelarten wie Lerchen, Rebhuhn, Grauammer kam diese Veränderung zugute, den großen Massen der anderen Vögel wurde der Aufenthalt unmöglich gemacht und damit kämen wir wohl zur Hauptaufgabe des praktischen Vogelschutzes, nämlich der Schaffung von Nistgelegenheiten. Hierbei müssen wir unterscheiden: 1. die für Höhlenbrütern und 2. die für nicht Höhlenbrüter bestimmten. Am längsten geübt wird wohl das Aufhängen von Starkästen und dieser Bursche ist so genügsam geworden durch Not und Gewohnheit, daß er jeden Kasten annimmt, mag er auch leck sein oder beim geringsten Wind wackeln und klappern. Weit höhere Anforderungen stellen die übrigen Höhlenbrüter, wie Meisen, Kleiber, Gartenrotschwanz. — Lange Zeit verschmähten sie die ausgehängten Kunstgebilde, bis es Freiherrn von Berlepsch gelang, einen Ersatz zu schaffen, der auch ihren Ansprüchen genügte. Er machte die Beobachtung, daß keine Höhle so gern bezogen wird, wie die verlassene Spechthöhle, und so ging er daran, diese auf das Genaueste nachzubilden; dabei stellte er nicht dünnwandige Kästchen her, sondern massive Gebilde, die aus einem natürlichen Baumstamm gebohrt, jahrelang halten; daß der Weg der richtige war, zeigte der Erfolg, denn diese Kästen wurden gerne angenommen. Er stellte sie in verschiedenen Größen für alle Höhlen- und Halbhöhlenbrüter her, ersann Haken, die eine völlig sichere Befestigung am Baum gewährleisteten, ohne diesen zu schädigen. Das Einflugloch soll der Wetterseite abgekehrt, also nach Osten sehen, es soll eher etwas nach unten schauen, so daß es dem Regen keinen Eintritt gewährt. Die Kästen sollen für Meisen nicht unter 2 m vom Erdboden aufgehängt werden, eine höhere Befestigung kann nicht schaden. Mit Hilfe dieser Kästen gelingt es, die für den Obstbaum so überaus wertvollen Meisen an unsere Gärten zu fesseln; doch ist kein anderer Vogel vergessen: für die Mauersegler werden Kästen gebaut, die wagerecht unter den Gesimsen zu befestigen sind, für den Gartenrohrschwanz bestehen Halbhöhlen, für Hohltaube und Wiedehopf ganz große Kästen; für die Blaumeisen sind die Einflugsöffnungen enger als für die Kohlmeisen; alle weiteren Einzelheiten befinden sich in den betreffenden Büchern über Vogelschutz. Mit Hilfe dieser Kästen wird es vielleicht auch ermöglicht, unsere modernen Forstkulturen, die keine alten, morschen Bäume mehr dulden wollen, mit Vögeln zu beleben. Nicht weniger wie den Höhlenbrütern fehlt es den freibrütenden Vogelarten an Nistgelegenheiten und Aufenthaltsmöglichkeiten. Buschholz bringt keinen Nutzen, also fort mit ihm; und damit schwinden unseren Grasmücken, Hänflingen, Goldammern Niststätten und Nahrungspender. Um hier Ersatz zu schaffen, braucht es größere Opfer; mehr Geduld und Liebe als es das Aushängen von Nistkästen erfordert. Wer den Mut hat, sich ein solches Vogelparadies zu schaffen, der waffne sich mit Geduld, denn erst nach sechs Jahren wird ihm die volle Belohnung für seine Mühen zuteil. Zu den ersten 2—3 Jahren läßt man ein Gemisch von

Weiß- und Schwarzdorn, wilden Rosen, Liguster und Hainbuche heranwachsen, dann werden sie geköpft, damit sich an den Stellen Quirle bilden, die die beste Unterlage für das Nest abgeben und erst in den nächsten Jahren bilden sie das erwünschte Dorado für unsere Freunde. Aus meiner Jugend erinnere ich mich an ähnliche, allerdings auf andere Weise entstandene Gehölze, es waren die mit lebenden Hecken umfriedeten Kuhweiden im Schweizer Jura; das Vogelleben war einzigartig: auf hoher Warte saßen auf Weiß- und Schwarzdorn rotrückige Würger, wie die alten Burgwächter alles andere Geflügel vor herannahenden Gefahren warnend, im Dickicht trieben Grasmücken, Braunellen, Goldammer und Zaunkönig ihr heimliches Wesen; von eingesprengten Buchen und Tannen rieselte Rotkehlchens Kirchenlied, im Herbst statteten Eichel- und Tannenhäher, Eichhörnchen den Haselnußstauden ihre Besuche ab. Bei der Anlage ähnlicher Hecken könnte die Bahnverwaltung viel leisten, wenn sie die Bahndämme mit lebenden Hecken einfrieden wollte und auch die auf ihrem Gebiet liegenden Ödländereien zweckmäßig bepflanzte. Die beste Vorbereitung zur Anlage solcher Gehölze bildet sicher reichliches Beobachten in freier Natur. — — — (Schluß folgt.)

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Kauf- u. Tauschvermittlung: Max Dähnick in Berlin NO 18, Gr. Frankfurter Str. 90, Ecke Markusstr. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

In der am 11. November 1925 stattgefundenen Vorstandssitzung sind Mittel im beschränkten Umfange zum Besuche von Ausstellungen bewilligt worden. Es ist beabsichtigt, der Dresdner Ausstellung einen Besuch abzustatten. Der Verein ist ersucht worden, eine Werbesitzung in den Rahmen seines Programms mit aufzunehmen. Der Besuch der Dresdner Ausstellung wird angelegentlichst empfohlen, ihr geht der Ruf voraus, daß sie eine erstklassige sein wird.

Unseren sehr verehrten Mitgliedern geben wir zur Kenntnis, daß in kurzer Zeit unser erstes Flugblatt: Naturschutz und Stubenvogelliebhaberei im Druck erscheint. Wir bitten für möglichst weite Verbreitung zu sorgen, vor allem in der Tagespresse. Jeder Verein und jedes Einzelmitglied muß seine Ehre darin erblicken, dieses Flugblatt jedem zugängig zu machen. Wir bitten, die Veröffentlichung in der Tagespresse auszuschneiden und an uns einzusenden. Die Ausschnitte dienen zum Beweis der Bemühungen und vor allem zu wertvoller Statistik. J. A.: Petters.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

E. Balser, Fulda: Grauköpfchen.

Eckstein, Magdeburg, Lübecker Str. 115: 0,2 Zenaida-Täubchen, 2 diesjähr. Sperlingstäubchen, 2 Wachteln.

Johann Götz, Vogelexport, Neu-Ulm (Bayern): Grauköpfige Zwergpapageien, Siebenfarbentangaren, 1,0 violettblaue Organisten, Zwergtimalien, Weißwangenlerchen, Orangeblaufinken, kleine Kubafinken, Zwergelsterchen (Sp. nana), Zebrafinken, Kaptäubchen, Glanzkäfertauben.

Richard Heydenreich, Bad Suderode, Harz: Schneeweiße Kanarien, desgleichen weißblaue und ganz blaue.

Josef Krah, Frankfurt a. M., Vogelhandlung, Kühgasse 7 (an der Konstabler-Wache): Tovisittiche.

E. W. Lenger, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a: Grauköpfchen, Schuppenköpfchen.

Hub. van Loosen, Dinslaken a. Rh., Duisburger Str. 45, A. Z.-Mtgl 220: Kalifornische Schopfwachteln.

Odenwald, Tierhandlung, Fulda: Grauköpfchen, Weißhaubenkakadus.

K. Reicherdt, Rochlitz i. Sa.: 0,1 kleiner Kubafink.

K. Rinke, Stargard i. Pom.: Girlitz×Kanarien mit und ohne Haube.

K. Schurz, Würzburg, Am Pleitenturm A. II.: Gesangskanarien in Orange, Moosgrün und Weiß.

Otto Steinhagen, Lübeck, Beckergrube 7: 2,0 Stieglitz×Grünfinkbastard, 1,0 Girlitz×Kanarien-, 1,0 Grünfink×Kanarienbastard, Isabellkanarien, Holländer Kanarien. 1 zahmer Kiebitz, 2 afrik. Sperlinge.

Friedr. Weick, Mörstadt b. Worms: 1,0 Pirol, 1,0 Wachtel,

Wilckens, Tierarzt, Vogel i. Taunus, A. Z.-Mtgl. 203: 1,0 Girlitz×Kanarie, 2,2 (Girlitz×Kanarie)×Kanarie, 1,0 Isabellkanarie.

Offerten unter „Billig" an die „Gef. Welt": Spitzschwanz-, Maskenamadinen, lauchgrüne Papageiamadinen.



Herrn O. L., Berlin. Die Pflege ihrer Prachtfinken ist im allgemeinen richtig. Zänkereien, meist auf Futterneid beruhend, sind unvermeidlich. Ist in der Gesellschaft ein besonders angriffslustiges Individuum, welches seine Angriffe stets auf ein weniger wehrhaftes richtet, das unter den Angriffen sehr leidet, so muß eins von beiden den Platz räumen. Am besten wird es in einem neben dem großen Käfig aufgestellten kleinen Käfig untergebracht. Zum Übernachten gibt man den Prachtfinken ein kleines Schlupfkästchen oder -körbchen in den Käfig von etwa 1 dm³ Größe. Über den Vorteil der Verfütterung gekeimter Samen ist wiederholt in der Zeitschrift berichtet worden, auch über die Art, wie die Keimung geschieht.

Herrn Dr. A. K., Aarau (Schweiz), ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn A. L., Halle (Saale). Der Generalsekretär der deutschen Ornithologischen Gesellschaft ist Herr Dr. Erwin Stresemann, Berlin N 4, Zoologisches Museum, Invalidenstraße 43.

Herrn Dr. B., Schwenningen; Herrn W. K., Freiburg i. B; Herrn L. E. F., Offenbach/M.; Herrn H. H., Braunschweig: Beiträge dankend erhalten.

Herrn A. B., Jena. Hoffentlich schreiten die Girlitze zur Brut, so daß im nächsten Jahrgang ein Züchtungsbericht erscheinen kann.

Herrn H. L., Wielki-Hajduki. 1. Junge Lerchen mausern das ganze Gefieder einige Wochen nach dem Flüggewerden. Es läßt sich nichts tun, um den Wechsel des Kleingefieders zu beschleunigen. Richtige Ernährung und Pflege ist notwendig. Statt der dauernden Gabe von Ei mit Semmel ist besser ein Gemisch von geriebener Möhre, Ameisenpuppen und Vogelbiskuit zu reichen, dem täglich kleingeschnittene Vogelmiere in größeren Mengen beigegeben wird. 2. In einem nach Norden gelegenen Zimmer sind die Vögel weniger günstig untergebracht als in einem nach Südosten oder Osten gelegenen, aber ein solches Zimmer kann immerhin als Vogelstube verwendet werden. 3. Den Vogel zu bestimmen, ist mir nach den gemachten Angaben unmöglich. Waren Kopf und Rücken einfarbig rotbraun, ohne jede Zeichnung?

Herrn St., Karlstadt. Der Wellensittich ist infolge einer Verletzung des Schädels eingegangen, anscheinend ist er von einem andern Vogel gebissen oder gegen eine scharfe Kante heftig angeflogen.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

Jahrgang 54 — 26. November 1925 — Heft 48

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Erinnerungen eines Papageienliebhabers. Von Pfarrer Möller. (Schluß.)
Das Liebhaberjahr. Plauderei von J. Birk, Leipzig. (Forts.)
Mein Freund, der Regenpfeifer. Von Bengt Berg.
Notizen aus vergangenen Jahren. Von A. Jena, Biberach/Riß. (Forts.)
Anfangsgründe und Grundrisse zur Weiterentwicklung in der Ausbildung des Kanariengesanges. Von Paul Holzky, Cöthen i. A.
Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten. Von J. Kuntzendorff, Berlin. (Forts.)
Vogelschutz. Von Dr. Stehle, Köln.
Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig – Vom Vogelmarkt – Redaktionsbriefkasten – Ausstellungen – Aus den Verbänden – Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

reutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellungen.

Der **Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden**, gegr. 1906 (vorm. Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden), veranstaltet in diesem Jahre vom 4. bis 7. Dezember seine Vogelschau im Italienischen Dörfchen. Ausgestellt werden einheimische und fremdländische Sing- und Ziervögel. Auch in der diesjährigen Vogelschau soll der Gedanke, wie die Vogelpflege und der Vogelschutz geübt werden, veranschaulicht werden. Alle Vogelliebhaber sind herzlich willkommen.

Die Ausstellungsleitung.

Der **Verein der Freunde von Sing- und Ziervögeln in Lübeck** erlaubt sich hiermit, alle Sports-Vereine und Freunde zu seiner am 12. und 13. Dezember 1925 stattfindenden Allgemeinen Ausstellung ergebenst einzuladen. Das Standgeld beträgt für Kanarien pro Kollektion 8 M., für Ziervögel pp. in Käfigen bis 50 cm Länge 1.50 M., bis 120 cm Länge 3 M. pro Käfig. Anmeldeschluß: 1. Dezember 1925. Als Preise kommen außer Ehrenpreisen 32 echte Medaillen (teilweise Senatspreise) zur Verteilung.

Herbert Müller, Lübeck, Hüxtstraße 119.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe (Bd.). Gegr. 1888. Die diesjährige Prämiierung findet am 28. und 29. d. Mts im Vereinslokal Goldener Adler statt. Dem Wunsch der Mitglieder entsprechend, wird neben einem Kanarienmarkt eine Vogelschau abgehalten. Zur Vergebung kommen außer 12 Medaillen verschiedene Ehrenpreise, die zum Teil der Verein angekauft, zum Teil von edler Hand gestiftet wurden. Als Preisrichter für Kanarien wirken die Herren Dubail aus Mannheim und Sterkel aus Durlach-Aue. Für die ausgestellten Exoten und einheimischen Vögel fungieren als Preisrichter unser Ehrenvorsitzender Herr Carl Schneider, ferner das Ehrenvorstandsmitglied Herr Klohe. Der aufgestellte Glückshafen wird mit 40 Kanarienhähnen sowie 40 Paar Exoten und anderen für die Liebhaberei brauchbaren Gegenständen ausgestattet. — Weiter findet am Samstag, dem 28. d. Mts., abends 8 Uhr, im oberen Saale des Vereinslokals ein Familienabend mit Preisverteilung und Tanz statt. In Anbetracht der kleinen Räume findet die Feier nur unter Vereinsmitgliedern statt.

Boppel, 1. Schriftf.

Voranzeige! Um vielfachen Wünschen nachzukommen und um gleichzeitig den Ostern 1926 zur Tagung des Reichsverbandes der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig in Leipzig weilenden Vogelliebhabern einen Einblick in den Stand der Leipziger Liebhaberei zu gewähren, veranstaltet der Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig im Naturkundlichen Heimatmuseum wiederum eine Vogelschau, zu deren Besuch schon heute alle Freunde und Anhänger unserer schönen Liebhaberei herzlichst eingeladen werden.

Die Ausstellungsleitung.
J. A.: Joh. Birk.

Aus den Verbänden.



Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastard-, Kanarien- und Exotenzüchter, Sitz München. Gegr. 1907. Monatsversammlung v. 24. Oktober 1925. Der 2. Vors. Herr Ziegler eröffnete die gut besuchte Versammlung. Herr Heinemann stellte auf Anfrage fest, daß sämtliche Mitglieder mit dem Verkauf ihrer Vögel an die Abnehmer Gebr. Artmeier, angemessen dem Preis, der zurzeit für Gesangskanarien bezahlt wird, zufrieden waren. Es wurden erzielt für Gestalts- und Gestaltsfarbenkanarien 12—15 M., für Gesangsfarbenkanarien 15—18 M. für Hähne, für Weibchen durchschnittlich 6—10 M. Auf Ausstellungen beteiligt sich der Verband gemäß den Statuten nur bei denjenigen Verbänden und Vereinen, welche den Verband hierzu einladen und die gestellten Bedingungen erfüllen. Herr Ziegler teilte mit, daß sich der Verband laut dem Beschluß an den diesjährigen Ausstellungen der Gruppe Oberbayern des Weltbundes vom 3.—13. Dezember 1925 und der des Alten Vereins für Vogelzucht und Schutz vom 1.—6. Januar 1926, beide in München, beteiligt. Zur Ausstellung des Weltbundes vergibt der Verband aus seinem Prämiierungsfonds für Gestaltskanarien (Holländer): 1. Ehrenpreis 20 M., 2. Ehrenpreis 15 M.; Münchener Gestaltsfarbenkanarien: 1. E.-P. 20 M., 2. E.-P. 15 M., 3. E.-P. 10 M., 4. E.-P. 5 M.; Gesangsfarbenkanarien: 1. E.-P. 20 M, 2. E.-P. 15 M; Bastarde: 1. E.-P. 20 M., 2. E.-P. 15 M.; Exoten: 1. E.-P. 20 M., 2. E.-P. 15 M. Ferner zirka 100 M. an Privat-Ehrenpreisen. Zu diesen Ausstellungen werden ganz besonders auch unsere auswärtigen Mitglieder ersucht, sich zu beteiligen. Anmeldungen sind zu richten an den 1. Vors. Herrn Leopold Keidel, München, Schraudolphstr. 44/3. Ringbestellungen für 1926 sind bis spätestens 1. Dezember 1925 aufzugeben.

M. Pfaller.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Sitz Leipzig. 1. Vors. Hermann Höhne, Leipzig Volkmarsdorf, Eisenbahnstraße 84 IV. 1. Schriftf. Max Hunger, Leipzig-Gohlis, Polizeigebäude Zimmer 196. Kassierer Ludwig Böttcher, Leipzig, Inselstr. 17 II. Girokasse Leipzig, Nr. 6317. Postscheckkonto Nr. 53319. — Die Mitgliederlisten der Vogelliebhaber-Vereinigungen zu Aue (beide Vereine), Schneeberg und Kamenz stehen noch aus. Um baldige Einsendung derselben wird gebeten. — Ferner machen wir die angeschlossenen Vereine auf die Vogelschau des Vereins für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden vom 4.—7. Dezember 1925 im „Italienischen Dörfchen", Schloßplatz, aufmerksam. Genannter Verein wird bestrebt sein, auch diese Ausstellung zu einem vollen Erfolg zu gestalten. Der Reichs- und Landesverbandsvorstand ist am Sonntag, dem 6. Dezember zugegen, und bietet sich somit zu einer Besprechung aller schwebenden Fragen die beste Gelegenheit. Das Band der Gemeinschaft dürfte in einem gemütlichen Beisammensein erneut gefestigt werden. — An unsere Mitglieder aber richten wir die dringende Bitte, am 6. Dezember von nah und fern herbeizueilen und neben der gewiß erfreuenden Besichtigung der Ausstellung die wertvolle Gelegenheit einer gemeinsamen zwanglosen Sitzung wahrzunehmen unter Beisein unseres wackeren Reichsverbandsvorsitzenden, des Herrn Birk, der sein Erscheinen zugesagt hat.

W. Höhne, Vors.; Hunger, Schriftf.

Aus den Vereinen.



Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Postscheckk. Hannover 56714; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10. — Aufgenommen sind die Mitglieder Nr. 193 n Herr Fabrikbesitzer Franz Fettback, Hannover, Andertensche Wiese Nr. 20; Nr. 200 n Herr Bruno Goldschmitt, München, Leopoldstr. 40 II; Nr. 207 n Herr M. Reichard, Berlin W 30, Nollendorfstr. 15 III — Im Anschluß an die Bekanntmachung in Heft 41 teile ich nachstehend die Vereinsnummern derjenigen Mitglieder mit, die in der Liste gestrichen und somit aus der A. Z. ausgeschieden sind. Etwaige Einsprüche sind innerhalb acht Tagen geltend zu machen. Mitgl. Nr. 7, 10, 24, 40, 41, 46, 52, 53 n, 54, 57, 76, 96, 97, 106, 109, 111, 112, 116, 125, 137, 138, 139, 142, 146, 152, 158, 169, 174, 177, 185, 187, 190, 194, 195, 198, 201, 208, 209, 210, 215, 223, 225, 227, 228, 231, 232, 239, 242, 248, 249, 259, 265, 267, 268, 274, 276, 277, 283, 285, 286, 287, 293, 294, 297, 309, 315, 316, 318, 319, 321, 322, 327, 329, 334, 336, 347, 357, 363, 367, 368, 375, 384, 390. Die Mitglieder 192 von Jena verzogen und 395 nach Bad Oldesloe hingezogen, bitte ich um Angabe der neuen Adresse. — Der Jahresbeitrag ist auf 4 RM., die Aufnahmegebühr auf 5 RM. festgesetzt. Die Zahlungsweise ist aus der demnächst herausgehenden Liste ersichtlich.

A. Krabbe.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögeln in Apelerbeck. Sitzung jed. 1. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, in der Wirtschaft Sprave, fr. Fritz Lecking, Kirchstr. F. Lecking, 1. Vors.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke-Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstr. 37a. Gäste stets willkommen. P. Böhme, Schriftf.

Verein für Vogelkunde und Geflügelzucht Breslau. Vogelliebhaber Breslaus, wollt ihr euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei nicht endlich auch zusammenschließen, wie es in anderen Städten schon längst geschehen ist? Ein Stamm von erfahrenen Vogelpflegern ist vorhanden, jedoch können Fortschritte nur erzielt werden, wenn alle noch abseits Stehenden sich uns anschließen und unsere mit belehrenden Vorträgen verbundenen Vereinsabende besuchen. Auskunft ert. bereitwilligst P. Spitzner, 1. Schriftf, Ofener Str 26.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Dessau und Umgegend. Gegr. März 1925. Vereinslokal „Fürst Blücher", Ecke Antoinetten-Leopoldstr. Versammlung jeden 2. Mittwoch, abends 8 Uhr. Gäste zu allen Veranstaltungen stets willkommen. J. A.: Dielitzsch, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jed. 2. u. 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Rest. „Zum Löwentor", Königswall 75. P. Stawitzki, Schriftf.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Vers. jed. Freitag, abends 8 Uhr, i. Vereinsl. „Bienenkorb", Schloßstr. Vogelliebhab. als Gäste willkommen E. Schubert, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Eliesenhof", Eliesenstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Mittelthüringens Sitz Erfurt. Sitzung jeden 2. Mittwoch und jeden letzt. Sonnabend im Monat im Vereinsl. „Stadt Chemnitz", Thomasstr. 57. Näh. Auskunft erteilt Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Vereinigung einheimischer Waldvogelliebhaber zu Görlitz und Umgegend. Zusammenkunft jeden 3. Sonnabend im Monat im Restaurant „Zum Bismarckgarten", Bismarckstraße. 1. Vors. W. Lücker in Görlitz, Konsulstr. 7. Vogelliebhaber als Gäste willk. J. A.: Erich Rothe, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen. Nächste Sitzung am Dienstag, den 1. Dezember. A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Der Hannoversche Vogelschutzverein zu Hannover, gegr. 1881, wirkt mit sichtbarem und anerkanntem Erfolge für Vermehrung und Schutz der Vogelwelt bei Hannover durch Aufhängen von jährlich einigen hundert Nistkästen aller Art, durch Erweckung von Interesse und Liebe für die Vogelwelt mit monatlich, zur Gesangszeit wöchentlich stattfindenden Belehrungsspaziergängen und durch Vorträge und Austausch der Beobachtungen in den jeden 3. Dienstag des Monats stattfindenden Vereinsversammlungen. Seine Bestrebungen dienen also lediglich gemeinnützigen Zwecken. Mitgliederzahl rd. 1200, jährl. Beitrag nur 1 M. Meldungen an den Vors. Herrn Fritz Becker, Hannover, Boedekerstr. 1 F. — In der am 17. d. Mts. stattgefundenen Versammlung des Hannoverschen Vogelschutzvereins hielt Herr Redakteur Klocke einen äußerst interessanten Vortrag über die Vogelwelt des Bodensees. Der Herr Vortragende verbreitete sich zunächst über die geographischen, physikalischen, geologischen und wasserbiologischen Verhältnisse des Bodensees, um dann zu dessen Vogelwelt überzugehen, deren großen Reichtum sowohl an Arten- als Individuenzahl er anschaulich schilderte, um dann mit dessen Einflusse auf die Organismen im Wasser zu schließen. Der Vortrag löste reichen Beifall und eine eingehende Besp echung nebst dem warmen Danke der besonders stark besuchten Versammlung aus. Schließlich wurde noch die dauernde Aufstellung des dem hiesigen Provinzialmuseum gestifteten, bei der jetzigen Naturschutz-Ausstellung vorgeführten hessischen Futterhauses beraten und die sehr interessant verlaufene Versammlung damit geschlossen. Die Dezemberversammlung fällt wegen der Nähe des Weihnachtsfestes aus. Becker.

Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber. Die Dezemberversammlung am 10. wird im Landesheim abgehalten.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- u. Singvögel zu Hörde. Gegr. Sept. 1920. Versammlung im Winter, v. Okt. bis April, aller 14 Tage Sonntags, nachm. 5 Uhr, im Sommer, v. April bis Okt., abends 8 Uhr. Gäste u. Liebh. stets willk. Vereinsl. Restaurant Burghof, Bes. H. Ungewitter, Bruchstr. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Versammlung aller 14 Tage Sonnabends. Vereinslokal: Gasthaus „Zur Krone", Jena, Grietgasse. Gäste stets willkommen. Jena besuchende Vogelliebhaber treffen jeden Sonntag vorm. den Schriftführer Adolf Voigt, Jena-Ost, Feodorastraße 13, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube freundlichst eingeladen. — Die Versammlung am Sonnabend, 14. Nov., war gut besucht. auch Gäste hatten sich eingefunden Erst wurden Probenummern der „Gefiederten Welt" verteilt Eingegangen ist eine Offerte der Firma Kaufmann Söhne, die etwas sonderbar anmutet. Der Lübecker Verein der Freunde von Sing- und Ziervögeln veranstaltet am 12. u. 13. Dezbr. eine Ausstellung und fordert zur Beteiligung auf. Für uns kommt eine solche natürlich nicht in Frage. — Der Schriftführer hielt einen Vortrag über ausländische Käfigvögel und besprach zunächst die auf dem Vogelmarkt erhältlichen Insektenfresser und eigentlichen Finken. Weitere Vorträge über Weber, Webefinken und Papageien sollen folgen. Eine längere Aussprache schloß sich an, in der besonders die Fütterungsmethode besprochen wurde. Allerlei aus dem Liebhaberleben gab der Vorsitzende zum besten, und ein Jenaer Original von Vogelfänger wurde treffend durch einige Mitglieder kopiert. Erst gegen 12 Uhr fand die Vers. ihr Ende. Die nächste Versammlung findet am Sonnabend, dem 28 Nov., statt. Adolf Voigt, Schriftf.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an!

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal bei Gastwirt Lapschies, Kaiserstr. 46a. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 3. Dez. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Laßner im Volkshaus-Nord, Glogauer Str. 20. Liebhaber willk. J. A.: Friedrich.

Verein der Vogelfreunde Linden. 1. Vors. P. Winkel, Linden, Fröbelstr. 9.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Sitzung aller 14 Tage im Restaurant „Zum Neckarstrand", Messeplatz 1. Liebhaber willkommen. Joh. Daubmann, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. im Monat. Vereinslokal: Gastwirtsch. Augustusburg, inn. Leipziger Str. Nächste Vers. 4. Dez., abends 8 Uhr. P. Schmidt, 1. Vors.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgel
Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zw

Käfige u. Gerätschaften

Verkaufe:

Drosselkäfig Reform . . . 10.—
Spötterkäfig 2.50
Gutes Schwarzplättchen,
Fußfehler . . . . . 3.—
Karl Penker, Landsberg a. W.,
Richtstr. 24. [1626

Futtermittel

Mehlwürmer

(das ganze Jahr hindurch)
ℳ 5.— das Pfd., ausschließl. Porto u. Verp.; bei Abnahme von 6 Pfd. Porto u. Verpackung frei.

Ia Ameiseneier

3.50 ℳ per Pfd.
9 Pfd. netto 30.— ℳ franko.
Ia Weißwurm, 1925er 4.— d. Pfd.
Ia Muska-Zecken . . 1.50 d. Pfd.
Ia Seidenraupen-puppen, gemahlen 0.60 d. Pfd.

tf. Universalfutter

Mischung I für Nachtigallen ℳ 2.—
" **II für Grasmücken** ℳ 2.—
" **III für Drosseln** . . ℳ 1.50
das Pfund ab hier, ausschl. Verp.; bei größeren Mengen billiger. [1627

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
A. Eckrich II, Waldsee (Pfalz).

Mehlwürmer

1 Pfd. 5 ℳ ab hier,
6 Pfd. franko und Verpackung frei, geg. Voreinsendung ¼ Pfd. 2 ℳ franko.

Ameiseneier, 1925er,

1 Pfd. 3.50 ℳ, ab hier 9 Pfd. 31 ℳ frk.

Ia Weißwurm, 1925er,

Pfd. 4.50 ℳ, 9 Pfd. 36 ℳ franko.

Ia Muska-Zecken

1628] Pfund 1.50 ℳ.

Seidenraupenpuppen, gemahl.,

Pfd. 0.60 ℳ ab hier.
Großabnehmer Rabatt.
Karl Claus, Mutterstadt II
(Hauptbahnhof).

Mehlwürmer

à Pfund 5.60 ℳ, ¼ Pfund 2.— ℳ
franko gegen Voreinsendung

Ia Ameiseneier	Pfd. 4.— ℳ
Ia Muska	Pfd. 1.50 ℳ
Ia Weißwurm	Pfd. 4.50 ℳ
Seidenraupenschrot	Pfd. 0.75 ℳ
Garneten gem.	Pfd. 0.35 ℳ

Alles diesj. Ware, à Pfund ab hier.
Th. Witte, Niederndodeleben
b. Magdeburg. [1629

Heidelberger Vogelfutter

Braune Packung für Erdsänger u. ä. Vögel
250 g 2.20
Graue Packung f. Grasmücken u. ä. Vögel
250 g 1.20
Blaue Packung für Drosseln u. ä. Vögel
250 g 1.10
Rote Packung für Stieglitze,
Zeisige, Kreuzschnäbel . 750 g 1.45
Grüne Packung f. Hänflinge,
Gimpel, Girlitze . . . 750 g 1.50
Gelbe Packung für Kanarien 1000 g 1.65
Generalvertreter für Sachsen und Thüringen [1630
Arthur von Ende,
Zoologische Handlung,
Jena (Thüringen), Magdelstieg Nr. 55.

Unübertroffen ist!

Heidelberger Vogelfutter,

hergestellt nach Vorschrift
und unter Kontrolle von
Professor Dr. Otto Fehringer
durch
GENO-WERK ~ Mannheim
Rheinkaistraße 8 b.

Anfragen über die Pflege einheimischer Vögel werden gerne beantwortet. Rückporto beilegen. [1631

„Naturell"

das seit Jahrzehnten in Liebhaberkreisen eingeführte und bestens anerkannte Futter für edle Weichfresser ist wieder in bester Friedensbeschaffenheit lieferbar! **„Naturell" ist Qualitätsware,** auf Grund langjähriger Erfahrungen zusammengestellt und durch Autoritäten bestens beurteilt. [1632
Preis: kg 6.— M. Probesendungen gegen Einsendung von 1.— M. in Briefmarken. Drosselfutter kg 2.— M.
Empfehle außerdem bestes Körnerfutter für Einheimische und Exoten, ferner Ia Ameisenpuppen, Weißwurm usw.
Nur direkt zu beziehen von
Wilhelm Dietze, Leipzig, Kurprinzstr. Nr. 15.

„ORNIS"

Freie Bezugsvereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands.
Gegründet 1912 .·. Fernsprecher 4198 [1633
Fachgemäße Belieferung mit Vogelfutter („Reform-Normal", individuelle Zusammensetzung bei restlosem Verbrauch; stets frisch gemischt). Hunderte von Liebhabern füttern seit über einem Jahrzehnt mit bestem Erfolg nur „Reform-Normal".
Reform-Normal-Käfige Mod. ORNIS 1925, neue Preisliste erschienen. — Modern eingerichtete Käfig-Bauanstalt mit elektrischem Betrieb.
Anschrift: Ornis-Haus, Halle-Saale. Der Geschäftsführer: Martin Sperling.

Bei Anfragen und Bestellungen bitten wir, sich auf die „Gef. Welt" zu berufen



Mehlwürm

veg. gez., 1 Pfund M
¼ Pfund M. 1.80
gegen Voreinsendu
Bonitas-Vers
Rostock i. M. 3.

1925er Ameisene

hell, gesiebt, das Pfund M. 3.70 ab
Bei Voreinsendung franko.
Geno-Werk, Mannh
Rheinkaistr. 8 b. Hersteller d
Heidelberger Vogelfut
nach Prof. Dr. O. Fehring

Ia Mehlwürm

gegen Voreinsendung
¼ Pfund 1.50 Mark fr
Exporthaus B
Wien III
Trubelgasse 8.

Offeriere Vogelfutter in prima Qu
Heir. Ameiseneier . . Pfd. 3.
. 10 Pfd. 36.— M.
Zecke . . . . . Pfd. 2.
Con. Eigelb . . . . . Pfd. 2.
Karottengrieß . . . . Pfd. 0.
Drosselfutter . . . . Pfd. 0.
Lucullus extra Mischung ½-Pfd.
0.95 M., weiße Packung 0.
Senegalhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd.
Silberhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd.
Algierhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd.
Kerbtiernahrung f. Kanarien Pfd.
Versand per Nachnahme oder
sendung des Betrages.
Paul Tzornack,
Berlin NO 55, Prenzlauer All
(Postscheck-Konto Nr. 652 6
Gegründet 1905.

Quaiser's Vogelfutte

in 6 verschiedenen Arten für **Weich- und Körnerfresser.**

Fürs Deutsche Reich Hauptverkaufsstelle:

Oskar Adler's Nachf.,
Zittau i. Sachsen,
Weberstraße 39.

in großen und kleinen O
ginalpaketen liefert fran
frei Verpackung für
Tschechoslowakei:
Alleinerzeugung u. Versan
Stefan Quaise
Reichenberg (Böhm
Herrengasse 10.

nach Angaben von Prof. Dr. O. Fehringer, Heidelberg

Weichfresser:	Erdsänger und ähnliche Vögel,	Packung	gelb,	groß:	2.40,	klein: 1.80
	Grasmücken u. Schwarzplatten,	"	rot,	"	2.25,	" 1.20
	Drosseln u. härtere Weichfresser,	"	grün,	"	1.80,	" 0.70
Körnerfresser:	Stieglitze und Zeisige,	"	rot,	"	0.75,	" 0.40
	Hänflinge, Girlitze usw.	"	blau,	"	0.75,	" 0.40
	Kanarien, beste Qualität,	"	weiß,	"	0.75,	" 0.40

Jeder Liebhaber wolle sich von der Qualität des **„Ideal"** überzeugen! [

Vereine und Wiederverkäufer Rabat

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 8
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdeb.

Grüner Yorkshirekanarienvogel — Münchener Holländer
Gehäubter Norwichkanarienvogel — Goldlizzard

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 3. Dezember 1925 | Heft 49

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Umzug.

Von Prof. Fritz Braun.

(Nachdruck verboten.)

Sommersüber hausen meine Gefiederten in einem hohen Bodenraum. Er wäre für sie ein treffliches Gelaß, glühte nicht die Sommersonne so unbarmherzig auf die roten Dachziegel und stünde da ein Ofen, den man an kalten Wintertagen wenigstens etwas anheizen könnte. So bange ich im Hochsommer immer wieder für das Leben der Kreuzschnäbel, Bergfinken, Birkenzeisige und andere, die es kühl gewohnt sind, und wenn die ersten Fröste kommen, muß ich mit der ganzen Gesellschaft in ein Badezimmer übersiedeln, das zwar hübsch groß ist, aber während der Winterzeit um dieser Gäste willen seiner eigentlichen Bestimmung nicht zugeführt werden kann.

Da gilt es nun, die Zahl der Käfige doch wenigstens etwas einzuschränken. Ich mache mich mit dem besten Willen ans Werk, aber der Erfolg entspricht dem leider nicht.

Schon der Anfang ist wenig glückverheißend, denn er besteht darin, daß ich meine Braunkopfammer aus dem Flugkäfig in ein Einzelbauer stecke. In dem großen Behälter hat er sich augenscheinlich nicht wohlgefühlt; Finkenvögel sind eben an ganz andere Bewegungen gewöhnt als diese Ammern, die am liebsten ruhig auf ihrer Stange hocken. Da müssen sie ihnen natürlich fortwährend in ganz unerwünschter Weise in die Quere kommen.

Als die Braunkopfammer sich ganz ruhig greifen ließ, meinte ich im ersten Augenblick, ich hätte es mit einem Kranken zu tun, weil ich nicht mit der Tatsache rechnete, daß gerade die Ammern, wenn sie erst einmal kirre geworden sind, nicht mehr jene Scheu vor der Menschenhand haben, die den meisten anderen Vögeln eigen ist; sind doch auch bei mir fast alle zahmen Vögel, die sich streicheln ließen, Ammern gewesen.

An seiner Statt wanderte ein Dominikanerkardinal in den betreffenden Flugkäfig. Wer weiß, wie lange der sich in ihm verträglich zeigen wird? —

Dann setzte ich meine Bemühungen, die Käfigzahl zu verringern, weiter fort. Der nächste Erfolg war der, daß ich einen neu erworbenen Kreuzschnabel — zu Einzelhaft verurteilte. Der Fichtenpapagei saß beständig in einer Käfigecke dicht unter der Decke des Bauers und griff jedem Genossen, der ebenfalls dorthin wollte, herzhaft ins Nackengefieder. Die übrigen schienen daraus schon die richtige Nutzanwendung gezogen zu haben, nur ein diesjähriger Grünling war durch Schaden noch nicht klug geworden, wie sein kahler Rücken mir allzu deutlich zeigte.

Wo soll ich nun aber jene beiden Stieglitze unterbringen? Die Vögel haben langsam gemausert und sind hinsichtlich der Gesundheit wohl unsichere Kantonisten. Sie sehen zwar ganz gut aus, haben aber, wie das Volk sagt, keinen rechten Mumm in den Knochen. Setze ich sie in ein Flugbauer, so kann ich wohl sicher sein, daß sie nach acht Tagen trauern. Dann müssen sie wieder in den Einzelkäfig wandern, nur mit dem Unterschied, daß sie mittlerweile ein gut Teil Lebenskraft verausgabt haben, während ich sie so durch Ruhe, gutes Futter und — Sonnenschein ein Stück vorwärtsbringen kann. Also die bleiben auch im Einzelbauer.

Nun zu den Bergfinken! Ihrer drei sind's: drei Vögel, drei Bauer. Noch vor drei Wochen steckte jener in einem Flugkäfig, aber da hatten die Buchfinken darin ganz kahlgerupfte Rücken; nun, da er allein sitzt, sind sie ganz glatt und schmuck geworden. Für die beiden anderen mußte ich einen Käfig durch eine Pappwand teilen. Mitunter verschiebt sich die, und die Tiere kommen zusammen. Das höre ich gleich, denn der schlankere Fink bekommt dann den anderen sofort an den Kragen. Das geht so nicht weiter; ein Bergfink wird verschenkt.

Doch weiter in der Arbeit! Star, Braunelle, Rotkehlchen, Weißwangenlerch emüssen sowieso allein bleiben. Mit dem Vereinfachen ist's halt eine böse Sache! Und jener Dompfaff? — Gott sei dank, daß er wieder menschlich — Verzeihung: dompfäffisch aussieht. Setze ich ihn in den Flugkäfig, so hockt er ganz gewiß morgen früh mit ausgeschlagenen Schwungfedern und blutendem Federbett auf dem Boden und denkt darüber nach, wie schön doch die so seltenen Tage sind, an denen er wirklich einmal alle Federn beisammen hat.

Und jenes Weißkehlpfäffchen? —. Nun, an zwei verfehlten Versuchen will ich es mir genügen lassen. Das ist auch kein Vogel für den Flugkäfig — ich meine nicht die Art, sondern dieses, mein Pfäffchen —, kommt das in einen lebhaften Verein, so ist es wie

dumm und abgeblendet, so frisch und sangeslustig und vernünftig es auch im Einzelkäfig sein mag.

Aber jene Jungstieglitze? — Ja, gewiß, das sind schöne, sangesfrohe Vögel, doch ich fürchte, kommen sie in den Flug, so sind sie es die längste Zeit gewesen. Nein, lieber Freund, da will ich es doch lieber beim alten lassen. Und im Grunde genommen, darf ich mit der „Vereinfachung" der Käfigwirtschaft ja auch ganz zufrieden sein: es ist nur ein Bauer mehr geworden.

Besonders scherzhaft war es bei dem heurigen Umzug, zwei Wellensittichmännchen und einen Safranfinken einzufangen, die sich seit Monaten in dem kapellenartig hohen Bodenraum voller Freiheit erfreut hatten. Gefangen werden mußten sie aber, denn die Dachdecker sollten die Pfannen aufreißen, um ein paar schadhafte Stellen zu entdecken, durch die es hindurchregnete.

So fegte ich denn fein säuberlich alles verstreute Futter auf und bot den freifliegenden Vögeln Wasser und Nahrung in einem kleinen Käfig, dessen offene Tür mir zugewandt war. Es dauerte etwa eine halbe Stunde, dann saßen die drei kleinen Schelme an dem Bauer und besahen sich abwechselnd das Futter und ihren Pflegeherrn, wobei man deutlich sehen konnte, wie der Hunger und der Fluchtreflex in ihnen stritt. Hierauf begannen die beiden Wellensittiche um den Käfig herumzulaufen, wobei sie sich dicht an die Gitterwände hielten und nur um die offene Tür einen weiten Bogen machten. Der Safranfink saß still und sah zu. Dann gewann in dem einen Sittich der Hunger den Sieg über den Fluchtreflex. Geradewegs trippelte er durch die Tür und fraß. Da erklärte auch der zweite sich für besiegt, und wie sie in der Wollust des Mahles schwelgten, nahm ich den langen Besen, den ich in der Hand hatte und versperrte mit den Borsten den Ausgang.

Aber der schwerere Teil der Aufgabe stand mir noch bevor. Denn der Safranfink ging wohl schließlich in den Bauer, behielt aber stets die Tür im Auge und war im Handumdrehen draußen, sobald ich mich nur im geringsten rührte. Selbst als ich einen anderen Käfig herbeiholte und dessen Falltür durch ein an einen Zwirnsfaden gebundenes Hölzchen stützte, kam ich vorläufig nicht zum Ziel. Ehe die Tür zufiel, war der schlaue Kerl schon draußen, obgleich sich das Spiel wohl zehnmal wiederholte, weil der Hunger ihn wieder und wieder in den Bauer trieb. Schließlich wurde mir das Haschespiel über und ich holte meinen Jungen herbei, dem ich für den Fang des Vogels einen halben Danziger Gulden versprach. Vermutlich hatte mein Sohn eine bessere Leitung zwischen Auge, Hirn und Hand, denn schon nach zehn Minuten brachte er mir den Safranfink an. Der aber saß so verdutzt auf der Sprosse, als wenn er sagen wollte: „Und zu solchen Kerlen soll man nun Vertrauen haben!" Damit war die letzte Hand an den Umzug gelegt; bis zum April habe ich vor diesen Freuden Ruh'. Gott sei's gedankt!

Das Liebhaberjahr.

Plauderei von J. Birk, Leipzig.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Der April ist eigentlich derjenige Monat, auf den der Vogelliebhaber mit Sehnsucht gewartet hat, bringt er ihm doch so viel des Neuen, und viele längst gehegte Wünsche gehen ihrer Erfüllung entgegen. Jetzt singt und schlägt alles in der Vogelstube. Mit der vollen Kraft ihrer Stimme wetteifern sie und suchen sich gegenseitig zu übertönen. Das größte Ereignis im Liebhaberjahr, die Ankunft der ersten frischen Ameisenpuppen, wird gegen Ende des Monats zur Tatsache, sind sie auch noch dünn gesät und im Handel noch gar nicht zu haben, so kann es derjenige, der seine Lieblinge mit dieser wirklich unschätzbar wertvollen Delikatesse selbst versorgt, kaum erwarten, bis er die ersten aus dem Walde holen kann, und seien es auch nur zum Notbehelf die großen Ameisenpuppen, die man aber wegen der Gefährdung der Fortpflanzung nicht aus den Haufen rauben soll, weil aus ihnen die großen geflügelten Ameisen, denen die Vermehrung obliegt, hervorkommen. An Frischfängen gelangen in den Handel neben den bereits im März erhältlichen Amseln Singdrosseln, Rot- und Blaukehlchen, Buchfinken, auch Schwarzplättchen, Zaun- und Dorngrasmücken, gegen Ende des Monats auch bereits Nachtigallen. Alle Frischfänge lassen sich mit Mehlwürmern an ein Mischfutter gewöhnen und lassen sich bei reichlicher Beigabe von Mehlwürmern auch bald wieder weiterhin im lauten Gesang hören. Eine Ausnahme davon macht die Nachtigall, die ja meistens erst Anfang Mai in den Käfig kommt. Sie darf an kein Mischfutter gewöhnt werden und muß so lange, bis frische Ameisenpuppen erhältlich sind, mit Mehlwürmern blank gefüttert werden. Sind Ameisenpuppen in genügender Menge erhältlich, so muß sie auch damit blank gefüttert werden, bis sie den Schlag einstellt. Alle Frischfänge bringt man am besten in verhüllte Käfige, um den Vogel erstens zu beruhigen und eher zur Futterannahme zu bewegen, zweitens aber ist dies bei verschiedenen Arten unbedingt nötig, da sie sonst nicht in den Gesang kommen, wie Sprosser, Nachtigall, Sumpfrohrsänger, Gelbspötter. Sie müssen unbedingt verhängt bleiben, bis sie abgesungen haben. Rotkehlchen, Blaukehlchen, auch die Grasmückenarten sowie die Drosseln können, wenn sie an das Futter gehen, nach und nach wieder enthüllt werden, und singen auch weiter, doch halte ich auch bei diesen Arten, besonders den Grasmücken, eine weitere Umhüllung des Käfigs für dienlich, vorausgesetzt, daß sie sich stürmisch benehmen. Jetzt ist es auch wieder eine Lust zu leben für den Liebhaber, der gerne Veränderung liebt, nun wird wieder ausgewechselt, überwinterte, schlecht im Aussehen befindliche Vögel werden abgeschafft oder, was ganz und gar verwerflich ist, sie werden der Natur zurückgegeben. Dafür werden wieder aalglatte Frischfänge in die Käfige gesteckt, und der Bestand ist wieder auf der Höhe. Nichts ist falscher als dies, denn nun beginnt die Sache wieder von vorne, niemals kann mir ein Frischfang das bieten, was mir überwinterte Vögel bieten, selbst gesanglich zeigen sich erst im zweiten Jahre viele Vögel in voller Leistung. Besonders Vögel mit Nachahmungstalent bringen noch verschiedenes, noch nie Gehörtes. Wer Vögel nach längerer Käfigung in die Freiheit setzt, begeht eine Grausamkeit, wenn sich dieselben nicht im vollen Besitze ihres Flugvermögens befinden und nicht zu einer ganz

günstigen, trockenen Zeit ausgesetzt werden. Meistens werden derartige hilflose Geschöpfe eine Beute von Raubzeug, oder falls sie dem Existenzkampf in der Natur zu sehr entfremdet sind, gehen sie eines elenden Hungertodes zugrunde. Vogelliebhaber, hast du diese freien Geschöpfe der Natur geraubt, hast sie hilflos und von dir abhängig gemacht, so ist es auch deine Pflicht, sie unter deiner Obhut zu behalten oder einem anderen Gleichgesinnten anzuvertrauen. Nur vollständig gesunde, vollkommen flugfähige Vögel dürfen zur geeigneten Zeit ins Freie gelassen werden und auch dann nur an Stellen, wo sie schützendes Gebüsch und die ihnen zusagende Nahrung finden. Ein wirklich wahrer Vogelliebhaber liebt nicht allein den Gesang, nicht bloß die Art, sondern ihm ist das Individuum in seiner Lebensäußerung lieb und wert. Er hängt nicht bloß an dem, was seine Augen sehen, seine Ohren hören, nein, er fühlt auch, was dieser oder jener kleine Vogelknirps für seelische Empfindungen in ihm ausgelöst hat. Der Vogel, als ein lebendiges Geschöpf der Natur, soll auch als solches betrachtet und behandelt werden und nicht, wie es leider bei vielen Vogelhaltern der Fall ist, in launenhafter Sucht nach Neuem, wie eine sonstige verbrauchte Handelsware beiseite gelegt werden. Darum muß es für jeden Vogelliebhaber Ehrgeiz und Ansporn sein, die ihm anvertrauten Lebewesen so gut und so lange als möglich sich zu erhalten.

Der Mai, wem ginge nicht schon bei dem Gedanken an diese herrliche Zeit des Liebhaberjahres ein freudiges Sehnen durch die Brust, ist für den Liebhaber, der nicht nur eine nüchterne Stubenvogelhaltung betreibt, derjenige Monat, wo Fenster und Herzen offen sein sollen, um zu schöpfen mit vollen Händen, was die Natur in verschwenderischer Fülle auf uns eindringen läßt. Er bringt uns die letzten Sänger, wie Gartengrasmücke, Pirol, rotrückigen Würger, ebenso auch die Nachzügler von den Ende April eingetroffenen Arten. Mögen zu Hause die gefiederten Sänger ihr bestes Können zeigen, sie verblassen vor dem, was uns in der Natur entgegenschallt, jetzt muß sich der Vogelfreund alle die schönen Stunden im Herzen aufspeichern, um im Winter beim Gesang seiner gefiederten Stubengenossen davon zu zehren und zu träumen, vom ewigen Frühling, vom schönen Monat Mai. Alle bis jetzt noch fehlenden Frischfänge, wie Sprosser, Nachtigall, Garten- und Sperbergrasmücke, Gelbspötter, rotrückiger Würger und Sumpfrohrsänger, sind erhältlich, welche, recht-



Kalanderlerche.

zeitig vor erfolgter Paarung gekäfigt, bei Blankfütterung mit frischen Ameisenpuppen im vollen Feuer weitersingen. Auch die überwinterten Sänger singen nun in höchster Vollendung, ebenso vollenden die in der Mauser eventuell zurückgebliebenen Vögel bei Blankfütterung mit frischen Puppen dieselbe noch. Jetzt ist die Zeit, wo der Vogelliebhaber wieder sorgenlos leben, wo er seine eventuell aus dem Kurs gekommenen Vögel wieder in Ordnung bringen kann durch die für den Vogelpfleger einen wirklichen Segen bedeutenden frischen Ameisenpuppen. Sie sowie die frische Beerenfütterung im Herbst bedeuten für die Vögel eine wirkliche Arznei zu einer Blutreinigungskur. Wer es nicht mit sicherer Regelmäßigkeit bewerkstelligen kann, daß er laufend mit frischen Ameisenpuppen versorgt ist, lasse sich ja nicht verleiten, seine an Mischfutter gewöhnten überwinterten Vögel blank einzufüttern, denn es können für ihn schlimme Tage kommen. Ja, es ist nicht falsch, seine überwinterten Vögel überhaupt, solange sie im Gesange sind, nicht

blank zu füttern, sondern nur Mischfutter unter Beigabe von frischen Puppen zu reichen, denn der Erfolg ist bedeutend größer so, als blank füttern mit zeitweiser, notgedrungener Unterbrechung. Erst nachdem die Vögel den Gesang eingestellt haben und vor der Mauser stehen, erst dann plötzlich blank gefüttert, das bringt sie in einen glatten schnellen Federwechsel. Beim Darbieten der ersten frischen Puppen an überwinterte Vögel sei man ganz vorsichtig und beginne mit nur einigen Puppen, und dann langsam nach und nach steigernd, bis sie blank eingefüttert sind, denn anstatt daß man seine Vögel durch die frischen Puppen zur höchsten Gesangsvollendung bringt, treibt man sie in eine anormale Mauser, ein Fehler, der längere Zeit in Anspruch nimmt, um wiedergutgemacht zu werden, außerdem ist es auch für diesen Sommer mit dem Gesang vorbei. Sehr empfindlich gegen eine zu plötzliche reichliche Darbietung von frischen Puppen sind überwinterte Sprosser, Nachtigall und Rotkehlchen, sie antworten meistens mit einer Mauser. Wer in dem Bedarf an Ameisenpuppen „Selbstversorger" ist, beginne bereits im Mai, wo die Ernte anfängt ergiebig zu werden, mit der Abtrocknung des Wintervorrates.

(Schluß folgt.)

Mexikaner bei Lenger.

Von Rudolf Neunzig.

(Nachdruck verboten.)

Am Anfang der vergangenen Woche ist es der rührigen Firma Lenger gelungen, durch Fockelmann einen größeren Transport aus Mexiko zu erhalten. Im Gegensatz zu den bisherigen Transporten während der Nachkriegszeit aus der Neuen Welt zeichnet er sich durch große Mannigfaltigkeit an Arten und durch das Vorhandensein verschiedener Seltenheiten und einiger Neueinführungen aus. Er besteht aus 600 Vögeln, darunter 400 insektenfressende Vogelarten.

Unter den Seltenheiten des Transportes fallen zwei Vertreter der Zwergdrosseln auf. Die Swainsondrossel — T. ustulatus swainsonii *Cab.* (s. Abb. S. 577) eignet sich zur Unterbringung in Volieren und Vogelstuben, in denen ihre Lebhaftigkeit und Beweglichkeit, aber auch ihr angenehmer Gesang voll zur Geltung kommen. Die sehr selten eingeführte Zwergdrossel — T. guttatus nanus *Aud.*, über deren Gefangenleben keine Mitteilungen vorliegen, ist schon aus diesem Grunde für die Käfigung zu empfehlen. Größer als die beiden angeführten Zwergdrosseln ist die Trauerdrossel — T. tristis, die im Jahre 1911 von Fockelmann das erstemal eingeführt wurde. Das von mir gekäfigte Exemplar hatte im Gegensatz zu den begeisterten Schilderungen des Herrn Lauer keinen besonders anziehenden Gesang. Hier wird eben die individuelle Veranlagung des einzelnen Vogels recht verschieden sein, ähnlich wie wir es bei unseren heimischen Arten finden.

Aus der Gruppe der Spottdrosseln ist nach Verlauf von 14 Jahren wiederum der Krummschnabelspötter — Toxostoma curvirostre *(Sw.)* (s. Abb. S. 581) eingeführt worden, dessen Gesang vorzüglich sein soll und über dessen Gefangenleben ebenfalls nichts berichtet worden ist. Die Spottdrossel und auch der Blauspötter fehlen als wohlbekannte Gestalten dem Transport nicht.

Besonders auffallend ist eine Anzahl schöner und zahmer Klarinos (s. Abb. S. 580), die bereits wiederholt nach Deutschland gelangt sind. Dr. O. Heinroth berichtet in der „Gef. Welt" 1909 folgendes über den Gesang des Klarino: „Hört man den Klarinogesang oft ..., so imponiert die merkwürdig kraftvolle „Instrumentalmusik" doch ganz gewaltig; ich finde, der Vogel stellt dann viele unserer sogenannten guten Sänger recht in den Schatten. Noch einen großen Vorzug hat das Lied: es paßt in jede Vogelstube. Man hört ihn unter allen anderen Singvögeln sofort heraus, und andererseits kommen während der verhältnismäßig langen Pausen zwischen den einzelnen Strophen auch die anderen Sänger zur Geltung. Der Klarino singt sehr fleißig." Die Züchtung des Klarino ist bereits einmal gelungen. Unter den Klarinos befinden sich mehrere Exemplare des Braunrückenklarino — Myadestes obscurus *Lafr.*, der das Hochland von Ostmexiko bewohnt und selten eingeführt worden ist. Aus der Familie der Schnäpper ist neben dem Zedernvogel der mexikanische Grauschnäpper — Ptilogonys cinereus *(Sw.)* in mehreren Stücken vorhanden, der zuerst im Jahre 1908, später 1911 und 1913 eingeführt wurde. Sie fressen Weichfutter und besonders gern Ebereschenbeeren. In der Vogelstube sind sie harmlos, verträglich, beweglich und gewandte Flieger.

Als Neueinführung ist besonders ein Mitglied der Familie der Naschvögel zu erwähnen, das als erstes seiner Sippschaft nach Deutschland gelangte. Das kleine Vögelchen heißt mexikanischer Naschvogel — Coereba mexicana. Die Amerikaner nennen ihn, anscheinend wegen seiner Vorliebe für Bananen, „Bananaquit". Eine ausführliche Besprechung folgt in der Artikelserie „Neueinführungen und Seltenheiten" vom Herausgeber der Zeitschrift.

Die durch ihre Farbenpracht sich auszeichnenden Tangaren sind in drei Arten vertreten, unter ihnen der violettblaue Organist, die schöne Dreifarbentangare und die selten nach Europa gekommene blutrote Tangare — Pyranga bidentata sanguinolenta *(Lafr.)*, deren Verbreitung sich über das östliche Mexiko und Mittelamerika erstreckt. Kopf, Hals und Unterseite dieser Tangare sind orange- oder scharlachrot gefärbt, die übrige Oberseite ist braunrot, Schwanz dunkelbraun mit olivfarbenen Säumen, die mittleren und großen Flügeldeckfedern haben breite, rötlichweiße oder weiße Spitzen.

Die den Tangaren nahestehenden Ammerhabias sind in zwei Arten vertreten, von denen der Braunkopfammerhabia — Buarremon brunneinucha *(Lafr.)* bereits einmal im Jahre 1911 in den Berliner Zoologischen Garten gelangte, während die andere Art, der mexikanische Ammerhabia — B. virenticeps, das erstemal nach Deutschland gelangte. Über das Gefangenleben des Braunkopfammerhabia liegen keine Berichte vor, er soll in seinem Wesen und Benehmen den Angehörigen der Gattung Habia ähnlich sein. Der Braunkopfammerhabia ist auf Seite 169 des laufenden Jahrganges bildlich dargestellt.

Von weiteren Charaktervögeln der neotropischen Zone sind drei Arten der Trupiale zu erwähnen, die bereits einige Male nach Deutschland gelangt sind, aber keineswegs zu den häufig eingeführten Arten gehören. Durch seine Kleinheit und Zierlichkeit fällt der Gartentrupial auf, durch seine Schönheit der Gefiederfärbung der Goldstirntrupial (s. Abb. S. 582), durch schlanke Gestalt und den dünnen, mittellangen Schnabel der ebenfalls schön gefärbte Wagler-Trupial. Die vorhandenen Exemplare dieses Trupial weichen in der Gefiederfärbung etwas von den Beschreibungen dieser Art ab, indem sie durch die gelb gefärbten Unterschwanzdecken an den Lesson-Trupial erinnern, sonst mit den anderen übereinstimmen. Anscheinend handelt es sich hier um Übergänge beider Formen, die als zeographische Vertreter aufzufassen sind. Waglers Trupial bewohnt das nördliche Mexiko bis Guatemala, Lessons Trupial das südliche Mexiko, durch Mittelamerika bis zur Landenge von Panama. Die den Stärlingen nahestehenden Kassiken sind durch die selten eingeführte Gelbbürzelkassike — Cassicus persicus *(L.)* vertreten.

Aus der großen Familie der finkenartigen Vögel sind die roten Kardinäle, die Papst- und Orangeblaufinken, die Karmingimpel und Falkenschnabelpfäffchen, die schönen Lerchenfinken und Grundrötel — Pipilo maculatus *Sw.* zu erwähnen. Die letzteren sind sehr selten nach Deutschland gekommen und gehören zu den schönsten Finkenvögeln, die sich durch auffallend kleinen Schnabel und verhältnismäßig langen Schwanz auszeichnen. Sie sind für Volieren und Vogelstuben geeignet und sollen auch gegen geringe Wärmegrade nicht empfindlich sein. In ihrem Äußeren erinnern sie an die Schamadrossel. Im Gegensatz zu den Bälgen des Berliner Museums zeichnen sich die eingeführten Vögel durch drei kleine weiße Flecke an der Stirn aus, ähnlich wie sie beim Braunkopfhabia vorhanden sind.

Zum Schluß seien noch zwei schön gefärbte Vertreter der Rabenvögel erwähnt: der Diademhäher und der Yukatanblaurabe, von denen der erstere selten nach Deutschland gelangte.

Swainsons Drossel.

Die Orpheusgrasmücke als Käfigvogel.

Von Erich Merz.

(Nachdruck verboten.)

Die Orpheus-, auch Sängergrasmücke genannt, ist unter den gekäfigten Vögeln der Liebhaber eine Erscheinung, die im Laufe der Jahre immer mehr zur Seltenheit geworden ist. Die Anschaffung war in den glücklichen Zeiten vor dem Kriege schon teuer, denn ein guter Vogel kostete etwa M. 9.—, doch heute wird das Vierfache dafür verlangt. Vor dem Kriege käfigte ich zwei Orpheus. Schon damals erweckte sie mein Interesse, da sie unter den Grasmücken einen besonderen Platz einnimmt. Ihre Heimat ist das südliche Europa und ihr Lieblingsaufenthalt sind dichte Laubwaldungen, wo sie sich in den Kronen der Bäume herumtummelt. — Es sind alle Grasmückenarten ausgesprochene Zugvögel, und haben wir ein beerenreiches Jahr, so reicht die Zugzeit oft bis in die Herbstmonate hinein. Eigenartig ist es nun, daß auch die Orpheus Südeuropa verlassen und bis in das Innere Afrikas vordringen. Die Orpheusgrasmücke aus Spanien soll bis zur Westküste Afrikas ziehen.

Wie es bei so vielen Vögeln anderer Gattungen Tatsache ist, daß nicht jeder Vogel gleich groß und gleich in der Farbe ist, so traf dieses auch bei meinen beiden Orpheus zu. Herkunft, Alter spielen dabei eine große Rolle. Es sind z. B. die Orpheus aus den Balkanländern andere wie die aus Spanien und Südfrankreich. Als Nahrung dienen ihr wie allen ihren Verwandten neben Insekten auch Früchte und Beeren. Deshalb verabreiche man ihr in der Gefangenschaft außer dem üblichen Mischfutter dasjenige an Beeren und Obst, was die Jahreszeit gerade bringt. Im Winter gab ich vorher in Wasser angequellte Korinthen, die sie gerne nimmt. Feigen und Datteln frißt sie zwar auch sehr gern, doch würde ich solche, wenn keine frischen zur Hand sind, etwas anquellen und am Käfiggitter befestigen. Zerschneidet man Datteln und Feigen und mischt diese unter das Mischfutter, klebt alles zusammen. Der Vogel klopft das Futter ab und es geht viel verloren. Mit der Einfütterung wird man meistens keine Schwierigkeiten haben, da die meisten Orpheus erst auf den Markt kommen, wenn sie einigermaßen futterfest sind. Da die Orpheusgrasmücke zu den im Winter vermausernden Vögeln gehört — die Mauser fällt in die Monate Januar, Februar —, so ist es ratsam, ihr so lange wie möglich, wenn nicht blank, so doch wenigstens bis zur Hälfte des Futters frische Ameisenpuppen zukommen zu

lassen. Bei richtiger Pflege und normaler Körperbeschaffenheit des Vogels wird die Mauser auch glatt vor sich gehen. Es gehört dazu, daß die Mauser sich nicht nur auf das Kleingefieder erstreckt, sondern daß die großen Federn in Trieb kommen und die alten abgeworfen werden. Wichtig ist es, die Orpheus während des Verlaufs der Mauser vor Zugluft zu schützen. Sollte sie etwa Anfang März keine Anzeichen für eine Mauser zeigen, so möchte ich ausnahmsweise bei diesem Vogel raten, in vorsichtiger Weise allmählich die Schwung- und Schwanzfedern auszuziehen. Es wird dann bald, wenn auch nicht gleich, die Mauser des Kleingefieders eintreten. Im allgemeinen greift kein Liebhaber gerne zu dieser Nachhilfe. Der künstliche Eingriff rechtfertigt sich von dem Gedanken aus, daß der Vogel bei unvollkommener Mauser eingehen würde. Bei meinen beiden Orpheus vollzog sich die Mauser glatt. Die Fälle, wo die Mauser ausbleibt oder nur teilweise eintritt, sind im allgemeinen vereinzelt. Wie verhält es sich nun mit dem Gesang? Sowohl von Liebhabern wie auch von Vogelhändlern hört man sehr oft, daß der Gesang der Orpheus nicht so hoch einzuschätzen sei, wie in den Büchern Loblieder darüber gesungen werden. Gewiß wird mancher ein derartiges Urteil über den Gesang gefällt haben, weil er keinen guten Sänger besaß. Auch von meinen beiden Orpheus ließ der erste Vogel mich erst mal lange auf Gesang warten, und was er dann vortrug, erfüllte die auf ihn gesetzten Hoffnungen nicht. Er war sicher ein junger Vogel, der frühzeitig in Gefangenschaft geraten war und dem kein geübter alter Herr aus seiner Meistersingergilde ein Preislied vorgesungen hatte. Wohl nimmt eine junge Orpheus, die kein guter Sänger ist, von dem Gesange der übrigen Käfigvögel an und wird im Laufe der Jahre besser, doch das Charakteristische des richtigen Orpheusgesanges wird sie nie bringen. Trotzdem war es ein schmucker Vogel, in seinen Bewegungen wie ein Granatpfeil. Die zweite Orpheus war kleiner, in Farben schärfer ausgeprägt und ein wirklicher Sänger, der seinem Namen alle Ehre machte. Woraus besteht nun dieser Gesang? Wollte man denselben in einzelne Strophen zerlegen, so geht dieses nicht. Wenn die Orpheus in ihrem Gesang die Gartengrasmücke nachahmt, das macht sie wohl am meisten, dem Gelbspötter oder einer Drosselart etwas ablauscht, hin und wieder aus dem Gesang ihrer sonstigen gefiederten Freunde etwas stiehlt, so macht sie sich dies alles für ihre Kehle zurecht. Doch das Hauptmerkmal beim Gesange eines älteren Wildfangs ist die langsame und deutliche Vortragsweise. Jeder wird einen solchen Gesang lieben und zumal, wenn jeder Ton so deutlich erklingt. An und für sich betrachtet, hat der Gesang der Orpheusgrasmücken auch seine Merkmale und steht, einheitlich betrachtet, gesondert da, genau so, wie andere Vogelarten den ihnen eigentümlichen Gesang aufweisen. Herrlich wäre es, wenn es einem vergönnt wäre, Orpheusgrasmücken in der Natur beobachten zu können und ihren Liedern zu lauschen. Doch dürfte dieser Wunsch sich in den wenigsten Fällen erfüllen. In aller Kürze wird eine abgehörte Orpheus nach langer Zeit wieder zu meinen Pfleglingen zählen, und wer es kann, folge meinem Beispiel. Gewiß ist es gewagt, den Gesang aller Orpheus als ganz hervorragend anzusprechen. Hatte jemand einen schlechten Sänger, ist ein abfälliges Urteil über den Gesang der Orpheusgrasmücke erklärlich. Der Gesang einer guten Orpheus bleibt ein Genuß, darum verachtet mir die Meistersänger nicht und ehrt mir ihre Zunft.

Anfangsgründe und Grundrisse zur Weiterentwicklung in der Ausbildung des Kanariengesanges.

Vortrag, gehalten von Paul Holzky, Cöthen i. A.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Solange wir nicht für die Heranbildung neuer, tüchtiger Kräfte, namentlich gewissenhafter und ehrenhafter Gesangskenner, und das sind die Preisrichter, sorgen, können wir nicht vorwärtskommen. Der heutige Stand der Kanarienzucht verlangt es unbedingt, daß wieder einmal frische Kräfte erscheinen. Eine Vermehrung von Halbkennern und Stümpern ins Unendliche kann uns nichts nützen. Hauptsache muß uns die Veredelung des Gesanges und der Kanarienzucht sein.

Unter den Züchtern sind doch gewiß einige, die ein besonderes Interesse an der Ausbildung für den Gesang an den Tag legen. Wer sich mit der Zeit die Erfahrungen zu eigen gemacht und diese in die Tat umgesetzt hat durch Selbstzucht guter Vögel und diese zur Ausstellung gebracht hat, dem ist die beste Gelegenheit gegeben, sich einer Preisrichtervereinigung anzuschließen. Hier kann er seine weitere Ausbildung in den Vereinssitzungen bereichern, bis er sich fähig fühlt, das Preisrichterexamen abzulegen. Aller Anfang ist schwer. Aber durch Unterstützung älterer Preisrichter, die mit amtieren, wird er nach und nach seine Selbständigkeit erlangen.

Bevor ich nun zur eigentlichen Tourenerläuterung komme, wäre noch zweierlei zu besprechen, was unmittelbar mit dem Gesange zusammenhängt. 1. Was bewegt den Hahn zum Singen? 2. Der Stimmapparat, der dem Hahn dieses eigentümliche Gesangsgepräge gibt. — Es würde heute zu weit führen, erschöpfend über dieses Thema zu reden.

Wie ich schon sagte, soll es jeder Züchter sich angelegen sein lassen, zuerst die guten Touren kennenzulernen. So fangen wir mit der Hohlrolle an. Die Grundtouren der Hohlrolle sind die Vokale i, ü, u und o. Des öfteren werden auch die Vokale ö und a angeführt. Als reine Grundtöne kann man diese wohl kaum anerkennen. Wer aufmerksam auf den Gesang achtet, wird beobachten, daß der Schnabel, sobald der Vogel eine vollkommen erhabene tiefe Hohlrolle singt, wo die Vokale i, ü, u und o zur vollen Geltung kommen, fest geschlossen ist. Während eine Hohlrolle, in welcher die Vokale ö und a vorkommen, stets mit mehr oder weniger geöffnetem Schnabel gesungen wird. Die Hohlrollen auf ö und a, welche in höherer Lage gehen, haben alle einen Anflug zur Nasenhohlrolle. Ich glaube kaum, daß jemand eine Nasenhohlrolle, selbst wenn diese mit dem Vokal ö gebracht wird, obschon sie, wenn weich vorgetragen, ganz schön

klingen kann, wirklich schön findet. Bei einer tiefen Hohlrolle, wo die Vokale ü und u brillieren, kann man so recht sehen, wie sich Hals und Kehle anstrengen und aufblasen und den inneren Hohlraum des Halses fast zu einer Halbkugel aufblähen. Nur durch diese Anstrengung erhalten die Grundtöne ü und u ihre volle, dumpfe und hohle Klangfärbung. Ganz anders dagegen, wenn die Vokale ö und a vom Vogel gebracht werden. Die Klangfärbung wird ganz wesentlich geschwächt durch das mehr oder wenigere Öffnen des Schnabels. Wenn der Vogel seinen Schnabel auch nur eine Kleinigkeit öffnet, so kommt das Nasale sofort zum Vorschein. Wie bereits gesagt, haben wir es mit der Nasenhohlrolle zu tun. Von verschiedenen Seiten hört oder liest man wohl, der Vogel bringt die Hohlrolle belegt, oder der Vogel geht heiser. Um hier einer Verwechslung vorzubeugen, kann ich nur anführen: Ein heiserer Vogel singt die tiefen Hohlrollen, wie oben beschrieben, stets mit geschlossenem Schnabel, während die näselnden Hohlrollen mit fast geöffnetem Schnabel gesungen werden. Also das Nasale und Heisere ist wohl leicht zu unterscheiden. Werden nun die Grundtöne oder die Vokale i, ü und u recht lange zum Vortrag gebracht, wenn also der Vogel das i, ü und u recht lange beim Singen anhält und diese Töne mit einem verschwommenen h verbindet, dann sagt ja schon der Name, daß es eine gezogene Hohlrolle ist. Wie schon erwähnt, wird der aufmerksame Zuhörer an den Grundtönen i, ü, u und o den Geräuschlaut h deutlich wahrnehmen. Der Konsonant h tritt in den Vordergrund und setzt sich den Vokalen i, ü, u und o vor. Das h verbindet sich gewissermaßen mit den Vokalen i, ü, u und o und wir hören deutlich ein hi, hü oder ho singen. Rollt der Vogel in dieser Tour fort und wir hören das h fortlaufend den Vokalen i, ü, u und o angehängt, und wir hören ferner diese Tour in derselben Lage, nur etwas, kaum merklich anschwellend, aber gleich wieder nachgelassen, dann können wir wohl von einer geraden Hohlrolle sprechen. Es ist eine sich lang hinziehende Tonlage, ohne Steigung des Gesanges nach oben, oder ein Fallen, eine Biegung nach unten. Die geraden Hohlrollen hören sich im allgemeinen monoton an, weil sie ohne merkliche Abwechslung in derselben Tonart, wie sie beginnen, fortrollen.

Nun kommt es aber öfter vor, daß hinter dem i, ü und o nochmals ein r verschwommen vom Vogel gebracht wird, dann entsteht ein etwas härterer Ton. Vergleich: der Vogel singt ri, ro, setzt das r dahinter, so daß es jetzt lauten würde: rir, rür, ror. Das r hört sich in diesem Falle, zum Schluß gebracht, hart an. Wir haben es auch hier, wie es der Name sagt, mit einer harten Hohlrolle zu tun.

Was gibt es denn nur alles für Abarten von Hohlrollen, wird mancher fragen. Ja, werte Züchter! Ich bin noch nicht zu Ende damit, denn bald hätte ich eine vergessen. Hier spielt die Zunge des Vogels hauptsächlich mit. Das b ist mehr zu hören als das l in verschärfter Form, das l abwechselnd mit bl. Hierdurch klingt der Gesang wässerig und wir haben es mit einer Wasserhohlrolle zu tun. Vögel mit Wasserrolle sind sehr angenehme Sänger und werden auch sehr gern gekauft. Über Wasserrolle habe ich erst in der Fachpresse kürzlich ausführlich geschrieben und meine Ausführungen dürften manchen bekannt sein. Zu erwähnen wäre noch die sogenannte Heulrolle oder Wirrolle; diese Ausdrücke hörte man früher in Harzer Stämmen. Ich komme jetzt zur allerschönsten Tour im Kanarienliede, und das ist die gebogene Hohlrolle, die wertvollste aller Hohlrollen, sie weicht von der Tonart ab, biegt nach unten oder oben, das heißt, der Vogel rollt höher oder tiefer. Das wäre die einfachste Erklärung und am meisten verständliche Auffassung für diese Tour. Mit dieser einfachen Erklärung werden manche Züchter wohl nicht zufrieden sein, und so will ich versuchen, auch diese Hohlrolle nebst Anhang besser zu präzisieren.

Da der Spielraum innerhalb des tonlichen Bezirks dieser Hohlrolle mindestens dreimal größer ist als in jeder anderen Tour, so erreicht der wirkliche

Orpheusgrasmücke.

Primaner in dieser Strophe auch seine Hauptfertigkeit. Der Vogel biegt diese Rolle in verschiedenen Tonlagen ab- und aufwärts, wiederholt die Tour häufig in verschiedener veränderter Lage, übersetzt die Hohlrolle, also eine übersetzte Hohlrolle genannt, so daß sie im Gange des Vortrages sich öfters wiederholen kann. Die Vokale sind i und ü, seltener dagegen o und u. Am vollsten und tiefsten lautet diese Strophe auf u. Biegt der Vogel verschiedene Male, und zwar unmittelbar hintereinander, so entsteht als höchste Leistung der Hohlrolle die gebogene Hohlrolle. Wenn die Biegungen nach abwärts stattfinden, so entsteht ein wehmütiges Klagen. Diese Tour hat etwas wahrhaft Bestechendes an sich, indem die Vögel in Moll übergehen. Ein weiteres Beispiel, meine Herren, von dieser so zu Herzen gehenden Tour, welche durch das Großartige ihres Wesens sich in das Gemüt des Zuhörers eingräbt. Der Vogel setzt eine Hohlrolle auf i an, übersetzt diese Tour mit einem h auf ü. Das ü liegt tiefer und es entsteht gewissermaßen ein Bogen nach unten. Setzt der Vogel die Hohlrolle mit einem ü ein, zieht das h mehr nach dem i hinüber, das i liegt höher, so haben wir es mit einer Hohlrolle nach oben zu tun, während das erstere eine Hohlrolle nach unten genannt wird. Wie erwähnt, wiederholen sich diese Bogengänge, denn anders kann man es wohl nicht nennen. In keiner anderen Tour vermag sich diese kolossale Stimmbegabung eines Vogels durch seine Fähigkeit zum Modulieren besser im hellsten Lichte darzustellen als in dieser gebogenen Hohlrolle. Nun kommt es auch vor, daß der Vogel mit einem i einsetzt, dann einen oder mehrere Töne tiefergeht, so daß er auf ü oder u kommt, dann sagt man: Der Vogel fällt im Gesang. In diesem Falle ist es eine fallende Hohlrolle. Im Gegensatz. Der Vogel fängt mit einem u oder ü an, geht dann verschiedene Tonlagen höher bis zum i, dann sagt man: Der Vogel steigt. Also eine steigende Hohlrolle. Sie sehen also, in welch großartiger Modulation sich der Vogel in der Hohlrolle bewegen kann. Daß eine Hohlrolle möglichst tief liegen muß, ist wohl selbstverständlich, denn in hoher Lage ist sie ohne besondere Bedeutung.

Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten.

Von J. Kuntzendorff, Berlin.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Die Eingewöhnung der Purpurtangare bietet gewöhnlich keine großen Schwierigkeiten; an ein mit kleingeschnittenem, saftigem, süßem Obst durchsetztes Universalfutter gehen sie im allgemeinen ohne großes Zaudern. Vorteilhaft ist es, wenn man demselben noch eine Portion Eierbiskuit zusetzt. Nach der Eingewöhnung halte ich es für praktisch, das Obst ihnen getrennt vom anderen Futter zu geben. Doch läßt sich solches nicht immer bewerkstelligen, da man auf die anderen Insassen des Flugraums Rücksicht nehmen muß. Wenn daher zartere Fruchtfresser sich noch im gleichen Abteil befinden, wird man neben der getrennten, reinen Fruchtfütterung und dem reinen Universalfutter doch mit Obst durchsetztes und mit Eierbiskuit vermengtes Universalfutter reichen müssen. Für die Purpurtangare selbst aber ist solches nicht unbedingt notwendig.

Sie ist schon mehrfach mit Erfolg gezüchtet worden und das balzende Männchen beim Liebestanz gewährt ein ganz reizendes Bild. Wie schon erwähnt, war es mir nicht gelungen, für meine derzeitigen Männchen ein Weibchen zu erhalten, was ich um so mehr bedauerte eben wegen der anderweitig schon erzielten Zuchterfolge. Nach Angaben der Reisenden

Klarino (s. S. 576).

und Liebhaber legen die Purpurtangaren blaugrüne Eier, Langheinz berichtet jedoch, daß die Eier rosa mit schwarzen oder sehr dunkelrotbraunen Strichen und Punkten gefärbt wären. Wäre es also nicht auch hier möglich, daß die Tangaren zweierlei gefärbte Eier legten, wie es bei anderen Vögeln vorkommt — ich erinnere nur an Erithacus diplootocus moussieri. Es wäre wirklich lohnend, dieser Frage an Hand der Langheinzschen Beobachtung näherzutreten. Alles in allem ist die Purpurtangare ein Vogel, der seinem Pfleger auf jeden Fall begeistern wird und der allen Liebhabern exotischer Weichfresser sehr zu empfehlen ist.

Von den zu den Tangaren — Tanagra — gehörenden Arten sind von mir fünf verpflegt worden. Die

blaugraue Tangare — Tanagra cana *Sw.*

Angeregt durch die Farbenschönheit der Purpur- und der Dreifarbtangare beschloß ich vor vielen Jahren, mir nach und nach eine kleine Sammlung Tangaren anzulegen. Besonders aus dem Grunde hatte ich mich hierzu entschlossen, weil ich damals mit dem Gedanken umging, ein Vogelhaus bauen zu lassen. War doch die Aussicht, viele dieser herrlichen Vögel in einem großen Flugraum beisammen zu haben, etwas gar zu Verlockendes, wenngleich mir damals von vielen Seiten davon abgeraten wurde, Tangaren gemeinsam in einer Voliere zu käfigen, wegen der allgemein verpönten Unverträglichkeit dieser Vögel. Doch wer nicht wagt, gewinnt auch nicht, und ich freue mich, meinen Vorsatz trotzdem ausgeführt zu haben. Wenngleich die blaugraue Tangare an Farbenpracht den vorhergehenden bei weitem nachsteht, so muß die stille, ruhige Schönheit des Gefieders doch wieder gewürdigt werden. Das Männchen ist an Kopf, Hals, Unterseite hellbläulichgrau gefärbt und erscheint an diesen Körperteilen schwach zart grünlich überflogen; Schultern, Rücken sind dunkler blaugrau, schwach meergrün verwaschen; Bürzel, Oberschwanzdecken leuchtend blaugrau; kleine und mittlere Flügeldecken leuchtend zyanblau, die übrigen Flügelfedern grünlichblau, Schwingen schwarzbraun, außen grünlichblau, die inneren Armschwingen grünlicher und die Handschwingen an der Spitze schwärzlich; Schwanzfedern schwarzbraun, breit grünlichblau gerandet; Auge dunkel gelbgrau, Schnabel schwärzlichgrau, Füße blaugrau. Lg. 146—161, Fl. 84—92, Schw. 59—67 mm. Das Weibchen ist ebenso gefärbt, „die blaue Flügelzeichnung kaum bemerkbar unreiner. Jugendkleid dem Weibchen ähnlich, mit noch weniger durchtretender blauer Zeichnung und mehr einfarbig blaugrau erscheinend." (Eichlam, Die in Guatemala vorkommenden Tangaren, „Gef. Welt" 1901). Die Heimat dieser Tangare ist Südmexiko, Mittelamerika, Venezuela, Kolumbien, Westekuador, Nordwestperu, Trinidad und Tobago. In ihren Lebensgewohnheiten weicht sie im allgemeinen nicht von den übrigen Tangaren ab, sie ist aber sehr scheu, sucht sich den menschlichen Blicken dadurch zu entziehen, daß sie bei Annäherung ins dichte Laubwerk flüchtet. Sie kommt selten auf die Erde herab und bevorzugt sogar zum Trinken durch Laubwerk versteckt gelegene Plätze. Das Nest wird vermutlich nur auf den höchsten Bäumen angelegt, da es schwer auffindbar ist.

Da alle von mir verpflegten, zu Tanagra gehörenden Arten, was ihre Haltung und Verpflegung anbetrifft, im großen und ganzen übereinstimmen, so will ich deren, dieses letztere angehend, gemeinsam Erwähnung tun.

Die meerblaue Tangare — Tanagra sayaca *L.*

Von der vorigen nur unwesentlich unterschieden, ist die meerblaue Tangare, Männchen wie Weibchen, oberseits bläulichaschgrau, dunkler als erstere und der Rücken mehr grünlichgrau schimmernd, und unterseits ebenso, jedoch heller als an der Oberseite; kleine Flügeldecke grünlichblau; Schwingen und Schwanzfedern schwarz, die Federn mit düstermeerblauen Außen- und weißlichen Innensäumen; die Flügel weisen eine gräulich meerblaue Querbinde auf; Schnabel schwärzlichgrau, am Grunde heller, Auge dunkelbraun, Füße bläulich schieferfarben. Lg. 150—170, Fl. 90—95, Schw. 65—67 mm.

Krummschnabelspötter (s. S. 576).

Das Verbreitungsgebiet zieht sich über Ost-, Mittel- und Südwestbrasilien, Uruguay, Paraguay, Argentinien und Bolivia hin. Sie bevorzugt offenes Gelände und die Nähe von Flüssen und Bächen. Zur Brutzeit bevölkert sie auch Plantagen, vorzugsweise Kaffeeanpflanzungen und Gärten, und kommt auch in unmittelbarer Nähe menschlicher Siedlungen und Wohnorte vor. Das Nest wird in Höhenlagen zwischen $1^1/_2$—10 m, durch das Laubwerk der Bäume meist gut versteckt, in den äußersten Zweigen angelegt und besteht aus trockenen Blütenstengeln, die mit Wurzelfasern und Gras sorgfältig verbunden und in welches Geflecht außen Moos, Flechten, Rindenstückchen und Baumwolle fest verwebt sind. Innen ist es mit Binsenblättern fest ausgelegt. Das Gelege besteht aus drei gelblichweißen, dicht, besonders am dicken Ende, gefleckten und gestrichelten Eiern. Es finden jährlich drei Bruten statt. Die meerblaue Tangare, wie auch die nachfolgende Art, behält ihre

schlichtvornehme Gefiederfärbung das ganze Jahr über. Sie ist von allen Tangarenarten die am schlichtesten gefärbte und unterscheidet sich aber trotzdem nicht wesentlich von den übrigen, so daß Verwechslungen häufig vorkommen.

Die Blauflügeltangare — Tanagra cyanoptera *(Vieill.)*.

Dieser auch Blauschultertangare genannte Vogel unterscheidet sich von den erwähnten durch reine blaugrüne Färbung und meergrünlichem Schimmer an der Oberseite. Sie ist zart grünlichblau gefärbt, oberseits dunkler als unterseits, an der Stirn reiner glänzend blau, an Kopfseiten und Kehle mehr blaugrau; Unterseite schwach gräulich grünblau, Bauchmitte weißlicher; kleine Flügeldecken glänzend blau; Schwingen wie Schwanzfedern bräunlich-

Goldstirntrupial (s. S. 577).

schwarz mit schmalem bläulichem Außensaum. Schnabel bleigrau, Auge dunkelbraun, Füße schwärzlichbraun. Lg. 165—195, Fl. 90—105, Schw. 68—89 mm. Das Weibchen ist fahler gefärbt, kleine Flügeldecken mehr grünlichblau, Unterseite hell bläulichgrau, Bauchmitte fast reinweiß. Die Heimat der Blauflügeltangare ist Südbrasilien und Paraguay. Sie belebt das Kamposgebiet und kommt bis an den Fuß der Kordilleren vor. Wie die ihr verwandten Arten bevorzugt sie die Wipfel der Bäume und ernährt sich von saftigen Früchten, Beeren wie auch von weichen Insekten. Zur Brutzeit sieht man sie häufig auch in der Nähe der Ansiedlungen, sie hält sich dann viel in Gärten, vorzugsweise Palmenanpflanzungen auf. Meist wird sie mit der meerblauen Tangare verwechselt, so daß bei Beschreibungen dieser Art vielfach nicht ersichtlich ist, welche von beiden Arten gemeint ist.

Die Schmucktangare — Tanagra ornata *Sparrm.*

Diese Tangare trägt ihren hochtönenden Namen in Hinsicht auf die anderen viel farbenprächtigeren Tanagriden eigentlich zu Unrecht, da jene sie in jeder Hinsicht übertreffen, wenngleich sie unter der Gattung Tanagra die farbenreichste darstellt. Das Männchen ist am Oberkopf lebhaft blau, der übrige Kopf und Hals leuchtend dunkelblau; Zügel schwarz, Oberseite olivgrün, bläulich verwaschen; Kehle, Brust, Körperseiten purpurblau verwaschen, Oberseite olivgrün, bläulich verwaschen; Bauch schwärzlich graublau; Bürzel und Steiß grünlichgrau; Schultern bläulichschwarz; kleine Flügeldecken blau, breit gelb gespitzt; übrige Flügelfedern und Schwanz schwärzlich, außen olivgrün, innen weißlich gesäumt; Unterflügeldecken rahmfarbig; Auge dunkelbraun, Schnabel hornfarbig, Füße dunkelbraungrau. Lg. 172 bis 187, Fl. 95—97, Schw. 73—75 mm. Die Weibchen sind kleiner, matter gefärbt und nur an der Oberbrust purpurblau verwaschen. Verbreitet ist sie über Ost-, Mittel- und Südbrasilien, lebt in den Waldungen z. B. der Umgebung Bahias, in den Provinzen St. Katharina und Rio de Janeiro. Sie ist wenig scheu und kommt wie ihre Verwandte häufig in die Gärten und Plantagen der menschlichen Ansiedlungen. Der Gesang ist, wie auch der der vorher angeführten Arten, unbedeutend.

Die Palmtangare — Tanagra palmorum *Wied.* ist abweichend von den übrigen nicht blau oder bläulich, sondern grün gefärbt. Männchen und Weibchen gleichen einander. Oberseits ist sie olivgrün, der Kopf am reinsten und hellsten, der Rücken dunkler, mehr ins Braune spielend; unterseits, besonders die Brust mehr grauoliv; Flügel und Schwanz bräunlichschwarz; Flügeldecken olivgrün gerandet, eine Flügelbinde bildend; Schwingen und Schwanzfedern dunkeloliv gesäumt; Auge dunkelbraun, Schnabel schwärzlichhorngrau, Füße graubraun. Lg. 187, Fl. 95, Schw. 75 mm. Das Weibchen ist etwas kleiner. Die Verbreitung dieses Vogels ist eine sehr große und erstreckt sich über Ost-, Mittel-, Süd- und Südwestbrasilien. Die Gefiederfärbung variiert in den einzelnen Landstrichen sehr. Infolge der durch Finsch festgestellten Zwischenstufen zwischen Tanagra palmarum und der schwarzflügeligen Tanagra tana-

gra melanoptera ist es möglich, daß beide Arten übereinstimmen, und dann würde sich daher die Heimat der Palmtangare auch noch über einen weiteren Teil von Südamerika nach Süden hin und nach Norden über mehrere westindische Inseln erstrecken. Sie lebt wie die vorigen in Waldungen, scheint aber offene Stellen zu bevorzugen und unter den Bäumen besonders die Palmen. Sie ist in Anpflanzungen und Gärten anzutreffen und nistet in denselben und in Palmenwaldungen. (Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

„Vom Hunsrück", so wird mancher Leser der „Gef. Welt" verächtlich denken. Ja, lieber Leser, auch auf dem Hunsrück gibt es Vogelfreunde, gibt's Ornithologen. Wenn auch hier keine großen Vogelschutzvereine bestehen, so bietet doch der Hunsrück mit seinen schönen Wäldern gerade für den Ornithologen so manchen Reiz. Bevor ich an die Niederschrift meiner Beobachtungen gehe, möchte ich noch bemerken, daß sämtliche angeführten Beobachtungen sich auf die nähere Umgebung meines Heimatstädtchens Castellaun beziehen. Wenn in Vogelschutzkreisen über die starke Abnahme der Vögel Klage geführt wird, so kann ich erfreulicherweise hier vom Hunsrück, von vielen Arten, das Gegenteil behaupten. Doch nun zurück zu meinem eigentlichen Thema. Am 4. April d. J., einem noch recht kalten Frühlingstag, das erste Gelege für dieses Jahr, ein Waldkauznest mit drei Eiern, gefunden. Selbiges war in einem Tannenwald in dem Bau einer verlassenen Fuchshöhle untergebracht. Obschon der Waldkauz hier ein ziemlich häufiger Vogel ist, so war dies doch für mich der erste Fall, daß ich das Gelege dieser Eule in einer Erdhöhle fand. Sonst brütet er hier in alten Bäumen. Die andern Eulen Steinkauz, Schleiereule und Waldohreule sind etwas spärlicher vertreten. Sodann erwähne ich noch ein Pärchen Rauhfußkäuze, das ich an dem langen Stoß sicher als solches ansprach. Von den Tagraubvögeln seien Mäusebussard, Habicht, Turm- und Baumfalke erwähnt. Der Sperber kam mir in hiesiger Gegend noch nie zu Gesicht. Der Mäusebussard wird wohl der am stärksten vertretene Raubvogel sein. So fand ich dieses Jahr in einem nahen Walde, in einem Umfang von 200 m, nicht weniger als drei besetzte Horste. Nachdem ich die zwei Eier des einen Geleges entfernt hatte und ich 14 Tage später wieder an den Horst kam, strich der alte Vogel von demselben ab. Beim Ersteigen des Nestbaumes fand ich wiederum ein Gelege mit zwei Eiern. Denselben nach zu urteilen, war es ein Nachgelege desselben Weibchens. Die Tauben, insbesondere Hohl- und Ringeltauben, sind überall anzutreffen. Von den Hühnervögeln konnte ich nur das Rebhuhn feststellen. Spechte sind fast alle Arten vertreten, besonders zahlreich ist hier der Schwarzspecht, der sich in den letzten zehn Jahren stark vermehrt hat. Er schlägt im Gegensatz zu der Literatur seine Nisthöhle auch in kerngesunden Bäumen, vor allen Dingen gern in Buchen, auf. Großer und kleiner Buntspecht und Grauspecht sind nicht so stark vertreten, aber trotzdem in sämtlichen Waldungen anzutreffen. Elster, Eichelhäher und Rabenkrähe beleben die Felder und Gärten und zehnten die Kleinvogelwelt. So schlug ein Eichelhäher ein Buchfinkenweibchen in unserem Garten auf einem Apfelbaum, während ich darunter stand. Amsel und Singdrossel lassen ihren herrlichen Gesang ertönen. Da hinein mischt sich das Gezeter der Meisen, welche, alle sechs Arten, hier Brutvögel sind. Von den Goldhähnchen konnte ich nur das Wintergoldhähnchen feststellen. Baumläufer und Kleiber finden an den vielen alten Bäumen Nahrung im Überfluß. Von den Finkenvögeln konnte ich als Brutvögel folgende bestimmen: Buchfink, Grünfink, Distelfink, Bluthänfling, hier Stockfink genannt, und Blutfink. Als Zugvögel im Winter: Erlenzeisig, Bergfink und Fichtenkreuzschnabel. Der Zaunkönig ist besonders häufig, überall hört man sein lautes „zerr". Er baut sein Nest hier fast ausnahmslos unter Baumstrünken. In einem solchen fand ich auch am 26. Juni 1921 einen jungen Kuckuck. Neben dem Nest lag ein faules Zaunkönigei. Wenn ich ihn anfassen wollte, so sperrte er ständig seinen Schnabel auf. Es ist dies für mich der einzige Fall, eines jungen Kuckucks nach Kuckucksei habhaft zu werden. Leider fand ich das Nest am 29. Juni leer. Unter dem Baumstrunk saß ein alter Igel, neben ihm Federn des jungen Kuckucks. Sehr wahrscheinlich hat dieser Übeltäter den kleinen Nestschmarotzer verzehrt. Von den Buchvögeln kann ich noch nennen: Garten-, Dorn-, Zaungrasmücke, Weidenlaubvogel, Rotkehlchen, Goldammer und Heckenbraunelle. Von den Würgern ist hier nur der rotrückige vertreten, ebenso von den Piepern nur der Baumpieper. Im diesjährigen Sommer fand ich auch das erste Gelege des mir für die hiesige Gegend bisher unbekannten grauen Fliegenfängers. Es war in einem Nistloch unseres Nachbarhauses eingebaut. Trauerfliegenfänger sind auch vertreten, obgleich nur in einzelnen Paaren. Von den Bodenbrütern sind hier beheimatet das schon oben erwähnte Rebhuhn und Baumpieper sowie Feldlerche und braunkehliger Wiesenschmätzer. In einem nahen Steinbruch hausen der Steinschmätzer und die weiße Bachstelze. Von der letzteren fand ich in diesem Jahr in den Efeuranken eines hiesigen Hauses ein Nest mit sechs erwachsenen Jungen. Die Gebirgsstelze brütet, wie alle Jahre, unter einer Brücke unterhalb unserer Stadt. Als Vögel, die sich dem Menschen eng anschließen, nenne ich: Haus-, Rauch- und Turmschwalbe, Hausrotschwänzchen und Haussperling, wohingegen der Feldsperling und auch der hier sehr häufige Star fast ausnahmsweise in Baumlöchern brüten. So bin ich an das Ziel meiner Schilderungen gekommen, und ich hoffe, daß ein jeder Leser unserer lieben „Gef. Welt" einen Einblick in das Vogelleben des Vorderhunsrücks bekommen hat. Betonen möchte ich noch, daß sämtliche angeführten Arten, mit Ausnahme von Zeisig, Bergfink und Fichtenkreuzschnabel, von mir als Brutvögel festgestellt wurden. Falls ein anderer Hunsrücker Vogelfreund diese Zeilen zu Gesicht bekommt, so bitte ich ihn, mir und der „Gef. Welt" etwa nicht angeführte Arten gütigst mitteilen zu wollen.

Arthur Schmaus, Castellaun.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Kauf- u. Tauschvermittlung: Max Dähnick in Berlin NO 18, Gr. Frankfurter Str. 90, Ecke Markusstr. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

In den Reichsverband sind aufgenommen worden: 1. Herr Franz Blüml in Weichs bei Regensburg; 2. Herr Alois Kastner in Waldsassen; 3. der Verein für Geflügel- und Vogelzucht, Abt. Vogelschutz und -pflege zu Mainz mit 27 Mitgliedern und 4. die Ortsgruppe Nürnberg der Vereinigten Waldvogelvereine Nürnberg-Fürth-Erlangen mit 379 Mitgliedern. J. A.: Petters.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

Richard Heydenreich, Bad Suderode, Harz: Schneeweiße, weißblaue und ganz blaue Kanarien.

Max Kleinert, Berlin NO 18, Strausberger Straße 13, Fernruf Alexander 3313: Taubenhalsamazonen, Tyran, schwefelgelb, Kreidrosseln, Katzendrosseln, brasil. Blauraben, Kronentangaren, Morgenammerfinken, Jakarinifinken, Spitzschwanzamadinen, Riesenpfäffchen, Pfalzschnabelpfäffchen, brasil. Roßtäubchen, weiße Kanarien.

Ing. Anton Koch, Langau bei Geras (Niederösterreich): 1 Steinrötel (1925), 2 Wachteln, schlagend.

Odenwald, Tierhandlung. Fulda: Weißhaubenkakadus, Mollukenkakadus, Gelbmantelloris, Arieltukan.

O. Neupert, Breslau, Kospothstr. 21: Spottdrossel, goldst. Blattvogel, 1 goldgelber Pirol, Davidsprosser, 1 Sumpfrohrsänger, Blaudrossel, Steinrötel, Kalanderlerche.

Max Sachs, Plauen i. V., Rädelstr. 20, A. Z.-Mtgl. 398: kl. Elsterchen × jap. Möwchen.

B. Wieser, Steyr, Oberösterreich: Ia Nachtigall, Frühj. 25, dto. Alpenbraunelle, dto. Heckenbraunelle, Frühj. 25.



Herrn W. R., Stendal. Bisher liegen Mitteilungen über Unverträglichkeit der tarantinischen Unzertrennlichen mit Wellensittichen und Feuerflügelsittichen nicht vor. Es wäre aber nicht ausgeschlossen, daß die Wellensittiche, besonders die Weibchen, evtl. nistende Tarantiner stören und ähnlich verfahren würden, wie Fragesteller es beim Zusammenhalten der W. mit anderen Vögeln beobachtet hat. Der erste Grundsatz bei dem Einbringen verschiedenartiger Vögel in einen Raum, besonders wenn man nicht von vornherein auf ein gutes Einvernehmen rechnen kann, ist der, daß man alle gleichzeitig einsetzt, damit nicht schon das Gefühl des „Herr-im-Hause-Seins" die Angriffslust auf Neuankömmlinge aufkommen läßt. In keinem Fall ist es ratsam, Neulinge einzusetzen, wenn eine Art Eier oder Junge im Nest hat. Feuerflügelsittiche, bei denen die Geschlechter nicht zu unterscheiden sind, sind bisher nicht gezüchtet worden.

Herrn H. J., Goldberg. Das Männchen der Blutschnabelweber verfügt nur über die Töne, welche er bei Ihnen hören ließ. Einen das Ohr angenehm berührenden Gesang hat er nicht. Es läßt sich auch nicht sagen, wann er brütet, da nicht bekannt ist, aus welchem Teil Nordwestafrikas er kommt. S. darüber die Auskunft auf S. 560 unten. — Genau so verhält es sich mit der Frage, wie lange der B. das Brutkleid trägt. Zuweilen tragen die Männchen das Brutkleid über ein Jahr, besonders dann, wenn sie durch Darbietung von Mehlwürmern, Insekten oder einem Ersatzfutter für Insektenfresser lange brütlustig bleiben. Die Fütterung ist sonst richtig.

Herrn M. Sch., Remscheid. Das Ausziehen der Schwingen und Schwanzfedern bei Vögeln, welche nicht voll vermausert haben, ist besser zu unterlassen. Die Federn können nicht nachwachsen, wenn die Federpapillen noch nicht entwickelt sind. Da die Sperbergrasmücke (nach meinen Beobachtungen) im Winter das ganze Gefieder wechselt, im Sommer aber nur das Kleingefieder, war die Vornahme falsch.

Herrn G. T., Oldenburg. Der W. ist infolge einer Lungenentzündung eingegangen.

Herrn Dr. U., Lübeck. Der K. war trotz seines kräftigen Äußern ein stark degenerierter blutarmer Vogel, der infolgedessen trotz gut entwickelten Eierstockes nicht zur Produzierung von Eiern kam und wohl schließlich infolge allgemeiner Lebensschwäche einging.

Herrn E. Sch., Dresden. Der Zeisig ist infolge einer mit Abzehrung verbundenen Ernährungsstörung eingegangen.

Herr L. Sch., Obergeibsdorf. Beide Füße werden nach sorgfältiger Reinigung mit Jodtinktur bestrichen. Wie das Ungeziefer auf dem Vogel bekämpft wird, ist auf S. 296 im Redaktionsbriefkasten unter „Herrn K. L., Gera" mitgeteilt. Wie die gleichzeitige Reinigung des Käfigs vorgenommen wird, ist auf S. 380 im Redaktionsbriefkasten unter „Herrn A. M., Düsseldorf" nachzulesen.

Herrn M. R., Breslau; Herrn Reg.-R. F., Frankfurt a. d. Oder; M. S., Innsbruck; Herrn A K., Anklam; Herrn E. A., Bischofswerda: Beiträge dankend erhalten.

Herrn A. B., Jena, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn W in L. Wenn man Nachtigallen halten will, so muß man doch zumindest auf dem Gebiet der Pflege von insektenfressenden Vögeln Kenntnisse und Erfahrungen haben. Wenn aber jemand fragt: „Wie sind die Käfige für Nachtigallen beschaffen? Ist für sie ein Bauer wie für Kanarienvögel üblich, geeignet", so zeigt er, daß er von der Pflege derartiger Vögel nichts versteht und sich mit ihrer Pflege nicht beschäftigen darf, bevor er durch eifriges Studium der einschlägigen Literatur sich erst mal über die Pflege von Weichfutterfressern im allgemeinen orientiert hat und der Versuch, ein Rotkehlchen oder eine Mönchsgrasmücke erfolgreich zu pflegen, gelungen ist.

Herrn P. Sch., Weinsheim. Die Grauköpfchen können in ungeheizten frostfreien Räumen überwintert werden, auch der Graukardinal. Erstere erhalten zur Nahrung Hirse, Spitzsamen, Hafer, Reis in Hülsen, halbreifen Samen, frische Zweige, Grünkraut. Die Graukardinäle erhalten außer den obengenannten Sämereien auch Rübsen, Zweige mit Blattknospen, auch lebende Insekten und ab und zu etwas Insektenfresserfutter.

Herrn M. E., Demmin. Mohrenkopf und kleine Gelbhaubenkakadus lernen Worte nachsprechen. Sie sind nicht besonders empfindlich, wenn sie gesund in die Hände des Pflegers gelangen und sachgemäß gehalten und ernährt werden. Als Sprecher sind Graupapagei und viele Amazonen vorzuziehen. Topfsittiche sind bereits gezüchtet. Sie würden auch in großen Volieren, in welchen auch Wellensittiche und Unzertrennliche untergebracht sind, zur Brut schreiten. Es besteht aber dann die Gefahr, daß sie besonders durch Wellensittiche, deren Weibchen häufig alle Nistkästen durchsuchen, gestört werden.

Herrn J. P., München. Frisch eingeführte Rosenpapageien, bisher meist in hoher Wärme gehalten, werden am besten in einem Zimmer mit üblicher Stubenwärme untergebracht. Die Gewöhnung an Trinkwasser kann in beabsichtigter Weise vorgenommen werden. Die schwerfälligen Pennantsittiche können den Rosenköpfchen kaum etwas anhaben. Es sind aber Fälle bekannt, in denen letztere selbst den großen Plattschweifen die Beine zerbissen haben.

Herrn P. B., Naumburg a. d. Saale. 1. Der Schnabel des tarant. Bergpapageien ist bei beiden Geschlechtern karminrot; Schwanzfedern grün mit breiter schwarzer Binde von der Spitze, Grund der Innenfahnen gelblich; Größe etwa wie Rosenpapagei. 2. Nußköpfchen sind in der Größe etwa dem „Inseparables" gleich. Der Preis ist hoch, weil sie sehr begehrt, aber in der Nachkriegszeit noch nicht wieder eingeführt sind. 3. Die blauen Flügelfedern und der Bürzel sind bei dem gemeinen Sperlingspapagei (Lg. 120 mm) ultramarinblau, bei dem mexikanischen Sp. (Lg. 130 mm) sind diese Gefiederteile hellblau. Der grünbürzelige Sp. (Lg. 130 mm) hat smaragdgrünen Bürzel. 4. Mit „Blauastrild" bezeichnet man im Gegensatz zum „Schmetterlingsfink" die südafrikanischen Formen dieser Art, bei denen auch dem Männchen der rote Ohrfleck fehlt. Sie sind größer und besonders auf der Oberseite heller gefärbt als der meist eingeführte, westafrikanische „Schmetterlingsfink". 5. Die Berlepschschen Nisthöhlen für Meisen (mit großem Schlupfloch) und für Stare können zur Züchtung von Wellensittichen verwendet werden. Ihre Schwere läßt sie aber für kleine Käfige kaum verwenden. Hergestellt werden sie von der Firma Scheid in Büren (Westfalen).

Herrn R. M., Wien V. Ein geeignetes Futter für den Zwergalori wäre erweichtes, gut ausgedrücktes und dann zerkrümeltes Eierbrot mit Zucker bestreut und kleingeschnittenen Sultaninen vermengt, daneben auch süßer Apfel. Um ihn an die Annahme von Samen zu gewöhnen, wird darunter gut gequollener Spitzsamen und Hirse gegeben. Wenn der Vogel diesen annimmt, werden allmählich auch trockene Körner gereicht. Ein gutes Getränk ist anfangs mit dem bisher gereichten Tee verdünnte Alpenschweizermilch mit Zucker- oder besser mit Bienenhonig gesüßt. Die des Morgens im Käfig umherliegenden Federn wird der Vogel vermutlich bei dem Umhertoben verlieren. Das Anbringen eines Schlupfkastens (Starkastens) zum Übernachten ist ratsam. Die Art ist so selten eingeführt, daß noch nicht festgestellt werden konnte, ob ihr die Begabung, menschliche Worte nachzusprechen, eigen ist. Wesentlich ist, daß das Futter feucht ist, damit es der Lori leckend aufnehmen kann. Als Beigabe kann dem Futter hartgekochtes zerriebenes Ei beigegeben werden. Gern wird meist rohes Gelbei mit Honig vermengt genommen. Sie lieben auch das Benagen frischer Zweige von Weiden und Obstbäumen. Das Nachsprechen von Worten erlernten, soweit bekannt, von den Spitzschwanzloris der Gebirgslori und von den Breitschwanzloris der Schwarzkappenlori und einige nahestehende Arten (Frauenlori, Gelbmantellori, roter Lori).

Herrn J. F., Karlsruhe. Die Dayaldrossel ist infolge der mit Abzehrung verbundenen Ernährungsstörung der Vögel eingegangen.

Herrn K. A., Hamburg. Es ist mir nicht bekannt geworden, daß in der Nachkriegszeit japanische Mövchen aus Japan eingeführt worden sind. Es ist kaum anzunehmen, daß das geschehen ist. Wohl aber sind weiße Reisvögel im vorigen Jahr im Handel gewesen, die wahrscheinlich aus dem Ausland gekommen waren.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

gang 54 3. Dezember 1925 Heft 49

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Umzug. Von Prof. Fritz Braun.

Das Liebhaberjahr. Plauderei von J. Birk, Leipzig. (Forts.)

Mexikaner bei Lenger. Von Rudolf Neunzig.

Die Orpheusgrasmücke als Käfigvogel. Von Erich Merz.

Anfangsgründe und Grundrisse zur Weiterentwicklung in der Ausbildung des Kanariengesanges. Von Paul Holzky, Cöthen i. A. (Forts.)

Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten. Von J. Kuntzendorff, Berlin. (Forts.)

Kleine Mitteilungen - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Ausstellungen - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellungen.

Der **Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden**, gegr. 1906 (vorm. Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden), veranstaltet in diesem Jahre vom 4. bis 7. Dezember seine Vogelschau im Italienischen Dörfchen. Ausgestellt werden einheimische und fremdländische Sing- und Ziervögel. Auch in der diesjährigen Vogelschau soll der Gedanke, wie die Vogelpflege und der Vogelschutz geübt werden, veranschaulicht werden. Alle Vogelliebhaber sind herzlich willkommen.

Die Ausstellungsleitung.

Der **Verein der Freunde von Sing- und Ziervögeln in Lübeck** erlaubt sich hiermit, alle Sports-Vereine und Freunde zu seiner am 12. und 13. Dezember 1925 stattfindenden Allgemeinen Ausstellung ergebenst einzuladen.

Herbert Müller, Lübeck, Hüxstraße 119.

Voranzeige! Um vielfachen Wünschen nachzukommen und um gleichzeitig den Ostern 1926 zur Tagung des Reichsverbandes der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig in Leipzig weilenden Vogelliebhabern einen Einblick in den Stand der Leipziger Liebhaberei zu gewähren, veranstaltet der Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig im Naturkundlichen Heimatmuseum wiederum eine Vogelschau, zu deren Besuch schon heute alle Freunde und Anhänger unserer schönen Liebhaberei herzlichst eingeladen werden. Die Ausstellungsleitung. J. A.: Joh. Birk.

Aus den Verbänden.

Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen. Sitz Leipzig. 1. Vors. Hermann Höhne, Leipzig-Volkmarsdorf, Eisenbahnstraße 84 IV. 1. Schriftf. Max Hunger, Leipzig-Gohlis, Polizeigebäude Zimmer 196. Kassierer Ludwig Böttcher, Leipzig, Inselstr. 17 II. Girokasse Leipzig, Nr. 6317. Postscheckkonto Nr. 53319. — Der Vorstand befaßte sich in seiner letzten Sitzung mit der Gewährung von Diplomen für die Ausstellungen der angeschlossenen Vereine und gelangte zu folgendem Beschluß. Diplome in künstlerischer Anfertigung werden den Vereinen auf Antrag zur Verfügung gestellt, wenn sie 1. sich bereit erklären, von den entstehenden Unkosten 2/3 zu tragen, 2. die Ausstellung von einem Sachverständigen des Landesverbandes für diplomwürdig begutachtet worden ist. Zu einer Übernahme der gesamten Unkosten konnte sich der Vorstand nicht entschließen, da die immerhin erheblichen Unkosten eine unerträgliche Belastung der Landesverbands-Finangen darstellen würden. Damit das Diplom wirklich eine besondere Anerkennung der gezeitigten Leistungen ist und bleibt und nicht als eine selbstverständliche Folge der Ausstellung angesehen wird, ist die Begutachtung eines Sachverständigen des Landesverbandes unerläßlich. — Die Jahresversammlung des Landesverbandes soll Ostern 1926 im Rahmen der Generalversammlung des Reichsverbandes stattfinden. Sobald die notwendigen Vorarbeiten erledigt sind, erfolgt Bekanntgabe des endgültigen Termins. — Der Reichsverband hat sein erstes Flugblatt, betitelt „Vogelschutz und Stubenvogelliebhaberei", herausgegeben. Der Landesverband hat eine größere Anzahl erworben und wird den angeschlossenen Vereinen und Einzelmitgliedern eine entsprechende Anzahl zugehen lassen. Das Flugblatt soll in der Hauptsache als aufklärendes Organ der breiten Öffentlichkeit gegenüber dienen. Pflicht der Vereine und Einzelmitglieder ist es, für weiteste Verbreitung des Blattes (honorarfreie Veröffentlichung in den örtlichen Tageszeitungen usw.) bemüht zu sein. — Die nächste Vorstandssitzung ist in Anbetracht der Erledigung wichtiger Fragen auf den 3. Januar 1926, 3 Uhr nachmittags, bei Herrn Höhne, Leipzig-Volkmarsdorf, festgesetzt worden. Eventuelle Wünsche sind bis dahin zu unserer Kenntnis zu bringen. J. A.: Hunger, Schriftf.

Aus den Vereinen.



Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Postscheckk. Hannover 56714; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10. — Angemeldet ist Fräulein von Oesterley, Hannover, Podbielskistr. 19; Herr Generalkonsul Cremer, Bremen. — Unter Bezugnahme auf die Mitteilung des Herrn Dr. Luig, Brüssel, in Heft 47 teile ich mit, daß Mitglied 255 in liebenswürdiger Weise bereit ist, die Wünsche der Mitglieder zu einer einheitlichen Bezugsliste bei Chapman zu vereinigen und den gemeinsamen Bezug durch Flugzeug zu erwirken. Reflektanten wollen sich gefl. unter Beifügung von Rückporto mit Mitglied 255 in Verbindung setzen. — Ferner ist auf Anregung geplant, in Abständen von 2 bis 3 Monaten, je nach Bedarf, Tauschlisten herauszugeben, deren Aufstellung ebenfalls Mitglied 255 zu übernehmen bereit ist. Eine solche Liste wird versuchsweise erstmalig dem neuen Jahrbuch beigegeben. Tauschgesuche, An- und Verkäufe sind bis zum 15. Januar nach Jena einzureichen. Die Listen sind nur für Mitglieder bestimmt — Ich mache nochmals darauf aufmerksam, daß literarische Beiträge zum Jahrbuch bis spätestens am 15. Dezember in meinen Händen resp. im Besitz von Mitglied 34 sein müssen. Spätere Einsendungen können nicht mehr berücksichtigt werden. A. Krabbe.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögeln in Apler-beck. Sitzung jed. 1. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, in der Wirtschaft Sprave, fr. Fritz Lecking, Kirchstr. F. Lecking, 1. Vors.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhaber-vereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke-Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstr. 37a. Gäste stets willkommen. P. Böhme, Schriftf.

Verein für Vogelkunde und Geflügelzucht Breslau. Vogelliebhaber Breslaus, wollt ihr euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei nicht endlich auch zusammenschließen, wie es in anderen Städten schon längst geschehen ist? Ein Stamm von erfahrenen Vogelpflegern ist vorhanden, jedoch können Fortschritte nur erzielt werden, wenn alle noch abseits Stehenden sich uns anschließen und unsere mit belehrenden Vorträgen verbundenen Vereinsabende besuchen. Auskunft ert. bereitwilligst P. Spitzner, 1. Schriftf., Ofener Str. 26.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Dessau und Umgegend. Gegr. März 1925. Vereinslokal „Fürst Blücher", Ecke Antoinetten-Leopoldstr. Versammlung jeden 2. Mittwoch, abends 8 Uhr. Gäste zu allen Veranstaltungen stets willkommen. J. A.: Dielitzsch, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jed. 2. u. 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Rest. „Zum Löwentor", Königswall 75.

A. Spauche, Schriftf., Dortmund, Lagerhausstr. 21

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Vers. jed. Freitag, abends 8 Uhr, i. Vereinsl. „Bienenkorb", Schloßstr. Vogelliebhab. als Gäste willkommen. E. Schubert, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Eliesenhof", Eliesenstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Mittelthüringens Sitz Erfurt. Sitzung jeden 2. Mittwoch und jeden letzt. Sonnabend im Monat im Vereinsl. „Stadt Chemnitz", Thomasstr. 57. Näh. Auskunft erteilt Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Vereinigung einheimischer Waldvogelliebhaber zu Görlitz und Umgegend. Zusammenkunft jeden 3. Sonnabend im Monat im Restaurant „Zum Bismarckgarten", Bismarckstraße. 1. Vors. W. Lücker in Görlitz, Konsulstr. 7. Vogelliebhaber als Gäste willk. J. A.: Erich Rothe, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen Nächste Sitzung am Dienstag, den 15. Dezember. A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite)

Der Hannoversche Vogelschutzverein zu Hannover, gegr. 1881, wirkt mit sichtbarem und anerkanntem Erfolge für Vermehrung und Schutz der Vogelwelt bei Hannover durch Aufhängen von jährlich einigen hundert Nistkästen aller Art, durch Erweckung von Interesse und Liebe für die Vogelwelt mit monatlich, zur Gesangszeit wöchentlich stattfindenden Belehrungsspaziergängen und durch Vorträge und Austausch der Beobachtungen in den jeden 3. Dienstag des Monats stattfindenden Vereinsversammlungen. Seine Bestrebungen dienen also lediglich gemeinnützigen Zwecken. Mitgliederzahl rd. 1200, jährl. Beitrag nur 1 M. Meldungen an den Vors. Herrn Fritz Becker, Hannover, Boedekerstr. 1 F.

Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber. Die Dezemberversammlung am 10. wird im Landesheim abgehalten.

Heidelberg. Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg, Abteilung Vogelpflege. Zusammenkunft jeden 1. Donnerstag im Monat im „Holländer Hof". Vogelliebhaber stets willkommen. Prof. Dr. Otto Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- u. Singvögel zu Hörde. Gegr. Sept. 1920. Versammlung im Winter, v. Okt. bis April, aller 14 Tage Sonntags, nachm. 5 Uhr, im Sommer, v. April bis Okt., abends 8 Uhr. Gäste u. Liebh. stets willk. Vereinsl. Restaurant Burghof, Bes. H. Ungewitter, Bruchstr. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Versammlung aller 14 Tage Sonnabends. Vereinslokal: Gasthaus „Zur Krone", Jena, Grietgasse. Gäste stets willkommen. Jena besuchende Vogelliebhaber treffen jeden Sonntag vorm. den Schriftführer Adolf Voigt, Jena-Ost, Feodorastraße 13, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube freundlichst eingeladen. Adolf Voigt, Schriftf.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an!

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal bei Gastwirt Lapschies, Kaiserstr. 46 a. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 3. Dez. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Laßner im Volkshaus-Nord, Glogauer Str. 20. Liebhaber willk. J. A.: Friedrich.

Verein der Vogelfreunde Linden. 1. Vors. P. Winkel, Linden, Fröbelstr. 9.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wsl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Sitzung aller 14 Tage im Restaurant „Zum Neckarstrand", Messeplatz 1. Liebhaber willkommen. Joh. Daubmann, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. im Monat. Vereinslokal: Gastwirtsch. Augustusburg, inn. Leipziger Str. Nächste Vers. 4. Dez., abends 8 Uhr. P. Schmidt, 1. Vors.

Anzeigenteil

ie viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per rief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Alfred Klaus. Seifhennersdorf Nr. 179

Vogelkäfigbau

für jeden Vogel in jeder Ausführung je nach Wunsch und Maßangabe, Hartholz, Zinkschublade, zerlegbar oder fest 1661

Saubere Ausführung **Billigste Berechnung**

Unübertroffen ist

Heidelberger Vogelfutter,

hergestellt nach Vorschrift und unter Kontrolle von

Professor Dr. Otto Fehringer

durch

GENO-WERK - Mannheim

Rheinkaistraße 8 b.

Anfragen über die Pflege einheimischer Vögel werden gerne beantwortet. Rückporto beilegen. [1662

Anzeigen in der Gef. Welt haben guten Erfolg

Erklärung

Die Firmen Osk. Adler Nachf., Zittau und Stefan Quaiser, Reichenberg (Böhmen) annoncieren ein Vogelfutter „Ideal" nach Angaben von Prof. Dr. O. Fehringer, Heidelberg. Ich hatte vor zwei Jahren mit der Firma Stefan Quaiser, Reichenberg einen Vertrag geschlossen, wonach diese Firma unter meiner Kontrolle sechs Arten von Vogelfutter sollte herstellen und vertreiben können. Die mir zur Kontrolle gesandten Proben haben jedoch meinen Angaben nicht entsprochen. Infolgedessen habe ich alle Beziehungen mit der Firma Stefan Quaiser abgebrochen. Mit der Firma Osk. Adler in Zittau stehe ich überhaupt in keiner Beziehung. Ob die jetzt angezeigten Vogelfutter „Ideal" meinen früheren Angaben entsprechend hergestellt sind, weiß ich nicht. Eine Erlaubnis von meinem Namen Gebrauch zu machen haben die beiden Firmen von mir nicht.

Dagegen steht die Fabrikation des [1663

„Heidelberger Vogelfutter"

von der Geno-G. m. b. H. in Mannheim

unter meiner Kontrolle. **Prof. Fehringer.**

Ia Ameiseneier

mit würzigem Geruch à Pfd. 4.-- M, bei 10 Pfund 35.— franko

Ia Elbweißwurm Pfd. 4.50 M

Mehlwürmer gegen Einsendung von 1.80 M ¼ Pfund franko.

W. Busse, Magdeburg, Gr. Mühlenstraße 1. [1664

Mehlwürmer

veg. gez., 1 Pfund M. 5.50 ¼ Pfund M. 1.80 franko gegen Voreinsendung

Bonitas-Versand Rostock i. M. 3. [1665

1925er Ameiseneier

hell, gesiebt, das Pfund M. 3.70 ab hier.
Bei Voreinsendung franko. [1666

Geno-Werk, Mannheim

Rheinkaistr. 8 b. Hersteller des

Heidelberger Vogelfutter

nach Prof. Dr. O. Fehringer.

Mehlwürmer

1 Pfd. 5 ℳ ab hier,
6 Pfd. franko und Verpackung frei,
geg. Voreinsendung 1/4 Pfd. 2 ℳ franko.

Ameiseneier, 1925er,

1 Pfd. 3.50 ℳ, ab hier 9 Pfd. 31 ℳ frk.

Ia Weißwurm, 1925er,

Pfd. 4.50 ℳ, 9 Pfd. 36 ℳ franko.

Ia Musta-Zecken

1667] Pfund 1.50 ℳ.

Seidenraupenpuppen, gemahl.,

Pfd. 0.60 ℳ ab hier.

Großabnehmer Rabatt.

Karl Claus, Mutterstadt II
(Hauptbahnhof).

Mehlwürmer

geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.**, Bierenthal i (Mark). [1668

Mehlwürmer

(das ganze Jahr hindurch)
ℳ 5.— das Pfd., ausschließl. Porto u. Verp.; bei Abnahme von 6 Pfd. Porto u. Verpackung frei.

Ia Ameiseneier

3.50 ℳ per Pfd.
9 Pfd. netto 30.— ℳ franko.

Ia Weißwurm, 1925er 4.— d. Pfd.
Ia Muska-Zecken . . 1.50 d. Pfd.
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen 0.60 d. Pfd.

tf. Universalfutter

Alecwa I für Nachtigallen ℳ 2.—
„ **II für Grasmücken** ℳ 2.—
„ **III für Drosseln** . . ℳ 1.50
das Pfund ab hier, ausschl. Verp.; bei größeren Mengen billiger. [1669

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser

A. Eckrich II, Waldlee (Pfalz).

Mehlwürmer

à Pfund 5.60 ℳ, 1/4 Pfund 2.— ℳ
franko gegen Voreinsendung

Ia Ameiseneier	Pfd. 4.— ℳ
Ia Muska	Pfd. 1.50 ℳ
Ia Weißwurm	Pfd. 4.50 ℳ
Seidenraupenschrot	Pfd. 0.60 ℳ
Garneien gem.	Pfd. 0.35 ℳ

Alles diesj. Ware, à Pfund ab hier.

Th. Witte, Niederndodeleben
b. Magdeburg. [1670

Ein Versuch

überzeugt jeden von der Güte meines **Universalfutters.** Preis 2 M. p. Pfd. Sämtliche Futtersorten für Exoten, Wald- und Kanarienvögel zu billigsten Tagespreisen. Versand geg. Nachnahme. Verpackung und Porto werden billigst berechnet. [1671

P. H. Kirsten, Leipzig 3,
Zeitzer Str. 53. Fernruf 31445.

Vogelfutter [1672

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14958.

Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Liebhaber und Kenner

die ihre Lieblinge **gesund** erhalten und **in Gesang bringen** wollen, füttern das seit Jahrzehnten bestens bewährte und für zarte Weichfresser eigens zusammengestellte

„Naturell"



Naturell enthält **nur beste** und für den Vogel **bekömmliche Zutaten** und ist schon seit langer Zeit von besten Kennern günstigst beurteilt.

Alleiniger Hersteller: [1673

Wilhelm Dieße, Leipzig
Kurprinzstraße 15

Naturell kg 5 ℳ. Probesendung gegen 1 ℳ in Briefmarken

Empfehle außerdem:
Drosselfutter kg 2 ℳ, Ameisenpuppen kg 7 ℳ
Weißwurm kg 10 ℳ
ferner beste Futterarten für sämtliche in- und ausländischen Körnerfresser in bester Qualität bei billigsten Preisen.

„ORNIS"

Freie Bezugsvereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands.
Gegründet 1912 .·. Fernsprecher 4198 [1674

Fachgemäße Belieferung mit Vogelfutter („Reform-Normal", individuelle Zusammensetzung bei restlosem Verbrauch; stets frisch gemischt). Hunderte von Liebhabern füttern seit über einem Jahrzehnt mit bestem Erfolg nur „Reform-Normal".

Reform-Normal-Käfige Mod. ORNIS 1925, neue Preisliste erschienen. — Modern eingerichtete Käfig-Bauanstalt mit elektrischem Betrieb.

Anschrift: Ornis-Haus, Halle-Saale. Der Geschäftsführer: Martin Sperling.

Quaiser's Vogelfutter „Ideal"

nach Angaben von Professor Dr. O. Fehringer, Heidelberg

Für Weichfresser:

Erdsänger und ähnliche Vögel, Packung gelb,		groß:	2.40,	klein: 1.30
Grasmücken und Schwarzplatten,	„ rosa,	„	2.25,	„ 1.20
Drosseln und härtere Weichfresser,	„ grün,	„	1.80,	„ 0.70

Für Körnerfresser:

Stieglitze und Zeisige, Packung rot . . .		groß:	0.75,	klein: 0.40
Hänflinge, Girlitze usw.,	„ blau . . .	„	0.75,	„ 0.40
Kanarien, beste Qualität,	„ weiß . . .	„	0.75,	„ 0.40

Franko jeder Station frei Verpackung!

Hauptverkauf für Deutschland: **Oskar Adler's Nachfolger, Zittau i. Sa.,** Weberstraße.

Tschechoslowakei: **Stefan Quaiser, Reichenberg (Böhmen),** Herrengasse. [1675

Jeder Liebhaber und Vogelfreund wolle sich von der Qualität des **„Ideal"** überzeugen.

Vereine u. Wiederverkäufer erhalten Rabatt!

Offeriere in gesunden u. gutbefiederten Exemplaren:

Graupapageien	à	120.— ℳ	Atlasfinken in Pracht	Paar	4.— ℳ
sprechende	à	160.— „	Silberfasänchen . . .	Paar	3.50 „
Rosakakadus, pr. Tiere	Stück	30.— „	Schuppenköpfchen . .	Stück	5.— „
Gr. Gelbhaubenkakadus	Stück	55.— „	Kanarienhähne, flott singend	Stück	10.— ℳ bis 15.— „
Kl. Gelbhaubenkakadus	Stück	35.— „	dito Weibchen	Stück	1.— ℳ bis 2.— „
Taubenhalsamazonen .	Stück	60.— „	Gebirgs-Schwarzplatten	Stück	8.— „
Kaptäubchen	Paar	7.— „	Rotkehlchen . . .	Stück	2.50 „
Afrik. Halsbandtäubchen	Paar	7.— „	Feldlerchen	Stück	3.50 „
Stahlfleckentäubchen .	Paar	6.— „	Kalanderlerchen . . .	Stück	15.— „
Senegaltäubchen . . .	Paar	6.— „	Stieglitze	Dtz.	24.— „
Grüne Wellensittiche, junge	Paar	9.— „	Männchen	Stück	4.— „
dito ausgefärbte . .	Paar	12.— „	dito Weibchen . . .	Stück	2.— „
Rotgehäubte Kardinäle	Stück	8.— „	Gelbe Zeisige . . .	Dtz.	18.— „
Reisfinken, ausgefärbte	Paar	5.— „		Stück	2.25 „
dito jung	Paar	4.— „	dito Weibchen . . .	Stück	1.— „
Safranfinkenhähne, unausgefärbte	Stück	3.— ℳ, Paar 5.— „	Buchfinken	Dtz.	12.— „
Muskatfinken	Paar	4.— „		Stück	1.50 „
Imp. Zebrafinken . .	Paar	18.— „	Klarino, herrliche Sänger	Stück	40.— u. 45.— „
Zwergmaskenweber in Pracht	Stück	4.— „	Rote Kardinäle . . .	Stück	30.— „
Grauköpfchen (Zwergpapageien)	Paar	12.— „	Papstfinken, sehr schön, nur Männchen . . .	Stück	16.— „
Feuerweber in Pracht	Paar	6.— „	St.-Thomas Sittiche .	Paar	30.— „
Bandfinken	Paar	3.50 „	Brauner Makak-Affe, ganz zahm		55.— „
			Hutaffe, ganz zahm, angekleidet		80.— „
			Kleine Meerkatze, zahm . .		50.— „

Porto und Verpackung 3.50 ℳ, Dringend 6.50 ℳ.

Reellste Bedienung zugesichert. [1676

Paul Tzornack, Berlin NO 55

Prenzlauer Allee 189.

Pa. gesiebte Ameiseneie

Pfund 3.40 M.,
über 5 Pfund à Pfund 3.30 M
10 Pfund 31 M. franko.

Zecke	Pfd. 2.50 M
Con. Eigelb	Pfd. 2.— M
Karottengrieß . . .	Pfd. 0.70 M
Drosselfutter	Pfd. 0.80 M

Lucullus extra Mischung 1/2-Pfd.-Pak 0.95 M., weiße Packung 0.80 M
Senegalhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. fran
Silberhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. fran
Algierhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. fran
Kerbtternahrung f. Kanarien Pfd. 1.30 M

Versand per Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. [167

Paul Tzornack,
Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 18
(Postscheck-Konto Nr. 652 65)
Gegründet 1905.

Ameiseneier

gute Qualität, Ernte 1925, à Pfund 3.50 M., bei 10 Pfund franko.

Weißwurm

Ia, Pfund 5.00 M., bei 10 Pfund frank

Versand per Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. [167

Friedr. Gustav Müller

Berlin SW 61, Blücherstraße 6
Postscheckkonto: Berlin Nr. 153990.
Fernsprecher:
Moritzplatz 2689, Hasenheide 6682.

Offeriere freibleibend

Graupapageien .	Stck.	110 u. 120.—
Blaustirnamazonen	Stck.	50 bis 60.—
Taubenhalsamazonen . .	Stck.	65.—
Gelbnackenamazonen, ausgefärbt	Stck.	75.—
Kleine weiße Gelbhaubenkakadus	Stck.	35.—
Doppelgelbkopf, ausgefärbt	Stck.	60.—
Rosakakadus	Stck.	29.—
Grüne u. gelbe Wellensittiche	Paar	12.—
Sperlingspapageien, Wbch.	Stck.	7.—
Schamadrosseln, Wbch. .	Stck.	50.—
Tyran, schwefelgelb . .	Stck.	30.—
Kreidrosseln	Stck.	10.—
Katzendrosseln	Stck.	12.—
Brasil. Blauraben . . .	Stck.	30.—
Kronentangaren	Paar	8.—
Safranfinken, ausgefärbt	Paar	8.—
Morgenammerfinken . .	Paar	8.—
Jakarinifinken	Paar	20.—
Spitzschwanzamadinen . .	Paar	50.—
Riesenpfäffchen, gute Sänger	Paar	12.—
Pfalzschnabelpfäffchen, gute Sänger	Paar	12.—
Jap. Möwchen	Paar	13.—
Brasil. Rotztäubchen . .	Paar	5.—
Tigerfinken, ausgefärbt, hochrot	Paar	5.5
Weiß. Kanarien, Hähne	Stck.	40 u. 50.—
dito Weibchen . .	Stck.	15.—
Harzerroller, flott singend	Stck.	10 u. 12.—
Stieglitzhähne	Stck.	3.5
Zeisighähne	Stck.	2.5
Buchfinken	Stck.	2.—
Schwarzplatten	Stck.	10.—
Rotkehlchen	Stck.	5.—
Kapuzineraffen	Stck.	65.—
Rhesusaffen	Stck.	45.—
Schwarze Makaken, handzahm	Stck.	80.—
Hundpaviane, zahm . .	Stck.	120.—
Meerkatzen	Stck.	70.—

Sämtliche Sorten Futter für Weich- und Körnerfresser zu den billigsten Tagespreisen. [167

Bei Anfragen Rückporto beifügen.

Tierhandlung

Max Kleiner

Berlin NO 18
Strausberger Straße 13.
Fernruf Alexander 3313.

Wegen völliger Aufgabe der Zuch gebe ich ab:

Wellensittiche

grüne und gelbe erprobte Zuchtpaare, grüne und gelbe Jungtiere (1925) aus gefärbt, alles kräftige, gesunde und ab gehärtete Tiere aus großer Voliere.
1,1 **Zuchtpaar** gr. 14 M., gelbe 18 M
Jungtiere gr. 5 M., gelbe 7 M. da Stück. Einsendung von Verpackung e wünscht, Porto Expreßselbstkosten. Bitt Rückporto. [168

Fr. Stoltze,
Böblingen (Wtbg.), Waldburgstr. 3

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg bei Magdeburg

Der heutigen Nummer liegt eine Farbentafel bei



Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 10. Dezember 1925 | Heft 50

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Karl Theodor Liebe.

Manchem Vogelfreund wird es ergehen wie dem Verfasser dieser Zeilen, wenn sein Auge auf das Bild Karl Theodor Liebes fällt: er bedauert es tief, diesen Mann mit den sympathischen, vertrauenerweckenden Zügen, dem scharfen, klaren und doch wohlwollenden Blicke, dem feinen Munde, den Mann, dem die Joppe mit den Hirschhornknöpfen und die behagliche, wärmende Pelzmütze so gut steht, nicht persönlich gekannt zu haben. Ja, das müßte für jeden, der die Vögel ins Herz geschlossen hat, etwas Feines und Köstliches gewesen sein, wenn er dem „alten Liebe" einmal selbst Aug' in Aug' hätte gegenüberstehen oder in einem gemütlichen Plauderstündchen hätte gegenübersitzen oder ihn gar in seiner Vogelstube hätte aufsuchen dürfen! Wohl denen, welchen dies Glück beschert war! Uns anderen ward es nicht zu teil und es bleibt uns nur übrig, aus den Erzählungen dieser Mehrbegünstigten uns ein Bild von K. Th. Liebe aufzubauen, wie er leibte und lebte. Doch eines dürfen wir dabei nicht vergessen, wenn das Bildnis nicht matt und farblos werden soll! Vor allem werden wir in den nachgelassenen Schriften unseres Liebe recht fleißig nachzulesen haben: denn wird die Gestalt, die wir in der Erinnerung heraufbeschwören, greifbar, leibhaftig vor uns treten, denn es heißt auch da: an seinen Werken werdet Ihr ihn erkennen!

Das äußere Leben K. Th. Liebes bewegte sich in einfachen Bahnen. Es ist mit wenigen Worten zu schildern: Am 11. Februar 1828 wurde dem Pastor und Ephorieadjunkten Carl Julius Liebe in Moderwitz bei Neustadt an der Orla ein Sohn geboren, der auf die Namen Karl Theodor getauft wurde. Wiege und Bahre unseres Karl Theodor standen im „waldgrünen Thüringland" und sein ganzes Leben spielte sich dort ab. Im Sturmjahre 1848 bezog der begabte Jüngling die Universität Jena, um, dem Wunsche des Vaters folgend, Theologie zu studieren. Seine eigene innere Neigung führte ihn mehr den Naturwissenschaften zu, hauptsächlich der Geologie und Paläontologie. Er legte im Jahre 1851 die Theologieprüfung ab und brachte seine naturwissenschaftlichen Studien dadurch zu einem beachtenswerten Abschluß, daß er im Jahre darauf sich in diesem Fache den Doktorhut erwarb. Seine Absicht, die akademische Laufbahn zu ergreifen, scheiterte an der Geldfrage. Er wandte sich dem Schuldienst zu. Zunächst war er als Oberlehrer am Schleidenschen Realgymnasium in Hamburg tätig; im Jahre 1855 erhielt er einen Ruf, eine Lehrer- und bald darauf auch die Direktorstelle der Gewerbeschule in Gera zu übernehmen. Sechs Jahre später wurde er Professor für Mathematik und Physik am Geraer Gymnasium, welche Stelle er bis zu der am 31. März 1894 erfolgten Zurruhesetzung in großer Treue und Hingebung, hochgeachtet von seinen Amtsgenossen, verehrt von seinen Schülern, bekleidete. Seine Lehrtätigkeit beschränkte der Unermüdliche nicht auf die durch den Stundenplan festgelegten Zeiten. Auch in seinen Freistunden förderte er freiwillig seine Schüler in der Mathematik und in den Naturwissenschaften. Einer seiner hervorragendsten Schüler, Prof. Dr. Fürbringer in Jena, hat die Tätigkeit Liebes als Lehrer und Mensch mit folgenden Worten gekennzeichnet:

„Mit den häuslichen Studien wurden jene unvergeßlichen Exkursionen verbunden, wo er uns Augen und alle Sinne öffnete und schärfte, die Wunder der Gottesnatur zu genießen, wo er uns aus dem reichsten Born seiner Kenntnisse und Erfahrungen schöpfen ließ und unsere Herzen mit Wissensdrang und Begeisterung erfüllte. Da lernten wir jedem, auch dem kleinsten Dinge Liebe und Achtung schenken, und das warme Naturempfinden, das unserem Leben noch jetzt so viele Stunden reinsten Glückes schenkt, das stammt von da. Und jene Exkursionen zeigten uns auch den frischen, freien Mann, den Freund seiner Schüler, den Todfeind jeder Philisterei und jedes engherzigen Schulmonarchentums. Jeder wußte und fühlte instinktiv, daß ein rechter Naturforscher, ein ganzer Mann und ein warmer Mensch, mit einem Worte, ein Pädagog von Gottes Gnaden, die Hand über uns hielt und Geist und Herz uns bildete. Das wissen namentlich auch die, welche das Glück hatten, in seinem Hause einen Teil ihrer Jugend, d. h. bei ihm und der Frau Hofrätin, die hierbei die rechte Mutter war, zu verleben."

Neben seiner Berufsarbeit fand der unermüdliche Mann noch Zeit, dem öffentlichen Leben seine Dienste zu widmen. Er war Mitbegründer der Geraer All-

gemeinen Turngemeinde, langjähriges Mitglied des Gemeinderats; er gehörte tätig der Feuerwehr an, leitete den Gewerbeverein und war der erste Vorsitzende der Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaft. Eine äußere Anerkennung fand seine segensreiche Tätigkeit in der Verleihung des Hofratstitels und von Ordensauszeichnungen, sowie in der Ernennung zum Ehrenmitgliede vieler naturforschenden Gesellschaften und zum Mitgliede der Academia Carolo-Leopoldina. Nach kurzer Krankheit, welche die Lunge und das Herz ergriff, ging K. Th. Liebe am 5. Juni 1894 im Alter von 66 Jahren zur ewigen Ruhe ein.

Die wissenschaftliche Tätigkeit Liebes, der wir noch zu gedenken haben, umfaßt in der Hauptsache zwei Fächer: Geologie nebst Paläontologie und Ornithologie.

Als wissenschaftlich durchgebildeter Geologe, der sich durch eine stattliche Anzahl ausgezeichneter Abhandlungen hervorgetan hatte, erhielt er im Jahre 1868 von der Königlich Preußischen und Fürstlich Reußischen Regierung den ehrenvollen Auftrag, die geologischen Aufnahmen in Ostthüringen zu leiten. Die weitausgedehnte Tätigkeit, die er hierbei entwickelte, fand — neben der Herstellung vieler Profile und neben den Erläuterungen zu den einzelnen Kartenblättern — einen Abschluß in einer Arbeit, der er die Überschrift „Übersicht über den Schichtenaufbau von Ostthüringen" gab und die zur Festschrift für den internationalen Geologenkongreß in Berlin 1884 bestimmt wurde. Diese Tätigkeit Liebes wurde auch von der Königlich Preußischen geologischen Landesanstalt mit höchst ehrenden Worten anerkannt.

Was uns Vogelfreunde und Vogelliebhaber aber besonders zu K. Th. Liebe hinzieht, war sein Verhältnis zur Vogelwelt. Schon von Jugend auf wurde er von dem Oheim mütterlicherseits darauf hingewiesen. Besuche bei Vater Christian Ludwig Brehm in Unterreuthendorf und die Besichtigung von dessen großartigen Sammlungen steigerten die schon geweckte Liebe zu den gefiederten Freunden, die ihn durch das ganze Leben nicht verließ. Er war ein Vogelliebhaber, wie es nicht allzuviel gegeben hat und gibt. Professor Dr. Hennicke, der uns von Meister Liebe ein warmherziges Lebensbild gezeichnet hat, schreibt darüber:

„Wer Liebe jemals in seiner Wohnung besuchte, wo ein jeder, der sich für Vögel und Vogelschutz interessierte, stets gastliche Aufnahme fand, der wird den Aufenthalt dort nie vergessen. In großen Flugbauern und in vergitterten Verschlägen, die mit Bäumen, Gestrüpp und künstlichen Nistgelegenheiten versehen waren, in den denkbar günstigsten, der Natur abgelauschten Verhältnissen, befanden sich ungezählte Vögel, groß und klein, die durch lauten Gesang und fröhliches, munteres Gebahren Zeugnis davon ablegten, mit welch tiefer Sachkenntnis und Hingabe sie von ihrem Beschützer und seiner Frau gehegt und gepflegt wurden. Ich kann es nicht unterlassen, hier auch die wackere Lebensgefährtin des unvergeßlichen Mannes, Emilie geb. Weißker, zu erwähnen, die es durch die Opferwilligkeit, mit der sie das Halten der vielen Vögel (bisweilen 200) in allen Zimmern hinnahm, dieselben fütterte und pflegte, besonders auch mit großem Geschick junge Vögel aufzog, und sich sogar dem Präparieren von Vogelskeletten unterzog, ihrem Gatten außerordentlich erleichterte, seine Erfahrungen zu sammeln und deshalb an seinen Erfolgen einen großen Anteil hat. Wie unendlich viele Vögel hat Liebe in seinen Räumen zum Brüten gebracht, wie ungezählte Junge hat er aufgezogen! Die meisten seiner Pfleglinge nahmen ihm das Futter aus der Hand. Für selbst gezüchtete Exoten wurde ihm vom Preisgericht auf der Vogel- und Geflügelausstellung in Wien 1892 die höchste Auszeichnung zugesprochen."

Neben seinem Hauptberufe und der hingebenden Pflege der gekäfigten Vögel fand der unermüdliche Mann noch Gelegenheit zur schriftstellerischen Tätigkeit. Die Vögel, über die er geschrieben hat, sind längst nicht mehr, aber das, was er über sie veröffentlicht hat, ist uns als köstlicher Besitz erhalten. Dem schon erwähnten Prof. Dr. Hennicke, der Liebe persönlich nahegestanden ist, gebührt das Verdienst, daß er noch bei Lebzeiten des Meisters, dessen in viele, zum Teil kaum mehr zugängliche Zeitschriften zerstreute Veröffentlichungen gesammelt und im Jahre 1893 im Verlage von W. Malende, Leipzig, unter dem Titel „Hofrat Professor Dr. K. Th. Liebes Ornithologische Schriften" systematisch geordnet, herausgegeben hat. In nicht weniger als 85 Abhandlungen werden die verschiedensten Gebiete der Vogelkunde in ihrem ganzen Umfange behandelt. Der Vogelschutz steht oben an mit dem Geleitworte Liebes, das für alle vogelschützlerischen Bestrebungen auch heute noch die Grundlage zu bilden hat: „Lernet erst das Leben der Vögel genau kennen, wenn Ihr sie mit rechtem Erfolg schützen wollt". Dann folgen eine Reihe monographischer Studien über einzelne Vogelarten, darunter prächtige Sachen, wahre Kabinettstücke! Diesen schließen sich Aufsätze über Vogelfauna, geographische Verbreitung und Einwanderung an. Weiter folgen für uns Züchter wichtige Abhandlungen über Gefangenleben, Pflege und Zucht der Gefiederten; weiteres über Nahrung, Nutzen und Schaden der Vögel und zum Schlusse noch Erörterungen über alle möglichen Fragen der Vogelkunde. Ein stattlicher Band von über 700 Seiten, dem nach dem Tode Liebes der Herausgeber noch einen kleineren Ergänzungsband im Jahre 1905 in E. M. Köhlers Verlag in Gera nachfolgen ließ.

Ob dieser Sammelband heute noch im Buchhandel erhältlich ist, entzieht sich der Kenntnis des Verfassers dieser Zeilen. Vom Antiquar wird er da und dort noch angeboten. Wer das Buch besitzt, freut sich seines Eigentums; wem es gelingt, es sich zuzulegen, wird nicht minder erfreut sein über die Bereicherung seiner Bücherei und seines Wissens.

Bei der führenden Stellung, die sich Liebe in allen Fragen des Vogelschutzes erobert hatte, nimmt es nicht wunder, daß er bald nach Gründung des „Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt" dessen zweiter Vorsitzender und nach Thienemanns Tode im Jahre 1884 der Herausgeber der Zeitschrift des Vereins, der „Ornithologischen Monatsschrift", die heute noch besteht, wurde. Er leitete sie mit größtem Erfolge bis zu seinem Tode. Viele

seiner Aufsätze sind in dieser Zeitschrift erschienen. Erst als die körperlichen Kräfte in seinen letzten Tagen versagten, hat er die fleißige Feder aus der Hand gelegt. Was sie geschrieben, wird noch lange Geltung haben. W. Bacmeister.

Von meinem großen Gelbhaubenkakadu.

Von Ludwig Weitzel.

(Nachdruck verboten.)

In Nummer 37 unserer schönen Zeitschrift vertritt Herr Lichtenstädt in seinem interessanten Artikel: „Von grauen und anderen Papageien" die von anderer Seite bestrittene Ansicht, daß männliche Papageien weibliche Pfleger bevorzugen und umgekehrt. Auch ich kann für die Richtigkeit dieser Ansicht ein gutes Beispiel anführen. Mein seit 24 Jahren in Deutschland lebender großer Gelbhaubenkakadu, ein schönes, voll ausgewachsenes Männchen mit imposanter Federhaube, zeigt eine ganz ausgesprochene Vorliebe für meine Frau und andere weibliche Wesen, obwohl er von einem alten Herrn großgezogen und jahrelang in dessen Gesellschaft gelebt hat. Trotzdem ich ihm regelmäßig sein Futter, Leckerbissen und Nageholz reiche und er nur selten von meiner Frau etwas zu fressen erhält, sucht „Polly", sobald er aus seinem 100×50×75 cm großen Käfig freigelassen wird und dem Haufen Anmachholz in der Küche seinen gewohnten Besuch abgestattet hat, die Nähe seiner Freundin. Er klettert zunächst auf seinen Stuhl, der, nachdem ihn der unermüdliche Papageienschnabel von seinem letzten Rest von Rohrgeflecht gesäubert hat, zum Papageiständer degradiert ist, von da auf den Tisch, und nun schmiegt er sich unter dauerndem freundschaftlichen Schnabelklappern an ihre Wangen an, die dadurch ganz weiß gepudert werden. Ich sitze ihr am Tisch gegenüber, ohne daß er mich jemals aufsuchen würde, außer vielleicht, um aus meinem Pudding sich einige Rosinen herauszupicken oder sich ein Stückchen Frankfurter Wurst von meinem Teller zu stehlen, wonach er aber wieder sofort zu ihr herübermarschiert. Mit Freude klettert er dann auf ihren Schoß hinab, läßt sich dann mit der Zeitung, in der sie liest, zudecken oder gar ganz in diese einwickeln oder noch lieber zärtlich umarmen und drücken. Allerdings mißbraucht er die Freundschaft mitunter dadurch, daß er mit seinem scharfen Schnabel völlig unbemerkt einige Knöpfe von ihrem Kleid abzwickt, die er dann nach seinem Geschmack bearbeitet. Auch zu anderen Frauen geht er ohne weiteres, klettert freundlich klappernd auf ihre Schuhe und läßt sich dann von ihnen hochnehmen und liebkosen. Sämtliche Männer dagegen faucht er feindlich an, ist jedoch im Laufe der Jahre so gesittet geworden, sich auch von ihnen, wenn auch ungern, angreifen zu lassen; ganz zu trauen ist ihm jedoch dann nicht. Als Käfiggenossin hat „Polly" ein schönes junges Weibchen, das er aber kaum beachtet, sondern hin und wider recht schlecht behandelt, obwohl sie ihn, wenn er es gütigst gestattet, gerne kraut und dann von ihm die gleiche Liebkosung, jedoch meist vergeblich, erwartet. Nehme ich ein Stöckchen oder Hölzchen zur Hand und berühre ihn damit rechts und links, sein liebstes Spiel, so fängt er sofort an aufgeregt auf und ab zu wippen, haut mit dem gefährlichen Schnabel halb im Scherz, halb im Ernst nach allen Seiten, schlägt bei noch höherer Aufregung fauchend mit den beiden Flügeln nach vorn, und wenn ich ihm das Holz endlich zu fassen gebe, verwandelt er es mit boshaft funkelnden Augen in Splitter, aber nur solange ich es festhalte und ihm Widerstand leiste, sonst läßt er es sofort interesselos fallen. Versucht meine Frau dasselbe Spiel, so läßt er sich überhaupt nicht darauf ein, regt sich nicht im mindesten darüber auf, sondern betrachtet sie freundlich aus seinen schönen, schwarzen Augen, bis ich das Holz wieder nehme, worauf sofort wieder das vorige Spiel beginnt. Kinder kann er ebenfalls nicht leiden und hat schon mehrere recht schmerzhaft gebissen, nachdem er sich ihnen auf unsere Ermunterung hin anfangs ganz freundlich genähert hatte.

Großer Gelbhaubenkakadu.
Aufnahme von S. Lichtenstaedt.

Von mir nimmt er zwar gnädig Futter an, läßt sich auch wohl kraulen, kommt abends auf Wunsch auf meine Hand, die ihn in seinen Käfig befördert, aber kaum ist er drinnen angelangt, so fordert er mich durch dauerndes Wippen und In-die-Stäbe-Beißen wieder heraus, und wenn ich dann gar mit beiden Zeigefingern nach ihm zu steche, so ist er völlig aus dem Häuschen. Geht dann meine Frau zu ihm hin und sagt etwa: „Ei Polly, was hast Du denn nur?", so beruhigt er sich sofort, bis ich mich dem Käfig wieder nähere. Auf den Ruf meiner Frau läuft er durch zwei Zimmer auf sie zu, mit mir gibt er sich nur ab, wenn ich allein in der Wohnung bin und er, nachdem er des Holzzerkleinerns müde, Unterhaltung sucht. Komme ich morgens zuerst ins Zimmer, so nimmt er von meinem Kommen überhaupt keine Notiz, das Eintreten meiner Frau begrüßt er dagegen mit trompetendem Schrei oder durch einige Worte. Auch sein größter Feind, der schwarzhaarige Kehrbesen, ist dies nur in meiner Hand. Wenn meine Frau vor seinem Käfig damit kehrt, ist die Feindschaft nur halb so ernst. Seine

Zerstörungswut für alles Holz wird praktisch dadurch nutzbar gemacht, daß er das Anmachholz in Scheiten in seinen Käfig bekommt, aus dem es nach kurzer Zeit fertig gespalten zum Feuermachen herausgeholt wird.

Wie widerstandsfähig so ein Kakadu gegen falsche Ernährung ist, zeigt die Tatsache, daß er den ganzen Krieg hindurch ohne einen Bissen Körnerfutter, sondern mit allem, was auf den Tisch kam, ernährt wurde, sein Abendessen bildete sogar meist eine Scheibe des berühmten Kriegsbrots! Noch heute hat er daher eine Abneigung gegen Mais und Erdnüsse und eine Vorliebe für Fleisch und Wurst, die er jedoch nur höchst selten mal bekommt. Überhaupt ist erstaunlich, was ein Papagei im Laufe seines Gefangenschaftslebens alles lernt. Unser Vogel beschmutzt z. B. einem niemals, sondern strebt sofort auf seinen Stuhl, unter dem zu diesem Zweck eine Zeitung ausgebreitet liegt. Früher im Anfang unserer Bekanntschaft pflegte er im frühen Morgengrauen mit einigen Urwaldschreien oder auch seinem gelungenen Jodeln den Wunsch auszudrücken, es möge jemand kommen und sich mit ihm beschäftigen. Nachdem er dreimal diesen Wunsch erfüllt bekam, jedoch nur in der Art, daß der Betreffende gegen ihn das Stöckchen schwang, hat er diese Unart ebenfalls eingestellt, wie er überhaupt in unserem Beisein niemals schreit, obwohl er abends, wenn die Dämmerung eintritt, wie alle Papageien äußerst aufgeregt ist.

Der Vogel hat fast 23 Jahre allein gelebt, und da er, hauptsächlich im Frühjahr, mit breit gefächertem Schwanz, weit geöffneten Flügeln, hochgestellter Haube und außerordentlich gelungenen Verbeugungen und Luftsprüngen, sowie ganz ungewöhnlichen Bauchrednertönen richtige Balzspiele aufführte, wurde ihm das oben erwähnte Weibchen zugesellt, das er aber leider nun so wenig beachtet, obwohl es ihm mit der größten Liebenswürdigkeit und Zuneigung entgegenkommt.

So ist unsere Hoffnung auf Zuchterfolge vorerst, ehe mir ein Tausch des Weibchens gelingt, leider zu Wasser geworden, aber das Vergnügen, das so ein urkomischer Kakadu seinem Besitzer bereitet, kann nur der empfinden, der selbst jahrelang einen solchen verpflegt hat. Wer noch etwas Interessantes über das Gefangenleben eines blauen Aras lesen will, dem sei das an vorigen Weihnachten erschienene Buch von Dr. Knottnerus-Meyer, Direktor des zool. Gartens in Rom, „Tiere im Zoo" angelegentlichst empfohlen.

Das Liebhaberjahr.

Plauderei von J. Birk, Leipzig.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Der Juni läßt bereits wieder ein Abflauen des Gesanges bei überwinterten Vögeln erkennen, ja manche stellen ihren Gesang bereits ganz ein und beginnen mit dem Federwechsel, was um so eher der Fall ist, je länger die Vögel im Käfig sind. Je öfter die Vögel überwintert haben, um so eher beginnen sie mit der Mauser. Ende Juni findet man bereits vollständig vermauserte Vögel im Käfig vor, was als ganz normal für ältere Käfigvögel bezeichnet werden kann. In der bis jetzt innegehabten Fütterung lasse man keine Veränderung eintreten, außer man will bei abgesungenen Vögeln mit Blankfütterung von frischen Puppen beginnen. Seinen Vögeln überhaupt keine frische Ameisenpuppen zu füttern, ist die größte Unterlassungssünde, die sich der Vogelpfleger zu schulden kommen lassen kann; er kann dies wirklich nicht verantworten, denn nur die frischen Ameisenpuppen sind es, die unseren Käfigvögeln nach den Entbehrungen des verflossenen langen Winters wieder neuen Lebensmut geben, sie aber auch für den kommenden Winter widerstandsfähiger machen. Frischfänge soll der Liebhaber in diesem Monat nicht kaufen, denn er unterstützt dadurch eine grausame Handlungsweise mancher Vogelfänger, auch in der Brutzeit Vögel wegzufangen, eine ganz verwerfliche Roheit. Zu entschuldigen ist dies nur, wenn es sich um einen bestimmten Sänger handelt, der beim Flüggewerden seiner Jungen überlistet wird. Die Ernte der Ameisenpuppen ist auf der Höhe, sie sind auf dem Markte fast immer zu haben, falls nicht etwa eine langandauernde Hitzeperiode das Fortpflanzungsgeschäft der Ameisen ungünstig beeinflußt, erst Regen bringt wieder reichlichere Ernte.

Im Juli verstummt so nach und nach das Konzert der edlen Sänger mit einigen Ausnahmen, wie Schwarzplättchen, Rotkehlchen, Buchfinken, Lerchen, sowie alle Körnerfresser, die noch länger singen. Die ersten Jungvögel werden angeboten, die aber niemals den verwöhnten Gesangskenner befriedigen können. Besser sind dahingegen die Jungvögel der eigentlichen Herbstwildfänge, die bereits vermausert und auch etwas mehr vom Naturgesang mitbringen. Wer aber von seiner Liebhaberei etwas mehr haben will als nur Ia Gesang, der diesen sogar zurückstellt hinter die vielerlei Genüsse, die die Beschäftigung mit seinen Pfleglingen dem Liebhaber bringt, dem ist nur anzuraten, sich mit der Aufzucht von Jungvögeln zu befassen, oder doch wenigstens Jungvögel zu käfigen. Er wird mit diesen leichter fortkommen, denn die Pflege macht weniger Schwierigkeiten, trotzdem die Fütterung dieselbe sein muß wie bei alten Wildfängen. Ferner kommen sie leichter in und durch die Mauser und letzten Endes, was mit ein Hauptvorteil für den weniger auf Gesangsgüte achtenden Liebhaber ist, sie singen zeitiger, fleißiger und manche Arten auch bei Licht. Wenn Rausch empfiehlt, man soll, wenn im Juli verschiedene Arten, wie Sprosser, Nachtigall, Blaukehlchen, Sperbergrasmücke, Singdrossel und Amsel noch nicht mausern, bei diesen Arten durch vorsichtiges Ziehen der Schwung- und Schwanzfedern die sogenannte „künstliche Mauser" einleiten, so kann ich diesem Rate, wenn er allgemein gehalten gelten soll, nicht beipflichten, höchstens bereits überwinterte Vögel können damit gemeint sein, niemals aber Frischfänge. In meiner Praxis habe ich gefunden, daß auch noch im August Frischfänge verschiedener Arten ohne irgendwelchen Eingriff in die Mauser kommen, ausgenommen wäre höchstens die Sperbergrasmücke, die auch als Frühjahrsfrischfang meistens schon zeitig in die Mauser kommt, ja vielfach schon im Juni. Ehe man also kurzerhand bei derartigen säumigen „Mauserern" die Federn zieht, prüfe man den Fall erst und forsche nach der

etwaigen Ursache dieser Stockung. Nach meinen Beobachtungen werden meistens Frischfänge, die nicht in den Gesang gekommen sind, eben dadurch schwierig in den Federwechsel kommen. Eigentlich muß jeder Käfigvogel die naturgemäße Mauser zur normalen Zeit absolvieren, wenn er weiterhin als Käfigvogel widerstandsfähig sein soll, doch gibt es Arten, die auch trotz übergangener Mauser ohne sichtbare nachteilige Folgen auch weiter ein lebensfrohes gesundes Dasein führen, indem sie einfach das Versäumte bei der nächsten Mauser nachholen. Anders steht dies bei manchen Arten, wie Sprosser, Nachtigall, Gelbspötter, Sumpfrohrsänger, wie überhaupt die Laubvögel und Rohrsänger, ebenso auch die Heidelerche,

Großer Gelbhaubenkakadu.
Aufnahme von S. Lichtenstaedt.

bei der ersten Käfigmauser, alle diese sind darin empfindlich und zählen vielfach zu Anfang des Winters zu Todeskandidaten. Darum, wenn alles vergebens und der äußerste Termin verstrichen ist, dann nicht mehr zaghaft und die Federn vorschriftsmäßig gezogen. Viel ist da nicht mehr zu verderben, entweder so oder so, da das Leben des Vogels auf dem Spiele steht. Jetzt im Juli ist auch die Zeit, wo der Liebhaber nicht vergessen darf, seinen Körnerfressern solange wie erhältlich halbreife Sämereien zu bieten, ebenso auch ständig Grünzeug vom ersten zarten Grün im Frühjahr bis zum Eintritt des Frostes. Die Samenrispen des Wegebreit werden von allen Körnerfressern im halbreifen, sowie reifen Zustande sehr gern angenommen, meine Hänflinge sind geradezu versessen darauf und beachten das übrige Futter erst, nachdem sämtliche Samenrispen kahl gefressen sind. Der Liebhaber soll daher ständig im Wandel der Jahreszeiten forschen und suchen, was sie ihm an Naturfutter, seien es Insekten, Sämereien oder Beeren, für seine gefiederten Lieblinge bringen, denn Abwechslung im Speisezettel ist der beste Arzt, der vorbeugt und auch kuriert.

So haben wir die Monate des Liebhaberjahres, was sie uns an Freud und Leid bei der Vogelpflege bescheren, kurz umrissen an uns vorüberziehen lassen, und wollte man alles, was im Verlaufe des Liebhaberjahres auf den Pfleger an zu lösenden und auch niemals zu lösenden Fragen eindringt, in den einzelnen Fällen spezifizieren, so müßte man ein starkes Buch schreiben von dem, was einem nahezu 30 Liebhaberjahre darin gebracht haben. So zieht ein Liebhaberjahr nach dem anderen auf unserem kurzen, leidensvollen Lebensweg vorüber, jedes bringt uns ein Übermaß von Arbeit, Leiden und Freuden, und wollen wir offen sein, letztere überwiegen alle Widerwärtigkeiten dermaßen, daß sie vollständig verblassen vor dem, was uns die Beschäftigung mit einem Stückchen Natur, was uns die Vogelliebhaberei an seelischen Werten bringt, wie sie unser Gemüt veredelt.

Großer Gelbhaubenkakadu.
Aufnahme von S. Lichtenstaedt.

Alle Jahre, wenn mir die Natur den kommenden Herbst durch die von uns scheidenden Mauersegler verkündet, denke ich zurück an das verflossene Liebhaberjahr und setze den dabei erfahrenen Enttäuschungen die neu zu setzenden Hoffnungen des kommenden Liebhaberjahres entgegen, und ziehe ich den Schluß aus meiner Tätigkeit als Vogelliebhaber, so komme ich zu dem Ergebnis, daß das Leben mit seiner Härte, seiner Arbeitslast doch schön ist und verdient gelebt zu werden. Unsere Gegner sollen einmal in sich gehen und unparteiisch und unbeeinflußt von ihrer Auffassung sich fragen, ist es wirklich Tierquälerei, wenn ein Familienvater mit einer zahlreichen Kinderschar, für deren Wohlergehen er alle seine Kräfte in dem Kampf ums Dasein opfern muß, sich mit lieben Geschöpfen der Natur befaßt, sie ebenso pflegt wie die eigenen Kinder, zur Finanzierung dieses seines Herzensbedürfnisses manchen Genusses entsagen muß, täglich mindestens eine Stunde Schlaf zur Versorgung seiner Schützlinge opfert, kurz gesagt, keine Mühe und Kosten scheut, sollte er dieses alles, alles nur tun, um einer Tierquälerei zu fröhnen? Nein, die Liebe zur Natur und ihren Geschöpfen, das Herzensbedürfnis zur ständigen Fühlungnahme

mit der Natur, die Freude an ihr, alles dies ist es, was uns zu Vogelliebhabern gemacht hat und was uns Vogelliebhaber sein lassen wird bis zu dem Tage, an dem wir das letztemal im letzten Liebhaberjahr den südwärts ziehenden Seglern wehmütig auf ein Nimmerwiedersehen nachblicken.

Mein Waldkauz.

Von W. R.

(Nachdruck verboten.)

Über ein Jahr ist's her, daß man ihn zu mir brachte als kleines über und über wolliges Etwas; aber trotzdem ist mir's, als wäre es eben, als klänge eben noch das girrende Zirpen des hungrigen Käuzchens an mein Ohr, als blickten mich noch eben unter rot geränderten Lidern die blauen Augen des jungen Waldkauzes an. Eine schnell mit Stroh ausgelegte Kiste nimmt den Ankömmling auf. Zu schwach sind die Fänge, um dem Tierchen das Stehen zu ermöglichen; doch der gebogene Schnabel hakt sich am Kistenrande fest und so einen Angelpunkt gefunden habend, versucht sich der kleine Wollklumpen aus der Kiste zu ziehen. Es bleibt bei dem Versuche. — Glücklicherweise ist etwas zartes Rindfleisch im Hause. Es wird in trockenen Ameisenpuppen gewälzt, und gierig verschlingt das Eulchen einige Happen. Das war am 27. April 1924, einem Sonntage. Da es mir unmöglich ist, natürliches Futter herbeizuschaffen, gebe ich auch die folgenden Tage fein gewiegtes, in Puppen und Federn (zur Gewöllbildung) gewälztes Fleisch. Anfangs geht alles gut. Mitten in der Woche aber verweigert mein Pflegling mit einem Male die Nahrungsaufnahme, und die unnormalen, höchst widerlich riechenden Entleerungen zeigen mir, daß mit aller Kunst bei dieser Fütterung nichts zu erhoffen ist. Schon würgt das Tierchen die mühsam eingestopften Happen wieder heraus. Was tun? Da bringt man mir einen frisch geschossenen Spatzen. Wie im Spiel lasse ich ihn vor dem Schnabel des Kauzes hin- und herpendeln. Gierig faßt er zu. Natürlich ist er viel zu schwach und unbeholfen, um etwas abzubekommen. Als ich mir aber die Mühe nicht verdrießen ließ und ihm kleine Stückchen des mit Knochen und Federn fein zerhackten Spatzen einzustopfen, da schlingt mein Käuzchen, was es schlingen kann, und im Nu ist von dem Spatzen nichts mehr übrig. Das war etwas Besseres als das langweilige Rind- und Kalbfleisch mit den trockenen Puppen und den anhaftenden Federn. Zum Glück hat es sich herumgesprochen, daß ich eine junge Eule zu verpflegen habe, und so bekomme ich bald Spatzen, bald Mäuse oder Ratten und Maulwürfe. Sichtlich vorwärts gehts jetzt mit dem jungen Kauz. Ist es zwar nicht gerade appetitlich, ihm Stück für Stück zu zerhacken und vorzulegen, so entschädigt andererseits die Freude am Gelingen der Aufzucht für diese Mühe. War das Tierchen, als ich es erhielt, nur in weiße Dunen gehüllt, so brachen jetzt allenthalben Kiele hervor; besonders der Federkranz um die Augen gibt dem Tierchen ein komisches Aussehen. Nicht mehr hockt es dauernd in seiner Kiste, sondern richtet sich bereits manchmal schon auf und steht einige Zeit oder trippelt unbeholfen umher. Scheint aber die Sonne durchs Küchenfenster, dann breitet das Nachtgespenst seine Flügelchen, daß man all die hervorsprießenden Federchen sehen kann, sträubt all die andern Federchen des kleinen Körperchens und läßt sich die Sonne ordentlich auf die Haut scheinen. Von Tag zu Tag sieht man deutlich, daß es mit Riesenschritten in der Entwicklung vorwärts geht. Freilich Sorge und Mühe macht manchmal die Beschaffung des Futters. Und welche Portionen der Kauz zu verschlingen vermag, das weiß und glaubt nur der, welcher es einmal selbst mit angesehen hat. Mäuse verschlingt er jetzt unzerstückelt. Vorsichtig faßt der Schnabel den Kopf der Maus. Ein kräftiges Rückwärtsschlagen des Eulenkopfes unter gleichzeitigem Öffnen des Schnabels und die Maus ist mit ihrem ersten Drittel im weiten Rachen verschwunden. Eine kleine Ruhepause. — Wieder das eigenartige Rucken, wieder verschwindet ein Stück des Mäusekörpers in dem weiten Rachen der Eule. Schließlich baumelt nur noch der Schwanz wie das Rohr einer Tabakpfeife aus dem Schnabel. Ein Recken geht durch den Körper der Eule, hoch aufgerichtet sitzt sie da, ein letztes Schlingen und auch der Schwanz der Maus ist verschwunden. Deutlich tritt der erweiterte Kropf des Kauzes hervor. Drollig ist's jetzt, wenn er in den Vormittagsstunden in der Küche umhertrappelt. Der Finsterling ist zum Tagvogel geworden. Kein Plätzchen bleibt ununtersucht. Oft werden die mächtigen Schwingen, die doch so seidenartig weich sind, geschwungen. Mit Hilfe ihrer und der scharfen Krallen und des gebogenen Schnabels, mit welchem er sich geschickt anzuhängen vermag, erklettert der junge Kauz Tische, Stühle und Schränke und landet im Gleitfluge von da aus irgendwo. Bald wird's ungemütlich mit dem aufdringlichen Burschen, dessen Entdeckerfahrten selbst vor der heißen Herdplatte keinen Halt machen. So muß er auswandern und erhält als Wohnraum die Waschküche angewiesen. Dort kann er sich tummeln so viel er will. Am Nachmittage aber wandert er mit hinaus in den Garten, erklettert geschickt die kleinen Zwergbäumchen, um auf ihren Zweigen hockend Umschau zu halten. Spaßig sieht er aus, wenn er hoch aufgerichtet dasteht auf seinen kräftigen, dicht befiederten Fängen, mit den scharf bekrallten Zehen (11. 5. 24.) Recht fest vermögen sie schon zuzufassen und tief graben sich die harten Nägel ins Fleisch, wenn man den krabbeligen Kobold einmal, auf der Hand sitzend, umhertragen will.

Weiter und immer weiter schreitet die Entwicklung vor sich. Feder um Feder schiebt sich über das Wollkleid, mit leisem Fluge huscht die Eule bereits dahin. Aber erst soll sie vollständig selbständig werden, ehe sie von uns Abschied nimmt. Darum bekommt sie, wenn wir sie mit in den Garten nehmen, eine starke Schnur um den Fang. So kann sie die frische Luft genießen, ohne daß es mit der Nachbarschaft Ärger und Verdruß gibt. Gar possierlich hockt das Tierchen auf seinem Sitz, den ich ihm, einer Jule ähnlich, angefertigt habe. Was hat der Fink da zu schelten? Rüp, rüp, rüp, immer näher kommt er, nimmt der Eule gegenüber Platz,

und nun legt er los, so gut er kann. Mit einem Male ist die Amsel da: tack tack tack, so geht es, und pickpickpick, schilp schilp schilp, so schelten die Spatzen, und karr karr schilt die Nachtigall. Selbst der Star, der mit Futter zu seinen Schreihälsen im Bretterkasten fliegen will, kommt herbeigeflogen, schnarrt ärgerlich. Am tollsten aber treibt es der Spötter. Die Scheitelfedern sträuben sich, laut zirpend und zuletzt singend, stürzt er sich auf den Finsterling. Der wiegt das Köpfchen, knackt mit dem Schnabel, trappelt auf seiner Sitzgelegenheit hin und her und mit einem Male breitet er die Schwingen. Wollte er sich auf einen Frechling stürzen, oder wollte er nur einem sicheren Plätzchen zufliegen? Die Fessel hindert ihn, sein Vorhaben auszuführen. Um so lauter schreiend und scheltend umflattern ihn dafür die erbosten Vögel. Ein wahrer Höllenlärm erfüllt den Garten. Zu der einen Amsel haben sich schon lange mehrere gesellt. Krächzend kam der Pirol herbeigeflogen. Mit lautem Huid umflattern einige Haubenlerchen den verhaßten Nachtvogel. Da ist auch der Gartenrotschwanz mit seiner weißen Kappe und dort sein Vetter, der Hausrotschwanz. Am tollsten aber haben sich die Amseln. — Manche Stunde habe ich so in der weinumrankten Laube oder im dichten Gebüsch verborgen gesessen und dem Hexentanz zugeschaut, manchmal auch einen Spatzen zum Fraße für die Eule dabei geschossen. Das alles konnte die andern nicht viel stören. Je ruhiger sich der Kauz sogleich darüber hermachte, um die noch warme Beute zu verschlingen, desto rasender gebärdeten sich die andern. Die meiste Ausdauer bewiesen die Amseln. Mochte der Kauz schon längst in sicherem Gewahrsam in der Waschküche sitzen, mochten sich alle andern, die auch den Finsterling gehaßt hatten, schon wieder zerstreut haben, sie flatterten noch erregt von Zweig zu Zweig, tackten und pickerten und wollten sich nicht beruhigen. — Vieles geht mir durch den Sinn, wenn ich an meinen Waldkauz zurückdenke. Sein erstes Bad — eine Gelte mit Wasser war zufällig in der Waschküche stehen geblieben. Daß eine Eule badet, daran hatten die Meinen nie gedacht. „Ach sieh doch mal schnell, der Kauz hat sich wohl heute Nacht einen Flügel gebrochen!" So schnell, wie den Morgen, war ich noch nie in der Waschküche. Wirklich, da im Halbdunkel hockte die Eule und ließ die Flügel hängen, weil — sie vor Wasser trieften. Zu lieblich hatten die Morgensonnenstrahlen ihre Kringel auf das klare Wasser gemalt, als daß da nicht selbst eine Eule hätte widerstehen können. Sie mußte in die kühlen Fluten steigen. Oft konnten wir sie späterhin dabei belauschen, wie sie hinein ins kühle Naß stieg, mit den Schwingen schlug und naß wie eine gebadete Katze mühsam ihr Plätzchen aufsuchte. Kräftig schlugen die Schwingen, mächtig schüttelte sich der Körper, und ein feiner Sprühregen rieselte hernieder. Dann aber bekam der Schnabel Arbeit, glättete und ordnete jede Feder, einige Flüge von Sitzplatz zu Sitzplatz in der geräumigen Waschküche, und trocken prangte in seidigem Gefieder mein Waldkäuzchen. Sein Gehör: das Gehörorgan der Eule ist ein Wunderwerk der Natur. Mochte noch so leise meine Schuhsohle auf dem Ziegelfußboden knirschen, schon wandte sich das Köpfchen dahin, mochte mein Finger noch so leise im Scherz an der rauhen Wand krabbeln, das Eulenohr hatte es gehört und neugierig suchten die Eulenaugen den Fleck. Leise knistert das Brotpapier in meiner Tasche. Die Eule hat es vernommen, macht sich schlank, dreht das Köpfchen schräg zur Seite und blickt von oben her, als wollte sie das Innere meiner Tasche ergründen. Einmal war ich in Sorge um sie. Kein Futter rührte sie an. Noch in der Dunkelheit ging ich einmal zu ihr hinein. Sollte das Tierchen krank sein? Aber die Augen schauten doch so munter drein! Da, als ich dem Käuzchen freundlich zuspreche, wendet es den Kopf dem Herde zu. Größer scheinen die Augen zu werden und mir will's scheinen, als glühten sie ordentlich. Einige

Waldkauz.

Male kreist der Kopf. Ganz Aufmerksamkeit ist die Eule geworden. Still bin auch ich und schaue zum Herde hin. Da, jetzt habe auch ich es vernommen, jenes leise Rascheln einer huschenden Maus. Weidmannsheil wünsche ich und gehe frohen Mutes zu Bett. Daher seit einigen Tagen die Vorliebe für den Herd, daher die Futterverweigerung. Freilich: selbsterlegte Beute mundet besser. — Ein lieber Genosse war uns der Finsterling geworden, lehrreich und zugleich befriedigend war es uns, zuzuschauen, wie mit dem Wachstum, ohne daß er irgendwie Anleitung erhalten hatte, sich seine natürlichen Fähigkeiten entwickelten. Urkomisch waren seine Stellungen, wenn er sich des oft umfangreichen Gewölles entledigte. Dieses Rucken und Strecken, dieses Neigen und Drehen des Kopfes, das Sträuben der Federn, daß man wirklich von Gesichterschneiden reden möchte, dieses Trippeln und Trappeln mit den Fängen, und dann öffnet sich der weite Rachen, ein-

mal und noch einmal und wieder und endlich klatscht ein Pfropfen, mausgroß und schleimig, Haare, Federn, Knochen und andere unverdauliche Stoffe bergend, zu Boden. Der Vogel schüttelt den Kopf, schüttelt den Körper, plustert die Federn und nun merkt man's, auch ihm ist jetzt recht wohl, nach dem diese Frohnarbeit vorbei ist. — Bis in den August hinein erfreuten wir uns des Kauzes. Da mußten wir ihn, wie schon oft der Wäsche halber, in der Kammer nebenan unterbringen. Laut quietschend hatte er dagegen protestiert. Drum mußten wir noch einmal nachsehen, ob er auch gut in seinem neuen Heim saß. Da huscht mit geisterhaftem Flug ein Schatten durch den Türspalt. Der Waldkauz hatte seine Freiheit. Laut lärmten die Vögel im Nachbargarten. Dann war's still. Der Kauz hatte ein sicheres Plätzchen gefunden. Oft hörten wir nachts seinen Ruf. Und als ich jetzt nach einem Jahr im Garten eine Eulenfeder fand, da dachte ich wieder an ihn, unseren lieben Gefährten, und hatte nur den einen Wunsch, möcht sie von ihm sein, und möchte er sich noch recht lange seiner Freiheit freuen.

Notizen aus vergangenen Jahren.

Von A. Jena, Biberach/Riß.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

1860. Biberach, den 18ten März.

Werther Freund Fr. Biller!

Ich kann nicht unterlassen an Euch einen Brief zu schreiben, ich gehe schon lang damit um, hatte schon im vorigen Jahr im November an Sie schreiben wollen u. brachte es nicht dazu, aber jetzt wird es die höchste Zeit seyn, daß Sie der Brief noch zu Hause antrifft. Ich bin nehmlich der Schmied von Biberach u. Sie werden Ihnen noch erinnern können, daß ich vergangenes Jahr im Mai anno 1859 bei Ihnen in Ulm in dem Wirtshaus „zur Stadt" war und Ihnen einen Ungarischen Sprosser abgekauft habe; ich hätte jetzt die Bitte an Sie, mir über diese Vögel eine Auskunft zu ertheilen, ich verlange nicht, daß Sie dabei in Unkosten kommen und habe Ihnen deswegen Briefmark eingelegt, welche Ihnen in Österreich ein Kaufmann gern auswechselt, so daß Sie also mir antworten können. Sie werden sich noch erinnern können, daß ich noch am Abend zu Ihnen in die „Stadt" kam, wo Sie logierten; dann gingen Sie gleich mit mir hinauf in die Kammer, wo ihre Vögel waren, und hatten gesagt, ich könne vielleicht noch einige hören schlagen, aber es sey schon ziemlich spät; wir gingen miteinander hinauf und Sie hatten dann auf einem Papier gerieben u. gelockt, dann that noch ein Vogel einen Schlag, blos einige Silben und diese Stimme kam mir so schön vor, daß ich erstaunen mußte. Und dieser Vogel, der diesen herrlichen Schlag getan hatte, war derjenige Vogel, der in einem grünen Käfig ganz allein auf den andern Käfigen, wo auf dem Tisch standen, droben stand. Sie hatten auch gesagt zu mir, dieses sey ihr fleißigster Vogel, wo Sie bei Ihnen haben u. haben gesagt, es habe ihn ein Offizier herausgesucht, wenn ich ihn aber wolle, so könne ich ihn haben. Sie thäten dann aber einen andern Vogel wieder hinein, weil es nun aber schon spät war, so haben wir zu einander gesagt, wir wollen es ganz gehen lassen, bis am andern Morgen und weil ich zu Ihnen gesagt habe, ich bleibe bei Ihnen in der nehmlichen Kammer über Nacht, dann können wir am frühen Morgen noch hören u. hätten die Wahl, dann ließen wir am Abend die Vögel in Ruhe. Daß es mir dann hinterlich gegangen ist, weil ich noch am selben Abend nach Töflingen hinaus mußte und bis ich hereinkam der verdammte Wirth mich nicht mehr hereinließ, wissen Sie noch wohl. Ich kam also gleich am andern frühen Morgen zu Ihnen hinauf, wo Sie gerade auch aufgestanden sind und dann haben wir die Vögel recht miteinander angeschaut. Jetzt werden Sie sich erinnern können, daß mir die Wahl fürchterlich weh that, und ich nicht wußte, ob ich den nehmen sollte, wo also in dem grünen Käfig auf den andern droben stand u. am Abend vorher diese schöne Stimme hatt hören lassen, oder den, wo ich dann genommen hatte, u. auch noch habe. Ich habe diesen, wo zu hinterst an der Wand in einem eichenen Käfig hing, gleich wenn man zu der Thür hineinkam links. Ich habe deßwegen diesen Vogel genommen, weil er viel größer u. stärker u. gesprökelter war, als der andere, und meinte dann (in meiner Dummheit), es sey am gewißesten ein Ungar u. jetzt hatt es mich schon oft vielmals gereut, daß ich nicht den andern Vogel noch zu diesem genommen habe; oder wenn ich nur einen genommen hätte, denselben, wo wir haben hören schlagen. Jetzt sind Sie so gut und thun Sie mir den Gefallen u. schreiben Sie mir auch die große Auskunft, nehmlich, ob mein Vogel auch diesen schönen Schlag bekommt, vielleicht später, wenn er einmal ausbricht, wie also dieser gehabt hatt, wo ich noch gehört habe und mir die Wahl weh that, ob ich nicht denselben nehmen solle; oder waren es zweierlei und giebt es zweierlei Arten von Sprosser? Vielleicht, denn auffallend war es, daß der eine, wo ich genommen habe, bedeutend größer und gesprenkter an der Brust war und der andere also viel kleiner und ganz fein gesprenkt war. Daß derselbe ein noch junger Vogel war, habe ich wohl gesehen, allein es steht auch in meinem Vogelbuch, daß man einen Unterschied halte bei den Sprossern, nehmlich es gebe Ungarische u. Polnische Sprosser und die Ungarische werden im Schlagen für feiner und beßer gehalten als die Polnischen und auch ich kann mich noch erinnern, Ihr seeliger Bruder, als Sie miteinander hier in Biberach waren vor 14 Jahren, hat etwas gesagt von Ungarische u. polnische Sprosser u. so scheint es mir jetzt, ich habe einen Polnischen bekommen und dieser, wo so schön geschlagen hat und kleiner u. feiner war, ist ein Ungarischer gewesen, so nach meiner Meinung. Seyd nun so gut, und schreibt mir also über dieses die Wahrheit. Denn ich gebe u. kann Ihnen keine Schuld geben, wenn ich den rechten Schlagvogel oder die Art nicht habe; denn Sie haben mir ja die Wahl gelaßen. Mein Vogel ist sonst ganz schön u. gesund u. hatt den 4ten Tag schon anfangen schlagen, als ich ihn hier hatte; aber ich mußte ihn einigemale verstellen, weil ich Maurer u. Zimmerleute hatte, und so kam der Vogel nimmer recht in

den Schlag hinein und die Zeit war dann bald auch vorüber; jetzt hatt er wieder angefangen seit ungefähr 4 Wochen, aber schlägt eben noch nicht laut, die andern Nachtigallen auch noch nicht; Jetzt will ich nur wissen, ob es eine rauhere Art ist und den schönen Schlag nie hatt und bekommt, wie dieselbe hatte, oder ob sie auch noch diesen Schlag bekommt, wenn sie einmal ausbricht. — Wenn es seyn kann und Sie es noch wissen, wer den Vogel von Ihnen bekommen hatt, wo ich da immer meine, u. mich reut, daß ich ihn nicht genommen habe, so schreiben Sie es mir auch; es wird doch nicht der seyn, wo der alte Herr Ebner hatt, sonst haben Sie, wie ich erfahren habe, keinen verkauft in Ulm an den Ebner; schreiben Sie mir auch, ob ich drauf rechnen kann, daß mein Ungar auch bei Nacht schlägt; in meinem Vogelbuch heißt es, daß beinahe alle Ungarn bei Nacht schlagen, und meine 2 Ungarn, die ich vor 14 Jahren bei Ihnen hier kaufte, haben auch beide viel bei Nacht geschlagen, namentlich einer, den ich aber leider nur ein Jahr hatte. Derselbe hatte am Abend 9 Uhr angefangen und die ganze Nacht durchgeschlagen u. wie schon vorn im Brief gesagt, Ihr seelg. Bruder hatt dort zu mir gesagt, ich habe zweierlei, der große sey ein Polnischer u. also grade der kleine hatt so schön bei Nacht geschlagen. Ich ersuche Sie also nochmal, sind Sie so gut und berichten Sie mir gleich über diese Sache u. sollt es so seyn u. zweierlei Arten geben, u. Sie dieses Jahr wieder nach Ulm kommen, deßwegen schreibe ich jetzt Ihnen, so berichten Sie mir in dieser Antwort, auf welche ich warte, dann würde ich Sie ersuchen mir einen solchen Vogel, wie derselbe war, der solche Stimme hatte, gleich auf der Reise für mich auf die Seite zu thun und dann würde ich ihn bei Ihnen in Ulm holen, aber es müßte ein Nachtvogel seyn, noch jung, wenn's seyn kann einjährig, u. wie gesagt, wenn es 2 Arten gibt, ein echter Ungarischer; er dürfte also nicht so groß wie der eine seyn und nur ganz fein gesprenkelt. Sie haben noch erwähnt, als ich den meinen genommen habe, da hätte ich Ihren größten Vogel. Es grüßt etc.

(Fortsetzung folgt.)

Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten.

Von J. Kuntzendorff, Berlin.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Im Laufe der Zeit gelang es mir vorstehend angeführte Arten zu erwerben. Nur die Schmucktangare hielt ihren Einzug bei mir zur Zeit, als ich meine Vögel noch in Käfigen beherbergte. Die übrigen vier Arten kamen hinzu, als das Vogelhaus schon erstanden und bevölkert war. Diese Tangaren eignen sich, im Grunde genommen, weniger für eine Käfighaltung, da es durchweg sehr ruhige, wenig bewegliche und nicht sehr anmutige Vögel sind, zumal ihre gesanglichen Leistungen alles andere, als schön zu nennen sind. Wegen ihrer, im Vergleich zur Purpurtangare, mehr schlichten, wenn auch durchaus nicht unschönen Gefiederfärbung — sie wirken im Gegenteil durch die ruhigen Farben neben den farbensprühenden der anderen sogar sehr wohltuend —, haben sie nicht den Vorzug, den die bisher genannten Arten aufweisen, d. h. Schmuckvögel im wahrsten Sinne des Wortes zu sein. Es werden daher Liebhaber, die darauf angewiesen sind, ihre Vögel in Käfigen zu halten, diese Tangaren leicht überbekommen.

Ihre Unterbringung im Flugraum machte mir eigentlich weniger Kopfschmerzen; das einzige, wofür ich Besorgnis hegte, war die Frage: Werden sich diese Tangaren alle miteinander und mit ihren kleineren Verwandten sowie mit den anderen Vögeln vertragen. In der Literatur waren die zu Tanagra gehörenden Arten teilweise als friedfertig angegeben, es bereiteten mir hauptsächlich die Schmuck- und die Palmtangare in dieser Hinsicht Sorge, da erstere als



Waldkäuze.

bösartig angegeben war und letztere auf mich den Eindruck eines streitbaren Vogels machte. Aber ich hatte in betreff dieses Punktes entschieden Glück, alle fünf Arten erwiesen sich als durchaus verträglich, sogar die übel beleumundete Schmucktangare tat mir den Gefallen, den schlechten Ruf, in dem sie stand, nicht zu bewahrheiten. Selbst die zartesten Vögel konnten sich ohne Befürchtung in deren Nähe im Gezweige niederlassen, konnten ohne Zank und ohne fortgejagt zu werden, mit diesen Tangaren gemeinsam ihre Mahlzeiten einnehmen. Selbstverständlich herrschten kleine Plänkeleien unter den Tangaren selbst und unter den übrigen Fruchtfressern an den Obsthaltern, doch ohne in ernstlichen Tätlichkeiten auszuarten. Wollte doch jeder den besten Bissen ergattern. Um die Verträglichkeit zu fördern, muß man eben dafür Sorge tragen, daß erstens im ganzen genügende Gelegenheit, sich am Obst zu delektieren, vorhanden ist, zweitens auch jede Obstart, die man reicht, den Vögeln in genügender Menge zu Gebote

steht. Es mag sein, daß dadurch, daß ich diesem Prinzip huldigte, ein Hauptmoment für die Streitsucht sonst eventuell nicht ganz friedlicher Vögel aus dem Wege geräumt wurde.

Das Wesen dieser Tangaren änderte sich mit dem Zeitpunkt ihrer Unterbringung in den Flugraum völlig. Waren es vorher im Käfig stille und ruhige Vögel, so entwickelten sie jetzt eine Beweglichkeit, die man eigentlich diesen Phlegmatikern gar nicht zugetraut hätte. Das war ein Hin- und Herhuschen in den Gebüschen, ein Fliegen und sich beinahe Überstürzen, daß man diese früher ruhigen Gesellen gar nicht wiedererkannte. Sie hielten sich meist in den obersten Teilen der Sträucher und des Strauchwerks auf und bevorzugten die hoch an der Wand angebrachten Zweige denen in niederen Lagen befestigten gegenüber. Freistehende, wenig über dem Boden befindliche Äste mieden sie; die Felspartien wurden gar nicht beachtet. Das Badebedürfnis dieser Tangaren ist ein großes zu nennen, mehrmals am Tage nehmen sie die gebotene Gelegenheit dazu wahr. Auf den Boden kamen sie nur zur Nahrungsaufnahme. Der Flug ist gerade und schnell, jedoch im allgemeinen nicht sehr gewandt. Wie die meisten meiner Vögel legten sie eine recht große Zahmheit an den Tag, kamen getrost zu den in meiner Nähe befindlichen Zweigen, neugierig verfolgend, was ich tat, aber richtig zutraulich wurden sie nie. Es liegt nach meinem Dafürhalten im Charakter der Tangaren ein gewisses, nicht überwindbares Mißtrauen, das auch bei der größten Zahmheit nicht schwindet. Die Eingewöhnung gestaltet sich in keiner Weise schwierig, mit dem bei den anderen erprobten Eingewöhnungsfutter vollzog sie sich in ganz normaler Weise. Die definitive Fütterungsart wurde in derselben We se vorgenommen, wie bei der Purpurtangare. Die Tanagra-Arten sind, ebenso wie die letztgenannte, wenn eingewöhnt, hart zu nennen und wegen ihrer ruhigen Farbenschönheit, ihres recht lebhaften Wesens und ihres verträglichen Charakters — bei der Schmucktangare ist jedoch auf alle Fälle stets Vorsicht besonders am Platze — für die Volierenhaltung zu empfehlen und bilden wertvolle Schmuckstücke eines jeden Flugraums.

Die Sänger- oder Schwarztangaren — Tachyphonus *Vieill.* unterscheiden sich äußerlich von den übrigen Tangaren durch ihren schlankeren Schnabel und durch ihr einfarbiges, höchstens durch nur ganz geringe andersfarbige Abzeichen an Kopf, Flügel oder Bürzel verziertes Federkleid. Sie gelten als harte und ausdauernde Stubenvögel, sind aber bedauerlicherweise zu den unverträglichen und bösartigen zu zählen. Infolge dieser Eigenschaften eignen sie sich weniger für den Flugraum und kommen hauptsächlich für die Käfighaltung in Betracht. Doch sind bei den Schwarztangaren nicht alle Individuen mit solchen unangenehmen Zugaben bedacht, es kommen auch hier Exemplare vor, die man als durchaus verträglich ansprechen muß, wie ich es an den meinigen erfahren habe. Also auch bei dieser Gattung zeigt sich der Individualismus, und zwar, wie ich später ausführen werde, in recht erheblichem Maße. Sie ernähren sich in der Freiheit in gleichem Maße von Insekten, Früchten und Sämereien. In der Gefangenschaft reicht man ihnen Kerbtiere, Universalfutter, Obst, Beeren und Sämereien, wie Hirse, Spitzsamen, Mohn und gequetschten Hanf. Von den bisher eingeführten vier Arten habe ich zwei gehalten.

(Fortsetzung folgt.)

Vogelschutz.

Vortrag gehalten im „Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln" vom 2. Vors. Herrn Dr. Stehle.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Doch auch durch direkte Verfolgung hemmt der Mensch die Vermehrung vieler Vogelarten, besonders gilt dies für bereits selten gewordene, auffallende oder schädliche Arten. Bei den ersteren muß ich



Waldkauz.

hauptsächlich an unseren recht selten gewordenen Wiedehopf denken, wie soll uns dieser schmucke Bursche erhalten bleiben, wenn ihm jeder Sonntagsjäger mit der Schrotspritze auf den Leib rückt. Von den schädlichen Vögeln sind manche Raubvögel, Reiher und Eisvögel in ihrer Existenz bedroht; ihrer sollten sich ideal denkende Großgrundbesitzer annehmen, nur sie können uns diese interessanten Erscheinungen retten. Der Vogelliebhaberei kann im großen und ganzen wohl kaum der Vorwurf gemacht werden, an der Abnahme der Vögel schuld zu sein, denn die gekäfigten Kleinvögel sind dort, wo sie gefangen werden, so häufig, daß die geringe Herausnahme aus der großen Zahl völlig unbemerkt bleibt. Doch auch hier gibt es Ausnahmen. Merklich gelichtet wird durch den Fang sicher die Nachtigall in dichtbevölkerten Gebieten. Sie macht sich durch ihren Schlag sehr rasch bemerkbar und ist so leicht zu erwischen, daß der Fänger eine Gegend systematisch abfangen kann. Welchen Verlust an ideellen Werten die Allgemeinheit durch eine solche

Verödung erfährt, brauche ich wohl kaum zu betonen. Ein Mittel hiergegen kann nur das Verantwortlichkeitsgefühl der Liebhaber schaffen, die Nachtigallen nur vereinzelt käfigen und das Leben dieser Aristokraten unter den gefiederten Sängern als kostbar hüten. Leider gibt es andere Arten, denen wir unseren Schutz nicht angedeihen lassen können, ich denke da vor allem an die Hekatomben von Vogelleben, die alljährlich im Süden geopfert werden. Wir sahen, daß gewissen Vögeln, wie Lerche und Rebhuhn, die Zunahme des bebauten Ackers zugute kam und ihre Vermehrung förderte; gleiches sollte man von der Wachtel erwarten und doch nimmt deren heiterer Schlag jährlich ab; dies bewirkt sicher ihre massenweise Vertilgung zur Zugzeit. Als schlechter Flieger wartet sie mit dem Zug auf günstige Winterverhältnisse, und während dieser sammeln sich große Mengen der Tiere, die nach Überqueren des Meeres so ermattet sind, daß sie eine leichte Beute der Südländer werden. Die amerikanische Wandertaube, die in enormer Zahl zu ziehen pflegte, wurde fast völlig ausgerottet; ähnliches droht unserer Wachtel, der vielleicht nur ein internationales Hilfswerk Rettung bringen kann. Leider bedeuten auch manche technischen Einrichtungen, wie Leuchttürme, den Tod von vielen tausend gefiederten Wanderern, nicht weniger Gefahren, wie der Mensch mit seiner fortschreitenden Kultur, droht dem Vogel von seiten der Naturelemente. Ein strenger Nachwinter kann den Tod vieler zurückgekehrten Weichfresser bedeuten; wie ein strenger Winter mit reichlichem Schneefall und Glatteis den Standvögeln das Leben unmöglich machen kann. Damit kämen wir zur Fütterung der freilebenden Vögel zur Winterszeit. Wenn Geben seliger ist als Nehmen, so trifft dies wohl nirgends mehr zu als bei der Fütterung unserer Vögel; weniger denke ich dabei daran, daß die Vögel dabei auch unsere Obstbäume von allerlei schädlicher Insektenbrut säubern, als an den großen erzieherischen Wert, den die Winterfütterung für unsere Jugend bedeuten kann. Ein Dorfschulhaus ohne zweckmäßige Futtereinrichtung sollte undenkbar sein; die Erziehung der Lehrer sollte sich ernstlich eine entsprechende Vorbildung angelegen sein lassen. Denn gelang es, die Liebe der Jugend zur Natur zu wecken, so wird der Futterplatz am Schulhaus bald das Vorbild für viele weitere Futterstellen abgeben. Und ein Knabe, der im Winter füttert, wird im Sommer kein Nest zerstören. Wenden wir uns zunächst den Futtermitteln zu, so sollen dieselben möglichst kalorienreich, d. h. nahrhaft sein, und da Fett das beste Wärmemittel gegen Kälte ist, werden wir fetthaltige Stoffe bevorzugen, doch sind sie nicht bei allen Arten verwendbar. Für Meisen, Buchfinken, Grünfinken stellt Hanf ein bekömmliches, nahrhaftes Winterfutter dar, erstere lieben auch sehr tierische Fette, wie Speck und Talg, gequetschter Hanf ist für die größeren Weichfresser, wie Amseln, Rotkehlchen, geeignet. Andere Arten, wie die Ammern, Sperlinge, Lerchen, bevorzugen mehlige Sämereien, wie enthülster Hafer. Recht zweckmäßig hat sich das Begießen von Tannenbäumen mit einem Gemisch von heißem Talg, Hanf, Hirse, Weißbrot und Ameiseneiern erwiesen; rührige Fabriken bringen das fertige Gemisch als Futtersteine oder Futterringe in den Handel. Wichtig ist, mit der Fütterung nicht erst bei Einsetzen von Schneefall oder Frost zu beginnen, sondern bereits im Spätherbst die Futterplätze zu beschicken, damit der Vogel weiß, wo er im Falle der Not Hilfe findet. Will man nicht von dem erwähnten, mit Talgmischung begossenen Tannenbäumen Gebrauch machen, so ist von einer Futterstelle zu fordern, daß sie gegen das Verschneien geschützt und bei jedem Wetter den Vögeln zugänglich ist. Feinde, aus der Tierwelt, wie Katzen, Sperber und Würger, sind nach Möglichkeit davon fernzuhalten; gegen Katzen sind auch alle Stätten zu schützen, die als Nistplätze für Vögel gedacht sind; einzelstehende Bäume am besten durch einen breiten Ring von Stacheldraht. Nur bei regelmäßiger Versorgung der Vögel wird diesen geholfen. Ausbleiben der gewohnten Fütterung kann den Tod vieler Vögel bedeuten. Fast ebenso wichtig wie der Futterplatz im Winter ist die Vogeltränke im Sommer; Schwalben erleichtern wir den Nestbau durch Darbieten von feuchtem Straßenkot. Der größte Feind aus der Tierwelt für Vögel ist sicher die Katze, dann vielleicht der Sperber, während der große Raubwürger schon so selten ist, daß man ihn selbst schützen sollte; nie konnte ich den rotrückigen Würger, den ich oft zu beobachten Gelegenheit hatte, des Vogelraubes überführen.

Zum Schlusse wollen wir aber, eingedenk der großen ästhetischen Bedeutung der Vögel, den Schutz nicht nur den wirtschaftlich nützlichen Arten angedeihen lassen, sondern wollen auch die gefiederten Raubritter, wie den seltenen Wanderfalken und Steinadler vor der völligen Ausrottung schützen, damit sich noch spätere Generationen an den Edlen erbauen.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

Frage 26. Einer meiner Jakos leidet seit mehreren Wochen an einer anscheinend schmerzhaften Schwellung des linken Fußes. Er „humpelt" auf der Stange und schont das Glied, wo er kann. Beim Massieren scheint er keine sonderlichen Schmerzen zu haben. Um welches Leiden kann es sich handeln? Der zweite Fuß ist völlig normal, der kranke Fuß ziemlich hoch hinauf stark geschwollen. Für direkte Mitteilung resp. Heilungsvorschriften wäre ich sehr dankbar.
Lichtenstaedt, Berlin-Friedenau, Kaiserallee 137.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Kauf- u. Tauschvermittlung: Max Dähnick in Berlin NO 18, Gr. Frankfurter Str. 90, Ecke Markusstr. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

Dem Stiftungsfonds des Verbandes sind überwiesen worden: M. 5.— von Ungenannt in Groitzsch. Wir gestatten uns auch an dieser Stelle für diesen Beitrag allerbestens zu danken. Wenn wir künftig über eingehende Beträge nicht mehr öffentlich quittieren und danken, so bitten wir uns das nicht verübeln zu wollen. Wir haben die Einrichtung getroffen, daß allen Gebern im Jahresberichte Erwähnung getan und gedankt wird. J. A.: Petters.

Bücher- und Schriftenschau.

Heinroth, Oskar und Frau Magdalena, **Die Vögel Mitteleuropas.** Herausgegeben von der Staatl. Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen. Hugo Bermühler Verlag, Berlin-Lichterfelde. Lief. 13—16.

Das schöne Werk schreitet rüstig vorwärts und ist nun fast bis zur Hälfte des geplanten Umfangs gediehen. Die vorliegenden vier Lieferungen behandeln die Rohrsänger, Schwirle und die Meisenarten in der allseitig anerkannten, neuartigen Weise, die sich in ihrem Gesamtergebnis am besten als eine modernste Ergänzung und Weiterführung der vorhandenen Literatur bezeichnen läßt. Wer als Anfänger in unserer „scientia amabilis" zu dem Werke für erste Studien greifen wollte, würde allerdings die Anfangsgründe vergeblich suchen; es setzt vielmehr beim Benützer schon ein gut Teil Wissen voraus und will auch ausgesprochen über das vorhandene Schrifttum hinausführen. Wie sehr ihm dies gelingt, läßt fast Seite um Seite der außerordentlich anregenden Ausführungen erkennen. Heinroth ist ein glänzender Beobachter und ein selbständig denkender kritischer Beurteiler des Neugesehenen wie der altbekannten Tatsachen, die nun oft in völlig neuem Lichte erscheinen. Daß der Gelbspötter von ihm als ein echter, auf die Bäume gegangener Rohrsänger angesehen wird, ist nur eine der vielen neuen Auffassungen, die er durch eine Reihe anatomischer und biologischer Tatsachen so überzeugend begründet, daß auch der Zweifler zu ihr bekehrt wird. Überzeugend ist die Kritik an den häufig unzutreffenden deutschen Vogelnamen, die notwendig zu Irrtümern führen müssen, so z. B. Drosselrohrsänger für einen Vogel, der weder die Größe noch das Aussehen einer Drossel hat, Schilfrohrsänger, der nicht eigentlich im Schilfe, Sumpfrohrsänger, der nicht im Sumpfe, Binsenrohrsänger, der nicht in den Binsen lebt! Lediglich der Teichrohrsänger trägt seinen Namen im allgemeinen zu Recht. Von den Schwirlen sind der Heuschrecken- und der Nachtigallschwirl näher besprochen; den ersteren lernt Heinroth dadurch die Schüler vom grünen Heupferd auf Lehrausflügen unterscheiden, daß er betont: alle vor Juli auf feuchten Wiesen schwirrenden Heuschrecken sind Schwirle, alle nach dem Juli schwirrenden Schwirle sind Heuschrecken! Der Einzelbeschreibung der Meisenarten ist ein fesselndes, allgemeines Charakterbild der Waldmeisen (Kohl-, Blau-, Sumpf-, Weiden-, Tannen- und Haubenmeise) vorangestellt, das die Beobachtungen über den Nestbautrieb, seine mitunter für die Arterhaltung total unzweckmäßige Betätigung, die Entwicklung der Meisen vom Offen- zum Höhlenbrüter, die Ursachen und Zwecke des Kinderreichtums der Meisen, das allen echten Meisen eigene Festhalten der Nahrung mit den Füßen, den alljährlichen Wechsel zwischen Pflanzen- und Tiernahrung, die Mauserverhältnisse, die wunderbar zweckmäßige Art der Kotentleerung bei Nestjungen, das Benehmen in der Gefangenschaft usw. enthält. Schließlich rät der Verfasser zur Abrundung des Charakterbildes auch noch Wilhelm Buschs Schilderung der Meisenart und -unart in seiner Gedichtsammlung „Zu guter Letzt" herbeizuziehen. Wie völlig verschieden die seit alters her „Schwanzmeisen" genannten Vögel von den eigentlichen Meisen sind, lehrt der Unterschied in Nestbau, Nahrung, Nahrungsaufnahme, Gesichtsausdruck, Gestalt, Jugendmauser und die Bedaunung der Jungen, die bei den Schwanzmeisen überhaupt fehlt. Auf Buntafeln sind abgebildet Blauracke, Nachtschwalbe und Großer Buntspecht. Besonders die Tafel mit der die Flügel streckenden Blauracke ist in ihrer gegenständlichen Klarheit wie in Farbgebung eine Prachtleistung. In zahlreichen Schwarzbildern nach Momentaufnahmen sind die Entwicklungsstadien der Meisen, Kleiber, Baumläufer, Stelzen, Pieper, Lerchen, Sperlinge und des Drosselrohrsängers vom eben ausgekrochenen Jungvogel bis zum Alterskleid in ungemein verschiedenen, oft höchst reizvollen Stellungen festgehalten, die das Geschick der Autoren, mit Vögeln umzugehen, ebenso groß erscheinen lassen wie ihre Kunst und Ausdauer, die unruhige Beweglichkeit der Kleinvögel auf die Platte zu bekommen.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

C. Balser, Fulda: 2,3 schieferblaue Kanarien, fast schwarz, Isabellkanarien, weiße und weißblütige Kanarien, Grauköpfchen.

Richard Heydenreich, Bad Suderode, Harz: Steinrötel, Wachtelhähne.

Max Kleinert, Berlin NO 18, Strausberger Straße 13: Taubenhalsamazonen, Tyrann, schwefelgelb, Graidrosseln, Katzendrosseln, brasil. Blauraben, Kronentangaren, Morgenammerfinken, Jakarinifinken, Spitzschwanzamadinen, Riesenpfäffchen, Pfalzschnabelpfäffchen, brasil. Roßtäubchen, weiße Kanarien (Hähne und Weibchen).

E. W. Lenger, Tierhandlung, Berlin N 58, Schönhauser Allee 70a: Klarinettenvögel (Klarino), Bergklarinettenvögel, Spottdrosseln, Blauspötter, Krummschnabelspötter, Gelbbürzelkassiken, Yukatanblauhäher, Diademhäher, Grauschnäpper, Trauerdrosseln, Zwergdrosseln, Swainson-Zwergdrosseln, Braunkopfammerhabia, mexik. Ammerhabia, Goldstirntrupiale, Wagler-Trupiale, Gartentrupiale, blutrote Tangaren, Dreifarbentangaren, mexikan Grundrötel, Zedernvögel, Karmingimpel, Lerchenfinken, Pfalzschnabelpfäffchen, Flötenwürger, ind. Bergmeisen, Rötelmerlen, Golosperlinge, Schuppenköpfchen, Grauköpfchen, Schwarzohrpapageien.

B. Schaeffer, Berlin-Lichterfelde, Marschnerstr. 33, A. Z.-Mtgl. 296: Blaublütige Wellensittiche.

Eduard Schütze, Eystrup (Weser): 0,2 mexikan. Sperlingspapageien, 0,1 grünbürzl. Sperlingspapagei.

Adolf Schwarz, Weißenfels, Klingenplatz 8: Organisten, Tovisittiche, Braunohrsittiche.

Friedrich See, Frankfurt a. M., Bahnhofsplatz 8: 1,3 kleine Kubafinken.

Strauß, Breslau 3, Bergstr. 31: Sperbergrasmücke.

Paul Tzornack, Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189: Taubenhalsamazonen, Kaptäubchen, afrik. Halsbandtäubchen, Stahlfleckentäubchen, Senegaltäubchen, Zwergmaskenweber i. Pracht, Grauköpfchen (Zwergpapageien), Schuppenköpfchen, Kalanderlerchen, Klarino, St.-Thomas-Sittiche.

A. Wasielewski, Zoologische Handlung, Berlin-Neukölln, Nogatstr. 30: 1 gelbe Bachstelze.

Offerten unter „G" an die Geschäftsstelle der „Gef. Welt": 1 Paar lauchgr. Papageiamadinen, 1 Paar Maskenamadinen.

Offerten unter „Unzertrennliche" an die Geschäftsstelle der „Gef. Welt": 2,0 orangegef. Unzertrennliche.



Herrn A. G., Augsburg. Die Besetzung des Käfigs ist völlig ausreichend. Wenn aber auch Gimpel × Kanarien gezüchtet werden sollen, ist natürlich das Einsetzen von 1,1 Gimpel falsch. Es dürfte dann nur 1,0 Gimpel eingesetzt werden.

Herrn H. R., Schwarzenbach/Saale. Es ist besser, wenn Nachtigall und Sprosser in verschiedenen Zimmern singen. Der Gesang jeder Art kommt dann mehr zur Geltung. Die Gefahr, daß der Sprosser Touren der Nachtigall aufnimmt, besteht kaum. Es kann natürlich vorkommen. Es kann vorkommen, daß der feurigere Sänger von beiden den andern zum Schweigen bringt.

Herrn K. L., Oldesloe. Die genannten 5 Arten können paarweise in dem Käfig von angegebener Größe untergebracht werden. Es könnten auch noch 1-2 Paar kleine Prachtfinken hinzukommen, wie Helenafasänchen, Goldbrüstchen, Schönbürzelchen. Der Käfig muß Sitzgelegenheiten auch aus dünnen Zweigen haben und Schlupfkästchen oder -körbchen zum Übernachten. Als Futter wird weiße und Senegalhirse, auch in Kolben, ab und zu einige Mehlwürmer und frisches junges Grün, gekeimte Samen gereicht.

Herrn O. P., Erfurt, Herrn S. L., Berlin-Friedenau, Herrn Dr. L., Brüssel, Herrn Sch., Berlin O 34, Herrn M. R., Breslau. Beiträge dankend erhalten.

Herrn J. K., Hannover, Herrn A. Sch., Dresden-A., Herrn M. S. Bern, ist brieflich Bescheid zugegangen.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

ang 54 10. Dezember 1925 Heft 50

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Karl Theodor Liebe.
Von meinem großen Gelbhaubenkakadu. Von Ludwig Weitzel.
Das Liebhaberjahr. Plauderei von J. Birk, Leipzig. (Schluß.)
Mein Waldkauz. Von W. R.
Notizen aus vergangenen Jahren. Von A. Jena, Biberach/Riß. (Forts.)
Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten. Von J. Kuntzendorff. Berlin. (Forts.)
Vogelschutz. Von Dr. Stehle, Köln. (Schluß.)
Sprechsaal. - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig. - Bücher- und Schriftenschau. - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Ausstellungen - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Ausstellungen.

Der **Bayr. Vogelliebhaberverein (E. V.)** Sitz München hält im Verein mit der Weltbundes-Gruppe Oberbayern und dem Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastard-, Kanarien- und Exotenzüchter, Sitz München, in der Zeit vom 3. bis 13. Dezember 1925 im „weißen Saal" — Neues Polizeigebäude, Neuhauser Straße — eine Vogelausstellung ab, die sehr interessant zu werden verspricht. Alle Vogelliebhaber sind herzlich willkommen. Der Vorstand.

Der **Verein der Freunde von Sing- und Ziervögeln in Lübeck** erlaubt sich hiermit, alle Sports-Vereine und Freunde zu seiner am 12. und 13. Dezember 1925 stattfindenden Allgemeinen Ausstellung ergebenst einzuladen.

Herbert Müller, Lübeck, Hüxstraße 119.

Voranzeige! Um vielfachen Wünschen nachzukommen und um gleichzeitig den Ostern 1926 zur Tagung des Reichsverbandes der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig in Leipzig weilenden Vogelliebhabern einen Einblick in den Stand der Leipziger Liebhaberei zu gewähren, veranstaltet der Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Leipzig im Naturkundlichen Heimatmuseum wiederum eine Vogelschau, zu deren Besuch schon heute alle Freunde und Anhänger unserer schönen Liebhaberei herzlichst eingeladen werden. Die Ausstellungsleitung. J. A.: Joh. Birk.

Aus den Vereinen.

Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Postscheckk. Hannover 56714; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10. Unter Bezugnahme auf die Mitteilung des Herrn Dr. Luig, Brüssel, in Heft 47 teile ich mit, daß Mitglied 255 in liebenswürdiger Weise bereit ist, die Wünsche der Mitglieder zu einer einheitlichen Bezugsliste bei Chapman zu vereinigen und den gemeinsamen Bezug durch Flugzeug zu erwirken. Reflektanten wollen sich gefl. unter Beifügung von Rückporto mit Mitglied 255 in Verbindung setzen. — Ferner ist auf Anregung geplant, in Abständen von 2 bis 3 Monaten, je nach Bedarf, Tauschlisten herauszugeben, deren Aufstellung ebenfalls Mitglied 255 zu übernehmen bereit ist. Eine solche Liste wird versuchsweise erstmalig dem neuen Jahrbuch beigegeben. Tauschgesuche, An- und Verkäufe sind bis zum 15. Januar nach Jena einzureichen. Die Listen sind nur für Mitglieder bestimmt — Ich mache nochmals darauf aufmerksam, daß literarische Beiträge zum Jahrbuch bis spätestens am 15. Dezember in meinen Händen resp. im Besitz von Mitglied 34 sein müssen. Spätere Einsendungen können nicht mehr berücksichtigt werden. A. Krabbe.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögeln in Apterbeck. Sitzung jed. 1. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, in der Wirtschaft Sprave, fr. Fritz Lecking, Kirchstr. F. Lecking, 1. Vors.

Verband deutscher Farben-, Gestalt-, Bastardkanarien- und Exotenzüchter und des Bayerischen Vogelliebhabervereins (e. V.) Sitz München, Ortsgruppe Augsburg. Jeden Samstag gemütliche Zusammenkunft beim Vogelwirt J. Leininger, Gasthof, Frohnhof-Peutingerstr. Jeden 1. Samstag im Monat Versammlung ebendort. Vogelliebhaber als Gäste stets willkommen. Amtl. Vereinsorgan: „Gef. Welt". J. A.: H. Schwaiger, 1. Vors., Augsburg, Schöpplerstr. 9/I.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstr. 37a. Gäste stets willkommen. P. Böhme, Schriftf.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke-Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde und Geflügelzucht Breslau. Vogelliebhaber Breslaus, wollt ihr euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei nicht endlich auch zusammenschließen, wie es in anderen Städten schon längst geschehen ist? Ein Stamm von erfahrenen Vogelpflegern ist vorhanden, jedoch können Fortschritte nur erzielt werden, wenn alle noch abseits Stehenden sich uns anschließen und unsere mit belehrenden Vorträgen verbundenen Vereinsabende besuchen. Auskunft ert. bereitwilligst P. Spitzner, 1. Schriftf., Ofener Str. 26.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Dessau und Umgegend. Gegr. März 1925. Vereinslokal „Fürst Blücher", Ecke Antoinetten-Leopoldstr. Versammlung jeden 2. Mittwoch, abends 8 Uhr. Gäste zu allen Veranstaltungen stets willkommen. J. A.: Dielitzsch, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jed. 2. u. 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Rest. „Zum Löwentor", Königswall 75.

A. Spauche, Schriftf., Dortmund, Lagerhausstr. 21.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Vers. jed. Freitag, abends 8 Uhr, i. Vereinsl. „Bienenkorb", Schloßstr. Vogelliebhab. als Gäste willkommen. E. Schubert, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Eliesenhof", Eliesenstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Mittelthüringens Sitz Erfurt. Sitzung jeden 2. Mittwoch und jeden letzt. Sonnabend im Monat im Vereinsl. „Stadt Chemnitz", Thomasstr. 57. Näh. Auskunft erteilt Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Vereinigung einheimischer Waldvogelliebhaber zu Görlitz und Umgegend. Zusammenkunft jeden 3. Sonnabend im Monat im Restaurant „Zum Bismarckgarten", Bismarckstraße. 1. Vors. W. Lücker in Görlitz, Konsulstr. 7. Vogelliebhaber als Gäste willk. J. A.: Erich Rothe, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willkommen Nächste Sitzung am Dienstag, den 15. Dezember. A. Weber, Vors., Hamburg 1, Rabotsen 56, Hansa 9599.

Der Hannoversche Vogelschutzverein zu Hannover, gegr. 1881, wirkt mit sichtbarem und anerkanntem Erfolge für Vermehrung und Schutz der Vogelwelt bei Hannover durch Aufhängen von jährlich einigen hundert Nistkästen aller Art, durch Erweckung von Interesse und Liebe für die Vogelwelt mit monatlich, zur Gesangszeit wöchentlich stattfindenden Belehrungsspaziergängen und durch Vorträge und Austausch der Beobachtungen in den jeden 3. Dienstag des Monats stattfindenden Vereinsversammlungen. Seine Bestrebungen dienen also lediglich gemeinnützigen Zwecken. Mitgliederzahl rd. 1200, jährl. Beitrag nur 1 M. Meldungen an den Vors. Herrn Fritz Becker, Hannover, Boedekerstr. 1 F.

Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber. Die Dezemberversammlung am 10. wird im Landesheim abgehalten.

Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg. Am 18. Dezember findet im Hörsaal 7 der Universität ein Vortrag des bekannten Ornithologen Dr. O. Heinroth mit Lichtbildern statt. Thema: Körperliche und geistige Entwicklung mitteleuropäischer Vögel. Die bisherigen Zusammenkünfte der Vogelpfleger unserer hiesigen Ortsgruppe am 1. Donnerstag eines jeden Monats fallen wegen Mangel an Beteiligung aus. Prof. Dr. Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- u. Singvögel zu Hörde. Gegr. Sept. 1920. Versammlung im Winter, v. Okt. bis April, aller 14 Tage Sonntags, nachm. 5 Uhr, im Sommer, v. April bis Okt., abends 8 Uhr. Gäste u. Liebh. stets willk. Vereinsl. Restaurant Burghof, Bes. H. Ungewitter, Bruchstr.

Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Versammlung aller 14 Tage Sonnabends. Vereinslokal: Gasthaus „Zur Krone", Jena, Grietgasse. Gäste stets willkommen. Jena besuchende Vogelliebhaber treffen jeden Sonntag vorm. den Schriftführer Adolf Voigt, Jena-Ost, Feodorastraße 13, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube freundlichst eingeladen. — Die am Sonnabend, dem 28. November, abgehaltene Versammlung war von 10 Mitgliedern und 3 Gästen besucht. Sie brachte auch eine Anmeldung als Mitglied. Herr Borggreve sprach über das Turacin und die Turakos. Herr Parbohr hatte ausgestopfte Vögel mitgebracht, und zwar: Pirol, großen Raubwürger, Rohrammer, Wachtel und Wintergoldhähnchen, die eingehend besprochen wurden. Angeregt wurde, die Frauen ab und zu zu den Vereinsabenden mitzubringen. Zum ersten Male soll dies in der Versammlung im Januar geschehen. Die nächste Versammlung findet am 12. Dezember statt, die Versammlung am 26. Dezember fällt aus.

Adolf Voigt, Schriftf.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite)

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an!

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal bei Gastwirt Lapschies, Kaiserstr. 46 a. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 17. Dez. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Latzner im Volkshaus-Nord, Glogauer Str. 20. Liebhaber willk. J. A.: Friedrich.

Verein der Vogelfreunde Linden. 1. Vors. P. Winkel, Linden, Fröbelstr. 9.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Sitzung aller 14 Tage im Restaurant „Zum Neckarstrand", Messeplatz 1. Liebhaber willkommen. Joh. Daubmann, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Stud.-Rat Prof. Jahn, 1. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. im Monat. Vereinslokal: Gastwirtsch. Augustusburg, inn. Leipziger Str. Nächste Vers. 18. Dez., abends 8 Uhr. P. Schmidt, 1. Vors.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Flugbauer,
ut erhalt., 130×132×65, zerlegbar, Hartholz, auch f. Exoten passend, billig zu verk.
L. Bracklow, Halle a. S.,
Merseburger Straße 20. [1725

E. Maschke
Kaufmann, Mtgl. VDK.
Original-Züchter
hochedler [1726
Qualitäts-Kanarien
St. Andreasberg i. Harz.
7 goldene Medaillen, Ehrenpreise.

Praktische Käfige
für alle Vögel
Vogelfutter jeder Art
in Prima Güte
Seit 1872 zahlreiche Dankschreiben bedeutender Kenner aus vielen Staaten.
Katalog u. Antwort gg. 30 Pfg. Marken.


Mehlwürmer
veg. gez., 1 Pfund M. 5.50
¼ Pfund M. 1.80 franko
gegen Voreinsendung
Bonitas-Versand
Rostock i. M. 3. [1727

Mehlwürmer
¼ Pfd. 1.80 Mk., ½ Pfd. 3 Mk.,
1 Pfd. 4.50 Mk. [1728
gegen Voreinsendung des Betrages frk.
kg 8 Mk. geg. Nachn. ausschl. Porto.
Ludwig Marzluf
Altenheim bei Offenburg in Baden.

Mehlwürmer
Pfund 5.60 M, ¼ Pfund 2.— M
franko gegen Voreinsendung
a Ameiseneier Pfd. 4.— M
a Muska Pfd. 1.50 M
a Weißwurm Pfd. 4.50 M
Seidenraupenschrot Pfd. 0.60 M
Garneten gem. Pfd. 0.35 M
Alles diesj. Ware, à Pfund ab hier.
Th. Witte, Niederndodeleben
b. Magdeburg. [1729

Unübertroffen ist
Heidelberger Vogelfutter,
hergestellt nach Vorschrift
und unter Kontrolle von
Professor Dr. Otto Fehringer
durch
GENO-WERK - Mannheim
Rheinkaistraße 8 b.
Anfragen über die Pflege einheimischer Vögel werden gerne beantwortet. Rückporto beilegen. [1730

Liebhaber und Kenner
die ihre Lieblinge gesund erhalten und in Gesang bringen wollen, füttern das seit Jahrzehnten bestens bewährte und für zarte Weichfresser eigens zusammengestellte
„Naturell"

Naturell enthält nur beste und für den Vogel bekömmliche Zutaten und ist schon seit langer Zeit von besten Kennern günstigst beurteilt.
Alleiniger Hersteller: [1731
Wilhelm Dietze, Leipzig
Kurprinzstraße 15
Naturell kg 5 M. Probesendung gegen 1 M in Briefmarken
Empfehle außerdem:
Drosselfutter kg 2 M, Ameisenpuppen kg 7 M
Weißwurm kg 10 M
ferner beste Futterarten für sämtliche in- und ausländischen Körnerfresser in bester Qualität bei billigsten Preisen.

„ORNIS" Freie Bezugsvereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands.
Gegründet 1912 ∴ Fernsprecher 4198 [1732
Fachgemäße Belieferung mit Vogelfutter („Reform-Normal", individuelle Zusammensetzung bei restlosem Verbrauch; stets frisch gemischt). Hunderte von Liebhabern füttern seit über einem Jahrzehnt mit bestem Erfolg nur „Reform-Normal".
Reform-Normal-Käfige Mod. ORNIS 1925, neue Preisliste erschienen. — Modern eingerichtete Käfig-Bauanstalt mit elektrischem Betrieb.
Anschrift: Ornis-Haus, Halle-Saale. Der Geschäftsführer: Martin Sperling.

Mehlwürmer
1 Pfd. 5 M ab hier,
6 Pfd. franko und Verpackung frei,
geg. Voreinsendung ¼ Pfd. 2 M franko.
Ameiseneier, 1925er,
1 Pfd. 3.50 M, ab hier 9 Pfd. 31 M frk.
Ia Weißwurm, 1925er,
Pfd. 4.50 M, 9 Pfd. 36 M franko.
Ia Muska-Zecken
1733] Pfund 1.50 M.
Seidenraupenpuppen, gemahl.,
Pfd. 0.60 M ab hier.
Großabnehmer Rabatt.
Karl Claus, Mutterstadt II
(Hauptbahnhof).

1925er Ameiseneier
hell, gesiebt, das Pfund M. 3.70 ab hier.
Bei Voreinsendung franko. [1734
Geno-Werk, Mannheim
Rheinkaistr. 8 b. Hersteller des
Heidelberger Vogelfutter
nach Prof. Dr. O. Fehringer.

Pa. gesiebte Ameiseneier
Pfund 3.40 M.,
über 5 Pfund à Pfund 3.30 M.,
10 Pfund 31 M. franko.
Zecke . . . . . Pfd. 2.50 M.
Con. Eigelb . . . . . Pfd. 2.— M.
Karottengrieß . . . . Pfd. 0.70 M.
Drosselfutter . . . . Pfd. 0.80 M.
Lucullus extra Mischung ½-Pfd.-Paket 0.95 M., weiße Packung 0.80 M.
Senegalhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Silberhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Algierhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Kerbtiernahrung f. Kanarien Pfd. 1.30 M.
Versand per Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. [1735
Paul Zornack,
Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189.
(Postscheck-Konto Nr. 652 65)
Gegründet 1905.

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark ¼ Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,**
Biesenthal I (Mark). [1736

Mehlwürmer

(das ganze Jahr hindurch)
ℳ 5.— das Pfd., ausschießl. Porto u. Verp.; bei Abnahme von 6 Pfd. Porto u. Verpackung frei.

Ia Ameiseneier

3.50 ℳ per Pfd.
9 Pfd. netto 30.— ℳ franko.

Ia Weißwurm, 1925er 4.— d. Pfd.
Ia Muska-Zecken . . 1.50 d. Pfd.
Ia Seidenraupen-puppen, gemahlen 0.60 d. Pfd.

ff. Universalfutter

Alleckwa I für Nachtigallen ℳ 2.—
„ **II für Grasmücken** ℳ 2.—
„ **III für Drosseln** . . ℳ 1.50
das Pfund ab hier, ausschl. Verp.; bei größeren Mengen billiger. [1737

Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser

A. Eckrich II, Waldsee (Pfalz).

Mehlwürmer

½ Pfund 1.50 ℳ gegen Voreinsendung. **Ameiseneier Ia,** holz- und milbenfrei, Pfund 4.— ℳ. **Ameiseneier I,** wenig Holz, milbenfrei, Pfund 3.40 ℳ. **Elbweißwurm,** Ia, Pfund 4.50 M, milbenfrei. **Muska** Pfund 1.50 ℳ, ohne Steine Pfund 3.— ℳ. **Seidenraupenpuppen,** gem. Pfund 60 Pfg.

W. Busse, Magdeburg,

Gr. Mühlenstraße 1. [1738

Heidelberger Vogelfutter

Braune Packung für Erdsänger u. ä. Vögel 250 g 2.20
Graue Packung f. Grasmücken u. ä. Vögel 250 g 1.20
Blaue Packung für Drosseln u. ä. Vögel 250 g 1.10
Rote Packung für Stieglitze, Zeisige, Kreuzschnäbel . 750 g 1.45
Grüne Packung f. Hänflinge, Gimpel, Girlitze . . . 750 g 1.50
Gelbe Packung für Kanarien 1000 g 1.65
Generalvertreter für Sachsen und Thüringen [1739

Arthur von Ende,
Zoologische Handlung,
Jena (Thüringen), Magdelstieg Nr. 55.

Ameiseneier

gute Qualität, Ernte 1925, à Pfund 3.50 M., bei 10 Pfund franko.

Weißwurm

Ia, Pfund 5.00 M., bei 10 Pfund franko.
Versand per Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. [1740

Friedr. Gustav Müller,

Berlin SW 61, Blücherstraße 61,
Postscheckkonto: Berlin Nr. 153 990.
Fernsprecher:
Moritzplatz 2689, Hasenheide 6682.

Ein Versuch

überzeugt jeden von der Güte meines **Universalfutters.** Preis 2 M. p. Pfd. Sämtliche Futtersorten für Exoten, Wald- und Kanarienvögel zu billigsten Tagespreisen. Versand geg. Nachnahme. Verpackung und Porto werden billigst berechnet. [1741

P. H. Kirsten, Leipzig 3,
Zeitzer Str. 53. Fernruf 31445.

Vogelfutter [1742

für Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser. Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,

Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Suche: Goulds. Verkaufe: Selbstladepistole, Kal. 7,65, 20 R.-M. **Dreifarben-Kamera** mit Tessar 1 : 4,5, 15 cm und Zubehör, 500 R.-M.
Brummund, Prenzlau. [1743

Offeriere in tadellosen gesunden Exemplaren:

Schamadrosseln Mch. 60.— bis 70.—
dito . . . Wch. 50.—
Spottdrosseln, amerik. Mch. 35.— bis 50.—
Trauerdrosseln, mexik. Mch. 22.—
Swainsondrosseln, mexik. Mch. 30.—
Zwergdrosseln, mexik. . Mch. 30.—
Weißkehldrosseln (Hängeflügel) Mch. 6.—
Ringdrosseln, europ. . . Mch. 12.—
Schwarzdrosseln, europ. Mch. 10.—
Singdrosseln, europ. Mch. 10.— bis 20.—
Klarino, mexik. Mch. 50.— bis 60.—
Blauspötter, mexik. . . Mch. 40.—
Goldstirnturpial, mexik. Mch. 30.—
Raubwürger, europ. . Mch. 12.—
ff. Schwarzplättchen, europ. Mch. 12.— bis 15.—
Dorngrasmücke, europ. . Mch. 6.—
Müllergrasmücke, europ. Mch. 5.—
Rotkehlchen, europ. . . Mch. 5.—
Heckenbraunelle, europ. Mch. 5.—
Morgenammerfink . . Mch. 8.—
Lazulifink . . . . . Mch. 25.—
Papstfink . . . . . Mch. 18.—
Safranfink . . . . . Mch. 8.—
Lerchenfink . . . . . Mch. 8.—
Buchfink . . . Mch. 2.— bis 5.—
Grün- und Bergfink . Mch. 2.—
Goldammer . . Mch. 2.— bis 3.—
Alpenstieglitz . Mch. 5.— bis 6.—
Gartenstieglitz . Mch. 3.— bis 4.—
Rothänfling . . Mch. 3.— bis 4.—
Berghänfling . . . . Mch. 3.—
Erlenzeisig . . Mch. 2.— bis 3.—
Kernbeißer . . . . Mch. 5.—
Kreuzschnabel . . . . Mch. 5.—
Amazonenpapageien 50.— bis 80.—
Graupapageien . 100.— bis 150.—
Braunohrsittich . . . . . 20.—
Feuerflügelsittich . . . . . 20.—
Wellensittiche, grün . . Paar 12.—
dito gelb . . Paar 15.—
Roter Kardinal . . . Mch. 35.—
Zebrafinken . . . . Paar 20.—
Tigerfinken . . . . Paar 8.—
Atlasfinken . . . . Paar 5.—
Bandfinken . . . . Paar 5.—
Kl. Elsterchen . . . Paar 5.—
Silberfasänchen . . . Paar 4.—
Graudelsänger . . . Paar 6.—
Jap. Mövchen . . . Paar 12.—
Kanarienhähne . . 10.— bis 20.—
dito . . Wch. 1.50 bis 3.—
Dompfaffen . . . . . Paar 9.—

Verpackung und Porto 3.50. Lebende Ankunft Garantie.

Wilhelm Hiltmann, Berlin S 14, Dresdener Str. 24

Postscheckkonto: Berlin 849 68. [1744

Wir offerieren in gutbefiederten, gesunden Exemplaren:

Ararauna . . . . Stück 150.—
Grünflügel-Aras . . „ 165.—
Molukkenkakadus . . „ 150.—
Weißhaubenkakadus „ 120.—
Feuerhaubenkakadus „ 100.—
Gelbhaubenkakadus, fingerzahm . . . . „ 60.—
Kleine Gelbhaubenkakadus . . . . „ 30.—
Blaustirnamazonen, etwas sprechend, Ia im Gefieder, junge Vögel „ 65.—
Gelbmantelloris . . Paar 150.—
Wellensittiche, grün . „ 9.—
blau . „ 130.—
Katharinasittiche . . „ 30.—
Port-Lincoln-Sittiche „ 140.—
Barnardsittiche . . . Stück 130.—
Grauköpfchen . . . Paar 10.—
Dolchstich-Tauben . . „ 200.—
Kuba-Tauben . . . „ 80.—
Guinea-Tauben . . „ 25.—
Kalifornische Schopfwachteln . . . . „ 35.—
Schamadrosseln, t. voll. Gesang, Männchen . Stück 60.—
dito Weibchen . „ 70.—
Beos, kleine . . . „ 45.—
Himalayasäbler . . „ 100.—
Blauwangenbartvögel „ 45.—
Bengalenpitta . . . „ 60.—
Rotschulterstare . . „ 9.—
Grauer Kronfink . . „ 10.—
Orangeweber i. Pracht „ 6.—
Kubafinken, kleine . Paar 16.—
Rhesus-Affen . . . Stück 50.—

Odenwald,

Vogel- und Tierexport, G. m. b. H.,
Fulda. [1745

Abgebe:

1,2 Wellensittiche, grün . Paar 15.—
1,0 dito gelb . Paar 15.—
erprobte 3jährige Zuchtpaare,
1,1 Bandfinken . . . . zu 4.—
2 Graudelsänger ohne Garantie à 2.—
1,0 Dompfaff . . . . . 3.—
1,0 Kreuzschnabel . . . . . 3.—
1 Orangeblaufink . . . . . 15.—
1 Indigofink . . . . . 10.—
1,0 Flammenweber in Pracht . 6.—
1,0 dito wieder außer Pracht 2.—
Tausche auch andere Exoten.
Versand ab hier. [1746

Eugen Müller,
Küllstedt i. Eichsfeld.

Verkaufe

4,6 jap. Mövchen, im Freien gezüchtet, gesund u. zuchtfähig, Paar 8 M., Weibch. 4 M. **Tausche gegen 1,0 Zebrafink, 1,0 kl. Maskenweber, 1,1 Amarant, 0,1 Goldbrüstchen, Ges. Welt** 1897, 189 , 1923.
Carl Fischer, Leipzig-Gohlis,
Kaiser-Friedrich-Str. 48 I. [1747

Offeriere freibleibend:

Weichfresser (Frühjahrsvögel) wie: **Nachtigall,** im Schwanz etwas bestoßen, 20 ℳ; **Sperbergrasmücke** 12 ℳ; **Schwarzplättchen,** stepr., 10 ℳ; **Müllerchen** 6 ℳ; **Gartenrotschwänze** 6 ℳ; **Rotkehlchen** 3—5 ℳ; **Gelbspötter** 12 ℳ; **Ia Singdrossel** mit Davidruf 18 ℳ; **Feldlerchen** 5 ℳ; **Heidelerchen** 8 ℳ sowie alle einheimischen Körnerfresser. **Raubwürger,** Ia im Gefieder, 15 ℳ; **Exoten,** Paar von 3.50 ℳ an, bei Abnahme von 10 Paar 3 ℳ per Paar. Versand unter Nachnahme oder gegen Voreinsendung des Betrages. Porto und Verpackung 3.50 ℳ, Dringend 6.50 ℳ. Bei Anfragen bittte Rückporto beifügen.

Zoologische Handlung
G. Behnke, Berlin O 34,

Petersburger Straße 29. [1748

Schwarzdrosseln

gute Sänger, hochf. im Gefieder, Stück 3.50, Buchfinken 1.50 M., Hähne und gesunde Ankunft garantiert

Joh. Kraienhorst [1749
Westerwiehe (Westfal.).

Zeisighähne 2.50, Stieglitzhähne 3.50, Bluthänflinge 2.50, Buchfinken 2.—, Steigerlerchen 3.—, Haubenlerchen 5.—, Stare 5.—, Gelbspötter 10.—, kl. w. Kakadu 45.—, Grünpapagei 50.—, Dompfaffen, rote 7.—, blaue 3.— Mk.
Zoolog. Handlung **A. Wasielewski, Berlin-Neukölln,** Nogatstraße 30.
Fernsprecher Neukölln 5052. [1750

1 Mäusebussard 27 M.,

1 Turmfalke 11 M., 1 Dohle 6 M., alle Tiere sind kerngef., nur etw. in Flügel u. Schwanz abgestoßen Tausche auch. [1751

R. Roider, Simbach am Inn
(Niederbayern).

3 Schleiereulen

Frühbr. 24 u. 25 prachtvoll im Gefied., gesund und munter, verkaufe billig.
Tausch gegen alles.
Flachmeyer, Mennighüffen 406,
Westfalen. [1752

Annahme von Anzeigen bis Sonnabend den 12. Dezember

1 P. Nymphen-Sittiche

Zucht 1924, gibt ab [1753
E. Stümcke, Vegesack (Bremen).
A.Z.-Mtgl. 258. Anfragen Rückporto.

Gebe ab:

Jap. Mövchen eigener Zucht, passend zur Aufzucht seltener Prachtfinken, pro Paar M. 12.—, unsortiert 10 Stück 50.— M., Verpackung und Porto zum Selbstkostenpreis. [1754
Dr. A. Schröter, Bad Berka
b. Weimar, Badestraße 101 a.

1 Schmuck- und 1 Gebirgslori

verkauft zusammen für 185 M.,
1,0 Singsittich 45 M. [1755
Pracht, Düsseldorf-Gerr.

Bastarde

Hänflingskanarien, schöne Sänger, Stück 12 M., **Zeisig- und Girlitzkanarien,** fleißig singend, Stück 9 M., verkauft
Max Mettendorff, Berlin N 58,
Sonnenburger Str. 9. [1756

Papageien und Affen

Pr. Graupapageien (Kongo), **Amazon.-Papageien, Araras und Sittiche, kleine Spielaffen und andere** billig zu verkaufen.
Es kommen nur gesunde Tiere zum Versand. Anfragen mit Retourmarke. [1757

Hermann Rath

Zoologische Handlung
Hamburg 4. Sophienstr. 34.
Gegründet 1889. — Telefon D II 5785.

Verkaufe:

1,1 ff. Reisfinken 10.—, **1,0 Graukardinal,** ff. 10.—, **1,0 Safranfink,** ff. 7.—, **1,2 Kanarien.** tiefe Vögel, 16.—, **1,0 Drossel** m. bgdm. Flgl. 5.—.

Krebs, Wolfstein

(Rheinpfalz). [1758

Das Abbalgen und Ausstopfen kleiner Vögel [1759
ist mühsam und zeitraubend. Das Verfahren, Vögel samt dem Fleischkörper mittels Einspritzung einer Konservierermasse schnell, schön, dauerhaft u. billig zu präparieren, wird schon seit 20 Jahren von vielen angewendet. Genaue Anleitung und Rezepte hierzu enthält die Broschüre: **„Die Mumifizierung von Vögeln und kleinen Säugetieren"** von Ludwig Kirchrobt, Oberlehrer, Klosterneuburg, Österreich. Preis 2 Gmk. Nachnahmeporto 50 Pfg.

Schönfelders Kanarienfeinzucht, Dresden-Trachau 37,

gold. Med. präm., Urstamm Seifert-Wolf, empfiehlt tiefe Hohlroller, Knorren, Schockel, schöne tiefe Flöten, Zuchthähne und ff. Tag- und Lichtsänger à 12, 15, 18 M., 3 Stück zus. 40 M., erstklassige Vorsänger und Ausstellungshähne à 20, 25, 30 M., 3 Stück zus. 60 M., prima Zuchtweibchen à 4 M. Versuch lohnt. Hunderte von Dankschreiben. [1760

Schneeweiße

Kanarien, desgleichen weißblaue u. ganz blaue, Hähne u. Weibchen in großer Auswahl.
Richd. Heydenreich,
Bad Suderode, Harz. [1761

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 17. Dezember 1925 | Heft 51

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Allerhand aus Tirol.

Von M. Sandner, Innsbruck.

(Nachdruck verboten.)

Meine frühere Mitteilung über die Sperlingseulen hat ziemliches Interesse gefunden; ich möchte daher noch einiges hinzufügen und, da ich aus Anfragen auch Interesse für übrige Hochgebirgsbewohner fand, noch weiter ausgreifen.

So brav und sittsam sich meine Eulen anfänglich gegenüber den übrigen Bewohnern meiner Vogelstube betrugen, so gründlich veränderten sie später, und zwar ganz plötzlich, ihr Wesen. Als ich sie wieder einmal, wie schon öfter, freiließ, stürzte sich ganz unerwartet das Männchen mit einer derartigen Wucht auf einen meiner Lockbauer, der einen Stieglitz beherbergte, daß ich glaubte, der Käfig geht in Fransen. Seitdem ist es auch Schluß mit dem Freiflug. Auch untereinander sind sie nicht mehr so friedlich. Besonders das Männchen hat richtiges Raubvogelblut. Wenn es auch nur von weitem einen Vogel sieht, zittert es schon am ganzen Körper. Riesig komisch wirken dann die Verdrehungen des Kopfes, das Wippen und seitliche Hin- und Herschnellen mit dem Schwänzchen. Wenn jede der Eulen irgendeinen Raub im Fang hat, ist es interessant zu beobachten, wie ängstlich bzw. mißtrauisch sie gegeneinander sind. Keine Bewegung des Andern wird übersehen! Sie erinnern mich in dem wie in manch andern Punkten lebhaft an das Benehmen der Affen. Besonders kraß wirkt sich auch bei ihnen die bekannte „Weitsichtigkeit" der Eulen aus. Meine werden grundsätzlich nur aus der Hand gefüttert. Halte ich nun ein Stück Fleisch in der Hand, kommt die Eule sofort auf diese, kann jedoch die Beute, wenn ich inzwischen die Lage derselben veränderte, nicht mehr finden. Mit dem Schnabel tastend, sucht sie die ganze Hand ab, bis sie zufällig auf das Fleisch kommt. Vögel, selbst Mäuse werden sorgfältig gerupft, dann aber gänzlich, in kleinen Stücken, gefressen. Was nicht sofort verzehrt wird, verstecken sie zusammengerollt in eine bestimmte Ecke ihres Käfigs. Bevor sie vom Versteck wegfliegen, beobachten sie noch längere Zeit unter komischen Bewegungen ihr Werk. Im übrigen sind sie, vielleicht durch meine Schuld, ziemlich heikel. Fleisch, selbst Herz, wird längere Zeit hindurch ungern gefressen. Bei mehrtägiger Fütterung lediglich mit Rindfleisch läßt ihr Raubtemperament merklich nach, wird dagegen bei Vögel- oder Mäusenahrung sofort wieder geweckt.

Von sonstigen interessanten Gebirgsbewohnern sah ich voriges Jahr im Frühherbst einen Dreizehenspecht im oberen Inntal. Heuer wurde ein solcher vom Hofrat R. der hiesigen Landesregierung im Achenseegebiet einwandfrei festgestellt. Auch dieser Gebirgsvogel dürfte wohl öfter vorkommen, als man glaubt, aber vielfach mit dem großen Buntspecht verwechselt werden.

Erfreulicherweise mehren sich die Mitteilungen über das Vorkommen des Alpenmauerläufers in Tirol. Ich selbst sah zwei Stücke vor zwei Jahren im schneereichen Spätwinter in nächster Nähe Innsbrucks an einem kleinen Steinbruch. Auch im vorigen Winter wurde an derselben Stelle von einem hiesigen Vogelliebhaber ein solcher festgestellt. Sollte der heurige Winter wirklich, wie vorhergesagt, schneereich und streng werden, dürften wieder Mauerläufer bis in die Talsohle kommen. Für alle Fälle wird ein entsprechender Käfig vorbereitet; ich möchte gar zu gern mit ihm mein Glück im Zusammenleben versuchen.

Ein Gebirgsvogel, der überall eher gekäfigt wird als in Tirol, ist die Alpenbraunelle. Sie ist zwar unter den verschiedensten Volksnamen bekannt, welche aber ebenso auf andere „Jochvögel" angewendet werden. Da eben fast keine Nachfrage ist, wird sie kaum gefangen. Hie und da ein Zufallsstück. Auch mir, der ich der Gilde der „Vogelfächer" gar nicht so ferne stehe, war das Glück nie hold. Ich habe auch nie die von unserem leider verstorbenen heimischen Feld-, Wald- und Wiesenornithologen Anzinger beschriebenen Schwärme von Alpenbraunellen während des Herbstes im Mittelgebirge gesehen.

Komisch wirken für uns Innsbrucker Liebhaber die Anzeigen in der „Gef. Welt" über „Tiroler Gebirgsschwarzplättchen". Diesen Händlern sei gesagt, daß wir Innsbrucker Liebhaber unsere „Schwarzplattln" überall lieber herbeziehen als von Tirol: denn soviel man da überhaupt verallgemeinern kann, sind sie überall besser im Gesang als speziell im Inntal. Mag sein, daß im Durchzug hie und da ein guter Vogel gefangen wird, aber wer die Wahl

hat, tut jedenfalls nicht schlechter, seine Schwarzplättchen wo anders her als von Tirol zu beziehen.

Weil ich gerade vom Vogelfang schreibe, zum Schluß noch etwas darüber: Er ist natürlich auch bei uns strengstens verboten. Wenn man die Sache näher untersucht, findet man auch genug „Funktionäre", die den Stumpfsinn dieses radikalen Verbotes einsehen; leider ist es aber gegenwärtig ein Glaubensartikel, der auf die urteilslose Masse wirkt und gern nachgebetet wird.

Im übrigen: geradeso wie ein richtiger Tiroler dort, wo es noch Wild gibt, das Jagern nicht läßt, läßt der richtige Tiroler Vogelliebhaber den Vogelfang nicht, selbst auf die Gefahr hin, daß er erwischt wird; und schließlich, der's nicht im Blut hat, kann sich seine Lieblinge um billiges Geld am Innsbrucker Markt kaufen, insbesondere die Tiroler „Wappenvögel": „Krumpschnabel, Tannenmoasen und Roatkröpfl".

Etwas über Krankheiten unserer Exoten.

Von S. Lichtenstaedt.

(Nachdruck verboten.)

Dem freundlichen Leser möchte ich, ehe er die nachfolgenden Zeilen liest, ausdrücklich erklären, daß ich nicht die Absicht hatte, einen Artikel über Vogelkrankheiten und ihre Heilung zu schreiben. Nur einige allgemeine Anleitungen und Erfahrungen auf Grund eigener Beobachtungen möchte ich veröffentlichen, und bitte ich auch andere Liebhaber, ihre Erfahrungen, welche sie mit kranken Stubenvögeln gemacht haben, in unserer „Gef. Welt" der Allgemeinheit zugute kommen zu lassen und zu veröffentlichen.

Wir haben über Vogelkrankheiten leider kein modernes, zeitgemäßes Werk, an Hand dessen wir in der Lage sind, wenigstens den Versuch zu machen, einen Kranken zu heilen.

Die Erfahrung ist wohl der beste Lehrmeister. Ich habe mir eine Sammlung vieler Artikel aus verschiedenen Vogelzeitschriften, welche Krankheiten behandeln, angelegt und Versuche mit den dort empfohlenen Mitteln angestellt. Manchmal half es, meistens nicht. Manchmal sollten die Mittel todsicher helfen, bei mir versagten sie völlig, resp. sie halfen — — todsicher. So erhielt ich unfehlbare Mittel gegen Krämpfe bei Papageien zugesandt, welche dem Vogel nicht die geringste Linderung brachten.

Ein Liebhaber, welcher heute ein Mittel gegen eine Krankheit angewandt hat und wirklich Erfolg hatte, glaubt nun den Stein der Weisen gefunden zu haben, um das nächstemal zu sehen, daß bei der gleichen Krankheit das Mittel völlig versagt.

Sehr häufig wird ein Vogel nicht durch ein bestimmtes Mittel, sondern trotz eines solchen gesund, ja, ich behaupte sogar, daß manche scharfe Heilmittel das Ende eines kranken Vogels nur beschleunigen helfen.

Viele Liebhaber sind der Meinung, daß Heilmittel, welche einem Menschen Linderung bringen, auch dieses ohne weiteres bei einem Vogel tun müßten. Diese Meinung ist entschieden irrig. Solange es sich um harmlose Sachen handelt, richten solche Heilmittel zwar wenig Schaden an, greift der Liebhaber aber zu schärferen oder gar giftigen Dingen, so wird er einen vielleicht durch lange Krankheit schon geschwächten Vogel um so schneller ins Jenseits befördern.

Welch ein Unfug ist es beispielsweise, einen Durchfall bei einem Jako zu „stopfen". Ein Durchfall ist nur ein Symptom einer Krankheit, schwindet diese, so hört der Durchfall ganz allein auf. Halten wir die faulenden Kotmassen aber künstlich im Körper zurück, so können wir sicher mit dem Eingehen des Vogels rechnen.

Wie oben gesagt, versagen sehr häufig Mittel, mit welchen ein Liebhaber gute Erfolge gehabt hat, bei anderen völlig. So veröffentlicht Herr Otto Böneker in Nr. 15 der „Wochenschrift" ein unfehlbares Mittel zur Heilung kranker Gouldamadinen, und zwar eine Mischung von Pfefferminz- und Kamillentee. Herr B. sagt am Schlusse seines Artikels: „Jedenfalls bin ich heute wegen eines kranken Vogels nicht mehr besorgt."

Ich möchte Herrn B. antworten, daß ich das empfohlene Mittel verschiedentlich, zuletzt bei frisch importierten Mohrenköpfen, anwandte, ohne den gewünschten Erfolg zu erzielen. Ich halte es auch für selbstverständlich, daß das Mittel bei ansteckenden Darmerkrankungen, Typhus, Sepsis, welche als Ursache Bakterien oder Mikrokokken haben, völlig versagen muß, bei leichteren Darmerkrankungen jedoch wirksam sein kann.

Jedenfalls bin ich über jede Erkrankung meiner gefiederten Lieblinge sehr besorgt, da nach meiner vollen Überzeugung hier unser Wissen noch Stückwerk ist, ja ich behaupte sogar, daß in vielen Fällen der Liebhaber überhaupt nicht weiß, was seinem Vogel fehlt. Sehr häufig ist es mir passiert, daß die Sektion eines toten Vogels eine ganz andere Krankheit ergab, als ich annahm, und natürlich die Behandlung des Tieres eine völlig falsche war.

Vielfach sind über die Ursachen mancher Krankheiten bei den Liebhabern noch Ansichten verbreitet, welche heute nicht mehr stichhaltig sein können. Ich führe nur zwei Beispiele an. Kalkdurchfall: Derselbe entsteht laut vielen Lehrbüchern durch Mangel an kalkhaltiger Nahrung. Das stimmt nach meinen Erfahrungen nicht. Selbst bei reichlichster Kalkzufuhr erkrankt ein Vogel an dieser sehr schweren Krankheit, wenn seine Organe den Kalk nicht richtig verarbeiten. Die Krankheit entsteht also nicht aus Kalkmangel, sondern aus Krankheit der Organe, welche den Kalk dem Körper nicht zuführen. Legenot: Immer wieder taucht das alte Märchen auf, daß auch Legenot aus Kalkmangel entsteht. Unter diesen Umständen dürfte es bei einem Vogelzüchter Legenot überhaupt nicht geben, denn jeder vernünftige Vogelwirt versorgt seine Tiere mit Kalk.

Legenot entsteht nicht durch Kalkmangel im Futter, sondern durch Schwäche der Legeorgane der Weibchen. Den besten Beweis für meine Behauptung boten mir meine Freivolieren. Hier kam Legenot überhaupt nicht vor, da die Tiere durch die frische Luft und durch ausgiebige Bewegung kräftig und gesund waren. Nur zu junge Weibchen erkrankten einmal an dieser vom Züchter so gefürchteten Krankheit.

Legenot kann man also nicht verhüten, indem man seinen Vögeln Kalk reicht, sondern indem man kräftige, gesunde Weibchen zur Zucht nimmt und diese in gesunder, reiner Luft und in möglichst großen Volieren hält.

Bei Darmentzündungen meiner großen Papageien hatte ich, wie ich bereits in meinen früheren Artikeln erwähnte, große Erfolge mit Schleimfütterung. Reis, Haferschleim, Buchweizengrützenschleim haben sich bei mir glänzend bewährt. Helfen können sie natürlich nur, wenn es sich um eine verhältnismäßig einfache Darmentzündung handelt.

Handelt es sich um eine bakterielle Erkrankung, so werden sie auch meistens versagen. Von Herrn Tierarzt Nowodny wird mir als ein vorzügliches Mittel selbst gegen schlimmsten Darmkatarrh Wismut empfohlen. Derselbe rettete eine Amazone, welche blutigen Stuhl hatte und jede Nahrung verweigerte, durch eine Wismutkur.

Leichte Erkältungskrankheiten, besonders Schnupfen, wie sie frisch importierte Amazonen so häufig mitbringen, wird man am besten mit Dampfbädern bekämpfen. Solche sind aber nur mit der größten Vorsicht zu reichen. Nach dem Dampfen muß der Vogel weiter warm stehen, wenn man Erfolg haben will, sonst kann man das größte Unheil anrichten.

Gegen Krämpfe, speziell bei Graupapageien, habe ich alle möglichen Mittel angewandt, ohne von einem Erfolge sprechen zu können.

Ruhiger, kühler Standort des Vogels ist unbedingt erforderlich, überhaupt ist es eine völlig verkehrte Ansicht, daß Graupapageien in hoher Wärme gehalten werden müssen. Das beste Mittel, um die Anfälle zurückzuhalten, ist, stets für leichten Stuhl des Vogels zu sorgen. Also viel Obst, besonders Weintrauben und Äpfel, Mistelbeeren, keine ölhaltigen Sämereien, und als Getränk leichten Baldriantee.

Die unangenehmsten Krankheiten, und auch nach meiner Erfahrung die schlimmsten, sind die sog. Importkrankheiten. Dieselben befallen frisch importierte Exoten und raffen sie zu Tausenden hin.

Ich habe mir alle erdenkliche Mühe gegeben, um krank ankommende, frisch eingeführte Exoten zu retten, habe aber bei wirklich ernsten Erkrankungen recht wenig Erfolge erzielt.

Vor einigen Wochen erhielt ich eine Anzahl frisch importierter Mohrenköpfe. Alle erschienen gesund, nur ein Vogel war bedeutend leichter im Gewicht als die anderen. Gerade dieser Vogel war besonders zutraulich, kam mir sofort auf die Hand und ließ alles mit sich geschehen. Wenn frisch importierte Mohrenköpfe und auch andere Sittiche und Papageien sofort außergewöhnlich zahm und zutraulich sind, so kann man sehr oft damit rechnen, daß sie nicht gesund sind*).

Auch dieser Mohrenkopf ging nach etwa 14 Tagen ein. Er war bis drei Tage vor seinem Tode verhältnismäßig munter, magerte aber trotz bester Pflege rapide ab und war schließlich nur noch Haut und Knochen. Ich ließ kein Mittel unversucht, um ihn zu retten, doch war alles vergeblich. (Schluß folgt.)

*) Ausnahmen lasse ich bei den Feuerflügel-, Tovi- und ähnlichen Sittichen gelten, welche häufig „dummzahm" zu uns gelangen.

Von meinen Staren.

Von Helmut Hampe, Braunschweig.

Mit 6 Aufnahmen des Verfassers.

(Nachdruck verboten.)

Da in unserem Hausgarten jedes Jahr fünf bis sechs Paar Stare brüten, gelangen öfters ein oder mehrere Nestjunge in meinen Besitz. Die Aufzucht derselben bereitet ja keine Schwierigkeiten; wenn sie so alt oder besser ein oder zwei Tage jünger wie die auf dem Bilde S. 603 gezeigten sind, sperren sie noch sofort oder doch sehr bald und sind schon kräftig genug, die Umgewöhnung an das Ersatzfutter ohne Schaden zu ertragen, vorausgesetzt, daß diese nicht allzu plötzlich erfolgt. Man reiche also in den

Star, etwa 6 Tage alt. Aufnahme von Helmut Hampe.

ersten Tagen noch möglichst viel Käfer, Würmer und dergleichen, um später hauptsächlich geschabtes Pferdefleisch, das mit etwas gemahlenem Zwieback oder Universalfutter zu kleinen Klumpen geknetet wird (s. Neunzig, Einheimische Stubenvögel), in Milch erweichtes Weißbrot und ähnliches zu geben. Dabei gedeihen sie im allgemeinen vorzüglich; sollte der eine oder andere doch dabei erkranken, so läßt er sich mit reichlich Ameiseneier und sonstigem natürlichem Futter leicht wiederherstellen. Man kann übrigens sofort mit der Nase feststellen, ob ein Star gesund ist; ein solcher hat nämlich einen ganz bestimmten, sehr intensiven, aber durchaus nicht unangenehmen Geruch, der beim Eintreten einer Verdauungsstörung verschwindet. Der Vogel riecht alsdann widerwärtig sauer. Ein Gleiches habe ich bei verschiedenen anderen Weichfressern, auch bei Finken und Tauben, oft beobachten können.

Einige Mühe macht die Gewöhnung der Stare an selbständiges Fressen; Mehlwürmer und Ameiseneier nehmen sie zwar leicht auf, manche wollen aber höchst ungern ans Mischfutter gehen. Man darf dann nicht die Geduld verlieren und muß sie noch längere Zeit reichlich nachfüttern, damit sie nicht mager werden. Sind sie das Mischfutter erst ein-

mal gewöhnt, so fressen sie es sehr gern; meine jetzigen mögen es sogar lieber wie Ameiseneneier, während meine sämtlichen früheren geradezu wild wurden, wenn wir ihnen nur die Schachtel mit den trockenen Ameiseneiern zeigten. Im übrigen ist die Ernährung der Stare höchst einfach; wenn man mehrere Weichfresser hätte, bekommen sie hauptsächlich die Reste vom Futter, daneben allerlei Abfälle des Haushaltes, einige Mehlwürmer, und zur gegebenen Zeit viel Obst und Beeren. Dabei halten sie sich vortrefflich.

Zweifellos ist der Star einer der klügsten Vögel; daher besitzt auch jeder ganz bestimmte individuelle Merkmale, wenn auch natürlich im großen und ganzen alle sich doch ziemlich gleichen. Natürlich hat das auch für andere Vögel Geltung; gerade bei Staren — und bei aufgepäppelten Wellensittichen — ist es mir jedoch immer besonders aufgefallen. Deshalb hat mir die Aufzucht dieser zwei Vogelarten auch stets besonderes Vergnügen bereitet.

Der erste Star, den ich vor Jahren in Gemeinschaft mit meiner Frau großzog, zeichnete sich durch besondere Zahmheit aus. Wir hatten ihn einzeln aufgezogen, und bekanntlich werden solche Vögel meist zahmer, als solche, die zu mehreren gehalten werden. Außerdem hatten wir uns damals sehr viel mit ihm beschäftigt; er war eigentlich dauernd bei uns, ging mit in alle Zimmer und sogar mit in den Garten; solange er noch jung war, folgte er uns laufend, später zog er es vor zu fliegen. Auf Anruf oder Pfiff antwortete er stets mit lautem Schrei und kam sofort herbei, auch wenn er sich hoch in den Bäumen aufhielt. War er einmal in seinem Käfig eingesperrt, so verhielt er sich darin ruhig, solange nur meine Frau im Zimmer war; hörte er aber mich die Flurtür aufschließen, so begann er zu toben und war erst zufrieden, wenn er herausgelassen wurde und bei mir war. Damals gab es noch Fleisch auf Marken, das hinderte ihn jedoch nicht, sich mittags von unseren Tellern die besten Happen zu holen. Wenn er sie wenigstens gefressen hätte! Aber meistens warf er sie einfach fort und holte sich immer wieder neue. Kartoffeln und Gemüse überließ er großmütig uns. Wenn ich an meiner Voliere arbeitete, so war er natürlich immer dabei und fand besonderes Vergnügen daran, kleine Nägel, besonders die sogenannten Blauköpfe, zu verschlucken. Was ihn dazu bewogen hat, ist mir heute noch unklar. Nach kurzer Zeit spie er sie dann wieder aus, doch meist nur, um sie, wie es die Weichfresser oft mit ihren Gewöllen machen, von neuem zu verzehren. So hatten wir lange Zeit unsere Freude an dem Tier; doch als er einmal wieder mit auf dem Balkon genommen wurde, flog er plötzlich weit fort und schien verschwunden; doch ging es diesmal noch gut, nach zwei Stunden kam er auf meinen Pfiff freudig schreiend zurück. Von da ab blieb er oft lange Zeit aus und eines Morgens verschwand er für immer; es hatte ein heftiges Gewitter eingesetzt und der Vogel ist, dadurch erschreckt, zu weit geflogen, so daß er den Rückweg nicht wieder finden konnte. Wahrscheinlicher ist aber wohl, daß er in einem Hause Schutz gesucht hat und festgehalten ist.

Die beiden Stare, die ich das nächste Jahr aufzog, gingen mir bestimmt auf letztere Art verloren; verschiedentlich wurden sie mir von Nachbarn, in deren Fenster sie geflogen waren, zurückgebracht. So noch einen Tag, bevor sie endgültig verschwanden. Im übrigen waren sie, da sie stets zusammengehalten wurden, nicht so zahm wie der vorige, jedenfalls längst nicht so anhänglich. Immerhin kamen auch sie auf Anruf sofort, sogar von unserer im 1. Stock gelegenen Wohnung durchs offene Fenster, direkt in den Garten, wenn ich sie von dort aus rief, und was mehr besagen will, auch umgekehrt.

Auch die nächsten zwei Stare sollte ich nicht lange behalten; noch im ersten Sommer gingen sie mir an im Darm schmarotzenden Fadenwürmern zugrunde, mit denen sie wahrscheinlich durch Regenwürmer oder Schnecken, die ich reichlich verfüttert hatte, infiziert worden waren. Sie waren wieder zahmer wie die vorigen; merkwürdigerweise antworteten sie mir stets mit leiser Stimme, während sonst die Stare stets sehr durchdringend zu schreien pflegten. Sie wurden mit zwei Turmfalken zusammen aufgezogen. Vor diesen, doch immerhin nicht ungefährlichen Raubvögeln, hatten sie daher nicht die geringste Furcht. Als sie schon längst fliegen konnten, suchten sie noch immer mit Vorliebe das Körbchen auf, in dem die noch etwas jüngeren Falken saßen, und kuschelten sich ganz dicht an diese an, ja sie krochen sogar direkt unter ihre Genossen, deren Wärme ordentlich auszunutzen. Später kamen die vier zusammen in einen Flugkäfig von $2^1/_2$ m Länge, wo sie sich mehrere Wochen vorzüglich vertrugen. Die unglaublich frechen Stare scheuten sich nicht, gelegentlich den Falken ein Stück Fleisch aus den Fängen zu reißen oder tüchtig auf sie einzuhacken. Diese, einmal an die Stare gewöhnt, ließen sich das auch gefallen, obwohl sie andere in ihrem Bereich kommende Vögel zu fangen suchten. Aber im Laufe der Zeit gewann ihre Raubtiernatur doch die Oberhand. Nachdem wir sie schon einigemale den Staren nachstellen gesehen hatten, hörte meine Frau eines Morgens ein entsetzliches Geschrei, und fand, herbeigestürzt, den einen Falken auf einem Star sitzen, während der andere davorstand, bereit das sich heftig wehrende Opfer mit dem Schnabel zu hacken. Daraufhin wurden sie natürlich sofort getrennt; zum Glück war es noch nicht zu spät gewesen und der Star hatte noch keinen Schaden genommen. Wenige Wochen nachher gingen dann die beiden an den Eingeweidewürmern zugrunde.

Somit war es zum drittenmal nichts mit den Staren; das reine Verhängnis! Hoffentlich wird nun mit den dreien, die ich dieses Jahr aufgezogen habe, nichts passieren. Alle drei sind wieder zahm, besonders einer; mit diesem haben wir uns aber auch am meisten beschäftigt und ihm viel Freiflug im Zimmer gestattet. Der zweite, ein sehr dunkles Exemplar, also wohl ein ♂, ist ein Raufbold, dem es große Freude bereitet, seine beiden Artgenossen, die mit ihm einen Flugkäfig von $1{,}25 \times 0{,}50 \perp 1{,}20$ m bewohnen, oder zufällig von außen an das Gitter fliegende andere Vögel an den Füßen zu fassen und zappeln zu lassen. Der dritte scheint etwas dumm zu sein; jedenfalls macht es ihm immer noch Schwierigkeiten, seine reichlich $^1/_2\square$ m große Käfigtür zu

finden. Im übrigen halten die drei stets zusammen und führen alles gemeinsam aus, sei es das Fressen, das Baden oder irgendein Unfug, wie das Herausziehen von Gardinennadeln, das Zerstören von Blumen u. dgl. Durch den riesigen Eifer und die große Hast, mit der sie dabei zu Werke gehen, wirken sie unsäglich komisch. Geradezu grotesk aber wird die Szene, wenn wir sie alle drei während des Mittagessens herauslassen. Im Nu sind sie zur Stelle, der erste faßt auf dem Teller Posto, der andere auf der Gabel, und der dritte fliegt auf die Schulter, die Bissen, die den beiden anderen vielleicht noch entgangen sind, zu guter Letzt noch aus dem Munde zu holen. Will ich die Wegelagerer fortjagen, so wehren sie sich mit wütenden Schnabelhieben und begeben sich schließlich beleidigt zu meiner Frau, bis sie von dort vertrieben, sich wieder bei mir zu Gaste laden. So bereiten uns die Tiere durch ihre Anhänglichkeit, ihre Klugheit und ihr drolliges Wesen manche vergnügte Stunde; leider schmutzen sie recht erheblich; bei uns in der Vogelstube spielt das ja keine große Rolle, im Wohnzimmer dagegen kann man ihnen doch nicht gut öfteren Freiflug gestatten, falls man dort Plüschsessel und sonstige leicht zu beschädigende Möbel stehen hat.

Notizen aus vergangenen Jahren.

Von A. Jena, Biberach/Riß.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Ulm, den 7ten Juni 1860.

Werter Vetter Stadtschmidt!

Soeben war ich bei Herrn Ebner und habe bei ihm nachgefragt, welcher mir Euere Fragen beantwortet hat u. also lauten: 1. der ungarische Vogelhändler komme bloß alle 2 Jahre nach Ulm, denn wenn er alle Jahre käme, so würde er keine Vögel anbringen. 2. Es sei gar kein Unterschied zwischen den besprengten Vögel mehr oder weniger, z. B. wie jünger der Vogel sei, desto mehr sei er besprengt, wie älter, desto weniger, also bei den älteren verliere es sich ganz, so sei auch der Unterschied beim Singen, wie älter, wie besser, wie alt daß sie werden, könne er gerade nicht sagen, denn alt werden sie auf keinen Fall, weil in Wien eine viel feinere Luft sei c. c. Ich soll Euch nur das Beispiel anführen, es verhalte sich gerade wie bei den Menschen, die einen singen besser, die andern schlechter u. kommen ja doch alle auch aus einem Nest. Zwischen den Ungarischen u. Polnischen Sprossern sei auch kein Unterschied, überhaupt komme es gar nicht auf das Besprengte an, wie ich es ja schon oben angeführt habe. Sein Vogel sei ihm gleich verreckt, er habe aber noch nicht viel bei Nacht geschlagen; ich soll Euch anfragen, ob Ihr keine Nachtigallen kaufet, er habe 2, es müssen aber alle beide miteinander gehen, eine davon sei vom Wiener Vogelhändler und eine davon eine inländische, der Preis sei 9 fl. für alle beide, sie wären ihm nicht feil, aber er habe keine Zeit zum Füttern, weil sie soviel Zeit brauchen. H. Ebner läßt Euch vielmal grüßen u. wenn Ihr nach Ulm solltet kommen, so möchtet Ihr ihn auch besuchen.

Anmerkg. H. Ebner sagte zu mir, Ihr solltet halt auch so ein Vogelbuch haben, wenn Ihr ein's wollet, so wolle er Euch ein's besorgen, es kostet 5 fl., aber er wolle machen, daß Ihr's um 4 fl. 30 Kr. bekommt. Die Überschrift heißt: Friedrich, Vogelgeschichte.

Es grüßt Euch vielmal

Euer dankbarer Vetter Ernst Beck.

Ich meine, jetzt sollten die Fragen beantwortet sein, wo nicht, so gebt dem Johann einen Brief mit.

1861. Anfang Januar begann zu singen der Distel, Rotkehlchen, ausgangs Februar die Schwarzblatte, anfang April der Lerch, der Fink. Mitte Februar hatt der Sprosser wieder anfangen schlagen, mit Anfang Mai, gleich als ich ihn an's Fenster thun konnte, wegen der kalten Nächte hatt er gleich bei Nacht anfangen schlagen u. zwar dieses Jahr schon um 9 Uhr u. 10 Uhr u. hatt die ganze Nacht

Star, etwa 9 Tage alt. Aufnahme von Helmut Hampe.

bis früh am Morgen unausgesetzt fortgeschlagen. Den 9ten Juni hatt er das letztemal bei Nacht geschlagen u. hatt dann noch bei Tag an den Vormittagen fortgeschlagen bis zum 16. Juni, dann hatt er aufgehört, ausgangs Juni kam er in die Mauserzeit. Mitte Februar hatt die Nachtigall angefangen schlagen. Anfang Februar habe ich vom Rach alt, ein Rotkehlchen umgetauscht fürs meinige, es ist ein sehr zarter Sänger; am 9ten Mai habe ich in Grab's Garten eine Nachtigall gefangen, den andern Morgen hatt sie schon anfangen schlagen.

1862. Anfang Februar hatt anfangen singen die Nachtigall, Rotkehlchen und der Lerch. Den 16. Februar hatt mir dieser liebe Vogel (= der Sprosser) einen Fuß gebrochen, wir haben ihn dann geschindelt und in 8 Tag drauf konnte er wieder springen, dann haben wir ihn wahrscheinlich zu früh aufgebunden und der Fuß wurde böse und der gute dann auch, der Vogel wurde mir leider am 15. Aprill Cabut.

Biberach, den 31ten Mai 1862.

Vetter Ernst!

Auf Deinen Brief v. 22. d. M., wo Du mir geschrieben hast, Du warst bei Benzinger, habe ich

sogleich die Adresse benützt u. habe dem Mann nach München geschrieben, denn es wunderte mich, was ein solcher Vogel in München kostet. Weil Du unten im Brief noch beigesetzt hast, die Vögel seien theurer als in Ulm, dieses wird halt Benzinger zu Dir gesagt haben, und ohne mich vorher zu erkundigen u. durch Benzinger einen bestellen lassen, da wäre er mich freilich noch so hoch gekommen, denn dieser hätte die Hälfte noch drauf gemacht. Dieser N. hatt mir also geschrieben, er habe mehr Sprosser, welche wirklich schön schlagen und um den Preis von 4 fl. könne ich einen haben, aber ich müsse ihn durch einen Konduktör abholen lassen. Jetzt sey so gut und gehe gleich morgen, aber ganz bestimmt, zu Benzinger hin und sage zu ihm, ich habe einen Nachbar, einen Silberarbeitergehilfen, dieser sey in München u. bei diesem habe ich mich erkundigt. Jetzt dieser sey zufälligerweise von seinen Eltern der nächste Nachbar u. er kennt ihn ganz gut; dieser hatt wieder an den Mann „Bach" geschrieben und der Mann hatt also gleich mir geschrieben, diesen zu Liebe wolle er mir einen guten Vogel geben um den Preis von . . . fl., sonst kosten sie mehr bei ihm, aber ich muß ihn sobald als möglich holen lassen; jetzt frage, was ich ihm oder er dem Konduktör geben müßte fürs Herausnehmen von München bis zu ihm nach Ulm; also er soll so gut sein und mir den Gefallen erweisen u. was ich ihm dafür bezalen muß; dann muß er den Vogel bei sich behalten und ich hole ihn am Pfingstmontag selbst bei ihm ab. Der Schnellzug fährt in $3^1/_2$ Stund von München nach Ulm und auf einen solchen muß er achten, daß der Vogel kommt; auf einen andern ist er zu lang ohne fressen u. daß der Vogel nicht dem Rauch von der Lokomotive ausgesetzt ist, dieser tut ihm schaden. Ich meine also, wenn er einem Konduktör einen Gulden gibt, so wird er's wohl besorgen. Ihn will ich schon auch befriedigen, aber zuerst frage ihn, was ich ihm bezahlen soll, daß er mir den Vogel gut besorgt. Schreibe mir also dieses gleich morgen; denn wenn er mir diese Gefälligkeit erweist, so werde ich ihm gleich das Geld hinunterschicken u. er solle mir sogleich den Vogel kommen lassen und ihn behalten und gut füttern u. versorgen bis am Pfingstmontag, da hole ich ihn dann. Ich kann die Nachtigall, wo ich voriges Jahr selbst gefangen habe, gerade jetzt um 2 Kronthaler verkaufen und dann kommt mich dieser Vogel nicht mehr so hoch; dieses brauchst Du aber nicht zu Benzinger zu sagen. Es grüßt etc. etc.

1862. Den 15ten Juni habe ich den Sprosser von Bach-München erhalten, der Benzinger hat ihn selber gebracht, den 21. Juni hatt er still noch anfangen schlagen, den 28ten habe ich ihn wieder hören schlagen, den 30ten ditto. Den 2ten Nov. ist mir die Wiener Nachtigall Cabut worden, an der Dürrsucht.

1863. Den 28ten Febr. hatt der Sprosser von München angefangen schlagen (da habe ich ihn erstes mal gehört.) Diesen ersten Sommer über hatt er nicht viel geschlagen und bei Nacht noch gar nicht. Ausgang Juli nach der Mauser hatt er noch ein wenig still geschlagen. 21. Juni vom Rach 1 Rotkehlchen gekauft um 26 Kreuzer, es ist vor 14 Tag gefangen worden. Die Grasmück, Schwarzblatt u. Fink hatt dieses Jahr gesungen bis anfangs August. Anfangs Dezember hatt anfangen singen Rotkehlchen, ausgangs Dezember die Nachtigall.

1864. Anfang Januar die Lerche, ausgangs Januar singt die Grasmücke, den 21. Januar der Sprosser anfangen schlagen; den 4. März der Spotter. Die Lerch ist cabut worden; den 10ten Januar vom Rach eine Schwarzblatt gekauft, er hat sie im Herbst gefangen, kostete 1 fl. 36 Kr., singt schon. 28ten Februar vom Rach wieder einen Lerchen gekauft um 1 fl. 12 Kr., es ist ein vorjähriger; den 17ten April von ihm eine Grasmücke gekauft, alter guter Sänger um 2 fl. 12 Kr. Den 28ten Dezember hatt der Sprosser wieder schlagen anfangen.

1867. Den 3ten Januar ist mir die Nachtigall, wo ich 1861 gefangen habe, Cabut worden, wahrscheinlich hatte sie die Krankheit bekommen von dem Farbengeruch vom neuen Schmiedebruckdach.

1870. Den 3ten Januar habe ich an den Rettig 3 Vogelkäfig verkauft, die zwei grüne Amsel- u. Drosselkäfige mit Rösch (=Schublade) per Stück 1 fl. und das hohe Käfig mit 3 Abtheilungen um 2 fl. 30, zusammen 4 fl. 30; diese 4 fl. 30 werden dann abgerechnet an der Dachrinne, die er mir im Mai machen soll.

1871. 14ten August hatt Rettig mir die 4 fl. 30 bezahlt, er war hier. NB! Jetzt hat er noch ein Käfig von mir, wo er schon früher entlehnt hat; ein hölzernes Grasmückenkäfig.

1884. Den 19ten April habe ich den Sprosser, wo der Wagmeister Guter hatte, von seiner Tochter geschenkt bekommen, den 22ten April hat er ein wenig still geschlagen, einige Tage darauf kam er schon in die Mauser, im Juni an Peter & Paul hab ich ihn wieder schlagen hören, dann nimmer. NB. Diesen Vogel hat Guter vor 2 Jahr von Prag kommen lassen, er sagte zu mir es sey ein Rußischer Sprosser, geschlagen hat er bei ihm recht schön.

1887. Sonntag, den 23. Januar Nachmittag habe ich den rußischen Sprosser vom Wagmeister Guter seelig, welchen mir seine Tochter geschenkt hat, herausgefangen, um ihm die Füße zu reinigen und habe ihn leider wahrscheinlich im Fangen gedrückt, denn einige Minuten drauf wurde er Cabut. Ausgangs Jan. hatt der d. Sprosser (NB. der meinige) anfangen schlagen. Den 29ten Oktober hat er schon wieder angefangen.

1888. Ausgangs Juni kam er in die Mauser, nach der Mauser im Juli hat er am Morgen wieder geschlagen, aber still. Den 23. Dez. hat der Sprosser ein wenig geschlagen.

1889. Vom Januar an hat er immer viel gegeschlagen und im Juni viel bei Nacht, mitte Juni kam er in die Mauser; am 18. Dez. hat er wieder angefangen schlagen.

1890. Mitte Juni kam er in die Mauser, ausgang Juli hat er am Morgen noch still geschlagen; anfang Juli kam die Grasmücke vom Rach in die Mauser, ausgang Juli hat sie noch mal anfangen singen u. hat still gesungen bis Mitte August; den 25. Dez. an Weihnachten hat sie wieder anfangen singen.

1891. Den 1ten Jan. hat die Grasmücke vom Schuster anfangen singen, den 11. Jan. hat der Sprosser anfangen schlagen, den 5ten Mai habe ich vom Karl 1 Nachtigall bekommen für eine Grasmücke, die ich vor ein Jahr vom Schuster bekommen habe. Die Nachtigall ist eine frisch gefangene, er, der Karl hat mehrere bekommen aus Ungarn, das Stück um 4 Mark. Mitte Juli kam die Grasmücke vom Rach in die Mauser, am 28ten Dez. hat sie anfangen singen und auch der Sprosser schlagen.

Anfangsgründe und Grundrisse zur Weiterentwicklung in der Ausbildung des Kanariengesanges.

Vortrag, gehalten von Paul Holzky, Cöthen i. A.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Den Höhepunkt erreicht die gebogene Hohlrolle, wenn der Vogel diese noch „übersetzt", mit anderen Worten, also in verschiedenen Tonlagen zu Gehör bringt. Eine weitere Eigenart der Hohlrolle ist, daß der Vogel die Stimme beliebig anschwellen, aber ebensogut dämpfen kann. Geschieht ersteres nach und nach, also in mäßigem Tempo, so erlangt das Lied eine großartige Wirkung. Im letzteren Falle geht der Vogel bis zu den Bauchtönen herab. Also eine gedämpfte Hohlrolle. In dieser Vertiefung hält der Vogel nicht lange aus, während eine gerade Hohlrolle dem Vogel einigermaßen das Atemholen gestattet und sich demzufolge länger hinzieht, hingegen wieder die gebogene Hohlrolle, weil tiefer und ohne Atmen vorgetragen, nicht von langer Dauer sein kann. Hohlrollen werden bis zur vierten Tonlage gesungen. Z. B. das u beim i und ü kommen aber nur zwei Touren in Betracht, während das o sich wohl nur in der mittleren Lage bewegt. Wenn man von einer tiefen Hohlrolle auf o spricht, so ist wohl bestimmt anzunehmen, daß sich das o mit dem u vermischt hat, das sind Modulationen. Und Modulationen entstehen, wenn sich die einzelnen Grundtöne verbinden, z. B. das i mit ü und o mit u. Bewertet wird die Hohlrolle nach der Skala des V.-D.-K. mit bis 9 Punkten. Eine Hohlrolle mit 9 Punkten wird nur in den seltensten Fällen angewendet. Das muß schon etwas ganz hervorragendes, abnormes sein, in mächtiger Tiefe und Fülle. Das Tempo der Hohlrolle ist wohl das allerlangsamste im ganzen Kanariengesange, denn sie wird gleichmäßig ruhig hingezogen. Sie bedingt schon im voraus ein ruhiges, andauerndes Talent, mit Fleiß gepaart. Junge Vögel, aus durchgezüchteten Hohlstämmen, welche das Hohl einigermaßen in mehreren Lagen begriffen haben, fassen die übrigen Touren schon von selbst auf. Nun kultivieren wir die Hohlrolle als Haupttour weiter, sie ist die Perle, die Königin des Liedes. Züchten wir also gutes Hohl und immer wieder gutes Hohl, dann wird der Lohn nicht ausbleiben. Ich glaube, von der Hohlrolle alles Nötige erwähnt zu haben und komme jetzt zur nächsten verwandten Tour, zur Hohlklingel. Was ist nun eine Hohlklingel? Schon der Name sagt es, daß es eine hohle Klingel sein muß. Im Gegensatz von hochliegender Klingel. Ich versuche nach Möglichkeit, die Hohlklingel so zu beschreiben, daß eine Verwechslung mit der Hohlrolle fast ausgeschlossen ist. Die Hohlklingel ist aus der Hohlrolle entstanden, und zwar durch allmähliche Züchtung der tiefen Hohlrollen. Um das näher zu begründen, will ich mit meinen Erfahrungen ca. 40 Jahre zurückgreifen. Alle Züchter und namentlich Gesangskenner aus damaliger Zeit werden mir recht geben, daß die Vögel meist in höheren Hohlrollen, überhaupt in höheren Lagen arbeiteten. Die Klingeln waren vorherrschend. Man hörte mehr Klingelrollen als heute. Mit der Durchzüchtung der tiefen Hohlrollen faßten aber naturgemäß die Vögel auch die Klingeln ebenfalls tiefer auf und so entstanden durch sachgemäße Züchtung unsere heutigen Hohlklingeln, speziell die herrliche tiefe Hohlklingel. Nach diesen Ausführungen könnte man auch zu der Meinung kommen, daß, nachdem die

Star, etwa 12 Tage alt. Aufnahme von Helmut Hampe.

Hohlrolle in immer größerer Tiefe von den Vögeln verlangt wurde, diese (die Vögel) als Übergangsstück auch einer tiefen Klingel bedurften und, wie oben schon gesagt, sich auf unsere heutige Hohlklingel legten. Was eine tiefe Hohlklingel im heutigen Kanariengesang bedeutet, wird jeder Züchter zu schätzen wissen, der auf einen tiefen Vogel hält. Die Hohlklingel ist unstreitig eine unserer schönsten Rollen. Die Grundtöne der Hohlklingel sind u, ü und i als Vokale. Wir sehen, meine Herren, daß die Hohlklingel in 3 Grundtönen gebracht wird, also nochmals u, ü und i. Diese 3 Grundtöne müßte man zerlegen in 5 Tonformen, oder richtiger gesagt, in 5 Klangfarben. Das u in einer Lage, das ü kommt wohl in 3 Lagen zu Gehör. Das i nur einmal in seiner tiefsten Lage. In den höheren Lagen zählt es schon zur Klingel.

Wie kommt nun die Hohlklingel zum Vortrag, resp. wie kann sie der Vogel bringen? Das u vermischt sich mit dem ü, wird ohne den Konsonanten r zum Ausdruck kommen, denn bei den meisten Rollen hören wir das r, welches hier gänzlich fehlt. Es gibt auch Hohlklingeln, die mit einem l als Konso-

nant eingeleitet werden. Das l muß aber immer mehr verschwinden und zuletzt gewissermaßen in einen Hauch ausgehen. In diesem Falle wirkt die Hohlklingel bestrickend und ist in dieser Gangart wertvoll. Von verschiedenen Preisrichtern wird behauptet, die Hohlklingel wird mit r intoniert und dann mit l weitergeführt. Der Konsonant l ist ja, wie ich angeführt habe, selbstredend vertreten. Das r kann aber in der Hohlklingel nicht zum Ausdruck kommen, das läßt die Technik dieser Tour gar nicht zu. Es kann nur der Übergang der Hohlrolle zur Hohlklingel, oder der Übergang von der Hohlklingel zur Klingelrolle gemeint sein. In der Hohlrolle bewegt sich das r und ebenso in der Klingelrolle. Die wertvollste aller Hohlklingeln, die ein Vogel bringen kann, ist entschieden die, wenn er sie mit u beginnt, auf ü übergeht, dann wieder zurückgeht und dann eine metallische reine Klingel auf i anfügt. Eine rein vorgetragene Hohlklingel besteht also aus einer möglichst schnellen Anreihung (Ankettung) der Grundtöne o, h, u, l. Rein und gut vortragene Hohlklingeln sind schwer, strengen auch den Vogel am meisten an, zumal, wenn sie mit Weichheit und Fülle zum Ausdruck kommt. Nun gibt es aber noch Hohlklingeln, wo der Konsonant h vertreten ist. Das h setzt sich den Grundtönen vor und wird, wie eben gesagt, weitergeführt. Diese Art Hohlklingeln verlieren durch das h sehr wenig, denn das h tritt nicht scharf hervor und verbindet sich mit den Grundtönen zu einem reinen Ton. Die Hohlklingel artet eigentlich sehr wenig aus. Wird die Hohlklingel in höherer Lage auf i gebracht, wo in der Regel auch das Hohl nachläßt, so ist sie weniger wertvoll und geht hier schon zur Klingelrolle über. Wird der Grundton u beim Übergang zum ü nicht gut gehalten, und klar zum Vortrag gebracht, so kann leicht Nasenhohlklingel entstehen. Man achte hier genau auf den Schnabel, denn die Hohlklingel wird mit fast geschlossenem Schnabel gesungen. Ein langsames Anschlagen und Ziehen der Vokale wird etwas Schleppendes an sich haben. Wie es der Name auch hier schon sagt, hat man es hier mit einer schleppenden Hohlklingel zu tun. Auch von einer wässerigen Hohlklingel kann man sprechen, welche entsteht, wenn ein l verschwommen mit durchgehört wird, ähnlich wie bei einer Wasserrolle. Auch harte und flache Hohlklingeln gibt es. Diese entstehen, wenn sich ein unreiner Ton den Grundtönen der eigentlichen Hohlklingel beimengt. Dieses genau zu beschreiben ist sehr schwer und muß hier der Preisrichter sein Geschick zeigen. Auch Verwechslungen mit der Hohlrolle finden statt. Die Hohlklingel wird in recht schnellem Tempo vorgetragen und sehr häufig mit der Hohlrolle verwechselt. Man muß, um einen genaueren Unterschied zu machen, stets bedenken, daß in der Hohlrolle das r stark vertreten ist, welches bei der Hohlklingel doch gänzlich fehlt. Die Hohlrolle kann in tiefer oder höherer Lage gesungen werden. In jeder dieser Tonlagen hören wir das r heraus. Bei der Hohlklingel, wie schon oben angeführt, ist kein r zu hören. Alle diese merklichen Unterscheidungen zwischen Hohlrolle und Hohlklingel mußte ich hier anführen, damit möglichst Irrtümer vermieden werden.

Ich kann nun noch weitere, fast untrügliche, sichtbare Merkmale angeben. Eine Hohlrolle kann in jeder Lage gebogen werden. Bei der Hohlklingel ist dies ausgeschlossen. Die Hohlklingel kann wohl fallend und steigend gebracht werden, aber nie im Bogen, z. B. wie bereits erwähnt. Die Hohlklingel wird auf u übergehend auf ü gebracht, geht dann in höhere Lage auf i, weicht sogar verschiedenartig von den gebrachten Grundtönen ab. So hört es sich an, als wenn die Hohlklingel gebogen gesungen würde, in Wirklichkeit ist es ein Fallen und Steigen in verschiedenen Tonlagen.

Die Hohlklingel ist schließlich auch Modulationen ausgesetzt. Wie diese entstehen, habe ich bereits bei der Hohlrolle angeführt und zwar, wenn sich die einzelnen Grundtöne verbinden. Bewertet wird die Hohlklingel bis 6 Punkte. (Fortsetzung folgt.)



Stare, etwa 3 Wochen alt, sperrend, und junge, flügge Singdrossel.
Aufnahme von Helmut Hampe.

Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten.

Von J. Kuntzendorff, Berlin.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Die Trauertangare — Tachyphonus rufus (*Bodd.*).

In seiner tief getönten, stahlglänzenden Einfarbigkeit stellt sich dieser Vogel in einer Gefiederschönheit uns vor, die trotz der finsteren Farbe in keiner Weise düster wirkt. Das Männchen ist am ganzen Körper tief glänzendblau- bis violettblauschwarz mit stahlglänzendem Schimmer, der jedoch den Flügel- und Schwanzfedern fehlt, ausgenommen die inneren kleinen Flügeldecken, Achselfedern und Unterflügeldecken, die weiß sind; Auge braun, Schnabel schwarz, am Grunde und Unterschnabel bleigrau, Füße schwärzlich. Lg. 150 bis 180, Fl. 83—91, Schw. 75—86 mm. Das Weibchen ist oberseits rostbraun; unterseits hell gelblichbraun; Schwingen dunkelbraun mit hellen rostbraunen Säumen; Schwanz rötlichbraun; Auge braun, Schnabel bräunlichgrau; Füße schwärzlichbraun. Das Verbreitungsgebiet reicht von Kostarika und Panama durch ganz Südamerika bis Südbrasilien, Argentinien und Paraguay. Sie leben meist paarweise, jedoch

auch einzeln in dichtem Gebüsch des Waldes, besitzen schrille, durchdringende Lockrufe, hingegen aber keinen eigentlichen Gesang. Ihre Nahrung besteht aus Früchten, Insekten und Sämereien. Das Nest wird in hohem Grase gebaut, das Gelege besteht aus drei hell lachsfarbenen Eiern, die braunrot gefleckt und dunkelbraun gestrichelt sind.

Trotz der in der Literatur gemachten Angaben über die Bösartigkeit der Trauertangare schaffte ich mir den Vogel an. Was Beweglichkeit und Lebhaftigkeit im Käfig anbetrifft, so kommen sie der Purpurtangare ungefähr gleich, sind also hier im ganzen infolge ihres ziemlich ruhigen Wesens weniger interessant. Dagegen verhielt sich mein Exemplar im Flugraum ganz entgegengesetzt, hier war sie ein recht lebhafter Vogel, der gewandt im Gebüsch herumhüpfte und raschen, geraden Fluges den Zwischenraum zwischen den einzelnen Sträuchern durchmaß. Die Angabe über ihren Gesang fand ich voll und ganz bestätigt, unangenehme, laute und durchdringende Rufe sind ihr eigen, von einem richtigen Gesang konnte ich keine Spur entdecken.

Trauertangare.

Mein Hauptmerkmal richtete ich bei der Unterbringung der Trauertangare in der Voliere auf die Verträglichkeit des Vogels. War es doch nach den allseitigen Äußerungen, außer einem bekannt gewordenen Fall, der allerdings nicht ernst genommen worden war, ein großes Wagnis, den Vogel zu den vielen, oft recht heiklen anderen Insassen des Flugraums zu tun; stellte sich Bösartigkeit jedoch heraus, so konnte der Vogel bei größter Aufmerksamkeit meinerseits auch ohne Nachteile für die anderen Vögel schnell wieder aus dem Vogelhaus entfernt werden. Der erste Tag verging ohne jeden Zwischenfall, was ja auch auf Konto der fremden Umgebung gebucht werden konnte; als aber ein Tag nach dem andern verstrich, ohne daß ich irgendwelche Gefährdung der anderen Vögel wahrnehmen konnte und schließlich eine Woche seit dem Einsetzen vergangen war, während welcher die Tangare sich völlig gesittet betragen hatte, kam ich nach und nach zu der Überzeugung, daß das in der Literatur bekannt gegebene, die gesamte Art betreffende Urteil doch zu hart war und daß, wie bei so manchen anderen von mir verpflegten Tangaren, auch bei dieser Art der Individualismus ein gewichtiges Wort bei der Kritisierung einer Art mitzusprechen hat. Die Trauertangare zeigte sich während der $1^3/_4$ Jahre, die ich sie verpflegte, anderen Vögeln gegenüber als durchaus verträglich, was besonders durch folgendes noch krasser bewiesen wurde.

Genau ein Jahr nach Erwerbung dieses Vogels erhielt ich eine rotbraune Tangare — als solche war sie mir angeboten worden — die ich anfangs nicht klassifizieren konnte, bis ich dahinterkam, daß ich in dieser Neuerwerbung ein Weibchen Trauertangare erstanden hatte. Nun allerdings war die Frage der Unterbringung im Flugraum eine sehr, sehr heikle geworden. Denn ich nahm mit aller Bestimmtheit an, daß mit diesem Moment es nicht nur mit der Verträglichkeit des Männchens vorüber sein werde, sondern daß, nach den Erfahrungen Ruß', das Weibchen sich als der bei weitem üblere Teil des zukünftigen Ehepaares entpuppen würde. Aber auf eine Probe wollte ich es doch ankommen lassen, so stellte ich den Käfig mit der weiblichen Tangare

vorderhand in den Flugraum, um sie auf diese Weise an denselben zu gewöhnen. Gar bald hatte das Männchen die ihm zugedachte Gattin erspät, und es war interessant zu sehen, daß es sich gleich zur holden Weiblichkeit hingezogen fühlte. Nach einigen Tagen befreite ich das Weibchen aus seiner Gefangenschaft und nun setzte eine intensive Beobachtung ein, in welcher mich meine Frau in dankenswerter Weise kräftig unterstützte. Doch, soviel man Ausschau hielt nach eventuell vorkommenden Mißhelligkeiten oder gar gefährlichen Streitigkeiten unter den Vögeln, zu unserer Beruhigung stellte sich nichts dergleichen ein; das Paar vertrug sich, abgesehen von kleinen, belanglosen Reibereien am Futternapf, vorzüglich mit allen anderen Vögeln und während des $^3/_4$ Jahres, während welcher Zeit ich sie hatte — wegen meiner Übersiedlung von Zürich nach Berlin mußte ich auch diese beiden verkaufen — hatte ich in keiner Weise über sie zu klagen. Allerdings zu einer Brut ist es bei mir nicht gekommen, trotzdem die Örtlichkeit und der Raum dazu einladend und Nistmaterial vorhanden war. Jedoch die Zärtlichkeit, die sie einander bewiesen, zeigte, daß sie sich als zueinander gehörig betrachteten. Ich kann deshalb das allgemeine Urteil, das die Trauertangaren als bösartig, unverträglich und angriffslustig hinstellt, nicht völlig richtig erachten und muß immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig es ist, den Individualismus des Vogels mit in Betracht zu ziehen.

1879 schreibt Ruß in seinem großen Werk „Die fremdländischen Stubenvögel", Band I, die körnerfressenden Vögel S. 640 „... nur darauf sei hingewiesen, daß Erfahrungen von zahlreichen Seiten mit voller Entschiedenheit eine Bösartigkeit dieses Vogels festgestellt haben ...". 1897 schreibt Ruß in der „Gef. Welt" weiter S. 331: „Wie alle Tangaren, sind auch die beiden obigen (die Purpur- und die Trauertangare (Ruß gibt hier nicht nur auch der Purpurtangare, sondern allen Tangaren diese Charaktereigenschaft. D. V.) als böse, streit- und mordsüchtige Vögel bekannt; sie sollten daher weder im Gesellschaftskäfig und ins Besondere zur Nistzeit nicht in Vogelstuben freifliegend gehalten werden. Im Einzelkäfig oder im Flugraum mit Arten, denen sie nichts anhaben können, werden sie stets als herrliche Schmuckvögel ... gelten dürfen." Ruß also stellt dieses als feststehendes Endurteil über die Art Trauertangare hin, trotzdem ihm bekannt war, daß im damaligen Berliner Aquarium nach Angaben des Oberwärters Seidel das dort befindliche und zugleich nistende Pärchen sich als das Gegenteil erwies und sogar „sich gar nicht damit begnügte, ihre eigenen Jungen zu füttern, sondern daß sie die ihnen gereichten Mehlwürmer auch barmherzig jedem anderen Vogel bieten, welcher darum bettelt." (Ruß, „Die fremdl. Stubenvögel" Band I S. 640.) Er betitelt diese Angaben als „Fantasieschilderungen", aber nach den von mir gemachten Erfahrungen will mir ein derartiges Verhalten der Vögel nicht gar so unwahrscheinlich und unmöglich erscheinen. Denn ohne solche Fütterung von seiten der Trauertangaren beobachtet zu haben, wird Seidel diese Angaben wohl kaum gemacht haben. Der Individualismus und der Trieb, sich in der Vogelfütterung zu betätigen und somit Ammendienste zu verrichten, war bei diesem Paar besonders ausgeprägt und steht, das letztere betreffend, ein solcher Fall in Allgemeinheit nicht einzig da.

Die Eingewöhnung beider Tangaren gestaltete sich in keiner Beziehung schwierig, da sie sofort an das gereichte Universalfutter, mit Obst und etwas Eierbiskuit vermischt, gingen und auch die dargebotenen Sämereien nicht verschmähten. Ich muß jedoch ausdrücklich betonen, daß die Trauertangaren, ebenso wie die Krontangare, bei mir bedeutend mehr animale wie vegetabile Nahrung zu sich nahmen und daß auch im Flugraum in erster Linie Frucht- und Universalfutter kamen, in zweiter erst Sämereien. Sehr gerne fraßen sie Mehlwürmer, auf diese waren sie ganz erpicht. Baden taten sie oft und ausgiebig. Ihren Aufenthalt nahmen sie in der Hauptsache im Gebüsch und im Gesträuch in mittlerer Lage, allein befestigte Zweige kamen nur ausnahmsweise zur Benutzung. Die Felspartien wurden gänzlich gemieden, es sei denn, sie benutzten sie im Winter, um sich zu sonnen. (Schluß folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Erzhalunken*). Ich bin auf Grund langjähriger Beobachtung und ganz besonders wieder auf Grund meiner Erfahrungen in diesem Sommer zu der Überzeugung gekommen, daß der Eichelhäher der gefährlichste Nesträuber für alle unsere kleinen Freibrüter des Waldes ist, dem glatt 90 v. H. der ersten Brut dieser Vogelart zum Opfer fallen. Als Mitarbeiter eines biologischen Instituts habe ich mich in diesem Sommer besonders mit der Beobachtung der Vogelwelt und Vogelberingung befaßt und gefunden — um nur ein Beispiel herauszugreifen —, daß von zehn sehr versteckt angelegten Dompfaffnestern in neun die Gelege und im zehnten die Nestjungen zwei Tage nach dem Schlüpfen aufgefressen wurden. Ja, in zwei Nestern wurde ein Ei übrig gelassen und im dritten war das letzte Ei nur zur Hälfte ausgeschlürft, ein Zeichen dafür, wie reichlich Herr Markolf um diese Zeit seinen Räubertisch zu decken versteht. Von hoher Warte eines Randbaumes herab entgeht seinem Räubergesicht das Ab- und Zufliegen der Vogeleltern nicht, und sofort ist er hinterher und findet als gründlicher Buschklepper, von Ast zu Ast hüpfend, auch das allerversteckteste Nest. Daß nun bei Körnerfressern meist schon die Gelege, bei Insektenfressern meistens erst die Jungen gefressen wurden, berechtigt zu der Annahme, daß erstere infolge zweistündlichen Fütterns des brütenden Weibchens leichter und daher früher von dem Strauchritter entdeckt werden. — Auch dem Eichhorn fällt eine gewisse Anzahl von Vogelbruten zum Opfer, wenn auch nicht in so erschreckendem Maße wie dem Häher, der als Spezialist System in seine Räuberei legt.

*) Mit Erlaubnis des Verlags abgedruckt aus: „Wild und Hund" Nr. 46. 1925.



Kopf des roten Kardinals — Venezuela-Kardinals

(s. Redaktionsbriefkasten unter Herrn O., Hamburg).

Beide aber haben sich in den letzten Jahren in unseren Wäldern ganz erheblich vermehrt, eine Folge der nahezu gänzlichen Ausrottung des Edelmarders in der nachrevolutionären Pelzjägerei. In hiesigen Revieren, die vor dem Kriege pro Winter etwa ½ Dutzend Goldhälse lieferten, spürt man heute nicht einen mehr. Und gerade junge Häher standen auf Edelmarders Sommerspeisekarte als Delikatesse an erster Stelle, und der Bestand an Eichhörnchen wurde durch ihn nach unten angemessen reguliert. Und nun zu dem anderen, der noch viel frecher ist als der Häher, gemein und listig, es ist der große graue Würger. Was der Häher im Wald verbricht, das leistet dieser andere Gauner am Rande, in Feldgehölzen, Alleen, Hecken usw. So fand ich außerhalb des Bestandes Gelege in verschiedener Stückzahl verlassen und kalt, Lerchen, Goldammern, Wiesenschmätzer, Grünling, Pieper usw. Zunächst hatte ich als Vogelräuber hier Sperber und kleine Falken in Verdacht, stellte aber dann den Raubwürger als Missetäter fest und sah ihn in dortiger Gegend kurz hintereinander mehrere Singvögel schlagen. Er jagt und erbeutet außer der Schwalbe jeden kleinen Singvogel. Mit hartnäckiger Frechheit jagt er schnurgerade hinter seinem Opfer her, mit ihm fallend und steigend, dabei immer die Entfernung verringernd, bis er es in den Krallen weiterträgt. Dabei entwickelt er große Kraft. Ich sah ihn im Winter am Klettensamen auf einem Futterplatz einen Grünling schlagen und mit ihm senkrecht vor der Hauswand hochgehen und über das Dach verschwinden. Ein anderer griff vor mir auf der Straße eine Sumpfmeise. Als ich sofort mit meinem Hut — etwas anderes war nicht zur Verfügung — nach ihm warf, entschlüpfte das Meischen unter einen Gartenzaun, der verfolgende Würger flog 3 m vor mir ebenfalls auf den Zaun, und in demselben Augenblick, als die Meise schutzsuchend einem wenige Schritte entfernten Reisighaufen zustrich, stieß er auf sie und trug sie weg. Jeden Winter treiben sich einige dieser geheimen Räuber, und zwar immer paarweise, in unseren Dörfern herum, nach Bedarf Buchfinken, Ammern, Sperlinge und Meisen schlagend.

Lehrer Schneider, Ob.-Gleen.

Bilderbücher. Na nu! denkt der Leser. Ich sagte neulich abends so ungefähr dasselbe! Wenn nach 7 Uhr das Personal mit großer Pünktlichkeit verschwindet, der letzte „Stift" mehr oder weniger laut sein „Gute Nacht" gerufen, wenn ich aufatmend sagen kann „Endlich allein", dann folgt nach Stillung des Hungers, nach dem Anrichten des Futters für meine „6 Dutzend", die Sehnsucht nach „geistigen Genüssen". Manchmal reicht die Zeit nur für die Zeitung, aber manchmal lasse ich auch dringende Arbeit liegen, wenn hinten im Lagerraum auf den Packtischen die neuen Bücher sich zu Bergen türmen. Es ist eine Sintflut jetzt vor Weihnachten, und der, der sich darin vertiefen muß, kann darin „versinken" — bis die Glocke zwei Uhr nachts schlägt. Stöbere ich da neulich in den neuen Jugendschriften herum und finde eine neue Sendung Nürnberger Bilderbücher. Die meisten sind im Offsetverfahren (Gummidruck) hergestellt. Wunderbar weich und doch kräftig in den Farben! Na nu! Ein Vogelbilderbuch! Das ist erstaunlich! Seit „Ad. Menzel" sein prachtvolles „Kinder-Album" schuf, dessen farbige Urzeichnungen einen der größten Schätze der Handzeichnungen-Abteilung der Berliner Staats-Sammlung bilden, ist es mit künstlerischen Tierbilderbüchern kümmerlich bestellt. — „Vogel-ABC" von F. W. Kleukens (Mk. 5.80), nennt sich der Band. Die Bilder? Fein! Die Verse? Ulkig! Einige Proben: Der Storch, das weiß so alt wie jung, erneuert die Bevölkerung. — Vom Paradies sind wir geschieden, sein Vogel lebt noch heut im Süden. — Der Onesal thronet stolz erfüllt in Guatemalas Markenbild. — Der Jabiru hat große Schwingen, kann der uns auch mal Kinder bringen? — Kindern macht das Buch Spaß, den Vätern, so selbe Vogelfreunde, auch. Viele beachtenswerte „Exoten" sind da zu sehen. — „Unsere gefiederten Hausfreunde." Bilder von W. Schacht, Verse von Aug. Jahn. (Mk. 2.80.) Anders als jenes in Druck, Technik und künstlerischer Darstellung. Schacht ist ein erfahrener und stark beschäftigter Steinzeichner, der nur manchmal reichlich „süß" in seinen Bildern wirkt. Diese Vierfarbendrucke vom „Hühnerhof" sind ganz prächtig gelungen. — „Sonntagskind." 12 Bilder und Text von M. von Minckwitz. (Mk. 4.50.) Für Drei- bis Sechsjährige soll dies Bilderbuch sein, und ist doch so recht eine Freude der Mutter, die Freude an der Natur hat. Die Farben sind zart und duftig. — „Wer die Wahrheit weiß, muß sie sagen. Auch wenn sie ihm nicht geglaubt wird." So beginnt Alice Berend die „Geschichte der Arche Noah". (Mk. 7.50.) „Die anderen zu überragen, ist jedoch immer schwere Bürde, oft sogar Unglück. Auch hier war es so. Das Mammut und die anderen „Sauren" mußten draußen bleiben. Der Eingang war zu eng. Sie konnten die Arche nur von außen bewundern und mußten zusehen, wie sie fortschwamm. Sie selbst aber kamen erst wieder unter Dach und Fach, als es Museen in der Welt gab. Sie waren eine recht alte Haut geworden. Aber sie bekamen einen feinen Familiennamen. Sie wurden Fossilien genannt." In dieser witzigen Art unterhielt Alice Berend jung und alt, und die bunten Tierbilder des Amerikaners E. B. Smith sind lebendig und anschaulich. — „Wie Tiere arbeiten." Erzählungen von Klara Berg — farbige Bilder von Karl Neunzig. (Mk 6.—.) — Na nu! Ist das K. Neunzigs „Handschrift"? So prachtvolle Farbenbilder hatte ich vom Herausgeber der „Ges. Welt" noch nicht kennengelernt! Große Folioblätter in kraftvollem farbigem Offsetdruck, die Farben weich in den Übergängen, leuchtkräftig und warm, nicht „bunt" und doch farbenschön. Die Blätter Eichhörnchen beim Nestbau, das Krokodil und sein Freund, Kreuzschnäbel auf der Futtersuche, der Ameisenhaufen, der Feuervogel und das entzückende Bild „Pfingsten" sind Kunstblätter allerersten Ranges. Dieses Bilderbuch gehört in jede Familie, wo Kinder sind, wo Vögel gepflegt werden. A. Troschütz, Hannover.

Bücher- und Schriftenschau.

Das Leben der Vögel. Von Friedrich von Lucanus. Mit 19 farbigen Tafeln und 136 Textabbildungen. Verlag von Aug. Scherl, G. m. b. H., Berlin SW 68.

Das im Scherlschen Verlage erschienene Buch von Friedrich von Lucanus sucht in volkstümlicher Darstellung unser Wissen vom Leben der Vögel zu bereichern. Jeder Versuch, das Lebensbild der beschwingten Welt zu vertiefen und zu erweitern, verdient seiner anregenden Wirkung wegen Dank und Anerkennung. Von der „Stammesgeschichtlichen Entwicklung" der Vögel ausgehend, welche im ersten Abschnitt behandelt wird, wird im zweiten Abschnitt „Bau und Ausrüstung des Körpers" besprochen. Es folgen die Abschnitte „Das Gefieder", „Bewegungen und Stellungen", „Das Ei und seine Entwicklung", „Stimme und Gesang", „Liebesleben und Fortpflanzung", sodann zwei Abschnitte, welche das Hauptforschungsgebiet des Verfassers umfassen: „Seelenleben und geistige Fähigkeiten", „Zug und Wanderungen". Im letzten Abschnitt wird die „Verbreitung der Vögel auf der Erde" geschildert. Ein derartig umfassendes Werk kann unmöglich auf eigenen Beobachtungen und Wahrnehmungen aufgebaut werden. Vielmehr muß die Fachliteratur und diese in erster Linie neben der Eigenerfahrung herangezogen werden. Mehr als bei dieser bedarf es der vorsichtigen Kritik von Nachrichten, die nicht aus der Fachliteratur stammen. Außer infolge der Unzulänglichkeit der Quellen können dem Verfasser eines ein so umfangreiches Gebiet behandelnden Werkes auch aus anderen Gründen Irrtümer unterlaufen, sei es durch unzulässige Verallgemeinerungen einzelner Erfahrungstatsachen, sei es da, wo naturwissenschaftliche Nachbargebiete berührt werden, wie bei den Ausführungen über Chromosome auf S. 68, über die Fruchtbarkeit der Mischlinge (S. 70) und über die embryonale Entwicklung des Vogels auf S. 205. Daß Prachtfinken eine Vorliebe für bunte Gegenstände zeigen, dürfte unzutreffend sein. Für die Wahl des Halmes oder der Feder, welche das vor dem Weibchen tänzelnde Männchen im Schnabel hält, ist nicht die Farbe ausschlaggebend (S. 259). Das eigenartige Eintragen der Niststoffe im Bürzelgefieder wird irrtümlicherweise der Gattung Zwergpapageien (Agapornis) zugeschrieben, trifft aber doch nur auf einige Arten zu. Rußköpfchen, Tarantiner z. B. tragen die Niststoffe im Schnabel ein (S. 288). Die Laufhühnchen (Turnix) werden auf S. 292 zu den polygam lebenden Vögeln gestellt, „alle neueren Beobachter erfuhren jedoch das Gegenteil" (Brehm). „Australische" Schopfwachtel statt „kalifornische" ist wohl nur ein Druckfehler. Eine große Anzahl von Textbildern und 19 Farbentafeln dienen als Anschauungsmaterial.

Wenn die Schnepfen streichen. Von Baron A. v. Krüdener, Band 10 von „Die Bücherei von Berg und Wald von Waidpfad und vom Schuppenwild". Verlag Richard Eckstein Nachf., Leipzig, geb. 3.— M.

Das Buch ist den Jägern gewidmet, denen neben der Freude über das Erbeutete, vor allem die Förderung des Daseins und Gedeihens des Wildes am Herzen liegen soll. Verfasser hat auf Grund seiner Erfahrungen und Beobachtungen in seiner Heimat Kurland unter Benutzung der jagdlichen und ornithologischen Literatur in dem Buche zusammengetragen, was ihm über die Schnepfen mitteilenswert erschien. Auch den Schnepfen in der Gefangenschaft ist ein Abschnitt gewidmet. Die Schilderungen und Betrachtungen sind frisch unter Vermeidung eines trockenen lehrhaften Tones geschrieben, sie atmen Waldesduft.

Die Mumifizierung von Vögeln und kleinen Säugetieren ohne Abbalgen, bei Erhaltung des natürlichen Körpers. Von Ludwig Kirchroth, Klosterneuburg bei Wien.

Verfasser gibt in dem 72 Seiten umfassenden Büchlein mit Hilfe vieler Abbildungen eine eingehende Erklärung und Anweisung zur Ausführung seines von ihm mit gutem Erfolg angewandten Mumifizierungsverfahrens, das er in einigen 20 Jahren zur Anfertigung von Tierpräparaten erprobt hat.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Kauf- u. Tauschvermittlung: Max Dähnick in Berlin NO 18, Gr. Frankfurter Str. 90, Ecke Markusstr. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

Am 4. und 5. April 1926 findet, wie wir bereits einmal veröffentlicht haben, die Generalversammlung des Reichsverbandes in Leipzig statt. Bereits heute schon laden wir alle uns angeschlossenen Liebhaber zur Teilnahme ein. Wir würden uns recht sehr freuen, wenn die Teilnahme an der wichtigen Sache eine recht zahlreiche wäre, wie es der Bedeutung des Tages entspräche. Wir hoffen, daß die rechtzeitige Mitteilung der Anlaß sein möge, die durch die Teilnahme erwachsenden Kosten in Teilbeträgen zurückzulegen, weil wir des gewiß sind, daß es vielen unter uns sauer wird, die notwendige Summe auf einmal vom Arbeitsverdienst zu entbehren. Petters, Schriftführer.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten:

G. Behnke, Zoologische Handlung, Berlin O 34, Petersburger Straße 29: Sperbergrasmücke, Müllerchen, Gartenrotschwänze, Heidelerchen, Raubwürger.

Flachmeyer, Mennighüffen 406, Westfalen: Schleiereulen.

Richard Heydenreich, Bad Suderode, Harz: Schneeweiße, weißblaue und blaue Kanarien.

Wilhelm Hiltmann, Berlin S 14, Dresdener Str. 24: Amerik. Spottdrosseln, Trauerdrosseln, Swainsondrosseln, Zwergdrosseln, Weißkehldrosseln, Ringdrosseln, Klarino, Blauspötter, Goldstirntrupial, Raubwürger, Dorngrasmücke, Müllergrasmücke, Morgenammer, Lazuli-, Lerchenfink, Kernbeißer, Braunohrsittich, Feuerflügelsittich.

Odenwald, Vogel- und Tierexport, G. m. b. H., Fulda: Ararauna, Grünflügel-Aras, Molukkenkakadus, Weißhaubenkakadus, Feuerhaubenkakadus, Gelbmantelloris, Katharinasittiche, Port-Lincoln-Sittiche, Barnardsittiche, Grauköpfchen, Dolchstichtauben, Kubatauben, Guineatauben, kalifornische Schopfwachteln, kleine Beos, Himalajasänger, Blauwangenbartvögel, Bengalenpitta, Rotschulterstare, grauer Kronfink, kleine Kubafinken.

Pracht, Düsseldorf-Gerr.: Schmuck- und Gebirgslori, 1,0 Singsittich.

R. Roider, Simbach am Inn (Niederbayern): Mäusebussard, 1 Turmfalke, 1 Dohle.



Herrn K. R., Rochlitz. Dorn- und Binsenastrilde sind, wenn sie in guter Verfassung hier ankommen, durchaus keine weichlichen Vögel, die sich auch häufig als gute Züchtungsvögel bewährt haben. Gouldamandinen gibt man zum Nisten am besten Harzer Bauerchen, deren Seiten mit Ausnahme der vorderen mit Leinwand umkleidet sind. Als Nistmaterial verwenden sie gern Kokosnußfasern. Die chinesische Zwergwachtel nistet in irgendeiner Ecke der Vogelstube in dichten Heu- oder Mooslagen. Die Nistmulde stellt das Weibchen durch Drücken und Drehen ihres Körpers her. Nähere Auskunft über alle diese Fragen finden Sie in „Fremdländ. Stubenvögel" von K. Neunzig. Bei richtiger Pflege ist das Gefieder der Prachtfinken stets glatt und gut in Ordnung.

Herrn W. F., Aachen. Die Frage im Sprechsaal würde nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen. Die Geschlechter der Feld- und der Heidelerche sind nicht zu unterscheiden. Im allgemeinen sind die Weibchen kleiner. Besonders ist die Flügellänge zu beachten. Diese schwankt bei männlichen Feldlerchen zwischen 110 und 120 mm, bei weiblichen zwischen 95 und 105 mm. Heidelerchen, deren Flügel unter 95 mm messen, sind sicher Weibchen. Maße über 95 mm kommen bei beiden Geschlechtern vor. Heidelerchen, deren Flügel länger sind als 96 mm, sind ziemlich sicher Männchen. Bei beiden Arten, auch bei der Haubenlerche, soll das auf den Rücken gelegte Weibchen den Schwanz fächerartig ausbreiten, während das Männchen den Schwanz geschlossen behält.

Herrn A. Sch., Tauberbischofsheim. 1. Wandertrieb macht sich bei der Schamadrossel nicht bemerkbar. 2. Sie singt das ganze Jahr, mit Ausnahme der Mauserzeit. 3. Die Schama mausert im Juli bis September. 4. Als sehr beweglicher langschwänziger Vogel braucht sie einen großen Käfig, dessen Mindestmaße etwa 75 × 40 ⊥ 60 cm sind.

Herrn G. B., Wielkye-Hayduki. Die beiden Vögel werden Mitte April zusammengesetzt. Wenn der B. sich als Nesterzerstörer erweist, ist er herauszufangen. Andere Vorsichtsmaßnahmen sind nicht zu treffen. Die Wochenschrift ist eingegangen.

Herrn H. R., Neuhoff-Heilsberg. Die Unterbringung des Wasserhuhns muß in einem Raum geschehen, der nicht allzu kalt ist, damit die empfindlichen Zehen nicht erfrieren. Sauberer Sand und Kies muß stets vorhanden sein und ein größeres Gefäß mit häufig zu erneuerndem Wasser. Gern wird von einem aus Rohr und Schilf herzustellenden Versteck Gebrauch gemacht. An das Futter läßt es sich leicht gewöhnen, wenn es in einem flachen mit Wasser gefüllten Gefäß gereicht wird und wenigstens z. T. auf der Wasseroberfläche schwimmt. Man reicht, wenn möglich, Regenwürmer, Mehlwürmer, erweichtes Weizenbrot, zerdrückte gekochte Kartoffeln, Kükenfutter, wie es die Hundekuchenfabriken herstellen, allerlei kleingeschnittene Fleisch- und Küchenabfälle und die verschiedensten Getreidesämereien.

Herrn L., Münster, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn R. H., Kehlheim. In Heft 4 und 5 des laufenden Jahrgangs behandelt eine längere Arbeit eingehend die künstliche Aufzucht der Papageien mit besonderer Berücksichtigung des Wellensittichs.

Herrn E. E., B. Der Vogel ist an der mit Abzehrung verbundenen Stoffwechselkrankheit eingegangen. Es ist meist der Fall, daß die Krankheit, die sich sehr langsam entwickelt, erst erkannt wird, wenn es mit dem Vogel zu Ende geht. Es ist sehr wahrscheinlich, daß das Leiden schon bestand, als Fragesteller den Vogel erhielt, doch läßt sich das mit Sicherheit nicht nachweisen.

Herrn O., Hamburg. Der Purpur- oder Venezuelakardinal unterscheidet sich von dem roten Kardinal Nordamerikas außer durch die sattere Färbung und die geringere Ausdehnung der schwarzen Kopffärbung durch die Form der Haube und besonders die des Schnabels, der kurz, dick und stark gekrümmt ist und sich der Form des Schnabels des Schmalschnabelkardinals nähert (s. Abb. S. 606).

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

gang 54 17. Dezember 1925 Heft 51

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Allerhand aus Tirol. Von M. Sandner, Innsbruck.
Etwas über Krankheiten unserer Exoten. Von S. Lichtenstaedt.
Von meinen Staren. Von Helmut Hampe, Braunschweig.
Notizen aus vergangenen Jahren. Von A. Jena, Biberach/Riß. (Schluß.)
Anfangsgründe und Grundrisse zur Weiterentwicklung in der Ausbildung des Kanariengesanges. Von Paul Holzky, Cöthen i. A.
Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten. Von J. Kuntzendorff, Berlin. (Forts.)
Kleine Mitteilungen - Bücher- und Schriftenschau - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg.

eutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung d. Vogelliebhaber Landesverband Preußen. 1. Vors. Karl Gumprich, Berlin W 50, Nürnberger Str. 44 III; Geschäftsstelle: 1. Schriftf. P. Böhme, Berlin O 17, Rüdersdorfer Str. 69; Kassierer: Erich Merz, Bln.-Friedenau, Wilh.-Hauff-Str. 14. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt". Schriftwechsel grundsätzlicher Art ist an den 1. Vors., im übrigen an die Geschäftsstelle (2. Vors.) zu richten. Geldsendungen: Postscheckkonto Berlin NW 7 Nr. 46155 für Erich Merz. — Vorstandssitzung vom 7. Dezember 1925 in Berlin, „Königgrätzer Garten", Königgrätzer Str. 111. Der Vorsitzende, Herr Gumprich, eröffnete die Sitzung um 8¼ Uhr mit der Begrüßung der erschienenen Herren. Es kam zunächst das Protokoll der letzten Sitzung zur Verlesung und Annahme. Hierauf erfolgte Bekanntgabe des Schriftwechsels zwischen dem Verein in Bochum und Preußenverband, worüber eine längere Aussprache stattfand. Ferner folgte ein Schriftwechsel Reichsverband und Preußenverband über restliche Beiträge. Der Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Mittelthüringens, Sitz Erfurt, hat um Aufnahme in den Preußenverband nachgesucht. Dem Wunsch ist allseitig nachgekommen worden. Genannter Verein ist nunmehr Mitglied des Preußenverbandes. Es folgte eine längere Aussprache über Machtbefugnisse der unteren Polizeiorgane über Beschlagnahme lebender Vögel der Liebhaber. Aus der Aussprache ging hervor, daß kein Polizeibeamter das Recht hat, Vögel zu beschlagnahmen, es sei denn, daß er im Auftrage des Staatsanwalts handelt. Es folgte ein Schriftwechsel zwischen dem Herrn Vorsitzenden und Herrn Professor Thienemann von der Vogelwarte Rossitten. Der Vorstand hat, wie bekannt, die Absicht, die Tätigkeit der Vogelberingung in sein Arbeitsgebiet einzureihen. Des weiteren wurde die Aufzeichnung freilebender Vögel erörtert. Der zweite Schriftführer, Herr Leonhard Schmidt, sprach über Mängel des Reichs-Vogelschutz-Gesetzes, im besonderen über Fang und Transport der Vögel. Herr Max Dähnick, Berlin (Tauschvermittlung), sprach über die bisherige Tätigkeit seines Amtes. Im allgemeinen wird diese Einrichtung von den Liebhabern noch zu wenig in Anspruch genommen. Schluß der Sitzung um 11½ Uhr. Nächste Vorstandssitzung: 11. Januar 1926. P. Böhme, Schriftführer.

Aus den Vereinen.

Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Postscheck. Hannover 56714; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10. Der Vorstand macht wiederholt darauf aufmerksam, daß die Mitgliederbeiträge pp. nicht an den Unterzeichneten oder sonst ein A. Z.-Mitglied, sondern ausschließlich an unsern Schatzmeister Herrn Eduard Schütze in Eystrup a. Weser, und zwar nur auf dessen Postscheckkonto Hannover 56714 unter Angabe der Mitgliedsnummer zu zahlen sind. Um eine reibungslose Abwicklung der Kassengeschäfte zu gewährleisten, wird höflichst um Beachtung dieser unerläßlichen Vorschrift gebeten. — Angemeldet sind die Herren Max Schwinge, Prokurist, Halle a. S., Gesenisstr. 35; Erwin Böhm, chem. Ingenieur, Wien VIII, Diaristengasse 32; Karl Wolff, Buchdruckereiinhaber, Wien XII, Meidlinger Hauptstr. 70; Adalbert Tschernach, Oberbeamter, Wien XVIII, Dittesgasse 11/5. — Aufgenommen ist Mitgl. Nr. 213n Fräulein von Oesterley, Hannover, Podbielskistr. 19; Mitgl. Nr. 218n Herr Generalkonsul Cremer, Bremen.
Der Vorstand. J. A.: A. Krabbe.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögeln in Apelerbeck. Sitzung jed. 1. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, in der Wirtschaft Sprave, fr. Fritz Lecking, Kirchstr. F. Lecking, 1. Vors.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitgliedes Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstr. 37a. Gäste stets willkommen. P. Böhme, Schriftf.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke-Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde und Geflügelzucht Breslau. Vogelliebhaber Breslaus, wollt ihr euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei nicht endlich auch zusammenschließen, wie es in anderen Städten schon längst geschehen ist? Ein Stamm von erfahrenen Vogelpflegern ist vorhanden, jedoch können Fortschritte nur erzielt werden, wenn alle noch abseits Stehenden sich uns anschließen und unsere mit belehrenden Vorträgen verbundenen Vereinsabende besuchen. Auskunft ert. bereitwilligst P. Spitzner, 1. Schriftf., Ofener Str. 26.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurterstr. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Dessau und Umgegend. Gegr. März 1925. Vereinslokal „Fürst Blücher", Ecke Antoinetten-Leopoldstr. Versammlung jeden 2. Mittwoch, abends 8 Uhr. Gäste zu allen Veranstaltungen stets willkommen. J. A.: Dielitzsch, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jed. 2. u. 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Rest. „Zum Löwentor", Königswall 75.
A. Spauche, Schriftf., Dortmund, Lagerhausstr. 21

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Vers. jed. Freitag, abends 8 Uhr, i. Vereinsl. „Bienenkorb", Schloßstr. Vogelliebhab. als Gäste willkommen. E. Schubert, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Eliesenhof", Eliesenstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Mittelthüringens Sitz Erfurt. Sitzung jeden 2. Mittwoch und jeden letzt. Sonnabend im Monat im Vereinsl. „Stadt Chemnitz", Thomasstr. 57. Näh. Auskunft erteilt Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Vereinigung einheimischer Waldvogelliebhaber zu Görlitz und Umgegend. Zusammenkunft jeden 3. Sonnabend im Monat im Restaurant „Zum Bismarckgarten", Bismarckstraße. 1. Vors. W. Lücker in Görlitz, Konsulstr. 7. Vogelliebhaber als Gäste willk. J. A.: Erich Rothe, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Gäste willk. A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Der **Hannoversche Vogelschutzverein zu Hannover**, gegr. 1881, wirkt mit sichtbarem und anerkanntem Erfolge für Vermehrung und Schutz der Vogelwelt bei Hannover durch Aufhängen von jährlich einigen hundert Nistkästen aller Art, durch Erweckung von Interesse und Liebe für die Vogelwelt mit monatlich, zur Gesangszeit wöchentlich stattfindenden Belehrungsspaziergängen und durch Vorträge und Austausch der Beobachtungen in den jeden 3. Dienstag des Monats stattfindenden Vereinsversammlungen. Seine Bestrebungen dienen also lediglich gemeinnützigen Zwecken. Mitgliederzahl rd. 1200, jährl. Beitrag nur 1 M. Meldungen an den Vors. Herrn Fritz Becker, Hannover, Boedekerstr. 1 F.

Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber. 59. Mitgliederversammlung am 12. November 1925 im Vortragssaal des Provinzialmuseums. Bei Anwesenheit von etwa 50 Personen, bestehend aus Mitgliedern unseres Vereins und vielen Gästen, hielt unser Vorstandsmitglied Schüz, der wissenschaftliche Hilfsarbeiter im Naturkundemuseum, einen kenntnisreichen, wissenschaftlichen und doch volkstümlichen Vortrag über den „Vogelzug". Beim zweiten Teil wird er im Dezember über Beweggründe, Instinktäußerungen und über das Verhalten einzelner Vögel und Vogelarten sprechen, während er diesmal, an Hand von fesselnden, zum Teil ganz neuen Lichtbildern alles Tatsächliche, gewissermaßen Greifbare über den Vogelzug erzählte. Sehr aufschlußreich waren seine Hinweise über die Arbeit unserer Vogelbeobachtungsstellen, vor allem in Rossitten und Helgoland, und die vorgeführten Karten, z. B. über das in der Beziehung besonders gut erforschte Amerika.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite.)

Bund für Vogelschutz e. V. Stuttgart, Ortsgruppe Heidelberg. Am 18. Dezember findet im Hörsaal 7 der Universität ein Vortrag des bekannten Ornithologen Dr. O. Heinroth mit Lichtbildern statt. Thema: Körperliche und geistige Entwicklung mitteleuropäischer Vögel. Die bisherigen Zusammenkünfte der Vogelpfleger unserer hiesigen Ortsgruppe am 1. Donnerstag eines jeden Monats fallen wegen Mangel an Beteiligung aus. Prof. Dr. Fehringer.

Verein der Liebhaber von Zier- u. Singvögel zu Hörde. Gegr. Sept. 1920. Versammlung im Winter, v. Okt. bis April, aller 14 Tage Sonntags, nachm. 5 Uhr, im Sommer, v. April bis Okt., abends 8 Uhr. Gäste u. Liebh. stets willk. Vereinsl. Restaurant Burghof, Bes. H. Ungewitter, Bruchstr. Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Versammlung aller 14 Tage Sonnabends. Vereinslokal: Gasthaus „Zur Krone", Jena, Grietgasse. Gäste stets willkommen. Jena besuchende Vogelliebhaber treffen jeden Sonntag vorm. den Schriftführer Adolf Voigt, Jena-Ost, Feodorastraße 13, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube freundlichst eingeladen. Adolf Voigt, Schriftf.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Rhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an!

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal bei Gastwirt Lapschies, Kaiserstr. 46a. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 17. Dez. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Laßner im Volkshaus-Nord, Glogauer Str. 20. Liebhaber willk. J. A.: Friedrich.

Verein der Vogelfreunde Linden. 1. Vors. P. Winkel, Linden, Fröbelstr. 9.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße. gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Sieverstorstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wfl., Schenkendorfstr. 14.

Verein für Geflügel- und Vogelzucht Mainz, Abteilung für Vogelschutz u. Vogelpflege. Jeden 1. Montag im Monat, abends 8 Uhr, Versammlung im Lokal Schlink, Frauenlobstr. — Die diesjährige Weihnachtsfeier mit Christbaumverlosung und Tanz findet am 9. Januar im „Radkeller", Kästrich, statt. A. Mertens, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Sitzung aller 14 Tage im Restaurant „Zum Neckarstrand", Messeplatz 1. Liebhaber willkommen. Joh. Daubmann, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Mann, stellv. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. im Monat. Vereinslokal: Gastwirtsch. Augustusburg, inn. Leipziger Str. Nächste Vers. 18. Dez., abends 8 Uhr. P. Schmidt, 1. Vors.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pf. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Käfige u. Gerätschaften

Billige Gebirgs-Weichfresser-Kistenkäfige,
alte bewährte Art, anheimelndes Aussehen, 3-Sprung, saubere Heimarbeit (am Glatzer Schneeberge). [1762
Größe II: 60 cm lang, 26 cm breit u. 32 cm hoch, beide Stirnseiten eingeschobenes grünes Glas, links ein Einschiebefutternapf, Glasbadehaus, Zinkblechschublade, weiche abnehmb. Decke, innen hellgrün, außen nußbraun gebeizt, à Stck. nur 16.— RM., exkl. Verpack. u. Porto. Voreinsendung oder Nachnahme. **Größe I:** 15 cm kürzer, **Größe III:** 20 cm länger.
Verkauf edler Gebirgsweichfresser
Liebhaberzentrale edler Gebirgsweichfresser,
Bad Landeck (Grafschaft Glatz).

Futtermittel

Mehlwürmer
¼ Pfund 1.50 ℳ gegen Voreinsendung. **Ameiseneier Ia,** holz- und milbenfrei, Pfund 4.— ℳ. **Ameiseneier I,** wenig Holz, milbenfrei, Pfund 3.40 ℳ. **Gelbweißwurm, Ia,** Pfund 4.50 M, milbenfrei. **Muska** Pfund 1.50 ℳ, ohne Steine Pfund 3.— ℳ. **Seidenraupenpuppen,** gem. Pfund 60 Pfg.
W. Busse, Magdeburg
Gr. Mühlenstraße 1. [1763

Unübertroffen ist
Heidelberger Vogelfutter,
hergestellt nach Vorschrift
und unter Kontrolle von
Professor Dr. Otto Fehringer
durch
GENO-WERK - Mannheim
Rheinkaistraße 8 b.

Anfragen über die Pflege einheimischer Vögel werden gerne beantwortet. Rückporto beilegen. [1764

Versäumen Sie nicht das Abonnement der „Gefiederten Welt" zu erneuern!

„ORNIS" Freie Bezugsvereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands.
Gegründet 1912 .·. Fernsprecher 4198 [1765
Fachgemäße Belieferung mit Vogelfutter („Reform-Normal", individuelle Zusammensetzung bei restlosem Verbrauch; stets frisch gemischt). Hunderte von Liebhabern füttern seit über einem Jahrzehnt mit bestem Erfolg nur „Reform-Normal".
Reform-Normal-Käfige Mod. ORNIS 1925, neue Preisliste erschienen. — Modern eingerichtete Käfig-Bauanstalt mit elektrischem Betrieb.
Anschrift: Ornis-Haus, Halle-Saale. Der Geschäftsführer: Martin Sperling.

Mehlwürmer
(das ganze Jahr hindurch)
ℳ 5.— das Pfd., ausschließl. Porto u. Verp.; bei Abnahme von 5 Pfd. Porto u. Verpackung frei.

Ia Ameiseneier
3.50 ℳ per Pfd.
9 Pfd. netto 30.— ℳ franko.
Ia Weißwurm, 1925er 4.— d. Pfd.
Ia Muska-Zecken . . . 1.50 d. Pfd.
Ia Seidenraupen-puppen, gemahlen 0.60 d. Pfd.

tf. Universalfutter
Alectwa I für Nachtigallen ℳ 2.—
„ II für Grasmücken ℳ 2.—
„ III für Drosseln . . ℳ 1.50
das Pfund ab hier, ausschl. Verp.; bei größeren Mengen billiger. [1766
Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
A. Eckrich II, Waldsee (Pfalz).

Pa. gesiebte Ameiseneier
Pfund 3.40 M., über 5 Pfund à Pfund 3.30 M., 10 Pfund 31 M. franko.
Zecke . . . . . Pfd. 2.50 M.
Con. Eigelb . . . . . Pfd. 2.— M.
Karottengrieß . . . . Pfd. 0.70 M.
Drosselfutter . . . . Pfd. 0.80 M.
Lucullus extra Mischung ½-Pfd.-Paket 0.95 M., weiße Packung 0.80 M.
Senegalhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Silberhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Algierhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Kerbtiernahrung f. Kanarien Pfd. 1.80 M.
Versand per Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. [1767
Paul Lzornack,
Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189.
(Postscheck-Konto Nr. 652 65)
Gegründet 1905.

Billige Gelegenheitskäufe wertvoller Bücher für den Vogelfreund

Schacht's Vogelwelt. 3.50 M. Die Vogelwelt des Teutoburger Waldes nach den 30jährigen Beobachtungen von Kantor H. Schacht. 269 Seiten, 30 farbige Tafeln. Leinenband. Wie neu! Sehr zu empfehlen! Nur noch einige Stücke! Dr. Karl Flöricke, Vogelbuch. Statt 16.— M für 10.— M. 496 Seit., 53 farbige Tafeln. Lexikon-Format. Fein gebunden. Wie neu! Für den Vogelfreund sehr wertvoll! Hofrat Liebes ornithologische Schriften. Über 700 Seiten. Leinenband. Fast neu! 20.— M. Dr. med. Otto, Die Schamadrossel. 1.50 M. 104 Seiten (mit Anhang: Die Verpflegung der Weichfresser nach modernen Grundsätzen). Eduard Bode, Die Sängerin der Nacht. Nur 2.— M. 827 Seiten, 14 Bilder. Gebunden. Bietet reiche Unterhaltung. Dr. Braeß, Vogelstudien und Vogelgeschichten. 181 Seiten. 1.— M. —, Das heimische Vogelleben im Kreislauf des Jahres. 220 Seiten mit Bildern. 1.50 M. —, Unsere gefiederten Freunde. 175 Seiten. 1.— M. Alle drei Bände enthalten lesenswerte Aufsätze. Postfrei bei Beträgen über 10.— M (Nachnahme). Die Preise haben nur Gültigkeit für kurze Zeit.

Alfred Troschütz,
Buchhändler und Antiquar,
Hannover, Große Aegidienstraße 4,
Postscheckkonto Hannover 200 (Cruse's Buchhandlung). [1768

E. Maschke
Kaufmann, Mtgl. VDK.
Original-Züchter hochedler [1769
Qualitäts-Kanarien
St. Andreasberg i. Harz.
7 goldene Medaillen, Ehrenpreise.

Praktische Käfige für alle Vögel

Vogelfutter jeder Art in Prima Güte

Seit 1872 zahlreiche Dankschreiben bedeutender Kenner aus vielen Staaten. Katalog u. Antwort gg. 30 Pfg. Marken.

Mehlwürmer
geg. Einsend. v. 2.— Rentenmark 1/4 Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co.,**
Biesenthal I (Mark). [1770

Mehlwürmer
à Pfund 5.60 M, 1/4 Pfund 2.— M franko gegen Voreinsendung

Ia Ameiseneier	Pfd. 4.— M
Ia Muska	Pfd. 1.50 M
Ia Weißwurm	Pfd. 4.50 M
Seidenraupenschrot	Pfd. 0.60 M
Garnelen gem.	Pfd. 0.35 M

Alles dies. Ware, à Pfund ab hier.
Th. Witte, Niederndodeleben
b. Magdeburg. [1771

Dattel-Abfälle.

Von einer Hamburger Fabrik erhalten wir hin und wieder einige Zentner Dattel-Abfälle, die wir an unsere Mitglieder und an die Vereine je 10 Pfd. postfrei für 6 Mark abgeben können. Diese Abfälle bilden für Grasmücken, Meisen, Tangaren, Blattvögel, Seidenschwänze und andere ein äußerst nahrhaftes Futter. — Vor dem Verfüttern sind die Datteln auszulesen, innerlich schwarz gewordene und verholzte und die Kerne zu entfernen, die weichen in Klumpen zu kneten, die festen zu zerkleinern. Erstere werden zwischen die Käfigstäbe gesteckt, die anderen in Näpfen gereicht. Bestellungen an
A. Troschütz, Hannover,
Große Aegidienstraße 4. [1772
Vereinigung Hannoverscher Vogelliebhaber.

Erklärung

In Heft 49 dieser Zeitschrift hat Herr Professor Fehringer in Heidelberg eine Erklärung veröffentlicht, in welcher er mir das Recht abspricht, das von mir in den Verkehr gebrachte Vogelfutter „Ideal" mit dem Hinweis zu verkaufen, daß es nach Angaben von Professor Dr. O. Fehringer hergestellt sei. Demgegenüber berufe ich mich auf den von mir am 15. Januar 1924 mit Herrn Professor Dr. Fehringer abgeschlossenen Vertrag, von welchem ich eine notariell beglaubigte Abschrift auf der Geschäftsstelle dieses Blattes in Magdeburg zur Einsicht für jedermann niedergelegt habe. Nach Ziffer 2 des Vertrages bin ich berechtigt, Futtermischungen nach den Angaben des genannten Herrn herzustellen und auf der Hülle den Namen des Herrn Professor Dr. Fehringer anzugeben. Dieses Recht habe ich laut dem Vertrage käuflich erworben. Es kann mir, zumal ich keinerlei Mißbrauch damit getrieben habe, nicht wieder entzogen werden. Die Futtermischungen werden genau nach den Rezepten gewissenhaft erzeugt, so daß jedem Vogelfreunde nur etwas Gutes geboten wird. Ich bemerke noch, daß die Firma Oskar Adler Nachf. in Zittau lediglich von mir den Weiterverkauf des Vogelfutters „Ideal" für das Gebiet des Deutschen Reiches übertragen erhalten hat.

Stephan Quaiser, Reichenberg
(Tschecho-Slowakei). [1773

Auch Sie

müssen in der „Gefiederten Welt" inserieren, wenn Sie einen Erfolg erzielen wollen!

Quaiser's Vogelfutter „Ideal"

nach Angaben von Professor Dr. O. Fehringer, Heidelberg

Für Weichfresser:

Erdsänger und ähnliche Vögel,	Packung gelb,	groß:	2.40,	klein:	1.30
Grasmücken und Schwarzplatten,	„ rosa,	„	2.25,	„	1.20
Drosseln und härtere Weichfresser,	„ grün,	„	1.80,	„	0.70

Für Körnerfresser:

Stieglitze und Zeisige,	Packung rot . . .	groß:	0.75,	klein:	0.40
Hänflinge, Gritze usw.,	„ blau . . .	„	0.75,	„	0.40
Kanarien, beste Qualität,	„ weiß . . .	„	0.75,	„	0.40

Franko jeder Station frei Verpackung!

Hauptverkauf für Deutschland: **Oskar Adler's Nachfolger, Zittau i. Sa.,** Weberstraße.

Tschechoslowakei: **Stefan Quaiser, Reichenberg (Böhmen),** Herrengasse. [1784

Jeder Liebhaber und Vogelfreund wolle sich von der Qualität des „Ideal" überzeugen.

Vereine u. Wiederverkäufer erhalten Rabatt!

Liebhaber und Kenner

die ihre Lieblinge **gesund** erhalten und **in Gesang bringen** wollen, füttern das seit Jahrzehnten bestens bewährte und für zarte Weichfresser eigens zusammengestellte

„Naturell"

Naturell enthält **nur beste** und für den Vogel **bekömmliche Zutaten** und ist schon seit langer Zeit von besten Kennern günstigst beurteilt.

Alleiniger Hersteller: [1775
Wilhelm Dieße, Leipzig
Kurprinzstraße 15

Naturell kg 5 M. Probesendung gegen 1 M in Briefmarken

Empfehle außerdem:
Drosselfutter kg 2 M, Ameisenpuppen kg 7 M
Weißwurm kg 10 M
ferner beste Futterarten für sämtliche in- und ausländischen Körnerfresser in bester Qualität bei billigsten Preisen.

Brehm's Tierleben vor Gericht.

Nach jahrelangem Streite entschied jetzt endgültig das Reichsgericht dahin, daß der **„Volks-Brehm"**, die Auswahl aus der 2. Auflage des **von Alfred Brehm selbst verfaßten** „Großen Brehm", nicht als unberechtigter Nachdruck zu betrachten und daher zum Verkauf freizugeben sei. **Ich kann nunmehr die 6bändige billige Auswahl von Brehm's Tierleben wieder liefern.** Jeder Band ist hübsch in rote Leinwand gebunden, 600 bis 700 Seiten stark, mit 25 Bildtafeln geschmückt und kostet nur 6.— M. Band 1—3 schildern die Säugetiere, Band 4 und 5 die Vögel, Band 6 Kriechtiere, Lurche und Fische.

Die ungemein anschaulichen und lebendigen Schilderungen Brehm's kommen hier weit besser zur Geltung als in der großen Ausgabe. Die Bände, die einzeln käuflich sind, eignen sich besonders zu Geschenken für Naturfreunde und für die heranwachsende Jugend.

Alfred Troschütz,
Buchhändler und Antiquar,
Hannover, Große Aegidienstraße 4,
Postscheckkonto Hannover 200 (Cruse's Buchhandlung). [1776

Mehlwürmer
veg. gez., 1/4 Liter franko gegen Voreinsendung von RM. 2.—. [1777
Bonitas-Versand
Rostock i. M. 3.

Ameiseneier
gute Qualität, Ernte 1925, à Pfund 3.50 M., bei 10 Pfund franko.

Weißwurm
Ia, Pfund 5.00 M., bei 10 Pfund franko.
Versand per Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. [1778
Friedr. Gustav Müller,
Berlin SW 61, Blücherstraße 61,
Postscheckkonto: Berlin Nr. 153 990.
Fernsprecher:
Moritzplatz 2689, Hasenheide 6682.

Heidelberger Vogelfutter

Braune Packung für Erdsänger u. ä. Vögel
250 g 2.20
Graue Packung f. Grasmücken u. ä. Vögel
250 g 1.20
Blaue Packung für Drosseln u. ä. Vögel
250 g 1.10
Rote Packung für Stieglitze, Zeisige, Kreuzschnäbel . 750 g 1.45
Grüne Packung f. Hänflinge, Gimpel, Gritze . . . 750 g 1.50
Gelbe Packung für Kanarien 1000 g 1.65
Generalvertreter für Sachsen und Thüringen [1779
Arthur von Ende,
Zoologische Handlung,
Jena (Thüringen), Magdelstieg Nr. 55.

Vogelfutter [1780

für **Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser.** Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst.

W. Göpel, Leipzig,
Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Ein Versuch

überzeugt jeden von der Güte meines **Universalfutters.** Preis 2 M. p. Pfd. Sämtliche Futtersorten für Exoten, Wald- und Kanarienvögel zu billigsten Tagespreisen. Versand geg. Nachnahme. Verpackung und Porto werden billigst berechnet. [1781
A. H. Kirsten, Leipzig 3,
Zeitzer Str. 53. Fernruf 31445.

Inserate

für das am 24. Dezember 1925 zur Ausgabe gelangende Heft 52 der Ges. Welt erbitten bis 19. Dezemb.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Magdbg.

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber.

Jahrg. 54 | Den 24. Dezember 1925 | Heft 52

(Druckort: Burg, Bezirk Magdeburg.)

Die Dresdener Vogelschau.

Von J. Birk, Leipzig.

(Nachdruck verboten.)

Wenn ich über das zur Dresdener Ausstellung Gesehene berichten will, so muß ich gleich vorausschicken, daß ich wirklich überrascht war von dem, was Dresden geboten hatte, denn diese Vogelschau wies, selbst mit den Augen eines scharfen Kritikers betrachtet, in allem, sowohl in Quantität wie in Qualität des Ausstellungsmaterials, Hervorragendes auf. Wenn ich mich bei Besuch von Ausstellungen, um mich vor allzugroßen Enttäuschungen zu bewahren, schon von vornherein mit dem Gedanken vertraut mache, neben einwandfreiem Vogel- und Käfigmaterial auch Unliebsames zu sehen, so muß ich von Dresden sagen, daß ich freudig überrascht war, nur ganz weniges zu finden, was man vielleicht als nicht einwandfrei bezeichnen könnte. Ja, könnte eine Dresdener Ausstellung überall gezeigt werden, so wäre dies ein wertvoller Fortschritt auf dem Gebiete des Ausstellungswesens. So empfehlenswert die Veranstaltung einer Vogelschau ist, wenn sie einer sachlichen Kritik des Fachmannes standhält und dem Laien ein halbwegs vollkommenes Bild vom Ideal und Wert der Stubenvogelliebhaberei gibt, so verwerflich ist es aber auch, wenn sich ein Verein einer Aufgabe unterwirft, der er mit seinem Vogel- und Käfigmaterial nicht gewachsen ist. Darum, entweder etwas Zufriedenstellendes oder ein Verzicht auf den zweifelhaften Ruhm, den man mit einer an Mängeln überreichen Ausstellung erntet.

Dresden verstand es wirklich, auch mich zu verblüffen mit dem angenehm anmutenden Arrangement seiner Vogelschau, und ich muß, will ich der Wahrheit die Ehre geben, offen gestehen, daß auch ich, ebenso wie die übrigen auswärtigen Besucher, Gelegenheit hatte, noch zu den auf dem Ausstellungsgebiete gesammelten Erfahrungen hinzuzulernen. Ganz besonders wirkte die Dekoration mit lebendem Grün sehr anheimelnd und gab dem Gesamtbild eine beruhigende Wirkung. Wenn ich vorerst, ehe ich mich mit besonders Hervortretendem befasse, die einzelnen Arten und deren Zahl nenne, so will ich gleich miterwähnen, daß in einem Nebenraum die unvermeidlichen, unheimlichen, sogenannten Gesangsschränke aufgestellt waren, in denen die Kollektionen des Kanarienzüchterklubs Groß-Dresden sowie des Vereins deutscher Kanarienzüchter für die Augen der Besucher verborgen waren. Vom Züchterstandpunkt aus betrachtet gilt diese Dunkelhaft als dringend notwendig für die Schule des Sängers, als Laie kann man sich aber doch nicht eines aufsteigenden Mitleides erwehren mit den vom Licht abgeschlossenen Wesen. Sind sie doch auch Geschöpfe, die Luft und Licht als notwendige Lebensbedingung brauchen. Der scharfe Kontrast auf derartigen gemischten Ausstellungen tritt offensichtlich zutage, wenn man in einem Raum diese unheimlichen Schränke sieht, und täuschte nicht der trotzdem frohe Gesang der Kanarien Leben vor, man erinnert sich an das kahle, tote Aussehen dieser Schränke mehr, als lieb wäre. Wie anders hüpft und zwitschert es in den offenen Käfigen, hier blüht das Leben in nahezu vollendeter Natürlichkeit. Die Bezeichnung „Waldvogelschau" dürfte irreführend sein, wenn man in dieser bunten Gesellschaft allerlei Exoten mit untermischt findet. An einheimischen Körnerfressern waren vertreten: 1 Bergfink, 2 Buchfinken, 1 Goldammer, 4 Dompfaffen, 1 Kernbeißer, 1 Fichtenkreuzschnabel, 8 Zeisige, 5 Stieglitze, 5 Hänflinge, 2 Girlitze, 1 Grünfink und an Mischlingen 6 Stieglitz-Kanarienbastarde nebst Eltern. An Lerchen waren vertreten: 1 Heidelerche, 2 Hauben- und 2 Feldlerchen. An einheimischen Weichfressern zeigte die Ausstellung: 5 Blau- und 8 Rotkehlchen, 1 Dorn-, 1 Zaungrasmücke, 2 Sperber- und 3 Gartengrasmücken, 6 Mönchgrasmücken (Schwarzplättchen), 2 Gartenlaubvögel (Gelbspötter), 7 Nachtigallen, 1 Sprosser, 1 Steinrötel, 1 Blaudrossel, 1 Singdrossel, 2 Amseln, 1 Star, 1 Gartenrotschwanz, 2 Heckenbraunellen, 1 Baumpieper, 1 Gebirgsbachstelze (junges Männchen) und 1 Goldhähnchen. Die exotische Ornis stellte Vertreter in: 1 Amarant, 7 Schamadrosseln (4 ♂, 3 ♀), 1 Goldstirnblattvogel, 1 Klarino, 1 Sonnenvogel sowie in verschiedener Anzahl Tiger-, Zebra- und Schmetterlingsfinken, Goldbrüstchen, Möwchen und Mossambikzeisige. Zeigt auch der Artenreichtum noch manche auffallende Lücke, so wird dies voll aufgewogen durch die Vorzüglichkeit des Vogelmaterials. Wenn man den Kernbeißer mit seinem verstoßenen Schwanzgefieder ausschaltet, so muß gesagt werden, daß alle Vögel einwandfrei in natürlicher Gefiederbeschaffenheit prangten. Aus dem

Rahmen aller Vögel müssen hervorgehoben werden die beiden in allem Ia Gelbspötter sowie Nachtigallen. Ob es unbedingt nötig ist, daß auf einer Ausstellung 7 Nachtigallen, wenn auch sonst einwandfrei, gezeigt werden, ist eine Frage, die von dem weiter denkenden Liebhaber verneint werden muß, und zwar aus gewissen Gründen. Die Glanznummer der Ausstellung verkörperten der Steinrötel und die Blaudrossel des Herrn Schreiber. Diese beiden Vögel bildeten nicht nur für mich, sondern für die meisten Liebhaber eine lang vermißte Augenweide, man konnte sich nicht satt sehen an dem herrlichen einwandfreien Gefieder, an der stolzen Haltung und dem eleganten Benehmen dieser beiden Gebirgsbewohner. Letzten Endes trug die praktische Käfigung dieser Vögel nicht wenig dazu bei, die Schönheiten dieser Vögel trefflich ins Licht zu führen. Sitzgelegenheit auf Steinen, dem Lebenselement dieser Vögel, war sinnreich geboten, außerdem trugen die mit einer Mischung von Zement und Sand überzogenen Drahtstäbe in Gestalt von Sitzstangen viel dazu bei, um die Füße gesund zu erhalten. Der herrliche Anblick dieser von mir bereits lang wieder ersehnten Vögel ließ den Wunsch ihres Besitzes wieder lebendiger werden, doch verbietet mir der immerhin noch ansehnliche Preis in Anbetracht der jetzigen wirtschaftlichen Lage jeglichen Gedanken einer baldigen Erfüllung. Die von Herrn Brückner im Käfig gezüchteten vier Dompfaffen erregten mein besonderes Interesse, denn ist die Weiterzüchtung von Wildvögeln schon ein schöner Erfolg für den Liebhaber, so ist der Erfolg des Herrn Brückner sogar staunenswert, wenn man bedenkt, daß diese vier Prachtkerle, die ihren Artgenossen in der Natur in nichts nachstehen, in einem Käfig von ganz bescheidenem Maße von 50×30 cm erzüchtet sind. Die erste Brut kam leider nicht hoch, hingegen diese vier Dompfaffen, die der zweiten Brut entstammen, gediehen ausgezeichnet. Ja, werden die Gegner der Stubenvogelhaltung angesichts solcher Erfolge in der Weiterzüchtung unserer heimischen Vögel nicht verstummen müssen, sie scheinen davon noch gar keine Kenntnis zu haben oder keine Notiz zu nehmen, daß der Vogelliebhaber auch imstande ist, mit seinen gekäfigten Vögeln zu züchten. Alles Material von Züchtungen unserer einheimischen Vögel müsse in einwandfreier Weise gesammelt und an einer Stelle zusammenlaufen, um eventuell als wertvolle Statistik unseren Gegnern vor Augen gehalten zu werden, zum untrüglichen Beweis, daß der Vogelliebhaber nicht in qualvoller Gefangenschaft seine Vögel käfigt, sondern daß ihre Haltung und Pflege ziemlich an der Grenze des Natürlichen vor sich geht, der beste Beweis ihre Fortpflanzung im Käfig. Wenn ich noch einzelne Vögel herausgreifen würde aus dem Rahmen der ausgestellten Vögel, so wäre dies eine Zurücksetzung der anderen, denn bis auf einen, den schon erwähnten Kernbeißer, waren sie alle tadellos im Gefieder und kerngesund, wirklich Vögel, wie sie eine Ausstellung zeigen muß. Ganz besonderer Erwähnung und ebensolches Lob verdient das zur Schau gestellte Käfigmaterial, ja, ich sage nicht zu viel, auch darin bin ich von Dresden geradezu begeistert. Hier konnte man sehen, wie vorteilhaft sich die Vögel in geräumigen Käfigen ausnehmen, welche Augenweide deren natürliche Bewegungen für den Beschauer bilden. Alle Zweifel müssen schwinden angesichts solcher praktischer Käfigung, die Märchen von dem Vorteil kleiner Käfige (System Rausch) müssen verblassen, wenn man derartiges sieht. Herrn Burghard, dem Erbauer dieser Käfige, gebührt Dank für seine für Dresden tonangebende Richtung in der Herstellung von praktischen Käfigen. Daß auf einer so mustergültigen Vogelschau auch dem praktischen Vogelschutz ein Plätzchen eingeräumt war, ist wohl selbstverständlich. Wirkliche Freude mußte man empfinden, wenn man die viele Mühe und Arbeit einer solchen Vogelschau mit einem solchen Massenandrang des Publikums belohnt sah, das zu gewissen Zeiten geradezu beängstigend wirkte. Auch die vielen von auswärts herbeigeeilten Liebhaber, so aus Chemnitz, Zwickau, Zittau, Neugehrsdorf, Reichenbach, Oschatz, Leipzig usw., waren vollauf befriedigt, und in der vom Reichsverband und vom Landesverband Sachsen einberufenen Werbeversammlung zeigte sich die helle Begeisterung, die in den Herzen der anwesenden Vogelliebhaber für derartige Veranstaltungen loderte. Möge es dem Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden vergönnt sein, noch öfters eine derartige mustergültige Vogelschau zu zeigen, der Dank nicht nur aller Vogelfreunde, sondern auch der des übrigen Publikums wird ihm sicher sein.

Etwas über Krankheiten unserer Exoten.

Von S. Lichtenstaedt.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Meine anderen Mohrenköpfe erfreuen sich des besten Wohlseins, und ich werde sie dem geneigten Leser später einmal in Wort und Bild vorführen.

Gleichzeitig erhielt ich ein Pärchen der entzückenden Katharinasittiche, welche ebenfalls, als ich sie erhielt, nicht ganz gesund erschienen.

Zu meiner Freude aber haben sich die kleinen Kerle, von denen ich später ebenfalls etwas berichten will, völlig erholt. Sie erhielten Venecinwasser, jetzt von der Fabrik „Avisan" genannt, Weiden- und Holunderruten, welche sie völlig zernagen, und fraßen außerdem nur Spitzsamen und ein wenig Hirse.

Fast ebenso wichtig wie die Heilung der Krankheiten ist die Beantwortung der Frage: „Wie kann der Liebhaber seine Pfleglinge vor Krankheiten schützen?"

Vor allen Dingen lasse sich jeder Vogelwirt gesagt sein, daß selbst bei bester Pflege Krankheiten nie ganz zu vermeiden sein werden, da ein Tier zu viel Zufälligkeiten ausgesetzt ist, denen es sich nicht wie ein Mensch entziehen kann.

Dennoch kann der Liebhaber sehr viel tun, um seine Pfleglinge nach Möglichkeit gesund zu erhalten.

Viele Liebhaber wenden der Qualität des gekauften Futters zu wenig Aufmerksamkeit zu. Man erhält manchmal total verschmutztes, von Mäusekot durchsetztes Futter und wundert sich, wenn ein Vogel später erkrankt. Der Hanf ist häufig total ranzig und derartig ölig, daß er schon bei geringem Druck in eine klebrige, schmierige Masse zu verwandeln ist.

Viele anderen Futtermittel sind nicht viel besser. Erdnüsse müssen fest und hell sein. Zerspringen sie bei geringem Druck, so füttere man sie nur, wenn man sich nach Entfernyng der Schale übgerzeugt hat, daß die Nüsse hellgelb und nicht ranzig und dunkel aussehen. Zu diesem Zwecke muß man auch das über jeder Nuß befindliche Häutchen entfernen.

Im Laufe der Jahre zeigt die Erfahrung wohl jedem Liebhaber, ob das gekaufte Futter gut oder irgendwie verdächtig ist.

Niemals kaufe man fertiges „Papageienfutter", welches eingetütet in den Handel gebracht wird. Eine solche Packung für Graupapageien enthielt nach meiner Untersuchung Erdnüsse, Zirbelnüsse, Hanf (z. T. total ranzig) und gelben Mais.

Peinlich sauber müssen stets die Futtergefäße gehalten werden. Besonders die Gefäße, welche feuchtes Futter enthalten (bei meinen Papageien nassen Mais, Obst), müssen täglich nach Entfernung der Futterreste sauber ausgewaschen und ausgetrocknet werden*).

Sehr leicht bilden sich in solchen Näpfen, wenn die Sauberkeit fehlt, gefährliche Pilze, welche den Tod des Vogels herbeiführen können.

Eine der wichtigsten Fragen unserer Liebhaberei ist es nun: Woran erkenne ich beim Kaufe, ob der Vogel gesund ist?

Beim Schicken vom Händler ist man nun selbstverständlich ganz und gar auf die Reellität desselben angewiesen. Er garantiert zwar für einen gesunden Vogel, aber was will der Liebhaber tun, wenn das Tierchen nach einigen Tagen eingeht? Der Händler hat ihn gesund verschickt, Reklamationen und Prozesse sind so gut wie aussichtslos, und der Liebhaber ist sein Geld los. Zur Ehre wenigstens der mir bekannten Berliner Händler muß ich sagen, daß keiner derselben wissentlich einen kranken Vogel verschicken wird.

Ich mußte sogar in den meisten Fällen, wenn mir befreundete Händler Korrespondenzen mit Liebhabern vorlegten, die Partei der Händler ergreifen. Ein Liebhaber kann nicht verlangen, daß ein sprechender Graupapagei 48 Stunden nach Empfang sein ganzes Repertoir zum besten gibt. Er kann auch nicht verlangen, daß eine Schama womöglich noch im Versandkasten ihre schönsten Weisen erklingen läßt. Auch einem Händler zuzumuten, einen nach vier Wochen eingegangenen Vogel zu ersetzen, noch dazu eine Gouldamadine, ist etwas zu weitgehend. Wer heute frisch importierte empfindliche Exoten erwirbt, muß wissen, daß mit dem Eingehen der Tiere zu rechnen ist.

Ferner kommt der persönliche Einkauf in Frage. Hierzu möchte ich einige Anleitungen geben. Wie ein gesunder Vogel äußerlich beschaffen sein muß, weiß wohl jeder einigermaßen erfahrene Liebhaber. In jedem Lehrbuch findet er eine diesbezügliche Anweisung. Trotzdem ist es keineswegs einfach, von einem, besonders frisch eingeführten Vogel sagen zu können, daß dieses Tier unbedingt gesund ist.

*) Nach meiner Beobachtung hat feuchter Mais, welcher morgens den Vögeln gereicht wird, schon mittags im Futternapf einen säuerlichen Geruch.

Ein Vogel kann kerngesund aussehen, munter und fidel sein, und trotzdem ein Todeskandidat. Das beste Mittel zur Feststellung der Gesundheit eines Vogels ist sein Gewicht. Nun kann ein Liebhaber beim Händler nicht nach „Gewicht" einkaufen gehen. Aber die Erfahrung ist hier ein guter Lehrmeister. Vor mehreren Jahren erstand ich bei einem hiesigen Händler ein Pärchen Sperlingspapageien. Wohl 10 Paare waren vorhanden, alle sahen gleichmäßig glatt und kerngesund aus.

Von sechs Tieren erklärte ich dem Händler, daß dieses Todeskandidaten seien, wurde aber ausgelacht. Meine Prophezeiung traf jedoch prompt ein.

Von Herrn Balser, Fulda, erhielt ich einst mehrere Paare hellblaue Sperlingspapageien. Die

Junger Star ärgert sich über die junge Amsel (s. S. 599). Aufnahme von Helmut Hampe.

Vögel kamen gesund an und waren fidel und munter.

Am nächsten Tage untersuchte ich die Tiere genau und erklärte meiner Frau, daß eines der Weibchen nicht mehr lange leben wird. In 14 Tagen war das Tierchen hinüber.

Beim Einkauf beachte man also folgendes: Man nehme eine Anzahl Vögel der gleichen Art nacheinander in die Hand und prüfe nach Gefühl das Gewicht. Selbst wenn die Größe der Vögel eine verschiedene ist, wird man sich sehr schnell sagen können, ob der Vogel das richtige Gewicht hat.

Ein sich voll und schwer anfühlendes Tier ist meist gesund, ein leicht und „windig" anfühlendes ein Todeskandidat. Fette, d. h. krankhaft fette Tiere kommen bei frischen Transporten fast nie vor, ab und zu jedoch magere, welche sich bei guter Pflege wohl noch erholen können, in vielen Fällen jedoch verloren sind.

Dabei brauchen die mageren Tiere keinesfalls mit einer schweren Krankheit behaftet zu sein. Sie sind häufig durch den langen Transport und mangelhafte Pflege organisch so geschwächt, daß sie gar nicht mehr imstande sind, gute Pflege zu verarbeiten und auszunutzen.

Im Laufe von Jahren erhält man beim persönlichen Einkauf eine große Erfahrung, ob der zu kaufende Vogel gesund ist oder nicht. Niemals kaufe man da ein Tier, wo der Händler aus einem großen Schwarm ein Paar herausfängt und einfach in den Versandkasten steckt.

Selbst der kränkste Vogel wird bei dem Herumjagen von einem gesunden nicht zu unterscheiden sein.

Bei sprechenden Papageien, welche wochenlang nichts hören lassen, verändere man den Standort ihres Käfigs in der Wohnung. Mancher Vogel, welcher in einer dunklen Ecke mäuschenstill war, beginnt sofort zu sprechen, wenn er ans Fenster gestellt wird. Auch Geräusch, Musik usw. tut hier manchmal Wunder. Wenn der Lautsprecher meines Radios in Betrieb gesetzt wird, beginnt mein nebenan stehender Jako sofort sein gesamtes Repertoir hören zu lassen.

Mit frischem Kolbenmais habe ich in diesem Jahre wieder Versuche angestellt. Nicht zu reichlich gefüttert, bekommt er allen Papageien gut, in zu großen Mengen gereicht, erzeugt er häufig Durchfall.

Auch meine Mohrenköpfe sind nach den Kolben ganz wild und verzehren sie bis auf das letzte Stückchen.

Zum Schluß möchte ich nochmals an alle Liebhaber die Bitte richten, ihre Erfahrungen, welche sie bei Heilungen von Krankheiten unserer Stubenvögel gemacht haben, zu veröffentlichen.

Vielleicht ist es uns doch möglich, die leider immerhin noch hohe Sterblichkeit besonders der frisch eingeführten Exoten zu verkleinern.

Einiges über den Baumläufer — Certhia familiaris *L.*

Von Wilhelm Schreitmüller, Frankfurt a. M.

(Nachdruck verboten.)

Zur Herbstzeit, wenn die Bäume und Sträucher im roten, gelben, braunen, dunkelgrünen und violetten Blätterschmuck prangen, wenn die Beeren des Schneeballs und der Berberitze, die eckigen Früchte des Pfaffenhütchens, die Trauben des Aronstabes (Arum maculatum *L.*) und die Hagebutten der wilden Rosen ihr grelles Rot, Schlehen-, Liguster-, Schneebeeren, Maganien-, Weißdorn-, Holunder- und Loniceraſträucher ihre blauen, weißen, schwarzen und roten Früchte leuchten und in der Sonne spielen lassen, wenn der wilde Wein (Jungfernrebe) im purpurnen Blättergewand erprangt und seine blaubereiften Beerendolden zeigt, und die absterbenden Ranken des bittersüßen Nachtschattens und der Zaunrübe ihre roten Beeren tragen und Tintenpilz und Champignon auf Wiesen und Feldern ihre weißlichen Kappen aus dem Grase erheben, Feldmäuse gespenstig in ihren Laufgängen auf Feldern und Wiesen umherhuschen und große Schwärme von Staren umherziehen, um abends gemeinschaftlich in das Schilf einzufallen, worin sie übernachten, dann erscheint auch in diesen Gärten, Anlagen, Parks, in Auen und Wäldern, auf Chausseen und Hainen, zu größeren Trupps vereinigt, ein kleines, unscheinbares Vögelchen von mausgrauer bis graubrauner Färbung, hellem Bauch und gelblicher Fleckung des Rückens und auf den Flügeln, welches in Gemeinschaft von Kleibern, Meisen und Spechten truppweise sich damit beschäftigt, unermüdlich Baum für Baum auf- und abzuklettern, um die zwischen Rindenspalten und Ritzen, an Ast- und Zweiggabeln und in dürren Blättern sitzenden Insekten, deren Eier, Larven und Puppen abzusuchen und zu vertilgen. Es ist äußerst reizvoll, diese winzigen, mäuschengleich an den Bäumen hochkletternden, dabei ständig ein leises, scharfes „sri-sri-sri" hervorstoßenden Vögelchen zu beobachten. Folgen wir einem mit den Augen: Soeben fliegt eines der Tierchen am Fuße eines Baumes an, läuft hierauf mehr hüpfend oder rutschend als laufend den Stamm hoch, und zwar spiralenförmig, wie dies auch Kleiber, Spechte und Eichhörnchen zu tun pflegen. Jede Ritze, Spalte, Astgabel und jedes Rindenstück, kurz alles, was sie am Stamm vorfinden, wird peinlichst genau nach etwas Genießbarem untersucht. Sind die Vögel oben im Gipfel des Baumes angelangt, so stürzen sie sich im Gleitflug durch die Luft herab, an den Fuß des nächsten Baumes, worauf dieselbe Tour von neuem beginnt.

So geht es fort ohne Ende, bis der Tag zur Neige geht, in ununterbrochener nützlicher Tätigkeit.

Will man sich in den Besitz einiger dieser kleinen Kobolde setzen, so bedient man sich am besten des Vogelleims, mit dem man vorsichtig Schweinsborsten bestreicht und diese in geeigneter Weise und Menge an den von den Vögeln beflogenen Baumstämmen anbringt. Bei der Kleinheit und Zartheit der Vögelchen empfiehlt sich eine Verwendung von Leimruten (Birke) nicht, weil sie sich sonst zu sehr verleimen und nur mit größter Mühe vom Leim gesäubert werden können, wozu man am besten ganz feinen, trockenen Sand oder noch besser Holzasche verwendet. Es ist aber zu bemerken, daß die Baumläufer äußerst zart und empfindlich sind und ohne Nahrung nicht lange aushalten können. Aus diesem Grunde hat der Fänger dafür zu sorgen, daß die Tierchen während des Transportes mehrere Male mit frischen Ameisenpuppen oder Mehlwurmstückchen und dergleichen gestopft werden, desgleichen sind die Tiere ab und zu zu tränken.

Der Baumläufer ist ebenso wie der Zaunkönig, die Goldhähnchen und ähnliche zarte Vögel ziemlich schwer einzugewöhnen. Am besten gelingt dies noch, wenn man mehrere Exemplare zugleich in einem entsprechend eingerichteten Käfig, welcher sehr enges Gitterwerk aufweisen muß, unterbringt. Den betreffenden Käfig richte man ebenso ein, wie den des Kleibers. Die Rückwand und teilweise auch die Seitenwände versehe man mit Baumrinde (Eiche, Kiefer oder dergleichen) und bestecke das Ganze dicht mit Tannen- oder Kiefernzweigen. Sitzstangen, wie wir solche für andere Vögel verwenden, bringe man nicht an. An deren Stelle verwende man unregelmäßig angebrachte rauhe, starke Äste und Zweige und bringe ein oder zwei mit Rinde verkleidete Nistkästchen mit engem Schlupfloch (3—4 cm) an, in welchen die frisch gefangenen Vögel gern Unterschlupf suchen.

Die Hauptschwierigkeit der Eingewöhnung besteht aber in der Futterfrage. Bekanntlich sind die Baumläufer gewöhnt, ihre Nahrung von Stämmen, Ästen und Zweigen abzusuchen. Aus diesem Grunde werden die Tiere vorerst Nahrung direkt vom Boden oder aus Näpfen nicht annehmen. Ich habe mir stets in der Weise geholfen, daß ich reichlich Ameisenpuppen zwischen die Rinde der Kletteräste streute, ferner kleine Stücke zerschnittener Mehlwürmer allenthalben an Äste und Wände festklebte. Auch Spinnennester (mit Eiern), Eier des Seidenspinners — Bombyx mori *L.* und Eikokons von Insekten, die man ebenfalls im Gezweig anbringt, tun oft gute Dienste. Daneben bringe man zwischen den Astgabeln kleine, irdene, möglichst grün oder braun gefärbte Gefäße an, die man mit kleinsten Mehlwürmern, frischen Ameisenpuppen, toten Fliegen und Enchyträen füllt, damit solche die Vögel stets sehen.

Ein Stopfen der Baumläufer vermeidet man so lange als möglich, da man hierbei äußerst vorsichtig umgehen muß und es leicht vorkommen kann, daß man den zarten, feinen und langen Schnabel der Vögel verletzt oder gar knickt. Muß es dennoch sein, einen Baumläufer zu stopfen, so versuche man nie den Schnabel des Vogels vorn (an der Spitze) zu öffnen. Man nehme vielmehr einen flachen glatten Gegenstand aus Elfenbein, Knochen oder den Fingernagel, den man dem Tier nahe den Schnabelwinkeln einzuschieben und den Schnabel zu öffnen versucht. Man bringt dem Tier hierauf einige Ameisenpuppen oder kleinste Mehlwürmchen bei, welche der Vogel nach Lockerlassen der Hand bald verschluckt, und gibt das Tier hierauf in den Käfig zurück. Haben sich die Vögel erst daran gewöhnt, Ameisenpuppen und Mehlwürmer usw. aus dem Napfe zu nehmen, so hat man gewonnenes Spiel. Man gewöhnt sodann die Tiere an ein Weichfuttergemisch, wie wir ein solches den zarten Laubvögeln, Spöttern u. a. reichen. Während der ersten Zeit der Eingewöhnung bringe man den Käfig des Baumläufers etwas hoch an und verhänge die nach der Stube zugekehrte Seite desselben mit einem Tuch. Leichter und besser gewöhnen sich die Vögel ein, wenn sich in dem betreffenden Käfig schon einige eingewöhnte gut fressende Exemplare ihrer Art, Zaunkönige oder Goldhähnchen befinden, von welchen sie sehen, wo und wie sie ihre Nahrung zu suchen haben; auch regt das Fressen der schon eingewöhnten Vögel auch ihrerseits dazu an, Futter aufzunehmen. Sind die Baumläufer erst eingewöhnt, so bietet ihre fernere Haltung keine besonderen Schwierigkeiten. Die Hauptsache für ein ferneres gutes Gedeihen der Tierchen ist und bleibt aber immer, daß sie genügend Insekteneier, Puppen, kleine Spinnen, Fliegen, Borkenkäfer, kleinste Raupchen und dergleichen, neben dem Ersatzfutter erhalten.

Der Käfig der Baumläufer sei nicht zu klein und eher höher als lang, da diese Vögel ständig umherklettern, wobei sie ihre leisen „fri-fri-Laute" fleißig ertönen lassen. Sie werden im Laufe der Zeit ganz zahm und nehmen dann dem Pfleger Fliegen und dergleichen aus der Hand.

Vor eines möchte ich dringend warnen, diese Vögel frei im Zimmer umherfliegen zu lassen (ausgenommen in einer Vogelstube), da sie überall hin- und herkriechen, hinter Bilder und Schränke usw. schlüpfen und auf diese Weise leicht verunglücken oder verhungern können. Außerdem benutzen diese kleinen Kerle natürlich auch jede sich bietende Gelegenheit, sich durch engste Spalten oder offene Türen und Fenster zu empfehlen.

Der Baumläufer ist ein echter Höhlenbrüter, welcher sein Nest in Astlöchern, hohlen Bäumen, in

Purpur-Grackel.

Mauerritzen, Nistkästen und sogar hinter Fensterläden usw. anlegt. So fand ich z. B. im Jahre 1889 ein solches Nest hinter einem vor dem sogenannten Wintergarten der früheren großherzoglichen Hofgärtnerei zu Schloß Belvedere bei Weimar befindlichen hohen Fensterladen, woselbst sich etwa 1 m tiefer auch das Nest eines Wendehalspaares — Jyns torquilla *L.* befand. Beide Arten lebten hier einträchtig nebeneinander, ohne sich gegenseitig zu belästigen oder zu stören. Auch im Unterbau großer Raubvogelhorste (Bussard, Reiher, Habicht usw.) baut der Baumläufer öfter sein Nest ein.

Für den Naturhaushalt ist Certhia familiaris neben den Meisen, Kleibern, Goldhähnchen und ähnlichen Vögeln ein nicht hoch genug zu schätzender Vogel, welcher Garten- und Forstschädlinge und deren Bruten in großer Menge vertilgt und auf diese Weise dafür sorgt, daß diese nicht allzusehr überhandnehmen. Er sollte aus diesem Grunde überall da, wo er auftritt, geschont und gehegt werden, da er einer unserer nützlichsten Vögel und für den Naturhaushalt überaus wichtig und nicht zu entbehren ist.

Sind Mehlwürmer Infektionsträger?

Von Arthur Dresler.

(Nachdruck verboten.)

Zu den wichtigsten Futtermitteln für unsere weichfutterfressenden Stubenvögel gehören wohl die Mehlwürmer, da sie ja fast die einzige lebende Nahrung bilden, welche, leicht erhältlich, den Ersatz für die mannigfachen Gaben, die die Natur den Vögeln spendet, darstellen. Unentbehrlich für die Eingewöhnung der Wildlinge, die, ohne dieses wundervolle Lockmittel gekäfigt, sehr schwer am Leben zu erhalten wären, gewinnen sie in der speziellen Verfütterung für unsere gefiederten Lieblinge noch die weitere Bedeutung der diätetischen Regelung ihrer Ernährung. In dieser Beziehung verfährt die praktische Erfahrung nach bestimmten Grundsätzen, so daß sie im allgemeinen für die besondere Art von Vögeln die Anzahl der zu spendenden Würmer als Richtschnur beibehält und nur in Ausnahmefällen sich veranlaßt sieht, davon abzuweichen, so, wenn der Vogel in einem geschwächten oder überernährten Zustande sich befindet.

Selbst bei unseren gekäfigten Körnerfressern, die zur Frühjahrs- und Sommerszeit ja alle zu Insektenfressern werden und auch manches Würmlein annehmen, getreu ihrer Ernährungsweise im Freileben, wo sie, schon der Aufzucht der Jungen wegen, darauf verwiesen sind, bis die pflanzliche Natur, einschließlich die Kultursaaten des Ackers, ihnen in der Haupternährung zu Hilfe kommt, gewinnt die Verfütterung von Mehlwürmern eine gewisse Bedeutung dahingehend, daß sie in der Periode der Mauser neben den Ameisenpuppen, dem gehackten Ei usw. ihnen Kraftzufuhr durch Fleischnahrung bietet.

Dies sind bekannte Tatsachen, wozu auch die gehört, daß bei einem kranken Körnerfresser rechtzeitig angewandte Mehlwurmgaben oft Wunder wirken, sofern der Vogel freilich instinktiv sie als seine Rettung erkennt und annimmt. Anders hat in Einzelfällen eine gewaltsame Einführung von Mehlwürmern, in der Anzahl je nach der Größe der Vögel, in den gesperrten Schnabel, so daß der „Saft" des Wurmes bzw. dessen Eingeweide hineingedrückt wurde, ebenfalls eine alsbaldige Erholung von bereits bedenklich geschwächten Körnerfressern zuwege gebracht.

Ein Beispiel von der sicheren instinktiven Erkenntnis seiner Heilung durch Mehlwürmer gab mir ein Zeisig, der vom Vogelhändler direkt in meinen Besitz überging, aber bereits den nächsten Tag dauernd den Kopf unterstecke und nur fraß, wenn ich ihn dringend dazu aufforderte, indem ich auf seinen Käfig sacht klopfte und ihn von der Stange zum Futternapf scheuchte. Der Zeisig befand sich dicht neben einem Rotkehlchen. Am dritten Tage, als dem Rotkehlchen ein Mehlwurm entfiel, begab sich der Zeisig auf den Boden seines Käfigs, Gitter an Gitter mit seinem Nachbar, und trippelte daran hin und her, um zu dem Mehlwurm zu gelangen. Sofort entsprach ich seinem Verlangen; er zerbiß dem Mehlwurm den Kopf und saugte ihn aus, indem er ihn so lange seitlich den Schnabel passieren ließ, bis nur noch die bloße Haut übrigblieb. Nach einigen Tagen hatte der Zeisig sich bei dieser regelmäßigen Gabe sichtlich erholt. Er behielt die Mehlwurmnahrung, als erste Gabe des Morgens, monatelang bis nach Beendigung seiner Mauser bei, und erst nach dieser verschmähte er sie.

Noch eine andere erhöhte Bedeutung gewinnen die Mehlwürmer in der Verfütterung an unsere Stubenvögel durch die Materialien, mit welchen sie für diesen Zweck aufgezogen werden können, um gleichzeitig den Bedingungen von „Raupenfutter" zu entsprechen. In Ermangelung dieses natürlichen Raupenfutters für unsere Stubenvögel habe ich in der „Gef. Welt" bereits darauf hingewiesen, wie speziell in bezug auf den Ersatz von Raupenfutter — abgesehen von getrocknetem Seidenwurm — getrocknete und pulverisierte Vogelmiere und andere Blätter, die von den Raupen bevorzugt werden, als Teilbestandteil des Mischfutters mit Nutzen verfüttert werden; ihren Ernährungsbedingungen in der Freiheit ist damit einigermaßen entsprochen, da sie ja notwendig der Stoffe bedürfen, die ihnen die Raupen durch ihre Blätternahrung im verdauten Zustande zuführen.

Einfacher und zweckmäßiger genügen wir diesen gesundheitlichen und natürlichen Anforderungen unserer gekäfigten Vögel, wenn wir die Mehlwürmer, anstatt mit der üblichen Möhre oder nur mit Wasser (im Leinenlappen) als Tränkemittel, mit frischen Salatblättern und Busch- und Baumblättern, die sie annehmen, ausreichend versorgen. Auch gesammelte getrocknete Blätter, für den Zweck in Wasser erweicht, dienen demselben Effekt.

Damit dürfte das Problem der Raupenfütterung für die Vogelwirte auf die beste Art gelöst sein. In der Tat hat die Blätterverfütterung an die Mehlwürmer ergeben, daß die Tiere sich ausgezeichnet dabei entwickeln, daß die Vögel sie gern nehmen und sich dauernd wohl dabei befinden.

Ist nun bei der Aufzucht und der Pflege der Mehlwürmer alles geschehen, was die Sorgfalt für die so wertvolle Wurmnahrung für unsere gekäfigten Insektenfresser nur vorsehen kann, so ist es unverständlich, wie neuerdings einige Vogelwirte sich zu der auffälligen Behauptung versteigen können, daß die Mehlwürmer als gefährliche infektiöse Keimträger anzusehen seien, z. B. von Tuberkeln, daß die Stubenvögel danach sterben, also doch wohl an Tuberkulose eingehen?

Bisher ist diese Behauptung als allgemein bekannte Tatsache von seiten der Vogelwirte in vielen Jahrzehnten nicht laut geworden, es müßte dann sein, daß der Herausgeber der „Gef. Welt" sie auf Grund von vielen Untersuchungen eingegangener

Vögel, vielleicht auch bereits von dem unvergeßlichen Begründer dieser Zeitschrift mit übernommen hat — was mir nicht bekannt ist! Auch von anderer vogelwirtlicher Seite ist über die Mehlwürmer dergleichen bedenkliche Beanstandung nicht ausgesprochen worden.

Trotzdem soll es nicht als unmöglich von der Hand gewiesen werden, daß ein Mehlwurmbestand u. a. Tuberkelherd werden und sein kann, nämlich wenn diese gewiß sehr gefährlichen infektiösen Keime von außen in die Mehlwurmkiste gelangen durch den tuberkulösen Vogelwirt oder dessen kranke Angehörige, sobald diese sich mit der Fütterung der Mehlwürmer unvorsichtig beschäftigen. Weiter kann die Übertragung von infektiösen Keimen durch Vermittlung der Menschen von kranken Haustieren, wie etwa von Hunden, die von vielerlei Krankheiten befallen werden, auf die Mehlwürmer geschehen. Allerdings wäre von fachmännischer Seite noch zu bestätigen, ob die auf diese und andere Weise übertragenen infektiösen Keime für die Vögel noch die Ansteckungsfähigkeit besitzen wie für die Säugetiere, wozu ja auch klassifiziertermaßen der homo sapiens (Mensch) gehört.

Wiederum sind typhöse Erkrankungen und Sterbefälle unter den Stubenvögeln nicht so selten; sie aber auf die Mehlwürmer als Ursache zu beziehen, ist wohl noch keinem erfahrenen Vogelwirt eingefallen? Und doch könnte man mit demselben Rechte der Tuberkelverdächtigung sie als Typhuskeimträger bezichtigen! Nun ist aber in Hinsicht dieser meist katastrophalen Erkrankung der Vögel, der sie ja auch wohl im Freien erliegen, noch kein Fall bekannt geworden, daß Vogelwirte usw. dadurch angesteckt worden wären? Danach ist der Typhus der Vögel nicht identisch mit dem Typhus des Menschen bzw. der Säugetiere. Wäre nun — angenommenermaßen — die „Tuberkulose" der Stubenvögel identisch mit der menschlichen Tuberkulose bzw. der Säugetiere? Oder haben wir es bei der „Tuberkulose" der Vögel mit einer anderen Art von Tuberkeln zu tun? Was ist wissenschaftlich-bakteriologisch daran festgestellt und erwiesen, und was nicht? Liegen klinisch irgendwelche Erfahrungen dafür vor?

Mir ist darüber nichts bekannt geworden. Aber der Austrag dieser Fragen ist hygienisch sehr wichtig.

Hinsichtlich der Typhusfälle bei unsern Stubenvögeln ist die Ursache wohl stets auf Erkältung zurückzuführen — auf Verabfolgung von zu kaltem Trink- oder Badewasser bei fehlender Zimmerwärme oder durch hinzutretende Zugluft.

Bei einer sachgemäßen Pflege und Aufzucht der Mehlwürmer, wie sie zu Verkaufszwecken durch die Mehlwurmzuchtanstalten und die Zwischenhändler gehalten werden, ist ein Verdacht, daß die Würmer etwa für die Vögel als gesundheitsschädliche oder tödliche Keimträger anzusehen seien, unmotiviert. Die Mehlwurmzuchtanstalten beobachten die Bedingungen für eine gediegene Aufzucht der Würmer zu genau, um sich Erfolg und Verdienst zu sichern; sie verwenden bestimmt nur bestes einwandfreies Material für eine gesunde Aufzucht derselben.

Anders freilich steht es (nicht bei einem gewissenhaften Vogelwirt, der seinen Lieblingen nur sorgfältig gehaltene Mehlwürmer verabreicht!) oft bei privaten Laien-Vogelliebhabern, die es mit diesem lebenden Futtermittel für ihre Vögel nicht so genau nehmen. Da ist entweder die Kleie im Verfluß eines ganzen Jahres nicht erneuert, die in Portionen gereichte Mohrrübe vielleicht teilweise mit leichten Fäulnisstellen und Schimmel bedeckt, oder sie liegt zu lange, bevor die Würmer sie verzehren, säuert und schimmelt und teilt ihre schädlichen Pilzkeime dem gesamten Brutkasten mit; handelt es sich hinwiederum um eine bloße Tränkestelle durch Wasser, so bewirkt auch dieses, zu reichlich gegeben, Dumpfheit der Kleie, Pilz- und Milbenbildung darin. Erwähne ich die von manchen Laien-Vogelliebhabern geübte verwerfliche Gepflogenheit, tote Vögel oder überhaupt rohes Fleisch in die Mehlwurmhecke zu geben, um die Würmer zu „mästen", so steht außer allem Zweifel, daß die durch das faulende Fleisch sich entwickelnden Miasmen eine derartige „Mehlwurmhecke" zu einem Infektionsherd schlimmster Art

Junger Star, sich sonnend (s. S. 599).
Aufnahme von Helmut Hampe.

für die Vögel wie auch für die Menschen machen. Aber auch unter den vorher vermerkten Umständen ist die Mehlwurmhecke eine gesundheitliche Gefahr für die Vögel wie für Menschen. Allein die sich bildenden Milben in der Mehlwurmhecke bewirken bei feinhäutigen Personen äußerst juckende entzündliche Stellen.

Es ist deshalb bei Selbstaufzucht der Mehlwürmer dringlichst alle Sorgfalt zu empfehlen resp. müssen sie eine Pflege haben, die sie völlig gesund erhält. Allerdings würde man bei Bezug von Mehlwürmern auch nur solche Händler bevorzugen, die vertrauenswürdig genug sind, daß sie nur rein mit vegetabilischem besten Material aufgezogene Mehlwürmer zum Verkauf bringen.

Die hier aufgeworfene Frage der Verseuchung der Mehlwürmer mit Tuberkeln usw., wie sie eben neuerdings, bisher freilich ohne genaue Unterlagen für diese Behauptung, beunruhigenderweise in die Vogelliebhaberkreise getragen wird, kann nur durch hinreichende Daten mit möglichst wissenschaftlich genauer Bestimmung, also bakteriologisch durch Übertragungsexperimente und Identitätsbeweise mit den

Menschen eigentümlichen Tuberkeln entschieden werden. Jedenfalls ist diese Frage wichtig genug, um vom Standpunkte der Möglichkeit, daß die Mehlwürmer Infektionsträger sein können, die nicht nur Gesundheit und Leben unserer gekäfigten Vögel gefährden, sondern auch eventuell gefährliche Übertragungsfähigkeit auf den Menschen besitzen, in ernsthafte Erwägung gezogen zu werden. Die reiche Erfahrung der Leser der „Ges. Welt" und ihre eventuellen Beziehungen zur Wissenschaft könnten wohl der hier gegebenen Anregung eine nähere Beleuchtung zuteil werden lassen.

Der Kuckuck.

Von Werner Hagen, Lübeck.

(Nachdruck verboten.)

Drüben über Balingen färbt sich der Himmel heller und heller. Das Schilf der Wakenitz zittert und ruschelt im Frühhauch. Am Fischerbuden rauschen die Linden auf; in schweren Tropfen klatscht der Nachttau hernieder.

Das alte Kuckucksmännchen in der hohen Pappel überstellt sich, schüttelt das Gefieder und reckt verschlafen die Flügel. Vor zwei Stunden erst hatte er sich eingeschwungen. Müde blinzelt er in den schönen Maimorgen hinaus. „Da wären wir also." Über Griechenland war er in den letzten Nächten von Afrika heraufgezogen. Nun ist er daheim.

Lange Zeit bleibt er reglos. Dann streicht er mit schnellem Flügelschlag zur Wiese nieder. Hier tun sich die überwinterten Grasglucken- und Bärenspinnerraupen gütlich. Rüttelnd sucht er den Grasplatz ab. Mit jeder Beute fliegt er zum nächsten Busch, schüttelt sie und würgt sie heißhungrig hinunter.

Nach einer Stunde schwingt er sich in den Randbäumen des Kaninchenberges ein. Jubel und Lust herrschen um ihn. Fitis, Amsel, Zilpzalp, Gartensänger, Star, Mönch, Schilfsänger, Gartengrasmücke, Goldammer, Pirol und alles was sonst noch einen Schnabel trägt, singt und flötet und pfeift und schmettert. Die Bekassine meckert in hoher Luft, das Dommelchen unkt im Rohrdickicht. Kreischend jagen sich die Seeschwalben über dem Wasser. Da erfassen auch ihn Lenzesfreude und Liebessehnsucht. Weit öffnet er den roten Rachen und sendet seinen Ruf in die frühlingsfrohen Lande.

Der Fischer auf Spierdingshorst horcht auf. „Ruft da nicht der erste Kuckuck?"

Rastlos durcheilt das Männchen in den nächsten Tagen die altbekannten Gegenden. Suchend durchklingt sein Ruf das Flußtal. Selbst um Mitternacht bei Vollmondschein läutet es noch: Kuhkuh.

Eines Morgens ist auch das alte braune Weibchen wieder da. Kichernd beantwortet es seinen Ruf. In toller Hatz sausen beide über Büsche und Bäume.

Nach vier Tagen erscheint noch ein Männchen und folgt den beiden unermüdlich. Geschickt weicht das Weibchen den Werbungen der beiden Liebhaber aus. In stürmischer Hast eilen die drei hintereinander her. Das zweisilbige Kuku wird zum dreisilbigen Kaukaukuh. Da läßt der Alte vom Weibchen ab und wirft sich auf den Eindringling. Der schwenkt gewandt. Aber schließlich faßt er ihn. Beide stürzen zur Erde. „Hachsach hachsach." Doch wieder und wieder folgt der Junge. Da fügt sich der erste ins Unvermeidliche und duldet den Nebenbuhler. Dem Weibchen sind beide genehm. Einmütig sieht man die drei von nun ab über Schilf und Laubwerk streichen.

Die Mittagshitze brütet über dem Wasser. Die Sänger sind verstummt. Verloren ruft ein Kuckuck durch die Stille. Ein Schatten huscht um die Bäume der Landwehr. Das alte Männchen sucht das Weibchen. Das sitzt seit einer Stunde reglos in den Erlen bei Mückenbusch und beobachtet stumm ein Teichrohrsängerpaar. Vor einigen Tagen trug dasselbe Niststoffe. Es muß nun die ersten Eier haben. Jetzt ist das Nest entdeckt. Im Gleitflug geht der Kuckuck nieder. Tief neigen sich die Schilfhalme. Ein Rohrsängerei wird mit dem Schnabel

Junger Kuckuck.

gepackt. Acht Sekunden später liegt ein Kuckucksei an seiner Stelle.

Zwei Tage später fliegt das Weibchen unruhig flußauf und -ab. Es kann und kann kein neues Nest finden. Die meisten Rohrsänger sind noch nicht so weit. Das Ei drückt und drückt. Da fliegt es nach Mückenbusch, nimmt wieder ein Teichrohrsängerei und legt sein zweites hinein.

Alle zwei Tage legt das Weibchen ein Ei. Es hat bald keine Not mehr mit der Nestersuche. Die Rohrsänger waren eifrig am Bau. Alle zwei Tage wird eins der Pärchen mit einem Kuckucksei bedacht. Die Teichrohrsänger an der Landwehr, am Eisenbahndamm, hinter der Horst und bei Wakenitzhof, die Schilfrohrsänger im Kleinensee, am Stiegbrook und im Gärtnermoor, die Sumpfrohrsänger vom Fischerbuden und beim Bahnwärter, sogar die Drosselrohrsänger an der Ecke des Kaninchenberges und die Heuschreckenrohrsänger bei der Weberkoppel hegen eins.

Nur einmal ist das Weibchen noch im Druck. Es hatte sich die Kinderwiege eines Teichrohrsängers im Langen Jammer zur Ablage ausersehen. Da

waren am Morgen junge Burschen im Boot gekommen. Zufällig fanden sie das Nest und mußten es natürlich mitnehmen. Die Eier waren selbstverständlich nach einer halben Stunde herausgerollt. Sie waren zerschlagen und hatten schöne gelbe Streifen über die Pfingstbuxe des einen gezogen. Das Nest zierte später die Bude des andern. Im Herbst steckte die Mutter den Staubfänger in den Ofen.

Das Kuckucksweibchen sucht und sucht ein neues Nest. Es kann aber nicht gleich ein neues Rohrsängernest finden. Da wirft es sich über den Bruchwald bei Hundtenhorst, fliegt den Landgraben entlang bis zur Wiese und legt dem schwarzköpfigen Rohrammer das Ei in seinen Halmenbau.

Da liegt das fremde Ei im fremden Nest wie ein greller Fleck. Das Kuckucksweibchen ist in einem Rohrsängernest groß geworden. Seine Eier ähneln daher in der Färbung den Rohrsängereiern. Hier ist das grünliche Fleckenei unter die weißlichen Kritzeleier geraten. Der Ammer merkt nichts. Die Zahl stimmt. Eins nahm der Kuckuck vorher heraus.

Auf sechzehn Eier bringt es das Weibchen in diesem Jahre.

Dreizehn Tage liegt das Kuckucksei im Nest des Schilfrohrsängers im Kleinen-See. Dann platzt die Eischale, und der junge Kuckuck schlüpft einen Tag vor seinen Stiefgeschwistern. Ein roter Tropfen klebt am Rethalm, der erste Auswurf des neuen Weltbürgers. Keine zwei Tage später ist er allein. Er selbst ist noch so klein wie der halbe Nestboden. Tief hängt die eine Seite des Baues hernieder. Sollte das Kuckucksweibchen seinem Sprößling geholfen haben?

In der Kinderwiege des Sumpfrohrsängers beim Fischerbuden liegt schon ein großer Schlungs, der die Federn sträubt, eulenartige Ruckbewegungen macht und den großen roten Rachen aufreißt, kommt jemand dem Nest zu nahe. Unermüdlich füttern die Stiefeltern. Rasch wächst der Wechselbalg heran; er frißt ja für fünf. Bald ist er flügge und prüft seine Schwingen. Ein Nest nach dem andern wird leer.

Hochsommersonne sengt aufs Wasser hernieder. Stumm ist die Schilfwand, still der Uferwald geworden. Die Sänger mausern. Hier und da versucht ein junger Rohrspatz seine ersten Strophen. Die jungen Bläßhühner ziepsen. Verstohlen huscht das Teichhühnchen ins Schilf. Der Kuckucksruf ist verklungen. Die Alten zogen fort; und auch manches der Jungen ist nicht mehr hier.

Ein plumper, grauer Fischerkahn biegt in den Landgraben ein, einem Einbaum der Pfahlbauzeit vergleichbar. Vier Augen blicken prüfend auf jedes Seerosenblatt, schweifen suchend über jeden Retstengel. Die bronzenen Rohrkäfer auf den Froschbißblättern entgehen ihnen nicht, nicht die Bernsteinschnecke im Leesch. Jeder Wasserjungfer folgen sie, jeder Schilfmotte sehen sie nach.

Plötzlich läßt der Steurer das Ruder sinken. „Zirp zirp", tönt es in regelmäßigen Pausen am Ufer. Die Gläser fliegen an die Augen. „Junger Kuckuck!" Am Schilfrand, den die schweren Fischerstiefeln niedertraten, sitzt er, der letzte der diesjährigen Gauche. An den Tagen vorher gingen heftige Regengüsse nieder. Da sitzen die Raupen wohl noch in den Verstecken. „Zirp zirp", giert es heißhungrig, „zirp zirp". Endlich ein unterdrücktes Schnarren. Der Kleine fährt herum. Weit reißt er den roten Rachen auf. Das Schilf raschelt. Flink hüpft der Teichrohrsänger abwärts, klemmt fest die Zehen um den Rohrstengel, biegt weit den Körper vor und stopft die fette Raupe in den riesigen, unersättlichen Rachen.

„Nun haben wir die Strahlenfalle aus Gewitterfurcht im Hause gelassen!" „Und die Vogelringe dazu vergessen!" „Dumm!" „Ob er morgen noch hier ist? Laß ihn los!"

Grau hat sich am nächsten Morgen der Himmel umzogen. „Wenn Sie *den* wiederfinden, *dann* haben Sie Glück", ruft der Fischer uns nach. „Zirp zirp", klingt es schwach an der alten Stelle. Er sitzt tief im Ret. Hinein in die Schilfwildnis. Der Boden schwankt. Mit den Armen das Rohr beiseite gedrückt. Warten. „Zirp zirp." Wieder zwei Schritte

Junger Kuckuck.

vorwärts. Knien. „Zirp zirp." Weiter! Der Boden murrt. Horchen. „Zirp zirp." Vorwärts. Das Wasser quillt. Schadet nichts. Weiter. Zwischen den Halmen blänkert es. Langsam zieht's die Füße in die Tiefe. Weiter. „Zirp zirp." Da sitzt er über einem Pfuhl. Der Schwanz stippt ins Nasse. „Hat ihn!"

Bald sitzt er auf der gestrigen Stelle. Mißtrauisch äugt er nach dem Kasten. „Bitte, recht freundlich!" „So noch einige Male!

Nach dem Knipsen nehme ich ihn auf den Finger. Dort sitzt er geduldig still. Ab und zu reißt er stumm seinen roten Rachen auf. Die grauen Augen schauen sehnsüchtig in die Höhe. Plötzlich wirft er zuckend Flügel und Schwanz hoch, immerzu. Dann läßt er etwas fallen. Und dann — ein Sprung, und weg saust er, erst mit plumpen, krampfhaften Schlägen abwärts, fast bis auf den Wasserspiegel, aber dann im Bogen aufwärts — dem Lichte entgegen. Auf einer hohen Erle landet er. „Zirp zirp", ruft er unermüdlich ins Weite. „Zirp zirp." Das klingt so stolz und freudig.

Fahr hin, du schöner Vogel! Und wenn du im nächsten Jahre wiederkehrst, dann will ich im Röhricht liegen, und Schilfgeraschel und Retgesäusel sollen mir ihre Nixenlieder singen, und dein Glockengeläut soll mich einspinnen in jene Traumstimmung, die Menschentrug und Menschennot vergessen läßt und wunschlos glücklich macht — für kurze Zeit.

Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten.

Von J. Kuntzendorff, Berlin.

(Schluß.) (Nachdruck verboten.)

Die Krontangare — Tachyphonus coronatus (*Vieill.*).

Auch diese Tangare ist, abgesehen von geringen andersfarbigen Abzeichen, einfarbig. Das Männchen ist schwarz, stahlblau glänzend; auf dem Scheitel, nur beim Sträuben der Kopffedern sichtbar, ein roströtlicher Fleck; kleine Flügeldecken und Unterflügeldecken weiß; Flügel- und Schwanzfedern nicht so intensiv stahlblau glänzend; Auge braun, Schnabel schwarz, Unterschnabel dunkelbleifarben, an der Spitze bräunlichschwarz, Füße schwarzbraun. Lg. 184, Fl. 87—90, Schwanz 65. Mein Balg mißt Fl. 88, Schw. 80 mm. Das Weibchen ist lebhaft rostbraun; Oberkopf bis Nacken graubraun; Ohrdecken braun, fein grau gestreift; Bürzel, Schwanz heller zimtrot; Schnabel braun, Füße bräunlichfleischrot. Die Heimat dieser Tangare ist das südliche und südöstliche Brasilien. Hier bevölkert sie die Waldungen und ist besonders in den Provinzen St. Paulo und St. Katharina sehr häufig. Sie hält sich in niederen Gehölzen, hauptsächlich Gebüschen, ebenso wie in Gärten und Pflanzungen auf. Auf die Erde kommt sie sehr oft. Das Nest baut sie im dichtesten Gebüsch, zwischen frisch geschossenen, dicht gewachsenen Schößlingen gefällter Bäume. Es besteht aus lose zusammengefügten Pflanzenstengeln und dürren Blättern und wird mit Wurzelfasern ausgelegt. Das Gelege besteht aus drei weißen bis rosafarbenen, rotbraun gewolkten und gefleckten und schwarz gestrichelten Eiern.

Durch den Erfolg mit der Trauertangare ermutigt, schaffte ich mir ein halbes Jahr nach Erwerb dieser die Krontangare an. Im Käfig gleicht ihr Wesen dem der ersteren, ziemlich ruhig und gemessen benahm sie sich hier. Auch in der Voliere unterschied sie sich von jener hierin nicht, da sie dort gleichfalls ein ziemlich lebhaftes Temperament entwickelte. Auf jeden Fall ist sie ein keineswegs ruhiger und stiller Vogel zu nennen, da sie im ganzen genommen eine recht große Beweglichkeit an den Tag legte. Was nun ihre Verträglichkeit mit anderen Vögeln betrifft, so wird ihr, wie der vorangegangenen, das Gegenteil nachgesagt, zudem soll sie außerordentlich bösartig und mordlustig sein. Hat doch Dr. Ruß die schlimmsten Erfahrungen erst mit einem Weibchen, dann mit einem Pärchen gemacht, von dem sich das Weibchen abermals als das ärgere erwies. Trotzdem und weil ich mit den Trauertangaren bei denselben Voraussetzungen nur gute Erfahrungen gemacht hatte, wollte ich es mit dem Einsetzen im Flugraum auch bei der Krontangare probieren, denn bei einer allergrößten Aufmerksamkeit durften Verluste nicht vorkommen. Und siehe da, das Experiment gelang, denn zu meiner größten Freude ereignete sich während der zehn Monate, während welcher ich sie verpflegte — sie ging durch einen Unglücksfall ein —, auch nicht der geringste Zwischenfall, der mich zur Entfernung des Vogels aus der Voliere veranlaßt hätte. Keinem, auch nicht dem zartesten Tierchen, wie dem

Geschwätziger Honigfresser (s. Kleine Mitteilungen).

Gangesbrillenvogel — Zosterops palpebrora (*Tem.*), dem japanischen Brillenvogel — Zosterops japonica *Tem., Schl.* und dem Pitpit — Dacnis cayana (*L.*), wurde die Krontangare in irgendeiner Weise gefährlich, und sie vertrug sich auch mit allen übrigen Tangaren.

Während Ruß angibt, sie fräße in der Hauptsache Sämereien und weniger Früchte und Universalfutter, war es bei mir umgekehrt. Die Sämereien kamen entschieden an zweiter Stelle, während Früchte und Mischfutter unbedingt bevorzugt wurden, trotzdem die Körner ihr in reichlichem und abwechselndem Maße zur Verfügung standen, da ich zu der Zeit neben meinen 52 Weichfressern auch 9 Körnerfresser in dem Flugraum untergebracht hatte. Mehlwürmer waren für sie eine große Delikatesse. Einen Gesang habe ich nicht vernommen, nur rauhe Töne gab sie von sich. Das Badebedürfnis ist sehr ausgeprägt. In der Voliere hielt sie sich hauptsächlich in den Gebüschen und in dem Strauchwerk auf und benutzte seltener freistehende Zweige. Auf dem Boden bewegte sie sich sehr oft, besonders auf dem Erdreich unter den lebenden Sträuchern. Der schöne metallische Glanz des Gefieders kommt vor allem im prallen Sonnenschein so recht zur Geltung, so daß dieser Vogel, trotz der Einfarbigkeit, entschieden zu den schönen Stubenvögeln zu zählen ist.

Ich hoffe, durch meine Ausführungen das Interesse für diese wegen des üblen Leumundes, in dem viele stehen, von Liebhabern etwas gemiedenen Vogelarten geweckt und deren schlechten Ruf verbessert zu haben. Denn Tatsache ist es, die Tangaren begeistern den Pfleger durch ihre eminente Farbenpracht und bieten ihnen so viel Interessantes und Beobachtungswertes, daß die Liebhaber sich dieser in keinem Fall „dummen" Vögel getrost etwas mehr annehmen können. Gewähren doch gerade solche Experimente, wie ich sie z. B. mit den beiden letzten Arten vorgenommen habe, neben dem Interessanten auch einen gewissen Nervenkitzel und beim Gelingen eine große Befriedigung.

Kleine Mitteilungen.

Auslandsbericht. Die erfolgreiche Zucht des geschwätzigen Honigfressers (Myzantha garrula) (siehe Abb. S. 618) gelang Herrn E. Suggit, der über den Verlauf des Brutgeschäftes im Novemberheft des A. M. nähere Angaben macht. Zunächst stellt er im Gegensatz zu anderen Autoren fest, daß die Ernährung dieses Honigfressers sehr einfach ist. Er gab nur in Milch erweichte Semmel und einige Mehlwürmer; Weichfutter und Früchte wurden gelegentlich gereicht. Die Vögel baden selten. Immer recht beweglich und geschäftig, lassen sie dabei ihr weithin schallendes Kreischen vernehmen. Mit anderen ungepaarten Vögeln wurden sie in einem kleineren Flugraum gehalten, wo sie bald an verschiedenen Stellen formlose Nester bauten, ohne jedoch zur Brut zu schreiten. Ganz zufällig entdeckte Suggit am 15. Juni d. J. ein fertiges Nest, das in einem runden Körbchen an der Wand, 7 Fuß über dem Boden, angebracht war. Von den beiden gelegten Eiern verschwand das eine; am 30. lag das erste Junge im Nest. Die Eier sind von rötlicher Farbe mit hellroten Flecken, in größerer Zahl am breiten Ende. Jede Annäherung seitens des Pflegers wurde mit ängstlichen Rufen von den Alten beantwortet. Das gleichmäßige Gefieder der Geschlechter ermöglichte es nicht, festzustellen, ob beide sich am Brutgeschäft beteiligten. Das Junge gedieh bei Fütterung mit Mehlwürmern und Spinnen ausgezeichnet; auch Milchsemmel wurde angenommen. Am 16. Juli flog das Junge aus und wurde noch zehn Wochen lang zeitweise von den Eltern gefüttert. Jetzt im November gleicht es den Alten, abgesehen von geringen Abweichungen: Schnabel und Füße sind dunkler, der Hautfleck hinter dem Auge ist schmutzigweiß, statt gelb; die Querbänderung des Gefieders weniger ausgeprägt. — Die letzten Hefte des A. M. bringen Aufsätze von Sydney Portner über die Vogelwelt von Rhodesien mit guten photographischen Aufnahmen. Was der Autor darin über das Leben und Treiben des Cabaniswebers sagt, möchte ich hier kurz wiedergeben: Der häufigste Webervogel und der gemeinste Vogel Rhodesiens überhaupt ist der Cabansweber. In Form und Farbe gleicht er ziemlich dem allbekannten indischen Bajaweber; er ist goldgelb mit dunkler, prächtiger, schwarzbrauner Kopf- und Kehlfarbe. Flügel, Schwanz und Rücken sind olivenfarbig. Folgendes möchte ich in bezug auf diese Vögel hervorheben: erstens die schöne Färbung des Weibchens, das abgesehen von dem dunklen Kopf dem Männchen fast gleichkommt; dann, daß die Jungen ebenso lebhaft gezeichnet sind wie die Alten, aber auch mit hellerem Kopf, und drittens die einzigartige Weise, wie das Nest angelegt wird. Dasselbe ist ein wahres Kunstwerk, fast rund und so ausgezeichnet gewebt, daß es einem geflochtenen Körbchen ähnlich sieht; die Polsterung besteht aus den zarten Halmen des blühenden Ropokagrases. Ausnahmslos befindet es sich an dem äußersten Ende eines dünnen Astes, von dem alle Blätter, bis auf die Spitze, entfernt sind; letztere werden mit in das Nest hineingewoben. Meist hängt es direkt über dem Gewässer der Flüsse oder wird in unmittelbarer Nähe eines Hornissennestes angebracht, so daß der Zugang für Neugierige recht erschwert wird. Die drei bis sechs Eier eines Geleges sind weiß mit kleinen roten Flecken. Der Gesang ist wie bei diesen Arten, rauh und krächzend; in der Nähe einer Cabanskolonie ist der Lärm so stark, daß man sein eigenes Wort nicht versteht.

Dr. Luig.

Beobachtung. Meine diesjährigen Beobachtungen über die Rauchschwalben gibt mir Anlaß zu berichten, daß diese Vogelart bei uns sehr im Abnehmen begriffen ist. Von Jahr zu Jahr werden diese Vögel weniger, was hauptsächlich auf den Massenmord im Süden zurückzuführen ist. Auch die Bauweise der Häuser und nicht zuletzt Unverständnis und Rücksichtslosigkeit mancher Hausbewohner trägt dazu bei, daß unsere Schwalben immer mehr abnehmen. — Mein Lampenschirm wurde auch heuer wieder von den Schwalben als Brutstätte benutzt und die Jungbrut, bestehend aus 5 Köpfen, machte bereits am 18. Juni die ersten Flugversuche.

Anton Luginger, Pfarrkirchen.

Sprechsaal.

(Steht den Abonnenten kostenlos zur Verfügung.)

„Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber." Unter dieser nicht gerade geschmackvollen, auch unrichtig (nur die allergrößten Kälber usw.) wiedergegebenen Redensart als Überschrift, beschäftigt sich das „Händler-Blatt" (Zoolog. Zentral-Anzeiger) in einem Aufsatz mit den Futterangeboten der „Vereinigung hannoverscher Vogelliebhaber". Der Unterzeichnete war vom Hann. Verein mit der Futterbeschaffung beauftragt und will daher nur hier für sich auf den Angriff antworten. Im Vorjahre war die Beschaffung getrockneter Ameiseneier der hohen Preise wegen mit Schwierigkeiten verknüpft. Verlangt wurden für das Pfund 7—9 Mk. Vom Selbstsammler kaufte ich das Pfund für 6.— Mk. Die Klagen über die hohen Preise mehrten sich. Der Vorstand des „V. h. V. Fr." nahm sich der Sache mit gewohnter Tatkraft an, erbat von Hamburger Einfuhr-Firmen Angebote und wir waren bald in der Lage, den Mitgliedern beste finnische Ameiseneier für 3.— Mk. das Pfund liefern zu können, hatten auch noch etwas für die Vereinskasse für die Wintervorträge übrig. — Ich brauche für meine 60 Vögel, meist Weichfutterfresser, 50—60 Pfund Ameiseneier im Jahre, sparte durch den Vereinsbezug rund 300 Mk., deren Verlust die Weiterführung meiner Vogelstube in Frage gestellt hätte. Wir beziehen von einem Geschäftsfreund unseres Herrn Vorstandes Datteln, die zur Verarbeitung als „Konfitüren" nicht mehr geeignet sind. Diese Abfälle,

harte oder zu weiche Datteln müssen ausgelesen, innerlich schwarz gewordene nebst den Kernen entfernt, gewiegt oder zusammengeknetet und in Näpfen dargereicht oder an Futterhölzer oder zwischen die Käfigdrähte gesteckt werden. Von Grasmücken, Meisen, Tangaren, Seidenschwänzen, Organisten, Blattvögeln und anderen wird das sehr nahrhafte stark zuckerhaltige Futter als Beigabe leidenschaftlich gern gefressen. (Wir geben zu Versuchen den Vereinen 10 Pfund portofrei für 6.— Mk. ab, schicken kleine Proben auch voran.) Dieses billige Futter ist nirgends im Handel. — Weißwurm bezogen wir früher von Böhmen, jetzt von der Mosel, und zwar vom Händler. Wir sind mit den Bezügen recht zufrieden. — Ein Mitglied liefert dem Verein Zwiebackmehl zu sehr billigem Preise. Auch diese Futterbeigabe ist im Handel so wenig zu haben, wie die Futternäpfe, von denen wir den Satz als Gelegenheitskauf für 10 Pfennig an die Mitglieder abgeben. Um es diesen bequem zu machen, beliefern wir zwei hiesige Händler mit Mengen des Dattelfutters zum Wiederverkauf an Mitglieder, natürlich mit entsprechendem Gewinn für den Händler. Ein „Risiko" ist damit nicht verknüpft, da wir Nichtverkauftes zurücknehmen. Eine Schädigung des Handels aber auch nicht, wenn dieser seine Forderungen so stellt, daß auch der mit irdischen Glücksgütern nicht allzu reichlich gesegnete Vogelfreund seine Lieblinge ohne große Sorgen durch das Jahr bringen kann. Alfred Troschütz, Hannover.

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig.

1. Vorsitzender: Joh. Birk, Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29; Geschäftsstelle: Rudolf Petters, Leipzig-Probstheida, Preußenstr. 31; Kassierer: Werner Geßler in Leipzig, Dresdener Straße 2; Kauf- u. Tauschvermittlung: Max Dähnick in Berlin NO 18, Gr. Frankfurter Str. 90, Ecke Markusstr. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt"; Postscheckkonto: Leipzig Nr. 22418.

Die Belieferung mit Ameisenpuppen kann, um die vielen Anfragen in Gesamtheit zu beantworten, nicht mehr erfolgen. Die Beschaffung ist abgeschlossen. Berücksichtigt konnten nur die Besteller werden, die auf unsere Veröffentlichung im Sommer d. J. eingingen. Eine Anschaffung auf Vorrat war dem Reichsverbande mit Rücksicht auf die geringen Kassenbestände gar nicht möglich.

Wie bereits angekündigt, liegt der heutigen Weihnachtsauflage das 1. Flugblatt des Reichsverbandes bei. Wir bitten alle Vereine und Liebhaber ganz ergebenst, für weiteste Verbreitung, namentlich durch die Tagespresse, sorgen zu wollen. Der Presse soll das Blatt zur honorarfreien Aufnahme überlassen werden. Über den Erfolg bitten wir uns zu unterrichten. Bei Bedarf stehen weitere Exemplare gern zur Verfügung. J. A.: Petters.

Vom Vogelmarkt.

Von seltener auf den Vogelmarkt kommenden Vögeln werden angeboten

C. Balser, Fulda: Kapuzenzeisig × Kanarie, Magellanzeisig × Kanarie, Yarrellzeisig × Kanarie, Stieglitz × Kanarie, Zeisig × Kanarie, Stieglitz × Grünling, Grünling × Kanarie.

Richard Heydenreich, Bad Suderode, Harz: Schneeweiße, weißblaue und ganz blaue Kanarien.

P. H. Kirsten, Leipzig, Zeitzer Str. 53: 1,1 Schnurrbärtchen, 1,1 Rotkopfamadine, 1 Goldmaskensittich.

Max Kleinert, Berlin NO 18, Strausberger Straße 13: Loris von den blauen Bergen, Nymphensittiche, kleine Kubafinken, Rotrückenamazonen, Taubenhalsamazonen, Diadem-Amazonen, Surinamamazonen, Weißbauch-Papageien, Monasittiche, Schamadrosseln, Männchen und Weibchen, Graidrosseln, Katzendrosseln, Tyran, schwefelgelb, Blauraben aus Brasilien, Kronentangaren, Rosttäubchen, Riesen- und Pfalzschnabelpfäffchen, Jakarinifinken, schneeweiße Kanarien, schieferblaue Kanarien.

Joseph Krah, Vogelhandlung, Frankfurt a. M., Kühgasse 7: Schamadrosseln, 1 Beo, Goldstirnblattvogel, Braunschulterstare.

Max Mettendorf, Berlin N 58, Sonnenburgerstr. 9: Hänflings-, Zeisig-, Girlitz × Kanarien.

Odenwald, Vogel- und Tierexport, G. m. b. H., Fulda: Ararauna, Grünflügel-Aras, Molukkenkakadus, Weißhaubenkakadus, Feuerhaubenkakadus, Gelbmantelloris, Katharinasittiche, Port-Lincoln-Sittiche, Barnardsittiche, Grauköpfchen, Dolchstichtauben, Kubatauben, Guineatauben, kalifornische Schopfwachteln, Schamadrosseln ♀ ♂, kleine Beos, Himalajasäbler, Blauwangenbartvögel, Bengalenpitta, Rotschulterstare, grauer Kronfink, kleine Kubafinken.

Hans Steiner, Wirt „Zum Merkur", Biel (Schweiz): Blaue Wellensittiche.



Herrn H. W., Brunshaupten. Der Bergfink hat ungefähr die Gestalt des Buchfinken. Die Federn der Oberseite bis zur Rückenmitte, die Kopf- und Halsseiten sind schwarz und haben hellgraugelbliche Säume, der übrige Rücken ist weiß, die Unterseite rostgelblich, nach hinten weißlich, die Flügel- und Schwanzfedern schwarzbraun bis schwarz mit hellen graugelblichen Säumen, welche an den inneren Armschwingen sehr breit sind. Die Schulterfedern sind gelblichrostfarben, Schnabel wachsgelb mit schwarzer Spitze. Einen wachsgelben Schnabel hat auch der Berghänfling, der dem Bluthänfling ähnlich. Nur am Vorderkopf und auf dem Bürzel zeigt er eine trüb purpurrote Färbung. Das Helenafasänchen ist größer und langschwänziger als der Grauastrild. Die feine Querbänderung des Körpergefieders ist beim Grauastrild sehr matt, beim Helenafasänchen dagegen sehr deutlich sichtbar. Letzteres hat einen bräunlichschwarzen, einfarbigen Schwanz. Beim Grauastrild ist der Schwanz schwarz, und die äußerste Feder auf jeder Seite des Schwanzes ist auf der Außenfahne weiß.

Herrn H. B., Lippstadt. Das ♀ Sperlingspapagei ist einem Herzschlag erlegen.

Herrn Dr. P., Klötze. Der Vogel war eine junge Ringdrossel.

Herrn M. G., Karlshorst; Herrn J. K., Berlin NO; Frl. C. v. W., Dresden; Herren St. u. S., Neuß-Rhein; Herrn K. K., Göttingen; Hern A. B., Jena: Beiträge dankend erhalten.

Herrn R. L., Breslau; Herrn F. W., Dortmund; Herrn E. M., Küllstedt; Herrn K. E., Wien, ist brieflich Bescheid zugegangen.

Herrn J. K., Berlin N. Es handelt sich bei dem Vogel um einen krampfartigen Anfall. Es ist besser, den Vogel in seinen gewohnten Käfig zu setzen, der an einem nicht zu warmen Ort aufgestellt wird. Mehlwürmer bleiben vorerst fort.

Herrn G. Th., Oldenburg. Das ♂ Bandfink ist einem Herzschlag erlegen. Krankheitskennzeichen konnten nicht festgestellt werden. Der Bescheid über den Wellensittich ist im Redaktionsbriefkasten des Heftes 49 veröffentlicht.

Herrn M. D., Mierzig. Mischlinge zwischen Turteltaube und Lachtaube sind fortpflanzungsfähig.

Herrn P. P., Coblenz. In „Beraja" hat Dr. Kl. den Wanderfalken eingehend behandelt. Die Adresse ist Oederstädt (Bez. Halle). Bitte dort anfragen.

Herrn M. H., Bautzen. Bluthänflinge bleiben stets lange scheu, manche werden überhaupt nicht zahm. Am besten ist es, den Käfig hoch aufzuhängen, ihn oben mit frischen Nadelholzzweigen zu bedecken und auch die Vorderseite des Käfigs damit zu bestecken. Der Vogel fühlt sich dann sicher und beginnt auch bald mit dem Gesang.

(Fortsetzung auf der 2. Umschlagseite.)

gang 54 24. Dezember 1925 Heft 52

DIE GEFIEDERTE WELT.

ZEITSCHRIFT FÜR VOGELLIEBHABER

Begründet von Dr. Karl Ruß

Herausgegeben von Karl Neunzig in Berlin-Hermsdorf

Inhalt:

Die Dresdener Vogelschau. Von J. Birk, Leipzig.
Etwas über Krankheiten unserer Exoten. Von S. Lichtenstaedt. (Schluß.)
Einiges über den Baumläufer — Certhia familiaris L. Von Wilhelm Schreitmüller, Frankfurt a. M.
Sind Mehlwürmer Infektionsträger? Von Arthur Dresler.
Der Kuckuck. Von Werner Hagen, Lübeck.
Mitteilungen über verschiedene Tangarenarten. Von J. Kuntzendorff, Berlin. (Schluß.)
Kleine Mitteilungen - Sprechsaal - Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V. Sitz Leipzig - Vom Vogelmarkt - Redaktionsbriefkasten - Aus den Verbänden - Aus den Vereinen.

Abonnement monatlich (4 Nummern) 1.50 Gm. — Einzelpreis des Heftes 50 Gpf.
vermittelt das nächste Postamt bzw. der zuständige Briefbote. / Postversand ab Burg Bez. Magdeburg

reutz'sche Verlagsbuchhandlung / Magdeburg / Postschließfach 148

Aus den Verbänden.

Vereinigung d. Vogelliebhaber Landesverband Preußen. 1. Vors. Karl Gumprich, Berlin W 50, Nürnberger Str. 44 III; Geschäftsstelle: 1. Schriftf. P. Böhme, Berlin O 17, Rüdersdorfer Str. 69; Kassierer: Erich Merz, Bln.-Friedenau, Wilh.-Hauff-Str. 14. Verbandsorgan: „Die Gef. Welt". Schriftwechsel grundsätzlicher Art ist an den 1. Vors., im übrigen an die Geschäftsstelle (2. Vors.) zu richten. Geldsendungen: Postscheckkonto Berlin NW 7 Nr. 46155 für Erich Merz. Nächste Vorstandssitzung: 11. Januar 1926.

P. Böhme, Schriftführer.

Aus den Vereinen.

Liebhabervereinigung zur Pflege u. Zucht fremdl. Sing- und Ziervögel. Präsident Horst Wagner, Bruchmühle, Kreis Niederbarnim, Lindenstr. 32; Schatzmeister Eduard Schütze, Eystrup a. d. Weser; Postscheck. Hannover 56714; Geschäftsführer A. Krabbe, Anklam, Demminer Str. 10. Aufgenommen ist Mitgl. 219 n Max Schwinge, Prokurist, Halle a. S., Geseniusstr. 35; Mitgl. Nr. 230 n Erwin Böhm, chem. Ingenieur, Wien VIII, Diaristengasse 32; Mitgl. Nr. 246 n Karl Wolff, Buchdruckereibes., Wien XII, Meidlinger Hauptstr. 70; Mitgl. Nr. 254 n Adalbert Tschernach, Oberbeamter, Wien VIII, Dittesgasse 11/5. — Mitgl. 308 n neue Anschrift: Budapester Str. 15. A. Krabbe.

Verein der Liebhaber von Zier- und Singvögeln in Apterbeck. Sitzung jed. 1. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, in der Wirtschaft Sprave, fr Fritz Lecking, Kirchstr. F. Lecking, 1. Vors.

„Aegintha", Verein der Vogelfreunde zu Berlin. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat, abends 8 Uhr, im Vortragssaal des Aquariums. Fast in jeder Sitzung belehr. Vorträge und Besprechungen unter gütiger Mitwirkung unsers verehrten Ehrenmitglieds Herrn Dr. Heinroth. Gäste willkommen. O. Vorbrodt, 1. Schriftf., Berlin O 112, Scharnweberstr. 18.

Vereinigung der Liebhaber einheimischer Vögel zu Berlin. Sitzung jeden 2. Donnerstag nach dem 1. und 15. des Monats im Vereinslokal „Zum Alexandriner", Alexandrinenstr. 37 a. Gäste stets willkommen. P. Böhme, Schriftf.

Zier- und Singvögel-Verein Bernsbach im Erzgeb. Aus dem Bericht der Vorstandssitzung der Vereinigung der Vogelliebhaber Landesverband Sachsen und Großthüringen, Nr. 49 der „Gef. Welt", geht hervor, daß der Vorstand beschlossen hat, bei Ausstellungen ein Diplom auf Antrag des ausstellenden Vereins zu gewähren, wenn die Ausstellung diplomwürdig ist. Welche Ausstellung ist diplomwürdig? Meines Erachtens nach ist dieser Schritt des Vorstandes zu voreilig und dazu angetan, Zank, Streit und Unstimmigkeiten innerhalb unserer Organisation hervorzurufen. Bedenkt man, daß Ausstellungen und die Preisrichterfrage im Reichsverband und Landesverband noch nicht in einheitliche Formen geleitet sind, muß man den Schritt, welchen der Vorstand in dieser Sache getan hat, nur bedauern und unserer weiteren Entwicklung nur mit Besorgnis entgegensehen. Begutachter und Preisrichter der Ausstellung sind innerhalb unserer Bestrebung noch großer abweichender Meinung und in bezug der Prämiierung nicht einheitlich, sondern ganz verschieden eingestellt. Mancher Preisrichter begutachtet die Ausstellung in der Käfigfrage und im Gefieder der Vögel, andere Preisrichter wiederum den Gesang der Vögel. Ein wohlbekannter Preisrichter im Erzgebirge, welcher einen Vogel ohne Schwanz mit einem Ehrenpreis belegte, gab mir auf meinen Vorhalt die drastische Antwort, ich prämiiere nicht den Schwanz, sondern den Gesang des Vogels. Aus diesen Gründen heraus habe ich den Bericht des Vorstandes nur mit Bedauern aufgenommen, weil dieser Beschluß unwiderruflich zur Zersplitterung unseres Ganzen und anstatt zu Mitgliederzugang zu Mitgliederrückgang führen muß. Es wäre viel zweckmäßiger gewesen, wenn sich der Hauptvorstand erst einmal mit der Preisrichterfrage beschäftigt hätte, um auf diesem Gebiete etwas Ganzes zu schaffen, eine Einheitlichkeit der Begutachtung der Ausstellung herbeizuführen, dann konnte später die Frage über Diplome geregelt werden. Nach dem Beschluß des Vorstandes ist eine Ausstellung nur diplomwürdig, wenn eine Ausstellung von einem Mitglied des Vorstandes begutachtet worden ist. Dieser Beschluß bringt aber mit sich, daß der Verband und auch die ausstellenden Vereine, welche ein Diplom anfordern, finanziell ganz erheblich belastet werden. Hat sich der Hauptvorstand einmal mit der Preisrichterfrage befaßt und etliche Preisrichter für gut befunden, um eine Ausstellung zu begutachten, dann muß auch der Preisrichter der maßgebende Faktor sein, um zu wissen, ob eine Ausstellung diplomwürdig ist. Die Begutachtung und Verteuerung der Ausstellung durch ein Mitglied des Vorstandes käme dann in Wegfall. Ich hege nur den Wunsch, daß sich zu dieser Angelegenheit noch mehr Liebhaber äußern mögen, damit dieser Beschluß des Hauptvorstandes nicht zur Tat umgesetzt wird, bevor nicht in der Ausstellungsfrage eine Einheitlichkeit erzielt worden ist.

Albin Drechsler, Bernsbach.

Vogelschutz- und -liebhaberverein „Edelfink" Bochum. Jeden 3. Sonntag im Monat, vorm. 10 Uhr, Versammlung im Vereinsl. des Wirtes Heinrich Hucke, Bochum 4, Dorstener Str. Liebhaber stets willk. J. A.: Otto Abe, 2. Vors.

Verein für Vogelkunde und Geflügelzucht Breslau. Vogelliebhaber Breslaus, wollt ihr euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei nicht endlich auch zusammenschließen, wie es in anderen Städten schon längst geschehen ist? Ein Stamm von erfahrenen Vogelpflegern ist vorhanden, jedoch können Fortschritte nur erzielt werden, wenn alle noch abseits Stehenden sich uns anschließen und unsere mit belehrenden Vorträgen verbundenen Vereinsabende besuchen. Auskunft ert. bereitwilligst P. Spitzner, 1. Schriftf., Ofener Str. 26.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei Cassel. Sitzung jeden 2. Montag im Monat im „Deutschen Haus", Frankfurter Str. Liebhaber willkommen. E. Ivo, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -liebhaberei zu Dessau und Umgegend. Gegr. März 1925. Vereinslokal „Fürst Blücher", Ecke Antoinetten-Leopoldstr. Versammlung jeden 2. Mittwoch, abends 8 Uhr. Gäste zu allen Veranstaltungen stets willkommen. J. A.: Dielitzsch, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Dessau und Umgegend. Am Sonntag, den 6. Dezember, hatte der Kanarienzüchterverein im Tivoli seine Ausstellung, woran sich unser Verein durch eine Sonderschau beteiligte. Ausgestellt haben 10 Mitglieder. — Den Anfang machten die Exoten des Herrn Susemihl. Wellensittiche, Schmetterlingsfinken, Orangebäckchen, Amaranten, Grauastrilde, Tigerfinken und Zebrafinken. — Nun kommen wir zu den einheimischen Körner- und Weichfressern. Vertreten waren als erster ein sehr zahmer Kreuzschnabel des Herrn Göhrisch, welcher uns durch seinen angenehmen Gesang erfreute. Dann folgen Gesellschafts- und Einzelkäfige mit Kreuzschnäbeln, Erlenzeisigen, Stieglitzen, Hänflingen, Buchfinken, Dompfaffen, Girlitzen, Birkenzeisigen, Bergfinken, Grünfinken und Bastarden, Rotrückigen Würgern, Rotkehlchen. Sehr schön war ein Paar Gartenrotschwänzchen des Herrn Weicheli, welches wie auch sein Baumpieper in einem naturgemäß eingerichteten Käfig untergebracht war. Eine sehr schöne Kollektion edler Weichfresser stellte auch Herr Hampe aus. Es waren Gelbspötter, Gartengrasmücke, Sperbergrasmücke, Nachtigall und einige Schwarzplatten. Auch ein Paar zahme Turmfalken, welche Herr Walter in einer geräumigen Voliere untergebracht hatte, waren vertreten. Herr C. Krietsch stellte eine umfangreiche Sammlung zum Teil sehr seltener Vogelnester zur Schau. Wenn auch hier und da einige Fehler gemacht worden sind, so können wir doch zufrieden auf unsere erste Ausstellung zurückblicken. Und wenn sich durch dieselbe einige Liebhaber zu uns gefunden haben, so ist der Zweck für diesmal voll und ganz erreicht.

Ernst Kolbe jun., 2. Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Dortmund und Umgegend. Sitzung jeden 2. u. 4. Sonntag im Monat, nachm. 5 Uhr, im Restr. „Zum Löwentor", Königswall 75.

A. Spauche, Schriftf., Dortmund, Lagerhausstr. 21.

Alte Vereinigung der Vogelliebhaber zu Dresden. Vers. jed. Freitag, abends 8 Uhr, i. Vereinsl. „Bienenkorb", Schloßstr. Vogelliebhab. als Gäste willkommen. E. Schubert, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und Vogelpflege zu Dresden. Versammlung jeden Donnerstag, abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Eliesenhof", Eliesenstr. 69. Vogelliebhaber als Gäste willkommen. J. A.: Gustav Gottleuber, Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Mittelthüringens Sitz Erfurt. Sitzung jeden 2. Mittwoch und jeden letzt. Sonnabend im Monat im Vereinsl. „Stadt Chemnitz", Thomasstr. 57. Näh. Auskunft erteilt Franz Heinrich, 1. Schriftf.

Vereinigung einheimischer Waldvogelliebhaber zu Görlitz und Umgegend. Zusammenkunft jeden 3. Sonnabend im Monat im Restaurant „Zum Bismarckgarten", Bismarckstraße. 1. Vors. W. Lücker in Görlitz, Konsulstr. 7. Vogelliebhaber als Gäste willk. J. A.: Erich Rothe, 1. Schriftf.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite)

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei zu Hamburg. Sitzung jeden 1. u. 3. Dienstag im Monat in Hüttmanns Hotel, Hamburg, Poolstr. 22, abends 8.15 Uhr. Nächste Sitzung Dienstag, den 5. Januar. Gäste willkommen.
A. Weber, Vors., Hamburg 1, Raboisen 56, Hansa 9599.

Der Hannoversche Vogelschutzverein zu Hannover, gegr. 1881, wirkt mit sichtbarem und anerkanntem Erfolge für Vermehrung und Schutz der Vogelwelt bei Hannover durch Aufhängen von jährlich einigen hundert Nistkästen aller Art, durch Erweckung von Interesse und Liebe für die Vogelwelt mit monatlich, zur Gesangszeit wöchentlich stattfindenden Belehrungsspaziergängen und durch Vorträge und Austausch der Beobachtungen in den jeden 3. Dienstag des Monats stattfindenden Vereinsversammlungen. Seine Bestrebungen dienen also lediglich gemeinnützigen Zwecken. Mitgliederzahl rd. 1200, jährl. Beitrag nur 1 M. Meldungen an den Vors. Herrn Fritz Becker, Hannover, Boedekerstr. 1 F.

Verein der Liebhaber von Zier- u. Singvögel zu Hörde. Gegr. Sept. 1920. Versammlung im Winter, v. Okt. bis April, aller 14 Tage Sonntags, nachm. 5 Uhr, im Sommer, v. April bis Okt., abends 8 Uhr. Gäste u. Liebh. stets willk. Vereinsl. Restaurant Burghof, Bes. H. Ungewitter, Bruchstr.
Fritz Reyer, 1. Vors.; Paul Lohs, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -pflege Jena. Versammlung aller 14 Tage Sonnabends. Vereinslokal: Gasthaus „Zur Krone", Jena, Grietgasse. Gäste stets willkommen. Jena besuchende Vogelliebhaber treffen jeden Sonntag vorm. den Schriftführer Adolf Voigt, Jena-Ost, Feodorastraße 13, an und sind zur Besichtigung von dessen Vogelstube freundlichst eingeladen. Adolf Voigt, Schriftf.

Verein für Vogelschutz, Kanarienzüchter und Waldvogelliebhaber zu Kamenz u. Umgegend. Vereinsl. „Fitzners Bierstuben", Bautzner Str. 1. Vereinsabend jeden Sonnabend nach dem 15. jedes Monats. Vereinszeitungen „Gef. Welt" u. „Kanaria". Liebhaber willk. J. A.: Zacher, 1. Vors.

Verein von Vogelfreunden Karlsruhe. Gegr. 1888. Monatsversammlung jeden 1. Mittwoch im Monat. Lokal „Goldener Adler". Bang, 1. Vorst.; Boppel, 1. Schriftf.

Verein für Vogelschutz und -liebhaberei Köln, Ortsgruppe Köln im Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig. 1. Vors. Hans Lohmar, Köln, Blumenstraße 1, Fernspr. Nhld. 1223 u. Mosel 1646; 1. Schriftf. Fritz Herber, Köln, Albertusstr. 41; 1. Kassierer Anton Wollnitz, Köln, Thieboldsgasse 18. Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, abends ½ 9 Uhr, in der Restauration von Stephan Wilden, Köln, Christophstraße 23. Vogelliebhaber von Köln und Umgegend, schließt Euch im Interesse unserer schönen Liebhaberei unserem Verein an!

Verein der Vogelliebhaber Königsberg i. Pr. Sitzung jeden Freitag nach dem 1. u. 15. j. M., abends 8 Uhr, im Vereinslokal bei Gastwirt Lapschies, Kaiserstr. 46a. Gäste sind willkommen. Ernst Reinholdt, 1. Vors.

Verein für Vogelkunde, -schutz u. -liebhaberei zu Leipzig. Sitzung jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat im Vereinsl. „Bauers Brauereirestaurant", Täubchenweg. Nächste Sitzung Donnerstag, den 7. Jan. M. Roth, Schriftf., L.-Gohlis.

Verein der Vogelfreunde Leipzig-Plagwitz. Vereinsl.: „Gosenschlößchen", L.-Plagwitz. Sitzung jeden 1. u. 3. Montag im Monat, abends 8 Uhr. Vogelfreunde willkommen. Karl Scholtissek, 1. Vors., L.-Plagwitz, Lauchstädter Str. 30.

Vereinigung der Vogelliebhaber, Sitz Liegnitz. Versammlung beim Mitglied Herrn Laßner im Volkshaus-Nord, Glogauer Str. 20. Liebhaber willk. J. A.: Friedrich.

Verein der Vogelfreunde Linden. 1. Vors. P. Winkel, Linden, Fröbelstr. 9.

„A. Z." Magdeburg (Liebhaber exotischer Vögel). Jeden 2. Dienstag im Monat, abends 8 Uhr, zwanglose Zusammenkunft im „Alten Fritz", Berliner Straße.
gez. Eckstein, Lübecker Str. 115; Große, Steverstorfstr. 42.

Ornis, Verein der Vogelfreunde, Magdeburg. Am 2. Mittwoch im Monat Versammlung im „Alten Fritz", Berliner Str. Beginn 8 Uhr. Gäste willkommen. Gefl. Anschriften an K. Albrecht, Mgdbg.-Wst., Schenkendorfstr. 14.

Verein für Geflügel- u. Vogelzucht Mainz, Abt. f. Vogelschutz u. -pflege. Jeden 1. Montag im Monat, abends 8 Uhr, Versammlung im Lokal Schlink, Frauenlobstr.
A. Mertens, Schriftf.

Verein der Vogelliebhaber Mannheim. Sitzung aller 14 Tage im Restaurant „Zum Neckarstrand", Messeplatz 1. Liebhaber willkommen. Joh. Daubmann, Schriftf.

Verein für Vogelkunde, -schutz und -pflege zu Oschatz und Umgebung. Gegr. 1. Mai 1922. Vereinsabend aller vier Wochen, in der 1. Woche des Monats verb. mit Vortrag, in der 3. Woche nur gesellige Zusammenkunft. Vereinsl. „Sächs. Hof". Gäste willkommen. Mann, stellv. Vors.

Verein für Vogelschutz u. -liebhaberei zu Zwickau i. S. Versammlung jeden Freitag nach dem 1. und 15. im Monat. Vereinslokal: Gastwirtsch. Augustusburg, inn. Leipziger Str. Nächste Vers. 8. Jan., abends 8 Uhr. P. Schmidt, 1. Vors.

Anzeigenteil

Die viergespaltene Nonpareillezeile oder deren Raum wird mit 20 G.-Pfg. berechnet. Aufnahme erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages in Reichsgeld per Brief od. auf unseren Zahlstellen: Postscheckkonto: Magdeburg 3148, Wien 156 687, Bern III 4326, Prag: Creditanstalt d. Deutschen unter Angabe des Zweckes

Billige Gebirgs-Weichfresser-Kistenkäfige
lte bewährte Art, anheimelndes Aussehen, 3-Sprung, saubere Heimarbeit am Glatzer Schneeberge). [1811
Größe II: 60 cm lang, 26 cm breit u. 32 cm hoch, beide Stirnseiten eingeschobenes grünes Glas, links ein Einhiebefutternapf, Glasbadebaus, Zinklechschublade, weiche abnehmb. Decke, innen hellgrün, außen nußbraun gebeizt, 1 Stck. nur 16.— RM., exkl. Verpack. und Porto. Voreinsendung oder Nachnahme. **Größe I:** 15 cm kürzer, **Größe III:** 20 cm länger.
Verkauf edler Gebirgsweichfresser Liebhaberzentrale edler Gebirgsweichfresser, Bad Landeck (Grafschaft Glatz).

Pa. gesiebte Ameiseneier
Pfund 3.40 M.
über 5 Pfund à Pfund 3.30 M., 10 Pfund 31 M. franko.
Zecke . . . . . Pfd. 2.50 M.
Lon. Eigelb . . . . . Pfd. 2.— M.
Karottengrieß . . . . Pfd. 0.70 M.
Drosselfutter . . . . Pfd. 0.80 M.
Lucullus extra Mischung ½-Pfd.-Paket 0.95 M., weiße Packung 0.80 M.
Senegalhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Silberhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Allerhirse Pfd. 0.50 M., 10 Pfd. franko
Kerbtiernahrung f. Kanarien Pfd. 1.30 M.
Versand per Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. [1812
Paul Zornack,
Berlin NO 55, Prenzlauer Allee 189.
(Postscheck-Konto Nr. 652 65)
Gegründet 1905.

Quaiser's Vogelfutter „Ideal"
nach Angaben von Professor Dr. O. Fehringer, Heidelberg

Für Weichfresser:

Erdsänger und ähnliche Vögel,	Packung gelb,	groß:	2.40,	klein:	1.30
Grasmücken und Schwarzplatten,	„ rosa,	„	2.25,	„	1.20
Drosseln und härtere Weichfresser,	„ grün,	„	1.30,	„	0.70

Für Körnerfresser:

Stieglitze und Zeisige,	Packung rot . . .	groß:	0.75,	klein:	0.40
Hänflinge, Girlitze usw.,	„ blau . . .	„	0.75,	„	0.40
Kanarien, beste Qualität,	„ weiß . . .	„	0.75,	„	0.40

Franko jeder Station frei Verpackung!

Hauptverkauf für Deutschland: **Oskar Adler's Nachfolger, Zittau i. Sa.,** Weberstraße.

Tschechoslowakei: **Stefan Quaiser, Reichenberg (Böhmen),** Herrengasse.

Jeder Liebhaber und Vogelfreund wolle sich von der Qualität des **„Ideal"** überzeugen. [1813

Vereine und Wiederverkäufer erhalten Rabatt!



Mehlwürmer
veg. gez., ½ Liter franko gegen Voreinsendung von RM. 2.—. [1814
Bonitas-Versand Rostock i. M. 3.

Mehlwürmer
gegen Einsendung v. 2.— RM. ¼ Pfd. franko versend. **D. Waschinski & Co., Biesenthal i** (Mark). [1815

Mehlwürmer
(das ganze Jahr hindurch)
M 5.— das Pfd., ausschließl. Porto u. Verp.; bei Abnahme von 6 Pfd. Porto und Verpackung frei.

Ia Ameiseneier
3.— M per Pfd.
sand- und milbenfrei.
Ia Weißwurm, 1925er 4.— d. Pfd.
Ia Muska-Zecken . . 1.50 d. Pfd.
Ia Seidenraupenpuppen, gemahlen 0.60 d. Pfd.

tf. Universalfutter
Aleckwa I für Nachtigallen M 2.—
„ II für Grasmücken M 2.—
„ III für Drosseln . . M 1.50
das Pfund ab hier, ausschl. Verpackung; bei größeren Mengen billiger. [1816
Spezialvogelfutterhaus für Weichfresser
A. Eckrich II, Waldsee (Pfalz).

Mehlwürmer
½ Pfund 1.50 M gegen Voreinsendung. **Ameiseneier Ia,** holz- und milbenfrei, Pfund 4.— M. **Ameiseneier I,** wenig Holz, milbenfrei, Pfund 3.40 M. **Eibweißwurm,** Ia, Pfund 4.50 M, milbenfrei. **Muska** Pfund 1.50 M, ohne Steine Pfund 3.— M. **Seidenraupenpuppen,** gem. Pfund 60 Pfg.
W. Busse, Magdeburg,
Gr. Mühlenstraße 1. [1817

Mehlwürmer

à Pfund 5.60 ℳ, ¼ Pfund 2.— ℳ
franko gegen Voreinsendung

Ia Ameiseneier	Pfd. 4.— ℳ
Ia Muska	Pfd. 1.50 ℳ
Ia Weißwurm	Pfd. 4.50 ℳ
Seidenraupenschrot	Pfd. 0.60 ℳ
Garnelen, gem.	Pfd. 0.35 ℳ

Alles diesj. Ware, à Pfund ab hier.

Th. Witte, Niederndodeleben
bei Magdeburg. [1818

Mehlwürmer

1 Pfd. 5 ℳ ab hier,
6 Pfd. franko und Verpackung frei,
geg. Voreinsendung ¼ Pfd. 2 ℳ franko.

Ameiseneier, 1925er,

1 Pfd. 3.50 ℳ ab hier, 9 Pfd. 31 ℳ frk.

Ia Weißwurm, 1925er,

Pfd. 4.50 ℳ, 9 Pfd. 36 ℳ franko.

Ia Muska-Zecken

1819] Pfund 1.50 ℳ.

Seidenraupenpuppen, gemahl.,

Pfd. 0.60 ℳ ab hier.

Großabnehmer Rabatt.

Karl Claus, Mutterstadt II
(Hauptbahnhof).

Ameiseneier

gute Qualität, Ernte 1925, à Pfund 3.50 M., bei 10 Pfund franko.

Weißwurm

Ia, Pfund 5.00 M., bei 10 Pfund franko.
Versand per Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. [1820

Friedr. Gustav Müller

Berlin SW 61, Blücherstraße 61,
Postscheckkonto: Berlin Nr. 153 990.
Fernsprecher:
Moritzplatz 2689, Hasenheide 6682.

1925er Ameiseneier

hell, gesiebt, das Pfund M. 3.70 ab hier.
Bei Voreinsendung franko. [1821

Geno-Werk, Mannheim

Rheinkaistr. 8b. Hersteller des

Heidelberger Vogelfutter

nach Prof. Dr. O. Fehringer.

Vogelfutter

für **Kanarien, Waldvögel, Exoten, Papageien, Weichfresser.** Anerkannt bewährteste Mischungen auf Grund langjähriger Erfahrung. Liste 13 über Vogelfutter umsonst. [1822

W. Göpel, Leipzig,

Tröndlinring 1. Telephon 14 958.
Bei Anfragen bitte auf die „Gefiederte Welt" Bezug zu nehmen.

Ein Versuch

überzeugt jeden von der Güte meines **Universalfutters.** Preis 2 M. p. Pfd. Sämtliche Futtersorten für Exoten, Wald- und Kanarienvögel zu billigsten Tagespreisen. Versand geg. Nachnahme. Verpackung und Porto werden billigst berechnet. [1823

P. H. Kirsten, Leipzig 3,
Zeitzer Str. 53. Fernruf 31445.

Kanariensaat

Ia gereinigte, ostfriesische,
Zentner 24.— Mark mit Sack.

Gerd L. Claassen,

Bunde, Ostfriesland 12. [1824

1 pr. Gebirgsschwarzplättch., 1924, Doppelüberschläg., bereits lt. singd., 15 ℳ.
W. Stehr, Glatz, [1825
Frankensteiner Straße 75 part.

Unübertroffen ist

Heidelberger Vogelfutter,

hergestellt nach Vorschrift
und unter Kontrolle von
Professor Dr. Otto Fehringer
durch
GENO-WERK ~ Mannheim
Rheinkaistraße 8 b.

Anfragen über die Pflege einheimischer Vögel werden gerne beantwortet. Rückporto beilegen. [1826

„ORNIS"

Freie Bezugsvereinigung der Waldvogelliebhaber Deutschlands.
Gegründet 1912 ∴ Fernsprecher 4198 [1827
Fachgemäße Belieferung mit Vogelfutter („Reform-Normal", individuelle Zusammensetzung bei restlosem Verbrauch; stets frisch gemischt). Hunderte von Liebhabern füttern seit über einem Jahrzehnt mit bestem Erfolg nur **„Reform-Normal"**
Reform-Normal-Käfige Modell ORNIS 1925, neue Preisliste erschienen. — Modern eingerichtete Käfig-Bauanstalt mit elektrischem Betrieb.
Anschrift: Ornis-Haus, Halle-Saale. Der Geschäftsführer: Martin **Sperling.**

Einheimische und exotische Vögel aller Art, Affen, Schlangen etc. [1828

Tierhandlung

MAHORSICH,

TRIESTE (ITALIEN)
Via Ghiberti 8.

Steinrötel

Junghähne, diesjährige Herbstwildfänge, prächtig ausgefärbt, gesunde Tiere, fleißig. prima Sänger, abzugeben. [1829

Richd. Heydenreich,
Bad Suderode/Harz.

Prachtvoll singende **Schamadrosseln** 60 Mark.

1 Beo	50 M.
Nachtigallen	25 M.
Goldstirnblattvogel	60 M.
Braunschulterstare	12 M.
Blaustirnamazonen	70 M.

Versand p. Nachnahme (dringend 5.60 M.)
Josepf Krah, Vogelhandlung, [1830
Frankfurt a. M., Kühgasse 7.

Verkaufe:

1 Gartengrasmücke	10.— ℳ
1 Gebirgsrotkehlchen	5.— ℳ
1 Deutsche Nachtigall	20.— ℳ
1 Chin. Nachtigall	12.— ℳ
1 Safranfink	8.— ℳ
1 Dompfaffweibchen	3.— ℳ
1 Buchfink	3.— ℳ

alles 1—2 Jahr gekäfigte gesunde Vögel.

Oskar Sprewitz, Torgau,
1831] Schloßstr. 12.

Erstkl. Schwarzkopf sowie **Deutsche Nachtigall** für 30 ℳ abzug. od. geg. **erstkl. Sprosser** zu vertauschen. [1832
Gef. Ang. erb.
L. Kopp, Rohrbach bei Heidelberg,
Kirchheimer Str. 92.

Tausche:

6 gelbe Wellensittiche,
1,1 Bandfinken,
0,1 Safranfink [1833
gegen: Zebra-Tigerfinken, Goldbrüstchen oder weißblüt. Kanarien.
Tonius Martens, Kevelaer,
Friedensstraße 89a.

Grünflügiges Wasserhuhn	8.—
Rotrückiger Würger	10.—
Alpenlerche	7.—
Eichelhäher	6.—

und sämtliche Körnerfresser.
Porto und Verpackung 3.50 ℳ,
Dringend 6.50 ℳ. [1834
Ganz zahmer Rhesusaffe 130.—
Zoologische Handlung
Fritz Sterling, Berlin NW 5,
Perleberger Str. 35. Amt Moabit 4733.

Weihnachtsgeschenk!

vorzl. 2 Lieder sing. **Dompfaffen,** im Prachtgef., fingerzahm, lief. jetzt sowie d. ganz. Winter z. Pr. à 65.— M. Gar. leb. Ank., 3 Tage z. Probe gegen Nachn. u. Best.-Kosten. [1835
W. J. Grösch, Dompfaffen-Züchterei,
Dalherda (Rhön).

1,1 chin. Zwergwachteln,
1,1 Dornastrilde,
1,1 Schilffinken,
1,0 Binsenastrild,
in prachtvollen, kerngesunden und akklimatisierten Exemplaren zu verkaufen.
Otto Ludwig, Halle a. d. S.,
Merseburger Str. 20. [1836

Zu verkaufen:

David-Sprosser, Frühjahrsfang 1925, sehr guter Sänger, 45 ℳ und
Gebirgsschwarzplatte, Herbstfang 1925, schon laut singend, 10 ℳ.
Versende porto- und verpackungsfrei.
Alois Kehrer, Opfenbach,
bayer. Allgäu. [1837

Gebe

als überzählig aus meinen Volieren **ab:**

1,0 grauer Kronfink	8.—
1,0 Dominikanerkardinal	8.—
1,0 Zebrafink	7.—
1,1 ll. Elsterchen	4.—
1,1 Braunrückengoldsperling	6.—
1,0 Zeisigbastard	7.—
1,0 Girlitz	3.—

Tausche auf Blaukehlchen, Nachtigall, Grasmücken. [1838
Dr. Höft, Altona (Elbe),
Flottbecker Chaussee 58.

Suche

Stieglitze und Rothänflinge, nur Männch., **gebe in Tausch: prima Stahlwaren** (Bestecke, Messer, Scheren), **Ia Kanar. u. erstkl. bl. Reisebrieser** 1839] **M. Sommer,**
Aufderhöhe-Solingen.

♂ **lauchgrüne Papageiamadine, 1,1 Graukäpfchen** gebe in Tausch geg. Exoten aller Art (Zebraf., Mövchen usw.) **Verk.** auch **1,0 Rebhuhnastrild.**
Artur Schiebe, Liegnitz in Schlesien, Luisenstr. 24, A. Z.-Mitgl. 282. [1840

Beschwerden wegen Nichtzustellung der „Gefiederten Welt" sind beim zuständigen Postamt anzubringen.

Inserate

für das am 31. Dezember 1925 zur Ausgabe gelangende Heft 53 der Gef. Welt erbitten bis 26. Dez. 25

Weihnachtsofferte:

Schamadrosseln, Ia Hähne, herrl. Sänger, tadelloses Gefieder	60.—
Goldstirnblattvögel, dito	50.—
Blaustirnamazonen, junge	35.—
Blaustirnamazonen, etwas sprech., fingerzahme, fehlerfreie ausgesuchte Vögel	60.—
Diademamazonen	50.—
Groß. fingerz. Gelbhaubenkakadus	60.—
Kleine Gelbwangenkakadus	30.—
Wellensittiche, grüne u. gelbe, Paar	14.—
Grauköpfchen, Ia Paar	10.—
Blumenausittiche Paar	16.—
Bombay-Tigerfinken, hochrot, Paar	8.—
Kanarienhähne, Ia Säng. 12 bis	15.—
Kanarienweibchen	1.5
Meerkatzen, fingerzahm	60.—
Rhesusaffen	50.—

Zier- und Parkgeflügel auf Anfrage.
Versand p. Nachn., Verp. u. Porto 3.5
Dringend-Eilbote 6.50 M. [184
Carl Blüm, Tierhandlung,
Mainz a. Rhein, Bebelring 46.

Aus meiner Spezialzucht

tiefgelber Kanarie

noch einige Hähne abzugeben

Dr. Noelle,

[184
Berlin-Lankwitz, Waldmannstr.

Prima Kanarienhähne

tief in Hohl und Knorre (Stamm Seifert) 7.—M., Weibch. 1.— M.

F. Köhler,

[184
Aschersleben, Lindenstr. 44.

Schönfelders Kanarien feinzucht, Dresden-Trachau 37,

gold. Med. präm., Urstamm Seifert-Wolf empfiehlt tiefe Hohlroller, Knorren Schockel, schöne tiefe Flöten, Zuchthähne und ff. Tag- und Lichtsänger à 12, 15 18 M., 3 Stück zus. 40 M., erstklassig Vorsänger und Ausstellungshähne à 20 25, 30 M., 3 Stück zus. 60 M., prim Zuchtweibchen à 4 M. Versuch lohnt Hunderte von Dankschreiben. [184

Schneeweiße

Kanarien, desgleichen weißblau u. ganz blaue, Hähne u. Weibchen in großer Auswahl.

Richd. Heydenreich,
Bad Suderode, Harz. [184

Hochfeine Edelroller

prämiiert mit goldenen, silbernen und Staatsmedaillen,
in großer Auswahl zu mäßigen Preisen
Kanarienfeinzucht seit 1887.
Anfragen gegen Rückporto.

Heinrich Reinhardt, Eisenach,
Charlottenstr. 7. [184

Echte Harzer Kanarien-Edelsänger

Prima Roller
mit tiefen Hohltouren usw. liefert au höchstpräm. Harzer Zuchten:
Hähne zu 10.—, 12.—, 15.— Mark
Weibchen 1.50 Mark.
Garantiert reelle Bedienung!
Bei Anfrage Rückporto beifügen.

B. Reininger, Quedlinburg a. H.
1847] Schmale Str. 60.

Naumann

405 Bildertafeln für den billige Preis von 75 ℳ zu verkaufen.

Reinholdt, Königsberg i. Pr.,
Insel Venedig 1 II. [184

Der heutigen Nr. der Gefiederte Welt liegt ein Flugblatt de Reichsverbandes der Deutsche Vogelliebhaber e. V. Sitz Leipzi über Vogelschutz und Stuben vogelliebhaberei bei, auf welche wir unsere Leser ganz besonder aufmerksam machen.

Verantwortlich für die Schriftleitung: Karl Neunzig, Berlin-Hermsdorf; für den Anzeigenteil: Rolf Kretschmann, Magdeburg, Postschließfach 148.
Verlag der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. — Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

1. Vorsitzender:
Joh. Birk,
Leipzig-Mockau, Beuthstr. 29

Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber E. V.

Geschäftsstelle:
Rudolf Petters,
L. Probstheida, Preußenstr. 31

Erstes Flugblatt

des Reichsverbandes der Deutschen Vogelliebhaber e. V., Sitz Leipzig

Vogelschutz und Stubenvogelliebhaberei.

Keine Beschäftigung mit Kindern der Natur kann meines Erachtens eine so tiefe und innerliche Freude geben, wie die mit den Vögeln.
Goethe.

Der Vogelschutz, für die meisten Menschen nur ein Begriff vom Hörensagen, müßte schon längst Allgemeingut des ganzen Deutschen Volkes geworden sein, soviel wurde schon über ihn geredet und geschrieben, und trotzdem ist es nur ein verschwindend kleiner Teil der eigentlich weiß, was unter Vogelschutz zu verstehen und wie er praktisch auszuüben ist. Natur- und vornehmlich Vogelfreunde haben sich um die Fahne des Vogelschutzes geschart, haben ihn, gepaart mit der Kenntnis unserer einheimischen Vogelwelt, in die Praxis umgesetzt. Das Buch von Dr. Frh. v. Berlepsch: „Der gesamte Vogelschutz", gibt allen Interessenten eingehenden Aufschluß, ein Jeder müßte dieses Buch lesen, alle Behörden, Städte und Gemeinden müßten sich des Vogelschutzes mehr annehmen wie bisher, in allen Schulen müßte im Unterricht über das Leben der Vögel auch die Notwendigkeit eines praktischen Vogelschutzes unserer Jugend vor Augen geführt werden. Wäre dies der Fall, so verschwände von selbst das falsche Urteil über Vogelschutzausübung, es wäre dann nie möglich, daß sich im Übereifer sogen. Übervogelschützer über die wahren Ursachen des Rückganges einzelner Vogelarten derartig täuschen könnten, daß sie eine tief im deutschen Volksgemüt schlummernde Neigung, Vögel als Zimmergenossen zu pflegen, für die durch die fortschreitende Kultur bedingte Abnahme einzelner Vogelarten verantwortlich machen. Die Stubenvogelliebhaberei ist eine weitverbreitete, seit alten Zeiten datierende Sitte germanischen Volkstums. Die Liebe zur Natur und ihren Geschöpfen, vornehmlich zur Vogelwelt, ist germanischen Ursprungs, und die Geschichte berichtet uns von Vogelstellern wie: Kaiser Heinrich der Finkler, Walther von der Vogelweide und von einem Volker von Alzey, besungen im Nibelungenlied. In früheren Zeiten, als die Vögel in Deutschland nicht nur wie heute allein zur Käfigung, sondern in ungeheuren Mengen auch zu Nahrungszwecken gefangen wurden, merkte man nichts von einem Rückgang der Vogelwelt, denn die Natur in ihrer noch unkultivierten Bodenbeschaffenheit sorgte in ebenso reichlichem Maße für Auffüllung der entstandenen Lücken, indem durch den natürlichen Schutz einer urwüchsigen Flora eine genügende Brutgelegenheit die Vermehrung ungemein begünstigte. Die moderne Forstwirtschaft, der Getreideanbau, überhaupt die moderne Kultursteppe drückt der Vogelwelt die Richtlinien ihrer Zu- oder Abnahme auf. Den besten Beweis haben wir in denjenigen Arten, die sich der fortschreitenden Kultur anzuschmiegen verstehen wie z. B. Lerchen, Segler, Finkenarten usw. Diese „Kulturfolger" verraten uns eine Zunahme in der Zahl ihrer Individuen. Diejenigen Arten aber, die wir als „Kulturflüchter" bezeichnen, wie Schwalben, sowie auch andere versch. Singvogelarten, auch Sumpfvögel, haben zahlenmäßig in ihrem Artenbestand einen Rückgang zu verzeichnen. Diese von jedem Natur- und Vogelfreund tief bedauerte Tatsache müssen wir durch einen wirklich praktischen Vogelschutz, wenn auch nur im schwachen Maße, auszugleichen versuchen, nicht aber denken, daß ein gesetzliches Verbot der Stubenvogelhaltung diese leider vorhandene Tatsache sofort wieder ins Gegenteil umschlagen läßt, indem diese Arten wieder ersichtlich durch Individuenreichtum auffallen. Eine derartige harmlose, tief im deutschen Volksgemüt verwurzelte Herzensneigung wie die Stubenvogelliebhaberei sie darstellt, für derartige auf andere Ursachen begründete Erscheinungen verantwortlich zu machen, ist eine Folge der leider noch sehr weit verbreiteten Unkenntnis der Lebensbedürfnisse und -gewohnheiten unserer einheimischen Vogelwelt. Die Abnahme unserer Rauch- und Mehlschwalben ist eine tieftraurige Erscheinung, es geht aber doch nicht an, dafür die Stubenvogelhaltung verantwortlich zu machen, denn Schwalben werden ja nicht

im Käfig gehalten. Die als Großstädte bekannten Steinhaufen bieten ihnen keine Brutgelegenheiten mehr und auch das flache Land mit seiner schon mehr fortschreitenden modernen Bauweise macht den durch den Vogelmassenmord des Südländers gelichteten Reihen der zurückkehrenden Schwalben die Anbringung ihrer Nester schon viel bedeutendere Schwierigkeiten als dereinst die primitiven strohbedeckten Siedlungen unserer Vorfahren. Ein weiteres Gegenstück, z. B. der Buchfink, schon seit altersher ein bevorzugter sehr häufig gehaltener Stubenvogel wird auch heute noch der am meisten gekäfigte Stubenvogel sein. Warum aber trotzdem von keiner Abnahme, sondern von einer stark auffallenden Zunahme dieser Art gesprochen werden muß, dürfte sicherlich keine Folge seiner häufigen Käfigung sein, sondern einzig und allein die ihm zusagenden Wälder unserer heutigen Kulturssteppe begünstigen seine äußerst starke Vermehrung. So ließen sich noch viele Beispiele aus dem Leben unserer heimischen Avifauna anführen. Doch wer nicht denken und nicht begreifen will, in seinem blinden Eifer eines kranken Idealismus, dem bringen auch noch soviel Tatsachenbeweise nicht zu einer gegenteiligen Überzeugung. Die wissenschaftliche Ornithologie hat in ihrer Forschung einwandfrei festgestellt, daß in der freien Natur, speziell bei unseren Singvogelarten, die ja nur vorwiegend bei der Käfigung in Betracht kommen, die Anzahl der Männchen die der Weibchen bedeutend überwiegt, und dies alles, trotzdem vom Vogelliebhaber nur Männchen gekäfigt werden und trotzdem im Kampf ums Dasein die durch ihr farbenprächtigeres Gefieder mehr auffallenden Männchen viel häufiger ihren Feinden als Beute zum Opfer fallen. Trotz dieser Tatsachen noch ein Überwiegen des männlichen Geschlechtes, wo doch eigentlich, wenn das Rechenexempel der Gegner der Stubenvogelhaltung stimmen wollte, gerade das weibliche Geschlecht, das fast nie in einen Käfig kommt, ganz bedeutend in der Überzahl sein müßte. Vielfach ist man mit seinem Urteil voreilig und bezeichnet die Haltung von Waldvögeln als eine Tierquälerei. Ja, wenn es sich wirklich bei der Haltung unserer gefiederten Waldbewohner um eine solche handeln würde, gehört da nicht auch der Graupapagei in die afrikanischen Wälder zurück, nicht auch der Amazonenpapagei in die Urwälder des südamerikanischen Stromgebietes? Ganz gleich, handelt es sich um Stubenvogelliebhaberei, um die Haltung einheimischer oder exotischer Vögel, niemals kann diese aus der Liebe zur Natur und zu ihren Geschöpfen geborene Herzensneigung in einem Atemzuge mit Tierquälerei genannt werden. Der Mensch, als Beherrscher und Ausbeuter der Naturschätze hat es verstanden, von dieser seiner Vorrangstellung ausgibigen Gebrauch zu machen, alles in seine Dienste zu zwingen. Die Tiere, so auch die Vögel der freien Natur hat er, wenn sie ihm gewinnbringend erschienen, gezähmt und zu seinen Hausgenossen gemacht. Warum soll es nun dem Vogelliebhaber verargt werden, wenn er nicht aus materiellen, sondern ethischen Gründen, nicht zur leiblichen, sondern zur seelischen Nahrung sich einen Sänger aus Wald und Flur als Zimmergenossen zähmt, um dadurch Gelegenheit zu haben, sich mit einem Stückchen lebendiger Natur zu beschäftigen und um eine Stimme derselben auf seine seelische Verfassung einwirken zu lassen. Einer Überhandnahme der Zahl seiner Pfleglinge ist der Liebhaber enthoben, da, bei der Vogelhaltung handelt es sich meistens um eine Liebhaberei des kleinen Mannes, seine soziale Stellung von selbst eine Schranke setzt, eine Liebhaberei, die nicht nur Mühe und Arbeit, sondern auch finanzielle Opfer fordert. Ein materieller Gewinn ist dem gegenüber niemals zu verzeichnen. Der geistige Gewinn, die innere Befriedigung seines Herzensbedürfnisses entlohnt ihn im überreichen Maße für alle Mühe und Kosten. Oder soll der Vogelliebhaber alle diese Opfer nur bringen, um sich einer Tierquälerei schuldig zu machen? Nein, wo Liebe zum Geschöpf das Leitmotiv der Handlungsweise, wo Freude der Lohn für die gebrachten Opfer ist, kann nicht Lust am Quälen dabei sein. Nur Mitgefühl mit einem hilflosen Geschöpf und die Sorge um das Wohlergehen desselben sind die stetigen Mahner an das Pflichtbewußtsein des Vogelpflegers. Waren sie nicht alle Vogelliebhaber, die den Gedanken des Vogelschutzes geboren, sind sie nicht auch heute noch in ihrer Mehrzahl Anhänger der Stubenvogelliebhaberei, die praktische Arbeit mit leisten am Werke des Vogelschutzes? Es ist leider eine traurige Tatsache, daß es im Vergleich zur großen Masse nur ein kleines Häuflein von Naturfreunden ist, die die Natur kennen und daher lieben und für ihren Schutz mit Wort und Schrift eintreten. Wer die Vogelwelt lieben und schützen will, muß sie erst gründlich kennen lernen. Darin leistet ein Beträchtliches mit die Stubenvogelliebhaberei, wie dies ja in treffender Weise die Worte unseres Altmeisters auf dem Gebiete des Vogelschutzes und der -liebhaberei, des Hofrates Prof. Dr. Liebe sagen: „Lernet das Leben der Vögel erst genau kennen, wenn ihr sie mit rechtem Erfolg schützen wollt." Auch die ornithologische Wissenschaft verdankt einen Teil ihrer erfolgreichen Forschungen den Beobachtungen am gekäfigten Vogel. Vogelkunde, Vogelschutz und Vogelliebhaberei sind drei sich gegenseitig ergänzende und unterstützende Faktoren, deren gemeinsame Zusammenarbeit nur gefördert werden muß, wenn wir den Gedanken der Notwendigkeit eines Natur- und Vogelschutzes in alle Herzen pflanzen wollen.

Wenn wir der Berechtigung der Stubenvogelliebhaberei mit voller Überzeugung das Wort reden, sie als tatkräftige Vorkämpferin eines praktischen Vogelschutzes bezeichnen, so dürfen wir aber dabei nicht vergessen ausdrücklichst zu betonen, daß nicht Vogelkäfigung schon Vogelliebhaberei ist, daß sie nicht verantwortlich gemacht werden kann für die leider noch vielfach vorkommenden Auswüchse auf diesem Gebiete. Diese Mängel und Fehler zu beseitigen, überhaupt auf dem gesamten Gebiete der Vogelkunde, dem Vogelschutz und der -liebhaberei aufklärend zu wirken, hat sich der Reichsverband der Deutschen Vogelliebhaber, e. V., Sitz Leipzig, zur Hauptaufgabe gemacht. Er bittet daher alle Organisationen, die Naturschutz auf ihre Fahne geschrieben haben, um gedeihliche Zusammenarbeit, alle Liebhaber des gleichen Sinnes wie der des Verbandes um Zusammenschluß, denn nicht Ausrottung einer mit der deutschen Volksseele verwachsenen Liebhaberei fördert, sondern hemmt die Weitertragung des Gedankens von dem so dringend notwendigen Vogelschutz.

Gedruckt in der Schreibstube für Erwerbsbeschränkte, Leipzig, Gerberstr. 3

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 074285831